

GVLIELMI

ANDELETTII

PHYSICI, ET 71038

MEDICINÆ IN SCHOLA

Monspeliensi Professoris Regij
& Cancellarij

de curandorum omnium morborum corpo-
ris humani, in tres libros distincta.

EIVSDEM

DE *Dignoscēdis morbis.* } DE *Internū & externū.*
Febris. } *Farmacopolarū officina.*
Morbo Italico. } *Fucus.*

opus nunc in lucem castigatius edita.



71038


APVD IACOBVM STOER.

M. DC. IX.
GENEVA.






TYPOGRAPHVS CANDIDO LECTORI.

 V E M A D M O D V M
strenuus pater liberos suos
non tantum ad virtutum
studia promoueri obnixè
curat, verum etiam vt illustres, ma-
gnanimi, Reique publicæ vtilis fiant totis
nititur viribus: ita profectò haud minori
studio doctus quisque in libros, quos suo
marce conceptos ediderit, afficitur, illos
colit, atque intimè fouet: vtque probus geni-
tor pulchra probaque prole gaudet ac glo-
riatur, sic sanè doctorem operum autor, ea vt
propriis fœtus à laudatis commendari, am-
plecti (quo ad superstes est) ac decorari ma-

ximè cupit. Quòd si quispiam in re Me-
dica propaganda his calamitosis tempor-
bus affectus fuerit, in his Guliel. Rondele-
tius nomen suum profiteri merito potuit.
Illam enim de Piscibus doctiss. foeturam,
atque alia multa perutilia opera enixus
est. Non valuit autem (morte præuentus)
Methodum suam curandorum omnium
corporis membrorum, prælo mandare. Fa-
ctum tamen est doctorum Medic. cura, ve
ad fidelio rem quàm fieri potuit exemplaris
typum, eadem Methodus excuderetur:
quanquam pluribus in locis, non solum au-
toris sui iam defuncti, sed & diligentissimi
emendatoris egeret censura. Deus enim o-
mnia in omnes diuidit, alter vt ope alterius
indigeat. Qua ratione pro virili effecimus,
vt hæc nostra editio innumeris in locis e-
mendatior in reipublicæ vsum prodiret, ad-
iuti fretique monitu docti cuiusdam Me-
dici (Rondeletij olim pers familiaris) qui
exemplar iam diu à se emēdatum, cūm qu
opt.

optimis exemplaribus collatum nobis ex-
hibuit. Quare hunc nostrum laborem in-
uandi studio susceptum (Lector optime)
ut & reliqua à nobis iam edita boni con-
sule. Quod si feceris, ad maiora tibi
dicanda nos extimulabis.

Vale.





INDEX EORVM QVÆ
TOTO HOC OPERE
CONTINENTVR.

A

A Dnata quid indicent.
fo. 734.
Ægylops. 279
Aggregatiua Mesuæ. 279
Alipta moschata. 1108
Alopecia. 1
Alopeciæ à morbo Italico
curatio. 12
Amantium curatio. 239
Anasarca. 507
Angina. 325
Ani procidentia. 465
Appetentia canina. 426
Apoplexia. 106. & 110
Aphthæ. 113
Aquæ optimæ quæ. 930
Aqua hirundinis. 161
Aqua theriacalis. ibid. & 868
Aquæ eligendæ in medica-
mentis parandis ratio. 931
Aque frigide potus an con-
ueniat febribus. 769
Aquosus rameus. 600
Argentum quando medica-
mentis miscendum. 1181
Aromaticū moschatū. 1180
Aromaticum rosatum. 1178
Arthritis. 601
Arthritidis præcautio. 614

Articulorum affectus. 601
Ascites. 507. & seq.
Asthma. 339
Atrophia. 396
Aurium dolor. 293
Aurium tinnitus. 297
Aurum quando ingreditur
compositiones. 1181
Aurea Nicolai. 1195

B

B Alnea ad quid parentur
& quomodo. 1116
Bilis reiectio quid signifi-
cet. 687.

C

C Achexia. 517
Calculus renū. 522. 587
Calculus vesicæ. 526
Cancer vteri. 590
Capillorum defluuium. 1
Cardialgia. 421
Catalepsis. 97
Cataplasmata diuersa. 1693
Cataracta. 257
Catarrhus. 301. & seq.
Catholici compositio. 1166
Cataplasmatū vsus & eorum
cōponēdorum ratio. 1092
Catoche, seu catalepsis. 97.
& seq.

Causus.

I N D E X.

Causus. 778
Cephalalgia. 27
Cephalæa. 27. & 66
Cerata quomodo conficienda, & vnde dicta. 1224
Ceratū album Galeni. 1225
Ceratum diapente. 1227
Ceratum æsopi Galeni. ibid.
Ceratū de pelle ariet. 1226
Ceratum stomachicum Galeni. 1227
Cholera morbus. 435
Cibifastidium. 428
Citri solutium. 1173
Clysterum conficiendorum ratio. 881
Clysterum differentia. ibid.
Coeundi impotentia. 551
Collyria quæ & quomodo paranda. 1100
Colici dolor. mitig. 893. 894
Colico dolori vinum hippocraticū an conueniat. ibi.
Colicus dolor. 478. & 484
Columellæ inflammatio. 319
Columellæ laxatio, vlcera, ac tabes. 321
Composito medicamento- rum. 873. externorum. 1025. & seq.
Cōpositiones paratas quas debeat habere Pharmacopola. 1141. & seq.
Conceptumiuuantia. 1120
Condylomata. 585. & seq.
Conditorum componēdo- rum ratio. 1004 & 1015
Cōfectio hamech. 1170. & se.
Contusio membrorum. 977
Conuulsio. 182. & 188. & 193

Conuulsio à congelationē humorum. 187
Corpora sana quomodo cognoscantur. 616
Coxendicus dolor. 617
Cucufæ. Vide Sacculi.
Cutis vitia quot & quæ. 735

D

Decoctio cōmunis clysteris. 1164
Decoctio communis medicinae. 1165
Decoctio corporalis. ibid.
Decoctionum parandarum ratio. 1165
Dentes tremuli. 309
Dentium dealbatio. 310
Dentium dolor. 307
Dentifricia quæ & quomodo paranda. 1020
Diabete. 525. 526
Diacassia descriptio. 1166
Diairis Salomonis. 1185
Diamoschum. 1181
Diapenidion Nicolai Alexandrini. 1186
Diaphænicum. 1168
Diarrhæa. 443
Dolor capitis. 12. 27. & seq.
Dolor capitis à bile. 43
Dolor capitis à causa materiali calida. 19
Dolor capitis ab ebrietate. 69
Dolor capitis per melanch. 55. & seq.
Dolor capi. à morbo Ital. 67
Dolor capitis à pituita. 49
Dolor cap. per cōsensum. 62
Doloris capitis curatio. 26
Dolor omoplate. 623

I N D E X.

Doloris speciei inueniēde & partis affectus method. 554
 Dolorum cap. signa & distinctio. 27
 Dolorum causa. 30
 Dropax quid, & efficiendi modus. 1099
 Dysenteria. 456. & 460
 Dysuria. 542
 E
E Clegmata. 1009.
Electuarium de citro solutinum. 1173
 Electuariū diacartham. 1174
 Electuariū diarismpl. 1185
 Electuariū diamoschi. 1180
 Electuarium diarrhod. abbas. 1182
 Electuarium diatragacathi frigidi. 1184
 Electuariū de suc. ros. 1176
 Electuarium triasantalō descript. Nicolai. 1183
 Eclegmatōrum conficiendōrum ratio. 1010
 Elephantiasis. 632
 Embrocationes quę dicantur. 1123
 Emplastrum contra rupturam. 1254
 Emplastrum diachylō. 1251
 Emplastrum diachyl. commune. 1249
 Emplastrum diachylō cum gummi. 1251
 Emplastrum diachylō magnum. 1250
 Emplastrum diuinum. 1254
 Emplastrū de graniadei. 1255
 Emplastrū de mastiche. 1253

Emplastrū de melilot. 1251
 Emplastrū oxycroceō. 1252
 Emplastrum de ranis. ibid.
 Emplastrorum componendōrum ratio. 1250
 Empyema. 351. 372
 Epithemata quę & quomodo conficienda. 1107
 Epulotica medicamenta quę. 1079
 Epilepsia. 155. & 169.
 Epilepsia per cōsensum. 165 & 177
 Epilepsia grauidarum. 169
 Epilepsia ab utero. 168
 Epilepsia à melancholia. 162 & seq.
 Epilepsia à bile & ventriculo. 178
 Epilepsia puerorum. 174
 Epileptici insultus curat. 181
 Errhina quę & ad quos affectus parari debeant. 918
 Exanthemata. 623

F

Febbris definitio 738. 740. & seq.
 Febris an à putredine sanguinis fiat. 752
 Febris hectica. 793
 Febris in paralysi. 154
 Febris pestilentialis. 803
 Febris synochus. 761
 Febres compositę. 812
 Febrium compositarum diuisio. 814. 816
 Febrium differentię. 742
 Fernelij error de cale. 528
 Fernelij error de paral. 149
 Fluxus sanguinis e narib. 287

Fœtus

Fœtus retentio. 567
Fomētis quando vtendum.

III

Formulæ quomodo confi-
ciendæ, & quid præstent.

984

Fuci varij ad diuerfos affe-
ctus faciei sanandos. 1256
& seq.

Fucorum componendorum
ratio. ibid.

Furfurum curatio. 15. 16. 17.
& seq.

G

Gargarizationum com-
ponendarum ratio.

914.

Gargarismata ad oris inflā-
mationem. 913. & seq.

Glandium componendarum
ratio. 876

Glutinantia quæ. 1082

Grauedo. 305

Gonorrhæa. 549

H

Hætica cū putrida. 801

Hemicrania. 66

Hæmorrhagia e narib. 281

Hæmorrhoides. 467

Hepatis affectus. 490

Hepatis frigida intempe-
ries. 492

Hepatis inflammatio. 495

Hepatis intemperies sicca.
494

Hepatis obstructio. 499

Hepatis scirrhus. 503

Herniæ. 595 & seq.

Hydrops. 506

Hydrocele. 600

Hypochondriorum inflam-
matio. 225

I

Iecoris imbecillitas. 491

Icterus. 501

Ilei dolor. 487. & 489.

Incubus. 238

Indum maius. 1170

Injectiones in aures quomo-
do faciendæ. 910

Injectionum componenda-
rum ad varios morbos ra-
tio. 878

Infessio quid, & eiusdem cō-
ficiendæ ratio. 1115

Instaurantia medicamenta
quæ. 987

Italici morbi curatio. 833. &
seq.

Intemperies frigida quomo-
do cognosci debeat. 717

Ischuria. 543

Iulepi quomodo conficien-
di. 947

Iulepi diuersa ad varios affe-
ctus. ibidem.

Iuncturarum medicamenta
quæ. 951

L

Lachrimæ inuoluntariæ.
276

Lactis defectus. 382. exube-
rantia. 384. coagulatio. 385

Laxantium medicamento-
rum diuersitas. 1166

Lethargus. 90. & 94

Lienis affectus. 515

Lienteria. 453

Lothot quid. 1009

Lotiones quæ. 1121

I N D E X.

Lotionum vsus & diuersitas.
ibid.

M

M Ammarum inflāma-
tio. 285. incrementū.
386. scirrhus. ibid. cancer.

387.

Mania. 219. 233

Manus Christi sic Arabibus
dicta quid. 1020 & 1187.

Manus Christi cum parti:
vide Saccharum rosatum.

Masticatoria quę & quomo-
do paranda. 1016

Mequinum. 166

Medici cognitio in quibus
sita sit. 635

Medico an sufficiat illa vni-
uersalis cognitio corporū
sanorum, ægrorū, & neu-
trorum. 636

Medicamenta à quibus pe-
taneur. 1129

Medicamenta in officinis
quomodo collocanda.
1137

Medicamenta secundū par-
tes pugnantiā quæ. 1107

Medicamenta sicca purgan-
tia quæ. 957

Medicamentis ad paralytim
quomodo vtendum. 146
in Medicamētis quid aduer-
tendum. 636

Medicamentorum purgan-
tium varietas & differen-
tia. 946

Melancholia morbus. 200.
208.

Melancholia ob cerebri af-

fectum. 217

Melancholia hypochondria-
ca 223. 225

Mel syrupos quando ingre-
diatur. 931

Mellis anthosati descriptio.
1144.

Mellis rosati descriptio.
1143.

Mellis scyllitici descriptio.
1144.

Mellis violati descriptio.
ibidem.

Memoria diminuta. 103. &
seq.

Memoria imminuta ob vul-
nus. 314

Menses prouocantia. 553

Menses retenti. 561

Mensū fluxus immodicus.
553

Menstrua alba. 561

Mola. 576

Morbi genus inueniendi ra-
tio. 652

Morbus Italicus quid. 833.

Eius signa 840. curatio.

841. & seq. vsque ad 872

Morbum incipientem co-
gnoscere difficillimū esse.
645.

Morbum an facilius sit in
principio curare, quā
auctum aut perfectē fa-
ctum. 637

Morbōrū cognitionem quæ
obscurent. 639

Morcelli quomodo efficiē-
di. 1018. & seq.

Muliebris purgatio. 555
N. Nausea

I N D E X.

N

N ausea.	418
Narcoticæ potiones & quando illis est utendū.	953
Narium foetor.	912
Nephritici doloris curatio.	
614. & seq.	896
Nyctalops.	273

O

O culorum cicatrices & albugines.	254
Oculorum dolor.	247
Oculi exitus.	274
Oculorum vlcera.	252
O Esophagi affectus.	401. & seq.
Olea quib. potissimū morbis conueniant.	1026
Oleorū parādorū ratio.	1209
Oleum de absynthio.	1217
Oleum amygdalarum.	1221
Oleum anethinum.	1213
Oleum de castoreo.	1215
Oleum chamæ melinū.	1213
Oleum de costo.	1215
Oleum cydoniorum.	1211
Oleum enulatum.	1214
Oleum de euphorbio.	1215
Oleum de frumento.	1222
Oleum de Iunipero.	ibid.
Oleum irinum.	1214
Oleum Keirinum.	ibid.
Oleum laurinum.	1220
Oleum liliorū.	1212. & seq.
Oleum lumbricorum.	1221
Oleum mastichinum.	1215
Oleum de menta.	1216
Oleum myrtillorum.	1211
Oleum nardinum.	1217
Oleum nenūpharinum.	1212

Oleum Ouorum.	1223
Oleum de piperibus.	1219
Oleum philosophorū.	1223
Oleū rosatū cōpletum.	1210
Oleum rosatum omphacinum.	1210
Oleum rutaceum.	1214
Oleum sesaminum.	1210
Oleum sycionium.	1222
Oleum ex thymelea.	1221
Oleum ex torpedine.	ibid.
Oleum violaceum.	1212
Oleum vulpinum.	1211
Omoplatæ dolor.	623
Opiatę diuersę.	1008. & seq.
Opiatę hepaticę.	ibid.
Opij castigatio quā fiat.	1188
Ophiafis.	I
Ophthalmia.	239
Ophthalmia non vera.	244
Ophthalmia à bile.	242
Oris foetor.	312. & 915
Oris vlcera curantur.	981
Oris vlcera in morbo Gallico quā curanda.	917
Oris ventriculi inflāmatio.	407.

Ossiū solutio sine fractura.	734.
Ozenę.	289
Oxymellitis diuretica descriptio.	1146
Oxymellitis differētię.	1145
Oxysaccharę cōpositę descriptio.	1246

P

P Alpitatio.	199
Pandalea quę & quomodo faciendę.	1017
Parallela.	16

I N D E X.

Paralyſis.	112. & 123	Pilulæ cochiz Rafis.	1194
Paralyſis ex cõtufione.	144	Pilulæ cõmunes variz.	1191
Paralyſis extremorum ibid.		Pilulæ de cynogloſſa.	1202
Paralyſis labiorũ.	145. & ſeq.	Pilulæ elephanginz. vidẽ de	
Paralyſis linguæ.	135. & ſeq.	aromatibus.	1192
Paralyſis manuum.	146	Pilulæ de Euphorbio.	1200
Paralyſis offis hyoidis & mu		Pilulæ foetidæ.	1198
ſculorum laringis.	152	Pilulæ de fumo terræ.	1200
Paralyſis partium faciei.	145	Pilulæ de hiera ſimplici.	1192
Paralyſis pedum.	146	Pilulæ de lapide laſuli.	1196
Paralyſis penis.	141. & 143	Pilulæ lucis maiores & mi	
Paralyſis podicis.	140	nores.	1201
Paralyſis ſuperciliorum.	145	Pilulæ de maſtiche.	1194
Paralyſis veſicæ.	138. & ſeq.	Pilulæ partibus determina	
Paraphrenitis.	86	tz.	957
Parotides.	291	Pilulæ de rhabbaro.	1199
Partus difficultas.	569. 571	Pilulæ de ſarcocolla.	1197
Pasta regalis quid, & confi		Pilulæ de ſtyrace.	1202
ciendi modus.	1016	Pilularum componẽdarum	
Pedicularis morbus.	18. &	ratio.	1190
ſeq.		Pilularum differentia vnde	
Penis exulceratio.	545	petenda.	957
Peripneumonia.	341. 369	Pilularum materia.	958
Peffaria quæ & quomodo		Pignolata quæ & quomodo	
conficienda.	1021	ſiant.	1019
Philonium Perſicum.	1188	Pituitæ color varius.	690
Philonium Romanum.	1187	Pituitæ reiectio.	689
Phlyctenæ.	251	Pituitæ ſapor.	689
Phrenitis.	78. & ſeq.	Pituitæ reiectio per vrinam	
Phthiſis.	345	quid portendat.	691
Phymoſis.	547	Pituitæ per vterum reiectio	
Pica.	431	ibid.	
Pilulæ de agarico.	1198	Pleuritis vera.	352. 358
Pilulæ aggregatinz.	ibid.	Pleuritis non vera.	357
Pilulæ ante cibum.	1194	Polypus morbus.	288
Pilulæ de aromatibus.	1192	Pompholix quid ſit.	1244
Pilulæ affaieret.	ibid.	Potiones cordiales quid præ	
Pilulæ de beniouin.	116	ſtent.	593
Pilulæ de bdellio maiores.		Potionum componẽdarum	
		ratio.	252

I N D E X.

Priapismus.	548
Profluuij capillorum post morbum acutū curatio.	13
Pterygium.	250
Ptyalismus.	329
Pulmonis vlcera.	345 & 1014
Pultes ad quid & quomodo parandæ.	1098
Puluis diambre.	1181
Pulueres pro morborum di- uerſitate.	1181
Pulueres laxatiui qui & quo morbo conficiendi.	981. & ſeq.
Puluerum conſideratio.	1181
Pilulæ dilatatio & diminu- tio.	167
Puris reiectio.	685
Pus ſub cornea.	256

Q

Qualitatū ſeu affectio- num cognitio quid utilitatis medico adferat.	710
Quartana continua.	789
Quartana intermittēs.	790
Quotidiana continua.	786
Quotidiana intermittens.	788

R

Rhagadiæ.	593. & ſeq.
Ramétorum cognitio.	696.
Ramex aquoſus.	60
Ramex ventoſus.	ibid.
Raucedo.	327
Reiectorum cognitio & ex illis prædictio.	678
Reiectorum natura & diffe- rentiæ.	730

Reiectum viuum quid.	696
Renum inflammatio.	518
Renum vlcera.	520
Renum calculus.	522. & ſeq.
Requies Nicolai myreſfici.	1188.
Reſolutiones particulares.	135.
Retentorū cōſideratio.	706
Rofata nouella Nicolai.	1187
Ructus.	400

S

Saccharum quid in ſyr- pis præſtet.	1149
Saccharum roſatum.	1187
Sacculi quomodo cōficien- di.	1105
Sāguinis fluxus è narib.	287
Sanguinis miſtus.	530
Sanguinis ſputum.	342
Saporis pituitę qualitas.	689
Sarcotica quæ.	1078
Scabies.	629
Scirrhus hepatis.	563
Sciſſuræ.	585. 628.
Secundinarum retentio.	575.
Seminis reiectio quid futu- rum præſagiat.	692
Semitertianæ febres.	819
Semitertianæ curatio.	825
Sibilus aurium.	911
Signa futura morbi.	639
Sinapiſmi vnde dicti, & quā- do illis vtendū, illorūmq; diuerſa genera.	1099
Singultus.	431
Sitis immenſa.	424. & ſeq.
Sitis ſine materia curatio.	425
Somnum prouocantia.	954

I N D E X.

Somnus profundus.	94	Syrupus de hyssopo.	1163
Spasmus à punctura.	184	Syrupus iuiubinus.	1161
Spasmus per cōsensum vteri & ex verminibus.	185	Syrupus ex infusione rosarum recentium.	1148
Sputum sanguinis.	342	Syrupus de liquiritia.	1159
Schinæ radice præparatio in diætâ morbi Ital.	860	Syrupus de limonibus.	1148
Sterilitas.	564	Syrupus de menta.	1157
Sternutatio.	299	Syrupus myrthinus.	1148
Stupor quid.	154	Syrupus nenupharinus. ibi.	
Stranguria.	541	Syrupus de papauere.	1162
Strumæ.	315	Syrupi de pomis cōpositio.	58.
Syncope.	280	Syrupus de prassio.	1160
Synochus putris.	776	Syrupus de stœchade.	1158
Syrupi simplices.	1148	Syrupus violatus.	1147
Syruporū componendorum methodus.	923	Suberh.	94. & seq.
Syruporum materia	930	Sudorum cognitio & ex illorum cognitione prædictio.	699
Syrupus de absinthio.	1157	Suffitium vsus.	1124
Syrupus de arthemisia.	1164	Suffusio.	257
Syrupus acetosus simplex.	1148	Sugillata.	255. & seq.
Syrupus de buglossa.	ibid.	Suppositorium: vide glâdes	876
Syrupus capil. veneris. ibid.		Suppuratio.	296
Syrupus de cichorio siue rhabarbaro.	1152	Surditas.	298
Syruporum compositorum componendi ratio.	922.	Surditatis curatio.	311
& seq.		T	
Syrupi cōpositi qui in officinis parandi.	1149	T Abellarum conficiendarum ratio.	1014 & 1138
Syrupi endiuizæ cōpositi descriptio.	1154	Tenasmus.	462
Syrupus endiuizæ simplex.	1148.	Tertiana exquisita.	782
Syrupi de eupatorio descriptio.	1154	Tertiana spuria.	784
Syrupi de fumaria descr.	1155	Testium contusio.	593
Syrupus de fumo terræ.	1155	Testium & scroti inflammatio.	594
& seq.		Thoracis morbi quæ medicamenta admittant.	950
		Tonsillarū inflammatio.	322
		Tonsil-	


INDEX.

Fonfillarum vlcera ferpē- tia. 324	Vertigo. 70. & seq.
Tortura oris. 196. & seq.	Veficæ inflammatio. 531. & seq.
Tremor. 197	Veficæ vlcera. 533. curatio. 535
Tremor cordis. 375	Vigiliæ superflua. 89
Triphera perſica. 1172	Vini hippocratici iniectio. 895
Trochiſci de agarico. 1204	Viſus debilitas. 268
Trochiſci alkekangi. 1206	Viſus obſcuritas. 271
Trochiſci de antiſpodio. 1207	Vlcera capitis manantia. 19. & seq.
Trochiſci de capparib. 1206	Vlcerū cognitionem ad præ- dicendū plurimum con- ferre. 728
Trochiſci de carabe. ibid.	Vnguenta pſilotra quæ. 1038
Trochiſci cyphi. 1209	Vnguēta ad varios affectus. 1228.
Trochiſci de galla moſcha- ta. 1208	Vnguentum Egyptiacum. 1272.
Trochiſci de rhabarbaro, eupatorio & abſynthio. 1205	Vnguentū ex adipibus. 1238 & seq.
Trochiſci de ſcylla. 1205	Vnguentum Agrippæ. 1236
Trochiſci de violis. 1203	Vnguentū album rafiſ. 1245
Trochiſci de viperis. 1208	Vnguentum apoſtolorum. 1242.
Trochiſcorum componen- dorum ratio. 1203. & 1203	Vnguentum Aragon. 1235.
Trochiſcorum efformado- rum ratio. 1204	Vnguentū de arthanita par- uum. 1240
Tumorum cognitio. 662	Vnguentum aureum. 1241
Tuffis. 334. & seq.	Vnguentum baſilicum ma- ius. ibid.
Tympanites. 394	Vnguentum baſilicum mi- nus. ibid.
Tympanites curatio. 514	Vnguētum de bdellio. 1239
V	Vnguentum citrinum. 1246
Ventriculi dolor. 417	Vnguentum cōtra vermes. 1248. & seq.
Vétriculi imbecillitas. 408. inflatio. 415. dolor. 417.	Vnguentum craſeos. 1243
Vermes. 474	Vnguētum deſiccatiuum &
Vermes vnguētis deturban- tur. 886	
Vermium ē ventriculo & ſu- perioribus inteſtinis de- turbandorum ratio. ibid.	

I N D E X.

rubrum.	1244	Vomitum crientia.	956
Vnguentum Dialtheæ	1236	Voulimos.	428
Vnguentum enulatum.	1248	Vrinæ ardor.	536. & seq.
Vnguentum fuscum Nicolai.	1240	Vrinâ prouocantia vnguenta.	1055
Vnguentum martiatũ.	1228	Vrinæ retentio.	85
Vnguentum nutritum.	1248	Vteri cancer.	590
Vnguentum pectorale	1238	Vteri scirrhus.	589
Vnguenta pectoralia.	1237	Vteri vlcera.	592
Vnguentum pompholygos.		Vteri inflammatio.	588
1243		Vteri inflatio.	578
Vnguentum resumptiuum.		Vteri iniectiones cur & quomodo faciendæ.	904. 905.
1237		Vteri phymosis.	576
Vnguentorum componendorum ratio.	1228	Vteri procidentia.	583
Vnitatis solutio.	723	Vteri suffocatio.	580
Vomitus.	418	Vteri scissuræ & cõdylomata.	585. & seq.
Vomitus sanguinis.	422. & seq.		

D. GVLIEL.





D. GVLIELMI RON-
DELETII D. MEDICI,
ET MEDICINÆ IN SCHOLA
Monspeliensi Professoris
regij, & Cancel-
larij,

CVRANDI MORBOS METHO-
DVS, QVÆ VVLGO PRACTICA
dicitur, in tres libros distincta.

De Alopecia, Ophiasis, & Capillorum defluuiis.

CAPVT I.



ILORVM amissio est, quæ à causa
præter naturam interna originem ha-
bet. Duas communes ex se parit diffe-
rentias: vnâ, quando qui decidit pi-
lus, areæ speciem in ea parte relinque-
re videtur, ex quo & areæ appellatio-
nem sumpsit: alteram, in qua pili aut capilli ex omnibus
capitis, vel corporis partibus defluunt sine discrimine, &
qui remanent, tenues & rari esse deprehenduntur, vnde
capillorum defluuium nominata est. Sed de ista poste-
rius, de altero verò primo loco dicendum. Huius quidem
duo sunt genera, quorû alterum Græcè à vulpe Alope-
cia dicitur: vt cynanche à cane, vt cherades à porcis, pro-
pterea quòd illa animalia, tali affectioni sunt obnoxia.
Alterum genus tam Græcis, quàm Latinis à serpentibus
nomen sumpsit, vnde Ophiasis appellatur. Ab istis verò
Tyria nominata est affectio, quo Arabes nomine non
solum viperas, sed serpentes omnes comprehenderunt.
Hæ affectiones morbi speciem vnâ constitunt, sed si-

*Amissio
capillorû
duplex.*

Alopec- gura differunt. Alopecia enim nullam peculiarem figu-
cia & O- ram habet, sed sub qualibet extenditur. At Ophiasis sub
phiafis di- certa semperprehenditur: quippe ab occipitio duo-
stinctio. rum digitorum latitudinē non excedens, ad aures duobus capitibus serpit: quibusdā etiam ad frontem usque, donec sese duo illa capita in anteriorem siōtis partem iungant, ita ut speciem carinæ præbere videantur, in quo & aliud illarum affectionum discrimen exoritur: cum Ophiasis sedē perpetuò in capite habeat, & infantibus solum accidat, & ad lepram dispositis. Adde quod læsam capitis partem, serpentis figura, glabram ostēdit. Alopecia verò barbā, reliquāsque corporis partes pilis à natura conuestitis non minùs occupat, quàm caput, nec minùs etiam alias ætates quàm infantiam, infestare solet. Præterea nunquam nisi ope medicamentorum euelli potest, cū Ophiasis absq; vlllo externo auxilio, suāque spōte interdum desinere frequenti experiētia posse videatur, præterquam in his, qui ad lepram dispositi sunt, maximè si cutis mollior sit & laxior. Commune autem ambabus est, quòd summa cuticulā siue cutis externa emoriatur, qua ratione primū extenuantur, deinde excidunt pili. Præterea si cutis pungatur, sanguis ferofus in illis exire consuevit. Omnium verò illarū perniciosissima censenda est, in qua cutis densior conspicitur, vel & subpingue tactui referens, aut ex toto glabra. Quòd si etiam per vniuersum corpus se extendat, materiāque à pituita acceperit, illā lepræ speciem inducit, quam thyriasm Arabes appellauerūt, sicut illi à sanguine ortā, quartum genus lepræ appellauerunt, quæ rubra dicitur: & qui ea afficiuntur, rubri elephantes à Galeno dicuntur. Defluxus capillorum nullas notas tradidimus, quoniam ipsæ sensui sunt satis per se manifestæ.

Affectionum causa.

*C*ausæ autem omnium illarum affectionum, aut ad humorum prauitatē, pilorum radices erodētium, aut ad alimentum, quod illos auget, penuriam, aut ad meatuum cutis amplitudinem, & laxitatem sunt referendæ.
Materia. Per humores, serū omnium humorum intelligimus, ut sanguinis, pituitæ, vtriusque bilis, à quibus tantum hos morbos posse excitari nos docet tū Cornelij Celsi au-
 thori;

thoritas, cum ait serosum sanguinem exire si cutis in his partibus pungatur, quæ hos affectus patitur: tum etiam ratio, cum partes quibus consistunt, maximè sint remotæ, & venæ, quæ ad illas ducunt, valde exules, & angustæ, cutis item illarum densa fieri non poterit, vt materia, quæ crassitiem magnam habuerit, ad illas peruenire valeat. Quare tenuem illam esse oportet, quæ in eam sedem erumpere, & peruadere possit, quam tamen paulò crassiorem esse cōcedo ea, quæ furfures efficere dicitur, quam ad epidermida vsque peruenire tunc necesse est, cum satis sit in capillorum defluuio veram eutem illo humore imbuī. Quod autem frequentius & facilius his affectibus infestentur capitis, barbæ, superciliorūque partes, cutis meatuum astrictio, densitasque in causa est, quæ maior, quàm in aliis partibus vestimentis coarctatur. Ex quibus manifestum euadit, nō aliam esse istorum affectuum materiam, quàm serum humorum, quo cutis verè imbuta est. Huic autem materiæ prauitatem inesse necesse est, quæ duplex est, communis & peculiaris. Communis prauitas est, quæ à communi humorum & veluti consueta putredine, & corruptela prouenit, talisque pueris capillorum defluuium in vlceribus capitis manantibus efficere consuevit. Peculiaris autem est, quæ certam quandam & insolitam malitiam aut ex aduersione, vel alia quadam maligna & perniciofa constitutione cōtrahit, qualis est leproforum, quibus ob eam causam superciliorū pili potissimū decidere incipiunt, propterea quòd quemadmodum natura illos exiles fabricata est, ne in immodicam longitudinem, quæ esset incommoda, crescerent, sic ob peculiarem corruptionem in leprosis decidunt. Paulò mitior esse videtur humorum cōditio in ea morbi Italici specie, quam Peladā vulgus appellat, quæ non solum superciliorū, sed barbæ, & capitis partes pilis denudat, quæ tamen tenuitate maiore prædita est, quàm in aliis speciebus & communi: vnde fit vt ferè semper cum furfuribus accidat. Quare operæpretium erit omnes Alopecię species, quas humorū impuritas constituit, quibus notis & proprietatibus inter se distinguantur, & discerni possint, hoc loco demonstrare.

Quæ partes citius afficiantur his.

Duplex materia prauitas.

Nota Alopecia à morbo Italico, & Lepra, & à communi humorum corruptela.

Prima nota.

*Signale-
pra.*

Alia nota.

Quanto alopec. ab humorum corruptela.

Caluitiū duplex præter superiora.

Primū quæ à morbo Italico ortum trahit, id peculiare obtinere videtur, quòd superciliorum citius, & barbæ, quàm aliarum partium pilos aggredi consuevit, subindèque eius partis capitis, quæ rarius hoc defluuiū patitur, vt sūt: latera vtraq; eò quòd caro musculi Crota-phite dicti, in illis cuti proximè subiecta sit in ea parte. In quo à caluitio distinguitur, sed hoc cum lepra commune habet, quòd in vtraque superciliorū amissio magna deformitate faciem deturpat, quamuis illa alopecie species, quæ lepræ soboles est, magis in superciliorum, quàm aliarum partium pilos grassetur. Huius propria sunt indicia quæ lepram indicant, vt nasus simus, oculi rotundi, nares contractæ, locus superciliorum prætumidus, totiusque faciei color à rubedine ad fucum accedens cum tuberculis carnosus aliquando prodeuntibus, quæ omnia rarò in illa morbi Italici specie prodire deprehendūtur, vt nec illa symptomata quæ in aliis morbi speciebus frequentia sunt, cuiusmodi sunt capitis, atque articulorum dolores, sed illorum loco, papulæ, vel crustæ frequentissimæ in capite, interdum in mento, & aliis partibus cum furfuribus, & lassitudinibus vlcerosis, atque pruritu circa faciem aliisque partibus subsequuntur. Aliquando etiā scissuræ in manu, quæ præcesserunt vlcus in pudendis: quanuis citra concubitum possit illa lues cōtrahi, eum quis vestes induerit, aut in eius lecto, vel cum illo dormierit, qui ea infectus erat. Solet etiam hæc pernicies in locis calidioribus vehementius & frequentius, quàm frigidis grassari, vt Romæ videre est, propter aeris ambientis æstum, qui corporis excremēta à centro ad superficiem euocare potens est. Tunc autem à communi humorum corruptela provenire alopeciā iudicandum est, cum ab illa notæ & indicia lepræ, & luis venereæ antea explicatæ fuerint remota. Hæc de capillorum defluuiō ab impuritate humorum. Aliud verò est, quod propter alimēti penuriam accidit, idque vel ætatis, vel morbi ratione, vt in senibus, in quibus caluitium appellatur, & iis qui à morbo acuto releuātur citra sepe necitū: in quibus tamen hoc interest discriminis, quòd calui-

CVRANDI MORBOS.

caluitium senile senfim paulatimque prodire, & in media parte capitis cum fronte ad occiput soleat. Quod verò morbi ratione contingit, affatim & repente magis scire videtur, eò quòd non solum ob alimenti defectu, sed magis à reseratione & laxatione meatuū procedat, qua ratione astringentia in illius curatione precipue sunt usurpanda. Quare post humorū impuritatem, & alimēti defectum, tertia causa defluuij capillorum in cutis relaxatione ponenda est, quæ cum à nullo materiæ vitio excitetur, nec fœdum vllum in corpore, aut deformem colorem inducere potest, vt contra in communi alopecia, & à luis venereæ sobole contingit, in quibus fœdus color nō solum illarū affectionum est comes: sed etiam humoris illas afficiētis est index, idque in communi magis, quàm in venerea alopecia: propterea quòd istius malignitas magis ab humorum quadam prauitate quàm multitudine, vt communis, dependeat. Patiuntur interdum etiam quædam corporis partes pilorum defluuiū: vt sunt cœxæ & tibiæ, cum sine interpositione longo tempore suis vestimentis opertæ permanent, vt cuidam ex Cardinalis Turnonij comitatu accidisse vidi, qui quum plurimis diebus caligas non exuisset, tandem vbi voluit deponere, simul cum illis pilos illarum partium auulsit citra morbum. Hoc autem accidisse credidi, propter fuliginosæ substantiæ retentionem, vnde putredinē quandam conceperat.

Alia rursus partes patiuntur defluuium capillorū.

Prognostica.

HArum alopeciarum sunt quædam, quæ curationem suscipere possunt, quædam verò nullo modo: ex illarū autem numero sunt, quæ morbo Italico à communi humorum corruptela, & post morbum acutum fiunt. Sed quæ à lepra & caluitio proueniunt, rarò, aut nunquā curationem admittunt.

Curandis ratio.

SI qua igitur sit, de cuius curatione bene sperandum sit, ea est, quæ humorum vitio propter putredinem sit, cuius curatio perficienda est frequenti & magna corporis purgatione, atque sanguinis missione, si plethora adsit, præsertim si ab exuperantia seri sanguinis hæc affectio sit excitata: quod cognoscitur ex cutis colo-

re rubeo, non inducto frictione, balneo, exercitatione, vel alia aliqua causa externa, aut si illa frixerit, statim ex leui frictione, vel à medicamento mordēte rubore per-

Vnde mittendus sanguis. fundatur. Sanguis autē educendus à vena cephalica primo loco, postea tundere venam frontis oportet, vel potius, quæ in temporibus, quod magis cōuenire mihi videtur. Quod si id non liceat, sanguisugæ in occipitio, vel circuitu capitis, aut cucurbitulæ cum scarificatione eo-

Compunctio cutis. dem in loco ad mouere commodissimum erit. Magnum autem sunt ægri commodum percepturi, si sibi variis in locis caput pungi patiātur, postquam fuerit frictum, & à pūctura oleo calido dulci irrigari, ne tam citò foramina illa coalescāt, vel adipe anserino, vel porcino, vel vrsino, aut agnino vngi debent. Talis enim vntio consolidationem illarum partium impedit, & dolorem, quem excitare debent, sedat, efficitque, vt melius & citius per

Vntio. alias vias educatur alopecie materia. Cum istis corpus est euacuandum frequenti & vehementi purgatione, vt syr. aliquo, vel apozemate potenter trahēte. Tales purgationes isti affectus postulant, & ij, qui à cacochymia concitantur, quia humores sunt in corporis habitu impacti, vnde difficillimè euelli possunt purgantibus medicamentis, nisi continuo & frequēti illorum vsu, qui à locis longinquis & remotioribus trahunt potentissimè. Nec solum quæ per sedē, sed & quæ per vrinæ vacuant, accommoda sunt. Serum enim sanguinis per medicamenta purgatur, quamuis non ipse sanguis. Vt morbi incrementum prohibeatur, in initio huius speciei, quæ à sero sanguinis fit, repellētia tutò quidem ad moueri debent. Quæ verò id præstant, sunt ol. ros. omph. lentisc. ol. mastich. addito aceto, vel succo citri. Ab iis in processu morbi traueundū est ad modicè digerētia, qualia sunt, farina hordei cocta ex melle, vel olea leniter digerentia admixta astringētibus, qualia sunt olea ricinini, nucum. Aut eorum loco cōficiendū med. ex amygdalis amaris vsis: vel ex nucibus vel auellanis, radicibus calami vulgaris, vel ex thure, acerrimo aceto permixtis, & oleo laurino. Quæ autē cōponuntur ex euphorbio, alcionio, tapfia & adarce, item ex semine rutæ, & eruce, in hac specie reiciēda sunt: quia plus æquo acria sunt, vnde flu-

Quibus incrementum prohibetur.

Quæ reicienda.

de fluxiones sanguinis vehementius in partem affectam excitarent. At in aliis speciebus eo nomine magis commendanda sunt & recipienda: tum quod materia sit cōtinuator, & difficiliter digeri possit, tū quia bonus sanguis, cuius penuria pars laborat, vtiliter ad illas attrahitur.

Curatio aliarum specierum à sero aliorum humorum generatarum.

Cum hæc etiam species à caco-chymia humorū pendeat, non minus est necessaria frequens, cōtinua, & vehemens in illis purgatio, quàm in superiori, nec minus etiam diligenter totius corporis, atque parvis color, tum victus ratio, quæ præcesserat, consideranda, vt humoris peccantis cognitionem habeamus. Similis enim efflorescit cutis humoribus in corpore exuperantibus. Ichores autem, succorum existētium in corpore nostro naturam retinent. Sic ergo curationem aggredior. Ante omnia pharmacum præscribemus minuendæ materiæ gratia, quod recipiet cath. vnc. j. vel. syr. ros. sol. vnc. j. s. quibus adiungemus parum diap. ad quantitatem aliquam vt drach. ij. pituitæ vel humorum adustorum vacuandam, subinde syr. humori vacuando idoneos exhibebimus, inter quos primum locum tenet syr. de fumaris vel de endiuia compositus cum decoct. similium herbarum, vel cum aquis distillatis, cum hic affectus à calidis & assatis humoribus proueniat. Quod si à pituitosis, ad superiora addemus mel rosac. syr. de stechade, de arthemis. Omnibus tamen affectibus ex æquo accommodari potest syr. capil. ven. vel herba capil. verbenæ, & abrotoni decoctum. His factis cum præparatum corpus esse videbitur, ad fortiora pugnando transeundum, cuius generis sunt ex pilulis de fumo. de quinque generibus myrobal. pillul. indæ, & fœtidæ. Aliæ similiter, quæ lapidem laz. recipiunt vel elleborum, si morbus inueteratus, & à melancholia existat. In biliosa enim constitutione, quibus aliquid scammonij additum est, pillulæ accommodatiores sunt, vt in pituitosa, quæ colocintidem, vel trochiscos alandal recipiunt, vt sunt pillulæ cochiz, de agar. & similes. Ex opiat

Principiū curation.

Syr. ad humores adustos, et aqua.

Pillula ad mel.

Ad pitui. confectio- nes.

METHODVS

autem confectio hamech. diap. indum maius, eléc. de citro & similia elect. quæ potenter euacuant. Postero die, quo medic. erit assumptum, aliud rursum erit exhibendum, quo quicquid materiæ reliqui est in penitioribus partibus, per sedem aut vrinæ educamus. Interea multo cibo non est replendum corpus, donec habitus corporis diligenter expurgatus erit, ne si alimenti copia corporis repleatur, excrementa tantum communia egerantur, humor autem attrahendus remaneat. Quare si per virium robur liceat, ex eo apozemate singulis matutinis ad quintum aut sextum diem continuo vtendum erit. Sin minus, post secundum aut tertium diem intermittere vnum aut alterum diem licebit. Hic enim euacuandi modus efficacissimus est in omnibus cutis affectibus, quos humorum vitium parit. Conficitur autem istud apozema ex medic. serolos humores euacuantibus in hunc modum.

Apozema.

R. Rad. lap. ac qr. j. rad. brionia vel enulæ campanæ qr. β. liqui. ra. ʒ. j. cicho. fumar. buglo. borrag. mer. cicla. bras. mari. ana M. j. her. capil. marr. & abro. ana M. j. pal. prunorum, sebest. ana pa. xx. sic. pa. x. seminis anisi, fœ. ana ʒ. ij. polip. quer. qr. j. senæ oriental. medullæ car. an. ʒ. ij. fiat decoct. in sero lactis capr. vel asinini ad lb. ij. in quibus diss. succi. ros. ʒ. iiij. saccha. qr. j. si. syr. mediæ decoctionis, de quo cap. ʒ. iiij. vel vj. pro dosi augendo & diminuendo prout magis aut minus operabitur. Possumus istis laxantibus addere syr. de fum. syr. ro. laxatiuum, qui similem facultatem habet in purgandis serosis. Æstate fieri debet decoctio in aqua pluuiali, quia nō tam citò putrescit. Quod si tunc ex sero paretur, minor quantitas ponenda erit, vt totū medicamentum melius & diutius conseruetur. Solet enim serum facile conturbari.

*Apozema
tis huius
ʒ. iiij. vel
ad maius
iiij. suffi-
ciant.*

Quod si omnino seri vsus magis placeat, dissoluetur eius quantitas sufficiens cum aqua aut succo rosarum, aut betæ vel mercurialis, & in eo folia senæ per noctem sub dio macerentur, factaque colatura capiat ʒ. vj. vel viij. manè loco syrupi, cōtinuétque vsum eius per sex aut septem dies. Quod si is non videatur satis purgatus: reitere-
retur medicamentum laxans ex præcedentibus laxanti-

bus,

CVRANDI MORBOS.

bus, quod fit commodè addendo vltimæ do syr. ros. lax. 3. j. s. vel 3. j. rhab. infusi, aut confectionis hamec 3. j. vel ij. secundum egri vires. At si apoz. nec syr. vsus gratus sit, pil. suprâ enumeratæ eorû loco substitui poterunt, quæ non minùs commodè & fortiter euacuabunt, si sæpè repetantur, vt de aliis medicamentis purgantibus dictum est. fiat verò sic.

R. mass. pil. de hiera simp 3. j. rhab. ag. ana 3. ij. senæ oriental. brass. marinæ ana 3. j. scammonij. troc. alandal ana 3. j. cum syrup. ros. formentur pil. vii. pro 3. capiat semel in hebdom. vel bis pilulas iij. manè, vt imitetur Galenum qui bis in quinque diebus iuuenes purgauit. Sed si non satis moueant, augeatur quãtitas scammonij in biliosis, colochintidis in pituitosis, & melan. addendo thymi vel lapidis lazuli tantundem, aut dentur pil. paratæ in officinis.

Particularis purgatio.

Absoluta corporis vniuersali purgatione, particularis quoque erit suscipienda quæ per consuetas regiones fieri debet. Illæ autem per quas caput se solet expurgare. sunt oculi, nares, os, & aures: sed in his effectibus commodius erit per os expurgare, tum quia ferros humoribus euacuandis via aptior est, tum quia respondet cavitatibus cranij, quæ solent pituitam è coana effluentem excipere, quod fit cum illa per foramina neruorum tertix coniugationis ad glandulas oris, quæ in lateribus linguæ fixæ sunt, secundum naturam decumbit. Trahitur autem materia à cerebro longa masticatione rerum salsarum vt oliuarum, vel dulcium, vel acrium, & earum quæ pituitam alliciunt, quæ Græci apophlegmata vocant, vt pyretrum, staphisagria, zinziber, piper, cubebæ, mastix, & sinapi: Id quod etiam efficerent agaricus & turbith, nisi suo amareore essent ori ingrata medicamenta. Ex his autem medicamentis parantur & masticatoria & gargarism. Gargarism. conficiuntur ex decoct. fructuum dulcium, vt ficuum, pass. & aliarum herbarum calidarum, quales sunt hiss. strachas, organum, pulegium & similes, in quarum decoct. diss. mel. ros. si medicamentum mitius esse oporteat.

*Quibus
conficiun-
tur apo-
phlegma-
ta.*

*Quibus
gargari-
smata.*

Si verò fortius, in fine deco. cubebæ, piper, pyretrum, vel compositio aliqua ex his, quæ pituitam trahunt, vt est diaphenicum, indum maius, elect. de citro, quibus adiungimus syr. ros. lax. ʒ. j. Antiqui gargarismata ex sinapi, aceto, & melle componebant: Id verò etiam nunc fieri potest. Trahunt enim illa pituitam diu in ore retenta, vt & superiora. Masticatorium verò forma accommodatiore est, & nostro instituto aptius, eò quòd per masticationem partem incalescunt, vnde serù facilius attrahitur. Qua ratione ex masticatoriis solida sunt præstantiora, quia ad eorum attritionem maior & longior requiritur masticatio, suâque effumatione partes calfaciunt & relaxant, poros aperiunt, humores crassos eliquant, & fundunt, & aciores reddunt, proinde ad expulsiõnem aptiores. Mastiche ergo plurimùm ad hanc rem commendatur, cubebæ, asarum, multò magis pyretrum crudum vel leniter coctum in oximelete pro pituitosa affectiõne. In succo verò ros. vel syr. ros. lax. pro biliosa, & pro melancholica, in decoctione mercur. vel thymi, vel ellebori. Minus autem probanda sunt, quæ ex pulueribus cera alba exceptis ad eundem vsum comparantur, vel panno raro includuntur, deinde masticantur. Ab iis enim hæc instituta sunt, qui vno medicamento non contenti, plura miscere volunt. Quòd si quis vti velit his, medicamenta leui modo alterentur, vt difficilior & longior sit eorum masticatio. Excipiuntur autem cera alba, quando durior, vel carne passularum vel ficuum, si sapore magis ingrata sint. Horum autem masticat. vsus in omnibus capitis affectibus, qui cum materia iuncti sunt, commodissimus est, excepto catarrho, qui in palatum & pulmones decumbit, in quo errhina conuenientiora sunt, vt masticatoria potius, quàm errhina in oculorum affectibus eligenda sunt. Tanta est denique harum particularium euacuationum utilitas, vt longè magis, quàm vniuersales frequentius repetitæ prosint: eò quòd materiam parti affectæ propinquiorem, & ferè coniunctam educant. His ita peractis non est inutile hypocausta ingredi, vt id quod sub cute remanet, euacuetur: vel si non sit à morbo Italico, lauacrum ex detergentibus & resoluentibus instituere pro toto corpore,

Masticat. & sus.

Mastiches

Varia pra-

paratio pro

Varietate

humoris.

In quibus masti. sunt ex & su, in quibus errhina.

pore, vel pro capite tantum. Parabitur autem hoc modo.

Balneum.

R. Radic. brionia, cucum. agrest. vel serpentaria ana
 lb. ij. marrubij, abroto. verbenæ ana Manip. iiij.
 herbarum capill. ana M. j. lupinorum & fabarum inte-
 grarum ana lb. j. decoquantur, & in fine deco. adde flo-
 rum anthos M. iiij. fiat deco. pro balneo. Vtatur manè
 reiectis alui & urinæ excrementis. Si pro capite tan-
 tum, conficiatur lauerum, decoquantur in lixiuio de-
 bili (nam forte, vt muria, pilos arrodit) Paratur autem *Muria*
 ex marrubio vsto & incinerato, vel ex cineribus testa- *Vires.*
 rum nucum vel amygdal. amararum, aut auellanarum,
 vel radice calami vulgaris, aut ex cineribus etiam heri-
 naceorum marinorum vel terrestrium, vel capitis ca-
 nis, aut vulpceulæ, aut pellium caprarum & pilis, aut vr-
 forum. His ergo conficiatur lixiuium, quo absoluator
 frequenter caput prius rasum. In istis nunquam sunt *Salis Vir-*
 apponenda astringentia, neque sal, propterea quod illa *tus.*
 materiam retinent, hoc verò depilat. Cōficiuntur mul-
 ta alia topica remedia ex his, quæ vim digerendi & re-
 ficcandi habent, & pilos generandi. Fiant autem ex *Olea di-*
 oleis propriis vt laurino, nuceo, abrotoneo, iunipero: *geren.*
 ex axungiis talpæ, vrsi, lupi, anseris, cuniculi. Ex aliis *Resic-*
 item resiccantibus, ex cineribus abrotoni, pilis vrsi, vel *cantia.*
 talpæ, vel pilorum eorundem, ex tapfia, euphorbio, ex
 cineribus echini marini & terrestris, ex halcone mari-
 na & aliis multis à Gal. enumeratis lib. x. *ῥώμης*. Neo-
 terici ex muscis, vespis & apibus parant. Ego ex his vn-
 guenta paro.

Vnguenta.

R. Ol. de abrot. ʒ. ij. pingued. vrsi vel cuniculi vel tal-
 pæ ʒ. j. vel ana ʒ. ss. cineris pellis vrsi, vel echini ter-
 restris, aut marini, ʒ. iiij. neuum vistarum, abrotoni vsti
 ana ʒ. j. propoleos ʒ. ij. mell. ʒ. j. incorp. omnia si-
 mul, & fiat vnguentum, quod non nimium adhæreat,
 ne pilos relictos sua tenacitate auellat. Post aliquem
 horum vsum optimum est addere aliquam partem la-
 dani, vt constringatur pars, quæ est laxior reddita.
 Istud postremum vnguentum partum ad generationem

METHODVS

*Pulueres
ad pilorū
generatio-
nem.*

pilorum, partim ad materiæ euacuationem est compo-
situm. Possunt tamen hæc aliquando separatim fieri, vt
primū humor medicamentis digerentibus resoluatur
aliquo oleo, aut melle exceptis: vt pice liquida, aut felle
taurino, aut hircino, aut porcino, quibus demum pul. in-
sparguntur ad pilorum generationem qui sunt ex cine-
ribus abrotoni, pilorum vrsi, muli, talpæ & aliorum, vt,
capitis canis, vulpis: vel ex stercorebus animalium quo-
rundam resiccatis, vt murium, caprarum. Aliorum enim
stercora negligenda sunt, vt quæ nimium acria: qualia
columbarum, turdorum, anserum & auium: vel quia im-
becilliora, vt iunctorum, vel quia foetida. Existimantur
autem ista generationem pilorum adiuuare: quia sua ca-
liditate sanguinem attrahunt, & in fuliginosam substan-
tiam vertunt, cutem verò resiccant.

Alopecia à morbo Italico curatio.

SI à lue venerea capillorum fluor proueniat, curan-
dus est vel diætâ, vel linimento, sed linimentum præ-
stantius, quia non tam absument pilorum alimentum,
quàm ratio victus tenuis. Huic ergo affectui accommo-
datissimum parabitur vnguentum, si superiori addantur
arg. vj. ℥. iij. euphorb. ℥. j. myrrhæ ℥. j. terebinth. ℥. ij. & ca-
piti applicetur. Vel aliud pro toto corpore & capite cō-
ponatur.

℞. axung. porc. vnguenti marciati ℥. iij. axung. vrsi.
℥. ij. ol. laurini ℥. iij. ol. de abrotono ℥. ij. olei de iunipe-
ro ℥. j. terebinthinæ ℥. ij. argenti viui ℥. vj. myrrhæ ℥. j. eu-
phorb. β. misce fiat vnguentum. vng. totum corpus, pro-
uocentur sudores, deinde supra partes admoueatur se-
quens.

℞. vnguenti præscripti ℥. iij. cineris abrotoni & pellis
vrsi, vel cineris pilorum hominis vel echini marini, vel
terrestris ℥. j. mell. ℥. iij. nucum vstarum cum testis ℥. j. β.
misce. fiat vnguentum quo vng. partes denudatæ. Arg. vj.
vñs hîc non est pertimescendus, cum in aliis etiam me-
dicamentis super caput appositis vsurpetur, vel quotidiana
experientiâ docente, sicut rustici & mulierculæ face-
re solent in morbo pediculorum.

℞. vnguenti primū descripti ℥. iij. euphorb. ℥. iij.
arg.

CVRANDI MORBOS.

arg. vj ʒ. ij. ſimul agitentur in mortario, adden. ol. laurini vel abrotoni, vel iunip. vel lucernarum, vel ricinini, ʒ. ij. fiat linimentum.

Vnguenta, quæ ad morbum Italicum communiter præſcribuntur, profunt: ſed multo magis ſi oleum de abrotono vel nucum, vel lauri recipiant, vel axungiam talpæ, vel vrfi, vel aliarum, quæ ſuperius enumeratæ ſunt, ſi in illis etiam tapſiæ vel euphorbij, vel ſtaphiſagiæ quantitas aliqua apponatur. Sulphur cōpeſcit ſudores & vim *Sulphuris* argenti viui extinguit. Potus etiam lactis alopeciam Italicam prohibere certa experientia deprehenditur. His *Stilitas.* abſolutis purgationibus theriaca antiqua commodè exhiberi poteſt, ſicut & trochiſci de viperis. Nec inutilis ficuum uſus erit, vt excrementa fuliginofa, quæ pilorum *Pilorum* generationis materia ſunt, ad cutim deferantur. Horum *materia.* enim uſum nihil eſt quod impedire debeat, purgato corpore, & affectione ipſa curata.

*Profluuij capillorum poſt morbum acutum
curatio.*

Longè alia eſt curandæ huius affectionis ratio, quàm aliarum ſuperiorū: cum à nullius materiæ vitio, ſed à ſola cutis relaxatione, & meatuum amplitudine proveniat: proinde ſola aſtringentium admotione ſiſtenda eſt, quæ ex ladano diſſoluto oleo myr. vel roſa, vel cydoniorum, vel omphacino, vel lixiuio ex aſtringentibus cineribus confecto ac parti affectæ admoſto perficitur.

Nec enim aſtringentia decoquenda eſſe exiſtimamus, *Quæ pilos* quia licet aſtringant, pilos denigrant. *Quare præſtat ex generant,* talibus medicam. cineribus lixiuium parare quàm decocto vti. *alopec. cu-* Quibus verò è ſuperciliis deciderunt pili aut *rant.* propter cicatricem vel aliquod vicus obduſtum, aut aliam cauſſam, nulla ſpes eſt poſſe renaſci pilos. Sed vt il- *Fucus pi-* la deformitas in mulierib aliquo fucus tegatur, pingédæ *ſum.* ſunt ſuperciliorum partes ex fuligine thuris, reſinæ & maſtiche, quæ etiam ſudore non obliterabuntur. De illo deſluuio, quod ab vlceribus capitis manantibus inducitur, ſuo loco ſeoriſim agemus. Infinita ad hanc rem à veteribus excogitata ſunt, quoniam plurima huic affectioni conducunt. Quæ pilos generant & alopeciam curant, ſunt omnia illa, quæ digerédi vim habent, & reſol-

M E T H O D V S

uendi potestate per caliditatem prædita sunt. Vt sunt olea calida tenuium partium : vt oleum fabinum apud antiquos, oleum antiquissimum lucernarum, laurinum, ricininum, rutaceum, nucem, petroleū, de spica, de iunipero. Olea hæc per se apponuntur, vel alia aliis moderatis excipiuntur. Spissum est oleum Lucernarum, Laurinum, Iuniperi, pix liquida. Alia possunt inspissari addendo parum pinguedinis vrsi, vel hirci, vel aliorum animalium. Post hæc succedunt fella aliqua recentia liquida ad arida remedia excipienda, cum fortiora paramus remedia. Vt est fel tauri, hirci, porci, pix etiam liquida & mel in his affectibus vel per se apposita presunt aut ad alia excipienda. Sanguis etiam testudinis marinæ reficcat plurimum à veteribus commendatus est. Quæ autem excipiuntur, sunt medicamenta arida: vt sterqus murium, fel caprarum, ouium, & aliorum animalium. Boum autem, equorum, porcorum est imbecillius, & fœtidum, & minus acre. Animalia tota sumuntur: vt cantharides, hypocampus, talpa, mus, aut eorum quædam partes, veluti capita, vt vulpis, canis, lacertæ vel eorum pelles & pili. Aut ex piscibus testæ ostrea vstæ: item alia, quæ potenter siccare possunt. Excrementis marinis alcionium, cui responderi adarce. Item atramentum sepiarum à priscis commendatur. Inter plâtas laudatur taphia ob insignem partium tenuitatem, quæ si nimis recens est, ex aqua administratur vel cum ol. multo, vt eius vis obrundatur, qua fertur vsus ad contusiones. Neruorum quos morbos vno die curatos scribit Plinius. Pulegium regale & ceruinum, erysinum, nasturtium, abrotonū, ruta loco taphiæ, in vsu esse possunt, si eodem modo vsurpentur. Sunt & semina his facultatibus prædita. Vt erucæ, rutæ, non autem cicutæ, vt quidam ex practicis abusus est. Quin si ex aliis, & cæpis confricetur caput, ab humoribus impuris cutem expurgabunt, & reditum pilorum accelerabunt, id quod etiam inter cerealia hord. tostum efficere creditur. Postremo loco succedunt lachrymæ & gummi ex quibus est euphorb. & myrrha, sed euphorb. eligendum quod mediocri sit ætate. Nam recens acrius est, ob id curim nimium exulcerat. Antiquum verò vetustate vires amisit. Ex his

*De cha-
ranta.*

CVRANDI MORBOS.

tria remedium genera parari debent, imbecilla, mediocria, & fortia. Imbecilla, vt in vsu sint morborū iniuriis, & leuioribus affectibus. In regionibus calidis, corporibus delicatis vt puerorum, mulierum & nobilium. Mediocria, in mediocribus, & robustiora in robustis ac antiquatis affectionibus. Hanc distinctionem summo studio in hoc instituto obseruandum docuimus, vt duo qui passim committuntur errores, vitentur: cutis scilicet exulceratio ab acris medicamentis, & humiditatis partis naturæ absumptio à siccioribus, quæ solent caluicium immedicabile inducere. Ea ratione sæpe inspicendus locus affectus: vt cognoscamus num medicamentum, quod est admotum, debilius, vel acrius sit.

Nam debile nullam aut longo tempore actionem in parte efficit. Fortius verò immodicè nimisque præcipitanter id præstat.

De furfuribus.

CAP. II.

Furfures in toto corpore, sed præcipuè in partibus in quibus pili nascuntur, emergere solent: ob id in capite præcipuè. quam affectionem *ῥιζαν* Græci vocant, inter capitis morbos solet passim annumerari. Et si alias partes obsideat, præcipuè quæ pilis à natura vestitæ sunt, vt barbam & supercilia, sed & interdū corpus vniuersum. Verū cū eius origo sit à serosis humoribus & tenuibus sparsum congestis inter cutim & epidermidam, qui facilius in barba & superciliis, & capite retinentur, propter illarum partium densitatem, & astrictionem maiorem, quàm in aliis, quas laxiores esse antea monstrauimus, sit, vt affectus esse capitis proprius potius, quàm aliarum, dicatur. Accidit autem, cū serosus humor sub cuticula contentus siccus & mordax adustione factus illam siccat & rodit, scinditque, & à subiecta cute auellit, vnde tenues & furfuraceæ scammulæ furfuribus tritici similes tenuitate, & candore (ex quibus nomen sumpserunt) excitant, quæ nihil aliud sunt quàm cuticula in frustra scammarum & furfuris speciem referentia, sic diuisa, quòd propter siccitatem & foramina, per quæ pili exeunt, quibus peruia est, frequetiam, vel vniionem & continuitatem suam seruare non possit.

METHODVS

Distinctio furfuris & parallela.

PORRÒ *φθειραν* à Paralella morbi Italici symptoma-
te, quæ affinitatem cum ea habet, distinguenda est:
quòd hæc parallela internam manuum & pedum par-
tem tantum obsideat, nec latius quàm ad latera & pha-
lāgem digitorum in manibus serpere queat, cuti ita ad-
hærens, vt nisi vnguibus diuellatur, decidere possit. Pre-
terea maior est scamma, quàm capitis furfur, quia cuti-
cula est illic magis continua: In capite verò ob forami-
num pilorum frequentiam magis diuisa. Huius autem
causam, quæ à nemine adhuc tradita est, hoc loco expli-
care præter instituti rationem nō est. Quòd igitur nulli
alteri parti hic morbus, quàm manuum volæ, & pedis
plantæ infestus sit, in causa est lentus ille tendo, qui in
illis partibus cuti proximè adhæret. Idque fidem facit,
quòd extra manuum & pedum circumscriptionem non
progrediatur. Tendo enim ille cutim densissimam, &
tensam atque etiam temperatissimā efficit, qua ratione
serosos humores hic collectos diutiùs retinet, nec dige-
ri sinit, ex quo scissuræ, herpes & furfures à morbo Ita-
lico exoriuntur: quia illa serosa substantia partem illam
molliorem siccādo facit, vt epidermis à cute diuellatur,
& eo modo, quo antè dictum est, decidat per latiores,
quàm in furfuribus, scammas. Scissuræ, quæ in eadem ma-
nuum pedumque parte proueniunt, licet cum parallella
sede conueniant, materia tamen longè discrepant, quæ
in ipsis crassitiem maiorem, quàm in parallella obtinet,
ratione cuius crustas, sed in pede quàm in manu crassio-
res excitat, ob cuius pedum densitatem & crassitiem ef-
ficat, altèque penetrando cutem veram findit, per quam
etiam herpetis modo serpit & vagatur. Quæ verò ad il-
larum curationem pertinent, pete ex libro nostro de
morbo Italico.

*De scissu-
ris.*

Curatio furfuris.

FURFURIS curatio à corporis euacuatione & cutis ab-
sterfione auspicanda, vt vitiosi humores hunc effe-
ctum efficientes purgentur. Purgandi autem sunt eo
modo, quo capite de alopecia dictum est. Detergebi-
tur autem caput, si nitro aspergatur, & fricetur vel sale,
vel lixiuio parato ex cineribus cum aliqua quantitate
vel

vel mellis vel succi betæ, vel porri, & arenæ, vel fale, vel felle bouis vel porci, & vngatur corpus bis aut ter in hebdomada. Conficiatur autem vnguentum ex detergentibus siccantibus, & digerentibus hoc modo.

R. amygdal. amar. leuiter frictarum in sartagine, vel rostarum in furno & nucum raudarū ana p. xx. terræ sigillatæ, sulphuris & vitrioli ana 3. ol. nucum 3. iij. mell. squil. 3. ij. misce, fiat vnguentum, quo vngatur serò & manè abluendo decocto lupinorum, vel fabarum, vel lixiuio parato ex radicibus betæ & brassicæ: aut ingreditur balneum sequens.

R. radic. lapatij acu. enulæ camp. ana 3. iij. mal. cicla 3. bis mal. pariet. saponar. ana M. iij. lupinorum & fabarū integrarum ana lb. j. flor. centaur. minor. p. iij. furs. vel hord. integ. p. iij. fiat decoctio pro balneo, & detergatur panno aspero vel spongia. Sed si corpus valde emaciatum sit, medicamenta minus siccata esse oportet. Quare hordeum mundatum pro hordeo integro est vsurpandum, & semen lini, fœnug. mal. pro lupino & fabis. Deinde vnguentum sequens fiat.

R. ol. amygd. amar. 3. iij. olei irini 3. ij. succi cicla 3. fumi. ana 3. iij. decoq. ad consumptionem succorum, quibus adde farinæ fœnug. 3. ij. nigellæ 3. j. misce omnia simul, & fiat vnguentum, quo vnga. partes noctu. Mane verò ingreditur balneum sequens.

R. hord. mund. p. vj. feminis lini fœnugr. 3. iij. viol. mal. borrag. fumi. cichor. lapath. ac. ana M. iij. amygdal. contritarum lb. iij. farinæ fabarum lb. j. misce, fiat balneum. Vbi corpus diligenter purgatum esse à serosis humoribus videbitur, & habitus corporis per balnea illa & vnguenta, erit. ex vsu balneum ex aqua marina vel aqua extinctionis ferri, vel ex decocto leuiter astringentium cum quadam deterfione, vt

R. foliorum myrthi, vel oleæ, vel oleastri, vel salicis, vel summitatū rubi, vel foliorum nucis fasciculos tres, plantag. acori, agrimoniz, foliorum vlmi ana M. iij. lentium lb. ij. florum ros. p. vj. fiat decoctio pro balneo, cui adde aluminis lb. 3. Ingreditur post vsum aliorum remedium. Ad præcautionem vtatur præscripto ad euacuationem feri cap. de ophiassi. Fugiat exercitationes

Friccio.

corporis & ea alimenta, quæ ad habitum corporis deducunt excrementa, vt ficus. Mutet frequenter indusia, vtaturque frictione molli, quæ si fieret, manibus iunctis oleo amygdal. amar. posset impedire, ne morbus fieret. Hac arte reuocantur serosi humores ab habitu ad centrum corporis, syr. vel medicamentis laxantibus, & quod remanet in habitu, nō retinebitur sub cuticula, sed leuiter apertis poris exibat. Si à lue venerea illa proueniant, optimum est vngüero supra scripto cinabrium & parum arg. viu. addere, vel cum axungia porci, ol. laurino, cinabrio & felle linimentum parare, & partes eo tingantur. Sed eo tempore, quo partes inungentur, addere oportet aquam aluminosam.

De pediculari morbo.

CAP. III.

*Pediculi
ortus.*

*Pedicul.
genera
multa.*

Pedicularis morbus, qui à Græcis *Θυγιασις* dicitur, fit in toto corpore, in locis calidis potissimū, & humidis, vt sub alis, circa collum, & in capite vniuerso ob frequentiam pilorum. Fiunt autem pediculi ab humore calido humido sed viuo, eodémque nutriuntur: quo fit vt post mortem cadauer fugiant. Fit autem hic morbus frequēti esu viperarum, seu iūm, idque aut quia talem succum gignūt ficus, aut quia viperæ sua tenuitate ad cutim excrementa expellunt. Sunt autem pediculorum multa genera. Primum est eorum, qui communiter in capite generantur. Secundum ferunt illud genus, morpiones vocatum. Tertium, quod cyrones vulgò appellant, qui nunquam extra erumpunt, sed semper intra cutim & cuticulam latitant. Facile deprehenduntur omnia genera.

CVRATIO.

Curatur autem tenui diæta, medicamentis detergentibus, potissimūque amaris, & multūm resiccantibus. Et quia ex copia humiditatis nascuntur, non est inutile corpus medicamentis euacuātibz exiccare, deinde meatus cutis relaxare, quò facilius, qui geniti sunt, simul cū eorum materia exeant, & medicamenta facilius in internam partem penetrent: neque diu immorandum est balneo, vel lauacro, ne ad cutim plura trahantur recrementa. Et hoc tantūm faciendum, cū à toto corpore pediculi erumpunt. Parabitur autem hoc modo.

R. rad.

R. mal. bismal. cicla ana M. ij. hord. integ. & leuiter *Lanactu.*
torrefacti p. ij. fœ. 3. j. florum chama. melil. ana p. j. fiat
decoctio qua abluatur. Si quis velit balneo pediculos
occidere, paret balneum ex lixiuo, & amaris, & salis. vt

R. cicla, absynth. marrub. beth. an. M. j. centaurij mi-
nor florum stecados ana p. ij. lupinorum p. ij. staphisa-
griz tb. j. arist. rotundæ vel longæ tb. ss. fiat decoct. in li- *Balneum,*
xiuo vel in aqua fontis, cui adde salis tb. iij. vel fiat de-
co. in aqua marina. Balneentur, vel abluentur emuncto-
ria & caput, in quibus locis potissimum oriuntur ob-
frequentes venas, quæ plus materiæ & caloris suppedi-
tant. Vnguento tali liniantur partes.

R. ol. amygd. amar. 3. ij. ol. antiquif. vel rutac. 3. j. sta- *Vnguen-*
phidos agriz 3. ss. centau. minor. 3. ij. myrrhæ 3. iij. ar. vii. *tum.*
3. ij. axung. rancidæ, & salitæ 3. iij. incorporentur simul,
& fiat linimentum, & tempore inunctionis adde aceti
parum. Ad omnia genera pediculorum occidenda nul- *Argentii*
lum est præstantius remedium, quam arg. viuum in qua- *Suum oc-*
cunque parte fuerint. Aduersus cyrones particulariter *cidit pedi-*
valet hyosquiamus, non alia ratione, quam stupefacien- *culos.*
di facultate. Quare & alia stupefacientia idem præsta-
bunt, obtundendo sensus & pruritus ac erosionem. Sed
quia longior illorum vsus manuum tremorem inducere
posset, erit vtilius ol. ex seminibus illorum parare, vt ol.
de pap. aut mandragora, aut axungiam antiquam sali-
ram admiscere, subietiam parum, aut argent. vii. 3. ss.
Hoc potest illos occidere, & pruritus ab illis excitatum
obtundere. Mulieres acu extrahunt, & sic sese à pruritu
vindictant, sed quia causam non auferunt, subinde alij
renascuntur. Quare vsus vnguenti magis vtilis erit. Ab-
luere manus cum aceto, & sale, illos occidit. Hic autem
morbus contemnendus non est, cum multi viri præclari
eo obierint.

De Glyceribus capitis manantibus. CAP. III.

QVos Græci Achores, Plinius vlcera capitis ma-
nantia, alij tineam, Galli (la Rache ou Tigne) ap-
pellant. Oriuntur autem Achores ab exuperantia prauæ
cuiusdam materiæ, acrimoniam, & crassitiem quandam
in se habentis, qua ratione Galenus eorum generatio-
nem ab humore multo manare tradidit, videlicet,

qui serosam, tenuemque substantiam mordacem simul & crassam habeat, vnde vlcus in cute profert, ex quo sanies quædam glutinosa erumpit, qui hunc affectum ab illo, qui Græcis *μύκω* dictus est, à nostris fauus, distare facit, à quo quæ exit materia, crassitudine & colore melli est simillima. In hoc etiam differunt, quòd in fauo per ampliora foramina in Achore per angustiora exit materia. Cum ergo in Achore mixta sit materia, mixtam etiam & variam formam retinuit. Tumor est præter naturam à materia tenui & mordaci, quæ sua acrimonia cutim vellicat, & ad scalpendum ægrum compellit: vnde disrumpitur cutis, & vlcera prodeunt. Quare non solum quæ tenues humores, sed etiam viscidos medicamenta ducunt, in curatione huius affectus requiruntur, in qua non minus frequenter & fortiter purgandum, quàm in alopecia: deinde humor in parte affecta contentus, resiccandus & digerendus est. Sed sunt, qui hunc influentem adhuc initio aceto vel aliis repellentibus repellendum censent, quod mihi non admodum tutum esse videtur. Periculum est enim, ne materia intus repulsa parotides, vel alios periculosiores tumores in alia parte excitet, vt experientia compertum est. Quamquam non eo inficias, in corporibus parum cacochy-
*Qualia medica-
mensa.*
Error. mis contingere posse, in cuius principio humor influens medicamentis repellentibus tutò prohiberi debeat, quia adhuc tam parua est, vt citra maiorem corporis euacuationem topicis remediis sanari possit. Sed si paulò copiosius fluxerit, & aliquo tempore restiterit, vix aut nunquam sine crebra, & vehementi purgatione, & diuturna topicorum remediorum applicatione, elui poterit.

CURATIO.

Topica. Curationem igitur instituemus, vt capite de alopecia dictum est, medicamentis scilicet laxantibus & apophleg. obseruata semper naturarum & ætatum ratione, & tenui victu recrementorù prouentus tollendus erit. Supra caput autem non frigida, sed astringentia, quæ multum siccant & materiam collectam absumunt, & densando corroborant, sunt apponenda, vt si quis inclinante morbo calcitidem vel alumen in aceto dissol-

dissoluta capiti admouerit, affectum sanare poterit. Acetum enim per se vel aliis admixtum potenter repellit, quod frigidum sit, & tenuium partium, quarum ope succos crassos incidit & attenuat, & nonnihil ob alias partes calidas illi admixtas discutit. Quare omni tempore aliis medicamentis misceri potest, additis quibusdam resiccantibus metallicis, vt cadmia, lytharg. spo- *Metallica*
dio, cerusa vsta, pompholige, calcantho, flore æris, & *resiccantia.*
similibus. Morbum autem iam factum curamus fortiter digerentibus, & resiccantibus, vt

R. ol. nucum de iunipero ana ℥.ij. ol. lucernarum ℥.j. *Linimen-*
nucum vstarum cum testis ℥.vj. myrrhæ, floris æris ana *tum.*
℥.j. fuliginis furni ℥.j. lytharg. ℥.β. argenti viui ℥.ij. in-
corporentur simul, & fiat linimentum, quo inungantur,
detrusis prius pilis, & capite deterso lixiuio descripto
cap. de morbo pediculari. Aliud efficacissimum.

R. auripig. rub. calcis viuæ lotæ quinquies ana ℥.iiij. *Aliud.*
fuliginis furni ℥.j. vitrioli, aluminis ana ℥.β. allij tenuis-
sime contriti ℥.β. tartari ℥.vj. cum melle & aceto incor-
porentur simul & reducantur ad formam linimenti.
Post hæc remedia detergatur caput cum lixiuio supra-
dicto, addendo aluminis ℥.j. Primum vnguentum pro-
pter argentum viu. citius curat: quare & hoc efficacius
erit, si addatur argentum viuum.

CVRATIO EMPYRICA.

Empyrici curant pice supra partem appositâ, quæ
quia facultatem habet metasyncriticam, id est, at-
trahentem è profundo ad circumferentiam, euacuando
materiam curare potest, & leues affectus: sicut etiam
in mitioribus semen iuniperi coctum in aceto & melle
suprà caput appositum curat, & quæcunque vim insi-
gnem detergendi habent: vt rapisia, allium, cape, ad-
ditis quibusdam insigniter resiccantibus, & metallicis.
Crustæ sunt, quæ faciunt morbum diutius durare, quia
pus intus retinent. Pus autem cavitates & sinus facit,
qui postea non facile curantur. Ob id crustarum abla-
tio, quæ fit expice, aut aliis, curationem accelerat. Pri-
mum vnguentum magis digerit, secundum magis exci-
cat. In summa quæcunque ad alopeciam scripta sunt ex
adassatis & fortiter digerentibus, vlcera capitis manan-

Sulphur. tia sanare possunt. Sulphur per se vel cum aliis appositum in corporibus robustioribus efficacissimum est remedium. Tutior verò est eius vsus, si vel bolo armena, vel calce 9. vel 10. lota, aut aliis terreis medicamentis, vt creta, terra sigillata, cimolia, vel argilla cum aceto permisceatur, vel cum vrina pueri, aut merallcis, quæ crassiores substantiam habent, & vim refrigerandi, vt molibdena, lythar. cerusa. pomp. cadmia. Sequitur hanc affectionem depillatio, quare remedia in fine alopecie descripta, sunt vsurpanda, addendo farinam hordei torrefactam, quæ supra cicatrices statim pilos etiam generare creditur, vt & alia, quæ digerendi vim insignem obtinent, & sunt tenuium partium, vt taphia, allia, additis quibusdam insigniter resiccantibus & merallcis, qualia sunt cadmia, lytharg. spodium, pompholix, cinabrium, cerusa vsta, calchant. flos æris, & similia.

*Quibus
tollitur
depilla.*

De dolore capitis. CAP. V.

Dolor capitis semper symptoma est. Sequitur enim vel intemperies, vel distentiones siue solutiones continui per distentionem factas, & per puncturam. Quare morbos à quibus fit, veluti & causas, præcognoscere oportet, vt iis medeamur. Sed hîc loquimur de dolore, qui ob suam vehementiam, ad sese curationem trahit, & rationem causæ habet mali, non boni, nec febrium est symptoma mite. Nam dolor ille capitis, qui fluxum sanguinis in morborum acutorum crisi præcedit, non habet rationem mali, sed boni: quare ei nulla remedia sunt adhibenda, vt illum inhibeamus. Nam cum nos medicamentis repellentibus illum impedire volumus, sanguinem à capite repellimus, & fluxum sanguinis, qui necessarius est ad morbi curationem impedimus. Galen. hoc in vniuersum docet lib. ad Glauc. Dolorem, inquit, criticum capitis non esse curandum. Quod tamen intelligi debet de dolore, qui fluxum sanguinis criticum præcedit è naribus, non autem de dolore capitis, qui vomitum præsignificat. Nam illa medicamenta repellentia euacuationem impedire non possunt, quod de exterius apposisis intelligo. Quare in hoc casu dolorê criticum possumus curare. Præterea eadem medicamēta adhiberi possunt in omnibus morbis, in

in quibus fluxus sang. inutilis est, vt in lethargo & peripneumonia. Poterūt enim & dolorem capitis minuere, & excretionē illam inutile impedire. Sed priusquā nos medicamenta supra partem adhibeamus, consideranda sunt duo potissimum, scilicet causæ dolorem facientes, & partes, quæ dolorem patiūtur. Partes illæ sunt capitis omnes vel aliquæ, eæque vel externæ, vel internæ. Internæ, vt membranæ cerebri, & vt Gal. addidit *venæ, arteriæ*, vel substantia cerebri, quas partes ipse *sentire* esse alibi docuit, vnde & omni dolore carere deberent. Quod si dolorem sentiant, erit grauis, qui partibus parum sentientibus euenire solet. Cerebrum ob- *Cereb. ob-*
tusè sentire, manifestum est ex his qui vulnerati sunt. *tusè sentit.*
Nam frigus vsque ad medium cerebri sentiunt. At potissimum distinguere oportet dolore partium internarum, à partibus externis. Nam omnes partes internæ, talem consensum habent, vt vna læsa aliæ lædantur, & difficilis est distinctio. Quid enim potest ex dolore graui cognoscere, an substantia cerebri doleat, vel venæ? Vene quidem discernimus, si substantia cerebri laboret, vel membrana. Nam cerebri dolor est grauis, membranæ punctorius. Dolor arteriarum à dolore venarum, pulsatione distingui potest. Nam arteria nō potest non dolore facere pulsatorium, si comprimatur: adde quod arteriæ partes vicinas pulsando dolorem faciunt maiorem, quàm venarum distentio. Dolor in nervis facile apprehenditur. Nam si nervus aliquis dolorem sentiat, dolor alicui organo communicabitur, vt si nervus opticus doleat, oculus dolebit, siue prima, siue secunda coniugatio sit. Si tertia aut septima, lingua per consensum nonnihil sentiet læsæ functionis. Nam dolorem parvum aut nullum sentiet, ratione laxitatis. Si quarta, palatum: si quinta, aures: si sexta, os ventriculi. Partes autem externæ ab internis distinguuntur facile. Nam si dolor sit externus, tactu apprehendi potest vel quod pili videantur erigi. Si partes internæ dolorem sentiant, talia non accidunt. Sunt & causæ causarum diligenter perquirendæ, num sit intemperies sola calida: quæ magnos & subitos dolores facit: frigida, magnos & subitos etiam, sed minùs quàm calida, diuturniores tamen: vel

Dolor cereb. membr.

Arteriæ.

Læso nervi.

Doloris interni ab externis no distinctio.

sicca, quæ moderatos, & non citos, & longos. Humida nullum dolorem facit sui ratione, sed humoris copia. Rarò dolores ex sola intemperie fiunt, & si fiant, diu non durant, quin causas internas mouendo dolorem cum materia faciant. In corporibus tamen bene temperatis fiunt isti dolores, sine materia, qui neque habent plenitudinem, neque cacochymiam. Econtra qui habent plenitudinem, aut cacochymiam, dolores cum materia patiuntur. Deprehenduntur autem dolores supradicti ex intemperie. Si à causa aliqua procatarctica excitati fuerint, vt à sole, frigore, aut à medicamentis calfacientibus vel refrigerantibus: talis erit intemperies, qualis fuit causa procatarctica, vt calida, si à medicamento calido appposito: frigida, si frigus aut medicamentum frigidum dolorem excitauit: sicca, si curæ, sollicitudines, vigilie immodicæ, inedia & alia, quæ vim habent exsiccandi corpus, præcesserint. Rursus dolores capitis cum materia, vel quod materiæ respondet, fiunt, vt à sanguine, bile, pituita, & melancholia, à flatibus, vel spiritu vaporoso, aut etiam subtiliori. Per consensum, vel per proprietatem etiam fit dolor capitis.

*Dolores
per consen-
sum &
proprietatem.*

Qui fit à fumis & vaporibus, magis per consensum fit, quam per proprietatem. Qui à materia, per influxum, vel citra influxum. Qui per defluxum fiunt, per consensum alicuius partis, vel totius corporis fiunt: Qui à pituita, magis per proprietatem. Qui verò à melancholia, per consensum & per proprietatem, sed rarò fit dolor à materia crassa, & viscida per consensum. Quod si dolorem faciat, id est ratione vaporum inde eleuatorum. Dolor capitis fit vel cum grauitate, vel cum distentione, vel morfu, vel pulsatione. Qui cum grauitate fit, multitudinem significat. Si cum morfu, acrimoniam vel humoris, vel vaporis. Si cum pulsu, inflammationem. Si cum distentione citra grauitatem & citra pul-

*Quibus di-
gnoscamus
morbum
capitis per
consensum.* sum spiritus copiam significat. Si cum grauitate fit & agnoscimus liis notis plenitudinem humoris. Cum pulsu, membrorum notæ substantiæ inflammationem. Cognoscitur per capitis per consensum fieri, si nulla præcesserit causa procatarctica circa caput, quæ potuerit dolorem inducere, vt insolatio, refrigeratio, odor myrrhæ, croci, aut aliorum, quæ

capitis

capitis grauitatem solent facere. Adde quòd si per consensum fiat, aliqua nota in ea parte, per cuius consensum fit, apparet, vt si per consensum ventriculi fiat, vel erudititas, aut ebrietas, aut cibi corruptio, aut dolor, aut nausea, aut oris amaritudo prius præsentiatur. Si autem per consensum vteri, menses retenti sunt, aut semen putrescit in vtero, aut circa illam partem humorum fit perturbatio. Nota propria huius doloris est partis posterioris capitis dolor, aut quòd prius in ea parte sentiat. Per consensum totius corporis fit, vel ob febrim quæ effumare facit multos fumos & vapores, aut propter humorum tenuium influxum. Rarò fit per alium consensum: hoc autem fit propter maiorem consensum ventriculi cum cerebro, & vteri cum spinali medulla, & parte posteriori capitis. Dolores qui sunt per consensum, sunt eodem modo, quo fieri solent inflammationes, vel ob imbecillitatem capitis, vel ob calorem trahentem, vel ob mittentium sympathiam, vt supra dictum est, vel mittentium robur, vel ob materię naturam. Leuius enim sursum ascendunt, & caput recipit fumos, & tenues humores ob firum, quemadmodum partes inferiores, liquidos & graues. Dolor capitis, qui frequenter repetit, per consensum fit, factus per consensum durat etiam post sedationem affectus prioris, vt videre est in doloribus factis in febrium intermittentium accessionibus, qui post sudorem, & febrem aliquot horas durant, propterea quòd non tam facile materia resoluitur, ac illa quæ est in ambitu corporis: vel quia propter febris vehementiam, magna fit ad cerebrum effumatio. Priusquam remedia adhibeamus, distinguere oportet causam & partem dolentem, & vt cognoscamus, quæ pars potissimum dolet, aut ratione cuius imbecillitatis dolor factus est, inspicere oportet, quæ illarum partium prius doluit: item si dolor totum caput occupauerit. Nam in hemicrania facile est distinguere, quæ pars doleat. Omnes istæ differentiæ dolorum, curationem habent, & præcautionem, & potissimum quæ sunt per consensum. Et in hoc conueniunt, quòd in principio repellentia medicamenta supra partem apponenda sunt. Si dolor sit ab intemperie calida, frigida eliguntur: si cum fluxu

*Ventriculi.
Vteri.*

Totius corporis.

Qua com-
munia in
doloribus
cap. materiae, non sufficiunt frigida, sed astringentia adiungenda sunt. Commune est etiam in omnibus doloribus, in declinatione, vt digerētia supra caput apponantur, & in fine declinationis, quæ parti robur addunt, potissimum quando ex imbecillitate cerebri fit dolor capitis.

CVRATIO.

Sang.
missio.

SI ergo symptoma sit morborum capitis dolor, non autem febris, neque sit ab intemperie tantum, ab euacuatione est incipienda curatio. Euacuatur autem humor à quo dolor excitatur, vt si à sanguine fiat, sanguinis missione, si à bile, pituita aut melancholia, medicamento purgante. Quod si vehementissimus dolor sit, à quacunque causa sit, ob vehementiam doloris sanguis detrahi potest ad præcautionem, ne fiat inflammatio in capite, & spiritus nimium resoluantur, aut dissoluantur. Adde quod vehementissimi dolores non fiunt sine humoris copia, & potissimum calidi. Quamobrem conuenientissima erit sanguinis missio è vena cubiti cephalica, vel mediana, vel basilica, si aliæ non appareant. Quod si missionem sanguinis præcesserit clyster, aut mox sequetur, melius erit, ne ad venarum inanitionem sequatur attractio recrementorum crudorum ventriculi, & intestinorum. Clyster debet esse emolliēs & detergens, si dolor sine febre sit. Quod si febre coniungatur, tunc infrigidantia optinē, & opportunè admiscuntur. Clyster ergo talis fiat.

Clysteres.

℞. herbarum remollit. ana M. j. furfur vel hord. p. iiij. fiat deco. in ffb. j. diss. mell. viol. ʒ. ij. succi ciclae & mercur. ana ʒ. j. olei viol. ʒ. iiij. misce, fiat clyster, detur ante sanguinis missionem, vel paulò post. Si cum feb. sit, vel à bile fiat, paretur sequens.

℞. mal. ciclae, viol. ana M. j. mercur. M. β. prunorum pa. xx. quat. sem. frigid. maiorum ana ʒ. iiij. anisi ʒ. j. florum viol. pugil. j. furfur, vel hordei pu. iiij. fiat decoct. in col. diss. mel. viola & succi ciclae ana ʒ. ij. olei viol. ʒ. iiij. misce, si clyster. hæc dicta sunt in vniuersum de omni dolore capitis, nunc de eo tantum qui à causa calida fit, dicemus.

Generalis explicatio eorum omnium, quæ in dignoscendis capitis doloribus cogniti sunt necessaria.

Capitis dolor in vniuersum à Græcis Cephalalgia dicitur. Sed in quo à Cephalæa distingui debeat, & Hemicranea, disputabitur suo loco. Nunc de dolore in vniuersum nobis instituendus est sermo, qui in Symptomatum ordine non morborum collocandus est. Comitatur enim intemperies aut continui solutiones quæ post distensionem & puncturam fiunt. Quare morborum & caussarum dolores excitantium cognitio nobis habenda prius est, quàm dolorem ipsum tollere possimus. Neque tamen omnis doloris sedandi rationem hoc loco tradere propositum est: sed eius tantum, qui tantam sæuitiam & molestiam exercet, vt vel naturæ perniciem laturus, vel in discrimen vires adducturus esse videatur, vnde grauioris mali causa esse queat. Dolorum enim salutem prænuntiantium quidem nec medicamentis præcaueri, nec cōsopiri sine periculo possunt, quidam verò tutissimè. Doloris siquidem capitis decretoriam in acutis morbis sanguinis è naribus eruptionem præeunti curatio molienda non est, ne dum medicamentis repellentibus eam perficere tentamus, sanguinis, quæ robore victricis naturæ futura est, eruptionem, à qua morbi solutio pendet, prohibeamus. Ob eamque causam Gal. 1. ad Glauc. dolorum criticorum curationem negat esse faciendam. Id quod sanè de eo tantum concedimus, qui natura perturbata, sanguinis excretionem per nares moliente fieri consuevit, non autem vomitionem. Si enim tam immaniter affligat, qui vomitionem præcedit dolor, sedari quidem non intrò assumptis, sed foris admotis remediis securè potest. Nihil enim hac ratione est, quo naturæ conatum excretionemque illam decretoriam auertere & remorari queat. Eiusmodi autem doloris auertendi leuandique ratio in omnibus etiam aliis morborum excretionibus, quæ periculum potius creant, velut in lethargo & Peripneumonia, necessariò tum excretionis, tum doloris compescendi causa vsurpanda est. Sed antequam illam demonstremus, de doloris generatione & differentiis prius agendum esse videtur. In quarum cognitionem

METHODVS

ut facilius deueniamus, duo primùm contemplanda
 sunt, id, videlicet, in quod dolor incidet, & quod illum
 inducit. Ille igitur vel per vniuersum caput sparsus est,
 vel eius aliquam tantum partem affligit: eaque vel in-
 terius vel exterius est. Internas voco membranas, ceu
 meninges, aut cerebri substantiam, vel venas, arterias,
 nervos. Quarum aliae sentiendi acumine magis, quæ-
 dam minus præstant. Quæ exquisitius sentiunt, me-
 ninges & nervos esse non est dubium, indeque dolo-
 ris molestias vehementius percipere. Sed de arteriis,
 venis, & cerebri substantia non adeo manifestum, cum
 grauem & obrusum dolorem tantum, qui partibus im-
 becillo sensu præditis accidere consuevit, præsentiant.
 Neque enim iis partibus sensum omnino detrahere o-
 porteret, cum Gal. lib. *περὶ τῶν οὐκ*, venas & arterias inter
 eas, quæ doloris iniurias sentiunt, enumeret, & de ar-
 teriis planè id pronuntiet, in lib. de tumoribus contra
 naturam, & cap. 3. lib. de locis affectis, sicut cap. 5. libr.
 15. meth. qui eas alibi & ipsam cerebri substantiam
 sensu carere scripsit, quod nos de extractione intelligen-
 dum censemus. Quod enim cerebri corpori sentiendi
 quædam vis insit, experientia demonstrat, in his, qui
 in capite vulnus acceperunt, quibus per ipsum vulnus
 ad cerebri medium usque frigoris sensus peruasit. Sed
 quauis hæ partes se habeant consensus & conne-
 xio illarum inter se, propter quam vix aliquam læsio-
 nem sine alterius offensione possunt accipere, efficit,
 ut ex doloris specie & vehementia, non satis perspe-
 ctè de doloris situ & parte primò dolente possit iudi-
 cari. Quis enim ex doloris grauitate, substantiam ce-
 rebri tantum dolore, aut venas ipsas affirmare audeat
 & rectè possit? Quauis grauitas, quæ in dolore est, sub-
 stantiæ cerebri potius, quàm meningum demonstret.
 Cerebri enim dolor cum ponderis cuiuspiam specie
 grauis est. Meningum enim pungens & acutus, ossium
 verò membranarum contundens & profundus est. Ar-
 teriarum dolor à venarum dolore proprietate sua &
 discrimine distinguitur, quòd arteriarum aut partium
 arteriis vicinarum cum pulsatione sit, quæ illis pro-
 pria est: venarum verò minimè. Qui verò à nervis pro-
 ficiscitur

ficiscitur dolor, vehementia cum menyngibus, ut sensus acumine & præstantia conuenit cum iisdem, sed hæc nota discernitur, quòd qui conuulsioni simile referat: atque etiam cum nervosa quædam pars cerebri afficitur, eius affectus aliquod sensuum externorum organum pariceps per consensum affici necesse est: ut si pars ea, à qua prima & secunda nervorum coniugatio, aut nervus, qui ad oculos sentiendi facultatem deferret, ortum trahit, noxam subierit, oculis illa communicabitur. Si ea porro, quæ tertiam & septimam producit, doleat, linguam in consensum suum trahet, quæ cum laxam & raram substantiam habeat, nullum ex distensione aut laxitate dolorem concepit. Eadem est & reliquarum coniugationum ratio, quarum quarta si patiatur, affectum suum per nares transmittit ad palatum: quinta ad aures: sexta autem ad os ventriculi. Dolor verò, qui externas capitis partes exercet, aut in cute, aut in pericranio situm habet: uterque ab interno dignoscitur, quòd tactu deprehenditur, pressuque capitis exacuitur. Interior vel minimè, in quo etiam pili non erigi, ut in externo videntur. Nec à veritate prorsus alienum est, interiores solum dolores ad oculorum usque radices, id est, partes oculorum internas peruenire, licet pericranium, cui externi dolores magna ex parte insident, oculorum cauum succingat, & ea ratione consensum cum interna oculorum parte, sicut cerebrum habeat, à cuius tunicis oculorum tunicæ atque etiam vasa proficiscuntur. Nam cum dolor externus à pericranij refrigeratione contrahatur, in palpebris potius, quam in radicibus oculorum percipitur, nec immerito interior pericranij oculorum cavitatem inuestientis tunica, non adeo frigoris nec siccitatis molestias perpeti posset, cum undique contegatur, & multa calore oculorum, qui concursu & copia spirituum atque etiam pinguedine illius partis perpetuò conseruatur, semper incalescat. Dicimus verò pericranium à frigoris iniuriis frequentius, quam ab aliis dolere, quòd cum sit frigida constitutionis, à causis similibus promptius, quam diuersis patietur. Quòd si quando contingat æstu aut alia evidente causa caput

dolere, dolor potius in cutis partibus, quam in penitioribus sedem habebit. Pericranium enim, quod vestit oculorum cavitatem, non afficitur ab æstu solis, quemadmodum neque occipitis pars inferior. Vnde Galen. in dolore capitis partem occipitis non esse inungendam docet, eò quòd dolor non perueniat ad eam.

CAVSSÆ DOLORVM.

Causse verò dolorem procreantes nobis iam sunt explicandæ. Sunt autem alteratio repente & confestim facta, atque vnitatis solutio. Alterant intemperies vel simplices & sine humoris consortio, vel cum humoribus, vel vaporibus, iisdemque calidis vel frigidis. Continuitatem solvunt rumpentia, contudentia, erodentia, soluentia & secantia. Rumpunt & quæ distendunt. Hæc rursus aut à forinsecus incidentibus sunt, aut ab interna aliqua substantia, quæ multitudine sua corpus se continens distendit, cuiusmodi sunt humores, flatus, vapores, immodica quoque siccitas. Contundunt dura vel magna foris incidentia. Erodunt autem humores, aut aliud quidpiam forinsecus adueniens, cui mordendi aut exedendi aut vellicandi vis insit. His omnibus distinctis, causse unde singula proficiantur, sunt considerandæ, quarum cognitio ex doloris specie & proprietate, partisque dolentis natura, & ex causarum, quæ præciserunt, contemplatione comparabitur. Sed cum dolorem non solam intemperantia, sed ea etiam, quæ materiam aliquam siue humorem, siue humoris vicem gerentem habet, procreet, distinguendus est, qui ab hac vel illa procedit. Ac primum vehementes, acutos, magnos, & subitos à coloris & frigoris exuperantia concitari manifestum est, quòd illæ qualitates promptissimam efficacissimamque vim in agendo habeant: quanvis calor breviores, frigus verò diuturniores efficere soleat. Quod equidem præstat, quum repente & confestim inuadit. Si enim sensim agat, stupefacit potius, cum huic obrundendi & minuendi potius, quam mouendi sensus, vis insit. Qui porro à calore est, iurbedine quidem leui capitis oculorumque & faciei partes infundit, atque calore in eisdem partibus primo tactu percepto, cum quadam faciei colliquatione & cū-

CVRANDI MORBOS:

tis siccitate scalaréque & simul ex frigidorum perfu-
 sionum iuramento perficiuntur. At qui à frigore est,
 contrariis notis & signis deprehenditur. Siccitatis au-
 tem cum in agendo tardior & imbecillior sit vis, mo-
 deratos tamen, lentos, longósque producit dolores: cu-
 ius etiam indicium est faciei scalar. Verùm humidi-
 tatis cum sit actio debilissima, non tanta vis est, vt do-
 lorem ex se promere possit, nisi cum copia distendat.
 Rarò autem dolores, qui diutissimè durant, sola intem-
 perantia sine materiæ consortio adferre videtur, pro-
 pterea quòd eos causæ procatarcticæ magna ex par-
 te procreant, quæ internas statim concitant: vnde fit,
 vt ad dolorem statim accurrat materia, nisi corpus ex-
 quisitè purum sit, nullaque plenitudine aut cacochy-
 mia laboret. Hinc etiam solùmmodo accidit, vt dolo-
 rem sine affluxu materiæ aliquamdiu perferat, cum
 nulla sit plenitudo aut cacochymia, quæ illam suppedi-
 tet. Quare si illæ adfuerint, diu sine materia permanere
 dolor non potest. Qui verò cum materia dolor est, eam
 aut ab aliquo quatuor humorum, vel à tunicis, aut à
 spiritu vaporis aut exaltationis naturam habente acce-
 pit, & cum morfu & acrimonia, gravitate, distensio-
 ne vel pulsu affligit. Ex quibus non solùm morbi spe-
 cies & pars laborans, sed etiam causa efficiens eorum
 demonstratur. Qui enim acer aut acutus aut mordax
 est, acrimoniam vel vaporis vel humoris biliosi signi-
 ficat: grauius verò frigidorum pituitosorumque co-
 pia. Hebes etiam ab eisdem est, & à melancholia, & à
 flatu, nisi cum multitudine vehementer distendant.
 Distendens autem citra gravitatem quidem ac pul-
 sum, flatulenti & crudi spiritus copiam ostendit. Si ve-
 rò cum gravitate distendat, retentam in membranis
 multitudinem testatur. At qui cum distensione simul
 & pungit & pulsat, membranz substantiæ inflamma-
 tionem: sicut, qui sola gravitate vrget, multitudinis hu-
 morum index est. Qui tantùm pulsat, inflammatione
 tentari significat arteriosam substantiam, vel partem
 arteriæ proximam, aut arterias ipsa tenui bilioloque
 humore aut vapore turgere, à quo vehementius ad
 pulsum excitantur. Multum autem etiam conuenit

circum an benevalenti, an ægro, an derepente vel non, oboriatur dolor. Cui enim bene valenti derepente oboritur, eius causam ad flatuosum spiritum referre oportere scribit Galenus in Aphor. 15. lib. 6.

De caussarum generatione.

Iam de caussarum generatione dicendum, quarum evidentes ab interioribus sunt distinguendæ. Evidentes sunt æstus, frigus, constitutiones temporum & æris, siue austrinæ, siue aquiloniæ, siue siccæ, ictus, casus, temulentia, animi corporisque affectiones & studia, ut sunt curæ, vigilæ immodicæ, exercitationes, & similia: quæ omnia vario modo capiti dolorem creant. Æstus enim, vel quivis calor, quatenus intemperies caput afficit, aut ad eam partem humores euocat, aut in eo iam contentos, & spiritus dissolvit, vellicat, excoquit, incendit, & in furorem agit, eatenus doloris capitis causa esse potest. Sic etiam omnia quæ repente & vehementer corpus humoresque noxios aut naturales exagitant, aut valde extenuant, & in feruorem agunt, ut sunt inediæ, vigilæ, exercitationes, ceteraque enarrata prius, idem, quod æstus, efficiunt, ipsumque frigus interdum. Sua enim condensante & astringente vi dum fuliginosa recrementa retinet, caloremque naturalem intro cogit, calefactionis & incensionis spirituum authorum, aut si repleta per austrinos imbres capita excipiat, efficit, ut in capite permanens excrementum doloris causa existat. Si autem nulla ex corporis parte plenitudinem ullam inueniat, digerit frigus aut discutit: atque hæc ex accidente præstat. Sua autem vi refrigerando dolorem excitat, quam obtinent austrinæ constitutiones, & omnia, quæ, ut illæ capiti gravitatem inducunt: unde ipsum replent, multitudinéque humorum grauant. Quorum omnium dignotio cum partis affectum demonstrat, ad eius curationem plurimum adfert momenti, proindeque diligenter contemplanda. Siccitas faciei, & calor cum oculorum rubedine & rotius corporis superficie, quod etiam sanguine tumescere conspicitur, sicuti & venæ omnes, quæ in oculis, temporibus, fronte & tota facie extenduntur, si magnus affectus fuerit, vestigia sunt caloris: contraria autem acciden-

CVRANDI MORBOS.

accidentia frigoris. Si verò curæ, mœrores, inedia, vigi- *Calor*
 lia, aerisque siccitates præcesserint, dolorem ab his pro- *veſigia*
 fectum esse suscipio erit. At si nihil prorsus eorum, quæ *ex frigo-*
 extrinsecus occurrunt, caput affecerit, tunc qui vrgebit *rit.*
 dolor, causam interiorem habere certò pronuntiandus
 est. eaque aut proprio cerebri vitio, aut ex partium sub-
 ditarum consensu nascitur. Illa ex proprio cerebri vitio
 nasci dicimus, quæ suæ generationis causam in capite
 habent. Talis est humorum caput aggrauantium vel
 mordentium, aut flatuosorum, spirituum acrium copia
 vel distendentium, quorum causa est intemperies aut
 imbecillitas, quæ superuacanea excrementa in se parit,
 quia subigendo & perdomando alimento non sufficit.
 Quibus accedit interdum obstructio meatuum, per
 quos excrementa capitis expurgantur, fuliginosique
 halitus cernuntur: à qua dum retinentur intus, suæ
 multitudine aut qualitate capiti offensionem pariunt.
 Ex quibus perspicuum est eos solos, qui per congestio-
 nem in capite colliguntur humores, dolorem per pro-
 prietatem illi ingenerare posse: quales sunt maxime
 crudi, crassi & pituitosi atque melancholici, qui raro et-
 iam per consensum ipsum affligunt. Quod si id aliquan-
 do efficere videantur, ratione vaporum ab illis excitato-
 rum accidere non dubitamus, quibus tamen adiunge-
 mus flatus, qui cruditatem calorisque imbecillitatem
 sequuntur. Hæc capiti licet insint vitia, non tamen sem-
 per illi dolorem commouere possunt, nisi aut exteriores
 causæ & consensus simul partium concurrant. Nec e-
 nim humorum in capite multitudo nec intemperies in-
 terdum procreabit dolorem, nisi aut ab externo acris
 condensatio vel refrigeratio accedat, nec imbecillitas
 tantam excrementorum copiam semper parit, vt dolo-
 ris causa esse nequeat, nisi etiam ab aliis partibus trans-
 missa in se recipiat, & ab iis obruta sese erigere nequeat.
 Adhuc non raro accidit, vt dolor, qui à cōsensu partium
 initium accepit, in affectum tandem proprium desinat,
 adeo vt alterius partis affectu sublato, à quo inualeſcat,
 per se iam subsistat, quod in Cephalicis frequentissimū
 est. Sed vt eos dolores, qui capiti ex proprio affectu i-
 pſius accidunt, ab iis, quos partium consensus infert, dis-

M E T H O D V S

cernere possimus, intelligere oportet, caput per consensum laborare, quum aut vniuerso corpore, aut aliqua eius parte laborante, in consensum illarum trahitur, affectusque particeps efficitur. Quod diuerso modo, pro vario inter partes consensu fit, transmissis videlicet prauis vel vaporibus vel humoribus, aut nō transmissis. Iecore enim inflammationem patiente, sicut dolor ad iugulum peruenit, & oris ventriculi morsum sequitur labri inferioris tremor: sic affectis interdum partibus quibusdam infernis per continuationem quam cum capite habent, sine vlla humorum aut vaporum transmissione dolor ad ipsum defertur. Hoc modo fieri potest, vt ore ventriculi morso, aut vellicato, aut quouis modo affecto dolore afficiatur caput propter retractionem, cum affecto cerebro stomachus patiens conuerso deprehendatur propter neruorum inlignum, per quos illi cum stomacho consortium est. Quamuis non dubitemus ex vaporum fumorumque ē ventriculo ad cerebrum ascensione dolorem excitari. De quo tamen iure posse dubitari videtur, cum nulla manifesta via, per quam deferantur, appareat. Si enim per oesophagum, vt vulgus medicorum credit, & ab oesophago per nares & odoratus organum & palatum ascendant, cur non semper & naribus apertis & ore patente potius illic exeunt? Quare existimamus non ē sinu ventriculi solum, sed ex ipsius tunicis externis fumos ad cerebrum effari. Et qui ē sinu partim oesophagum & viam odoratus, partim per rectitudinem & ambitum neruorum sextæ coniugationis ad cerebrum perueniunt. Ea enim rectitudo eam vim habet, quam baculus oblongus in camino erectus, vt fumus sursum intra canalem dirigat, ne extra effundatur. Non illa ratione torpedo per baculum tacta tangenti manuum stuporem inducit, eius vim dirigente & deducente baculo ad manum, ne per aerem diuagetur. Quam vim alioqui non habet, etiamsi manui quam proximē admoveatur. Qui verò ex tunicis exterioribus per arterias magis, quam per venas, quæ in illa parte sunt (quæ à vena porta originem trahunt) sursum feruntur. Nec porro dubitandum, ne tanta fumorum copia non possit inde

inde efferri, quanta ad dolorem generandum requiruntur. Cur enim si aliqua insigni agente qualitate ex putredine vel corruptione humorum contracta præditi, minorem vim afficiendi capitis & pungendi, quam pusillum, quod ex scorpionis morfu prodit, virus, ut statim Epilepsiam pariat, obtinebunt? Quæ enim ad vteri affectus referri possunt, qui eodem modo caput per consensum, quo ventriculus, afficiunt. Iam redeundum ad notas eius doloris tradendas, ubi prius admonuerimus vapores & fumos nullum, nisi per consensum, dolorem concitare posse. Ex humeribus autem eos, qui per defluxionem tantum, non per congestionem in capite colliguntur. Primum ergo per consensum laborare deprehenditur caput, cum nulla evidens causa, ut æstus, aut frigus, ictus vel odor gravis, aut aliquod eorum, quæ gravitatem capitis facere consueverunt, prius occurrerit: ob eoque differt, qui primario afficit, quod solitarius consistit, perpetuusque est nil intermittens, neque in crescente alterius partis affectu augetur, sed quovis alio sublato persistit: atque illi accommodata præsidia conferunt. Alter verò frequenter repetit, & cedit, alterius incremento inualefcit, illiusque remissione & affectu sublato mitescit vel leuatur. Licet id non usque adeo verum sit in doloribus, qui per insignes febrium intermittentium accessus præhendunt: quippe sudoribus & accessione sedata, post aliquot tamen horas perseverare apparent. Quod quidem accidit ex eo, quod materia tardius difficiliusque resoluatur & discutatur, propter cranei densitatem in capite, quam quæ per corporis habitum effusa est. Altera certissima nota est, quod si aliqua pars huic malo dedit originem, veluti si è ventriculo, vel vtero, vel iecore, foris aut aliunde confluxit, signa exhibet eius partis affectæ, quæ velut seminarium & origo mali fuerit. Ex ventriculo enim prodire iudicandum est, cum cruditatis aut ciborum corruptionis, vel imbecillitatis indicia, nausea, aut deiecta appetentia, oris amaror, & cordis erosio, cardiachmos appellata, prius præsentiantur. Ab vtero autem demonstrant suppressi menses, semen aut aliquid aliud in illo computrescens

vel circa illam partem humorum perturbatio. Sic si vitiosa constitutionis in corpore plenitudinis vel cacochymix conspicua signa apparuerint, his caput participes effici suspicandum erit. Quod fit elatis sursum vaporibus aut fumis per modum defluxionis confluentibus, si caput præsertim imbecillum hos promptè recipiat, vt in febrium rigore & vehementia accidit, quia fusi & accensi humores more vaporum caput subeunt: & vt in Aphorismis addit Galenus, vnà cum calore flatuosus spiritus in caput tollitur, quod per vrinas turbatas, iumentorumque vrinis similes significari Hippoc. asseruit. Fiunt enim crassam ac densam materiam agitante & versante calore, atque in ea subigenda occupato. Raro autem ex peculiari cuiuspiam alterius partis consensu, quàm ventriculi aut vteri, dolet caput. Nulla enim omnium capite inferiorum pars est, quæ maius & euidentius cum cerebro consensum habeat, quàm ventriculus per nervos sextæ coniugationis, & vterus per spinalem medullam, cui robustissimis tendonibus & ligamentis adligatus est: vnde fit, vt ab iis solis dolor ad cerebrum, sola condolente ratione, nulla interueniente materia perueniat; cum vterque ab acrimonia humorum vellicatur & pungitur, aut multitudine sola distenditur. Quare licet non raro per aliarum partium affectus, vt lienis, iecoris, & septi transversi caput in consensum adducatur, maximè si inflammationem patiantur: non tamen id, nisi communis societatis, quam totum corpus habet, ratione, & materia intercedente, sicque per venas & arterias sursum transmittitur. In quo facilius id per venam cauam præstat iecur, & lien per arteriam magnam. Sed cum alium nullum aditum, quàm per hos ductus ad cerebrum habeant, non videtur, qui ex eo potest excitari dolor, causam magis à mittente parte, quàm à recipientium imbecillitate obtinere, nec vnquam potius, quàm aliam capitis partem obsidere debere. Cum enim vena caua, arteriæque magna tantum iuxta iugulum diuidantur, dextramque & sinistram arteriam & venam in caput mittant, quæ ratio est, cur quod à iecore & liene demandatur, per illam potius, quàm per alteram ad caput peruenisse, & in dextra

dextra potius, quàm sinistra dolorem stabilire debeat? Quod enim de rectitudine obicitur, vim in doloribus, qui à materia per venam communem & per arterias & venas fiunt, nullam habet. At in his, qui per partium continuitatem & colligationem ab vna in alteram transeunt, verum esse posse non inficiamur. Quòd si hæc distinctio recipienda non sit, cur rectitudinis iure dolores omnes qui propter vteri societatem fiunt, non in occipite semper potius, quàm sincipite, vt Hippoc. & Gal. voluerunt, percipi debent, cum Galenus in hac re his, qui afflicti sunt lumborum, tum prorsus spinæ, posteriori cerebro rectitudinem quadrare affirmant, non assentiat? Quare dolori, qui ex consortio iecoris & lienis in capite suboritur, non dextra potius, quàm sinistra, nec alia pars assignanda est præter anteriorem. In qua cum omnis materia siue vapores, vel quæcunque fuerit, quæ à partibus inferioribus sursum deferretur recipiatur, doloris meritò per consensum communem totius corporis, & per materiam procreari sedes & nota existit. Id Galenus commento primo in libro 6. Epidemion demonstrare conatus est in hunc modum. Ex putrescente (inquit) sanguine febres accenduntur, quæ plurium vaporum copiam ad caput mittunt, à quibus cum repleatur, dolores in sincipite molestiam inferentes exoriuntur, eò quòd vapores illi calidi per arterias ad caput sursum ferantur, quas ex colli appellata fornace vtrinque sinciput rectà ascendentes cernere licet. Deinde quòd toto sanitatis tempore tenuia & vaporosa cerebri excrementa per sinciput maximè transpirare consueverunt, cum in eo rarissimè sint futura, craneumque ipsum tum tenuissimum, tum maximè fistulosum existat. Tertio præter hæc quòd sensu prædita corpora in futuris complura sint, nempe pelliculæ quædam panniculum crassiorum pericraneo coniungunt, penetratque tenuium vasorum copia. Cum autem magnitudine æqualia fuerint pathemata, partes, quæ natura sensu magis participant, sentiunt magis, quæ verò magis sentiunt, iis causæ dolorificæ molestæ magis. Ob eas itaque causas concludit in sincipite dolores existere, vt demonstret veram esse Hip;

pocrat. sententiam, quam pronuncianerat. Quibuscunque ex fortu abortiuo atque vteri tumoribus ad capitis gravitatem conuersio fit, in sincipite dolores fieri. Nos verò existimamus Gal. eo loco communes, non tamen omnes tradidisse causas eius doloris tantum, qui à fumis & vaporibus ex inferioribus partibus efflatis excitatur. & sincipitis partes magis quam alias infestat. Non enim per arterias solum, sed etiam per venas doloris istius materia sursum repit, & in eadem parte sedem figit, eò quòd venæ, quæ sinus duræ menyngis constituunt, ibi desinant, potissimumque tertius & quartus. Quare cum eò peruenit materia, illic residet, distensionem facit, vnde dolorem potius, quam cum in interna adhuc est. Ex quo non est, quod quis eò quòd pars posterior frequentioribus, evidentioribusque venis est magis conspicua, dolorem firmari potius debere, quam in anteriore contendat. Didicimus enim ex anatome ramos venarum in occipite latiores esse, antèrius verò exiliores, quòd ab illa in hanc partem ferantur & desinant. Hoc tamen fieri intelligimus cum nulla pars capitis altera magis imbecilla est, aut iniuriis opportuna. Quæ enim aut ab initio aut ex casu, vel aliqua læsione talem conditionem sortita est, in eam fluxiones & humorum decubitus fieri semper consueuerunt, adeò vt quàm plurimis in ea parte per temporum mutationes, aut alias etiam leues occasiones repetat semper dolor. Nec solum qui per consensum, verum etiam qui primario cerebri affectu fit dolor, in anteriore frequentius, quàm posteriore sentitur, præsertim cum à materia pituitosa, aut excrementis in capite collectis excitatus est. Solèt enim illa in anteriore magis, quàm posteriore cumulari, vt ostendunt meatus, per quos expurgatur, vt nares, & palati foramina in illa parte à natura constituta. Ex quibus abundè demonstratum esse arbitror, posteriorem capitis partem omnibus prorsus doloribus minus esse obnoxiam, quàm priorem, nisi ab vtero proueniant, quibus ob eam causam id proprii inest propter peculiarem illius partis & vteri societatem cum cerebro per spinalem medullam, vt in occipite sæuiant, & molestiæ initium faciant, dummodo non per fumos aut

CVRANDI MORBOS.

aut vapores ab utero transmissos, sed per solam condolentiam, ut à ventriculo morbo aut vellicato fieri antea demonstrauiamus, caput afficiatur. Iisdem enim modis vterus cerebri, quibus & ventriculus in consensum trahit, de quo plura dicenda non sunt. Scire tamen interest, omnes, qui per societatem dolores fiunt, ob inflammationes & huiusmodi humores excitari ab imbecillitate partis recipientis, vel intemperie calida potissimum, cui vis attrahendi inest, vel ob mittentium sympathiam, ut antea dictum fuit, aut robur, aut ob materiæ conditionem. Leuia enim sursum semper feruntur. Quare fumi, tenues vapores, & humores facile caput subeunt, & ab eo propter situm admittuntur. Sicut graues & liquidi deorsum descendunt, & ab inferioribus recipiuntur.

De dolore capitis à causa materiali calida.

CAP. VI.

SI dolor capitis fiat à sanguine, oportet multum sanguinis extrahere, si à bile, minus. Facta sanguinis missione, & adhibitis cucurbitulis in lateribus colli supra capitis commissuras, adhibenda sunt repellentia, quæ in forma liquida administrari debent, tum quia facilius ob tenuitatem penetrant, & nimis adhæsiōe & contractu caput calfaciunt, ut emplastra, cataplasmata, vnguentata, vel linimenta. In forma autem liquida fiunt duobus modis, vel ex oleis & aceto tantum, vel ex succo herbarum repellentium. Oleum ros. omphac. aut quod paratur cum foliis oliuæ. Oleum ros. cydoniorum, myrtil. ne- *Oleum*
nupharisq; cum paucō aceto supra caput apponuntur, *repell.*
vel irrigando caput, vel intingendo pannos rarios in oleis illis fortiter agitatīs, & permixtis. In vehemētissimo dolore, ad illa quæ frigida & stupefacientia sunt, venire cogimur. Et satius est oleo ex semine papauæ. uti, quàm succo pap. Est enim magis familiare, & minus refrigerat. *Stupefac.*
Succi plantaginis, solatri, foliorum vitis, foliorum falcis, vel oleæ, vel summitatum rubi, vel pyri sylvestris, cum paucō aceto ponuntur. Vel more antiquorum leuiter inspissentur farina hordei, & apponantur: sed melius

est albumen oui fortiter agitata, pilis exectis, capiti imponere. Nam propter farinam minus adherent parti, & magis obstruunt. Aquæ refrigerantes distillatæ, in defectu succorum oleis permiscuntur, & potissimum cum oxyrhodino & oleo iam antiquo parato uti cogimur. Apponuntur autem aquæ peculi. ros. lact. plantag. solatri. Aquæ autem ros. & myrtil. raro usurpantur, ob odorem quo tentant caput. Sunt qui pulueres capitales apponant per se, vel consutos cum bombace, & frontalia vulgò dicta parant, sed propter crassitiem tardissimè operantur. Hæc remedia in dolore capitis ex fluxu sanguinis, & in bilioso dolore, & in omni qui sit à fumis & vaporibus, aut per alium consensum partium infernarum, in principio vtilissimè apponuntur, quibus peractis, ad id quod factum est, venire oportet. Nam cum hæc repellentia medicamenta, aut sanguinis missio tardius facta fuerit, caput repletur fumis & vaporibus, quos digerere oportet digerentibus, nisi vehementia doloris id facere prohibuerit. Nam coguntur in vigore doloris uti sedantibus dolorem, quæ duplicia sunt, vel quæ sensum obtundunt, vel quæ partem laxant, nimium distentam, aut quæ humoris acrimoniam obtundunt. Stupefaciunt autem ol. de semine pap. vel in quo incocta sint capita pap. quo quidem medium est inter oleum pap. & opium. His etiam adiungere oportet oleum de mandragora, quod stupefacit, oleum de hyosquiamo, quod quanquam idem faciat, non est supra caput apponendum, quia facit fatuitatem, vel insaniam, ut & solanum maniam. Opium dissolutum in ol. chamo. vel de croco, vel in vino antiquo naribus & temporibus apponitur: sed hæc stupefacientia non sunt temerè apponenda, & non nisi quando alia remedia inutilia sunt. Dolorem sedantia, quæ partem laxant, sunt ol. amygd. dulc. Sesaminum, viol. aliis permixtum. Obtundunt verò humorum acrimoniam lac recens emulsum, mucilago seminis mal. decoctum seminis mal. Ista tria aliquando ponuntur per se, aliquando commiscuntur. In bilioso magis utimur obtundentibus acrimoniam humoris & stupefacientibus, in aliis autem relaxantibus & modicè dige-

*Aqua de-
still.*

*Rosa &
myrtil. o-
mittuntur.*

*Hæc in
fluxu san-
guis. & bi-
lioso dolo-
re conue-
niunt.*

Topica.

*Duo ge-
nera sedā-
tium dolo-
rem.*

Stupefac.

*Olea peri-
culosa.*

*Quando
Sciendum
stupefac.*

*Obtundē-
tia humo-
rum acri-
moniam.*

digerentibus, quæ etiam dolorem sedant, vt ol. chamom. amygd. amar. de semine lini, decoctum, paratum ex floribus chamom. mell. vel samb. vel seminis lini. mal. quo decocto irrigatur caput tepidè. Sed priusquam ista adhibeantur, oportet influxum sedatum esse, aut oportet ligaturis, reiterationeque clysterum semper deorsum excrem. retrahere, vel frictionibus asperis. Hic est potissimum obseruandum, ne eligantur medic. illa quæ odorata sunt, quia teste Hipp. dolorem faciunt. Ob id abstinemus ab oleo anethino, & similibus, nisi in declinatione, cum nos volumus id quod est in parte, euacuare. Euacuatur autem humor sanguinis eruptione è naribus, vel masticatoriis, potissimum in causis frigidis & multum humidis, vel topicis supra caput appositis, remediis. Quare si iuuenis, vel mulier *Quibus* fit, quæ retentionem mensium patiatur, vel vir, cui *sanguis* suppressæ sint hæmorrhoides, scalpendæ sunt frequen- *per nares* ter nares, aut seris pungendæ, aut herba illa, qua pue- *extrahatur.* ri sæpe sibi sanguinem prouocant, vel foliis ficus con- fricando, aut borragine, aut aliis herbis aculeatis, aut asperis. Nam hoc faciunt pungendo & lacerando venas. Vena frontis aperitur potissimum, si posterior pars capitis doleat, aut apponuntur cucurbitulæ cum scarificatione ad latera colli. Deinde digerentia medic. ponenda sunt, quæ efficaciora esse oportet. Si internæ capitis partes doleant, ob partis situm olea calida apponenda erunt, & quæ potentissimè digerunt, vt oleum commune, etsi vetus sit, vel oleum sicyocum, aut anethinū, aut de abro. addito pauco aceto, vel vino tenuium partium. Illa sufficiunt in dolore à materia calida. Nam quæ parantur ex spondylo, pulegio, calamintha ad crassorem humorem digerendum præscribuntur, vel post curationem doloris capitis. Ad corroborationem tunc fieri possunt pul. capitales, & cucufæ, sed pul. inspersus capiti melior. Nam discutitur manè, cum caput confri- catur, & nouus sequenti die apponitur. Cucufæ autem semper apponuntur eadem, & aliquando ob sudorem aut pinguedinem humefactæ plus nocent quàm pro- sunt, hoc tamen habent vtilitatis, quòd vice pilei sint. Conficiuntur autem hoc modo pulueres.

Paluis.

R. corian ros. an. 3. iij. flo. anth. stechad. & cha. an. 3. j. anis. granorum tinctorum, myrthi, sandali albi an. 3. iij. misce fiat pul. tenuissimus, quo cap. sinapisetur, serò, & manè excutiat, & alius, si velis, apponatur. Ex eodem pul. cucufa paratur, quæ minus conuenit in istis causis calidis. Et quia in vehementissimo dolore humores vruntur, & acrimoniam acquirunt, non erit inutile post missionem sanguinis, dare medicamenta, quæ ichores sanguinis purgent, qualis est syrup. ros. laxatiuus cum media parte aquæ endi vel 3. j. cath. aut 3. x. cass. per horam vnâ ante prandium. Eo tempore datur propter duas causas, scilicet vt grauitate cibi deorsum mittantur, & vt cibi prohibeant effumationem ad cerebrum. Solet enim suo odore dolorem facere. Potest etiam parari decoctum sequens, quod detur singulis matutinis, maxime quando sufficiens quantitas sanguinis non est extracta, vel in quibus per ætatem, aut virium imbecillitatem non licuit.

Quæ ichores purgât

R. prunorum sebesten. an. pa. xx pass. enucleatarum 3. j. tamarindorum elect. 3. j. senz orient. 3. ij. sem. carthag. contusi 3. vj. polypod. 3. ij. flor. vio. p. j. sem. anis. 3. i. fiat decoctio ad lb. j. in qua dissol. syrup. viol. 3. vj. misce pro tribus matutinis. Si adhuc perseverarit dolor, post illos tres dies, adde vltimæ dos. syrup. ros. lax.

Rhab. cur prohibeantur.

3. j. vel cath. 3. v. rhab. quia multum effumat, non est dandum, vel detur in substantia, sed infusum in aqua endiui. vel viol. Reiterentur clysteres tertio quoque die, si prædicto decocto non vtantur, aut si alius non satis moueatur.

Victus ratio.

Abstineant à vino, & ab omnibus effumantibus ad caput, quales sunt fructus, ex quibus oleum parari potest, vt amygd. nuges, nuclei pinearum, auellanae, & omnia alimenta odorata, & quæ parantur cum petros. maiorana, menta, saluia aut cinamomo, aut nuce moscata, & similibus odoratis. Non moueat corpus, confricentur pedes. & brachia, non caput, nisi post curationem. A lacte, butyro, & caseo abstinere. Comedet quæ refrigerant, minus alunt, & non tentent caput: qualia sunt poma cocta in prima mensa, vel cruda in vltima, si illis assuetus fuerit. Vtatur iusculis paratis ex herbis remollientibus ventrem, vt borrag. cicla

cicla, spinachiis, lactucis decoctis in iure pulli, vel cum pauca quantitate carnis capi, vel gallinæ, vel hædi, vel vituli. Utatur cremore hordei cum pauco saccharo. Comedat in vltima mensa pyra, vel fructum mali cotonei. Sed hæc magis probentur in ea specie quæ sit per consensum ventriculi: non reclinet caput, neque tempore somni, neque vigiliarum, supra puluinar factum ex plumis, quia caput nimis calfaciunt: sed sit ex corio plenopalea, fursure hordei, vel auena. Non est negligendus dolor capitis, etiã si sine febre sit, quia sæpe in alios morbos mutatur, vt in phrenitidem, & alias capitis affectiones grauiore. Hæc remedia sufficient pro dolore capitis facto à sanguine, vel à bile sine febre. Si autem dolor hic sit criticus, ex eorum numero quibus remedia adhiberi possunt, aut si superveniat alicui morbo, in quo missus fuerit sanguis, & corpus purgatum, poterimus prætermittere omnes illas euacuationes, & topica remedia adhibere. Nam si crîsim præcedit, sit circa statum, in quo silentium melius est habere. Adde quod expectatur vomitio, vel alia excretio ad morbi solutionem. Sunt præterea ægri imbecilliores in statu. Quare satius erit à sanguinis missione abstinere, nisi dolor ab inflammatione fuerit. Tunc si vires valent, sanguis mittendus est, vt cap. de phrenitide monstrabimus.

De dolore capitis à bile. CAP. VII.

Dolor à materia calida fit à sanguine, vel à bile, vel à fumis flauæ bilis. Distinguuntur autem, quia dolor qui fit à sanguine, accidit ob eius copiam, quare sentitur distentio cum gravitate & pulsatione. Dolor autem à bile est sine gravitate, quia est parua bilis quantitas, quæ dolorem facit, sed sentitur morsus ob eius acrimoniam. Si à fumis fiat, biliosus humor vel in ventriculo, vel in aliqua alia parte collectus, sentitur, qui fastidium, nauseam, & vomitum, vel amarorem, vel cordis morsum facit. Dolor sentitur cum magna leuitate, quia fumi sua mole non premunt, sed solum distentionem faciunt, quæ iuncta leuitati distinguit hunc dolorem à dolore facto cum distensione & gravitate, qui fit à multitudine alicuius materiæ. Istis signis

*Critico
doloris
cap.*

*Dolorum
cap. distin
ctio.*

Victus ratio adiungenda. adiungere oportet victus rationem præcedentem, si biliosa fuerit, vel biliosa temperatura, aut ira & excandescencia præcesserit, tempus, regionem, ætatemque & omnia, quæ bilis redundantiam significare possunt, vt

Curandi ratio.

Sectio Generalis.

Cucurbitula

etiam euacuationis consuetæ retentio, quæ vel per seidem, vel per vomitum fiebat Idem obseruandum in distinguenda materia sanguinea dolorem capitis faciente, & maxime si retineantur menses, aut hæmorrhoides, vel hæmorrhagia consuetæ fieri è naribus, & si præcesserit vini generosi multa potatio, alimentorum multum sanguinis generantium vsus, si relicta sit aliqua exercitatio consuetæ. Curandi ratio est: Primum detur clyster præscriptus cap. 5. cui addi potest lact. M. j. cucurbitæ eadem mensura, vel potest augeri modus quat. sem. frig. maior. præcipue cum nobis proponitur ætate & natura biliosus. Si venæ multum turgeant, à cepha, detrahatur parum sanguinis, non ad euacuationem, sed ad ventilationem. Nam cum bilis etiam pauca summos dolores excitet propter eius acrimoniam: non tam de ea euacuanda, quàm alteranda, & castiganda, nos oportet esse sollicitos. Et si æger natura fuerit biliosus & ætate, tempusque anni æstiuum, ne euacuando sanguinem, qui est frenum bilis, æger incidat in phrenitum, nõ est facienda sectio cephalicæ, sed venæ sub lingua posunt aperiri. Quod si ne has quidem liceat aperire, & æger venæ sectionem plurimum reformidet, cucurbitulæ humeris vel collo admoueantur cum scarificatione, vel fiant ligaturæ & frictions extremarum partium, & potissimum in carpo & pedio ad diuersiones. Si dolor levis est, vt ex ira, non statim mittendus est sanguis, sed topicis remediis tentanda potius curatio, quibus si non cedat, ad reliqua confugiendum. Cum autem biliosa est hæc materia, debet potius purgari, quàm euacuari sanguinis missione. Quod si purgatio materiæ non possit semel fieri, detur minoratiuum sequens.

℞. syr. ros. lax. ʒ. j. β. aquæ endi. ʒ. iij. misce, fiat potus, detur manè. Sequentibus diebus dentur manè syru. alterantes flauam bilem, vt syr. de endiu. simpl. viol. ros. de nymphaea, oxyfacchar. de agresta, & quibus est facultas infrigidandi. Herbæ, ex quibus conficiuntur tales

tales syr. aut decoctiones, aut aquæ distillatæ, sunt, lact. *Syr. alter-*
 sonchus aspara. j. rostrum porcinum, sonchus levis. j. *rantes bi-*
 endi. Pharmacopolarum, scariola. j. endiuia. Possunt *lem.*
 addi capil. portulaca, dens leonis, plantago & omnia fri-
 gida a primo gradu vsque ad tertium. Syr. præparantes
 fiunt hoc modo ad lenitionem & alterationem.

R. syr. viol. (qui multum conuenit propter lenitio- *Syr. præ-*
 nem & alterationem) syr. endi. simpl. ana ʒ. ij. syr. de *par.*
 nymphea (vt in crassetur materia subtilis) & myrtill. an.
 ʒ. j. aq. cichor. endi. lact. & lupulorum (si sanguis ad-
 mixtus est) ana q. j. fiat. iulep. cla. & aro. cum ʒ. j. dia-
 trag. frig. Possunt misceri ad somnum conciliandum a-
 quæ port. quæ conuenit, si simplex est affectio, nympheæ
 & cucurbitæ. Syr. viol. est valde utilis, quia refrigerat,
 ventrem lenit, & ferè est narcoticus. Laudantur quæ re- *Quib. com-*
 frigerant cum astrictione aliqua, quoniam in crassant, & *fert. Syr.*
 bilis feruorem extinguunt. In obstructionibus hepatis *endi. com-*
 syr. endi. compositus, cum aquis conuenientibus magis *positum &*
 conuenit, quàm simpl. quia magis aperit. Post syr. dari *viol.*
 potest tabula. j. diatrag. frig. aut triasand. duplicato
 rhab. aut diarrhodi abb. Si scirrhus est in hepate, con-
 uenit syr. endi. compositus cum aqua graminis. Si sit
 icterus, conuenit syr. endi. compositus cum aqua grami-
 nis, vt interim pars humoris euacuetur. Sed quoniam
 syr. & elect. suprascriptorum facultas exolefcit inter- *Ap. 2.*
 dum, satius fuerit sequenti apoz. vt ad ventris lenitio-
 nem, & obtundendæ bilis acrimoniam.

R. endi. non lotæ (ne auferatur facultas detergendi,
 quæ est in superficie) cichor. scariolæ, lupuli capil. ana
 M. j. Possunt addi rostrum porcinum & flores refrige-
 rantes. Præpter pharmacopolas varianda est præscriptio,
 qui norunt ex intuitu ægroti, quid sit ei præscribendum.
 Vt verò lenitio ventris fiat, & acrimonia humoris ob-
 tundatur, pone prunorum non dulc. sebesten. ana pa.
 vj. quat. sem. frig. maiorum ana ʒ. ij. seminis endi. ʒ. j. ʒ.
 Addi possunt semina lact. port. ana ʒ. ʒ. fiat deco. sub
 cuius finem potest addi florum cord. ana p. j. in lb. j. col.
 diff. sacch. q. s. fiat apoz. addatur acetiparum, vel vini
 granatorum. ʒ. j. vel ij. Quod si non modò alterare,
 sed vacuare volueris, adde myrobal. citrinorum & in-

dorum ana 3.ij. vel ij. vel 3.ß. Quæ etiam si non abluantur, obstruendi tamen vim, quam habent ob adstrictiōnem, amittunt decoctione tamarindorum, succi ros. (vt magis purget) ana 3. j. aut syr. ros. laxat. 3. ij. Quòd si deest syr. ros. adde sacchar. q. s. fiat syrup. mediæ deco. detur alternis diebus aro. cum 3. j. triasand. duplicato rhab. Vltimæ dosi adde (si multus humor superest) diagr. gr. iiij. mastich. gra j vel rhab. 3. j. vel elect. de succo ros. vel de citro sol. 3. ij. Si nolit hanc potionem, vtatur vel bolo, vel pill. sequentibus. Porro licet hîc in-
Aceti Vir-
tim. crassantia & refrigerantia primo scopo, primæque ratione conueniant, tamen quia commodè per vrinas bilis purgatur, possunt etiam misceri aperientia. Acetum additur, quoniam bili fluxu planè aduersatur: loco eius poni potest syr. acetosus. Postea vtatur potione vel bolo sequenti.

R. cath. 3. vj. vel cass. 3. v. elect. de succo ros. 3. ij. indi maior. vel de citro sol. 3. j. cum sacch. fiat bolus. Maior quantitas medicamentorum danda est in dolore, tum quia humores sursum mouentur, vt deorsum reuelantur: tum quia sensus minus est exactus in partibus ob spirituum resolutionem, aut retractionem. Vel accipiat pill. quæ sine custodia loco minoratiui dari possunt, quæ scilicet non recipiunt coloch nec diagrid. nec turbith quales sūt pill. de hiera simpl si sine croco & myrrha parantur, assageret & sine quibus, quanuis parum diagridij acceperint. Sed quia dolor sæpius repetit, affligitq; eos præsertim. qui bilioso sunt habitu, proderit pillul. quas magistrales vocât, accipere & sunt eradicatiuæ, vt cochia, de rhab. de quinq; generib. myrobal. mastich. aureæ & similes, quæ cum custodia dantur post primum somnum: vt prima actione facta melius operentur, & facilius. Sequentes sine custodia dari possunt.

R. mass. pil. de hiera simpl. 3. j & v. rhab. 3. ij. formantur pil. cum syr. laxatiuo, vel cum aquæ epdiuæ, ne nimis laxent aut calfaciant. Verum in hiera aufertur crocus. Is enim caput ferit & dolore tentat. Odorata tamen fortiter laxantibus mixta non possunt multum nocere, quia longam moram in corpore non faciunt. Parantur pillulæ magistrales in modum sequentem.

R. rhab.

R. rhab. 3. ℥. myrobal. citrinorum indorum, belleri-
corum & emblicorum, aga. ana 3. j. cina. myrrhæ, ma-
stich. nuc. musc. spicæ, ana 3. ℥. omnia temperentur per
noctem in succo ros. aut endi. addendo aloes lotæ in aq.
endi. 3. j. formentur pill. cum syr. ros. vel succo ros. de qui-
bus cap. 3. j. vel 3. ℥. semel in heb. ante cenam. Additur
aga. quanvis affectus sit biliosus. Nam vtile est aliquid
eorum admiscere, quæ pituitam purgant, modò insigni-
ter calida non sint, vt turbit. colocintis. Adduntur &

*Aromat.
effectus.*

aromata, quia cerebrum corroborant, tum quia ob te-
nuitatem partium efficiunt, vt vis medicamenti melius
penetret. Ad eradicationem addi possunt diag. gr. iiii. ad
3. j. pill. vel fiat potio post syr. vt sequitur.

R. elect. de succo ros. diapruni sol. ana 3. j. ℥. rhab. in-
fusi in aq. endi. & fortiter expressi 3. j. syr. ros. lax. 3. j. ci-
na. & florum stechad. ana gr. vj. fiat potus syrup. cap. ven.
conuenit ad obstructions, syr. ros. ad malitiam diagrid.
& aliorum solutiones corrigendam. Bolus ad virium
robur exhibeatur.

R. conf. ros. 3. j. conf. nymphæ & anthos ana 3. ℥. pul.

tria sand. vel dia. rhod. 3. j. sacch. parum, fiat bolus: cap.
postridie superb. parum aquæ endi. Addi potest nec sine
ratione aliquatulum confer. acori, quæ quoniam astrin-
git, est utilis omnibus morbis à defluxione & catarrho.
Dari potest etiam 3. ℥. theriacæ recentis vel sex men-
sium vel vnius anni.

*Conferua
acori vii.*

T O P I C A.

Quod ad topica attinet remedia oxyrrho. caput est
perfundendum, aut admouendus succus aliquarum her-
barum infrigidantium, vt prox. cap. diximus. Fiat etiam
frontale ex pul. coriand. præp 3. j. florū viol. ros. & nym-
phæ ana p. j. seminis lact. plantag. & pap. albi ana 3. j. ℥.
vel papaueris nigri 3. j. sandal. albi 3. j. caphuræ 3. ℥. fiat
pul. & ex eo frontale interbastatum in sindone rubra.
vel

Frontale.

R. ol. viol. ros. ana 3. j. opij (sed non in pueris, mulie-
ribus & mollioribus) 3. ℥. misce & illine digito na-
res interiores. Remedium hoc in dolore acerrimo est
præstantissimum. Mitius erit si addas lactis mulieris 3. j.
vel loco eius aquæ ros. 3. j. ℥. nucis moscatæ (vt caput

Opium.

roboret & immodicam opij frigiditatem retundat) gr. vj. Opium non est corrigendum , vt alias ex castoreo, euph. myrrha. & croco , quia per se dolorem capiti adferunt, sed potius nuce moscata , vel mosco, quæ caput confirmant. Potest fieri pot. talis ad sedandum dolorem vel conciliandum somnum, vt,

℞. lact. & solani ana M. j. semperuiui, flor. ros. viol. (quæ cum sint tenuium partium, magis conducunt) & nymph. ana p. j. flor. narcissi (si reperiuntur) p. ss vel flo. labruscæ, & vitis satiuæ an. p. j. Et quia roborandum est cerebrum, etiam si dolor sit à caliditate, adde florum anthos, vel stechad. tertiam partem p. j. florum cham. mel. (qui in omnibus doloribus prosunt) ana p. j. Sed tamen potius ponuntur in declinatione, & cum iam constitit fluxio, seminis lact. coriandri, pap. ana 3. j. Proderit etiam in fine semen lauendulæ ponere ad 3. j. ss. & addendo parum aceti, nisi adsint vigilæ. Huius decoctionis vapor naribus excipiat. Possunt & prædictæ herbæ in modum cataplasmatum capiti admo-ueri, vel incoquendum est caput veruecis in prædicta decoct. vel in eiusdem capitis decocto herbæ incoquenda, ex quo decocto caput irrigandum, idque potissimum in morbi declinatione. Tum enim materia discutienda est.

℞. ol. ros. viol. myrrill. ana 3. ij. aquæ ros. viol. succi plantag. aut solani 3. j. vel farinæ hord. 3. ij. aceti parum ad penetrationem, ceræ q. s. fiat vnguen. Si propinqua est declinatio, adde ol. cham. fieri potest pul. capitalis in primo refrigerans, in fine verò resoluens.

℞. coriand præp. 3. j. seminis pap. albi & lact. ana 3. j. florum nymph. ros. viol. ana 3. ss. anthos. & stechad. an. 3. ij. granorum tinctorum 3. ss. schenant. 3. ij. si. pul. subtilissimus. Sunt qui addunt mosci & macis ana 3. ij. hæc verò calida miscentur, vt penetrent, roborentque. Hoc autem in fine fieri solet, cum magis est discutiendum. Si vigilis torqueatur, exhibeatur portio ex syr. de pap. 3. ij. aq. lact. & bugloss. ana 3. j. ss. cap. hora somni, qui non est conciliandus in principio, sed postquam sunt defatigati: quia sic maior fieret ad caput effusio.

De dolore capitis à pituita. CAP. VIII.

Cum materia pituitosa lenta est & viscosa & crassa, incisione indiget ad sui euacuationem. Rectè igitur medici pituitæ talis præparandæ gratia, incidentes sy. ordinant à principio, tum ad diuersionem, tum vt materia pituitosa in intestinis generata (ob eorum frigiditatem) euacuetur. Imprimis igitur clyst. sequens pro materiæ dissectione, incisione, alteratione & euacuatione parabitur.

CLYSTER.

R. mal. bismal. merc. ciclæ, pariet. ana M. j. florum stechad. anthos cham. meliloti an. p. j. furs. macri in panno ligati iun. j. si. decoct. ad lb. j. in col. dist. mel. ros. viol. anthos lohor de cass. ana ʒ. j. ʒ. benedictæ, vel hieræ picræ vel hieræ Archigenis ʒ. ij. succi ciclæ ʒ. j. ol. veteris ʒ. iij. salis parum, fiat clyster, & detur longè à pastu. In hoc multi adsunt meliss. berth. hyss. ana M. ʒ. anis. scenic. ana ʒ. ij. seminis rutæ ʒ. ʒ. Sed in principio videtur sufficere prædictum clystina, nisi dolor, & vitæ periculum adeo insistent, vt medicum cogant statim à principio extremis vt remedijs, vt sit in apoplexia, paralyfi, & morbo comitiali. Alij addunt in hoc clystere loco olei veteris, ol. cham. vel de lilio, vel anethi, tantundem salis gemmæ. Idem etiam addunt decoc. ag. ʒ. ij. Clystere exhibitò, statim dantur pillul. satis leues ad materiæ minorationem. Nam dolor aliquando tam vehemens est, vt sit necesse materiam, quæ euacuationi præparata est, educere, sed leui medicamento, ne cruda materia agitetur. Ideo ad hanc rem pillul. quædam leuiore præscribendæ sunt in forma sequenti.

PILLULÆ.

R. mass. de hiera simpl. ʒ. ij. ag. tro. ʒ. j. cum melle ros. vel oxymel. simpl. fiant pillul. Possunt etiam formari cū syrup. de stech. Satis tamen fuerit pillulas aquis conuenientibus formare, sic enim multò minores sunt, quàm si cum syrup. fiant. Nam cum syrupi crassiores sint aquis distillatis, sit vt pillul. fiant maiores, si formentur cum syr. quàm si formentur cum aquis distillatis. Postea accipiet die sequenti syr. qui deinceps inferius præscribetur. Porro in principio syr. non debent esse multum

Syrup.

calidi, & aperitiui. Nā materia ratione caliditatis liqua-
retur, & fusa maiorem locum occupando, dolorem face-
ret vehementiorem. Ideo à leuioribus auspicādum, qua-
lis est, qui paulò pòst describetur. Syr. item leuiiores qui-
bus vtendum à principio, sunt ij, mel ros. syr. cap. ven. de
byzantiis, acetos. simp. & compositus. Medi j sunt syr. de
hyss. de prassi de gly. de acoro, de stech. oxymel squil. o-
xymel. simp. & compositum de quinque radicib. & his si-
miles. Herbae, ex quibus componuntur syrapi, apoze. &
aquae distilla. sunt capill. hyss. beth. saluia, cala. puleg. ab-
synth. meliss. maiorana, matricaria in mulieribus, ruta,
foenic. apium, enula campana. vng. cab. & his similes. Syr.
pro principio talis sit.

*Digestiuū
debile.*

℞. mell. ros. col. ʒ. j. syrup. capill. ven. ʒ. ij. aquae maior
hyss. & meliss. an. ʒ. ij. misce, & fiat iulep. pro duabus dos.
Syr. fortior.

Medium.

℞. syr. de gly. & capil. ven. an. ʒ. ij. syr. de byzantiis ʒ. j.
aquarum foen. beth. & verbenae ana q. j. misce, fiat iulep.
Syr. fortissimus.

Forte.

℞. syr. de stech. oxymel. scil. ana ʒ. ij. β. aquarum rute,
meliss. saluiae, & maio. ana ʒ. ij. beth. tantundem, misce,
fiat iulep. aro. cum drach. j. diamosci, vel pliris cum mos-
co, vel ros. nouellae, vel diagal. vel cum modico cinamo-
mi, vel zinzib. vel cubebarum.

℞. galangae crass. drach. iij. gly. ras. rad. petro. & grami-
nis an. ʒ. ij. (Si materia valde viscida est, adde quinq; rad.
communes. Si purgare vis, adde rad. ireos recetem. Nam
antiqua tantum attenuat. beth.) verbenae sampf. meliss.

*In pitui-
ta salsa.*

hyss. pulegijana m. j. capil. ven. borrag. an. m. β. Si pituita
sit salsa, adde cichor. endi. scariol. an. m. β. vel pone quin-
que capil. tantundem, seminis anis. foenic. an. ʒ. ij. seminis
apij, petro. ana ʒ. β. florum stech. roris. samb. ana p. j. In
pituita salsa pone trium florum cord. ana p. j. fiat deco-
ctio ad tb. j. β. in qua diss. mel. ros. & anthos. ana ʒ. ij. vel
oxymel. scyll. tantundem, sacch. q. l. fiat syrup. qui detur
quinque aut sex diebus.

℞. diamosci dulcis, vel pliris cum mosco vel diam-
brae ʒ. ij. cap. tabellam pond. drach. ij. cum syrup. Si libet
prescriptum apoz. facere laxatiuum, deco. potest addere
seminis carth. ʒ. ij. (& noster quidam carthamus ad tan-

ram dosim dari potest, quia familiaris est, & non violentus. Habet autem vim aperiendi & euacuandi pituitam) fol. senæ oriental. vnc. ℥. vel senæ communis vnc. j. agar 3. ij. turbith. 3. j. zinzib. 3. j. ℥. fiat apoz. zinzib. ponitur ad correctionem turbith, quia secus euacuaret materiam subtilem, crassam relinqueret. Addimus etiam ad eius correctionem sal gemmæ. Porro astringentia nunquam miscenda sunt in materia pituitosa, quia materiam per se crassam partim magis inapiungunt, & veluti coarctant. Ideò malè faciunt, qui myrob. embl. vel chebul. addunt. Et Auic. non immeritò ab eorum usu prohibuit in febribus, quæ sunt cum obstructione. In dolore capitis à materia frigida, verbenæ siue assumpta, siue admotæ confert. Si morbus comitialis sit admixtus dolori capitis, non pones apium in apoze. Nam ex mente recentium epylepsiam moueret. Attamen Gal. in morbo comitialis cura addidit apium, & petros. cui magis credendum, quàm neoterics. Potest etiam dari syr. de pomis compositus à Mes. Euacuat enim pituitam sine noxa ventriculi: quamuis elleborum recipiat. In morbo Italico plurimum prodest. Confert & nux moscata plurimum in dolore capitis à materia frigida. Si apoz. non sit laxatiuum, potest dari clyst. vel pillul. sine custodia, quorum supra meminimus, & v. sequitur.

*Cautio.**Verbenæ.**Apium.*

℞. pill. elephang. assag. ana 3. j. fiat pill. drach. vel 4. cap. per vnâ horam ante cœnam sine custodia.

Quid in pillulis observandum.

Cæterum id de pillulis obiter adnotandum, quòdque debent euacuare ab hepate & ventriculo, modò leues sint, dari debent vna hora ante cibum: quæ verò à capite euacuant, quatuor horis post cœnam, vt simul cum alimenti vaporibus eorum vis ducatur ad caput. Concocta materia sic vacuatur.

℞. mass. pill. cochiarum, foetidarum ana 3. ij. agar. tro 3. j. fiant pillulæ, formentur aqua hyss. vel aliis aquis capill. Fortiores sunt hæ.

℞. mass. pill. de sarco. de aga. & de mastiche ana 3. j. plus vel minus pro vi tutis robore. Ideo aliquando addimus tro. alandal. gr. iij. vel ij. vel j. Quòd si æger à pillulis abhorreat, detur potio.

R. capil. ven. hyss. ana M. j. pass. par. x. iuiub. sicutum
ana p. vj. feminis apiij & petro. ana 3. j. anis. fœnic. an.
3. ss. florum anthos, ttechad. an. p. j. aga. tro. 3. j. fiat deco.
ad 3. iij. ss. in col. diss. elect. indi maior. 3. iij. elect. de ci-
tro solur. & diachart. an. 3. mell. ros. col. (ad extenua-
tionem & dulcorem) vnc. ss. fiat potio, cap. in aurora
cum custodia.

Quid obseruandum in potionibus.

In dandis potionibus aliquid dulcis in fundo vasis
esse debet, si fieri possit. Nam id quod gratum est, sta-
tim à principio deuoratur: quod autem sequitur, æquo
animo accipiunt. Agar. magis damus in infusione. Nam
in substantia vomitiones excitat, sic autem infunditur.

R. agar. tro. 3. j. vel amplius, infunde in oxymel. vel
in melle ros. Poterit fieri potus cum aquis capital. qua-
Elect. pi- les sunt aqua sal. maior. beth. meliss. & cum syr. accom-
tutam e- modato ad dulcorem. Elect. euacuantia pituitam sunt
vacuatio. diacharth. indum maius & minus, elect. de citro.

R. elect. de citro 3. ij. ss. vel diacharth. tantundem. E-
lect. dantur à 3. ij. ad 3. iij. ss.

R. elect. indi maior 3. ij. elect. de citro, diacharth. an. 3.
j. cum sacch. fiat bolus. Quoniam verò multi medica-
menta auersantur, fallenoi sunt dato iusculo, quod ta-
men vim habeat purgandi: quod fiet commodissime se-
quenti modo, quoniam pituitam euacuat, & præterea pro-
dest asthmaticis, & iis, qui nolunt medicinam accipere.

R. pass. pruno. iubab. ana num x turbith, senæ ana 3.
j. summitatum thymi 3. j. ss. salis gemmæ & zinzib. ana
3. ij. omnia ponantur in ventre galli antiqui, & capiat
ius. Adde medullæ carth. vnc. ss. Ex his fieri potest pulu.
ablatis pass. prunis, & iuiub. & postea dissolui in iusculo.
Aut detur pul. sequens laxatinus.

R. polyp. 3. ij. gly. 3. ij. agarici tro. 3. j. turbith gum-
mosi infusi in lacte & exiccati 3. ij. zinzib. salis gemmæ,
mastich. ana 3. j. cineris tartari 3. ss. cinamomi, cubeb.
ana 3. iij. summitatum thymi 3. iij. sacch. candi. parum,
fi. pulu. adde feminis viol. 3. j. (quia lenit) medullæ semi-
nis carth. 3. ij. dosis erit à 3. ij. ad 3. iij. dissoluendo in iu-
re pulli, vel vino albo, vel aquis capitalibus: postero die
detur bolus hic.

R. myrrh.

℞. myrth. electiv. vel theriacæ veterum, vel aureæ alexandrinæ 3. j. confer. anthos 3. ij. fiat bolus, cap. superbibendo parum vini albi, vel aquarum capitalium.

C O N S E R V A.

Theriaca vetus, mythridath. aurea alexand. conserva acori, anthos, stechad. enulæ valent in hoc affectu. Et quando ponitur mythridatum vel theriaca, vel aurea alexandrina, miscendæ sunt conferuæ conuenientes. Possunt & misceri pul. elect. vt diamosci dul. & amari, pliris sarcotici, pliris cum mosco, diambrex, diagal. conse. supradictis, scilicet anthos, stecha. enulæ camp. hoc modo vtatur in ingressu lecti.

℞. confer. anthos, stechad. ana 3. j. conferu. capil. 3. ℞. pul. ros. no. de gemmis an. 3. j. diag. vel diamosci 3. ℞. sacch parum, fiat conditum, vel si lubet, fiat opiata, cum syr. capill. ven. adde pal. anis. vel dauci 3. j. A pastu non debemus vti immodicè calidis, quia caussantur obstru- *Cautio* ctionem, & alimentum adhuc crudum à ventre in he- *Observa,* parvehunt.

T O P I C A O L E A.

Topica remedia sunt olea, sacellationes, sacculi, cucufæ. Olea verò sunt irinum, de lilio, anethinum, ruta-ceum, de piperibus, & quæ calefaciunt & extenuant Quibus additur aqua vitæ loco aceti, in unctionis tempore.

℞. ol. irini, anethini an. 3. ij. cham. 3. iij. nuc. mosc. garyoph. sandal. omnium an. 3. ℞. seminis rutæ, anethi an. 3. j. florum stechad. 3. ij. ceræ parum, fiat vngu. quo vng. frons. Sacellatio communiter fit ex nitro & sale torrefactis. Potest tamen fieri ex herbis in sequentem modum.

℞. samp. verbenæ, meliss. an. M. ℞. florum cham. mel. samp. stechad. saluæ an. p. j. coquantur in aceto & aqua, fiat embrocatio ad caput. Vbi materia est admodum frigida, optimum est caput irrigare aqua ardenti.

℞. florum cham. melil. samp. stech. an. 3. ℞. macis, garyoph. calami aro. anetian. 3. ij. spicæ, lauendulæ an. 3. j. fiat pulu. subtiliss. Potest addi melissa, beth. verbenæ. Ex hoc pul. fiat cucufa ad confortationem cerebri, ne amplius recipiat fumos, & ad malæ qualitatis alterationem, additis quibusdam astringentibus, vt foliis myrthi, vel haccis, vel flor. rosarum, ne tam faciliè recipiat va-

pores. Euaeuata secundum partem materia in cerebro contenta, veniendum ad particulares purgationes, vt id quod est reliquum in cerebro, expurgetur, idque per conuenientes regiones, scilicet nares & palatum. Caputpurgium igitur fiet ex abstergentibus, vt melle, sacch. & manna: aut attrahentibus, vt succo ciclae, maioranae, anagal. aut ex deco. harum herbarum, addendo vinum album pro decoctionis materia.

*Caputpur-
gi. blan-
dus.*

R. succi ciclae, maior. an. 3. iij. vini albi lb. j. sacch. rub. 3. j. vel mellis rosati vel mannae tantundem. fiat caputpurg. Fortius erit, si addatur succus cucume. agrest. vel anagallidos vel ciclaminis cum eadem vini mensura, adaucta dosi sacch. vel mell. pro eodem. Fortissimum erit, si succi puri extrahantur sic.

R. succi cucumer. agrest. succi ciclami maior. an. q. s. deputentur, & attrahat per nares. Quod si remaneat mordicatio in naribus, vel dolor, immittatur lac mulieb. intra nares, vel oleum viol. Possunt addi pul. succi his, vt pul. piperis, staphisagriae an. 3. s. nucis mos. 3. j. Vel cum succis possunt etiam fieri caputpurgia ex deco. herbarum capital. Efficacissima sunt, si in his dissoluatur 3. scammonij, & cum pauca farina simul incorporentur, vt consistentiam habeant spissiore, & adhærere possint. Vel formentur veluti suppositoria, in oblongam & pyramidis formam: cocta naribus indantur. Vel decoquantur succi in aliquo oleo, & addita cera & scammono fiat ad formam linimenti, quo inungantur partes interiores narium, vel scamnoneum melle excipiat. Masticatoria ordinantur, cum non sit periculum de catarrho ad pectus. Nam quibus ad thoracem fluxio fiat, magis conuenit caputpurgium, & gargarismata iis utiliora sunt, qui laborant fluxione. Nam caputpurgia materiam fluentem ad pectus, trahunt ad nares, sicut garga. ab oculis diuertunt. Inter masticatoria verò quaedam sunt simplicia, quaedam composita, & simplicia quidem, vt radix pyretri, mastiche, zinziber, composita verò, vt

*Quibus
conferunt
caput-
purg. &
gargaris.*

R. mastich. staphisagriae, pyretri an. 3. ij. nuc. mos. 3. j. si. pul. qui inuoluatur in panno lineo raro, & fiat masticatio manè semper spuendo. Potest & hic puluis

nis excipi cera alba, vel ficubus, & eodem modo vti. Garga. fiunt ex decoct. herbarum capitalium dissoluen- do mel vel oxymel, vel partem aliquam elect. sol. hoc modo.

℞. hyss. beth. melyss. ana M. β . sinapi drach. ij. si. deco. in lb j. deco. dissol. mell. ros. & oxymel. squill. ana \mathfrak{z} . ij. fiat garg. tepide manè longè à pastu. Fortius erit se- quens.

℞. gly. ras. rad. ireos, pyret. ana drach. iij. hyss. orig. an. M. β . seminis rutæ, sinapi ana drach. ij. florum stechad. & chrysantemi. si reperiat, ana p. β . fiat decoct. in col. diss. elect. indi drach. ij. oxymel. squill. \mathfrak{z} . ij. fiat garg. Fortissi- mum erit si succum cucum agrest. addideris, & dosim elect. auxeris. Hic non miscebis pulu. hieræ aut benedi- ctæ, vt nonnulli faciunt. Nam cum his plurimum ama- roris, ægri non æquo animo ferunt, cum amara pluri- mum ori sint ingrata. Possunt fieri sacculi ad caput, *sacculi.* cum milio & sale, in sartagine torrefactis. Item olea calida applicari possunt capiti, vt rutæ de lilio (quod maxime laudat Gordonius) oleum de eupho. quod po- tentissimum est. Possunt & fieri cucufæ odoriferæ hoc modo.

℞. bethonicæ, sampsoci, melissæ, an. \mathfrak{z} . j. coriand. præ parati \mathfrak{z} . β . florum meliloti, chamomillæ, florum anchos & stechados an. p. j. rosarum rubrarum p. β . asandali ci- trini \mathfrak{z} . β . styracis calamintæ, beniouim an. drach. ij. pul- uerisentur puluerifanda, & cum syndone rubro interba- stentur, & fiat cucufa. Fiet etiam & suffumigium tale. *Cucufa.*

℞. suffumig. communis lb. j. fumigentur operimenta capitis. Possunt etiam instillari aliquot guttæ oleorum calidorum intra aures cum bombace. Possunt etiam æ- grotantes vti elect. necessariis, qualia sunt diamoscus dulcis & amarus, diambra, pliris cum mosco, pliris far- coticum, cum aquis capitalibus distillatis, vt supra di- ctum est. Quod superest de curatione huius affectus, disce à practicis, qui prolixiorē curam docent. *Suffumi- gium.*

De dolore capitis à melancholia. CAP. IX.

Etsi rarò dolor capitis fit à melancholia pura, fit tamen à melancholia pituitæ permixta, vt in iis, qui passi sunt morbum Italicum. Si dolor fiat à pura

Causſa.

melancholia, medicamenta alterantia debent eſſe calida & humida (niſi melancholia fit à bile flaua aduſta) non admodum tamen, ſed mediocriter, vt borrago, bu-
gloſſa. Quemadmodum autem Pleuritis à melancholia raro fit, ſic nec dolor capitis. Si enim ſola dolorem fecerit, certè, qui melancholia laborant, frequenter dolore capitis vexarentur, qui tamen dolorem nullum habent, niſi illum non ſentiant, quòd mens occupata ſit. Adde quòd ſiccitas dolorem non facit, neque materia craſſa, niſi vel bilis permisceatur, vel ſpiritus, qui diſtendendo partes dolorem faciunt. Quod ſecus euenit in pituita, quia frigida eſt & humida, vnde ſpiritus multus oritur, qui diſtendendo inducit dolorem, idque potiſſimum noctu, vt in morbo Italico. Si igitur fiat à melancholia aduſta, ob bilis naturam, quam retinet, dolorem facit. Ob idque humidis & frigidis alteranda eſt, & medicamentis cholagogis euacuanda & quibusdam tenuioribus præparatis ad dolorem à bile procreatum: qualia ſunt, Diaphenicum, conſectio hamech, Syrupus de fumo terræ compoſitus, & Syrupus de pomis laxatiuus, vel Syrupus roſatus laxatiuus cum decocto mercurialis, ſenæ & foliorum borraginis, quæ

*Borraginis
ſis.*

humores aduſſatos euacuare poſſunt. Topicis autem remediis non differunt, niſi quòd, quæ aſtringendo repellunt, minus conueniunt: illa autem, quæ refrigerant & humectant, ex uſu ſunt in principio, ſicuti quæ calfaciunt modicè & digerunt, in declinatione. Inter remediorum formas in hoc affectu magis conueniunt embrocatio & irrigatio capitis frequens. Deprehenditur autem à melancholia dolor fieri, ſi priùs ægri, quàm dolerent, non dormiebant, & inter dormiendum ſomniis multis vexabantur, partesque omnes illis circa caput calidiores & ſicciores apparent. Ad hæc ſentiunt veluti puncturas circa oculos, per quos medici crediderunt melancholiam expurgari, vt bilem per aures, & pituitam per palatum ac nares. Quòd ſi in corpore melancholico poſt morbum à melancholia, vel in morbo melancholico fiat dolor, qui medicamentis diſcutientibus, facilè non cedat, veriſimile eſt ab eodem humore fieri.

Signa.

CVRATIO.

Huic dolori præscribenda sunt calida & humida, vt attenuetur humor ad faciliorem euacuationem & dis-
 cutionem, ne si diu perseueret, morbum faciat, siccio-
 rem cerebri temperaturam reddat, & spiritus minuat.
 Sed quando horum copia non est, ideo commiscenda
 sunt medicamenta mediocria diuersi generis, vt tan-
 dem ad quandam mediocritatem calidi, & humidi ve-
 niamus, vt stech. cum viola aut nenuph. miscetur, vt
 fiat calidum & humidum medicamentum, sicut lact.
 cum beth. Imprimis igitur fit clyster ad educendam
 materiam communem existentem in intestinis, ad alte-
 rationem & diuersionem.

R. radie. alth. & liliorum ana ʒ. ij. mal. branch. vrsi-
 næ, buglos. borrag. parietar. mercur. an. M. j. pass. mund.
 sic. prunorum ana p. a. x. seminis anisi, foen. seminum fri- *Clyster.*
 gid. maior. ana ʒ. iij. flor. cham. meli. viol. ana p. j. fiat
 decoctio in decocto capitis veruecis, in lb. j. col. diss.
 cass. & mell. viol. an. ʒ. j. succi mercu. & sacch. rub. ana
 ʒ. j. ol. chamo. liliorum vel viol. ana ʒ. j. ʒ. fiat clyster,
 quem capiat longè à pastu. Potest addi ad maiore dis-
 cutionem, & reuulsionem à capite diaph. vel indi maio-
 ris ʒ. iij. Hic clyster à principio debet accipi. Sufficit
 autem lb. j. vt melius & diutius ab intestinis retineatur.
 Quodd si daretur in maiori copia, intestina pressa &
 grauata onere, statim excernerent. Debet autem repeti
 tertio aut quarto quoque die, ad minus semel in hebde-
 mada. Minoratio etiam vimur ad partem materiæ e-
 uacuandam, non præmissis syr. sic.

Minoratio.

R. cath. ʒ. vj. diaph. ʒ. ij. cum sacch. fiat bolus, vel sic.
 R. aquæ capil. ven. & buglos. an. ʒ. j. cath. ʒ. ʒ. diaph. ʒ.
 iij. syr. viol. ʒ. j. fiat potus, vel decoctio ex florib. cor-
 dial. & epithy. in qua dissol. prædi. elect.

Concoquentes syr.

Minorata siue imminuta materia debet concoqui.
 Huic rei conueniunt syr. de scolopend. borrag. buglos.
 de epithymo, de pomis, de radicibus simpl. de caparib.
 viol. qui debet misceri aliis ad humectandam melan-
 choliam, quæ magis siccitate lædit, quàm frigiditate.

Canon.

Sit igitur canon vniuersalis, vt semper humida misceantur cum calidis. Inter omnes syr. primas tenet partes syr. de pomis compositus, descriptus à Mes. cap. de soda frig. à melancholia, qui non solum concoquit, sed & educit humorem melancholicum & pituitosum, idque sine noxa ventriculi & aliarum partium, eo tamen vti debemus in progressu morbi, & non in principio, sed præcedente totius corporis vniuersali purgatione, quæ repeti sæpius debet in morbis à materia crassa, frigida, incocta & viscida. Nam vnica euacuatione tota educi non potest. Id videmus in quartana, aqua intercute, morbo comitiali, mania, passione melancholica, dolore cap. diuturno, & dolore iuncturarum à morbo Italico. Porro syr. de pomis compositis Mes. sic habet.

Syr. de pomis compositis.

℞. capil. ven. ceterach. bugloss. borrag. ana M. j. florum borrag. bugloss. fuma. summitatum thymi ana p. ij. foliorum senæ orient. cham. stechad ana ʒ. j. chamed. schenanthi, ellebori albi (niger enim nobis est incognitus) florum, amaranthi, sesamoidis ana ʒ. iiij. succi agrim. fumi. ana ʒ. iiij. succi pomorum dulc. lb. j. passi munda. polypod. querc. an. ʒ. ij. croci ʒ. j. fiat decoct in aqua & aceto q. s. in qua diss. sacch. q. s. fiat syru. perfectæ decoctionis, seruetur vsui. Dosis erit ab ʒ. j. ad ʒ. iiij. Hic syr. plurimum prodest in morbo comitiali, melancholia, morbo Italico, & omnibus affectibus à melancholia & pituita, præsertim salsa. Loco amaranthi poni possunt flores nenupharis ad acrimoniam & malitiam veratri castigandam. Eligantur poma admodum dulcia & odorata, vt sunt poma (Ioannis) vulgò dicta. Potiora enim sunt, quæ carnem minus solidam habent, & dulciora & gustui suauiora. Quæ autem sunt duriore carne, reici debent, vt curtipendula vulgò dicta. Herbarum ex quibus sunt syrup. & aquæ, sunt bugloss. borrag. capil. ven. ceterach, scolopendria vulgò dicta, siue lingua ceruina, thymus, epith. melissa, portulaca, absynth. cappar. fumus terræ, cortex tamarisci, fraxini, ebuli & omnes aliæ herbarum leni seruientes, vt vitex siue agnus castus.

℞. syr. de bugloss. & de borrag. ana ʒ. iiij. capil. ven. de stecha-

stechade (vt ducatur vis medicamenti ad caput , nam
secus iret recta ad lienem) ana ʒ. ij. aquarum meliss. bu-
gloss. & port. ana q. j. aro. cum pul. de gemmis , lætitia
Gal. diatrag frig. vel calidi.

R. lætitia Gal. tab. j. pond ʒ. ij. ʒ. capiat post syrupum.

Syr. magistralis.

R. capill. ven. borrag. meliss. port. bugloss. ana M. j.
pass. mundat. p. x. seminis melonum , anis. port. endivię
ana ʒ. j. seminis ocymi ʒ. iiij. florum anthos , bugloss.
viol. stech borrag. ana p. j. florum cham. p. ʒ. summit.
thymi (quia clarificat sanguinem) foliorum senæ ana ʒ. *Thymus*
vj. polypodij ʒ. ʒ. Si vis magis laxativum , pone plus *quid.*

laxativorum : fiat decoctio in aqua , & non in vino , vt
multi faciunt. In ʒ. ij. col. diss. sacch. q. ʒ. fiat syru. medię
coctionis. clā. & aro. cum ʒ. j. lætitia Gal. & ʒ. ij. cina-
mo. Adde inter clarificandum & non in concoctione
vini aro. ʒ. ʒ. fiat syr. ad formam hippocratis. Vtatur in
v. aut 6. matutinis , accipiendo post quamlibet dosim ta-
bulam j. diamarg. frig. Huic apoz. possunt addi v. radi-
ces , fumaria , & id genus. Proderit ægotantem accipe-
re clysterem mollem , ante syru. & eundem repetere se-
mel ad minus in hebdomada. Nam cum melancholia
sit sicca , etiam vt plurimum alius dura est in hoc af-
fectu. Finitis syr. debet purgari materia bolo , vel po-
tius medicamentis humidis & liquidis. Quare raro aut
nunquam vtendum pillulis in his affectibus siccis , quia
pillulæ omnes calidæ , & siccæ sunt , & ideo corpus ma-
gis alterant. Conveniunt tamen & melancholicis pil-
lulæ de quinque generibus myrobal. foetidæ , indæ , de
fumo. Sunt autem periculosæ pillulæ de lapide lazuli ,
& mezereo , ob diuersam quandam qualitatem , cuius
sunt participes. ideo est consultius ab usu earum absti-
nere , & medicamentis vt forma humidis , & mollibus ,
vt sunt potiones.

R. lyq. ras. polyp quer. rad. bugloss. ana ʒ. j. pass. pru-
norum ana p. x. quatuor sem. frigid. (ad humectandum)
ana ʒ. ij. semi. cuscutæ , non portulacæ (quia astringit)
ʒ. iiij. vel plus , quia debile est , anis. fœ. apij ana ʒ. ʒ.
florum viol. bugloss. borrag. cham. stechad. anthos ana
p. ʒ. florum tamarisci , senæ , summitatum thymi vel epi-

*Syr. melā-
choliām
preparans
& conco-
quens.*

*Flos geni-
sta vom-
tum prouo-
cat.*

thymi an. ʒ. ʒ. fiat decoctio. In col. ʒ. iij. diff. diaph. & confect. hamech. an. ʒ. j. syr. viol. vel de pomis compo-
siti ʒ. ij. fiat potus, cap. in aurora cum debita custodia.
Potest addi rhab. infusum, maximè si sit melancholia
ex adustione bilis. In decoctione poni potest etiam flos
genistæ, modò æger non sit pronus ad vomitum. Nam
instar ellebori vomere facit. Folliculi senæ orientalis,
non nostri debent poni, quia nostra nullius ferè est mo-
menti. Loco epithymi ponuntur summitates thymi.
Nam epithy. actio omnino est imbecilla Chamo. mul-
tùm prodest in affectibus capitis à pituita & melanco-
lia: nec miretur aliquis eam poni in decoctione potio-
nis, præter vsum communem. Si non adsit obstructio,
decoctioni misceri poterunt ad ʒ. ij. myrobalani indi &
chebuli confricati oleo amygdalarum dulcium, vt eo-
rum austeritas minuatur. In hac decoctione ponuntur
femina diuretica, quanuis cum splene nullum habeant
consensum, neque vias vllas communes cum renibus,
quò sit vt humor melancholicus per vrinas euacuari
non possit. Diureticorum tamen vsus maximè confert,
quòd humoris melancholici crassitiem incidant & at-
tenuent, teste Galeno primo ad Glauc. Animaduerten-
dum tamen omnia cientia vrinas ducendo materiam
ad venas, aluum sistere. Ob id in pauca quantitate poni
debent in medicamentis laxantibus. Passulæ mundatæ
nunquam omitti debent in melancholico affectu, quia
earum caro relaxat. Hæc debent dari diuitibus, & non
pauperibus quibus dabuntur syr. communes in offic. pa-
rati & medicina sequens.

℞. elect. diacarth. tabulati. pond. ʒ. iij. vel confect.
hamech, vel elect. de citro tantundem, capiat per se, vel
dissoluatur cum decoctione aliqua humori melancholi-
co purgando propria. Diacarth. perinde euacuat melan-
choliam atque pituitam, quanuis multi longè aliter sen-
tiant vel fiat sic.

℞. diaph. confect. hamech. ana ʒ. xv. cass. recenter
ext. cath. ana ʒ. iij. fiat bolus cum sacch. Diaph. purgat
materias adustas, ita etiam confectio hamech. cath. dia-
sene vtraque. Sequenti die accipiat bolum hunc.

℞. conf. flor. borrag. conf. rad. bugloss. ana ʒ. j. conf.
stech.

stech. vel anthos \mathfrak{z} . \mathfrak{z} . pul. diamarg. frig. & lætitiæ Gal. *Secretum*
 ana \mathfrak{z} . scrup. j. sacch parum, fiat bolus. Bibat vinum di- *ad hilaritatem.*
 lutum cum aqua elenij, vel buglossi. Elenium miram ha-
 bet proprietatem ad hilaritatem & gaudium excitan-
 dum: quod multi pro secreto habent, ideo conserua il-
 lius, quæ est paululum amara, & aqua distillata pluri-
 mum valent. Theriaca mediæ ætatis, est commune re- *Theriaca*
 medium, nec humori certo, aut affectui, aut parti deter-
 minata, interim tamen propria sit, si administretur cum
 aliqua medicina certa, & destinata cuidam affectui. Vt
 in hoc affectu post purgationem humoris melancholici
 exhibetur ad cõfortationem cum aqua bethonica,
 melicæ vel sampfuci, vt deducatur vis eius ad caput.

TOPICA.

Topica remedia sunt caput purg. masticato. sternu-
 tatoria, & quæ omnia descripta sunt prius in dolore ca-
 pit. à pituita, quibus tutò vti possumus. Optima caput
 purg. fiunt ex succo sampf. expurgato & eius decoctio-
 ne. Laudantur inunctiones calfac. & humectantes, vt,
 \mathfrak{R} . ol. liliorum & chamo. ana \mathfrak{z} . ij. ol. viol. vel cucurb.
 (ad humectationem) vel de semine lact. \mathfrak{z} . j. ceræ pa-
 rum, fiat vnguentum. Hoc fortius est ad calfaciendum
 & resoluendum.

\mathfrak{R} . ol. anethi & de semine lact. ana \mathfrak{z} . ij. ol. rutac. vel
 cucum. agref. \mathfrak{z} . j. ping. porci \mathfrak{z} . ij. pul. ciclæ, sampf. &
 meliss ana \mathfrak{z} . iij. seminis apij, lauendulæ ana \mathfrak{z} . j. ceræ pa-
 rum, fiat vnguentum, quo vratur. Si addas pinguedinis
 gallinæ & anatis ana \mathfrak{z} . ij. magis sedabitur dolor. Sunt
 enim tenuium partium, & faciunt, vt altius penetret
 vis vnguenti. Itaque cerebrum magis humectabitur &
 calefiet. Ante vnctionem abluatur caput ad poros ape-
 riendos, vt sic vnguenti vis melius penetret. Capitis
 verò fomentatio fiet decocto sequenti, vel irorando
 caput cum spongia madefacta, vel applicando.

\mathfrak{R} . Meliss. beth. sampf. buglossi. borrag. stech. ana M.
 j. flor. cham. mel. sampf. ana p. j. ros. rub. viol. nymph ana
 p. β . foliorum senæ \mathfrak{z} . iij. seminis aneth. \mathfrak{z} . ij. si. dec. in
 decocto cap. veruecis. Cum spongia caput lauetur aut
 irroretur ter aut quater in hebd. modò nō sit catarrhus.
 Flos & herba anethi, si reperiatur, huic decoctioni po-

rerit adiici, nec vtendum seminibus, quia calidiora sunt. Sacculi vel suffitus minus conueniunt, quam vel lotiones, vel vnctiones, quia nimis desiccant. Poterit tamen fieri suffitus, hoc modo, si catarrhus adsit.

℞. ros. rub. viol. nymphaeana p. ℞. feminis lact & o. cymi ana 3. ij. sand. ompium ana 3. j. aliptæ moscatae 3. ℞. fiat suffitus. Hoc suffumigium erit ex vsu, si dolor fiat à fœtore. Melius erit si per nares accipiat suffumigium decoctionis prædictorum florum & seminum, vt fecimus cap. de cephalalgia è sanguine.

De dolore capitis per consensum aliarum partium.

CAPVT X.

Dolor capitis non raro fit aliarum partium cum cerebro consentientium consensu, & conspiratione, inde triplex curandi indicatio nascitur, quarum prima sumitur à membro primariè affecto, secunda à cerebro, tertia ab utroque. Verbi gratia, si fiat dolor per consensum ventriculi, primò ventriculum curari oportet, nempe si materia sit in ore ventriculi apta ad expulsionem; vomitum excitare oportet, modò colli longitudo, pectoris angustia, aut thoracis affectiones, similiter vsus, & consuetudo, id non impediant. Nam à vomitu cauendum in phthificis, asthmaticis, & cæteris id genus. Hæc omnia si non contradicant, vomitus eiendus cum aqua tepida, quæ ventriculum lauando excitat vomitum. Quòd si fortius vomitorium quæras, fac sequens.

*Vomito-
rium.*

℞. raph. 3. ij. fiat leuis decoctio: adde bliti 3. ij. in q. j. col. diss. syr. acetos. simpl. 3. ij. vel oxymel. tantundem, vel syr. violati, capiat tepidè corpus mouendo, & non quiescendo, aut fricet regionem ventriculi in orbem. Cauendum tamen est à vomitoriis fortioribus, vt sit à nuce vomica, & semine behen, & veratro albo, quæ ventrem maximè lædunt. ob violentum vomitum. Qui oculorum affectibus laborant, caueant à forti vomitorio quod ad oculos ob motum vapores dirigit. Sic etiam à caputpurgiis abstineant, ne humores attrahant versus oculos. Affectiones oculorum dico ophthalmiam, suffusionem, hebetudinem. Syr. viol. prouocat vomitum relaxando ventriculum. Hinc deprehendi-

tur multorum error, qui medicinis purgantibus admi- *Error in*
 fcent syr. viol cuius loco satius est capere syr. capill. ven. *syr. vio.*
 Loco decoctionis raph. & anethi potest capi aqua raph. *late.*
 distillata. Miscemus cum syr. acetos. simpl. oxymel, &
 debet corpus moueri. Potest dari clyster, tum ad euacua *Clyster.*
 tionem materiæ, tum ad diuersionem, vt supra est ordi-
 natum. His peractis possunt dari pillulæ leues duabus *Pill.*
 aut tribus horis ante cœnam, ad diminutionem mate-
 riæ. Nec est timendum ab iis, etiam si non præcesserint
 syr. cum sint leues. Sunt autem pill. tales.

R. pill. de hiera simplici præparatarum absque cro-
 co & myrrha, vel de arom. 3. si. pillulæ vij. cum aqua
 absynthij, capiat duas horis duabus ante cœnam. Die
 sequenti capiat clysterem mollem, vt melius pillulæ e-
 uacuent. Nec refert, detur ante pillulas vel post. Loco
 clysteris potest dari glans ex melle & sale communi, vel
 succo betæ. Melius est tamen dare clysteres. Deinceps
 ad materiæ præparationem fiat syrupus.

Vbi distinxeris à qua materia fiat affectus, nempe an
 à pituita, an à melancholia, an à bile, an ventriculi cru-
 ditate. Nam si fiat à bile coaceruata in ventriculo, po-
 test dari syr. de absynthio, myrtill. cum aliis syrupis, bi-
 lem præparantibus. Nam absynth. euacuat subtiles hu-
 mores existentes in orificio ventriculi, Galeno 7. me-
 thodi. In aliis tamen, in quibus hepar, vel renes, calidi-
 tate laborant, miscendi sunt syr. frigidi hoc modo.

R. syr. endiuix 3. ij. syr. de absynth. 3. j. aquarum ab-
 synthij vel mentæ 3. ij. cichor endiuix ana 3. iij. misce. *Syr. absyn.*
 fiat syr. pro tribus dosibus. Non est quod aliquis calu-
 mnietur hîc poni syr. de absynthio, qui calidus est. Nam
 id fit quia absynth. bilem euacuat, & abstergit, Galen.
 7. meth. itaque melius est ponere aquâ absynthij, quàm
 mentæ.

R. elect. diarrh. abb. tab. iij. cap. tab. j. post syr. Pur-
 getur pillulis euacuantibus à capite, quæ tamen ven-
 triculo non noceant, vt sunt pillulæ cochix, foetidæ, au-
 reæ, quæ sua violentia possunt lædere ventriculum.
 Quare melius est pillulas debiliores dare, & iis fit me-
 lior operatio, quàm plus æquo violentibus. Talibus igi-
 tur vtatur.

℞. pill. de mastiche, de hiera simpl. ana scrup. j. rhab. scrup. ij. cum syr. ros. fiant pillulæ. Conueniunt pillulæ factæ de rhab. & myrob. & sine quibus, etsi paruam dosim scammonij admittant.

℞. omnium myroba. ℥. ij. rhab. 3. β. arg. tro. scrup. j. cinamomi, spicæ. schenanti ana ℥. j. aloes lotæ cum aqua endiuiz & absynth. ana 3. ij. syr. ros. q. s. fiat massa, de qua cape quarto quoque die, tribus horis ante pastum, & ex iis formando tres aut quatuor cum aqua endiuiz. Si eger sit biliosus, & plus æquo calidus, possimus admittere tamarindorum 3. j. β. Ne admisceas crocum, quia intus assumptum caput replet vaporibus, ideoque dolorem auget. Exterius potest applicari, vt in vnguento. In his pillulis ad paruam quantitatem admiscentur aromata, quia materia peccans non tam crassa, aut viscida est, vt egeat, aut extenuatione, aut incisione maxima. Adde quod non sunt multum aduersæ ventriculo, & ideo corroborantibus non egent. Purgatione facta vngendus est ventric. vng. sequenti.

*Croci in-
commo-
dum.*

℞. ol. ros. vel myrthini 3. iij. ros. rub. florum chamom. spicæ, sche. florum labruscæ ana 3. ij. sandall. omnium, coral. rub. ana 3. j. ceræ parum, fiat vnguentum, quo vngatur ventriculus.

TOPICA.

Topica remedia prius descripta adhibenda sunt capiti, & quidem si fiat dolor à bile, ea, quæ sunt descripta proprio cap. Si pituita similiter, & sic in reliquis differentiis. Adhibeantur statim à principio astringentia capiti, vt robore adhibito minùs recipiat humores fluentes, vel fumos elatos sursum, ad quam intentionem præscribi potest pul. ordinatus in dolore cap. à materia calida, cap. 6. Quod si dolor cap. fiat per consensum matricis, id erit vel ob menses recentes, vel minùs fluentes. Si fuerint suppressi, prouocentur eo tempore quo communiter solent fluere, vt docebimus cap. proprio. Si plus æquo fluant, supprimantur, vt etiam cap. proprio docebitur. Neque tamen interea negligatur caput quin huic medicamenta topica adhibeantur statim à principio, & quæ vim habent repellendi, & roborandi cerebrum, ne ad se fluentem materiam recipiat. Deinde appli-

applicabuntur ea medicamenta, quæ vim habent discutiendi & euacuandi materiam contentam in cerebro, qualia sunt quæ descripta sunt cap. de dolore capitis à pituita. Dolor ab immoderato fluxu mensium arguit frigiditatem summam, & siccitatem, ob sanguinis profusionem, quæ nisi subito compescatur, periculum est de hydropse. Suppressio fluore offerenda sunt alimenta, quæ citò nutrant, deinde caput est roborandum, & humectandum, vt diximus in dolore capitis à melancholia. Quoniam enim plus æquo exiccatum est cerebrum, ideo humectatione indiget. Si verò dolor capitis fiat per consensum alicuius partis, in qua pituita vitium gignit, his vtendum, quæ descripta sunt in capite de cephalalgia à pituita, hoc tamen obseruato, vt diligentiam adhibeamus in curatione partis primariò affectæ, non negligendo partem quæ per consensum laborat. Exempli gratia, si dolor capitis fiat per consensum ventriculi, purganda erit pituita, aut vomitu, aut pharmaco solvente, aut clystere. Quòd si præparatione indigeat, fiat cum sequentibus.

*Dolor ab immodico fluxu mē-
sium.*

℞. syr. de steehade, mel. ros. col. an. ʒ. j. aquarum scænic. beth. hyss. & menthæ q. s. fiat iulep. Addi potest aqua absynthij, sed non syr. propter illius nimiam astringentiam. Astringentia enim omnia materiam inculcant. Ob id à Galeno vituperantur. At aqua distillata astringentiam amittit sublimatione: quare addi potest his, quæ incidunt & attenuant quadam leui corroboratione viscerum. Quòd si timeas de caliditate hepatis aut renum, vt sit in bilioso & temporibus calidis, & regione calida, si humor putrescat, vel adsit febris, aquam endiuicæ, & capillorum addemus, & loco prædictorum syr. miscebimus medios syr. ad frigidum tendentes sic:

Syrup. absynthij eius facu. contraria.

℞. syr. de bizant & capill. ven. an. ʒ. iiij. aquarum endiuicæ, absynthij, graminis, asparagi ana ʒ. iiij. misce pro drach. dosi. hoc poterit conuenire in febribus pituitosis. Post syr. accipiet tab. sequentes:

℞. elect. diarrh. abb. tab. iiij. cap. j. post quemlibet syr. ventriculus vngi poterit vnguento stomachico Galen. vel superscripto. Topica remedia, quæ antè præscripta sunt in dolore à pituita, huc referenda sunt. Si

fuerit per consensum splenis, quæ dicta sunt in dolore à melancholia.

De cephalæa & hemicranea. CAP. XI.

Cephalæa & Hemicranea non requirunt alia medicamenta, quàm quæ prius sunt descripta, eadem tamen fortiora exposcūt. Nam cum in his dolores antiqui sint, leuia spernunt remedia, fortioribus non facile cedentes. Fiunt autem à bile, melancholia, & à pituita, aut per consensum aliarum partium. Ergo humor peccans concoquendus est, & postea euacuandus, & intemperies relicta contrario pharmaco corrigenda est. Humor peccans debet præparari secundum suam materiam modo prius descripto in superiori capite. Et quia in his affectibus cerebrum est imbecillum, ideo diligentiori cura est roborandum, & confortandum pul. capitalibus, cuculis extrà applicatis, tum etiã intus assumptis. Et tutius quidem si vtatur conseruis, pul. aquis & syr. ad id aptis: quales sunt conseruæ anthos, stechad. florum saluæ, & acori communis. Pul. quibus vti possumus, sunt diamoscum, diambra, pliris cum mosco, ros. nouella, arom. ros. & similes. Cōfectiones verò, theriaca, mithridatum, aurea alexandrina, & in mulieribus triphera persica sine opio. Ex conseruis item & pul. possunt fieri opiatæ. Topica remedia fortissima esse debent. Curatu enim difficiles sunt hi affectus, & contumaces.

T O P I C A.

℞. rad. cucum. agrest. ʒ. ij. coquatur in ol. antiquissimo, & postea contundatur, & reducatur ad formam vnguenti, vngatur anterior pars capitis prius rasa. Lauari caput aqua vitæ laudatur, quia maximè discutit. Fit præstantissimum vnguentum ex oleo rutaceo & laurino, addendo parum ceræ & vitrioli romani vsti (vt facilius penetret) & croci an. ʒ. . Id in doloribus cap. diuturnis ab humoribus frigidis prodest plurimum. Si nihil aut parum hæc topica proficiant, fiat sinapismus adeò fortis, vt cutis exulceratio sequatur, sed post exulcerationem statim remoueatur, ne nimis carnem vlceret. Nam sufficet cutim exulcerare & vesicas excitare, vt humor ad partes externas trahatur. His peractis vul-

tus erit abstergendum, & crusta siue scara auferenda cum butyro sine sale, fricanda, vt decidat. Vlcus verò siue vulnus mundificatur cum basilicone, vel macedonico, quæ solo thure differunt. Basilicum enim (quod & tetrapharmacum à Gal. vocatur) thus non recipit. Mundatum vlcus datur ad cicatricem, cum panygiro, quod fit ex cerusa, axungia porci, lytharg. &c. & aliis medicamentis exiccantibus. Diu tamen vulnus apertum remaneat, vt materia temporis interuallo, & sensim vacuetur. Sunt qui faciunt vesicatoria in occipitio: sed id ad reuulsionem fieri debet, si pars anterior sit affecta. Interim tamen conuenientissimum erit sinicipiti cauteria admouere ad euacuationem. Nam ibi sunt suturæ, per quas materia potest euacuari, adhibitis eiusmodi cauteriis, quæ materiam à profundo ad circumferentiam educant. Huiusmodi medicamenta metasyncritica dicuntur. Sit igitur tale vesicatorium.

R. canth. drach. j. sem. rutæ agrestis drach. j. s. fermenti acerrimi drach. ij. sinapi vnc. s. sicuum vnc. ij. misce, ponatur super caput, & id remoueatur cute exulcerata. Possumus vti capitello descriptionis de Vigo. Nam *Secretum* aperit cutim sine magno dolore, & est magnum secrete *chirurg.* tum chirurgorum, & ceri è laudabile est dolorem, quoad fieri potest, euitare. Porro capitellum fit ex auripigmento, sandaraca, arsenico, & pauco opio.

De dolore capitis à morbo Italico. CAP. XII.

Dolor capitis, qui hodie maximè grassatur, fitque plurimum à morbo Italico, infestat maxima ex parte noctu, circa partem anteriorem capitis, vel circa tempora, aliquando exterius, aliquando interiùs. Cum est exterius, faciliè deprehenditur. Nam sæpè tumores præter naturam excitat. Aliquando verò alopecia dolorem sequitur: itaque decidunt pili capitis, barbæ, superciliorumque, vt in elephantiasi. Dolorem internum comitantur dolores articulorum. Porro hic morbus cephalæa nempe, aliquando est incipiens, aliquando recidiuus. Cum est incipiens, oportet à principio ordiri curam morbi Italici descriptam à practicis, postea ad dolorem capitis, qui eius morbi recidiuam sequitur, veniendum, ad cuius curationem primum dari debent

clysteres ad materiæ diuersionem descripti prius de dolore capitis à pituita, deinde si iuuenis fuerit abundans sanguine, & omnia consentiant, fiat sanguinis missio. Quòd si dolor sit internus, dandæ sunt pillulæ vel minoratiua descripta suprâ de dolore capitis à pituita vel melancholia. Concoquenda tamen & purganda erit materia syrupo sequenti, idque bis in anno, Vere scilicet & Autumno.

Syrup.

R. rad. enulæ, polypod. ebuli, galang. an. vnc. ij. beth. melissæ, chamæpith. nepetæ an. M. j. Quòd si sit sanguineus, adde summitatum lupuli, asparag. an. M. j. fumi. scabiosæ, verbenæ, an. M. j. rad. pentaphili, rad. lathyronis, hermodactyl. an. vnc. j. ras ligni indi tb. j. pass. mundat. vnc. ij. foliorum senæ vnc. ij. turbith. vnc. ss. zinzib. drach. ij. fiat coctio. In colla. dissolue mel ros. col. q. s. f. syr. medæ decoctionis clarificatus & aromatizatus cum drach. ij. omnium sandal. vtatur in sex matutinis. Si lubet, potest addi syr. de pomis redolentibus ad vnc. vj. Accipiat quinque horis ante pastum. Purgetur pillulis cochiis, de sarcocolla, vel de fumo, vel aureis, vel fetidis, vel omnibus simul. Dosis erit drach. j. vel ÷ iij. ex quibus sex for. cum aqua fumiterræ, vel beth. vel primulæ veris. Si lubet potionem facere, ita parabitur.

Potio.

R. elect. ind maioris, & de citro sol. an. drach. iij. diss. in vltima dosi apoz. vel in aqua melissæ, beth. & arth. cap. in aurora cum custodia. In crastinum detur bolus sequens.

Bolus.

R. ther. veteris drach. j. cum sacc. fiat bolus. Ratio videtur sit exiccās extenuāsq̃ue. Vtatur fumigio sequenti.

Fumig.

R. coriandri præparati vnc. j. gum. hederæ torrefacti, nigellæ rom. infusæ in aceto vnc. ij. florum chamo. fchenant. ana vnc. j. myrrhæ, thuris, beniouin ana drac. ij. sandaracæ j. auripig. rub. drach. j. concassentur leuiter, fiat suffumigium supra carbones ardentes, capiat fumum per nares sero & manè, & suffiantur etiam coeperimenta capitis. Si dolor sit externus, fiat vnctio capitis, etiam si alias vnctus fuerit, Si nolit vngi, fiat talis pileus, vt sequitur.

Pileus.

R. mass. emplastri diuini, empl. de Vigo ana qr. j. m. laxentur cum ol. laurino, & extendantur supra alutam, ex quo

ex quo fiat pileus, qui applicetur capiti raso, & prius inuncto ol. laurino, & ferat hunc pileum, donec solutus sit capitis dolor. Et quoniam omnia huiusmodi vnguenta ingratum odorem expirant, ex vsu ægrotantis fuerit portare moscam, ambram, & id genus alia.

R. bethon. melissæ, absynth. pulicar. matric. sampf. ebuli cum radic. althææ an. M. j. florum stech anthos, sampfuci, chamo. mel. an. p. j. semini rutæ agrest. baccar. lauri, anet. an. vnc. iij. pingued. porci non salitæ & antiquæ lb. j. pingued. galli & anatis ana qr. j. bulliant omnia simul in vino, & aqua ad consumptionem vini, & reducantur ad formam linim. fortiter exprimendo, & addendo quatuor vnguentorum cal. an. vnc. ij. arg. viui extincti in aceto, & sulph. viui an. vnc. ij. cinabrij vnc. β. facis oleo. liliorum & laurini ana vnc. iij. hoc vnguento vngatur ad dolorem capitis, & articulorum, post alias vniuersales, vngendo caput & articulos. Multi in doloribus capitis à morbo Italico, vt in curatione morbi Italici vniuersali, maximum errorem committunt. Nam medicamenta frigida adhibent, quæ materiam infrigidant, & incrassant, quanuis materia sit vel omnino pituitosa, vel parum habeat admixtæ melancholiæ. Ideo aliqua ad humorem melancholicum admisceri debent, pauca tamen respectu eorum, quæ pituitam respiciunt, ex qua magna ex parte morbus hic nascitur.

De dolore capitis ab ebrietate CAP. XIII.

Dolor capitis aliquando fit ab ebrietate, ob vini vapores ad cerebrum eleuatos. Sed quia medici rarò ad hanc curam vocantur, ideo breuissimè de hac differemus, cum omnes curam & remedium experimento sciant. Fertur enim communi carmine, Si tibi ferotina nocet potatio vini, hora matutina rebibas, & erit medicina. Non tamen parum faciunt lucri medici ex curatione affectuum, qui ebrietatem sequuntur, quales sunt tremor, paralyf. morbus attonitus, comitialis, catarrhus, & id genus reliqua. Quamuis enim vinum sit calidum, frigidos tamen morbos gignit, vt docet Galen lib. de sympt. causis. Id sat superque norunt medici Britanni, qui diuites euadunt ex affectibus, qui ex erapula sobole fiunt. Porro vt aliquid tandem de hoc affe-

Et ut attingamus, dolor capitis ex ebrietate curatur pro-
uocatione vomitus, si sit plenus ventriculus. Excitatur
autem vomitus aqua tepida, & pauco oleo iniecto as-
sumendo vnc. iij. vel decoctionem rapha. cum syr. ace-
tol. Vomitu facto caput confirmabis oxyrrhodium, ne
facile fumum recipiat, deinde dabis decoctum caulium.
Caulium Nam vapores ad caput ascendentes sistit. Licet aliquan-
do. do dare clysterem ad diuertendum.

De Vertigine. CAP. XIII.

*Differen-
tia.*

Cum caput & simul quæ cernuntur, videntur cir-
cumagi, hæc affectio à Græcis *ἄσθηνος*, à Latinis Ver-
tigo appellatur, ut Galenus docet in 4. de ratione victus
in morbis acutis. Cum verò simul adest observatio te-
nebricosa, adeo ut derepentè visus euanescat, existiman-
tibus, qui id mali patiuntur, sibi offusas esse tenebras,
σκατὶδύοις, id est, vertigo tenebrosa nuncupatur. Quod si
illa tenebrarum offusio sine vertigine & rerum circu-
latione, aut illa saltem leui existat, Scotoma dicitur:
quæ leuius quoddam tenebricosa vertigine malum est,
vnde incipiens quædam ac debilis *σκατὶδύοις* esse vide-
tur, cum vehementiæ & intentionis ratione tantum
differant. Sunt tamen ex recentioribus nonnulli, qui v-
num & eundem affectum esse existimant, nullo disci-
mine adhibito. Quidam verò nomina non separant,
sed res ita distinguunt, ut id, quod verè Scotoma est,
suffusionem à Latinis dictam, à Græcis Hypochyma
nominauerint. Quos similitudine, quæ inter has affe-
ctiones intercedit, deceptos existimo. In illa siquidem
non minus, quàm in altera incipiente fumi vel nubes,
muscæ & similia spectra, interdum ob oculos volitare
putantur, proindeque alia ratione discrepare necesse est.
Scotoma enim quamuis oculorum obtenebratio sit,
eius tamen causa continens in cerebro subsidet, quam
spirituum ibi contentorum inordinata motio & turba-
ta excitat. At suffusionis incipientis sedes & causa in
oculo tantum continetur, estque vel aqua vel fumus.
Verum ut plenior omnino Vertiginis noticiam ha-
beamus (liceat enim hoc nomen nunc pro omni Sco-
toma usurpare) dicendum illam esse inordinatum spi-
rituum motum in anterioribus ventriculis cerebri exi-
sten-

stentium, qui tenebrarum offusiones adducit, & imaginatricis facultatis iudicium peruerit, vnde illa rerum obiectionum circulatio & conuersio sese obicit, simulque se circumagi, qui id patiuntur, & prolabi existimant. Nihil enim mirum tot læsarum functionum *Spiritus* symptomata inuehi, cum spiritus, qui in priore cerebri *instrumē-* parte constituti sunt, secundum naturam non se ha- *ta facul-* bent, sed indebito & peruerso motu feruntur. Sunt e- *tatum.* nim instrumenta & subiecta facultatum interiorum animæ, earum præsertim, quæ in ea parte domicilium habent, vt est sensus communis & intimus, à quo tanquam à fonte riui in exteriores sensus deriuatur, & vis illa prima sentiendi è cerebro in sensuum instrumenta se diffundit, sicuti etiam ea, quæ imaginatrix appellatur, cuius munus est species rerum apprehendere & concipere, & quæ illam naturali quodam instinctu consequitur. Nam quæ pars animæ sensu pollet, eadem pariter & phantasie & appetitus & motus facultates habet. Ex quibus perspicuum est, quicquid exagitare & conturbare humores ac spiritus potest (qui quoniam eorum omnium, quæ sunt in corpore, tenuissimam substantiam habent, ob id quoque facile agitantur) id etiam vertiginem sentiendi vim obtinere maximam. Id autem tum ab euidentibus, tum ab interioribus causis proficiscitur. Euidentes sunt solis æstus, excessus omnis aeris constitutionesque temporis intemperatæ, præsertim humidæ & calidæ, vt sunt austrinæ, quas Hippocrates auditum hebetare, caput grauare, vertiginem oculis inferre scripsit. Omnia denique, quæ humores extenuant & in feruorem agunt, & quæ subito vehementerque comprimunt, aut vehementiore motu incitant, vt dolor atrox, immodica exercitatio, ira, timor, omnesque tum corporis tum animi perturbaciones. Inedie porro, vel quia impuro corpore ventriculum plerunque implēt humoribus, idem efficiunt. vnde stomachi erosiones, vigilie, corporisque perturbaciones consequuntur, ac vertigines, quòd insitus calor perinde ac mens tum noxios humores exagitet alimenti penuria aut quia acres humores exacuit, incidit, & corpus calefacit. His etiam, qui ex morbo cōualescunt, ver-

riginem concitat in liberum perflatilemque aerem vel
 saluberrimū mutatio, quòd repentē ac vehementer cor-
 pus & humores exagitet. Id autem non minus promptē
 ac celeriter efficiunt rotarum. similiūque motionum
 circumactus, aquarum vortices, si vel aspectu solū ob-
 iiciantur: sed multò magis corporis immodica & in gy-
 rum facta motio, qualis est articularis motio apud Pro-
 uinciales, quam (voltam) vulgò nominant. Ab his autem
 promptius offenduntur, qui cerebrum in hanc affectio-
 nem iam propensum habent. Quòd autem solus rerum,
 quæ circumaguntur, aspectus, possit Scotomiam facere,
 non aliunde euenire puto, quàm propter continuatio-
 nem & coniunctionem rei aspectabilis cum videndi
 spiritu, ex qua consentaneum est spiritum illum eodem
 modo impelli, quo res ipsa, quæ cernitur, siue spiritu ab
 oculo manante, & in rem obiectam per medium inci-
 dente visio fiat, siue rei color & imago aerem medium
 afficiat, qui deinde ad oculum vsque protensus oculum
 concitat. Facilius verò intelligitur quo pacto turbata, &
 in gyrum facta corporis motio vertiginem concitare
 possit. Humores enim & spiritus cum ex fluentium ge-
 nere sint, his agitatis corpus vnà commoueri, & ad ean-
 dem motionem ferri necesse est, vnde vertiginis solutio
 statim adest cum motus contrarius initur. Contrarij si-
 quidem motus sese inuicem compescunt & contempe-
 rant. Sed tamen ad vertiginem componendam paucio-
 res, quàm ciendam requiri videntur, quod rem quiescē-
 tem compellere, quàm commotam sistere, maioris sit
 laboris. Causa verò interior continens vertiginis tradi-
 tur crassius spiritus aut flatuosus cum humore simul per-
 mixtus, qui in capite commouetur: aut soli spiritus cum
 multo vapore in cerebro contento, qui à capite suam es-
 sentiam & originem interdum accipiunt, constituuntq;
 eam vertiginis speciem, quæ à primario cerebri affectu
 fieri dicitur. Aliunde verò interdum transmittuntur, &
 eam, quæ ex consortio fit, adducunt. Quod accidit va-
 poribus vel humoribus ex ventriculo vel præcordiis,
 vel alijs partibus in cerebrum sublatis, aut per arterias
 & venas ad cerebrum ascendentes, deductis, eo modo,
 quo dolorem per capitis consensum fieri antea demon-
 stra-

frauimus. Generantur autem in ventriculo ob natiui caloris defectum, vel partis illius imbecillitatem, quæ ex cibo & potu vaporosum & flatulentum spiritum parit. Nonnunquam etiam humor prauus vel ibidem genitus vel aliunde accitus, interdum & cibus illic corruptus hanc affectionem procreat, ore ventriculi (vt scribit Gal. aph. 7. lib. 4.) morso aut vellicato. Nam propter nervorum magnitudinem ex cerebro in ipsum descendentem, animæ functiones læduntur, malè affecta hac particula. At nos maluimus dicere id fieri per vapores ex ipso ventriculo deductos per nervorum ambitum, qui ad ipsius os perueniunt, aut alio modo, quemadmodum de dolore capitis ex consensu ventriculi exorto demonstratum est. Morsus enim aut vellicatio stomachi syncopem, erosionem, nauseam, & singultum quod excitet concedimus: vertiginem verò quomodo possit, non videmus, nisi fumi sursum ferantur. Cur enim potius conuulsionem, sicut à poto helleboro, non adduceret? Feruntur autem sursum fumi, quoniam quæ in ventriculo existunt, agitantur aut corrumpuntur, sicuti ostendit vectio aut nauigatio, vel quam medicamentum purgans efficit, exagitatio. Eodem modo iecur, venæ, vterus intestina, vniuersum denique corpus consortij lege materiam huius affectionis ad cerebrum mandant, & maxime cum euidentium causarum vi cientur. Quare quotiescunque ex consensu alicuius partis fit vertigo, dignoscitur, quod eius affectæ partis indicia semper apparent, quæ veluti seminarium & morbi originem designant. Vertigo verò primarius cerebri affectus existit, cum vapores ac materia flatulenta huius mali causa est proprio ipsius vitio, in eoque aut procreatur aut congeritur. Id autem efficit omnis intemperies æqualis, vel excessus qualitatum & humorum, quæ coctionem impedire aut corrumpere nata sunt. Atq; inde cruditatum, flatuum, & excrementorum prouentus maior existit, quam qui possit à natura domari. Calida autem intemperies siue solitaria siue cum materiæ consortio peculiari quadam vi id præstare potest, vel quod humores extenuet, & in feruorem furoremque agat, vel quod tantam vaporum multitudinem alliciat, vt præ copia

excludi nequeant. Sed frigus fixarum inueteratarumque vertiginum causa est, omnem affectum contra naturam contumacem & diuturnum procreans, quia, cum penuriam & defectum caloris natui consequatur, crudicatum omnium est author, quacum ab inferiori debilique natura subigi nequeant, in flatus & crassos vapores abeunt. Qua ratione Hippoc difficultates spirandi & vertigines senibus familiares esse scribit. Nec tamen ab intentè frigida, aut summè debili calore materiam illam progigni dicamus. Si enim ad extremum imbecillitatis peruenisset, nunquam illos humores dissoluere aut resoluiere aggredieretur: id quod cum efficere nititur, præ imbecillitate attenuare ipsos non potest ita, ut per insensilem euaporationem excerni queat. Inde origo flatuosi spiritus existit in capite, cui cum exitus non pateat, more flammæ & fumi in furno coërciti, in gyrum mouetur. Id autem efficit capitis rotunditas & ventriculorum cerebri cameratio, ad cuius partem fornicis superiorem cum vapor rectè iuxta leuium naturam delatus est, nec aliùs ferri potest, reflectitur, & in orbem rotatur, non aliter quàm cum exhalatio, quæ sursum tendit, nubibus viam præcludentibus, in latus ducitur & ventum procreat. Atque ea est vertiginis eius, quam euidentes causæ non concitant, ratio. Cuius generationem meatuum capitis obstructio & condensatio, quæ vapores prohibet, adiuuat, atque interdum facit, quemadmodum & partis imbecillitas humores vel vapores ab aliis transmissos recipientis, vel in se parientis. Accidit autem etiam hæc affectio initiis morborum & iudicationibus, quo tempore aut turbationem, aut à flatuoso spiritu, quem humorum prauitas excitauit, cerebri repletionem demonstrat, naturamque haudquaquam quiescere, sed interdum contentos in corpore prauos humores ita aggredi, ut à bonis eos secernat. Quare medium quodammodo tum salutarium, tum exitiosarum affectionum obtinere videtur. Indicium enim est nec omnino prostratæ, nec omnino vincentis naturæ. Vnde cum initiis febrium interuenerit, spectandas esse iudicationes admonet Hippoc. ne temerarium feratur iudicium. Ex illa enim nisi superior

perior vel inferior morbo prorsus natura esse videatur, salus vel exitium certissimè pronuntiari nequit. Visa est præterea vertigo post diuturnorum morborum imperfectas crises accidere ob translatam materiam illorum in cerebrum, vbi hanc concitat.

CVRATIO.

Vertigo vt à multis causis fit, ita variis modis curatur. Si fiat ob motum corporis maximè in gyrum, vel ob aspectum rerum rotantium, vel profundarum, quiescant. & illa non aspiciant. In his præsens est remedium vt collocentur supini, ita vt nares sint capite altiores. Est etiam inungenda illis pars anterior oxyrrhod. vt facilius dormiant, & spiritus agitati quiescant. Si ob crapulam, curetur crapula modo supradicto, vt vomitu & corroboracione ventriculi Dentur aliqui fructus, aut alia astringentia. Detur pulvis sequens, qui utilis in omnibus ferè causis vertiginiserit.

R. coriand. vnicæ cooper. ʒ. ij. anis. similiter conditi ʒ. j. fœnic conditi ʒ. ij. diacyd. sine speciebus. ʒ. j. β. corall. subtiliter tritorum, & seminis pœoniæ mund. ana ʒ. β. sacc. ros. q. s. fiat pul. Commune præceptum est in ordinatione receptarum, vt primùm ea scribantur, quæ ponuntur in maiori dosi, sensim descendendo, & diminuendo, pro ratione affectus, & virium ægrotantis, vteribus obseruatum, & maximè ab Andromacho omnium in præscribendis medicamentis compositis maximè ingenioso. Obseruari debet etiam vt semper ea præcedant, quæ sunt affectioni curandæ, aut parti laboranti maxime propria, ad communia sensim descendendo. In superiori pul. ponitur semen pœoniæ, quia non solum epylepsiæ, sed omnibus affectibus capitis frigidis confert, præsertim his, qui affinitatem quandam habent cum epylepsia. Si ob cruditatem ventriculi vel frigiditatem accidat vertigo, ponatur diacydonitem cum speciebus, nisi velis alium puluerem calidum addere qui suppleat eius vires. Si autem fiat vertigo à vaporibus eleuatis à materia aliqua calida, vel ob agitationem, alicuius materie subtilis digeratur sic.

*Commune
præceptum
in præscri.
formul.*

*Pœonia
confert
affectib.
capitis.*

R. syr. ros. ʒ. ij. syr. de berber. ʒ. j. aq. solani viol. ros. ana ʒ. iiij. aq. meliss. aut sampsuci ʒ. ij. misce. Ponitur

aqua melissæ aut alterius herbæ capitalis, quanuis sit calida, vt vis medicamenti ad caput deducatur.

R. elect. triasand. vel diarrh. abb. vel diatrag. frig. tab. j. pro dosi.

Potio pur-
gans.

R. syr. ros. laxatiui 3. ij. rhab. infusi in qua endiuia non expressi 3. j. florum anthos & cinamomi ana scrup. ʒ. misce, fiat potio cum decoctione prunorum & sebestem. Si fiat ex mixtione humoris melancholici. adde in decoctione foliorum senæ orientalis 3. ij. vel summitatum thymi 3. j. vel polypo. querc. tantundem, aut senæ orient. 3. j. in substantia. Si verò ob cacochymiã egeat maiore euacuatione, adde elect. de succo rosar. 3. j. vel oxyph. laxa. 3. ij. Hæc confectio fit ex tamarindis. Quare confert febribus, & aliis, morbis etiam ex bile. Estque simillima compositioni diaprunis solu. Poteris tamen augere vel minuere dosim, pro magnitudine materiæ, & viribus ægri. Post euacuationem dantur aliqua astringentia, vt mala cydonia condita, aut diacyd sine speciebus. Utatur etiam carne cydoniorum conditorum post pastum. Applicetur etiam oxyrrhodium supra caput, vt in dolore capitis à bile dictum est. Quòd si non cedat morbus his remediis, veniendum ad fortiora. Adhibeantur succi plantag. & solani, & alia, quæ supra præscripta sunt, in dolore cap. à bile, semper ea eligendo, quæ magis astringunt. Si nolint accipere potionem, dentur pillulæ sine quibus, vel de quinque generibus myrob. vel quæ sine myrrha & croco parantur. Clysteres ante vsum syr. laudantur, quales præscripti sunt in dolore capitis à bile. Si à materia frigida eleuentur fumi tenebricosi vertiginē inducentes, concoquatur & euacuetur materia modo supradicto in dolore cap. à pituita. Præscribatur pul. iam dictus addita 3. j. cumini in aceto præparati & carui tantundem. Potest etiam addi in puluere 3. ʒ. elect. diag. aut pul. eius 3. j. Potest etiam fieri opiata ad confortationem cerebri, & ad prohibendam vaporum generationem hoc modo.

R. confer. cortic. citri cum sacch. conditi 3. j. confer. anthos & florum stechad. & ros. ana 3. ʒ. pul. ros. nouellæ, & aro. ros. ana 3. j. diacym. vel diatrium pipereum (si reperiatur præparatum) 3. ʒ. galang. subtilis. pul. & anis.

ana

ana ʒ. ʒ. syr. cōser. zinzib. vel corticis citri q. s. fiat opia-
ta, de qua accipiat duabus horis ante pastum ad quan-
titatem auellanzæ, superbibendo parum vini, vel aquæ
absynthij. Si æger habuerit renes natura calidos, aut
hepar calidum, admisceantur quæ illa refrigerant, in
minori tamen dosi; vt si addas tria sand. & diarrh. abb.
ana ʒ. ʒ. vel scrup. ij. vel bibat ante sumptionem opia-
tæ aquæ endi. ʒ. ij. vel cichor. hoc etiam faciendum est
in calidioribus naturis, vbi sumendæ sunt pillulæ, quia
omnes calidæ sunt, saltem ob aloen: Aut si alioqui he-
par fuerit calidius cum frigidityte ventric. Tunc enim
non sunt sumenda calida, quæ sunt multum tenuium
partium. Illa enim parum in ventriculo manentia, sta-
tim ad hepar transeunt. Quo fit, vt intemperaturam
ventriculi parum contingant, caliditatem verò hepa-
tis multum adaugeant. Sumenda ergo sunt calida, quæ
diu in ventriculo maneant, vt grana piperis integra, &c.
Topica remedia sunt aliqua ex parte discutientia cum
astringentibus, & cerebrum corroborantibus permi-
xta, vt si fiat puluis capitalis hoc modo.

R. flor. anthos, flechad. ana ʒ. i. ros. rub. & albar.
ana ʒ. ʒ. coriand. præpar. ʒ. vj. nucis moscatæ, garyoph.
calami ar. cyperi ana ʒ. ij. myrt. ʒ. j. fiat pul. subtiliss.
In principio & declinatione morbi, augeantur astring-
gentia. In principio vt vapores repellantur, in fine, vt ce-
rebrum corroboretur, ne rursus impleatur vaporibus.
In principio etiam ad repellendos vapores vrimur oxy-
rhod. aucta dosi aceti. Si maior intentio sit digerendi,
quàm repellendi & corroborandi, auferantur ros. albæ,
& semina myrthi. Frictiones partium externarum maxi-
mè laudantur. Omnibus autem modis fugienda est fri-
ctio capitis, quæ illud replet vaporibus, tantum abest vt
vacuet. Sit ergo commune præceptum in omnibus mor-
bis capitis, nunquam faciendam frictionem capitis su-
pra caput, nisi præcesserint euacuationes vniuersales,
vel per clysteres, vel per pillulas, & frictiones aliarum
partium. Fient ergo hoc modo. Primum fricetur collum
& brachia fortiter, & spina dorsi, tandem femora, &
crura, seu iuba: vltimo fricetur caput. Tuac enim non
est periculum de attractione vaporum, vel fumorum

*Pillula
omnes ca-
lida.*

*Hepate
calido &
frigido
ventriculo
à calido
abstinen-
dum.*

*Præceptum
commune
in dolori-
bus capi-
tis.
Fricatio.*

ad caput, cum iam facta sit diuersio ad partes longin-
 quas. Hoc modo fieri potest cerebro prius euacuato.
 Fiat frictio cum panno calido, & aspero, in aliis parti-
 bus à capite: in capite verò cum panno non multum
 calido, sed sufficit siccum esse, & non calidum. Nam
 panni calidi frictio multum dissoluit. Hoc in epyleps.
 apoplexia & catarrho, aliisque capitis affectibus obser-
 uandum est, incipiendo semper frictiones à collo sen-
 sim ad inferiora descendendo, vsque ad tibias & pedes.
 Hæc affectio solet accidere nimium ieiunantibus,* &
 inanitionem ex inedia patientibus, quos oportet refi-
 cere optimis alimentis citrò & bene nutrientibus, vt
 sunt vinum, testiculi gallorum, succus carnis, succus
 pullorum, &c. Corroborandum est etiam iis caput inun-
 ctione ol. rosarum. Laudant aliqui missionem sangui-
 nis, quando materia permixta est sanguini vaporoso,
 præsertim si adsit plethora. Si mittendus est sanguis, e-
 ligatur primùm cephalæa, quæ si non appareat, me-
 diana, his latentibus basilica secunda venit. Sunt qui
 laudant etiam apertionem venarum iugularium, quas
 vocant Arabes venas Guidem, sed quia non facile coa-
 lescent, & periculum est ne plus sanguinis vacuetur,
 quàm velimus, satius erit eas omittere. Pro vltimo re-
 medio sit sectio arteriarum, quæ sunt retro post aures, ve-
 rum quia pauci sunt chirurgi exercitati in earum sectio-
 ne, satius erit id omnino non tentare, loco cuius sectio-
 nis venæ, applicetur cauterium actuale in media parte
 capitis prope suturas. Si ignem refugiant, applicetur
 potentiale.

De Phrenitide.

C A P. XV.

Phrenitis inflammatio est cerebri vel eius menyn-
 gum, ad quam sequitur principis facultatis animæ
 læsio, vnde similitudo illi magna est cum Mania & Me-
 lancholia. Distinguitur tamen, quòd hæ affectiones de-
 sipientiæ sint sine febre, nec dum earum materia putre-
 dinem acquisierit. A Paraphrenitide verò, quòd hæc
 desipientia cum febrium vigore cesset, nec, vt Phreni-
 tis continua sit, & eundem tenorem seruet. Præterea
 Phrenitis semper morbus est, febrem inducit, & pro-
 pria affectione cerebrum afficit. Illa verò plerunque
 febris

*Differen-
 tia.*

Causa.

febris aut morbi grauioris symptoma est. Sequitur enim septi transuersi inflammationes, & aliarum partium subditarum ac febres ardentes, nec vnquam, nisi per consensum, caput affligit. Gignitur omnis Phrenitis à bile, vt Galenus multis in locis docet. Cuius cum *Materia* *li.* varieg sint species, varia quoque Phrenitidis genera constituant. Alia enim naturalis est, eaque nihil est aliud quam sanguis tenuior & biliosus, vnde mitior fit Phrenitis. De qua Hippo. locutus videtur, cum dixit, deliria, quæ cum risu accidunt, esse securiora, quam quæ serio, quod à sanguinis exuperantia fiant. Alia verò bilis est non naturalis, ex qua maligniores Phrenitides efficiuntur, prout maiorem aut minorem acrimoniam obtinet. Nam quæ minus adusta est & acris & pallida, mitiores: quæ flaua, maligniores: quæ verò perassata, vel in atræ bilis naturam degenerauit, melancholica, feruida, & furiosa deliria excitat. Cæterum cum hæc affectio acutissima sit, ideo medicum non solum doctum, sed diligentem requirit. Nam septimo die sæpe terminatur. Multa alia hinc dici possent de Phrenitide, sed quia tantum curam hinc decreuimus scribere, supersedebimus a pluribus, studiosum medicum relegantes ad authores, qui ex professo loquuti sunt de signis, causis & curatione huius affectionis, obseruantes methodum curandi breuissimam. Hæc itaque affectio fit aut à *Materia* sanguine, aut à flaua bile, ad cerebri menyngas affluente, vnde fit inflammatio ob causas, quæ phlegmonem generat, nempe ob humorum ex propriis vasis exitum, & in loco angusto coarctatum, ac impeditam eorum transpirationem. Hinc necessario sequitur putredo, atque febris, delirium, inquietudo, sitis inexhausta, capitis dolor, vigilæ, &c. ab autoribus descripta. Porro si fiat phrenitis à bile, multò (vt dixi) periculosior est, & grauiora habet symptomata, & est cum confidentia quadam maniaca, & aspectu terribiles oculi. Grauiora symptomata dico, febrim, sitim, virgalias, &c. Quæ verò fit à sanguine, magis mitis est.

CVRATIO.

Quod attinet ad huius affectus curationem, imprimis medicis vocatus, debet præscribere clysterem

mollem, alteratiuum, vt in febribus ardentibus, sic.

Clyster.

℞. quat. remollientium, lact. ana M. j. prunorum N. xx. semi quatuor frigidorum maiorum ana ℥. ℥. florum viol. nenuphar. ana p. j. hordei integri p. j. si decoctio in col. dissolue sacch. rub. cassiæ ana ℥. j. ol. viol. ℥. iij. salis parum, fiat clyster. Si æger sua natura sit aluo astricta, vel feces plurimum induratas habeat, pone succi ciclæ

Benedi-

ct in fe-

bribus in-

commoda.

Error in-

doctorum.

Vena se-

ctio.

℥. ij. Abstinentium ab hiera, aut benedicta, vel huiusmodi opiatas calidis. Nam febrem augment, & humores agitant, & subinde ratione siccitatis, aluum postea astrictam relinquunt. Ideo medici indocti plurimum errant, huiusmodi opiatas dantes in affectibus calidis. Detur igitur clyster illico, vt vocatus fueris, nisi sit plenus ventriculus. Postridie verò secabis cephalicam venam, si liceat per ætatem, anni tempus, &c. & fiet foramen paruum in vena, vt facilius & citius possit consolidari, & ne ægrotus delirio captus, manus & brachia agitando sanguinis fluxum excitet, quod non facile fiet, si foramen sit angustum. Si quid dehortetur venæ sectionem, cucurbitulæ applicandæ sunt humeris, & natis cum scarificatione, tum ad diuersionem, tum ad euacuationem. Vel fiat sanguinis missio sub lingua, vt docet Paul. sed magis in principio materia adhuc fluente. Circa statum & materia iam fluxa, vena frontis aperiatur. Licet dare clysterem post venæ sectionem. Nam si fueris vocatus manè in primo die morbi, statim nulla interposita mora, poteris secare venam, etiam non prius adhibito clystere, cum periculum sit, ne materia copiosa feratur ad caput. Nam (vt Hipp. inquit lib. de ratione victus) non exhibito clystere venam seca. ob urgentem necessitatem. Si tamen dentur induciæ, clyster exhibeatur.

TOPICA.

Topica etiam remedia statim ab initio sunt applicanda, virtute quidem frigida, & repercutienti vi prædita, nullo pacto resoluentia admiscendo, quæ in augmento, statu, & declinatione secundum plus & minus miscentur, vt conditio temporis, & morbi exigit. Applicetur igitur ab initio tale percussiuum.

Rec. oxyrrhod. lb. j. intingantur panni linei, & applicen-

plicentur parti anteriori capitis.

R. aquarum ros. solani, nymphetæ an. gr. ss. misce, intingantur panni, & ponantur frigidi, vt supra, addendo parum aceti. Et cum incipiunt calefieri, remoueantur. Aquis vrimur hyeme vice succorum, quia inueniri nequeunt herbæ. At æstate succis vrimur, cum herbæ ad-sint, vt quod sequitur.

R. succi lact. & plantag. ros. cucurb. ana ʒ. ij. aceti parum, misce, & capiti applicentur. Laudatur vnctio facta ex vnguento populeonis, & maxime quando volumus somnum conciliare, vt inferius dicemus, sed hoc vnguentum recens esse debet. Nam antiquum etiam calfacit, tantum abest vt refrigeret.

R. ol. violatum & nymphetæ an. ʒ. iij. ol. papa. albi & mandragoræ ana ʒ. j. misce, & applicentur fronti cum pannis lineis ad conciliandum somnum. Erit sanè fortissimum hoc modo, sed quia periculosum, ad mediocritatem reducatur, addendo lactis muliebris puellam lactantis recentem mulsi (nam tale frigidius est) ʒ. iij. His remediis vtemur in principio & in vigiliis ad somnum conciliandum. Sed huiusmodi medicamenta frigida cautè & cum consilio applicare oportet cerebro, cum suapte natura sit frigidum, & membrum princeps. Ideo nunquam applicari debent in principio, in senectute & in debili, nisi in minima dosi, & cum maximo iudicio. In declinatione & statu materia maiore ex parte in capite existente, miscenda sunt digerentia, & resoluentia cum astringentibus & resoluentibus, vt ratione resoluendum & digerentium dissoluamus id quod iam impactum est cerebro: & ratione repellentium impediatur ad cerebrum fluxio. Ideo in augmento pauca resoluentia miscenda sunt multis repellentibus: in statu æqualia conueniunt: in declinatione resoluentia debent superare repellentia, hoc modo.

R. ol. viol. & nenuph. an. ʒ. ij. ol. cham (ad resoluendum) ʒ. iij. misce, & adde succum alicuius herbæ conuenientis, vt,

R. ol. viol. iij. succi apij ʒ. ij. ol. cham. ʒ. iij. misce. Hic ponuntur repellentia, & refrigerantia, vt ol. viol. & resoluentia, vt ol. cha. & succus apij, Possunt addi succi

*De tem-
poribus
inflam-
mæ. Cro-
mediorū
varietate.*

fortiores, vt sunt calamen. origani, serpill. Sed ista resolu-
uentia in declinatione poni debent, quemadmodum in
principio repellentia & somnum prouocantia. Sequens
repellit, & somnum conciliat.

R. flor. violarum, ros. nymphaeana p. j. caput
pap. albi 3. iij. seminis lact. 3. ij. fiat decoctio in aqua, ca-
piat fumum huius decoctionis & somnum conciliabit.

Resoluen. Vel ad idem fiat irrigatio capitis ex colatura huius deco-
ctionis. Addere possumus ad resoluendum flor. cham.
stech. an. p. j. flor. melil. tantundem, sed id in fine sta-
tus fiet, vel in principio declinationis. In vera declina-
tione auferimus capita papaueris, nisi vigiliae sint mole-

Res herb. stae. Potest addi in declinatione ad resoluendum sampf.
serpilli ana M. ss. bet. meliss. & ceterae herbae capitales.
Interim tamen sit haec regula generalis, quod à leuiori-
bus est incipiendum. Itaque in principio resolutionis de-
bemus accipere catulum vnum, & per medium secare,
deinde capiti applicare. Hoc est medicamentum medio-
criter resoluens, & sine intensa caliditate. Huius loco pos-
sumus accipere pullum columbinum, vel pulmonem a-
rietis adhuc calidum, & applicare supra caput rasum. Nā
statim ab initio statim radi debet, sed vbi haec refrigerata
fuerint, statim auferantur. Sunt, qui addunt sequentem
puluerem.

Puluis re- R. coriand. præparati 3. ij. flor. chamo. melilo. viol. an.
solut. p. j. flor. nymph. & ros. ana p. ss. seminis lact. papaueris al-
bi an. 3. j. sandal. omnium ana 3. ss. granorum tinctorum,
beth. siccae ana 3. j. ss. fiat pul. & sinapizetur caput, vel ca-
tulus, qui ponatur supra caput. Et quoniam haec affectio
fit à bile, statim à principio materia vacuanda erit, ne
tota ad caput fluat. Ideo minoratiuum tale aliquod præ-
scribendum erit.

Minorati. R. prunorum damas. & sebesten, ana N. x. quatuor
sem. frig. maior. ana 3. iij. Et si inueniatur semen violae,
ponatur 3. ss. (quia venam lenit, humectat, & refrige-
rat) trium flor. cord. ana p. j. fiat decoctio ad qr. j. in
col. diss. cass. nouiter extractae, pulpae tamarin. ana 3. ss.
mannae granatae 3. j. (in valde picrocolis optimum erit
abstinere à manna, quia facile conuertitur in bilem)
rhah. infusi in aqua endiuiae & non multum expressi 3.
j. vel

j. vel loco illius pone syr. ros. lax. j. vt fit in pauperibus, quia rhab. est nimis carum. fiat potio, cap. in aurora cum custodia. In robustis corporibus potest addi 3. j. elect. de succo ros. vel diaprunis sol. tantundem. Satis autem est 3. j. Nam maiori pondere calfaceret, & agigaret humores. Vel pro pauperibus.

R. decoctionis prunorum qr. j. β. syr. ros. laxat. 3. ij. e. *Pro pau-*
lect. de citro 3. j. fiat potus. Si non ponis syrup. ros. laxat. *peribus.*
pone eius loco syr. viol. 3. j. auge dosim de citro vsque ad
3. ij. Et si liceat pro morbi indicatione materiam præ- *Syr. &*
parare & concoquere, id faciendum syr. ros. de oxy- *herba*
cantha. viol. granatis, acetoso simpl. oxyfacch. simpl. de *prapa-*
agresta, de limonibus, de ribes, de papauere, de nenu- *tantes bi-*
pha. &c. Herbae verò, ex quibus fiunt aquæ, sunt lactu- *lem.*
ca, cucurbita, endiuia, cichoreum, scariola, solanum,
plantago, acetosa, &c. Vinum etiam malorum grana-
torum.

R. syr. de granatis. syr. viol. vel syr. de berber. vel syr.
ros. an. 3. iij. aquarum endiuia, solani, lact. ana qr. j. misce
pro tribus dosibus. Melius autem est qualibet die dosim
prescribere, quia minus corrumpitur syr. cum quotidie
fit. Mutamus sy. uos pro necessitate nunc magis, nunc
minus frigidos, nunc astringentes, nunc lenientes præ-
scribentes. Et aliquando cogimur dare syru. de nenuph.
& de papauere, sed ne id fiat viribus repugnantibus, vi-
dendum est.

Symptomatum curatio.

His peractis ad symptomatum curationem venien-
dum. Primum itaq. cauendum est ab vsu syruporum a-
stringentium, quando alius astricta est, sed humectan-
tibus & lumbricam facientibus est vtendum, & molli-
bus clysteribus, qui possunt emendare astrictionem, quæ
fit à syr. Ad sitim verò, quæ in omnibus morbis acutis,
frequens est, & assidua, ordinantur syr. de granatis, oxy-
ficch. acetos. simpl. & viol. cum ptisana, quæ fit ex aqua *Ad sitim.*
communi & hordeo simul coctis. Interim tamen medi-
cus prudens, si alius dura est, ablineat à syr. astringenti-
bus antè descriptis, & vtatur lenientibus, vt syr. viol. qui
humiditate sua laxat, & infrigidat, cum aqua decoctio-
ni prunorum, quæ laxat, & similibus. Confert etiam

addere quatuor semina frigida maiora, vel fiat ptisana ex decoctione hordei. Ad sitim fiat talis syr.

R. aquæ ros. q. j. aquæ nymph. & bugloss. ana q. ss. sacch. albi q. s. misce, fiat iulep. quo vtatur tempore sitis cum aqua decoctionis hordei. Sunt qui à vino abstinere nolint, quod tamen in hoc affectu est perniciosissimum. Hi verò sic sunt fallendi.

Conditum.

R. vini granatorum ss. j. succi cytoniorum, modò alius non sitastricta, & ij. aquæ nymph. q. j. sacch. q. s. fiat iulep. cla. & aro. cum 3. j. sandali rub. Si æger est valde imbecillus, possumus vti conditis cordialibus, & fluxu bilis acrimoniam extinguentibus hoc modo.

R. conf. ros. viol. ana 3. j. conf. nymph. & bugloss. ana 3. ss. sacch. quod sufficit: fiat conditum, quo vtatur manè & serò longè à pastu, & tempore sitis cum decoctione hordei, in quo possunt addi aliæ conf. vt acetosæ, & maximè tempore pestis, conf. florum cichor. & capill. ven. sacch. ros. q. s. fiat conditum. Pul. quoque addi possunt hoc modo.

R. conf. ros. cichor. viol. ana 3. j. bugloss. 3. ss. pul. diatrag. frigi. (quia humectat & refrigerat) 3. ij. diamarg. frig. 3. ss. sacch. q. s. fiat conditum. Cum volumus conciliare somnum, additur etiam diapapauer album, sed minime pondere vt ad 3. j. tum quia nimis refrigerat, tum quia eius sapor ingratus est. Adduntur & alij pul. vt de gemmis, diarrhodi abb. Cauendum ab alijs qui calfaciunt. Fiunt & potus cordiales ad corroborandum, alterandum & somnum conciliandum, vt

Potus cordialis.

Potus somnifer.

R. syrup. de pap. 3. ij. aquæ lac. & bugloss. ana 3. j. ss. fiat potus ad somnum conciliandum. Si volumus virtutem corroborare, minuemus dosim syr. de pap. augendo dosim syr. viol. addendo pul. cord. vt fieri solet in debilibus qui ob calorem paucum & languidum syr. frigidis multum læduntur, & periclitantur de extinctione caloris natiui. Ideo fouendæ sunt vires, & somnus est potius conciliandus, per ea, quæ foris applicantur, quàm prioribus, scilicet quæ initio sumuntur. Nam illa minus lædunt, & si quid incommodi videantur allatura, facile remouetur: quod fieri nequit in his, quæ assumuntur. Fiat itaque potus hoc modo.

R. syr.

℞. syr. de pap. viol. an. ʒ j. vel ʒ. β pul. de geminis (ad virtutem & robur) diamarg. frig. ana ʒ. β diatrag. frig. ʒ j. misce, fiat potus. Adde aquæ lact. bugloss. borrag. an. ʒ j. detur hora nona, aut decima noctis, cum ibit dormitum.

Phrenitis à bile.

Si morbus fiat à bile, quæ ut plurimum adusta est, tunc in syr. & potionibus cordialibus humoris melancholici ratio habenda est. Itaque magis humectandum, cum humor peccans sit maximè siccus. Humectatio fiet per irrigationes, fomenta, syrupos, vnguent, & id genus. Addemus itaque decoctioni medicinæ folliculos senæ, epithymum, admiscendo bugloss. & borrag. & pro pul. cordialibus admiscebimus confectiōem alchermes hoc modo.

℞. syr. viol. ʒ j. syr. de pap. ʒ. β. confect. alchermes ʒ. β. vel si desit, diatrag. frig. & diarrhodi abb. ana ʒ. β. aquarum bugloss. borrag. lact. ros. an. ʒ. β. fiat potus, cap. hora somni. Quanto sunt delicatiores vel debiliores, tantò minus dandum est de hac confectiōe, quod aliter fit in aliis morbis. Et si suspicio sit de fluxu ventris, ab ea abstinere debemus. Dantur tertio quoque die clysteres mollientes, & alterantes. Nam alius semper humectari debet in hoc affectu.

Vrinæ retentionis curatio.

In phrenitide duo sunt symptomata, quæ accidunt ut *Duo symp.* plurimum, quorum alterum est, vigiliæ, cuius cura superius est descripta: alterum, vrinæ retentio, cuius curatio nunc restat. In hac autem affectione vrinæ prouocatio non debet fieri per ea, quæ assumuntur. Nam ea omnia ferè calida sunt, & nocent plurimum affectioni propter acrimoniam. Ideo vigilias prouocant, & morbum augent. His ergo est abstinendum, nisi in morbi declinatione, in qua morbo ferè soluto, & vacuata materia, dari possunt etiam calida. Primum igitur tentatur cura cum aqua calida, fomentando vesicæ regionem, ut faciebat Gal. lib. 1. de locis affectis, deinde comprimemus vesicam. Poterit & virgæ summitas fricari, & postea mittere vrinam, si possit. Quod si his leuioribus remediis non cedat symptoma, fiet ut sequitur.

℞. pariet. M. j petro. cum radic. M. β. fiat decoctio, & in col. diff. ol. scorpion. qr. β. fiat fots supra pectinem. Et residentia ponantur in sartagine cum oleo scorpionum, pistentur, applicenturque post fomentum, supra regionem vesicæ. Medicamentum valentius feceris, si addas seminis apij, petro. milij solis, seseleos ana drach. ij. Possent poni aliæ herbæ & radices aperitiuæ. Fiat sequens vnguentum, quod optimum est, & debet applicari supra fomentum.

℞. pingued. cuniculi, ol scorp. ana vnc. ij. sem. apij. petro. asari, seseleos ana 3. β. ceræ parum, fiat vnguentum, quo vngatur regio vesicæ, & perinei. In declinatione possunt assumi intra corpus sequentia.

℞. syr. de duadus radicib. 3. ij. aquæ alchechangi, graminis aspa. ana 3. ij. misce, detur manè. Fortius est hoc.

℞. oymel. seyll. vnc. j. aquæ fœnic. & beth. (quia respicit caput & aperit) saxifragiæ, apij ana vnc. j. misceantur. Si addas gummi prunorum drach. j. fiet fortissimum remedium. Reliqua pars curationis posita est in humectatione, cum affectus maximè fiat à bile adusta, quæ ratione magnæ caliditatis incinerata est, vnde cerebrum immodicè exiccatur. Fiet igitur fots ex decoctione viol. nymph. & decoctione capitis veruecis & cæteris eiusmodi, v

℞. florum viol. nenuph. ana p. ii. foliorum lact. viol. cucurb. solani, cucumeris, ana M. j. fiat decoctio, qua abluantur pedes & partes pudendorum tepidè.

De Paraphrenitide. C A P. XVI.

Paraphrenitis delirium est, quod in febrium ardentissimarum statu accidit, ob acrium vaporum elevationem ad caput. In hoc differt à phrenitide, quod hæc sit inflammatio cerebri, vel menyngum, ad quam sequitur febris quæ symptomatica est, & accidens. At delirium sequitur febrem, ad quam collatum rationem habet symptomatis. Ideo Galenus distinguit phrenitidem à delirio continuitate. Nam phrenitis continua est, vsque ad finem: delirium verò in statu, vel sine augmenti accidit.

*Phrenitis
dis & de-
liry di-
stinctio.*

C U R A T I O.

Paraphrenitidis curatio facilè deprehenditur ex curatione.

ratione phrenitidis, non tamen licet in paraphrenitide venam secare. Nam virtus animæ debilis est, & venæ sectionem dehortatur, & in statu melius silentium habere: non tamen oportet morbum sic incuratum relinquere. Eligantur igitur medicamenta maximè aperitiua, quæ non noceant morbo, à quo fit paraphrenitis, neque loco affecto, aut motui naturæ. Loco igitur sectionis venæ, cucurbitulæ in spatulis simul applicandæ sunt cum scarificatione. Hæ enim vires sectionis venæ gerunt, nec interea plus debilitant. Dentur clysteres ordinati in cura phrenitidis, & fiant frictiones. Inungatur caput oxyrrhodino. Detur potio somnifera, non nisi conciliatione somni. Nam debilitatur natura à vigiliis, quæ in somno reuocata, materiæ portionem per sudores euacuabit. Animaduertendum est præterea, cuius morbi delirium sit symptoma, & in qua parte sit morbus, ex quo fit delirium: quia semper admiscenda sunt potionibus & syrupis quæ morbum, à quo pendet delirium, & partem affectam respiciant: ut si delirium sit propter inflammationem pulmonis, costarum, colli, eligimus syrup. refrigerantes, & affectum priorem respicientes simul cum parte, quales sunt violatus, iuiubinus, de papauere, cum quo erit miscendus capill. venene sua frigiditate plus æquo noceat. Relinquemus syr. de agresta. de granatis, oxysacch. aceros. simpl. ros. & ceteros id genus, qui sua stipticitate, sputum impediunt, & respirationem reddunt difficilem, qui tamen laudantur in phrenitide, in qua non timemus nocere partibus pectoralibus. Dantur etiam syr. astringentes in hepatis inflammatione, & lienis, modò misceamus aliquas aquas aperientes mediocriter, quia semper aliquid debereduci à parte affecta per vias conferentes. In delirio ab inflammatione partium thoracis fit hoc modo.

R. syr. viol. ʒ. iiij. capil. ven. ʒ. ij. potest addi syr. de papauere. Nam magna ex parte phrenitis fit à bile, vel à sanguine bilioso, sicut & peripneumonia, maximè cum delirium excitat. Ob eam causam syr. de papauere non est reiiciendus, vel in syrup. digestiuis, vel in potionibus omniferis. Nam materiam plus æquo incrassat, nec in-

terim prohibet, quò minùs materia educatur. Adde aquarum viol. capil. ven. buglossæ ana qr. ß. Potest addi aqua ros. fiat iulep. Loco aquarum possumus miscere cum syr. aquam decoctionis hordei. In inflammatione diaphragmatis non sunt reiiciendi syr. restringentes, quia non æquè nocent, atque inflammationibus costarum aut pulmonis. Nam in inflammationibus diaphragmatis materia per sputum non reiicitur. Poterit dari aqua fructuum in delirio à phrenitide, vel peripneumonia. Nam in his duabus affectionibus fluxus ventris est periculosus, cum non euacuet materiam euacuandam per aluum. Ideo abstinendum à fortioribus laxatiuis. Hæc aqua fructuum fit ex decoctione prunorum, sebesten, tamarind in pauci quantitate hordei, quatuor seminum frig. maior. florum viol. & seminis viol. quæ plurimum leniunt cum passulis. Hæc decoctio leuiter lenit, & alterat mixta cum syrup. viol.

*In quibus
suspecta
alui pro-
luuiis.
Decoct.
fruct. le-
nientium.*

T O P I C A.

Topica remedia suprà descripta valent. Ideo fiat epith. ex aquis refrigerantibus admiscendo cordialibus vel aquis, vel pulueribus hoc modo.

Epith.

R. aquæ ros. (quia odorata) aquæ bugloss. & solani an. qr. j. (pro hepate addita aqua endiuizæ, cichor.) tro. de camphora 3. ß. croci gr. iij. sandali citrini pul. 3. j. fiat epith. quod applicetur tepidè cum panno lineo madefacto. Multi ponunt pulueres cordiales in epith. & rectè faciunt, quamuis id multi derideant. Interim in epithy. cord. ponimus pul. diamarg. frig. & pro hepate pul. triasandal. Maximè laudatur epith. sequens in pleuritide, peripneumonia, febribus ardentibus, hecticis, & colliquatiuis. Nam plurimum humectat, & refrigerat, & interim respirationem liberiores reddit, thoracis musculos laxando.

*Epith. Si-
le.*

R. decoctionis hordei excorticati lb. j. ol. viol. qr. j. misce fortiter agitando, & supra pectus applicetur, & sepe remoueat. Epith. hoc maximè valet in septi transuersi inflammatione. Hoc curata fuit puella quædam, de cuius vita desperatum erat. Si sit caliditas maxima, potes addere florum violarum p. j. Remedia alia in declinatione possunt adhiberi, sicut potiones cordiales

semper

semper eligendo quæ conueniunt affectui, vnde fit delirium, partis affectæ rationem habendo pul. diatrag. frig. recenter præp. & diapenid. sine speciebus plurimum prodest in calidis affectibus pectoris. Victus ratio cum in phrenitide, tum in delirio, sit admodum tenuis, humectans & refrigerans. Nam hi morbi acuti sunt, ideo breui terminantur. Virtutis tamen robur *Virtutis* semper conseruare oportet, sine quo virtus morbum sustinere non potest. Sufficit ergo cremor hordei (orge mundæ vocant) si virtus sit fortis: si debilis, pulvis gallinæ coctus cum herbis infrigidantibus. Pro potu aqua cocta cum hordeo: & in declinatione viuum album subtile, & aquosum conuenit.

De Vigilis superfluis

CAP. XVII.

Vigiliæ magna ex parte fiunt à caliditate, & siccitate. Ob id refrigerandum & humectandum est caput, quod fiet exterius quidem, per ea, quæ admouentur, de quibus dictum cap. de phrenitide, scilicet, vntionibus, irrigationibus, locutione pedum, &c. At intra venter cum syrup. de papauere, viol. aquis lact. cucurb. solani. Opiatis, vt est philonium roma. theriaca recens, & alia, quæ ex opio fiunt. Sed ad narcotica non est veniendum, nisi vrgeat necessitas summa, & cum alia remedia non profuerunt. Robustioribus oportet ea dare, & noxam quam induxerunt, castigare, vt si ventriculus plus æquo refrigeratus fuerit, vnguento aliquo calido, vel oleo est vngendus, vt stomach. Gal. vel ol. nardino, de menta, de spica. Mitissimum & optimum remedium, quod potest dari cum debilitate virium, est tale hordeum mundatum refrigerans.

℞. hord. mund. diutissimè cocti ℥. iij. amygd. dulc. *Hord.* infu. in aqua frig. & ros. tantundem, quatuor sem. frig. *mund. re-* maior. mund. ana ℥. β. seminis papaueris albi ℥. j. sacch. *frig.* ros q. s. fiat hord. mund. contundendo omnia simul & coquendo parum. post impositionem sacch. ros. detur post cœnam in introitu lecti, nec sit spissâ sorbitio. Conciliat somnum humectando, & refrigerando, & vires imbecillas reparat. Cum hoc remedio potest addi frontale, vel vngatur anterior pars capitis ol. ros. sine aceto, aut cum pauca eius quantitate. In extrema necessi-

*Cautio in
Gentric.
intemp.
frigid.*

*Amygd. cur
ponuntur.*

tate bonum est uti ol. viol. in quo diss. opij gr. aliquot, ut dictum in cap. de dolore cap. à bile, idque maximè cum vigilæ ob dolorem excitantur. Fiant leues frictiones, sit in loco obscuro & quieto. Detur vinum meracissimum, vel hippocraticum his qui vigilant ob mæiores & curam. Animaduertendum est quoties vigilæ sunt superflue, cum intemperie frigida ventriculi, vel per consensum cum eiusdem cruditate, nunquam esse sumenda refrigerantia per os, sed foris tantum applicanda, donec curata fuerit intemperies, vel cruditas, ne lædatur ventriculus. Ponuntur amygd. in hordeo mundat. præscripto, quanvis sint calidæ, vaporosæ, & facile effument ad caput, ob idque deducant vim aliorum medic. simul permixtorum, quæ vim refrigerandi habent, ad cerebrum. In instantia vigiliarum lotio pedum sit hoc modo.

R. viol. lact. lentic. aquæ, foliorum cucurb. vel cucumer. ana M. ij. florum viol. p. ij. florum nenuph. p. j. fiat dec. qua abluit pedes, manus & faciem, vel fiat pomum somniferum, sic.

R. opij 3. iij. styrac. 3. ij. croci, irid. & florum narcissi. ana 3. j. misce fiat pomum. Si quando narcoticea & maximè frigida adhibere cogimur, intermittendus est aliquando eorum usus: nam quotidianus calorem extinguit.

De Lethargo.

C A P. XVIII.

Vena sectionis.

Lethargus interdum morbus est, interdum symptoma, & tunc non propriè lethargus dicitur, sed caros, quanquam propemodum eadem sit amborum curatio. Lethargus tumor est frigidus cerebri, & maximè partis posterioris. In ea maximè necessaria est diuersio, ut in phrenitide. Sed quia materia frigida, non tam audacter sanguis mittitur, si tamen venæ tumentes appareant, & sanguis abundet, & consentiant reliqua, secatur primum **Cephalica**, deinde vena frontis. Ante venæ sectionem vel statim post, dandus est clyster ad diuersionem. Quod si alius iam pridem astricta est, incipiendum est à clystere, qui molliat, parum vacuet, & alteret pituitam sic.

Clyster.

R. rad. mal. altheæ, liliorum ana 3. ij. foliorum betæ, pariet. ana M. j. foliorum rutæ & centaur. minor. melif. beton.

beton. ana M. ss. feminis mal. lini & anethi an. ʒ. ss. feminis melon. ʒ. ij. florum mel. chamo. stech. ana pu. j. fiat decoctio in tb. j. col. dis. diaph. ʒ. ss. mel. ros. ʒ. ij. benedicta ʒ. j. succi ciclae & ol. chamo. ana ʒ. iij. salis gemmae ʒ. j. fiat clyster. Deinde fiat alius fortior. Nam in hac ægritudine quia virtus sopita est, humorésque crassi & lenti sunt, multum per clysteres & acutas glandes vacuandum est. Fortior igitur sic fiat.

R. fol. rutæ, lauri, beton. melissi, amaraci, saluæ, cen-^{Clyster}taurij minor. ocymij ana M. j. feminis rutæ, cubebæ, ^{fortior.}anis. fœnic. ana ʒ. ij. ag. ʒ. ij. pulpæ colocint. ʒ. ss. Sunt qui addunt radicem veratri (quod non est faciendum) florum anthos, stech. chamo. meli. sampsu. ana p. j. fiat decoctio. In col. tb. j. dis. indi maior. ʒ. ss. benedi. ʒ. ij. vel hieræ ruffi vel colocinti. ʒ. j. ss. ol. chamo. olei anethi. ana ʒ. ij. salis gemmae (quia virtus sopita est) ʒ. j. fiat clyster. Iteretur sæpius pro necessitate. Fricetur vehementer, ligentur extrema, & auellatur barba & capilli capitis & pudendorum. Fiat & suffitus hoc modo.

R. assæ foetidae, ammo. galbani ana ʒ. ij. aut ʒ. j. capil. ^{suffitus.} hominis ʒ. iij. castor. ʒ. j. ss. misceantur, fiat suffitus, quæ recipiat naribus. Et quia gargarismus commodè dari non potest, vngatur palatum sinapi, aut benedicta, aut hiera picra. His peractis excitetur sternutamentis non in principio, ne agitatus humor & fusus, plus occupet loci, & magis obstruat. Principio igitur retrahitur, & euacuatur materia clyster. supra scriptis, & venæ sectione. In statu post euacuationem pul. euph. aut veretri, aut pyretri aut piperis iniicitur naribus ad excitanda ad sternutamenta. In principio tamè est repellendū, quando ma-^{Repellens}teria fluit ad cerebrum. Sequens conuenit remedium. ^{remed.}

R. ol. ros. ʒ. ij. oxymel. scill. aut succi ciclae ʒ. j. misce, vng. cap. & sinciput, licet morbus sit in parte capitis posteriore. Nam quia sinciput est rarum & multis futuris peruium, vis medicamentum facilius penetrat in cerebrum. Postea vng. ol. ros. cui castoreum misceatur, aut vnguentum sequenti.

R. olei liliorum, vel laurini vel antiqui, vel chamo ^{Vnguentum.} milæ, vel alterius ex calfacientium numero ʒ. ij. succum. rutæ & apij ana ʒ. j. ceræ parum. fiat vnguentum. fortius

fiet, si addatur castoreum, aut oleum de castoreo. Fortioribus vtendum, vbi non profunt debilia, quoad morbus fuerit solutus.

Sinapismus.
 ℞. euphorb. castor. piper nigri ana ʒ. j. assæ foetida, ammo. ana ʒ. ij. cineris capillorum hominis ʒ. β. seminis rutæ agrest. ʒ. ij. ol. liliorum & laurini ana ʒ. iij. ceræ parum, fiat vnguentum aut loco ceræ pone ficus q. s. ad incorporandum sinapismi modo, & adde semen sinapi. Gummi liquentur vino maluatico aut vetusto communi, aut oxymel. scil. Admoueantur in statu occipiti cucurbitulæ cum multo igne, & scarificatione vt sanguis extrahatur, excitetur calor natiuus & materia retrahatur. In principio verò morbi admouentur humeris cum scarificatione ad diuersionem & euacuationem. Sinapismi conuenit ad materiam ex alto ad circumferentiam trahendam. Syr. si ægri sumere possint, sint calidi, & sicci ad concoctionem cum incisione, vt mel. ros. syr. capil. ven. oxymel simpl. & scilliticum, syr. de byzantiis. Nocent plus æquo calidi, vt de stechade, quando huic affectui febris est coniuncta. Ideo conueniunt omnes, qui in febre pituitosa propinantur. Diss. syr. aquis adianti, capil. ven. hyf. rutæ, meliss. fœ. scabio. beto. elenij.

Apoz.
 ℞. radic. graminis, petro. asparag. ana ʒ. ij. omnium capil. ana M. j. hyss. meliss. beton. ana M. β. anis. scen. ana ʒ. j. seminis apij petro. cubearum ana ʒ. ij. florum chamom. stechados, anthos ana ʒ. j. seminis earth. ʒ. ij. ag. tro. ʒ. ij. fiat decoctio in lb. j. β. diss. mell. ros. ʒ. iij. sacch. q. s. fiat syrup. arom. ʒ. j. cinamomi aut zinzib. cap. in quatuor dosibus. In hoc apoz. ponuntur, quæ tenuant & incidunt calfaciendo, sed mediocriter propter febrem. Purgatio fit pillulis fortioribus, quas si non potest deglutire, hoc modo dissoluantur.

Pillula.
 ℞. mass. pillul. de ag. ʒ. ij. cochiarum ʒ. j. ag. tro. ʒ. β. diss. in aqua meliss. vel rutæ vel hyss. vel alia capitali. Nec est timendum de amarore. Nam ægri habent gustum stupidum. Additur mell. ros. ʒ. β. ob dulcorem. Si propter febrem, calorem metuas, pone syr. viol. ʒ. j. loco mellis. Additur aliquando tam in pillulis, quam in portionibus castorei ʒ. β. plus minus, quia plurimum prodest in doloribus capitis frigidis, cerebri, & neruorum,

neruorum. In principio præparata materia possunt dari leues pillulæ ad minorationem, quia morbus acutus est, & timendum est de morte: ideo à clystere statim sunt dandæ. Hæ si dissoluantur aquis, dosi est augenda. Nam sub forma potus, non tam diu manent in ventriculo, ut possint à capite vacuare. In his omnibus respiciendum est caput, & cerebrum confortandum, tum ad motis, tum assumptis. Valent, quæ dicta sunt in dolore cap. à pituita, ut illius theriacæ, quæ calfacit, extenuat, & siccet. Ea dissol. in aqua vitæ, amaraci, rutæ, singulari remedio aduersus morbum Italicum. Nunquam miscenda est theriaca medicinis laxatiuis, quæ vacuant attrahenda. Nam ea venenosa sunt & suo veneno trahunt: ideo si cum illis misceas theriacam, ea extinguit vim veneni, & per consequens attractionem. Porro theriaca tam sumitur, quam admouetur, ut & mithridatum, aurea alexandrina. Aut fit elect. aut opiata, aut conditum ex conseruis & pulueribus capitalibus. Hæc sunt satis ad curandum lethargum; quatenus morbus est.

*Castor. in
morb. cap.
fri. pro
dest.*

*Aduersus
morb. Ita.
vntio.*

Curatio lethargi cum symptoma est.

Cum verò symptoma est, curatio in fine & principio conuenit, cum curatione phrenitidis. Nam utrobique fit sanguinis missio, ventosæ applicantur, & percussiva, indicatione sumpta à loco, & situ, quod in nulla alia inflammatione fit. Differunt in medio. Nam in phrenitide conuenit conciliare somnum & quietem irrigationibus, emplastris, vnguentis, &c. In hac vigiliæ sunt excitandæ faciendo dolorem, clamando, fricando, pilos euellendo. Cum verò symptoma hoc superuenit febribus pituitosis & hemitritæis, vena secatur, admouentur cucurbitulæ humeris ad diuersionem, & euacuationem. Ligantur fortiter extrema, euelluntur pili, ut excitentur. Dantur clysteres acres ut fiat reuulsio. Inungatur caput à principio cum oxyrhodino aut cum oxymel. scillitico, vel cum oleo alio forti, & succo rutæ, deinde si opus est, ad fortiora veniendum.

R. coriandri præp. 3. vj. chama. stech. beton. meliss. ana 3. j. piperis longi & nigri euphorbij. ana 3. β. calami, zinzib. ana 3. j. misce, fiat pul. subtilissimus. Inspargatur post vntionem. In delicatis pro castoreo, & eu-

vntio.

phorbio, adde carioph. macis, nucis moscatae, spicae
schenanthi, ana ʒ. ʒ.

Annotatio in caput de Lethargo.

Lethargus cum morbi symptoma est, nec fit primaria capitis affectione, minùs propriè dicitur Lethargus, sed rectius Caros, Arabibus Subeth: èstque propè eadem vtrisque curatio, quia ab eodem humore habent originem. Cùm verò cerebri inflammatio est, phrenitidi contrarius dicitur, quòd in parte posteriore maximè fiat; & ex frigido humore putrescente, vt vult Galenus. Oblivionem & partium mouentium torporem adfert, quem febris non acuta, sed lenta sequitur cum profunda animi in somnum propensione, & aliis signis, quæ quia à Galeno & Paulo Aegineta exactè traduntur, non est necesse commemorare. Febris præcedit Caron, quæ pituitosa & spuria est, sed vehementior, quàm in Lethargo. Præterea Caros succedit aliis affectibus, vt accessionibus febrium, cerebri compressionibus, caluariæ confractæ, & in anteriore parte maximè consistit. Cæteri etiam soporosi affectus à lethargo ex humore in cerebro generantur, sed non putrescente, nec cum febre.

Suberbus sive somnus profundus. CAP. XIX.

*Causa
prima.*

Secunda.

*Nastur-
ty vis.*

Tertia.

FIt interdum à vermibus in pueris, & curatur vermibus occisis per amara, & eductis, deinde vncto capite modicè calidis, vt oleo lauino antiquo, de lillio, & fimi-
libus. Vnctio si molesta est, sinapismus fiat ex pul. de-
scripto in lethargo, remoto castoreo. Fit & subeth à
multitudine sanguinis, & curatur venæ sectione. Post-
ea calidorum vnctione, & sinapismo modicè exiccante.
Hic prodest edere nasturtium aut coctum in iusculis,
aut crudum in acetariis. Nihil enim est, quod cerebrum
magis exiccet & vigilias excitet, quàm nasturtium. Vn-
de illud prouerbum in somnolentos, Ede nasturtium.
Quare non possum nō mirari, quòd Fernelius somnum
conciliare scripserit cap. 2. lib. 2. pathologicon. Si fit
propter cicutam deuoratum, aut aliud medicamentum
frigidum, vel admotum foris, curatur antipharmaco.
Quòd si non possit inueniri, aut ignoretur medicamen-
tum sumptum, procurato vomitum (quod commune
est in omnibus venenis sumptis) nisi venenum id suapte

natura

Datura faciat, vt veratrum. Dentur communia vt the-
riaca, & mithridatium. Si sumpta est cicuta, præmisso
vomitu, antiquissimum vinum, aut aromaticum anti-
pharmacum est: vt & sumpto opio, aut papauere casto-
reum mixtum theriacæ dilutum vino, aut aliud, quod
multum calfaciat. Si accidat admoto cortice mandra-
goræ, aut opio, aut populeone, vngatur caput ol. ex ca-
storeo, aut ex viperibus, aut ruth. aut laurino, & si non
satis calfaciat, adde ʒ. j. castor. & ʒ. ss. fimi columbini.
Corpus exagitantum, ne dormiat æger. Vngantur na-
res confectioe anacard. aut theriaca veteri, dissoluta
in aqua samplici, aut alterius herbæ calidæ. Si suberit *Quarta.*
fit ob crapulam, aut à multitudine vaporum, statim ex-
citetur vomitus. Detur clyster acutus, roboretur ven-
tricus vng. Gal. detur potio sequens.

POTIO.

R. pul. aro. ros. ʒ. j. diacydonites sine speciebus,
vel cum speciebus (nihil enim refert) ʒ. ss. aquæ ab-
synth. mentæ ana ʒ. ij. misce, fiat potus. Vel detur tabu-
la vna diaga. vel ros. nouellæ, vel diamosci, vel diambre.
Calfiat & exiccetur cerebrum modis dictis, vel vnctio-
ne narium, vel capitis. Bona est etiam potio aquæ frigi-
dæ, quia prohibentur vapores. Si ob copiam pituitæ ser-
uatam in cerebro, dentur clysteres ordinati pro lethar-
go. Syr. & aquæ sint paulò calidiores, & ficiiores. Den-
tur pillulæ euacuantes pituitam per se, vel dissolutæ, vt
suprà docuimus. Item Opiatæ fortes, vt hiera russi, aut
hiera colocynthidos. Additur pauca quantitas castorei,
vt ʒ. ss. vel gr. iij. vt videbitur. Dissoluantur in a-
quis capitalibus. Caput eodem modo calfaciendum &
exiccandum. Pituita per nares, & per palatum trahen-
da masticatoriis & sternutatoriis. Affigantur cucurbi-
tulæ supra spatulas cum scarificatione, non quòd in-
tendas multum sanguinem educere, sed quia post sca-
rificationem inducitur dolor. Et optimum est si supra
vltus ponatur sal, vel muria. Fiant frictiones asperæ
cum sale & saluia, fronti. Tunc eiciendi astantes & pa-
rentes. Præstantissimum remedium, vt excitentur, est,
ferro aliquo capillos adurere, & superficiem cutis in
parte capitis posteriore. Sinapismus capiti appositus,
vel sterus columbarum, vel hyrundinum cum oleo de

Experiti.

Spica, & aceto acerrimo multum confert. Quod si his non excitetur, solis sacerdotibus committendus est. In hac affectione suppositoria acuta sale gemmæ, veratro, & cæteris sunt optima post pil. & aliorum remediorum operationem. Potio theriacæ antiquæ optima est, si dissolvatur in aqua ardenti beton. & similibus. At melissæ aqua magis placet rusticis, & mulieribus. Possunt etiam dari pul. capitales, vt diamosci, diambra. Vt magis propria fiant, adde castor. gr. vj. vel iij. vel ʒ. ß. secundum proportionem puluerum. Cômune omnibus cataphoræ est aceti acerrimi perfusio supra laminam ferream ignitam, quæ multos fumos acres excitat, qui naribus attracti cerebrum exiecant, somnûmque expellunt. Efficacius erit, si addatur semen nigellæ vel rutæ aut castoreum, quæ absument fumos, & materiam humidam in ventriculis cerebri contentam.

Annotatio in caput de somno profundo.

Somnum profundum intelligimus, qui naturalem moderationem excedit: qua ratione debet inter causas & affectiones morbosas numerari, & vt affectiones omnes soporiferæ, Coma, Caros, Cataphora, quas sub nomine Subeth Arabes comprehenderunt. De harum significatione multa & apud Galenum, & alios dissentio, vt quibus Cataphora & Caros modò pro eodem, modò pro diuersis affectibus vsurpentur. Sed cum in eo consentire videantur, quod inexplicabilem ferè dormiendi cupiditatem afferant, & ferè ab eisdem causis oriantur, parum interest exquisitam horum nominum distinctionem habere, modò causas somnum illum inexpugnabilem efficientes cognitæ habeamus, sine quibus curatio rectè institui non potest. Plurimum etiam momenti adfert affectæ partis cognitio, quam anteriorem capitis partem potius esse, & ventriculos cerebri, quàm corpus eiusdem Galenus voluit. Harum affectionû causæ potissimum duæ sunt, imbecillitas caloris nativi, qui humorum in capite defluentium multitudinem euincere non potest, & refrigeratio cerebri, siue intrinsecus, siue extrinsecus aduenerit, siue citra humoris còsortium, siue cum humore frigido, & crasso, vt pituita.

Sæpius

Sæpius alimenta & medicamenta siue assumpta siue admota, quæ supra modum refrigerant & humectant, hæc procreant: rarius, contusiones, vulnera, morbi capitis præcipuè musculorum temporalium. A virium imbecillitate, quæ ex morbo periculoso aduenit, hoc malum lethale esse scribit Galen. Inducitur aliquando non ab humoribus, sed à multitudine vaporum crassiorum, qui aut à toto corpore transmittuntur, vt in acutis quibusdam morbis atque in vigore, & in accessionibus febrium à pituita. Nonnunquam efferuntur è ventriculo aut intestinis, idq. non raro à calidis aut laxantibus medicamentis ob magnam fumorum copiam, quam ad caput mittunt: qualis est cassia fistularis, compositionesque omnes quæ illam recipiunt. Est enim humore & odore prædita, quibus cerebrum fumis replet, & inde cataphoram inducit. Huius generis quoque sunt myrrha, crocus, iris, modo frigidam capitis constitutionem nanciscantur. Nam in natura calida Cephalalgias & capitis grauitatem potius afferunt, vt docet Hippoc. Quomodo odorata muliebria ducere dicit, sed capitis grauitatem parere. Quod autem interdum in pueris somnus profundus concilietur, in causa sunt vermes ex chili putredine generati. Putrescendo nanque vaporibus ad cerebrum sublatis consopiantur, præsertim à pituita, cuius vapores sunt crassiores, humidiores, & magis continui.

*Cassia non
cumen in.*

De catathe, siue catalepsi. CAP. XX.

Catalepsi & catathe non multum à caro & lethar- *Disctum*
Ego quantum ad actiones læsas, sed materia differunt. Est enim catalepsi veluti comprehensio omnium sensuum ita, vt remaneant aperta aut clausa instrumenta prout à morbo deprehenduntur, vt quandoque videas egrotantes qui loquebantur, ore aperto remanere, & non posse loqui: oculos apertos, & non posse videre, & omnes alias partes in eadem dispositione seruant, in qua occupantur, ita vt eos dicas esse in extasi. Est aliquid medium inter phrenitidem, & lethargum, sed maior est copia sanguinis in catalepsi, minus frigidi, quam in lethargo, magis humidi, aut minus calfacti, quam in phrenitide. Ego puto similem, & simili modo fieri quo apoplexia. Nam vt in hac tota substantia cerebri irrigata est fri-

gido humore, sic in catalepsi, multo sanguine irrigatur tota substantia cerebri, & fit per defluxionem. Cuius rei est argumentum, quod subito & affatim fiat per defluxum sanguinis ad caput, qui obstructionem facit. Remanet tamen libera magis respiratio, quam in apoplexia. Hęc docet historia de adolescente apud Aetium ca. 4. ser. 2. tetrab. 2. qui magna sanguinis per nares eruptione liberatus fuit. Fit etiam à sanguine melancholico sub-

Historia.

stanti in cerebri occupante. Quam speciem ego vidi in quodam pago. Puella erat annos nata xv. quæ nupserat iuueni cuidam, quem parum amabat. Cum eo vixit tantum octo dies, antequàm corriperetur hoc morbo præ morore. Ratione morbi rediit in domum patris, in qua hoc morbo nūquam vexabatur, nisi cū de marito cogitaret, vel audiret de eo mentionem fieri, aut etiam si illa nesciēte ad illam maritus veniret, priusquam illum videret aut audiret. Quod si esset in via gestans hydriam aquæ, eam deponebat & sedebat, & per aliquot horas in eo statū remanebat, sedens vel decumbens, oculis & ore aperto, sine sensu & motu aliquo, nisi quod muscoli vētris, & costarum infernarum multum mouebantur. Alium vidi Romæ qui hanc affectionem simulabat, dicebātque se corripī extasi, quoties audiebat verba illa passionis Christi (consummatum est.) Quod cū ego audiuissem, volui probare an corriperetur verè, an fingeret. Eramus apud Alexandrum Hebrææ linguæ professore, & fortè eius vxor in mei gratiam recitabat illa duo verba, quibus auditis statim Iulius ille sacerdos correptus fuit extasi, quem cū vidissem & iussissem mihi adferri baculum, quo illius morbum excuterem, statim ad sese rediit eo audito. Auxit suspicionem, quod cū corriperetur ab insania, prospiciebat vndiquaque, vt caput suū reponeret, ne læderetur. Is verè erat melancholicus, neque tam fictione quàm insania hoc faciebat. Quare oportet omnes istos vel esse melancholicos vel nimio sanguine redundare, qui non est inflammatus. Igitur danda erit opera, vt victus rationem præcedētem intelligamus. Quod si liberalis præcesserit, facies rubicunda fuerit, & venæ iugulares inflatæ, ætas florēs vel puerilis fuerit, à sanguine morbum prouenisse indicio est. Quare

tenuem

Alia historia.

tenuem victum imperare oportet, illique dare alimēta, quæ parum nutrant, vt herbas in iusculo, cremorem pitæ sanæ tantum, non pitæ sanam totam, & similia alimenta, quæ vires seruare possunt, plenitudinem & cacochymiam minuere. Pro potu, vtatur syr. acetoso simplici. Si vires, ætas, & omnia consentiant, trahendus est sanguis ex vena cephalica ad magnam quantitatem. Cucurbitulæ adhibendæ in lateribus colli, & scarificatio faciendâ prope iugularem. Deinde clyster iniiciendus, vel ante vel post sanguinis missionem, prout morbus vrgebit. Caput perfundatur oxyrrhodino multo cum aceto parato, & potissimum si caput calidum præsentiat. Postremò vtilissimum erit in declinatione etiam aliqua digerentia apponere, vt pulu. capitalem post irrigationem ex oleo ros. antiquo vel chamom. Frictiones & ligaturæ conueniunt primum in brachiis: deinde in dorso, tertio in cruribus & extremis pedibus, vt sanguis deorsum trahatur. Si iuuenis sit, oportet setis nares pungere, vt sanguis e naribus fluat. Quæ est à sanguine catalepsis, multo facilius curatur, quàm quæ à melancholico, à qua & si curentur, remanent melancholici. Quare curandi erunt clysteribus trahentibus succum melancholicum ad inferiora, & medicamentis laxantibus, & humorem melancholicum purgantibus. Caput erit perfundendum ol. viol. cum paucis aceto. Hæmorrhoides prouocandæ, si aliquando fluxerint. Omnia alia, quæ cap. de melancholia dicentur, conuenient.

Observatio in caput de Catoche.

Galen. in Epidem. hanc similitudinem inter Catochen & Coma profundum constituit, quod in vtraque affectione sensus & motus consopiantur, quanuis Comatosi oculi perpetuò sint clausi, cataleptici verò aperti. Magnum tamen inter illa discrimen, tum in loco affectionem recipiente, tum in materia efficiēte existit. licet, quænam sit Catoches materia, plurimum ambigatur. Nam Gal. in Aphor. refrigerationem cerebri vehementem cum siccitate scribit Catalepsim committere. Ob id in Porrheticis Catalepticos tenso, apertosque oculos habere. Comatosos verò clausos addidit, quod in his humiditas affectionis causa sit, neruorum robur &

firmitatem dissoluens: in illis autem propter siccitatem
 tensio oriatur. In libro porro pulsum cum de Cato-
 chorum pulsu differit, vehementem refrigerationem,
 cui adiuncta sit siccitas, priuationis in toto corpore mo-
 tus causam esse statuit. Sed cum hæc affectio repente
 & statim inuadat, statim etiam desinat: non videtur à re-
 frigeratione & siccitate siue solis, siue commixtis com-
 mitti posse. Nulla enim affectio sicca generationem &
 solutionem in nervis, præsertim repentinâ subitanam-
 que habere potest, quemadmodum Galen. 2. de locis
 affect. concludit de Epilepsia: imò conuulsionem, quæ
 à siccitate fit in nervis, immedicabilem scripsit. Et ut
 tensionis nervorum siccitas causa sit, conuulsionem ta-
 men ab ea potius, quàm Catochen exoriri consenta-
 neū esset. Cum ergo in eo omnes conueniant, quòd re-
 pentè fiat, sine humore procreari non potest. Quis au-
 tem humor eam procreet, necdum satis definitum esse
 videtur. Aëtius interdum sanguinem, interdum humo-
 rem melancholicum esse tradit. Sed in quorundam re-
 prehensionem eo nomine incurrit, quòd si verum esset,
 omnes laborantes melancholia, eo affectu corripì oport-
 ere contendant. Ego autem nec necessario, nec semper
 id euenire debere, sed tamen frequenter, concedo, cum
 huiusmodi materiæ multitudinem venæ & arteriæ cere-
 bri, non ventres opplentur, unde rigescit corpus, & di-
 stensum in modum corporum à frigore congelatorum
 conspicitur, speciemque præbet eorum, quos vulgus in
 cælum raptos esse iactat, quod prima historia superius
 recitata indicat. Ob eamque causam venia dignus vi-
 detur Aërius, qui humorem melancholicum huius af-
 fectionis causam interdum esse statuit. Cuius verba li-
 benter hîc subiiciemus. Mediam (inquit) inter Lethar-
 gum & Phrenitidem affectionem reperies, quæ species
 est delirij & amentię. Medici autem Catochen & Ca-
 talepsim vocare solent: ex humore atræ bilis contin-
 gens, verum in febribus Lethargo similibus consistit.
 Aliquando verò palpebras habent apertas, aut nutant,
 aut intentæ videntur. Idem docet Paulus. Dicunt (in-
 quit) & priuatim diuersamque à vigili Comate Cato-
 chen fieri, cum simplicem, non mixtam habeat causam,



sam, nimirum frigidiorē siccioreque materiā, quæ
 posteriore cerebri ventriculo malum excitavit, quo qui
 corripuntur, repente in illo permanēt habitu, quo cor-
 repti sunt. Ex his verbis verum Catoche, Comatis vigi-
 lis, & eius affectionis, quæ inter Lethargum & phreniti-
 dem media est, percipimus discrimen, quod illa, scilicet
 ex non permixta, sed simplici materia: posteriores verò
 ex contrariarum caussarum permixtione nascantur. Cu-
 ius ignoratio efficit, ut quidam eum affectum, qui ex pi-
 tuita & bile flava permixtis in cerebro exoritur, Cato-
 chen appellant. Alij autem affectionem inter phreniti-
 dem & Lethargum mediam cum comate vigili confun-
 dunt. Sed nos pleniorē illarum distinctionem ex Gal.
 proponimus. Scribit enim coma esse in somnum dela-
 tionem nequeuntibus, qui ab hoc occupantur sympto-
 mate, vigilantium munia obire interdum fieri, ut clausis
 palpebris dormire nequeāt, sed plurimum vigilet, quod
 Hipp. coma non somniculosum appellavit. Cataphorā
 verò in somnum delationē coma esse. Atque inde fieri
 ut eosdem comatosos & vigilantes dici mirum non sit.
 Paulò post subiicit phrenitidē, quæ exquisita est, & nulli
 alteri morbo permiscetur, fieri, cum flava bilis locum, in
 quo princeps animæ pars residet, præhenderit: Lethar-
 gum verò, cum eundem humectarit, dilueritque pituita.
 Quibus verò uterque humor cerebro molestus fuerit,
 contraria symptomata hominē præhendere, ita ut cum
 vigilet, tum leuiter in somnum deferatur. Cum verò &
 ad somnum deferatur & desipit, mixtam ipsi permanere
 affectionem esse putandum. Nonnunquam & in horum
 alterū rem ita deflectere, ut vel bilis, vel pituita superior
 sit, atque ægrum aut phreniticum exquisitè, aut Lethar-
 gicum dici, sed quoties ad finem usque tum desipientia
 tum coma persistunt, affectionem hanc ex phrenitide &
 Lethargo permixtam appellari. Adhuc non minus accu-
 rate discrimen comatis vigilantis à catalepsi explicat se-
 cundo de caussis pulsuum. Quod porro Paulus post Gal.
 addidit, malum hoc in posterioribus cerebri ventriculis
 excitari, non absolute verum esse potest, cum partes fa-
 ciei & oculi pati simul deprehendantur. Cum enim hic
 affectus, ut Gal. testatur de symptom. cau. resolutio sit fa-

cultatis imaginatricis, quæ in anteriore magis, quàm posteriore cerebri parte sedem habet, non magis hanc, quàm illam affici iudicandum est. Proinde facile adducor ut credam, cerebri potius substantiam, quàm eius ventriculos siue anteriores, siue posteriores huius mali materiam recipere, alioqui Epilepsiam citius, quàm melancholiam, aut Catalepsim pareret. Id autem accidit, cum venæ & arteriæ, quæ per cerebri meninges disseminatæ sunt, humore multo & copioso affatim irruente implentur, & hinc inflatæ distenduntur. Ex quo non absimilem affectum esse Apoplexiæ dictum est: licet in Apoplexia vasa penitus sint obstructa, quo fit ut difficiliorem pariat respirationem. Fieri autem non solum ab humore melancholico Catoche, sed & frequentissimè à sanguine, argumento est eruptio sanguinis per nares in adolescente, cuius historia superius posita est ex Aëtio. Idem obseruavi in muliere nobili nomine (de Pignam) quæ cum Synocho (qui à sanguine febris est) laboraret, decimonono die Catalepsi correpta est: sed largo tandem fluente à naribus sanguine, recuperatis sensuum dysfunctionibus tanquam ab orco reuocata est. Nemo ergo nisi temerè, sanguinem interdum huius affectionis materiam existere inficiari potest. Leue enim est, quod obiciunt sanguinem humidum flaccidumque rigidas tensasque partes efficere non posse. Nam de paucis id concedimus. Sed cum copiosus est, multitudinem suam venas & arterias distendit, tensasque retinet, non alia ratione, quàm humorum plenitudo nervos in conuulsione contrahit tenditque. At fortè sententiæ nostræ aduersari quispiam existimabit, quod interdum Catalepsi depressa aliqua siue motus siue sensus officia aut in manibus, aut in pedibus vel palpebris restare visa sint. Nam cum Galeno in secundo Porrh. duplicem Catalepsim seu Catochen constituimus, vnam absolutam, quæ motum & vocem ægro adimit: alteram, in qua immotum & concretum quidem corpus est, exiguum verò quidpiam homo loquitur. Qualis est illa Aëtij, in qua spectabat & aliquando manus capiti admouebat æger, quæ in febribus Lethargo similis est. Superest ut intelligamus, quo pacto Catoche media quædam affectio inter Lethar-

thargum & Phrenitidem secundum Aetium dici possit. Id quod sic accipiendum esse censemus, quod maior sanguinis quantitas (qui inflammatus non est) minus frigidi, quam in Lethargo, magis autem calidi & humidissimi, quam in Phrenitide, huius causa sit. Quæ cum ita fiat, consentaneum est omnes Catoche detentos vel melancholicos esse, vel plenitudine sanguinis & exuperantia laborare.

De memoria diminuta.

CAP. XXI.

Memoria minuitur ob frigiditatem & humiditatem, interdum ob caliditatem, & siccitatem eximiam, sicuti & imaginatio. Si igitur imaginatio vel memoria ob frigiditatem & humiditatem minuantur, iisdem remediis curantur, hoc dempto, quod in imaginatione topica remedia oportet adhibere super mediam regionem capitis, & verticem: in corruptione verò memoriæ circa posteriorem partem. Purganda est sensim pituita, incipiendo à leuioribus. Detur clyster, qualis est descriptus in dolore capitis à pituita. Dentur pillulæ de hiera simplici, vel de aromatibus cum agar. formentur cum aquis capitalibus. Dentur autem illico post clysterem ante assumptionem syruporum. Nam syrupi calidi humores ventriculi secum trahunt ad venas, unde sequitur obstructio: quod in omnibus huiusmodi affectibus obseruandum est. Fiant syr. calfacientes & exiccantes cerebrum, ut sunt qui parantur ex syr. de stechade, de hyssopo, & aquis melissæ, betonicæ, sampsiuci, & similibus. Si velis magistralem facere, fac hoc modo.

℞. radic. galangæ crassæ 3. ℞. rad. ireos, gly. & zinzib. *syrup.*
an. 3. iij. pyrettri 3. j. meliss. betonicæ, sampsiuci, hyss. pulg. mentæ ana M. j. seminis anisi, fœnic. cubebæ ana 3. j. ℞. seminis apij petro. ana 3. j. florum stechad. anthos, saluæ, an. p. j. fiat decoctio ad lb. ij. in col. diss. mell. ros. col. q. s. fiat syru. mediæ coctionis. cla. & arom. cum 3. ij. cinamomi & 3. j. diamosci, utatur in quinque vel vj. matutinis. Utendo syr. cap. tertio quoque die clysterem, vel assumptis tribus dosibus syru. cap. 3. j. de pilulis præscriptis cap. de lethargo, vel præscribantur hoc modo.

R. massæ pillul. de arom. & assaieret ana ʒ. j. aga re-
cen. tro ʒ. ʒ. castor gr. ij. fiant pillulæ vj vel vij. cum oxy-
mel. scill. vel cum syrup. de stechade. Postea vratur tribus
aliis dosibus syrup. præscripti, & post syrup. cap. potio-
nem sequentem vel pillulas.

R. indi maioris ʒ. iij. elect. de citro sol. vel diacarth.
ʒ. ij. vel vtriusque ʒ. j. ʒ. aquarum meliss. & fœnic. ana ʒ.
ij. syrup. capill. ven. mell. ros. ʒ. ʒ. fiat potio. Vel in deco-
ctione capitali detur confectio hamech secunda descri-
ptione mes. ad ʒ. iij. cum diacartham. ʒ. j. vel cum syr.
capill. vel cum alio. Pillulæ ad eradicationem materie
erunt pillulæ præscriptæ, si addas tro. alandal. gr. vj vel
loco ʒ. illarum capiat pillulas cochias, vel de aga. Opti-
mum est semper parum castorei addere. Si nolint toties
accipere pillulas, fiat apozema laxatiuum addendo se-
minis earth. ʒ. ij. ag. ʒ. j. turbith ʒ. ʒ. ol. senæ ʒ. ij. Nam
non solum purgat melancholiam, sed pituitam. Po-
test etiam addi fœniculus marinus vulgariter vocatus,
qui purgat pituitam, simulque extenuat crassos humo-
res, & ciet vrinas, qui videtur esse verum empetro. Si ad-
dantur ʒ. iij. vel iij. syrup. de pomis compositis, erit effica-
cissimum & præstantissimum remedium. Ad corrobo-
rationem cerebri & exiccationem capiat opiatam ex
conseruis & pulueribus capitalibus, & theriacam anti-
quam vel mythridaticam compositionem. Laudatur
summè compositio anacardina. Sed hac non vtantur
medici propter nimiam calfactionem, & exiccationem
quam facit, & quod sæpius febrem accendat. Potest ta-
men dari hyeme, vbi alia non profuerint, his, qui sunt
frigido & humido temperamento, & vt securior sit vsus,
capiat ʒ. ʒ. semel in hebdom. cum ʒ. ij. conser. rosarum
vel violarum, vt magis reducatur ad mediocritatem. O-
piata magistralis, quæ summè laudanda erit, fiat hoc
modo.

OPIATA.

R. zinzib. conditi ʒ. ʒ. myrob condit. chebulorum, &
emblicorum vel indorum an. N. ij. conseruæ anthos, ste-
chad. vel florum saluiz, vel enulæ campanæ. (Sed hæc
propter amarorem solet poni in minore dosi) ana ʒ. j.
conf. rad. buglossi ʒ. vj. pulu. diambæ & diamosci ana ʒ.
j. diag.

*Sene pur-
gat pitui-
tam &
melācho.*

j. diag. 3. j. β. cubebarum & galangæ crass. subtiliss. pul.
an. 3. β. sacch. ros. 3. iij. syru. conseru. cortic. citri q. s. fiat
opiata, de qua cap. bis in hebdomada ad quantitatem
nucis ponticæ post cœnam. At extra laudantur inun-
ctiões præscriptæ in lethargo. Laudatur insuper inun-
ctio cum theriaca antiqua, vel cum confectiōe anacar-
dina, vel cum mythridato, quæ si dissoluitur cum aqua
vitæ, fiet præstantissimum remedium.

R. ol. glandis vnguentariæ (vulgus appellat semen
behen) ol. sambucini an. 3. iij. castor. 3. j. euphorb. 3. β.
piper. longi & nucis moscatæ an. 3. j. fiat vnguentum,
inungatur pars posterior cerebri. Si addatur parum a-
ceti, facilius penetrabit, sed cōmodius erit scil. quia scilla
est amica neruis, sicut acetum est illis aduersissimum.

A siccitate Cutatio.

Si à siccitate nimia proueniat, vt sæpe accidit post fe- *Vnguen-*
bres acutissimas & pestilenciales humectatur vniuer- *tum.*
sum corpus optimis alimentis. Vtatur hordeo illo mun-
dato suprâ scripto in vigiliis superfluis, ablato semine
papaueris. Humectetur cerebrum decoctione illa præ-
scripta in dolore capitis à melancholia minuendo quã-
titatem herbarum calfacientium, addendo ad maiorem
refrigerationem hordei mundati M. j. foliorum lact. &
viol. & cucurb. ana M. j. humectetur caput, vel ex oleo
sequenti fiat inunctio.

R. ol. viol. & amygd. dule. ana 3. iij. lactis mulieris 3. *Vnctio.*
ij. (quod nō misceatur, nisi tempore applicationis, quia
facile corrumpitur) pinguedinis gallinæ & anatis an. 3.
j. misce, vel si addas ceram, reducantur ad formam vn-
guenti. Laudatur frequens ablutio capitis cum deco-
ctione capitis veruecis, cui addatur hord. mundati, flo-
rum viol. bugloss. & berrag. ana p. j. ros. florum nenu-
pharis, ana p. β. humectabit, & refrigerabit. At intrâ v-
tatur elect. resumptiuo frigido, diatrag. frigidi, nucleis
pineis post pastum.

Curatio deperditæ memoriæ à frigidityte.

In deperditione memoriæ à frigidityte, & humidita-
te & pituita masticatoriis vtatur, caput purgiis, apo-
phleg. & aliis particularibus ac topicis remediis præ-
scriptis in dolore cap. à pituita. Castaneæ, quæ ex India

adferuntur, & formam renis habent, ita vt videatur esse quædam species anacardi, maximè laudantur, si coctæ in flamma candelæ fumantur. Vſus etiam zinzib. condiri poſt paſtum commendatur multùm. Quòd ſi repellantur radic. pyretri virides & condiantur, vt zinzib. præſtantiores erunt: ſi non adſint virides, & ſiccæ poſſunt macerari in aqua donec molleſcant, & condiri, vt zinzib. Fructus ligni vulgò vocati (Brefil) multùm etiam commendatur.

De Apoplexia.

C A P. XXII.

A Poplexia morbus eſt acutiſſimus, & extremus, & qui citò ſtrangulat: ob id extremis indiget remediis & fortiſſimis, ſed hoc animaduertendum eſt, vt à lenioribus incipiamus. Si quis enim extrema & vltima in principio uſurpet, in his permanendum erit quoniam ad fortiora non poſſit pertranſire. Extrema igitur remedia in tres claſſes ſunt diuidenda, in imbecilliora, mediocria, & extrema ſiue ſumma. Ergo ab imbecillioribus incipiendum. Sunt autem imbecillia in apoplexia, quæ mediocria cenſebuntur in epilepſia: & mediocria in apoplexia, quæ ſumma in epilepſia. Extrema igitur erunt, quæ iſtis mediocribus erunt fortiora. Ergo primum detur clyſter deſcriptus in epilepſia. In hoc morbo primus erit, qui ſecundus in epilepſ. vel fiat ad hunc modum. Primus clyſter ad ſecundam purgationem, & vt totum corpus incaleſcat, & dilatentur meatus, cum ſit ex obſtructione.

Clyſter 1.

R. mal. biſmal. rutæ, centaurij minor. ſambuci an. M. j. paſſ. pa. xx. ſeminis anis. fœnic. carui ana ʒ. iij. flor. ſtechad. anth. ſambuci an. p. j. polyp. querc. (ad purgationem melancholiæ) & ſeminis carth. ad purgationem pituitæ, an. ʒ. j. ag. ʒ. ij. vt fortior ſit, ſeminis vriticæ, quia purgat pituitam & calfacit potentiffimè, ʒ. iij. fiat decoct. In lb. j. col. diſſ. mell. roſ. col. ʒ. j. ſ. vel ʒ. ij. hieræ picræ & benediſtæ an. ʒ. ſ. Non ponitur colocinthidis, quia oportet prius inanire, quàm attrahere à partibus remotis, hieræ colocinthidos ʒ. j. ol. chamom. ʒ. iij. fiat clyſter, detur in principio. Erit enim in apoplexia primus, & in epilepſ. medius. Medius in apoplex. talis ſit.

Clyſter 2.

R. mal. biſmal. fol. lauri, centaur. minor. origani, calamenti

lamenti pulegij, herbæ paralyf. ana M. j. seminis cubeb. rutæ agrestis & vrticę ana 3. iij. polyp. quer. & seminis carth. ana. 3. j. ꝑ summmitatum thymi & florum anth. & stechad. ana p. j. ag. 3. iij. pulpæ colocint. 3. j. fi. decoctio. In tb. j. col. dist. indi maior 3. ꝑ. vel diaph. 3. j. benedictæ 3. j. hieræ colocint. 3. ꝑ. ol. liliorum vel anethi, vel rutacei 3. iij. salis gemmæ 3. j. ꝑ. fiat clyster medius in apoplexia, qui postremus est in epilepsia. Postremus & fortissimus talis erit.

℞. foliorum lauri, rutæ, centaur. minor. orig. calamenti, puleg. saluæ, melissæ beton. ana M. j. seminis vrticæ, cubebarum, seminis anethi, seseleos, & seminis rutæ agrestis ana 3. iij. ag. rad. elleb. ana 3. iij. pulpæ colocinth. 3. j. ꝑ. florum saluæ, summmitatum thymi, florum stechad. ana p. j. furfur. p. j. fiat decoctio. In col. dist. benedictæ, & hieræ colocinthidos, vel ruffi Archigenis ana 3. j. ꝑ. ol. rutacei vel nucum, vel anethi 3. iij. salis gemmæ 3. iij. fiat clyster. Si variandus sit clyster ob iterationem, interdum ponatur colocint. siue ruffi, interdum Archigenis. Post primum clysterem mittendus est sanguis ut solvatur plethora. Auicenna laudat sectionem saphenæ, sed quia est remotior & minor, quam ut plethoram soluat, aperienda est potius basilica. Aut ne toties iteretur venæ sectio, fiat venæ sectio de basilica, & ut attrahatur sufficiens quantitas sanguinis, oportet ab utroque brachio sanguinem mittere. Postea admoueat

*Missio
san.*

cucurb. cum scarificatione supra spatulas. Possunt etiam aperiiri venæ, quæ sunt sub lingua. Auicenna voluit in omni diuersione maxime distantes venas secari, quod non est imitandum, tum quia non soluunt plethora, cum sint exigue, tum ne cogantur multas venas secare. Fiant ligaturæ fortissimæ & dolorificæ, & frictions asperæ in extremis partibus. Interim dum primus clyster paratur, applicetur suppos. acutissimum factum ex mell. elleboro, sale gemmæ, pul. hieræ picræ. Hæc suppositoria maxime comendantur in omnibus frigidis affectionibus capitis, quia ob agitationem, quam faciunt, diuertunt. Si æger veras hæmorrhoidas inflatas habeat, aperiantur & non fiat sanguinis missio, si sufficienter sanguis fluat. Hisce peractis, detur secundus clyster, &

Cucurb.

*Non est
imitandus
Aut. in
sectione
vena.*

*Ligatura
frict.
supposito-
rium.*

semper fiant frictions, clamores, ligaturæ, & trahantur pili. Detur sequens potio excafaciens, & extenuans.

Potio.

℞. theriacæ antiq. mythrid. electi ana ʒ. ij. oxymel. scil. ʒ. j. aquæ vitæ ʒ. ʒ. aquarum melissæ & rutæ an. ʒ. j. Si ad fortiora remedia veniendum sit, dentur in potione pilulæ in aquis capill. diss. sic.

℞. pil. coch. & fœtidarum ana ʒ. ij. tro. alandal gr. iij. oxymel. scil. ʒ. ij. aquæ chelidon maior. ʒ. j. ʒ. mi. sce, fiat potio Hæc potio laxans ex pilulis dissolutis datur, si plethora non sit sublata aut diminuta per sanguinis missionem, per clysteres, & alia. Quando verò pilulæ ita dissoluantur, debent dari in maiori dosi, quàm solidæ. Si velis castoreum addere, poteris ad ʒ. ʒ. Laudantur pilulæ de euphorb. de lapide lazuli, & quæcunque fortissimè soluant: vt in epileps. vtimur ag. ita in hoc morbo colocinthide. Potio illa, quæ theriacam recipit, non est danda nisi post sufficientem purgationem per clysteres, & pilulas. Neque in ea debent addi tro. alandal, vt in alia ex pilulis dissolutis. Est etiam reiteranda potio pilularum vel alia similis, verùm post operationem pilularum datur potio prima Si verò pilulæ non moueant, datur tertius clyster & postea sequens potio.

Potio.

℞. pul. diamosci & diamb. an. ʒ. ʒ. castor. ʒ. ʒ. aquarum chelid. saluæ, rutæ an. ʒ. ʒ. fiat potio. Reiteretur vltimus clyster fortificando cum ag. & colocinth. adauctis. Quia non possunt vti garg. ponatur in ore sinapi dissolutum in oxymel. vel benedicta, vel diaph. & fricetur palatum.

Sternutatoria.

*Quibus
periculosa
fumigia.*

Sternutatoria post ista vniuersalia remedia applicantur tunc, sed circa principium non sine periculo. Aliqui fumigia parant, sed parum probari debent, quia in habentibus difficultatem spirandi periculosa sunt, quales sunt asthmatici, & apoplectici. Satiùs erit vel rutam, vel castoreum, vel galbanum, vel euphorb. naribus apponere, quia trahendo aërem, trahunt aliquid eius odoris ad cerebrum, & calefit. Aliqui ex practicis laudant galeam ignitam, & capiti appositam, sed melius erit eius loco vti sinapisimo aliq. simpl. vel compos. Sim-

plex

plex est, qui ex ficibus, & semine sinapi cōficitur. Compositus est effitax sic.

R. castor. eupho: b. ana ʒ. j. trium pip. sulphuris, nu-
cis moscatæ, ana ard. seminis verticæ ana ʒ. j. fimi co-
lumborum ʒ. iiij. fiat. pul. qui incorpo. cum ficibus vel
cum terebinth. addendo ol. petrolei, vel ol. de piperi-
bus, (modò non sit paratum, vt solent parare pharma-
copolæ vulgò, sed vt infra dicitur) vel ol. de lateribus,
vel laurini ʒ. iiij. ʒ. fiat ad formam emplasti, vel vnguen-
ti crassioris, & apponatur supra caput prius dera-
sum. Verùm ante sinapismi applicationem pro dropace fiat
talis inunctio.

R. ol. laurini, rutacei, de castor. ana ʒ. ij. aquæ vitæ
ʒ. iiij. misceantur, vng. caput, & postea admoueat^{1. Vngue-}ur sin-
apismus. Applicetur etiã ferrum candens (patellam
vocant) supra caput, & vrantur pili, & superficies cutis.
Si euadunt à paroxysmo, concoquere oportet materiam
& euacuare, sed quia in paralyfim alicuius partis desi-
nit, ad curationem illius sequetibus vtetur, & primum
oleo de piperibus, quod præparatur sic.

Oleum de piperibus.

R. trium piper. ana ʒ. iiij. medullæ seminis behen ʒ.
xx. radic. apij & fœnic. ana ʒ. iiij. serapini, opop. (qui est
in emolliendo efficacissimus) turbiti albi ana ʒ. ij. ʒ.
ag. albi ʒ. j. ʒ. zinzib ʒ. iiij. costi ʒ. iiij. (si recens ponatur,
M. j.) hyss. rutæ ana M. j. contundantur & decoquantur
omnia in lb. 24. vini vsq; ad consumptionem tertie par-
tis. Colentur & in col. adijce ol. ricinini, siue de cherua
heminas duas, vel sextaria iiij. rursus coquantur leui-
ter. Sunt qui addunt (quod est probandum) ireos ʒ. vj.
tapf. ʒ. ij. anis. carda. ana ʒ. j. ʒ. calami aro. ʒ. ij. ʒ. spicæ
nardi ʒ. ij. succi stecha. lb. ij. Iris & calamus aro. poni
debent in prima decoctione. Loco ol. de cherua, poni
potest oleum irinum, vel amyg. amar. vel cherinum, vel
nucum, vel antiquum. Hoc ol. debet esse admodum ca-
lidum, & succum, ac tenuium partium, vt facile ad soli-
ditatem neruorum penetret, cum dicatur cōferre mor-
bis neruorum frigidis. Quamobrem vinum loco aquæ
positum est, in quo fit decoctio. Myrob. loco posuimus
balanum myrepicam, siue glandem vnguentariam, ita

*to euellē-
dis pilis
conue-
nienti.
Inunctio.*

vocatam, quòd eius oleum antiquis assumeretur ad vnguentorum odoratorum confectionem, quia non facile ranceffit, & qualitates externas facile suscipit, & diutissime seruat. Hoc oleum etiam calculum vesicæ frangere dicitur. Vim habet calfaciendi & attenuandi. Et quia vocatur etiam myrobalanus, credendum est sciolum quendam expressisse, myrobalanorum communium nomine, homonymia vocabulorum deceptum. Communes enim myrobalan. astringunt, & crassarum sunt partium, qua ratione nervos potius læderent, propterea quòd aliorum commixtorum penetrationem impedirent. Loco hyosquiami albi, qui etiam refrigerat, condensat, ac etiam incrassat, positus est ag. albus, qui etiam foris admotus, vim quandam attrahendi pituitam à nervis habet, adiutus calore nostro, & aliis medicamentis. Loco caulis recentis, ponitur costus vel succus ad ℥. iij. vel recens ad M. j. Nam quanvis caulis nervorum morbis frigidis conferre putetur, longè tamen est efficacior costus: Aut si velis, yua arthetica, ratione id monstrante. Loco succi thymi ponitur stech. quæ maximè commendatur in affectus nervorum, siue intro sumatur, siue foris admoveatur. Præterea maxima thymi copia opus esset, ut inde possint exprimi ℔. ij. succi, seu sextaria tria.

In caput de Apoplexia observatio.

Apoplexia fit à sanguine pituitoso, aut à pituita. Cum fit à sanguine pituitoso, & venæ amplæ & distentæ sunt, cæteris consentientibus, vena secanda est non quidem saphena, vel maleoli, ut quidam imperant. Est enim exigua & longè distat ab officina sanguinis, ut nec sat citò, nec sat copiosus sanguis à capite reuelli possit. Satius est popliteis venam tondere, nimirum quæ ampla est, & tutò feritur. Potest etiam incidi cephalicæ utriusque brachij, ut & dextra, & sinistra pars exoneretur corpore sic vacuato. Magna est controuersia, per quas venas deriuationem moliamur. Venas linguæ quidam præferunt, sed quoniam apoplectici nec os diducere, nec linguam exerere possunt, chirurgus eas videre nequit. Quidam narium venulas scalpunt, sed vix hoc modo tres aut quatuor guttæ manant, vnde nil iuuatur æger.

Alij

*Missio
san.*

Alij malunt eas, quæ in medio fronte cœunt, vt in sanis etiam cernuntur. Sed hæ, & quæ sub lingua sunt, quoniam à iugularibus internis, vel externis oriuntur, præstat iugularem externam secare, angusta plaga, metu hæmorrhagiæ. Qui hanc sectionem damnant, quòd, vt solet brachium, sic collum ligari nec possit, nec debeat in tam magna difficultate respirandi, hi non intelligunt ligari brachium vt venæ sint conspicuæ. Satis vero sunt conspicuæ iugulares in apoplexia, quoniam sanguine ruete in caput, vaporibusque multis implentur & turgēt. Qui autem hanc rationem vituperant, quoniam à Guidone & aliis proditum est accepta vulnera in collo esse lethalia, quòd sectis iugularibus sanguinis erumpentis impetus non possit cohiberi, nec aduertunt verum esse, si omnino sectæ sint. Sed licet chirurgus eas modicè aperire, & cum satis sanguinis exierit, medicamento Gal. ex pilis leporis, aloe, thure, & albumine oui sanguinem cohibere. Quapropter id remedium præstantissimum censeo. Si phleb. non conuenit, cucurbitulæ cum scarificatione affigantur, non humeris, dorso, aut fontanellæ, vt Arabes volunt, quia illic nulla vena est insignis, quæ in cerebrum proueniat, sed prope iugulares, & quasi sub mento, si possunt adhærere. Hæc enim topica remedia sic adhibenda sunt, vt per venas fiant, non solum in partem ægram pertinentes, sed & in proximas & amplas, si partis constitutio id permittat. Indita glande, vel clystere iniecto, quorū exempla reperies cap. superiori, dari potest 3. j. pil. cochiarum in aqua vitæ dissolutarum, quia ea tenuitate partium summa, œsophagum defluente è cerebro pituita impeditum deterget, & sopitam facultatem expultricem irritat, & obrotum calorē natium excitat. Clyster è vino nunquam parandus est, qui è ventre ad caput vapor vini quàm citissimè attollitur. Sternutamentum prouocare (quod per uulgato errore statim omnes faciunt) noxium est, quia humor biliosus in corpore cerebri est, non in eius ventriculis. Itaque sternutatione non potest excuti. Præterea agitatione capitis & pectoris cerebrum oppletur humoribus ad se tractis. Quare sternutatio non conducit, sed etiam lædit plurimum. Multi per initia

Error quorundam.

*Friord.
li.ii.*

*Cerebrum
malè affe-
ctum.*

cucurbitas imponunt hypochondriis, vt humores à ca-
pite ad inferna detrahant, sed id cum noxa maxima,
quoniam muscoli abdominis intenduntur, respiratio-
nemque difficilem magis lædunt, quod est experientia
comprobatum. Dum enim tabidis, & asthmaticis in
catarrho mulieres eo remedio fuissent vsæ temerè, æ-
gros penè suffocarunt. Quòd si quis obiiciat, Aëtium
consensisse, respondendū est id sensisse quidem, sed non
in paroxysmo. Sunt qui theriacam aut mythrdatum
bibendum exhibent magno quidem errore, quoniam
in illis tamen diu seruatis vis opij non omnino perijt,
vt taceam antidota ea composita esse ex multis, quæ a-
stringunt, vt acacia, hypocistide, & similibus, astringen-
tium & frigidorum quantumuis hebetata facultas su-
specta est, quoniam humor, vnde morbus hic commit-
titur, cerebri corpus imbuat, & altius impingitur his
medicamentis. His accedit, quòd hæc calida multos va-
pores in caput efferunt, sicque malum augent, vt & o-
mnia odorata, vt diamoscum, diambra, &c. Quia cere-
brum suaves odores auidè haurit, & excipit, præsertim
cū malè affectum est: Proinde fugienda sunt hæc o-
mnia, sed eorum loco dandus est castorei ℞.j. aut ij. tum
piperis, zinzib. & euphorbij modicum. Hæc verò quan-
uis nonnihil excitent vapores suo calore, quia tamen
castorei odor est iniucundus cerebro, minus cerebrum
feritur. At vbi fuerit cerebrum expurgatum, turè den-
tur antidota, quæ principio damnauimus, vt theriacæ,
mythrdatum, quoniam cerebro imbecillo ex morbo
præcedente robur addunt.

De paralyfi.

C A P. XXIII.

Paralyfis siue resolutio interdum fit à sanguine, in-
terdum propter ictum aut casum, sed sæpius ex in-
temperie frigida & humida, atque à pituita crassa in
neruis imbuta & obstruente, ne animalis spiritus pos-
sit penetrare. Quia morbus chronicus est & difficilis cu-
rationis, non est pollicenda salus à medico intra pau-
cos dies, sed admonendi sunt ægri vt tolerant, & spem
habeant, quo facilius obtemperent.

Curatio paralyfis à pituita.

Si ergo fiat à pituita, curetur hoc modo. Primùm di-
stingua-

tinguatur syru. in classes, & medicamenta soluentia, & unguenta, & omnia topica. Nam in hac affectione semper à debilioribus incipiendum est, & per mediocria ad summa veniendum. Sed necesse est inter ista remedia esse aliquod interuallum. Nam affectio est valde chronica, ob id sensim euacuare & exiccare oportet. Detur à principio clyster, si sit aluo astricta, vel si nihil veret, prouocetur vomitus. Nam clysteres & vomitus maxime laudantur in hac affectione. Ad clysterem igitur accipe mal. bismal. betas, & similes ad remollitionem, miscendo quæ calfaciunt & attenuant, & fiat decoctio in iure aliquo pingui, vel in oleo, non tamen oportet multum remollire in hac affectione per clysteres, ne sedis musculus relaxetur. Clyster primus fiat hoc modo.

R. mal. bismal. ciela, pariet. ana m. j. yux artheti. *Clyster 1.*
 cæ, primula veris (quam alij putant esse speciem verbasci, alij tapsum barbatum odoratum) foliorum ruta, & centaurij maioris ana M. ss. semina. anis. fenic. & sesel. ana ʒ. ij. fiat decoctio in brodio multum pingui, & capite veruecis, vel in oleo communi antiquo, meliusque erit, si fiat in oleo. Quod si antiquum non sit in promptu, adde maiorem quantitatem olei, & sine diu bullire. In lb. j. col. dissolue mel. anthos ʒ. ij. hieræ logodij, vel Ruffi, vel Archigenis ʒ. ij. hieræ picæ, & benedictæ an. ʒ. ss. misce, fiat clyster. Si hieræ ponantur in morbi huius principio, debent poni in parua quantitate. Fortiores fient, si addantur herbæ magis calfacientes, vel si *Fortiores clyst.*

dosis hierarum augeatur. Addatur in decoctione agarius, colocinthis, & cætera. Fient imbecilliores, mediocres, & fortiores eo modo, quo monstratum est in cap. de apoplexia, quæ morbus est acutissimus, ob idque oportet multum & cito euacuare, cum differre non concedatur. In hac autem affectione dantur induciæ. Accipiant igitur post clysteres (vt quæ sunt in ventriculo vacuantur) pilularum de hiera simp. ʒ. j. cum aga. tro. scr. j. & castorei gran. iij. (quæ oportet semper vti remediis affectioni curandæ propriis, sicut & parti affectæ) vel pilulas de arom. vel hiera composita. Istitis pilulis utatur *Pilul. post clyst.*
 ser in hebdomada; postea syrup. materiam pituitosam *Syrup.*

concoquentibus & incidentibus. Syrupi optimi sunt de stechade, de bixantiis, mel. ros. colatum, anthosatum, scyll. & aliquando oxymell. scill. sed quia acetum inimicum est nervis, propterea ab eo est abstinendum. Simplicia ex quibus fiunt syrup. aquæ vel decoctiones sunt rad. galangæ, ireos, zinzib. fœnicu. apij. petro. condisi (quod putatur esse strution) enulæ campæ. aristoloe. pyretri, calami arom. & zedoariæ. Herbæ, vt pollium montanum, marrub. chamæpithis, primula veris, pulicaria, saluia, yua arthetica, origanum, calamentum, nepeta, chelidonium vtrunque, hyss. thymus, stechas, pulegium, serpillum, syimbrium, meliss. beton. ruta. Semina cubearum, rutæ agrestis, seseleos, carui, cumini, apij, petro. card. piperis triplic. balsami, & terebinthi. Flores stechad. anthos, schenanthos, sambuei, saluæ. Ex his conficiuntur syr. decoctiones, balnea, stuphe. Syrupi hoc modo.

SYRUP I.

R. mel. ros. col. mel. anthosana ʒ. j. syrup. de hyss. ʒ. ij. aquarum yuæ artheticae, herbæ paralytis, saluæ an. qr. j. misce, pro tribus dosibus manè. Si velis cla. & aro. id fiat cum nuce muscat. vel galanga tenui aut crassa, vel cum diambra, diamosco, & similibus. Si non clarificetur, detur tabula vna diagalangæ, vel ros. nò. Hoc digestium erit pro principio. Verùm adaugeri debet in morbi processu, vt monstrabitur in sequentibus syr. Dos is syrup. & aquarum, vt sufficiat ad 5. aut 6. sumptiones, quia materia eget præparatione longa. Et cum vtuntur his syrup. vtantur tertio quoque die, vel clystere, vel pilulis ante pastum. In medio morbi vt i oportet syrup. ex aquis mediocribus. Fiat igitur tale digestium pro medio morbi tempore.

*Digest.
syr.*

R. mel. anthos. ʒ. ij. syrup. de stechad. ʒ. iiij. aquarum saluæ, yuæ arth. primulæ veris, melissæ an. qr. j. misce, pro 5. dosibus cla. & arom. modo supra dicto, vel dentur tabulæ prædictæ. Fortiores post alios syr. & multas euacuationes dandi sunt parati sic:

*Fortiores
syrupi.*

R. mel. scill. ʒ. iiij. syr. de stechade ʒ. iiij. aquarum chelid. rutæ, fœnic. saluæ, yuæ arth. an. qr. j. misce pro vj. dosibus aromat. vel dentur tabulæ, vt supra. His omnibus pera-

pera-

peractis, dandum erit apoz. sequens quod erit fortissimum, efficacissimum, & vltimum. Calfacit enim, concoquit, attenuat, digerit, & purgat pituitam.

A P O Z E M A.

R. rad. galang. ireos virid. (recens pituitam purgat, & feros humores, sic ea pituitam attenuat & incidit) enula campanæ. scenic. apij, petro. an. ʒ. j. cal. aro. rap. pyrethri an. ʒ. ʒ. saluix, rutæ, foliorum lauri, calam. orig. pulg. chamæpith. ana M. j. primulæ ver. chamed. chelid. an. m. ʒ. (Possunt & alię herbę præscriptę in sylua symp. addi) seminis cubeb. seseleos, rutæ agreß. (quod efficacissimum est in extenuanda pituita) ana drac. ij seminis vrticæ & carth. an. ʒ. ij. seminis iuniperi ʒ. ʒ. agar. esulæ, (quæ verum est turbith.) an. ʒ. iij. (in robustis & bene habitis addi potest veratrum ad ʒ. iij.) florum stechados, saluix, anthos an. p. j. raf. ligni indici q. j. ʒ. macerentur radices & lignum per noctem in aqua & vino albo, & sensim leuiterque decoquantur. Postea ponuntur herbę & alia, quę simul coquantur, & fiat syrup. vt artis est. addendo melil. ros. vel anthos. vel scill. q. s. saltem lb. ʒ. cum pauco sacch. clarificetur & aromatizetur cum ʒ. ʒ. cinamomi & ʒ. iij. zinzib. capiat ʒ. vj pro dosi tertio quoque die. Potest coqui media pars syr. perfectè vt conseruetur, & si spissior fuerit, detur cum decoctione cicerum rub. vel ligni indici. Vtatur attenuante victu, sit in loco calido. Si sudor moueatur, addantur lapides calfacti, & melius cooperiatur, vt magis sudor prouocetur. Nam hæc materia iuuatur sudoribus.

P I L U L E.

Pilulæ conuenientes in hac affectione, sunt etiam in classes distinguendæ, imbecilliores sunt pilulæ de hiera simplici, cum agar. vel de hiera compos. pilulæ de aro. & quę sunt sine diagridio, & sine colocint. Medię autem erunt eadem, si addatur tro. alandal. gr. iij. aut iijj. fortissimæ sunt pilulæ de euphorbio, scætidæ, cochix, de opop. de sagapeno, de assa scætidæ, & similes.

C O N S E R V A.

Conseruæ laudantur omnes, quę calfaciunt, & exiccant: vt zinzib. conditum, pyretrum conditum, conserua secacul. Est autem secacul, quod vulgò Mequinum

appellant, non autem est radix polygonati, quod vocatur
 sigillum Salomonis, vt quidam putant: ob id malè v-
 tuntur ad Venerem, nisi in picuosis, cum sit radix sicca.
 Arabes magis vtuntur ad calfactionem & exiccationem.
 Alij putant esse radic. iringiorum, sed malè. Mequinum
 autem est radix simillima zinzib. & conditur vt zinzib-
 ber, sed est calidius, sine humiditate, quæ tamen reperi-
 tur in zinzibere. Ob id zinzib. patitur cariem, non Me-
 quinum, qua nota à zinzibere distinguitur, sicut etiam
 filamentis, & vllis quibus caret Mequinum, non autem
 zinzib. Maxime laudatur in paralyfi pudendorum
 cōserua florum saluiz, anthos, stechados, inter quas sal-
 uiz, & stechados obtinent principatum, in hoc morbo,
 & omnibus neruorum affectibus: cōserua etiam enu-
 læ campanæ, & cōserua ireos. Cōserua acori vulgaris
 non probatur in hac affectione, quia astringit & increas-
 lat. Sed verus acorus est galanga crassa. Si galanga in a-
 liquibus locis reperiatur, recens cum melle conditur.
 Eius enim cōserua præstantissima erit: sin minus, pone
 loco cōseruæ, 3. j. galangæ crassæ. Commendantur et-
 iam confect. cheriaca, anacardina, mythridatium, aurea
 Alexandrina. Pulu diambæ, diamosci dulcis, diagalan-
 ga, diacastorei, ros. nouellæ, diacalaminthes, & eorun-
 dem electuaria. Pilulæ laudatissimæ in morbis cerebri,
 & neruorum frigidis, nouæ & anonymæ à me primum
 inuentæ hæ sunt, & vocantur de beniouin.

*Quid me-
quinum.*

*Quæ con-
serua con-
ferant.
Cōser.
noxia.*

*Confect.
Puluer.*

Pilula de beniouin.

R. assæ feetidæ 3. ij. castor. euphor. beniouin (quod
 est laserpitium) opop. sagap. an. 3. ss. tro. alandal. 3. j. ss.
 feminis rutæ agrestis, gal. cala. ar. spicæ nardi & celticæ
 an. scrupu. j. cinamomi, mastiches, sarcocollæ, myrrhæ,
 croci, elulæ, an. 3. iij. ag. tro. 3. iij. cum tereb. q. s. ad
 incorporandum, fiat massa pilularum addendo mell.
 scill. (ad gustum, & ne tam facile acescant) yuzæ art.
 drach. j. ss. stech. scrup. ij. fiant pil. vij. pro drach. Addi po-
 test veratrum in pondere 3. j. & diag. scrup. j. Sed hoc est
 in fortissimis morbis. Ponitur diagredium. Nam semper
 vbi veratrum ponitur in parua quantitate, illi miscen-
 dum est vel diagred. vel aliud forte medicamentum,
 quod

*Cautio
Geratri.*

quod illud foras è corpore propellat, alioqui diutius manet in corpore, & illud cõturbat, gravemque noxam infert. Assa fœtida præstantissima est in paralyfi, sed præstat uti in pilulis, quàm aliter, ob fœtorem & insuavitatem. Hæ pilulæ valent etiam in doloribus iuncturarum, si addas hermodactil. & zinzib. ana 3. ss. In morbo articulari erunt meliores, si addas myrobal. drac. j. Valent in epilepsi. si addas tro. de scilla 3. j. ss. vel carnis scillæ assatæ, si reperiatur 3. j. & seminis pœoniæ, & rad. eiusdem drach. ss. Valent in mania si addatur veratrum, vel lapidis lazuli ad scrup. ij. Melius usurpantur tro. de scilla in opiatis & aliis confectionibus quàm in pilulis, quia ob farinam hordei, quæ in illis multa est, magnam molem occupant, & sic pilulæ essent multæ cum paucâ efficacia. Item pilulæ debent assumi cum multa custodia. Si in tempore, & temperatura multum calidis, minuatur dosis assæ fœtidæ, quia facile febrem accendit, si frequenter assumatur. Quare si accedatur, modò non sit putrida, optimum est, quia materia exiccatur. Et in hac affectione ut accendatur febris, aliqui solent confectionem anacardinam exhibere, non tamen debet excitari ephemera, nisi purgato prius corpore, ne ex ephemera fiat putrida. Si ergo exciterur ephemera, nil fiat, sed sinatur: Si autem putrida, vel etiam continua, aut medicamentis, aut alia causa calida, curanda erit, ut postea monstrabimus cap. proprio, quod est decimum ab hoc cap. 33.

T O P I C A.

Post quamlibet euacuationem vniuersalem uti oportet particularibus, ut garg. masticator. caputpurg. sternutat. maximè cum paralyfis facta est post apoplexiam, vel propter aliam affectionem cerebri, vel vertebrarum colli. Nam per tales affectiones pituita educitur è cerebro, quæ ad partes affectas difficillimè fluit, & capita nervorum obstruit. Utatur itaque masticatoriis, caputpurgiis, gargarismatis, fumigiis, & aliis præscriptis in dolore capitis à pituita. Utatur gargarismate secundo illic præscripto, quod recipit gly. rasam, &c. Fumigia maximè commendantur ad exiccationem cerebri, quæ parari possunt eo modo, quo suprâ diximus in do-

lore cap. à pituita., sed augeatur dosi nigellæ romanz,
aut si non sit, addatur ad vnc. j. sed prius macerari debet
in aceto & exiccari. Potes etiam hoc modo præscribere
fumigia.

Fumigia. R. gum. hederæ nigellæ torref. ana ꝑ. ij. mastic. thur.
myrrhæ, cubebarum ana 3. vj. beniouin, styrac. florum
anthos, stechad. ana 3. j. β. macis, garyoph. ana scrup. j.
con. cass. grosso modo, fiat suffumigium.

B A L N E A.

Laudantur balnea naturalia, bituminosa, sulphureosa,
& nitrosa. Non ita probantur aluminosa, quia nimium
astringunt, nisi fuerit in morbi declinatione. Parantur
etiam balnea ex herbis calfacientibus, & exiccantibus,
& attenuantibus, & sudores mouentibus, sed maxime
obseruandum est, ne balneum sit valde calidum actu.
Sufficit tepidum esse, aut paulò calidius. Nam hi, qui
sensum amittunt non sentiunt, & si valde lædantur, &
ob id multa accidentia sequuntur. Resoluitur quippe
naturalis calor, ex diuturna in illis mora, & ex illa super
calfactione exiccantur pustula, fiunt vlcera, & mortifi-
cationes extremarum partium, in his maxime, qui ob
compressionem, vel ligaturam non sentiunt vel debiles
motus habent. Balneum bituminosum, vel sulphureum
fit hoc modo.

R. aquæ q. s. ad innatationem: ad lb. centum aquæ
appone sulphur lb. vj. aut bituminis tantundem, & erit
balneum sulphuris aut bituminosum, eandem vim ha-
bens ac naturale, sed non parem efficaciam. Erit enim
paulò imbecillius. Aqua sit alicuius fluminis tardi mo-
tus, vel alicuius stagni. Possunt admiscei radic. & her-
bæ sic.

R. rad. pyreth. galang. ana ꝑ. β. rad. ireos sicæ lb. j.
radic. cucum. agrest. & enulæ cam. ana qr. j. rad. cyper.
lb. β. chamep. cala orig. sampf. parthen. saluiz rutæ, fo-
liorum lauri, roris. pulegij, mentastri ana m. ij. vel iij.
Possunt etiam addi aliæ herbæ calfacientes, attenuan-
tes, vt beton. melyss. hyss. laurundula, saluia, absynth. &
similes, vt etiam radic. bardanz, quæ potentissimè mo-
uent sudores, & aliæ eiusmodi, florum stech. anth. sal-
uiz, cham. ana p. j. fiat decoctio pro balneo, in qua possit
inna-

*Radix
bardana
mouet su-
dore.*

innatare æger: herbæ ponantur in sacco, super quem sedeat. Si decoquatur vulpes viua ad dysfunctionem ossium, vel catus viuus, erit sufficiens balneum. Sic ol. vulpinum commendatur in hac affectione. Aliqui laudant irrigationes sensim & ex alto factas, sed nimium est morosum: ob id satius est vti lauacro. Stuphæ siccæ maxime laudantur in paralyti, quæ possunt fieri cum hac decoctione irrorando lapides calidos. Vel hoc modo decoctio ponatur in vas aliquod angustî oris, super quod ponatur embotum, quod sit collo oblongo, fiat foramen in Tina, & applicetur embotum foramini, vt fumus seu vapor omnis decoctionis ingrediatur in Tinam bene coopertam, & vt decet, paratam. Vas illud angustî oris debet circumdari carbonibus ignitis, vt decoctio seruetur calida. Tina sit oblonga cum pedibus sufficienter altis, vt vis decoctionis sub ipsa possit manere cum opus fuerit. Parabitur autem hoc modo: Infra Tinam ponatur assula, seu tabula multis foraminibus perforata, inter quam & fundum Tinæ sit interuallum, vbi sint lapides calfacti. Super illam assulam ponantur herbæ, super quas iaceat æger, donec prouocetur sudor, & hoc ieiuno ventriculo faciendum. Panno sicco abstergendus est sudor, in egressu stuphæ, postea inungendus est æger ol. antiquo vel vnguento. quia pori tunc sunt aperti, & vis vñctionis facile penetrabit.

Olea paralyti apta & vnguenta.

Olea apta huic negotio sunt, quæcunque calfaciunt & siccant, & tenuium sunt partium & digerunt. Vnguenta verò quatuor illa calida communia, si modò bene præparata fuerint. Olea verò imbecilliora sunt ol. chamomil. nardinum, liliorum descriptione Mes. Nam ex descriptione Nicol. rosæ sunt auferendæ, & minuenda dosis mastich. veluti ad 3. ij. item oleum antiquum. Mediocria sunt ol. amygd. amar. ricininum (vulgo de cherua dictum) de narcisso. Fortissima, ol. laurinum, de costo descriptione Mes. Nam in descriptione Nicolai loco oleandri, cuius succum ponit ad lb. j. substituere oportet cyperi lb. j. Oleander enim refrigerat, astringit, & incrassat, quod ex diametro pugnat cum scopo nostro, sed deceptus est affinitate vocabulorum. Oleum

de crôco, nucum, de nuce indica, de spica, de piperibus, paratum, vt dixi, ol. philosophorum, irinum, sambucinum, rutaceum, de euphorb. & similia. Sunt etiam alia olea, quæ & tota substantia, & proprietate occulta conferre huic morbo creduntur, quæ ad media referre oportet, vt vulpinum, decato, de cidonia.

De pinguedinibus.

Pinguedines ad confectionem vnguentorum imbecilliores sunt anatis, anseris, gallinæ. Mediæ, pinguedo cari & maxime agrestis, vulpis, taxi. Fortissimæ, leonis, pardi, viperarum, & serpentum communium. Sic de medullis est faciendum. In vnguentis additur interdum aqua vitæ, & succi aliquarum herbarum, vt chamep. saluix, rutæ & similia. In vnguentis & emplastris hoc obseruare oportet, vt ab imbecillioribus incipiamus. Conficiatur itaque inunctio pro principio ex imbecillioribus oleis, & pinguedinibus, additis aliquibus exiccantibus & resoluentibus, vt si fiat hoc modo.

Inunctio

pro principi.

℞. ol. cham. ʒ. iij. ol. liliorum ʒ. ij. laurini ʒ. j. ping. anat. & gall. ana ʒ. iij. Si fieri potest, iam sint rancidæ, vel ob antiquitatem deposuerint superfluum illam humiditatem, & tenuitatem substantiæ acquisierint, succi chamep. & saluix, an. q. j. ceræ parum, fiat vnguentum, quod erit optimum pro principio, & pro iis, qui sentiendi imbecillitatem habent ob ligaturam. Si imbecillius sit hoc vnguentum, addatur parum aquæ vitæ, vt ʒ. ss. & fiet efficacius. Hoc vnguentum aptum erit pueris, senibus, & mulieribus. Medium vnguentum erit illud vocatum de bdellio, vnguentum aragon, Martiatum si bene paratum fuerit. Possunt hoc modo confici vnguenta media.

Vnguenta media.

℞. radic. acoti, id est, galangæ crassæ ʒ. j. radic. ireos ʒ. iij. chamep. primulæ veris, saluix, stechad. ana M. j. olei laurini, & de lilio an. lb. j. vini optimi lb. j. ss coquantur simul ad vini consumptionem. Et posteaquam refrigeratum fuerit, adde piper carda, cala, aro. castor. bdell. liij an. ʒ. j. mell. & ceræ parum, vel propoleos loco illorum, fiat vnguentum. Fortissimum est vnguentum illud quod describitur à Gainerio, cap. de paralyfi, quod habuit

Fortissim.

habuit ab eremita alchymista. vel fiat aliud hoc modo.
 ℞. ol. nucis indicæ ʒ. ij. de costis, de piperibus, de terebinth. an. ʒ. ij. succi chamep. succi saluix & peucedanⁱ (si reperiatur verum peucedanum mōtanum, nam quod pro eo ostenditur, est hypomaratum) vel loco eius succi rutæ an. ʒ. iij. castor. ʒ. ss. piper. longi, pyretri an. ʒ. iij. sagapeni, opog. bdellij an. ʒ. ij. pingued. taxi tb. ss. ping. viperæ ʒ. j. vel serpentum communium, ʒ. ij. (sed terrestres sunt eligendi, & non aquatiles, quia sunt excrementosi, & multum humidi, & non tenuium partium) fiat vnguentum vt artis est. Oleo de nuce indica loco accipe pro pauperibus ol. nucum communium antiquiss. vel si non adsit, paretur ex nucibus rancidis, aut recens coq. lento igne & pro ʒ. j. ol. nucis indicæ, pone ʒ. ij. ol. nucum communium. Fiet efficacius remedium & ferè vltimum sic.

℞. ol. gaiaci ʒ. iij. vel ol. cedoritⁱ, quæ est species iuniperi, tb. ss. pingued. viperæ, vel serpentis communis ʒ. j. si non adsit pinguedo, pone cineres serpentum ad ʒ. ss. Comburentur in furno intra vas terreum bene lutatum euphorb. castor. an. ʒ. j. myrrhæ, cardamomi, aff. foetidæ, gummi hederæ, gummi elemnij ana ʒ. ss. trium piper. cubeb. nucis moscatæ, garyoph. yuæ arth. an. ʒ. iij. cum terebinth. & pauca cera fiat vnguentum. Fiet adhuc fortius addendo succi scillæ, & chelidon. minor. an. ʒ. ij. Vel fiat talis aqua.

Aqua excellentissima.

℞. aff. foetidæ, ammo. bdellij, gummi hederæ, myrrhæ, euphor. castor. carda. an. ʒ. ss. beniouini & gummi elemnij, terebinth. & mastiches ana ʒ. j. seminis agrestis, bacch. lauri, pyretri, cubeb. nucis moscatæ, secacul. trium piper. an. ʒ. ij. carnis scillæ radic. narcisci ana ʒ. iij. radic. eucume agrest. ʒ. j. chamep. saluix, florum & foliorum rorif. & trifolij foetidi ana p. j. omnia in vino per noctem temperentur & ponantur cum vino in alambico vitreo simul, distillantur: prima aqua erit imbecillior, secunda fortior. Si addas residuæ aquæ rutæ tb. ss. aquæ sublimationis prioris tb. j. & rursus distillantur, fiet medicamentum efficacissimum, & maxime tenuium partium, quo vti debemus in extremis.

morbis. Cum cera prius remollita, ne aqua calefiat, potest incorporari, & fieri ad formam vnguenti, vt magis adhæreat cuti.

OPATA.

Ad intra dantur aliqua ad cerebri confortationem & neruorum, & ad extenuationem materiæ, vt theriaca antiqua, mythridat. pul. diamosc. dulc. & amari, pul. diambæ, dianthos, diag. diacalamites, diatrium piper. & diacaſtor. & alia omnia, quæ calfaciunt & attenuant.

CONSERVA.

Confer. valentes in hac affectione sunt, conserua ſaluix, ſtech. anth. ſecacul, zinzib. conditum, pyretrum conditum, galanga condita, non communis acorus, niſi fortè in declinatione, cum per leuiter astringentia & aromatica volumus corroborare neruos. Sunt qui maxime laudant vſum aſſe foetidæ & caſtoſei, ſed quia ſunt foetida, & ingrati ſaporis, ſatius erit pilulas ex illis ad corroborationem & exiccationem ſic parare.

R. caſtor. 3. ij. euphorb. 3. j. aſſ. foetidæ 3. ſſ. chamep. ſorum ſtecha roriſ. & ſaluix an ſcrup. ij. pul. diamoſei & diambæ, vel ex aliis pulueribus, vt dianthos, ex vno aut duobus 3. j. cum ſyrup. de ſtechade & terebinth. fiat maſſa pilularum, de quibus cap. pilulam vnã poſt primum ſomnum. Opiata autem poteſt parari eo modo quo docebimus cap. de epilepſ. Hoc tantum intereſt, quod maiorem doſim conſeruæ zinzib. vel pyretri, vel enulæ campanæ debemus exhibere. Ex conſeruis nunquam debemus omittere conſeruam roriſ. & ſaluix. Quod ſi magis placeat ad corroborationem & exiccationem totius corporis, vtatur aqua theriacali, aut hyrundinum, quæ deſcribentur cap. de epilepſ. A qua ſublimata huic morbo propria, & quæ maxime commendatur, talis eſt.

Aqua ſublimata.

R. ſorum roriſ. lb. iij. aquæ ſaluix lb. j. diſtilla in balneo mariæ: accipiat ſemel in hebdo. cochlear vnum ieiuno ſtomacho. Quæcunque enim multum calida & tenuantia ſunt, debet ſumi vacuo, & prius purgato ventriculo, nec commiſcenda ſunt cibis. Nam cogerent cibos

bos nondum concoctos secum descendere, & sic parent obstructions. Quia interdicens sunt vino hi, qui paralyfim patiuntur, confici debent potiones, quibus vtantur loco vini. Sunt, qui laudant aquam hordei, quæ tametsi abstergit, nõ multum tamen laudanda est. Nam si parum cocta sit, flatus generat: si perfectè concoquatur, nimis nutrit, crassos & glutinosos humores gignit. Quamobrem satius erit vti aqua mulsa. Quòd si valentiores desideres, fiat sic.

Potus aqua mul-

℞. flor. roris. stechados & saluæ an. p.j. aquæ fontis *sa.*
 ℥b. ix. (non aquæ fluuiialis, quia astringit) mell optimi *Aqua*
 despumati ℥b. j. coq. leuiter, cla. aro. cum ʒ. iij. zinzib. & *fluuialis*
 ʒ. j. galangæ & cinamomi. Vtatur loco vini. Obseruare *astringit.*
 oportet, ne mel sit ex eo loco, vbi myrthus frequēs pro-
 uenit, aut etiam rosmarinus & spica, vt in Gallia Nar-
 bonensi.

Alterum caput de Paralyfi.

Paralyfis, Latine resolutio, differt ab Apoplexia, in qua interioribus sensibus illæsis externi læduntur, sentiendique & mouèdi vis amittitur. Quod cum alteri tantum parti accidit, dextræ vel sinistræ, Paralyfis nominatur, eius, videlicet, partis, in qua affectus consistet, vt in brachio, œsophago, supercilio, vesica, vel ano. In his interiores sensus manent illæsi, quòd in spinali medulla potius, quàm in cerebri substantia affectus continetur. Necesse quoque est sensus & motus amissionem esse, vt propriè dicatur Paralyfis. Nam si sensus tantum lædatur vel amittatur, Stupor est. Fit tendonum vel nervorum relaxatione, emollitione, vel nimia extensione. Debent enim secundum naturam tendi, quò leuissima contractione facta, partem, cui tendo inseritur, trahere queunt. Sed cum nervus laxior ob humiditatem aut Apoplexiam, vel post ictum humidior vel frigidiior redditur, vel spiritus propter obstructionem non permeat, sensum & motum necesse est lædi. Frequenter accidit ob tenuis menyngis vulnus, quòd cerebri substantiam contineat, nervos inuestiat, venas & arterias sustentet, sitque eius partis resolutio, quæ est è directo vulneris. Moriuntur, aut nunquam curantur. Ob ictum in spinali medulla, humore transitum spirituum impe-

diente sublato, curatur. Fit frequentius post luxationem vertebrarum, si in partem vel dextram, vel sinistram vertebra aliqua obluxetur. Si verò in partem inferiorem, difficillima est curatio. Sequitur enim partium internarum Paralysis. In pede citius curatur, quàm in manibus. Etenim multi in dies conspiciuntur, qui post Apoplexiam & mediæ partis Paralyfim ambulant, nec tamen quidquam manibus apprehendere possunt, licet contrarium potius fieri debere videatur ob cordis vicinitatem & caloris copiam. In causa est, quia nervi pedum sunt sicciore & robustiores. Omnes enim nervi, qui è vertebriis lumborum oriuntur, ante egressum nervi sunt. Spinalis siquidem medulla in nervos degeneravit. Curatio in vniuersum fit resolutionis exiccatione, idq; medicamentis relaxantibus & resiccantibus, vel febribus inductis, vel superuenientibus, balneis naturalibus, vnguentis. Balneum effoeminat, & vsus calidorum nimius resolutionem inducit. Quare non leuiter peccant recentiores, cum olea multum calida parum resiccantia præscribunt, vel eum oleum liliorum aut alia, quæ emolliant potius, quàm tendant, aut indurent. Nervus enim cum frigidi sint, & sicci, eorum natura conseruari debet, non destrui. Et quia densi sunt, medicamenta tenuium partium postulant. Quod si talia suapte natura non sint, adiungi debent, quæ ad penetrationem faciant. Peccant etiam, quod resoluentibus semper vtantur, quæ quidem necessaria sunt ad materiæ resolutionem, ita tamen, vt postea exhibeantur, quæ leui quadam astringitione, temperato calore partem affectâ corroborarent. Errant denique, cum eadem medicamenta in Paralyfi & conuulsione præscribunt, cum in conuulsione materiam flatulentam discutere oporteat, & nervum rigidum ac tensum emollire. Curanda est Paralysis sensim, quia morbus chronicus. Victus tenuis conuenientissimus est. Abstineat ab herbis humidis ac flatulentis, à vini potione, à iusculis. Vtatur aqua vel hydromelite valde diluto, & mediocriter cocto in principio, quo tempore non erunt aromata permiscenda, vt cinamomum galang. & alia, nisi in progressu, ne humores crudi extenuati, magis nervos penetrent. Datur mi-

nus

nus coctum in principio & magis dilutum, vt minus nu-
triat ac magis laxet detergendo. Sunt etiam illis inter-
dicenda omnia illa alimenta, quæ crassos humores gi-
gnunt, vt extrema animalium, caro lactantium anima-
lium, vt hœdorum, vitulorum. Vtatur carne parum fa-
lita, assa potius, quam elixa. Frequenter edat auiculas
& potissimum hyrundines, passerculos, ficedulas, & si-
miles. Si resolutio sit in pedibus, aut in pudendo, vel in
vesica, clysteribus frequenter vtendum est, qui parandi
sunt ex detergentibus, incidentibus, attenuantibus ac
laxantibus pituitosum humorem, vt,

CLYSTER.

R. merc. betæ, brassicæ, ana D. j. chamæpithis, rutæ,
primulæ veris, ana M. ss. anis. fœn. ana ʒ. ij. seminis
chartami & vrticæ ana ʒ. ss. florum roris. stechados &
sampsu. ana p. j. fiat decoctio. In libra vna colaturæ diff.
benedictæ ʒ. ss. vel hieræ picræ ʒ. j. salis ʒ. ij. fiat clyster,
detur manẽ.

Datur sine oleo, sine emollientibus herbis vel infri-
gidantibus, & parari debet. Quod si æger non admo-
dum sentiat, parari potest in aqua maris, vel in vna par-
te muricæ oliuarum, vel piscium, vel in lixiuio debili, vel
in vrina pueri.

Si ventrem laxum habeant, parentur clysteres addi-
tis herbis tantum resiccantibus, corroborantibus ner-
uos. Folia anthos, saluicæ, primulæ veris, lauendulæ, pu-
legij vtriusque, chamæp. origani, pollium conue-
niunt. Deinde commiscenda, quæ aliquam astrictio-
nem habeant, vt folia leniisci, therebenti, myrthi, la-
dani. Addere possumus radicem æqri vulgaris, quæ le-
uiter astringendo & resiccando nervis relaxatis robur
addit. Circa initia clystere supradicto vtendum erit &
frequenter, si paralysis sit in quadam parte inferiore.
Deinde vtatur frequenter pillulis sequentibus, & maxi-
mè si affectus sit in partibus superioribus. Hæ pituitam
trahunt sine magna exagitatione.

PILLULÆ.

R. agar. troc. ʒ. ij. turbith gummo. in hydromelite in-
fusi ʒ. ss. myrrhæ, sarc. nutritæ in succo ros. vel lacte (vt
deponat acrimoniam, qua oculo nocet) ana ʒ. ss. vel

scrup. ij. Castorei scrup. j. ꝑ. mastiches, salis gemmæ ʒ. j. aloes ʒ. ꝑ. cum melle scill. vel syr. de stechade, fiant pilulæ vj. pro ʒ. Capiat post mediam noctem præcedente leui cœna: vel loco harum pilularum, vtatur pilulis, de hiera, vel de aromatibus, vel sebellinis vel pil. ante pastum, quibus adiungere oportet agarici tertiam partem. Quod si ætas, aut regio, aut tempus calidum non prohibeat, vtile est Castorei scrup. ꝑ. pro ʒ. j. addere, vbi ventriculi excrementa & primarum venarum, & quæ fluxioni parata erant, vacuata fuerint pilulis supra dictis, vel frequenti vomitione. Coquendus humor, qui in venis & neruis est, syrup. magis detergentibus, quàm fortiter attenuantibus ac incidentibus, nisi in processu, hoc modo.

S Y R V P V S.

R. mellis anthosati & mellis ros. col. an. ʒ. iij. syrupi de stechad. ʒ. ij. decoctionis hyssopi, chamep. lb. j. ꝑ. misce, fiat syrupus pro quinque matutinis.

Si aromatisare velis, id fiat cum puluere diagal. de aro. ros. vel zinzib. vel galan. Nullum oxymel in hoc affectu vsurpandum est ob nimiam partium tenuitatem, & quia acrum neruis aduersatur. Diu concoquendus est humor, & quia inter coquendum, vel propter defluxionem materiæ aut erratum aliquod in victus ratione crudi succi in ventriculo gignuntur, vel ab aliis partibus defluentes congregantur, vtilissimum erit tertio quoque die clysterem superiorem iniicere, interdum pilulas eccoproticas ante cœnam dare, vt de aro. de hiera, & similes, vel ex supra scriptis, si fortius sit euacuandum.

P I L V L A.

Finitis syrupis, materia vtcunque euacuata & deterfa, meatibus reſeratis, purgetur medicamentis pituitam agentibus, vel in forma pilularum, vel boli, aut tabularum, vt diutius remorando in ventriculo à parte magis remota trahant. Pilulæ magis conueniunt, secundò, tabulæ: tertio, boli: omnium minimè mollia vel liquida.

Pilulæ huic affectui conuenientissimæ sunt, quæ valde trahunt, humores liquant, & fortiter euacuant.

Sunt

Sunt autem tales, quæcunque ex lachrymis parantur, ex agar. colocinth. turbith. & aliis pituitosis medicamentis, in quibus myrobalani nullæ admixtæ sunt, quales pilulæ fœtidæ maiores & minores, de opoponaco, de sagapeno, de euphorbio, de hermodactylis maiores, & quæcunque sine myrobalanis citrinis paratæ sunt. Pilulæ de sarcocolla, de agar. cochiaæ ad 3. j. vel scrup. iij. Electuaria autem sicca, vt electuarium diachartami, & citro solut. In forma boli dantur, indum maius vel minus, diaphenicum, hiera diacolo. & benedicta. Quia à parte longinqua, & humor frigidus trahendus, fortiora esse oportet medicamenta, si vires ferre possint, vt,

℞. pil. fœt. & cochia. ana scrup. ij. cum aqua betonice formentur pilulæ septem. Dentur post primum somnum. In iis, qui maiorem stuporem sentiunt, pilulas è lachrymis eligimus, vt,

℞. pil. de Euphorb. vel fœtida. maior. vel minor. scrup. iij. formentur & dentur, vt suprâ. In aliis, quibus sensus tam stupidus non est, pil. ex agar. & cochiaæ conveniunt, vel quæ minorem quantitatem lachrymarum recipiunt. Item in quibus diu non est, quod materia fluxit, pilulis è lachrymis non utimur, quia nimium liquefaciunt humores, & ad fluxiones præparant, nisi multum crassa & lenta esset materia.

ELECTVARIA.

Inter electuaria sicca, electu. de citro magis convenit, tum propter turbith, tum quia astringentia non recipit. Electuarium diachartami minus, quanquam pituitam purgat, propter carnem cydoniorum: quare eo tempore dandum est, quo aliquid adhuc fluit. Dentur ad 3. vj Indum maius satis patenter pituitam purgatur in eadem quantitate. Ad augere possumus in robustioribus. Nam imbecillioribus quantitatem minuire, sed frequentius euacuare oportet. Hieracolocynth. vel benedicta datur ad 3. ss. Quod si quis portione magis delectaretur, quam alia forma, diluere hæc medicamenta oportet, in decocto thymi vel epithymi, seminis chartami, vel vrticæ. quæ omnia calefaciunt & exiccant. Danda est decoctio ex his & quibusdam dulcior

ribus & odoratis, & detergentibus, vt hoc modo.

Potiones purgantes.

*Gargaris-
morum
finis du-
plex.*

℞. glycir. ʒ. β. pass. ficu. ana pa. xx. medullæ chartami ʒ. j. summit. thymi ʒ. ij. anis. ʒ. iij. florum anthos p. j. fiat decoctio, & in quart. j. dissolue indi maioris ʒ. vj. mellis ros. ʒ. ij. misce, fiat potus. Purgato corpore in crastinum dentur masticatoria & gargarismi, sed melius est incipere à gargarismis, qui sunt ob duplicem scopum, vel ad euacuandam pituitam, quæ redundat in capite & principio spinalis medullæ, vel ad discussionem & euacuationem materiæ partis affectæ, vt in paralyfi linguæ, œsophagi, vel gutturis, & in hoc differunt collutiones siue gargarismi, quæ ad euacuationem pituitæ capitis ex euacuantibus, trahentibus, & detergentibus conficiuntur, vt,

Gargarisma pituitam è cerebro trahens.

℞. pass. ficuum ana pa. xx. summit. thymi & feminis chartami vel vrticæ ʒ. j. turbith, staphisagriæ vel costi, ana ʒ. β. Decoquantur in hydromelite, vel in aqua & sapa, vel in aqua râtum. In collat. adde syrup. de stechade vel mellis scillitici, pro ℥. j. ʒ. ij. vel plus, si decoctum sit ægrotanti ingratum, vt,

℞. decoctionis præced. ℥. iij. mel. ros. col. vel anthosati, vel schilini, vel syrup. de stechade ʒ. vj. vtatur manè, & frequenter expuat. Loco huius decocti, decoctum suprâ scriptum ad diluendam compositionem indi maioris. Istis erit vtendum in crastinum medicamentorum purgantium, & cōtinuare per quatuor aut quinque dies, nisi sponte sua per os multa pituita deflueret, ob linguæ liquefactionem factam à medicamen. o. Neque danda est Theriaca ante horum vsum, maxime quæ adhuc recens est. Illa enim impediret fluxionem & huius medicamenti operationem. Alterum genus collutionis sit ex calfacientibus, siccantibus, & parum detergentibus, vt,

℞. costi, zinzib. galang. nucis mosca. ana ʒ. β. decoquantur leuiter in vino & syrupo de stechade, & diu contineat in ore.

Antiqui mirum in modum laudabant collutiones ex Synapi. Quod si ex aceto scillitico, vel melle scilli-

tico paretur, optima fiet collutio, vel dissoluantur prædicta decoctione, vel in aqua arthemisiæ, vel saluiæ, vel pulegij, vel calaminthæ, vel aqua vitæ. Hæc fiunt in particularibus resolutionibus partium oris.

MASTICATORIA.

Masticatoria duplicia sunt, vel ad pituitam capitis *Masticat.* euacuandam, vel ad digestionem, vel ad resolutionem *duo gene-* materiæ partium resolutarum. Quæ ad euacuationem *ra & finis* pituitæ parantur, ex attrahentibus parari debent, vt ex *triplex.* pietro, staphisagria, cubebis, & aliis, de quibus in dolore capitis dictum est & eorum usu. Alia autem masticatoria proportionem respondent secundis collationibus, quæ ad digestionem materiæ & exiccationem partium oris resolutarum conficiebantur, nempe ex his quæ magis resiccant, quàm calfaciunt, vt est mastiche, nuce moscata, sale, mace, aut zinzibere: aut radicibus galangæ, aut acoro vulgari, vel cyperi, excipiuntur sicibus semina nasturtij aut synapi. Quæ masticantur, manè præscribenda sunt, quemadmodum dictum est de collutionibus post purgationem, quæ ante antidota per tres aut quatuor dies conueniunt, & post illa. Ad materiæ consumptionem totius cerebri, & ad totius nervosi generis corroboracionem theriaca antiqua, & magis mithridatum Nicolai, deinde Aurea Alexandrina omnibus aliis preferenda est. Quibus omnibus castorei vel euphorbij, vel bituminis parua quantitas addi debet, quò magis determinata ad hanc affectionem reddantur. Superbibendum est parum aquæ arthemisiæ, vel calaminthæ, vel saluiæ, vel chamepythios. In horum loco parari potest hæc opiata, quæ vtatur quotidie, vel alternis diebus, vt,

OPIATA.

℞. zinziberis conditi vnc. j. conferuæ vulgaris acor i colaræ per cribrum (vt auferantur fibræ, quibus abundat, quòd palato & inter odorandum molestæ sint) vnc. ℥. conferuæ florum anthis & saluiæ an. 3. iij. conferuæ rosarum 3. vj. pulueris galangæ 3. iij. cineris viperarum, vel hirundinum 3. iij. cum syrupo de stechade, fiat opiata, de qua capiat ad quantitatem fabæ, superbibendo parum aquarum supradictarum.

*Pulueres.**Odora-
trix incō-
modata.*

Puluis rosæ nouellæ, diacameron, diamoschi, & dī-
bræ conueniunt, sed his, quæ parantur ex multo moscho
& ambra, in parua quantitate & parcius vtendum, quia
odorata & cerebri & neruorum substantiam exoluunt.
Quo fit, vt vnguentarij facilè in hunc morbum vel tre-
morem incidant, ob moschi & ambre continuū vsum,
aut aliorum odoratorum.

Rursus post duos aut tres mēses repurgandi sunt mo-
do suprā scripto, nisi quod magis attenuantia sunt præ-
scribenda, & fortius purgātia. Quare syrup. de stechade,
vel mel scilliticum cum decoctione herbarum supradi-
ctarum, vel cum aquis supraddictis dari poterunt. Quod si
quis velit apozema facere, parat ex enumeratis herbis,
radicibus & seminibus aliquibus resiccantibus & calfa-
cientibus hoc modo.

Apozema cum potione purgante.

R. rad. enulæ campanæ, cyperiana ʒ. β. berthonica,
pulegij vtriusque, saluæ, hyssopi, chamepithios, sam-
pluci, arthemisiæ, calaminthæ, primulæ veris ana M. j.
capilli veneris, cætherach, pollitrici, filicis masculæ ana
M. β. anisi, seminis rutæ, ana vnc. β. summitatum thymi
vel epithymi, florum stechados, anth. & chamom. ana
p. j. fiat decoctio. In fb. j. β. dissol. syrupi de stechade,
mellis scill. ana vnc. iiij. mellis communis parum. Fiat
syrup. aromat. cum ʒ. ij. diagal. Capiat in quinque matu-
tinis.

R. decoct. præced. fb. j. β. in qua decoque agarici tro.
ʒ. β. polypod. querc. vnc. iiij. seminis carthami contrusi &
senæ orient. ana vnc. ij. turbith. vnc. β. fiat decoctio. In
qua dissolue sacchari vel mellis q. s. capiat post vsum a-
pozematis supraddicti in quatuor dosibus, duos dies in-
termittendo.

Quod si non satis moueant hi syrupi, in vltima dosi
dissolue electu. de citro solutiui, vel diachar. vel indi ma-
ioris ʒ. iiij. vel dentur pillulæ suprascriptæ. Sequentibus
diebus redeat ad vsum opiatæ præscriptæ, vel capiat se-
quentem puluerem.

Pulueres.

R. priapi cerui & tauri (hi duo non multum diffe-
runt

runt) ana vnc. iiii. Inuolucrorum castorei, vel testiculo-
rum luthræ ana vnc. ß vrantur simul in furno in vase fi-
ctili nouo, & extinguantur vino albo, & rursus abluantur
cineres in vino albo, deinde in aqua decoctionis sal-
uiæ, vel samplici. Fiat puluis tenuissimus, quo vtatur vt
sequitur.

R. cineris supradicti ʒ. ij. cinamomi galangæ, gario-
phillo. ana ʒ. ß sacchari candi ʒ. iij. misce, fiat puluis, de
quo capiat cochlear vnum mane, superbibendo parum
vini diluti aqua saluiæ. Quod si diuiti præscribatur hic
puluis, adde ʒ. j. diambæ, vel diamoschi ductis ad odo-
rem gratum inducendum, vel fiat alio modo. Saccha-
rum candum ponitur potius quàm commune, vel rosa-
tum, quia commune non satis exiccat, rosatum verò
cum habeat aquam rosarum, quæ refrigerat & astringit,
nocere posset. Candum magis exiccat & abstergit, ob
idque in multis oculi affectibus eo vtimur.

R. ossium castoris & luthræ an. ʒ. j. vrantur & redu-
cantur in cineres. Abluantur & extinguantur vt supra.
Quibus adde spicæ celticæ, cinamomi an. ʒ. j. galangæ
3. ij. sacchari candi ʒ. iij. vtatur vt superius. Item

R. extremitatum viperarum quar. j. vrantur & redu-
cantur in cineres, & abluantur aqua maris, vel aqua sali-
ta & exiccantur in sole. Cui adde duplū satis torrefacti
leuiter, & reducātur in puluerem, quo vtatur pro sale in
cibis, in prandio & cœna, vel eius loco paretur sal theria-
calis descriptus à Gal. lib. de theriaca ad Pisonem sub fi-
nem. Sed quia difficile comparatur, satius erit nostrum
parare. Quod si non reperiantur viperæ, vrantur alij ser-
pentes.

*Sal the-
riacalis.*

Dieta vulgò dicta, quibus conueniat.

Si quis fuerit corpore admodum humido, non erit
inutile vti decocto radicis Schinæ, vel gaiaci cum victu
attenuante. Sed quò magis determinatum sit hoc reme-
dium, paretur hoc modo.

R. rasuræ ligni gaiaci, vel palmæ sanctæ lb. i. corti-
cis eiusdem ʒ. iij. asphalti, carabæ ana ʒ. ij. macerentur
in lb. 12. aquæ fontis vel cysternæ per horas 14. Deco-
quantur lento igne ad consumptionem tertiæ partis. In
quibus dissolue mellis communis lb. 2. clarificentur ad

dendo vini albi lb. 2. ad penetrationem, & arom. vnc. j. galangę & vnc. ss. beniouin. Vtatur manē & serò vnc. 4. cum volumus, exiccare tantum, & ab iis ad vnc. 6. vtatur, cum volueris prouocare sudorem. Rursus fiat secunda decoctio pro potu in eadem materia, seu residentia præcedentis decocti, addendo mellis lb. 2. Prætermittatur, vel intermittatur vinum, & minus decoquatur, ne fortius fiat. Vtatur per 40. dies, sudet tertio vel quarto quoque die.

TOPICA.

Si facile & sine magna molestia fieri potest, ne tanta fiat spirituum dissolutio, post vnā atque alterā purgationem (& non antè) ad topica remedia veniendum est, à leuioribus incipiendo, & à medio ad summum progrediendo. Sunt autem topica remedia, olea, vnguenta, emplastra, digerentia, & exiccantia, non emollientia, vt oleum de sulphure, de gagate, vel de bitumine, petroleum, oleum de thymo, ex floribus saluę, rosmarini, de lateribus, de tartaro, de piperibus paratum cum semine behen, siue myrobalanis arabicis & hyosquiamo oleo, de sinapi, de euphorbio, castoreo, costo, oleum lucernarum antiquissimum cum sale. Eligenda sunt, quę citra exulcerationem exiccare & detergere possint. Nam de tartaro, vitreolo, & similia exulcerant. Quare pauca quantitate imbecillioribus erunt admiscenda, vel terebinthina addenda, quia retundit vehementem penetrationem. Axungię quędam huic affectui conuenire possunt aliquo tempore, vt serpentum, & aliz antiquissimę, sed salitę potissimum. Seuum hirci, veruecis, tauri, potissimum si cum castoreo & euphorbio aut aliis siccoribus inungatur. Alię axungię humidiore sunt & magis relaxantes, quàm oportet. Inter resinas, cupressi resina, terebinthina, mastiche abluta in aqua aut vino vsurpantur. Vnguenta parata in offinis conueniunt huic affectui quę siccant & digerunt citra emolliationem, vt marciarum, aragon Sunt & alia quędam vnguenta ad vlcera instituta, quę huic affectui non admodum disconueniunt, vt vnguentum magnum cerusatum Mesue, vel vnguentum mirabile eiusdem, vnguentum etiam alterum descriptum post vnguentum

guentum de bdellio. Emplastra, quæ ex iisdem componuntur, apposita supra spinam dorsi, vel in cerata vel vnguenta redacta vsurpantur, vt emplastrum de baccis lauri, & quæ ad vlcera capitis parata sunt. Hæc autem omnia remedia vel in vino, vel cum aqua vitæ, vel cum vrina pueri recenti, ne ægrum lædat foetor, tempore inunctionis adhiberi debent: nimirum prima cum vrina: media cum vino albo tenui: fortiora cum aqua vitæ: Debile parari potest hoc modo.

LINIMENTA.

℞. olei casto. ʒ. iij. olei rutæ ʒ. ij. ceræ q. s. fiat linimentum. Tempore inunctionis adde vrinæ pueri parum. Medium verò ita habet.

℞. olei nucum, de spica ʒ. olei de costo, vel de piperibus, ʒ. j. ceræ q. s. castorei ʒ. j. addendo vinum antiquum tempore inunctionis. Fortissima autem sunt, quæcunque parantur ex oleo de euphorbio & petroleo vel oleo de sulphure, de gagate, de floribus thymi vel stechade, vel rorismarini, vel si parantur ex mediis addita maiore quantitate euphorbij, vel castorei, vel bituminis, vt

℞. Petrolei ʒ. β. olei de euphorb. olei de casto. an. ʒ. ij. costi, galangæ sulphuris viui an. ʒ. ij. florum stechados ʒ. iij. ceræ vel colophonix ʒ. iij. misce, fiat vnguentum, tempore inunctionis adde aquam vitæ, vel fiat sequens per sublimationē, ex quo extrahitur aqua vel oleum, vt

Aqua per sublimationem.

℞. florum thymi aut summitatum thymi, lauandulæ, stechados & saluiæ an. lb. vj. florum hyperici & anthos an. lb. iij. nucis moscatæ, non perforatæ contusæ, garyophill. maeis, eyperi, galangæ crassæ & minoris, piperis longi & nigri an. ʒ. iij. zedoarię, spicæ nard. cala. arom. costi, cinamo. an. ʒ. ij. cortic. thuris, myrrhæ, beniouin, euphorbij, castorei, ana ʒ. j. salis communis fricti aut assati lb. j. temperentur & irrorentur in vino albo & vrina pueri, æquis partibus, & in alembico distillentur in balneo mariæ, vel alio modo. Aqua & oleū seruantur vsui, quia maior est quantitas aquæ, quàm olei, nec minus efficax aqua, quàm oleum. Applicetur partibus, & quo facilius extendatur per omnes partes, &

retineatur, paruum quantitatem excipere oportet aliquo oleo imbecilliori, aut multa cera, aut multa terebinthina. Oleum pro spina, aqua pro partibus carnosis externis, quæ non solum valet ad paralytim, sed etiam ad stuporem cuiuslibet partis.

B A L N E A.

Balnea naturalia, bituminosa, sulphurea, nitrosa sunt ex usu ad materię resolutionem. Alia autem, quæ non nihil ad strictionis habent, ad iuncturarum corroboracionem vel mollificationem. Si æger sit procul à balneis naturalibus vel pauper, sic fiat balneum ex lixiuio & sale: additur & bitumen & sulphur. Ditiorebus paretur lixiuium tale.

R. cinerum ossium equorum, aut asinorum, aut ceruorum, aut aliorum animalium siccorum lb. 6. cineris rad. cannarum lb. 3. cineris ligni cupressi, vel myrthi, vel lentisci, vel iuniperi, aut lauri, aut rorismarini lb. 2. aquæ fluuiorum vel pluuiæ q. s. fiat in principio debile. Cui adde salis communis lb. 4. facis vini generosi lb. j. calcitidis lb. ss. primum probet in pede, vel aliqua parte. Quod si fortius esset, temperetur aqua. Post natationem detergatur spongiis nouis. Post usum præcedentium balneorum, ad roboracionem partium. Diuitibus sequens parari potest, vt

R. rad. cyperi, galangæ vtriusque, calami arom. vnc. 3. rad. arist. acori vulgaris, irid. an. lb. ss. pulegij vtriusque, arthemisæ, absynthij, saluæ, calaminthæ, abrotoni, foliorum cupressi & rorismar. ana m. j. florum ros. siccar. stechad. vtriusque, saluæ, summit. hyper. & chamepith. ana p. 3. fiat decoctio in aqua fluuiali. Cui adde facis vini siccæ lb. j. fiat balneum. Ingrediatur manè, ieiuno ventriculo, & citra defatigationem natet in eo per vnā horam. Non prouocetur sudor post balneum sed detergatur. Non bibat, neque edat donec corpus refrigeratum fuerit. Nam potus vini paralytim inducit, & quia cum vi balnei, cutis, caro, nervi & alia sunt patentiora, tunc vinum facile deducit pituitam per nervos à balneo, vel stupha. At potius aquæ frigidissimæ hepatis refrigerationem & hydropem inducit. Hæc sufficiunt pro vniuersali curatione Paralyseos, sed vnicoique parti

*Vinum
inducit
paralytim.
Aqua po
tus.*

parti sequentia remedia accommodata sunt.

*De resolutionibus particularibus in vniuersum, & de
Paralyſi lingua.* CAP. XXIIII.

Paralyſis accidit omnibus partibus, quæ motu voluntario mouentur, potiſſimum partibus illis, quæ proprium & peculiarem neruum habent. Fit autem huiusmodi reſolutio, quando neque cerebrum, neque ſpinalis medulla, ſed neruus ipſe læditur, vt palpebrarum, cum neruus tertię coniugationis, qui per foramen ſuperciliorum, ſeu oſſis orbitę tranſit, afficitur, vel à nimia refrigeratione, vel ictu. Idem de cæteris iudicium, vt reſolutione penis, veſicę, œſophagi, linguę, & laryngis, labiorum, ſuperciliorum. Curatur hac ratione: Si poſt apoplexiam fiat, aut affectum ſpinalis medullę, conueniunt ſuperius præſcripta. Cacochymia auferatur: topica eligantur, in omnibus quidem capitis partium reſolutionibus, maſticatoria, gargaris. errhina. In pene, vel ano, vel veſica, clyſteres iniiciendi, fumigia in ano magis ex uſu ſunt. Vnguenta, emplaſtra, detergentia, exiccantia ſupra eam partem ponenda ſunt tantum, à qua neruus reſolutus oritur, non autẽ, vt Empyrici anatomes imperiti, ſupra cerebrum & totam ſpinam. Reſoluitur enim ſpiritus partium ſiccarum. Supra partem affectam dropaces ad ſanguinis & ſpiritus attractionem ſunt adhibendi, & hac via erit ad ſpeciem progreſſiendum.

Ergo paralyſis linguę, quod ad vniuerſalia remedia ſpectat, eodem modo curatur. Primum enim concoquenda eſt pituita, & vniuerſum corpus purgandum vt ſuprà monſtratum eſt. Quia ante deriuationem omnem, vniuerſales purgationes debent præcedere, ſicut & diuerſionem, quæ fit per venarum minutarum ſectionem, evacuationem, quæ fit ab aliqua inſigni vena, vt baſilica. Poſtea venas linguę oportet aperire. Quod ſi paralyſis ſit in media tantum linguę parte, venam partis ſanę aperiri. Si in tota lingua, ex viroque latere mittendus eſt ſanguis. Fiant gargar. acria, vt hoc modo.

℞. radic. gly. ʒ. j. radic. pyretri & ireos ana ʒ. ſ. hyſſ. cala. origanni, ſaluia, ſtech. roriſ. ana M. ſ. cubeb. ʒ. ſ. coquantur in aqua & vino albo, & ꝑ. j. coll. miſce mell. ſcill. ʒ. ii. fiat garg. Potes addere parum elect. indi mag.

Gargar.

ioris. Sed hoc notare oportet, vt in declinatione tantum ponantur laxantia, & non in principio, ne humores ad partem affectam trahantur. Ergo sint primum parata garg. hoc modo, ex his, quæ calfaciendi, attenuandi, abstergerendi, incidendi facultatem habent, sine aliquo phlegmagogo. In declinatione potes dare garg. aliud descriptum in cap. de epileps. Vel in decocto huius superioris adde seminis vrticæ ʒ. j. seminis carth. ʒ. ij. & in col. diss. ʒ. ij. vel iij. alicuius elect. phlegmagogi. Sed ponatur in minore dosi, quàm in epileps. aut in apoplexia. Nam in his à toto capite volumus euacuare: in paralyf. autem linguæ à sola parte læsa. Postea vtatur primo garg. siue aliquo medicamento phleg. & ponatur radix cucum. agrest. & parum castorei. Quod si castoreum ob foetorem vituperetur, adde simul beniouin ʒ. ij. vel iij. Eadem ratione (ne sic humores ad partem affectam trahantur) vituperatur vomitus in hac paralyfi, qui tamen in aliis speciebus paralyseos est conuenientissimus à cibo factus. Affigantur cucurbitulæ sine scarificatione in collo, & spatulis. Studeat aliquo pacto mouere linguam, & illam exerere. Ad partis corroboracionem, ac illius materiæ consumptionem, fiant formulæ, quas teneat sæpe in ore supra linguam, hoc modo.

℞. assæ foetidæ, castor. an. ʒ. ss. beniouin ʒ. j. ss. pip. longi, cubeb. zinz. pyretri an ʒ. ss. nucis mosc. spicæ nardi an. ʒ. j. succi gly. & chamepith. (si reperiatur herba recens) an. ʒ. j. ss. sin minus, pone herbæ ʒ. ij. incorp. cum melle, & fiant formulæ ad figuram lupinorum, quas teneat ferè semper in ore supra linguam. Vel infra inunctiones fiant, vt in superioribus monstratum est. Optima erit, si fiat ex ol. antiquissimo, in quo sit decocta scilla, quæ insignem vim incidendi habet. Applicentur cauteria in parte capitis posteriore, vel apponantur vesicatoria, vt ex melle anacardino, vel cantharidibus, vel ex vatrachio, cuius omnes species laudantur, sed maximè ea, quæ vulgò dicitur apium risus.

Additio ad caput de Paralyfi linguæ.

Resoluitur lingua, aut manet resoluta post Apoplexiam, potissimum in his, qui tempore sanitatis balbuerant. Solet enim hic morbus firmari aut remanere in parte

parte magis debili. Qui autem balbi sunt, linguam habent humidam & mollem, ob idque illis facile fit Paralysis in lingua, quæ difficilius, quam in cæteris, aut nunquam curatur.

CVRATIO.

Si recens sit, & copia sanguinis apparet, misso sanguine curatur, è venis linguæ, & apposita cucurbitula in occipitio cum scarificatione. Sed prius vacuabitur, & ut supra demonstratum est, bis vel ter, priusquam topica remedia adhibeantur, ne plus ad partem affectam trahatur, quam discutiatur. Errhina ex succo Anagallidis, vel ciclaminis, vel iridis & melle parantur, ut ex decoctione trahentium medicamentorum, ut pyretri, turbith, esulæ, agarici, colocinthidis, veratri. Parentur autem hoc modo.

Misio sanguinis.
Cucurbit.

Errhina.

R. costi, pyretri & esulæ, ana ʒ. j. florum stechados, p. j. fiat decoctio in aqua & vino albo, & in lb. j. colaturæ dissol. mell. scill. ʒ. iiij. fiat errhinum, vel reducatur ad formam linimenti, quò diutius naribus hæreat, & potentius trahat. Nam propter impeditam transpirationem diutius hæc errhina liquida in naribus retineri non possunt. Quare nihil, aut parum pituitæ trahunt. Hoc modo paratum diutius hæret, & magis trahet, ut

Linimentum.

R. diagredij & trocisc. alandalana ʒ. j. excipiantur melle scillitico, & reducantur ad formam linimenti, quo intingantur partes interiores narium, & post aliquam euacuationem, detergantur aqua calida. Potentius multò trahunt hæc errhina, si præcesserit sternutatorium, vel si in istis adiungatur medicamentum aliquod, quod possit sternutamentum excitare, quale euphorbium vel veratrum. Materia enim commouetur sternutamento, quæ facilius trahitur, si prædicto vnguento addatur ʒ. j. euphorbij, vel veratri. Hæc prosunt, quia euacuant pituitam, & cerebrum exiccant. Gargarismata, quæ siccant & trahunt pituitam, huic affectui præscribenda sunt, de quibus superius dictum est. Vel fiant formulæ tales, quas in ore retineant, vel mastigent.

Gargaris.
Formula.

R. cubebæ. macis, nucis moscatæ, gariophy. galan. piperis longian. ʒ. j. salis communis ʒ. j. excipiantur cera, contineat ore, & mastiget. Eluat os frequenter muria

piscium, id est, garo, vel oliuarum, quæ plurimum prodest. Inungatur pars posterior ceruicis & latera maxillarum vnguento sequenti, vt

R. olei de euphorb. costini & de piperibus secundum nostram castigationem an. 3. ij. ceræ rubræ vel viridis q. s. fiat linimentum, quo inungatur pars posterior capitis & ceruicis retro aures. Tempore inunctionis adde aquæ vitæ parum.

Sinapismi Sinapismi, dropaces, & alia remedia metasyncritica, vel vesicatoria ex melle anacardino, vel ex cantharidibus parti posteriori capitis appositis plurimum prosunt. Eodem vnguento inungenda sunt latera colli vsque ad clauiculam in paralyti laryngis & œsophagi, in quibus, quæ ex aceto & synapi parantur, magis conueniunt, quàm aliæ collutiones. Item ex decoctione gallarum & nucum cupressi, & masticatoria, vt semen synapi exceptum mastiche, & caro cydoniorum leuiter masticata & subito deuorata. Linimenta fieri debent ex resiccantibus & constringentibus, vt

R. olei ex acinis vuarum 3. ij. olei myrthini & cydoniorum an. 3. j. ladani, acassie, cyperi, hypocist. an. 3. ij. aluminis de pluma 3. j. cera parum, fiat linimentum. Tempore inunctionis adde aceti ros. parum ad penetrationem & contractionem. In hac sola resolutione conuenit acetum ad partem nimium dilatatam contrahendam. Vngantur latera colli, & spinæ dorsi, & ceruix tota. Et quia difficilior hęc cognoscitur affectio, ob id adiungenda sunt signa. Hac nota potissimum deprehenditur, quod resolutione œsophagi laborantes cibaria deuorare possunt, quæ consistentia sunt spissa: quæ verò liquida sunt, non possunt. Huius rei causa est, quod alimenta non nisi sensim descendant, propter quod œsophagus confidit in se. Ob eam causam partem superiorem œsophagi contrahi oportet, vt cibum deorsum deturbet. At illa alimenta, quæ dura & spissa sunt, leui contractione facta propelluntur. Liquida, quia illam consistentiam non habent & cedunt impellenti, ob id non deglutiuntur.

De Paralyti Vesica.

CAP. XXV.

Resoluitur interdum musculus constringens collum vesicæ, ob quam resolutionem vrina inuoluntarie exit.

ext. Si ita accedit, curanda est alterantibus, & euacuantibus pituitam, vt dictum fuit supra. Topica autem remedia erunt hæc. Fiant iniectiones: vng. penis, & tota regio ossis sacri, à quo procedunt omnes nerui descendentes ad vesicam. Iniectiones possunt fieri ex oleis, decoct. calorificis, & affectioni accommodatis. Post purgationē etiam à principio sunt iniicienda per syringam olea, quæ digerunt, qualia sunt laurinum, ex rad. cucu. agre. liliorum, antiquiss. de nucibus, de costis. In declinatione autem olea, quæ aliquam habent astrictionem simul cum calore, sunt iniicienda, vel miscenda sunt calfacientibus, quæ vim habent restringendi sine refrigeratione, vt est oleum nardinum, de absynthio, oleum in quo decocta sit radix pyretri & alia id genus, quæ simul habent vim calfaciendi & astringendi. Iniectiones etiam sunt ex decoctionibus hoc modo.

R. rad. cucum. agrest. enulæ camp. vel ireos ʒ. j. herbe paralyf. yuæ arth. saluæ, foliorum lauriana M. ʒ. fiat decoctio in ol. antiquo, vel amygd. amar. vel in oleo de cherua, & iniiciatur cum syringa. In declinatione verò conficiendæ sunt deco. quæ leuē vim habeant astrin. sic.

R. rad. pyretri, rad. cucum. agrest. ana ʒ. ʒ. pulg. saluæ, primulæ veris, chamep. sabinæ ana M. ʒ. cortic. pini, cyperi ana ʒ. j. nucis cupressi, corticis thur. ana ʒ. iij. fructus lentis, vel summitatum eiusdem, aut fructus terebinthi, aut summitatum eius, vel oleastri maris ana ʒ. ij. fiat decoctio in vino stipitico. Potes etiam addere ros. stechad. Sunt verò colligendi cum surculis, & foliis. Saluæ, roris. ana p. j. & ex decoctione fit iniectio. Fiat inunctio ex oleis supradictis, vel ex pinguedinibus, & vnga. penis, & tota regio vesicæ, & ossis sacri, & perinei. Non præmittatur castor. siue in iniectionibus, siue in vnctionibus. Tantam enim habet proprietatem vt in omni paralyfi conueniat. Coniza etiam siue pulicaria, tri-
Castor. mirum in modum confert paraly.

folium foetidum, & ruta maximè in hac affectione cōferunt, quocunq; modo administrantur. Tandem affigatur cucurbitulæ, sine scarificatione supra nares primū post ea emplastrum ponatur, quale est cheroneū vel ex pice & colophonia tantum. Nam cucurbitulæ trahunt sanguinis & spiritus copiam, vnde pars incalescit, & humo-

*Cucurbi-
ta. & sem.*

rum crassities, & lentor attenuatur, & inciditur. Idem præstat & picatio, aut alterius emplastri calorifici applicatio. Pix enim attrahit à centro ad circumferentiam.

Annotatio in caput superius.

Eadem remedia, quæ describentur in additione ad cap. 26. de resolutione ani, conueniunt post clysteres. Inciendi est aliqua pars decocti clysteris in vesicam per syringam. Regio perinei inungenda vnguento descripto deinceps, in additione ad cap. 27. de resolutione mentulæ. Detur etiam hic puluis.

R. cineris muriû vel mustellarum 3. j. capiat cum aqua myrtillorum, vel peculi rosarum per catenchritem.

De Paralyſi podicis. CAP. XXVI.

EAdem ratione curanda erit paralyſis intestini recti. hoc tamen addere oportet, quòd in hac affectione fieri possunt fomentationes in ano in principio, & post purgationes. In principio iniectiones fient per clysteres, qui similes erunt superioribus, nisi quòd fortiores esse possunt. Sed fomentationes astringentes & calfacientes non debent fieri nisi purgato corpore, rectoque intestino intro reducto, ad motis etiam cucurbit. duabus in fine ossis sacri, prope caudam vtrinque vna. Nam ventosa veluti manus retinent intestinum. Et astrictio illa iuuatur per fomentationes recti intestini, & musculi ani. Fumigia etiam fiant ex castoreo, pice, & aliis rebus calorificis, & aliquo pacto astringentibus. vt hoc modo.

R. cortic. pini 3. j. cortic. thur. 3. β. picis coloph. thuris, mastichis ana 3. iij. castor. 3. j. formentur cum vino stiptico formulæ instar trocisc. quæ ponantur supra carbones, & recipiat fumum in ano per cathedram perforatam. Si addantur ramenta cornu cerui, erit efficacius. Ponantur in hoc fumigio foetida, quia non solum vterus fugit odores foetidos, sed etiam rectum intestinum, & aliæ corporis partes sponte naturæ. Quòd si alui excrementa retineantur, humectetur per clysterem ex oleo, & apponantur etiam quæ vim habent irritandi facultatem expultricem, vt sal & muria. Ita etiam in paralyſi vesicæ, si contingat vrinas suppressi, prouocentur.

Alterum caput de resolutione ani.

Resoluitur musc. sphincter, vel musculi retrahentes rectum

*Nō solum
vterus su-
git foetida*

rectum intestinum. Si resoluantur muscoli suspendentes qui in lateribus recti intestini positi sunt, fit descensus recti intestini. Si verò sphincter, alui excrementa non possunt retineri per aliquod tempus, post illam irrigationem factam. Curantur autem hæ duæ resolutiones clysteribus & fumigiis. Clysteres autem fiunt ex resiccantibus & constringentibus vteunque aut calfacientibus, vt, R. rad. acori vulg. & bistortæ cyperi. galangæ ana ʒ. ij. fol. saluæ M. j. pulegii, absinthij M. ʒ. flor. stech. ros. ana p. j. fiat decoctio in aqua & vino stiptico, & in tb. ʒ. col. diff. castor. ʒ. ʒ. ʒ. ladani puri ʒ. ʒ. misce, fiat clyster, iniiciatur frequenter. Ex eadem decoct. fit fons addendo aliqua quæ magis astringant, vt foliorum verbasci M. j. balaustrorum, sumach, hypocistidos ana ʒ. ij. foueatur vel sedeat in decoctione calidiss. vel frigidissima. Balani fieri solent hoc modo.

R. ladani ʒ. j. castor. ʒ. ʒ. malaxentur simul, fiant supp. crassa & breuia, immittantur & teneat æger per noctem. Item suffumigia potenter exiccantia sunt ex vsu. Parantur autem ex pice derafa de nauibus, vel fiat hoc modo.

R. cortic. nucum ʒ. j. castorei ʒ. j. styr. rub. ladani, hypocist. ana ʒ. ij. excipiantur pice & terebinth fiant for. quibus suffumigetur anus per emborum sic. Vel sedeat in sella perforata pannis inuoluta. Vndiquaque recipiat fumum post reiectionem excrementorum alui, vel fumum lapidum molarium extinctorum vino, vel deco. præcedentis clysteris.

De Paralyſi peni. C A P. XXVII.

FIt interdum resolutio in pene ob musculos eius relaxatos, & male affectos. Curanda erit alterantibus, & purgantibus medicamentis supra traditis. Obseruare tamen oportet, ne eos vrgeamus multis aut ingentibus vacuationibus. Nam omnis vacuatio insignis maxime contraria est distentioni penis, & veneri. Quin potius alimentis laudatis sunt alendi, & quæ adaugeant semen. Pro topicis remediis applicentur cucurbitulæ supra nates, postea circa inguina. Inunctiones fiant circa os sacrum, & ossa ilium, ex vnguentis superscriptis. In principio & quò magis propria, & determinata huic affectioni reddantur, miscenda sunt aliqua, quæ vim ha-

beant corroborandi illas partes . & inflandi siue disten-
dendi penem. Præterea dāda est opera, vt quæ nimium di-
gerunt & calfaciunt , in declinatione non adhibeantur.
Hæc enim semen absumunt , & flatus discutiunt , dige-
runtque . qui admodum necessarij sunt ad penis erectio-
nem. Ponatur ergo in declinatione maior pars eorum,
quæ vim habent gignendi flatus (vt sunt olea nucum &
auellandarum) quàm eorum quæ digerunt, vt hoc modo.

℞. ol. de cherua, vel ol. veteris, vel ol. nucum ʒ. iij. ol.
pinearum vel auella. ʒ. iij. ciuetæ ʒ. ij vel ʒ. β. si sit diues,
renum vel caudæ stincorum, & cineris priapi tauri, vel
cerui ana ʒ. j. seminis bulbi, vel cæpe, vel crysmi, vel eru-
cæ hispanicæ ʒ. iij. ceræ parum. Fiat vng. quo vng. renes,
perineum, & latera liliorum, & inguina, i. ferior pars vē-
tris maximè , vnde oriūtur nerui, & masculi distēdentes
penē. Utatur opiatis quæ poterunt cōfici ad hūc modū.

℞. conf. secacul. eryng. ana ʒ. j. auellandarum per duos
dies & totidē noctes maceratarum in melle N. x pinea-
rum, fisticorum ana ʒ. β. priapi tauri siue cerui, boracis
ana ʒ. ij. caudæ stincorum, linguæ anseris ana ʒ. j. semi-
nis bulbi ʒ. iij. syr. conf. satyrionis q. s. fiat opiata. Cap.
ad quantitatem auellanæ, cum ibit. dormitum. Aduer-
tendū tamen est vt diligenter obseruemus ægri tempe-
raturam. Nam in valde biliosis non est vtendū multum
calidis, & digerentibus, quia potius in istis semen & fla-
tus extinguunt, quàm generāt, quæ tamen in pituitosis &
humidis multū cōmendantur. Danda ergo biliosis sunt,
quæ non admodum calida sunt, cum quadam humidita-
te, vt est satyrion, in pituitosis contra. Auellanæ diu in
melle maceratæ, plurimū iuuant penis distētionem. Bo-
rax non est crisocolle veterū: hæc enim venenum est, &
borax citra noxā intus assumitur. Potest tamen dici cri-
socolla ab effectu. Nam aurifices ea vruntur, sed ea non
præstat quæ à veteribus sunt illi tributa. Lingua anseris
tota substantia venerem stimulat. Est autem & semen
fraxini, quod vulgò lingua auis dicitur. Ne quis hæc cō-
fundat, venerem etiam excitās, vt & omnia semina, quæ
aliquam habent dulcedinem, & sunt edendo, vt semen
lini. Conueniunt in hac affectione omnia alia remedia,
quæ præscribuntur ad erectionem virgæ. Abstineant à

mentā,

menta, ruta, vitice, lactucis, & omnibus semen minuē-
tibus. Pignolatum multum laudatur: vel si velis alio
modo parare, fiet vt sequitur.

R. pinearum infusarum in melle, auellandarum & fi-
sticorum ana ʒ. ij. medullæ seminis fraxini ʒ. j. zinz. fe-
minis erucæ, & bulbi ana ʒ. j. medullæ seminis pœoniae
ʒ. j. β. cinam. ʒ. ij. cum melle despumato fiat confectio
in forma solida vt turiones, vel morcelli, quibus vtatur
in fine mensæ. Si addas pul. priapi tauri vel cerui ad ʒ. j.
& seminis lini tosti ʒ. ij. fiet efficacius. Vel si velis amyg.
pistatas & sacch. addere, fiet velut pasta regia, vulgò (car-
tre de marsepain) dicta.

Alterum caput de resolutione mentula.

Mentula resoluta dicitur, quando erigi non potest
existente seminis statulenti multitudine. Resoluitur au-
tem ob maiorem extensionem manu factam. Solent e-
nim meretrices ob zelotypiam iuuenibus mentulā ex-
tendere vi. Aliquando fit ob natationem in aqua frigi-
da ob refrigerationem factam circa perineum: aut pro-
pter compressionem, aut longam equitationem, quæ
accidit præcipuè his, qui in ephippio sedent admodum
duro, & qui sunt parum pingues. Si fiat resolutio ob ex-
tenuationem corporis, foras aquæ frigida in principio
iuuat ob contractionem, quam inducit. Quod si id fa-
ctum statim non iuuerit, ad alia remedia veniendum est
& pars perinei inungenda sequenti vnguento.

R. ol. mastich. & ol. ex acinis vuarum ana ʒ. ij. mastic.
sang. ʒ. ana ʒ. ij. alumnis ʒ. j. ceræ rub. q. s. fiat linimen-
tum, tempore vñctionis adde parum vini cretici, vng.
mentula ad podicem vsque, quia ibi muscoli positi sunt
duo inferiores. Quod si morbus non fuerit curatus, &
inueteratus iam sit, foueatur sequenti lixiuio.

R. cineris inuolucris castor. vel priapi tauri, vel cerui
ʒ. β. fiat lixiuium in quo decoq. nucū cupressi ʒ. ij. fo-
ueantur prædictæ partes calidissimæ vel frigidiss. Hæc
fient post leuem aliquam euacuationem, vt pilulis pri-
mis inferioribus addito castor. ad ʒ. ij. Detur theriaca
antiqua, vel aurea alexandrina, vel fiat talis opiata ad-
dendo ʒ. β. mosci in ditioribus, vt.

R. zinzib. conditi ʒ. ij. conser. acori vulg. & conser.

eryng. ana ʒ. j. bauracis ʒ. iij. aureæ alexand. ʒ. ij. cum syr. conferu. corticis citri fiat opiata. cap. 3. j. manè, & sæpè vtatur alimentis flatulentis, & quæ ad penis distentionem præscripta sunt. Hac ratione perficitur huius resolutionis curatio. Dropax ex pice & sale & semine sinapi hæc resolutionem curat, vt fiat levis excoꝛiatio in extremitate præputij. Non sunt etiam negligendi clysteres, & alia topica remedia, quæ ad ani resolutionem præscribuntur. Hæc vltima remedia in resolutione penis conueniunt, à quacunque causa fiat. Potus aquæ frigidæ, & inunctio prima in resolutione facta à violenta extensione conuenit.

*Empla-
strum.*

De Paralyfi facta ex contusione, ictu, aut casu.

C A P V T XXVIII.

SI ex ictu timeatur defluxio ad partem læsam, vt si ad sit plethora, fiat sanguinis missio, vt in aliis contusionibus fieri consuevit. Verùm topica remedia in hoc differunt, quod in cōtusione, vel casu, siue resolutione adhibemus adstringentia, & refrigerantia, ne humores ad talem partem attracti, inflammationem excitent. In hac autem contusione adhibemus medicamenta, quæ partim digerunt, partim astringunt cum calfactione quadam, quale est medicamentum illud compositum ab Haly ad formam emplastri, cum quo curauit fratrem filij Moysi, vt recenset. Vel fiat sic:

ʒ. cortic. pini, mastichis, thuris ana ʒ. iij. bituminis iudaici, vel mumie ana ʒ. ij. cyper. cala. arom. galangæ crassæ, spicæ ana ʒ. j. olei chamo. oleandri ana ʒ. ij. ceræ parum, fiat vnguentum, vel addendo picis & resinæ q. s. fiat emplastrum. Adde ladani ʒ. β. grum. hederæ ʒ. ij. Post aliquot dies ab ictu, accedente declinatione, iam minuantur astringentia, & augeantur digerentia, vt loco olei oleandri, pone oleum de castoreo, vel lumbricorum. Si autem suscitetur inflammatio, vt eius generatio impediatur, ad augenda erunt in principio astringentia. Tunc adde rosas & similia. Et loco olei cham. addi potest portio aliqua ol. rosæ aut alterius eiusdem facultatis.

De Paralyfi extremorum. C A P. XXIX.

SI Paralyfis fiat in altero brachiorum, vel in pede Saut in aliqua alia parte extrema, hæc erit ratio cu-

randi

randi. Purgetur vniuersum corpus, concocta prius materia, vt supra monstratum est. Cerebrum exiccetur, & reliquum corpus. Præcipuū est post purgationem, vt supra partem, vnde nerui mouentes membrum resolutum oriuntur, apponantur cucurbitulæ, & vesicatoria, & vlcus exiccatum maneat longo tempore apertū. Supra partē verò affectam, affigantur paruæ cucurbitulæ cum paucō igne sine scaificatione, vt fiat tantū attractio ad partem, & non attracti resolutio. Id sæpius faciendum est, ter aut quater nempe in hebdomada. Inunctiones etiam fieri debent ex oleis præscriptis. Apponantur cucurbitulæ, & vesicatoria super spatulas in medio, si paralytis sit in brachiis: vt supra vertebrae lumborum, si crura sint resoluta, & supra os sacrum, vbi vesica, vel penis, aut rectum intestinum.

De paralyfi partium faciei, superciliorum, labiorum, manuum, pedum.

C A P. XXX.

Resoluuntur faciei partes affecto cerebro, vel quando neruus particularis afficitur. Interdum oculi resoluuntur, supercilia, labia. Si resolutio oculis accedat, remediis præscriptis in additione ad caput de resolutione linguæ curatur, nisi quod masticatoria magis conueniunt, quàm errhina. Alexander Trallianus imperat etiam sternutamenta, & errhina: sed hoc erit post masticatoria. Si autem resoluatur supercilium, difficillimè curatur, quod pars illa parum caloris habeat, neruos, venas, arterias, admodum constrictas, & magis propter refrigerationem partis externæ sit, quàm internæ.

Curatio paralyfis superciliorum.

Dropaces ex pice, aut emplastra trahentia cum castoreo, euphorbio, erunt ex vsu, vel linimenta descripta in additione ad caput de Paralyfi linguæ: vngatur vndique. Vel pro topicis & loco vnguenti, vtire succo raphanæ, vel rutæ, vel vrticæ, & inungatur pars affecta, & vicinæ partes, maxime pars posterior capitis & primæ vertebræ, vnde oriuntur nerui superciliorum motorij. Id autem fieri debet post vniuersales purgationes. Quod si medicamento non curetur, ferro curabitur. Inducendum est vulnus obliquè à canto minori ad maiorem. Facta deperditione cutis contrahitur, & sursum

trahitur palpebra. Sed semper deinde oculum apertum habebūt. Satiū autem est semper apertum, quā clausum habere.

Curatio paralysis labiorum.

Iisdem remediis curatur, quibus lingua, nisi quod gargarismata euacuante præscribi possunt.

Curatio paralysis manuum.

Curantur remediis præscriptis secundo cap. de cura vniuersali. Inunctiones faciendæ sunt circa finem cervicis, & principium dorsi, & in aliis, quia citius medicamenta per eam partem ad principium neruorum penetrant. Quod si digiti aliquantulum resoluuntur (quod tamen rarò accidit) topica remedia adhibenda sunt supra partem per quam nervus descendit ad digitos alios. Si parvus digitus & media pars annularis, topica remedia adhibenda sunt cubito. Si alij tres resoluuntur, vel stuporem patiuntur, aliis illæsis, vulnerata est aut affecta spinalis medulla, vel in ipso principio neruorum brachij. Omnes æqualiter resoluuntur, vel stuporem patiuntur, si per defluxionem vel concussionem lædantur. Nam per sectionem id non est necessarium, propterea quod omnes nervi circa principium simul iuncti sunt: separantur autem paulò post supra cubitum. Et quia nervus, qui in cavitare olecrani latitat siue cubiti, paruo digito & annulari sensum præbet, si lædatur vel contundatur, horum tantum duorum digitorum resolutio sequitur, aliis illæsis, ut ex anatome & per experientiam conspicitur.

Curatio paralysis pedum.

Si in pedibus fiat resolutio, topica remedia ponenda sunt super vertebrae lumborum, & in inguinibus, qualia prius descripta sunt in cura vniuersali. Alexander Trallianus meminit eiusdem resolutionis ex sola qualitate sine materia, à siccitate cum caliditate; quam refrigerantibus & humectantibus curari vult, quæ à me nunquam visa est.

Vniuersalis ratio & vniuersalis medicamentis præscripta ad paralysis. CAP. XXXI.

Primū præscribantur pilulæ sine custodia, de quibus capiat ter aut quater in hebdomada. Exhiben-

tur eiusmodi pilulæ leuioreſ ante alia remedia, & maxime ante uſum ſyruporum attenuantium, & aperientium, ut repurgentur viæ communes, ventriculus nimirum, & inteſtina ab excrementis, & humoribus crudis, ne idem nobis contingat, quod medico cuidam, qui cum vellet prouocare menſes, uſu aperientium, & attenuantium ſyrup. deduxit mulierem ad paralyſim, eò quod crudi humores, & glutinoſi, qui erant in viis ductuum, viſillorum medicamentorum aperientium deducti ſunt ad partes, & in neruis impacti paralyſim concitarunt. Alter etiam Lutetianus, cum vellet curare palidos colores, eadem ratione deduxit puellam ad paralyſim crurum. Oportet ergo in omni morbo ante uſum aperientium medicamentorum repurgare vias communes leui medicamento, ſiue prouocandi ſint menſes, ſiue reſoluendæ obſtructiones, aut ob aliud, uti multum calidis aperientibus, & attenuantibus medicamentis velimus. Poſt pilulas ordinetur ſyrup digeſtiuus pro 5. vel 6. doſibus ex ſyrup. imbecillioribus, & primi ordinis, vel detur ſyrup. præſcriptus, qui dicebatur imbecillior. Purgetur poſtea pilulis illis mitioribus, ſed fortificatis cum ag. vel irø. alandal, & pauco caſtoreo, vel etiam mediocribus præſcriptus. Poſt primam purgationem, aliquot diebus utatur theriaca antiqua per ſe, vel diſſoluta in aqua ſaluiz, vel chamepit. Continuet per duas hebdomadas, accipiendo, tertio vel quarto quoque die prætermittat pilulas illas leuioreſ ſine cuſtodia vel clyſterem. Tandem inunſtio faciendæ eſt, qualis eſt, quæ conficiebatur ex ol. cham. quam vocabamus imbecillioſiorem. Poſt aliquot hebdomadas vel menſes, rursus concoquatur materia ſyru. mediis, ſed præcedente ſemper clyſtere, & purgetur pilulis fortioribus. Utatur inſuper opiata præſcripta à nobis, vel compoſitione myrrhidatica, vel confectiōe anacardina in minore doſi. Confectio tamen hæc anacardina non admodum probatur, ut modò paratur à Pharmacopolis, propter myrrhobalanos, qui multum aſtringunt. Nam multum a-Incommo-
ſtringentia non debent cum multum calidis admifceri. dum com-
Faciunt enim, ut diutius maneat in corpore, & noxam feſtionis
inferant. Ob id confectio anacardina febrem excitat. anacard.

*Quando
Sciendum
aquis di-
stillatis.*

Melius est ergo loco myroba. ponere aliquod medica-
mentum tenuium partium, vt est cinamomum & simi-
lia. Adde frequenter castaneas illas indicas, quæ simi-
litudinem habent cum anacardis. Fiant stufæ & inun-
ctiones. Applicentur cucurbitule. Fiant exulcerationes.
Post aliquot menses rursus humor concoquatur, & va-
cuetur. Concoquatur quidem syr. fortissimis, si vires to-
lerant, & vtantur omnibus extremis remediis, vt modo
apozemate præscripto. Capiat bis in hebdomada 3. ij.
pilu. de beniuin intentionis nostræ præscriptarum cap.
23. Vtantur aquis sublimatis præscriptis. Sunt enim te-
nuiorum partium, quàm decoctiones. Quare cum volu-
mus vti attenuantibus, & incidentibus, præligendæ
sunt, vt in prouocandis mensibus, & obstructionibus
soluendis. Vtantur semper victu attenuate, abstineant à
iussulis. Quod si velint eis vti, conficiantur ex pipioni-
bus, passeribus decoctis cum saluia & betonica. Com-
mendatur etiam esus ciconiæ. Erit optimum in iussulis
addere puluerem præscriptum cap. de epilep. Qui penis
resolutionem patiuntur, victu minus exiccate, & paulò
pleniore alendi sunt. Parentur polypi pisces pro cibo,
quos diu & multum oportet verberare baculo, vt fiant
teneriores. Sunt enim admodum duri, attamen vbi ita
parantur, & bene concoquantur à ventriculo, præstan-
tissimi sunt, inter omnia alimenta in generando semine
efficacissima. Cum finditur polypus, reperitur quidpiam
lacteum oui simile, quod plurimum venerem stimulat.
Parantur etiam echini marini elixi, vel assi, quos vulgò
prouinciales (vrsini vocant.) In summa omnia alimen-
ta, quæ semen gignunt, multumque nutriunt, probum
succum, & non excrementosum generant, quæ omnia
commendantur in augendo semine. Vino vti possunt hi,
sed bene diluto. In his omnibus habenda est ratio tem-
peramenti, & in victus ratione præscribenda, & in me-
dicamentis. Nam qui natura sunt calidiores, paulò
crassiore victu vti possunt, & remediis minus calidis.
Nam multum calida & sicca, in his semen absumunt.
Quare medicamenta eligenda sunt, quæ magis à tota
substantia, quàm quæ qualitate manifesta operantur, vt
sunt Priapus tauri, vel cerui, & conserua satyrionis, quæ
magis

magis ob flatu, quos gignit, excitat venerem, quàm ob *Conserua*
caliditatem aliquam insignem. Videtur enim esse tem- *satyrionit.*
perata hæc conserua, vt indicat eius sapor dulcis, aut
potius insipidus. Qui verò natura sunt frigidiore & pi-
tuitosi, magis vi debent conserua secacul, & zinzibere
condito. & pyretro etiam condito (si reperiatur) & con-
serua, quam vulgò Bauciam vocant. Est etiam Baucia
radix spondylii, aut pastinacæ agrestis, & aliis similibus
remediis calorificis. In biliosis naturis commendantur
myrobal. conditi, vt nux communis condita in pituito-
sis. Qui vel linguam, vel vesicam, vel partem aliam re-
solutam habent, vtantur similiter victu attenuante. In
paraly si linguæ laudatur frequens eius frictio cum the-
riaca antiqua, vel mythridatio.

De paraly sim Fernelium. C A P. XXXII.

Paraly sim à pituita crassa neruo tenaciter inheren-
te fieri omnium medicorum est sententia. Ego verò
à tenui, sed multa, quæ à cerebro defluit, & ob tenuita-
tem, totam nerui substantiam irrigat, mollioremque ef-
ficat, in quo idem neruis, quod in apoplexia cerebro
accidit. Ex illa enim nerui remollitione sequitur nerui
extensio, constructioni naturali contraria, quæ efficit,
vt partem, cui inseritur neruus mouere non possit. Qua-
re non est audiendus Fernelius, qui flauam bilem, para-
ly sim posse excitare scribit. Huius autem verba sunt:
Quin etiam alius humor in spinali medulla influxus,
paraly sim committere potest. At sæpe flaua bilis hanc
infligit, cum sub finem intermittentium febrium in spi-
nam dorsi, deinde in nervorum origines effunditur.
Hactenus ille. Non eo inficias sanguinem in spinam
prouenire, & ab eo paraly sim induci posse, cum in spi-
nali medulla frequentissimæ sint venæ, à quibus mul-
tum sanguinis effundi potest, quia sua humiditate vim
habet humectandi nervos: sed qua ratione, aut bilis, aut
melancholia id efficere possint, non video, cum hæc ra-
rò, nec facile ad spinam deferantur, & cum eò peruene-
rint, nervos potius siccent, & indurent, quàm emolliât:
vt in elephantia laborantibus videre est, quorum corpus
propter siccitatem arefcit: non tamé inde paraly sim ac-
cerfit, quanuis sentiendi munus extinctum in his propè

appareat. Tantùm abest, vt nerui ob id resoluantur, & laxiores efficiantur, vt robustiores euadant, nisi ad extremam senectutem redigantur. Bilis enim non minus, quàm melancholia siccatur, sed cum acrimoniam adiunctam habeat, idonea magis est ad conuulsionem, quàm ad paralysem excitandã. Acrimonix enim conditio est, neruos potius vellicando contrahere & cogere, quàm relaxare & emollire, vt puncturæ, quæ illis ab acribus & mordacibus humoribus accidunt, nobis demonstrant. Non ergo satis mirari possum, quod tantus vir, tam leuiter, etiam sine ratione in hanc sententiam præcipitãter adductus sit, vt quod sub finem febrium intermittentium paralysem ortam, aliquando conspexerit, à bile in spinam dorsii, & neruorum originem effusa concitatam credidit, quasi bilis, quæ tunc euicta est, & pauca, ad locum adeo dislitum & remotum accessu difficilem permeare queat. Quod enim pauca eo tempore sit, & coacta, nõ dubium est, cum morbus in declinatione sit. Sed quis illi aditus ad spinalem medullã esse potuerit? Aut enim à cerebri sinu posteriore delapsam esse, aut per vertebrarum foramina ad spinam peruenisse oportet. Quod si per cerebrum, cur non phrenitim potius in illis febribus excitauit? cur non etiam in ardentibus? quod æquius esse videtur. Idem etiam præstat. Quod cum non fiat, nec in febrium intermittentium declinatione per hanc viam fieri putandum est. Per vertebrarum autem foramina, quia cum sanguine simul deduci deberet, subiisse cum sanguine, bilis videri non debet, aut in venis contentam fuisse. Quare ardentem aut continuam potius, quàm intermittentem febrem concitauisse oportuit. Adde quod venæ illæ quæ per vertebrarum foramina intra spinam pervadunt, nutritionis esse vertebrarum tantum, aut periosij interioris, quod efficere tertiam spinæ membranam crediderim, cõstitutæ sunt. Quæ cum nec duram, nec tenuem ipsius membranam attingunt, nec bilem etiam ad illas deferre posse credendæ sunt. Nec si sub finem intermittentium paralyfes fiant, à bile promotas argumentum est, cum bilis aut febrilis calor, pituitam in cerebro contentam, aut in ipsa medulla spinali latitantem eliquare potuerit, quæ in

neruos effusa, paralyfim induxerit. Ex quibus conclu-
dimus sanguinem solum tenuiorem, bilémque aquosio-
rem paralyfim committere posse, dum aut. multitudine
sua obstructionem faciunt, viámque spirituum interci-
piunt, aut humiditate spiritus extingunt, aut conso-
piunt, aut neruos emolliunt, & elongant. Qua ratione
paralyfi conuulsio superueniens, curare illam aliquan-
do videtur, propterea quòd neruus immodicè extensus
per illam contractionem, ad illum naturalem statum re-
uocatur, qui tamen cessante conuulsione, ad priorè ex-
tensionem recurrit. Calori porro non minus quàm fri-
gori. paralyfim inducendi vis est, cum illi emolliendi
& effœminandi neruos (si ita loqui licet) potestas in-
sit, siue per se id præstet, siue dum humores præsertim
pituitosos fundit, & ad fluendum paratiores reddit, at-
que vt facilius substantiam neruorum peruadant, po-
ros aperiendo efficit. Qua ratione vinum, quòd suo ca-
lore & tenuitate excrementa ad neruos deducat, para-
lyfim efficere dicitur. Quòd verò Aetius, & qui illum *Qua ra-*
fecuti sunt, à siccitate fieri scripserint, admodum diffi- *tioue vi-*
cile, & rarum esse censeo. Hoc autem ideo euenit, quòd *num in-*
musculi, vel tendines minùs à spiritu influente, tur- *duci pa-*
geant, vnde flaccescunt, & longiores efficiuntur. Sic *ralysim.*
quodam in loco Gal. ex atrophia laxiores euadere pro-
nunciauit. Ad id quauis resolutionis speciem præ se fe-
rat, non tamen veram esse paralyfim iudicandum est,
quæ tamen existit, cum sensus, & motus spiritus extin-
ctione, vel absentia perit. Quare cum solum sensus, non
autem motus amittitur, aut obtunditur, vt per partium
refrigerationes accidit. Stupor affectus nominatur, ad
paralyfim via est, aut paralyseos altera pars. His ita
constitutis, si particularis aliquis neruus emolliatur, e-
longetur, refrigeretur, aut à tumore aliquo comprima-
tur, sequitur illius particulæ, cui neruus animalem fa-
cultatem defert. resolutio. Quòd si tota spinalis medulla
ita affecta sit, totius à capite resolutio succedit. Si tantum
altera eius pars, siue dextra, siue sinistra, aut nerui sal-
tem alicuius partis, semiplena sit, cuius generatio admi-
rationem præbere non debet, cum defluxio, quæ cauf-
sa est resolutionis, per vasa fiat. Illa autem sic distincta

sunt, vt dextra sinistris non permisceantur. Nerui enim omnes (quod à nullo ante nos obseruatum fuit) ab ipso cerebri principio, vel in ipsa spinali medulla, diuisi sunt. Quare non tam à spinali medulla, quàm à capitibus neruorum paralyfis caussa proueniet. Ob eam causam Gal. palsim paralyfim accidere ait, quando neruorum capita, vel obstructa, vel resoluta sunt.

De resolutione ossis hyoidis, & musculorum baryng.

C A P. XXXIII.

Resoluuntur musculi omnes, qui motu voluntario mouentur, sed alij frequentius, alij minus frequenter. Musculi labiorum laryngis frequentius, œsophagi minus frequenter. Rarissimè fit paralyfis in osse hyoidis, quam tamen vidi in nobili quodam viro, de qua cum nulli hactenus scripserint, vel quia non viderint, vel quia illam non cognouerint, à me nunc explicabitur. Primum dicam, qua via eam deprehenderim & cognouerim, vt cæteri eadem ratione eam cognoscant, & semel cognitam possint curare iisdem remediis quibus ipsi fecimus in resolutione linguæ & partium faciei. Hanc resolutionem cognoui ex actione & vtilitate læsa musculorum, quorum functio est ad os illud firmandum, quod nulla alia ratione firmari potest, cum in interiori parte sit positum. Descendente enim cibo per œsophagum, os illud firmum & stabile esse oportet ad linguæ musculorum firmitatem, & laryngis. Ob id natura, vt nauis diuersis anchoris apposis firmant nauim, sic hoc os stabilivit duobus paruis musculis suspensimento, qui à parte inferiore retrahunt. Nascuntur è media parte menti, siue maxillæ ab ea parte, in quam inferuntur musculi aperiens maxillam, simul iuncti sunt, vt quasi vnus videatur. His apposuit duos alios rectos longiores & latiores. Quare magis distat os hyoides à clauicula, quàm à mento, quia oriuntur à superiore osse sterni. Abusa est his natura ad ligandam asperam arteriã, ob id latiores, & longiores fecit: & quia non potuit natura ponere duos transversos, qui in medio retinerent, alterum in dextra, alterum in sinistra. Non enim locus aliquis restabat commodus, à quo tuto orirentur, & in quem infererentur. Quod si etiam locus fuisset, vel ni-

mum

mium contraherent, & tanquam laqueus collo iniectus strangularent ægrum in contractione. Ob id sagax & provida natura binos ex utroque latere obliquos posuit, qui in medio retinerent, & in recto situ firmarent. Sunt enim duo, qui cum musculis maxillam aperiētib, à processu stilloidis nati, obliquè ad os hyoidis descendunt. Alij duo ab acromio orti ad id os obliquè, & tenues, & rotundi ascendunt, in aliquibus carnosi in principio & in fine, in medio verò tendinem habentes, veluti musculi maxillam aperiētes. Sic etiam dicti musculi, si altera in parte resoluti sint, os hyoides in alterā partem retrahitur, nec in recto situ manet, quia tensi nō sunt musculi eius, vnde sequitur vocis & loquellæ impedimentum, quin os hyoides firmum non est. Quare & musculi linguæ & laryngis, qui ossi hyoidi innituntur, non mouentur. Omne enim quod mouetur, innitatur alicui fixo oportet. Cogitur ergo, qui vult loqui, vt *Axioma.* musculi extendantur, rigidioresque fiant, in partem oppositam parti affectæ retorquendo collum, ob quam tensionem rectè loquitur, cum in media figura collum retinet. Minus bellè loquitur si ad partem affectam collum verratur. *ἄρρωτος* est ob laxitatem illorum musculorum linguæ, ortorum ab ossi hyoidis & laryngis. Fit hæc resolutio musculorum ossis hyoidis ob refrigerationem, vel ob tenuem defluxionem in partes illas tenues internas. Curatur vt aliæ resolutiones, pilulis *Causse te-* fortiter euacuantibus, masticatoriis, gargaris. trahentibus & euacuantibus, deinde calfacientibus. Vnguenta, *solus.* quæ ad linguæ resolutionem præscripta sunt, apponantur, & lateria colli, & claviculæ inungendæ, cum menti & aurium parte inferiore. Intus sumere non prætermittentes, quæ nervos & cerebrum siccant, firmant, & corroborant, & quæ arteriam detergunt, de quibus superius satis dictum est. *Curatio.*

De Stupore.

C A P. XXXIIII.

Stupor cum sit veluti diminuta paralytis, iisdem etiam remediis, sed leuioribus curabitur. Optimum remedium est, lauare membrum stupidum cum musto, tempore vindemiarum.

*De febre in Paralyſi excitata à medicamentis calidis aut
ab alia cauſſa.* CAP. XXXV.

Febriſ interdum complicatur cū paralyſi ob putredinem alicuius humoris. Quòd ſi febris fiat ſua ſponte, ex ſola humorum putredine, coquatur humor peccans, & purgetur, vt monſtratum eſt cap. de cura feb. Interim non eſt negligenda prior affectio, maior tamen cura habenda eſt de febre, tanquam de eo, quod magis urget, quia poſſet ægrum occidere.

Curatio febris à pituita.

Si igitur fiat febris pituitoſa quotidiana, quæ magna ex parte & frequentius accidit, curetur hoc modo. In principio detur clyſter communis, in cuius decoctione optimum erit addere parum agarici. Poſtea coq. humor ſyr. ſequentibus, ſiue ſit continua, ſiue intermittens.

Syrupus

digestivus

℞. ſyr. de byſant. mel. roſ. col. an. ʒ. j. ſyr. capil. ven ʒ. ij. aque gram. aſpar. bugl. an. qr. j. miſce pro tribus doſib. da manè. Purgetur vel pilulis vel potione, ſed potiones laudantur magis, quia non tantum calfaciunt. Vt

℞. gly. raf. ʒ. iiij. paſſ. prunorū nu. 6. ſeminis melonum, petro. & apij. an. ʒ. j. ſenæ oriental. ʒ. j. agar. ʒ. ſ. medull. ſeminis carth. ʒ. vj. fiat dec. in qr. j. diſſ. diap. ʒ. iiij. rha. in aqua end. & vino albo infuſi & fortiter expreſſi ʒ. ſ. cynamomi gr. vj. ſyr. capil. ʒ. ſ. miſce, fiat potio. Hæc potio propria eſt febre ex paralyſi, quia craſſos humores attenuat ſimul & euacuat. vt ſunt pituitoſi, à quibus & febris, & paralyſis fiunt. Facilius autem curatur hæc pituitoſa febris, quàm aliæ, quia eius remedium, & paralyſis ferè conueniunt. In vtraque enim pituitoſus humor extenuatur, & euacuatur, & minùs calidis reſtingitur calor febrilis. Si autem febris ſit à bile, aut à ſanguine, maior eſt difficultas.

Curatio febris à ſanguine.

Si à ſanguine fiat, & plenitudo corpus grauet, pro cura paralyſis & febris ſanguinem mittere oportet, ſi modò omnia conſentiant, minor tamen ſanguinis copia euacuanda eſt, quàm ſi ſola eſſet febris. & non cum paralyſi. Refrigerandus eſt humor minoribus etiam remediis, ſed longiori tempore. Nam affectio frigida & humida, qualis eſt paralyſis, non patitur ea, quæ inſigniter reſſit.

refrigerant, & humectant, vel quæ incallescunt. Curetur hæc febris eo modo, quo diximus curari dolorem capitis à sanguine: vt si tertiana fuerit, curabitur etiam, vt capitis dolor à bile, miscendo tamen, quæ ad pituitam respiciunt habéant, tum in medicamentis attrahentibus, tum in purgantibus.

De epilepsia.

C A P. XXXVI.

Epilepsia magna ex parte fit à pituita, interdum à melancholia, raro à sanguine, rarissimè aut nunquam à bile. Fiat aliquando per essentiam affecto cerebro, aliquando per consensum aliarum partium. Morbus hic magna ex parte solet corripere infantes, & pueros. Si infans epilepsia corripiatur, curatio est talis. Primum nutritur interdicitur vino vtaturque aqua, vel hydromelite vtatur victu attenuante, & abstineat à coitu. Si nutritur redundet malis succis, purgetur pro ratione humoris peccantis. Si sanguis vaporosus redundet, fiat levis sanguinis missio ad euentilationem. Vtatur electariis diamosci, diambrae, pliris cum mosco, & se exerceat. Pueris applicetur cauteriũ actuale, in parte posteriore capitis, & maximè iis, qui obesiiores sunt, estq; præstantissimum remedium Florétia, quia pueri sunt obnoxij huic morbo, etiam mulieres admouet cauteria actualia, vt torrem ignitum. Detur puero pul. sequentis 3. j. cum lacte manè.

P V L V I S.

℞. radi. peoniae & seminis eiusdem 3. j. seseleos, anisi, carui, ana 3. ss. visci quercini (quod huic affectui maximè est proprium) 3. j. fiat pul. subtilissimus, addendo sacc. candi 3. j. Sunt qui laudant vsum pul. diamosci in eadem dosi cum lacte, vel aqua hyss. Hoc modo facillimè curantur. Si pueri sint maiores natu, non est præmittenda euacuatio. Curabitur primum per clysteres leuiter purgantes, & attenuantes materiam, sic.

C L Y S T E R.

℞. mal. viol. pariet. hyss. pul. ana M. ss. sem. anisi. foeni. fefel. ana 3. ij. cumini, seminis rutæ ana 3. j. flor. viol. cha. stechad. ana p. j. agar. 3. j. fiat dec. in q. iij. diss. mel. viol. & anth. ana 3. j. ol. cham. 3. j. ss. misce, fiat clyster. Si velis magis diuertere, adde drachmas aliquot diaph. vel indi maioris. Possunt vti pro digestiuo syr. sequenti.

S Y R.

R. mel. scil. 3. j. aquarum hyss. meliss. & violarū an. q. r. j addendo parū sacch. fiat iulep. cla. & aro. cū 3. j. diamosci. vtatur post clysterem. Detur potio sequens pueris non lactantibus, in lactantibus sufficit nutricem purgari.

Potio in grandioribus.

R. ag. tro. in oxymel. scil. infusi & fortiter expressi an. 3. iij. castor. gr. iij. salis gemmæ tantundem, mell. ros. col. vel syr. capill. 3. ʒ. aquarum hyss. absynthij, vel meliss. an. ij. fiat potio. Bonum est interdum omittere salem gemmæ, nisi vbi crâsis & lentis humoribus abundant, & opus sit euacuatione forti. Si maior natu sit, & maiorem euacuationem ferre possit, fiat hoc modo.

R. gly. raf. polypod. querc. visci querc. ana 3. i. pass. mund. pa. vj. seminis anis. scen. cub. an. 3. j. sesel. medul. feminis carth. & feminis vrticæ an. 3. ij. ag. 3. j. turbith. 3. ʒ. zinzib. ʒ. j. fiat decoct. In col. q. r. j. diss. mannæ granatę 3. j. diaph. ʒ. iij. misce fiat potio. Potes addere syr. capven. vel mel. ros. col. 3. j. Si fortiori euacuatione opus sit, adde elect. de citro fol. 3. j. Si debiles sint, & velis omittere diaph. adde in decoctione follic. senæ 3. ij. In hac affectione cassia non probatur, nec cath. In crastinum cap. bolum sequentem confortarium.

B O L V S.

R. cōser. anthos 3. j. diamosci dulc. ʒ. j. sacch. parum, fiat bolus. Vel vt facilius capiant, diss. in aqua hyss. & fiat potus. Capiant ter in heb. 3. j. pul. præscripti, & applicetur cauterium in occipite, vt in aliis diximus. Si *Epileps. à* pueris accidat (vt sæpe solet) *epilepsia à* vermibus, *primū* occidantur vermes, & eiiciantur è corpore, postea *Germibus* vtantur pul. præscripto. Potest fieri potus in accessu *in pueris* *epileps.* in pueris sic.

R. pul. præscripti, vel loco eius pul. diamosci dulc. ʒ. ij. seminis contra. ag. tro. an. ʒ. ʒ. syr. acetos. simpl. 3. ʒ. aquarum absynth. & meliss. an. 3. j. fiat potus, detur statim. Si à passu & repletum habeat ventriculum, prouocetur vomitus primū, postea detur potio. Interea parabitur clyster præscriptus.

Curatio epilepsie in maioribus.

Iuuenibus autem, senibus, aut viris, aut mulieribus, si

hic morbus fiat, curetur hoc modo. Primum detur ely-
 ster, & fiat sanguinis missio de cephalica, quibus redun-
 dat sanguis. Si in mulieribus fiat ob retentionem men-
 sium, prouocentur menses. Si ob retentionem hæmor-
 rhoidarum, aperiantur. Si ob retentionem spermatis,
 subueniatur conuenienti remedio, vel ieiunent, & mul-
 tum laborent, utatur semine viticis, loco piperis in bro-
 diis & acetariis. Si ob pituitam, ut sæpe fieri solet, con-
 coquatur & euacuetur. Concoquatur syr. calfacienti-
 bus & attenuantibus, quales sunt præscripti cap. de do-
 lore cap. à pituita. Eos prætermittere oportet, qui suc-
 cum vel radic. apij recipiunt, quia creditur à tota sub-
 stantia epilepsiam generare, & fonere, quanuis Gal. in
 consilio pro puero epileptico cōcedat vsum apij, & pe-
 tro. Maxime commendatur oxymel. scil. & syru. de po-
 mis compos. qui est omnibus aliis anteferendus. Eo uti
 oportet, sicut docuimus cap. de cephal. à melancholia
 nempe post purgationem. Utantur pilulis ante cibum
 priusquam syrup. digestiuis, aperientibus, & attenuanti-
 bus, & repurgetur ventric. à pituita, & cruditate, aut pro-
 uocetur vomitus. Sed pil. magis laudantur hoc modo.
 Hoc commune præceptum est, in quibus vitiosi humo- *Præcep.*
 res continentur in ventriculo, vel ubi adest cruditas. *cōmune.*
 Pilulæ descriptæ fuerunt cap. de cephalalgia à pituita.
 Pro principio ergo utantur hoc syrupo digestiuo.

Syrupus digestiuus.

R. mel. scil. ʒ. ij. syr. de stech. ʒ. iij. aqu. hyss. meliss. rutæ.
 beton. samps. ana ʒ. iij. fiat syr. qui potest cla. & aro. cum
 ʒ. j. diamosci vel diambra. Fortius erit hoc modo.

R. oxymel. scill. ʒ. iij. syr. de stech. ʒ. ij. aquarum ru-
 tæ meliss. foen. samps. ana q. j. misce. Post primam pur-
 gationem purgetur pilulis, quia attrahunt fortius à par-
 tibus longinquis, cuiusmodi est caput, quam potiones.
 Pilulæ sunt coctiæ, fortidæ; de sarc. de ag. de lapide la-
 zuli, &c. Fiant hoc modo.

PILULÆ.

R. mass. pil. fortid. & de mastiche ana ʒ. ij. ag. tro.
 ʒ. ʒ. troc. alandal. & castor. ana gr. iij. fiant pilulæ vij.
 cum aqua meliss. vel hyss. cap. cum custodia. Opti-
 mum est semper aliquid castorei addere in eiusmodi

pilulis. In crastinum detur theriaca, vel aurea Alexandrina, vel mithridat. nisi aliquid veret vsum calidorum, vel si mauis, accipe conseruas capitales cum pulueribus capitalibus, calfacientibus, & exiccantibus, & fac hoc modo opiatam.

OPIATA.

R. conseru. anth. vel saluiaz, & stech. ana ʒ. j. pul. diamosci dulc. vel diamb. vel pliris cum mosco. ʒ. ij. mell. scill. ʒ. ij. fiat in formam opiatæ, & cap. in crastinum medicamenti, estque id præstantissimum. Potest addi scilla exiccata in sole per 40. dies, maximè sub canicula, vel loco huius pone mel. scil. aut tro. de scilla, vt communiter parantur pro theriaca. Trocisci tantum debent poni maiore dosi, quàm caro scillæ exiccatae propter farinam orobi, quæ ingreditur eorum compositionem, vt ponatur tro. ʒ. j. vel ʒ. ʒ. vel carnis scillæ ʒ. j. vel ʒ. ij. mel adhuc in maiori dosi, vt ad ʒ. ʒ. vel ʒ. ij. vel iij. Et diss. cum aqua hyss. & dentur post hebdomadam, vel fiat sequens opiatæ.

Opiata.

R. conser. anthos, stecha. ana ʒ. j. conser. enulæ campanæ ʒ. iij. (Est enim in omni affectu pituitoso, & melancholico laudatissima) tro. de scilla ʒ. ij. rad. pœoniæ, & seminis eiusdem ʒ. j. visci quer. seseleos ana ʒ. ʒ. pul. pliris cum mosco, vel diambrae, vel diamosci, vel diacastorei ʒ. iij. syr. conser. zinzib. vel syr. stechad. q. s. fiat opiatæ. Si morbus contumax sit & antiquatus, veniendum est ad fortiora, & ad ea, quæ tota substantia operantur, & ad superstitiones. Ad fortiora quidem sic.

SYRVPI.

R. syr. de pomis compos. (qui robusto corpore præditis, & vomitu minimè obnoxiiis est efficacissimus) ʒ. vj. oxymel, scill. ʒ. ij. misce, detur cum aquis sequentibus, vel cum decoctione aliqua conuenienti.

R. aquarum melissæ, beton. samb. rutæ ana q. j. misce cum syr. Si verò fiat decoctio, erit efficacissima. Nunquam debet misceri syrup. de pomis compos. nec aliud violentum & forte medicamentum cum myrobal. aliisque multum astringentibus, quia illa violenta diutius in corpore manentia noxiam in corpore inferunt aliquando grauem. Quare potius debent misceri cum

Cautio.

aliis

aliis, quæ citò expellunt è corpore.

DECOCTIO.

Decoctio potest fieri diuersis modis, simplex aut cōposita. Simplex erit decoctum ligni indici, accipiendo quantitatem sufficientem pro quatuor aut 5. dosibus. Composita autem, quæ erit extremum remedium, fiet hoc modo, & præstantissima.

R. puleg. hyss. meliss. beton. capil. ven. ceterach, politruci, adianthos, sampsu. ana M. j. seminis rutæ agrestis vel domesticæ loco eius, seset, carui, anis. ana ʒ. j. agar. ʒ. iij. seminis carth. & vriticæ ana ʒ. ʒ. visci querc. & galangæ crass. ana ʒ. iij. polyp. & rad. enulæ camp. ana ʒ. ij. Possunt addi flor. anthos & stecha. fiat decoctio. In col. diss. syr. præscriptus. M. clar. & arom. pro delicatis cum ʒ. j. zinzib. & ʒ. ʒ. diamb. & diamosci tantundem. cap. in quat. aut quinque dosibus. Rursum cap. pil. præscriptas, vel alias, vt,

Pilula conuenientes.

R. pil. foetid. cochiarum ana ʒ. j. pil. de euphor. (quæ sunt vtilis morbis omnibus, in quibus opus est ingenti incisione, vt in apoplexiâ, epilepsia, lethargo, & similibus) agar. tro. ana ʒ. ʒ. fiant pilulæ cum aqua endiuiz & reducantur aliquantulum ad mediocritatem, vel cum syr. viol. Vtuntur sequenti portione.

POTIO.

R. hieræ colocynth. & hieræ Ruffi ana ʒ. ij. aquæ hyss. & meliss. ana ʒ. ij. mel. ros. ʒ. ʒ. misce fiat potio. Cassia nō laudatur, vt iam monuimus a principio. Si ob amarorem hanc reiiciant, vtantur sequentibus. In hac enim materia optimum est vti decoctionibus, quia in eis adduntur medicamenta purgantia pituitâ, aut melancholiam & simul attenuantia. Vel potest sumi reliquum apozematis, in quo dissoluantur laxantia, vt hoc modo.

R. decoctionis apozematis præordinati q. j. in quo diss. indæ maior. & diacarth. ana ʒ. ij. confect. hamech. descriptionis Mes. ʒ. j. ʒ. mell. ros. ʒ. ʒ. misce, fiat potio. vel fiat talis decoctio.

R. gly. ras. polyp. querc. ana ʒ. j. pass. mundatarum & prunorum ana N. x hyss. capil. ana M. j. seminis anis. foenic. cubeb. ana ʒ. j. seminis carth. ʒ. j. agar. turbith, vel

esulæ (esula enim creditur esse verum turbith) ana ʒ. j. myroball. chebul. indorum, vel citrinorum, (maxime cum est admixta cholera, vel melancholia) confricatarum cum ol. amygdalarum dulcium ana ʒ. ij. follic. fenæ ʒ. j. & β. fiat deco. In q. j. col. diff. elect. de citro sol. ʒ. ij. indi maior & cōfect hamech secundū descriptionem Mes. ana ʒ. j. β. fiat potio. Augearur dosi si opus est, pro materiæ euacuandæ copia, & viribus ægrōtantis. Si non ponantur myrob. adde syr. de pomis compositi, & mell. ros. ana ʒ. β. vel syr. de pomis compos. ʒ. j. In crastinum vtatur theriaca antiqua, vel mithridatio. Sequentibus diebus capiat de opiata præscripta, vel sequente.

Opiata.

R. zinzib. conditi, & pyretri conditi ana ʒ. β. (Si non reperiatur pyretrū conditum, ponatur zinzib. ʒ. j.) conf. enulæ camp. & stechad. ana ʒ. vj. carnis scillæ, si reperiatur, vel eius loco, mellis scill. illius ʒ. ij. huius ʒ. j. vel ʒ. vj. seminis pœoniæ, & radic. eiusdē, visci quer. fescel. (quæ tota substantia valent, vt & sequentia) ana ʒ. ij. coaguli leporis ʒ. β. cineris cuculli, & cranij hominis adusti, an. ʒ. iiij. vel ʒ. j. β. diamosci dulcis, rosaræ nouellæ, vel diagal. ana ʒ. ij. mell. scill. vel oxymel. scill. q. f. Cum ponitur oxymel, ponitur parum sacch. Vtatur pro summo remedio hæc opiata, manē, superbibendo parum aquæ hyss. vel meliss. accipiant ad quantitatem auellanæ, in prima hebdomada singulis diebus, aliàs ter in hebdomada. Si opiata non accipere, fiant pilulæ tales. Nam quæ insuauia gustui sunt medicamenta, melius aptantur ad formam pilularum, quàm alio modo.

*Quatuor
substantia
ad epile.
valent.*

Pilula.

R. cineris cranij hominis, cineris cuculli, ciner. hyrund. ana ʒ. j. castor calami ʒ. i. seseleos seminis pœoniæ (quod colligi debet luna decrescēte) & rad. eiusdē, radic. aristolochiæ rotundæ, & visci quer. ana ʒ. β. pul. diamosci, diamb. & galangæ ana ʒ. j. coag. lepor. vel hœdi ʒ. β. incorpo. simul, fiat massa pil. cum. mel. scill. for. pilulæ vj. pro ʒ. capiat pilulas manē iiij. loco opiata. Et vt facilius dissoluantur in ventriculo, ac proinde citius operentur, bibat parum aquæ chamepit. vel rutæ, vel callitrici, quæ postrema confert epilepsię à tota substantia. Poterit vti his pilulis loco opiata, vel etiam licet accipiatur opiata, alternis vicibus, nunc ex pilulis,

nunc

nunc ex opiata. Si interdum misceatur agar. tro. valde iu-
uabit. Potest cōfici pul. capitalis, & ex præscriptis albatro
castoreo, vel eius dosi dimidium, addendo sacch. quo v-
rantur cum vino albo, vel cum aqua descripta, ne videamur
semper eodem medicamento vti. Potest fieri aqua
theriacalis, quæ præstantissima est hoc modo.

Aqua theriacalis.

℞. theriacæ antiquæ q̄. j. myrrid. q̄. ℥. rad. enulæ *Cautio.*
camp. ℥. ℥. callithrici M. ij. chelidoni j. maior. M. j. tem-
perentur per noctem in vino maluatico. Omnia simul
ponantur in alambico vitreo, & fiat distillatio. Hæc aqua
valet in omnibus affectibus cerebri, & neruorū frigidis.
Commendatur etiam aqua hyrundinum, quæ conficitur
hoc modo.

Aqua hyrundinum.

℞. hyrundinum ℥. vj. castor ℥. j. temperentur in vino,
& modo supradicto distillētur. De istis aquis capiat duo
cochlearia ad summum, semel in mēse manē ieiuno sto-
macho. Omnia enim, quæ sunt tenuium partium, debent
sumi vacuo ventriculo. Quod si ante vsum harum aqua-
rum per duos aut tres dies accipiat pilulas, erit melius.
Potest ergo fieri massa pilularum de quibus capiat ter in *Pilula.*
mense, vel semel in hebdomada hoc modo.

℞. agar. tro. (qui maximè commendatur in epilepsia)
℥. iij. rad. brion. & cucumeris agrestis, esulæ, zinziber.
cal. aroma. ana ℥. ℥. castor. myrrhæ, croci, cubeb. spicæ,
schenanth. nucis moscatæ an. ℥. ij. tro. alandal. ℥. ℥. aloes
vnc. ij. mell. scill. vel oxymel. scil. ℥. fiat massa pilularum,
de quibus capiat ter in mense, cum custodia, ℥. j. Radix
cucumer. agrestis ponitur loco elatarij, quod non para-
tur. Quod si pararetur, ponendum esset. Si non sit forti-
bus vtendum, vt re mitioribus, & roborantibus pilulis,
quas poterit capere sine custodia, vt sunt pilulæ assaie-
rēt, de aromatibus, addendo tertiam partem agar. vel
pilularum sine quibus, vel de hiera composita, nun-
quam prætermittēdo agar. formentur semper cum mel-
le scill. vel oxy melle scil. vel cum syrū. de stechad. vel de
hyss. vel cum aquis appropriatis, vt rutæ, callitrici, &
similibus.

TOPICA.

Masticatoriis vtantur, caput purgiis, &c. ad corroboracionem cerebri. In caput purgiis nunquam omitatur succus samplici. In masticatoriis verò addatur vel pyretum, vel zinziber, addendo rad pœoniæ. Gargaris. fiunt ex decoctione herbarum appropriatarum & oxym. scil. Decoctio gargarismatis fiat talis.

Gargar.

℞. origani, calam. marrub. sambuci, beton. melis. calli. thrici ana M. j. gly. ras. rad. pyretri ana ʒ. ss. galangæ ʒ. ij. (bonum esset ponere galangæ ʒ. j. sed carior est, & loco eius ponitur iris in maiore dosi, quàm galanga) rad. ireos ʒ. j. seminis cubeb. ʒ. j. pass. mundatarum, ficuum ana pa. xx. fiat decoctio. In lb. j. col. misce oxymel. scil. vel mel. ros. vel syr. de stech. ana ʒ. iiij. vel iiiij. fiat gargar. Ad duntur interdum laxantia in gargarismatis ad maiorem pituitæ detractionem, vt si addas indi maioris ʒ. ij. Aliqui laudant suffimigia, quæ fiunt ex secundina asinæ, blatta bizantia, radice pœoniæ. Sed illa magis conueniunt in ipsis paroxysmis, vt etiam olfacere rutam, vt excitentur. Quod si velis exiccare cerebrum, satius erit parare sic.

Fumigia.

℞. cyperi, cal. arom. myrrhæ, mastiches, beniouin, ana ʒ. ij. florum stechad. & anthos ana vnc. ss. nigellæ rom. in aceto madefactæ, & torrefactæ vnc. j. misce, fiat suffumigium. Si sit cerebro maximè humido, & egeat fortiore exiccatione, adde sandaracæ ʒ. j. Vtatur pro suffumigio, quo suffiantur operimenta capitis ægtotantis, intra cubiculum bene clausum. Gestet secum pomum hoc sequens.

Pomum.

℞. rad. peoniæ ʒ. j. rad. pyretri ʒ. 6. flor. anthos, saluiz, & summitatum thymi ana ʒ. iiij. seminis ruræ agrestis, castor. piperis, cal. aro. cyperi, ana ʒ. j. beniouin, styrac. rub. ana ʒ. ss. mosci ʒ. vj In ditioribus possunt addi plura grana. Fiat pomum cum aqua rosata, in qua maceratum sit gummi arab. vel tragacanthum.

Epilepsia à melancholia curatio.

Si autem epilepsia fiat propter admixtionem melancholiæ, in syr. concoquentibus oportet addere, quæ humorem melancholicum respiciunt, splenémique, in quo naturaliter maior eius portio est, simul miscendo, quæ propria

propria sunt affectioni, cum iis, quæ tum humorem admixtum, tum partem affectam respiciunt, quod est in omnibus affectibus observandum. Melancholiam respiciunt, borrago, bugloss. capill. ventr. ceterach, philli-^{Quæ me-}sis, felix, capparis, cortex capparis, tamarisci, & fraxini, ^{lancho. re-}ferant. thymus, epithymus, portulaca, chamed. chamep. & scordium. Idem etiam faciendum in medicamentis purgantibus. Addimus enim his, quæ sunt affectioni propria, polyp. folia senæ, summitates thymi, myrobal. indos, & in fortioribus, lapidem lazuli, & armeni præparatos, & alia, quæ melancholiam trahere nata sunt, vt sunt inter composita medicamenta, pilulæ indæ, de fumaris, for-^{ridæ,} de lapide lazuli. Inter elect. confect. hamech. diascenæ, diamannæ, diaph. diacarth. Syrupi de pomis compositis, de fumaris, & omnia alia, quæ præscripta sunt in dolore capit. à melancholia. Semper tamen adiungere his oportet, quæ à tota substantia epilepsiam, & caput respiciunt. Si autem admisceatur bilis, vel timeatur supercalfactio hepatis, vel renum, vel aliarum partium, vel propter anni tempus, & aeris caliditatem, cum siccitate, aut ob temperiem ægri calidam, & siccam, aut per consensum hepatis calidioris, aut renum cum iis, quæ propria sunt epilepsiæ: addimus cichor. endiuia scariolam, summitates asparagi, lupulorum capil. ven. portulacæ. Syr. infrigidentes etiam, vt de endiuia, capil. verner de cich. qui principatum obtinet in hac affectione, vsurpabimus. Eadem erit ratio curandi epilepsiam factam per admixtionem bilis, vel propter ichores san-^{Quæ bile}guinis (dempta sanguinis missione) vel curandi epilepsiam factam tempore calidissimo, aut temperatura biliosa, vt si fiat hoc modo.

℞. syr. de cicho. ʒ. ij. oxymel. scil. ʒ. j. aqua cicho. ca-^{Syrupus.} pil. callubrici, beton. vel hyss. ana ʒ. iij. misce, fiat syr. pro tribus dosibus. Capiat post, tab. j. elect. trias. si requiratur maior infrigidatio: sin minus, ros. nouellæ. Purgetur pilulis sequentibus.

℞. mass. pilul. de agar. & de rhabar. ana ʒ. j. agar. tro. ^{Pilula.} ʒ. j. cum melle scill. aut oxymel. simpl. aut scilliti. (si non timeatur calfactio viscerum) formentur pilulæ. Pilulæ omnes sunt calidæ op aloem. Quare in syrupis

est maior vis infrigidandi, hisque magis vtimur in calidis affectionibus. Possunt etiam dari pilulæ de quinque generibus myrobal. addita parte tertia ag. Potest eadem ratione & metho. componi opiata.

Opiata.

R. conf. florum cicho. & viol. ana ʒ. ss. conf. anthos ʒ. ij. visci quer. rad. peoniæ ana ʒ. j. cineris cranij hominis ʒ. iij. pul. diamb. ʒ. ss. pul. diarrh. abb. & pul. triasand. an. ʒ. j. sacch. parum, cum syru. capil. fiat opiata. Vbi intendimus alterare, aut refrigerare, non solum eligere debemus, quæ id præstare queant, sed ea maxime spectanda sunt, quæ a tota substantia operantur, illaq. nunquam prætermittere oportet, etiam si contraria sint nostræ intentioni, & calfaciant. Et hæc remedia erunt pro epilepsia facta ob bilis commixtionem, & per consensum alicuius partis calfactæ, vt hepatis, renum, &c. Et quando cogimur ætate media huic morbo mederi. Eadem methodo sunt componenda medicamenta, vbi epilepsia fit per consensum splenis, vel per mixtionem melancholiæ. Vt si fiat hoc pacto digestium.

Qua methodo componenda medic.

R. syr. de fumar. ʒ. ij. de pomis compos. oxymel. scil. ana vnc. iij. (quia fortiora remedia sunt necessaria pro splene laborante, quam pro hepate. cum ob partis, tum ob humoris melancholici crassitiem & frigiditatem) aquarum portulacæ, scolopen. melissæ, rutæ ana q. j. fiat syr. pro quinque matutinis.

R. elect. diamosci vel diamb. tab. j. pro dosi. Purgatur pilulis sequentibus.

Pilula.

R. massæ pil. de fumar. & foetidarum, ag. tro. ana ʒ. j. formentur pilulæ cum oxymel. scil. Fortissimæ sunt pilulæ de lapide lazuli, & periculosæ. Post purgationem vtatur hac opiata.

Opiata.

R. conf. scolopen. & capil. veneris ana ʒ. ij. conf. stachad. anth. ana vnc. j. conf. ireos conditæ (si reperitur) conf. enulæ campanæ ana ʒ. j. Potest addi conf. rad. bugloss. & florum borrag. & similes, pul. diamosci, diamb. ana ʒ. j. pul. laticinæ Gal. vel pul. regum, vel de gemmis, vel confectionis alchermes ʒ. ij. medullæ seminis proniæ, & visci quercini ana drach. j. seminis palmæ Christi, macerari in aceto scil. drachm. ss. Semen hoc debet in aceto macerari, & maxime scil.

ante

antequàm exhibeatur. (Tunc enim citò descendit, & nullam infert noxam ventriculo: alioqui ciet vomitum, ob vñctuositatem. Errant ergo, qui non maceratum exhibent. Nam quanuis proprium sit affectioni, ventriculo tamen noxium est.) cineris cranij hominis, vel vngulæ asini, vel cineris hyrundinum, vel cineris vesicæ apri, in furno exiccata cum lotio ʒ iij syr. confer. myrobala. vel syr. de stechade, vel de hyss. vel oxymel scil. q. s. addendo parum sacch. fiat opiata, de qua capiat ad quantitatem auellanae, superbibendo parum aquæ enulæ camp. vel meliss. In hac sola opiata ponitur alchermes, quia cum sit admixta melancholia, volumus confortare cor, & à fumis atris repurgare, & fuliginosis. Sunt enim isti obnoxij melancholiæ morbo.

Epilepsia per consensum partis facta curatio.

Si verò epilepsia fiat per consensum alicuius partis externæ, vt cruris, vel manus, ligetur pars paulò supra locum, à qua incipit affectio. Supra partem affectam cauterium applicetur, vel vesicatorium, vt illud quod parabatur ex cantharidibus, cap. II. vel melle anacardino, vel applicetur capitellum Ioannis de Vigo, & permittite vulnus diu apertum, vt vacuetur venenosa illa materia, & qualitas, quæ est causa primaria affectionis. Quoties epilepsia fit per consensum alicuius partis externæ, nunquam debent adhiberi setones vel cauteria circa caput, nisi morbus ob antiquitatem, iam factus sit per essentiam, & proprietatem, & tunc debent applicari duo cauteria, vnum quod diuerteret à parte affecta longè à cerebro, magis quàm pars, vnde incipit affectio, & infra partem affectam. Alterum ratione cerebri, quia iam epilepsia facta est per essentiam, & fit in spatulis, aut alio loco, vnde fiat diuersio à cerebro. Quando infestantur paroxysmo, oportet frictionibus eos excitare, & fumigiis, vt suffumigio descripto suprà ex secunda asinæ, & blatta bizantia, ponendo etiam intra nares succum rutæ, & præsertim agrestis, aut trifolij foetidi, quod menianthem Diosc. appellat. Si ventriculus plenus deprehendatur, excitetur vomitus. Detur præordinatus clyster. Post aliquod tempus, & non in princi-

Cautio.

*Epilepsia
ab inedia.
Epilepsia
ab ira.*

pio sunt adhibenda sternutatoria. Nam in principio magis mouerent materiam, & morbum adaugerent. Si fiat epilepsia ob nimiam inediam, vt in ieiunantibus, detur parum vini maluatici. Si propter iram, aliasq. affectiones, detur mica panis cum vino tincta. Non sunt negligendi sinapismi in omni epilepsia post multas vacationes vniuersales. Si fiat epilepsia, per consensum ventriculi, laudatur vomitio, vbi est venter plenus: in aliis causis non laudatur. Bonum est vti clystege præscripto, & pilulis stomachicis ante cenam, vt sunt de hiera, de aromatibus. Omnia remedia interna debent esse communia tum capiti, tum ventriculo. Præscribendi sunt igitur syrups materiam pituitosam concoquentes, simul admiscendo quæ venter respiciunt, eumque corroborant, non propter astringentem (quoniam astringentium vsus non laudatur in hac affectione) sed ob aromaticitatem, vt sunt menta, balsamita, calamus aromaticus, spina nardi, & celtica, & schenanthum, quæ simul sunt capitalia, & stomachica.

Syrups concoquentes pituitam.

Syr. autem erunt de hyss. (qui simul confert capiti & ventriculo) de stech. de absynth. sed hoc in minori dosi, quam alij, syr. de menta, conseruæ cortic. ritri. Verus acor. maximè laudatur, qui est galanga crassa. Communis verò acorus astringit, sine aromaticitate. Fiat ergo digestiuum tale.

℞. syr. de hyss. de absynth. an. ʒ. j. syr. de stech. ad. vel de menta, & mell. scill. ana ʒ. ij.) oxymel non debet poni, nisi in exigua quantitate) aquarum betonica, melissa, hyss. & mentæ ana q. j. misce pro quatuor matutinis.

℞. elect. diamosci, vel diambra, vel aro. ros. vel pliris cum mofeo, Ros. nouellæ tab. iij. Purgetur leui medicamento, quia non sunt præscribenda fortia medicamenta in affectibus ventriculi, quia omnia lædunt ventriculum, & ita adaugetur morbus. Fiant ergo pilulae hoc modo.

*Pilula pro
Ventricul.
Opiata.*

℞. mass. pil. de assaieret, & de hiera compos. vel de mastiche, ag. tro. an. ʒ. j. formentur pilulae cum syr. de hyss. vel cum aqua mentæ, aut absynthij. Opiatæ magis laudantur, quam tabellæ.

℞. cortic.

℞. cortic. citri conditi facch vel melle (si sit pauper, & non quæramus suauitatem) ℥. j. conf. anthos, zinzib. cōditi, cōl. stech. an. 3. vj. pul. aro. ros. 3. j. β. pul. diamosci 3. j. pul. diarrhod. abb. 3. β. cineris hyrundinum, vel cuculli, vel crani j hominis, radic. peoniz, & visci, querc. ana 3. j. seminum anis. cumini, & seseleos tenuissimè tritorum ana 3. j. syr. conferv. myrobalanorum, vel cortic. citri, vel *Quæ res* syr. de hyss. q. s. fiat opiata. Quæ immoderatè calfaciunt, *solum* resoluunt calorem natium ventriculi, & tandem frigi- *sim* *Gen* ditatem inducunt, vt apparet in puellis, quæ edunt zin- *triculo* ziber, & similia. Ob id enim occupantur à pallidis colo- ribus. Quare non vitur illis sine delectu, præsertim In epile- ventriculo laborante. Si epilepsia fiat à bile asseruata in *psia à bile* ventriculo, curanda erit modo præscripto, addèdo sem- *quid ca* per aliqua quæ ventriculum respiciunt, maximè quæ *uendunt* frigida sunt. Quòd si vitur calidis, vitur in pauca quantitate. Si epilepsia fiat per consensum ventriculi, laudantur pulueres à pastu, qui fiunt hoc modo.

PVLVERES.

℞. anis. conditi 3. ij. coriandri vnicæ cooperturæ, & fœni. an. 3. ij. medullæ seminis peoniz, & cubearum, corall. albi & rub. an. 3. j. pul. aro. ros. 3. j. pul. diag. 3. β. facch. q. s. fiat pul. de quo capiat duo cochlearia post pa- *Calida* stum, non superbibendo. Admiscuntur coralli ob cube- *post pastu* bas, quæ sunt fortiores. Nam quæ multum sunt calida & *non sunt* tenuium partium, non sunt sumenda post pastum, quia *sumenda* cogerent cibum nondum coctum descendere ad venas meseraicas, & ad iecur, atque ita parerent obstructions, & cruditates. Est etiam roborandus ventriculus emplastro aliquo, vel sacco, accommodatis ventriculo.

VICTVS RATIO.

Ratio victus præcipua est in hoc morbo. Vitur victu attenuante, & exiccante. Edant panem biscoctum ij, qui non laborant epilepsia facta per consensum ventriculi. Si fieri possit, bibant aquam, vel fiat hydromel cl. arom. cum 3. j. zinzib. & 3. j. galangæ crassæ, & cinamomi. Hæc aromatisatio fit pro lb. viij. aquæ, &

mell. lb. j. coctis ad consumptionem tertiæ partis. Vtatur alsis potius, quàm elixis: abstineant à iusculis & brodiis, quod etiam in omni materia catarrhali præcipitur. Si interdum ob virium imbecillitatem, vel ob consuetudinem, danda sunt brodia, vtatur iis, in quibus decocta sint hyss. beton. melissa & similes herbæ attenuantes. Optimum erit decoquere pipiones in iusculo cum betonica, vel etiam intra pipiones cum aliis appropriatis infarcire. Vel fiat pul. qui sequitur, quo vtatur in brodiis & condimentis.

Pulvis.

R. zinzib. nucis moscatæ, cubeb. piper. an. ʒ. ij. cinamomi ʒ. iij. seminis feseleos & peoniæ ana ʒ. ss. fiat pul. huic affectioni determinatus.

Curatio epilepsia ab affectibus Vteri.

Cautio.

Si ab utero fiat epilepsia, vel ob imprægnationem, vel ob retentionem, vel ob corruptionem spermatis, vel secundinæ retentionem, fiet vt sequitur. Et quidem si fiat ob retentionem mensium, provocentur menses, vt suo loco dicetur. Obseruandum verò est maximè, quoties sint prouocandi menses, aut alioqui vtendum aperiensibus, vt semper tollatur crudititas, si adsit. Saltem ventriculus est repurgandus humoribus nocuis, & excrementis, aut pilulis ante cœnam, aut vomitu, aut aliter. Purgetur pilulis fœtidis, vel de ag. Concoquatur materia cum syr. præscriptis, admiscendo syr. de arth. vel aquam arthef. matricariæ, nepetæ hoc modo.

R. oxymel. scill. ʒ. iij. syr. arthe. & de hyss. ana ʒ. ij. aquarum meliss. fœnic. matric. & nepetæ an. q. j. misce pro tribus dosibus aut iij.

R. triph. magnæ sine opio (quia est appropriata utero) tab. iij. aut iij.

R. pil. fœtid ʒ. ij. ag. tro. ʒ. ss. formentur pilulæ cum oxymel. scill. Vtatur theriaca, mythrid. vel triphera magna sine opio, fiat opiata post purgationem, vt in aliis dictum est. Sed præligendus est pul. diambæ, qui in mulieribus est magis conueniens. Emplastrum pro matrice in hoc affectu tale fiat.

Empla-

strum pro
matrice.

R. mass. empla. cheronei ʒ. iij. malaxetur cum ol. liliorum vel spicæ, adde musci gr. iij. Si à retentione &

corru-

corruptione seminis, vel secundinarum, eiiciantur, & postea corroboretur vterus modo prædicto.

Epilepsia prægnantis curatio.

Si prægnanti accidat epilepsia, difficilis est curatio, tum quia purgantibus medicamentis vti prohibemur, nisi à quarto ad septimum mensem. (Sed propter accidentia, quæ superueniunt, satius est curatione non moliri) Tum etiam propter morositatem mulierum, donec pepererint. Interim vtendum his remediis, quò morbus fiat mitior. Emplastrum pro matrice prægnantis.

R. mass. emplastri pro matrice & cheronici an. ʒ. iij. ss. mosci gr. vj malaxentur cum oleo liliorum vel de spica, fiant emplastra duo, alterum supra ventrem ad regionem matricis ponatur, alterum supra renes in dorso. Vbi solum est intentio purgandi, & exiccandi vterum, ponitur solum emplastrum cheroneum. Vbi roborandi & retinendi foetum, miscemus emplastrum pro matrice. Ad varietatem, loco emplastri possumus vti vnctionibus & sacculis, vt in vna parte emplastro, in alia vnguento. Vtatur electu. diamosci, diambrae. Teneat sepe in ore tro. de mosco. Venterculus corroborandus est sacculis & vnctionibus. Sacculis quidem præscriptis cap. de dolore capitis facto per consensum ventriculi: inunctione verò, sequenti.

R. olei nardini ʒ. iij. de absynth. & de menta an. ʒ. ij. *Inunctio.* misce, vngatur ventriculus, vel addendo ceræ parum. fiat vnguentum. Possunt addi aliqua arom. vt cyperi, garioph. nucis moscatae, amborum corallorum, macis, ros. spicae, schenanthi ana ʒ. j. fiat vnguentum. Fiat pessarium pro semine corrupto, & mensibus retentis.

R. benedictæ ʒ. ss. ag. trocif. ʒ. j. colocynth. seminis *Pessarium* nigellæ romanæ an. ʒ. ss. cū succo mercurialis, fiat pessa- *pro semine* *corrupto.* *rum,* indatur vuluæ, adhibeantur cucurbitulæ inguini- *bus.*

De Epilepsia, caput alterum.

Epilepsia, Latinis comitialis morbus, sacer, herculeus, & lunaticus dicitur. Est autem vniuersalis conuulsio corporis ob affectum communium nervorum principium, diciturque vniuersalis ad differentiam

Differen- tum particularis tū Empirothotoni, Opisthotoni & te-
tia. tani. Cū particularis est, dicitur eius partis conuul-
 sio, quæ contrahitur, vt brachij. Fit autem, cū cere-
Causa. brum in seipsum sese contrahit, vt, quod noxium est ex-
 pellat, quemadmodum & in sternutatione, cui similis
 est. Fit enim sternutatio, quando quod molestat, in an-
 teriori parte cerebri tantū continetur, prope eius ap-
 pendices, & narium interna foramina, ita vt si materia
Locum ma- pauca sit, vna vel duabus vel tribus contractionibus ex-
teria epi- pelli queat. Materia autem Epilepsiæ in ventriculis me-
lep. diis & posterioribus hæret aut in parte posteriori, ob
 idque difficilius excutitur. Cōmunis medicorum scho-
 la credit cum Galeno, crassum humorem cerebri ven-
 triculos obstruentem hunc maximè affectum parere,
 quibus obstructis spirituum transitum impediri necesse
 est. Existimant enim spiritus animales in ventriculis ce-
 rebri contineri extra arterias: in quo plurimū aber-
 rare mihi videntur. Nam si crassus & viscidus humor
 ventriculos cerebri obstrueret, vt illi putant, qui spiri-
 tum, quominus posset exire, impediret, cessaret motus,
 aut saltem minor fieret, vt in Paralyfi accidit. At tantū
 abest vt cesset, vt omnes partes præter voluntatem ad
 motum concitentur. Porrò si Epilepsia fiat propter a-
 liquam obstructionem, ea erit in meatu illo, qui à cere-
 bro ad coanam, id est, peluim siue infundibulum per-
 ueniat, per quem pituita ad palati foramina descendit,
 quod contra fit in Epilepsia. Ob id Gal. 4. & 11. de vsu
 partium optimè à natura comparatum esse ait, vt per
 decliues cerebri meatus, tum per palatum in os, tum
 per corpus narium orificis perspicuis ac magnis, pitui-
 ta aut alia cerebri excrementa excernantur, ne animal
 frequenter corripiatur Epilepsia. At contrà in Epilepsia
 accidit, in qua per illam viam expurgatur materia, qua
 insultum excitat, & ea, quæ cum spuma ex ore eicitur
 ab ægris. Adde quòd Epilepsia magis à tenui materia
 vel spumosa & acri fit, quàm crassa, vt illi existimant.
 Subitaria enim obstructione in magnis cavitatibus
 non fit. Nec sequitur, subitò fit, ergo à crasso viscoso-
 que humore. Argumentū Galeni docet Epilepsiam non
 fieri absque materia. Nam morbi omnes, qui ab in-
 tem-

temperie sicca fiunt, citra affluxum materiæ, sensim fiunt. quod Galenus demonstrare voluit. Quod autem repente fiat Epilepsia, id materiam potius tenuem esse, quàm crassam indicat, vt cita morbi solutio, materiæ paucitatem & tenuitatem. Crassa enim difficillimè mouetur, tenuis facillimè. Sed quò magis veritas elucescat, aliis argumentis conuincamus Epilepsiam fieri à materia acri vel tenui, vel aquea vel spumosa potius quàm crassa. Primum negari nò potest Epilepsiam omnia genera, quæ per consensum fiunt, à substantia tenui fieri. Quod Galenus de locis affectis in iuvene illo gràmatico indicat, qui quoties vehementius doceret, aut cogitaret, aut in ediam sustineret, aut irasceretur, morbo comitiali corripiebatur. Eodem in loco scribit se multos vidisse conuulsione comitiali ab ore stomachi correptos, aut cum non probè concoxissent, aut vini meracioris plurimum potassent, aut ubi veneri immodicè operam dedissent: quinetiam per febres quosdam conspexisse de repente conuulsione præhendi, nullo (quod eam prælagiret) præcedente indicio, qui bilioso superueniente vomitu protinus ab omni noxa liberati fuerunt. Atque hoc modo affectorum nonnulli res quasdam fuscas vomendo reiecerunt, alij humorè porri succo similè. Hactenus Galenus. Ex his locis manifestè apparet. per còsensum ventriculi fieri epilepsiam à vaporibus eleuatis à bile flaua & porracea & fusca, quæ atram bilem indicare videtur. Præterea docet hunc affectum oriri ex agitatione, aut ab ira, aut à magna contentione, aut vaporù acrimonia, vt in eo, qui ob potum meracioris vini epilepsia corripiebatur, aut inedia, quæ humores exacuit. Item quæ fit per consensum vteri in mulieribus, à vaporibus caput conscendentibus fieri manifestum est. Materia enim crassa ea in parte conclusa sursum eleuari nequit. Testantur & hoc mulieres, quæ fumum quandam ascendentem sentiunt Extat historia apud Galenum de puero. qui aurà è pede sursum eleuari sentiebat. In eadem sententia videtur esse Aristot. sub finem libri de somno & vigilia, cum scribit pueros maximè esse obnoxios epilepsie, quòd eorum caput multis fumis repleatur. Quare ab usu vini, quod suapte natura est

vaporosum, & quod caput tentat, vult mulieres abstine-
re. Solutio enim morbi repentina ostendit materiam
paucam eandemque tenuem esse, quod facile discuti-
tur. Simili argumento Galenus vsus est in lib de tre-
more & palpitatione, vt probaret iectigationem fieri à
tenui humore, quia citò dissoluitur & generatur. Quod
etiam testatur vacuationes, quæ fiunt, cum à paroxysmo
liberantur. Oscitant enim, sternutant, & spumam per os
reddunt, quæ omnia materiam esse tenuem ostendunt.
Materia autem crassa, nisi attenuata fuerit, non facile
euacuatur. Fit autem comitialis morbus à nidore & o-
doratis, vt experientia comperi. Quare necesse est fumos
omnes, aut omnes, aut materiem communem habere a-
liquam qualitatem, vel quantitatem, quæ cerebri facul-
tatem expultricem commoueat. Noui multos, qui cum
iter facerent, ex aëre vel vento concepto per nares, sta-
tim epilepsia corripiebantur, à qua si aures bombace,
aut aliqua alia substantia molli, obstruerent, sese vindi-
cabant. Hæc annotaui, vt intelligerent studiosi epilep-
siam fieri & à pituita tenui, & à spumosa, vel à bile fla-
ua, vel attenuata atra, aut eius ichoribus, vel à vaporibus
acribus, vel ab odoratu, propter cerebri exactiorem sen-
sum. Hinc efficitur, vt qui ingenij acumine pollent, huic
morbo frequenter obnoxij sint, vt de Cæsare Mahume-
te, Carolo quinto Imperatore scriptū legimus. Id quod
illi à Comitibus inditum nomen testatur, eò quod pluri-
mi ex Romanis in illis eo morbo frequenter corripī vi-
derentur. Hac igitur distinctione facta, facilius morbo
medebimur. Nam quædam prosunt epilepsię confor-
tij lege factæ, atque in materia calida, quæ non conueni-
rent in crassa & viscida, vt perfusio capitis cum oxyr-
rhodino, quam Celsus imperat ad repellendos fumos,
& succos irruentes in ventriculos cerebri. Item misio
sanguinis, vsus theriacis recentis, aquæ vel conferuæ,
violarum vsus, quam non alia ratione prodesse puto, nisi
quod vim narcoticam quandam habere scripsit Mesue.
Item asyncritum & aliæ compositiones quæ opium re-
cipiunt, ab antiquis ad comitialis morbi insultus com-
mendatæ fuerunt. Morbus hic citò deprehenditur, di-
stinguiturque facile ab omnibus morbis à materia fri-
gida

*Solertes
comitiales
morbo ob-
noxij.*

Signa.

gida in capite collecta factis, à Caro, Lethargo, Paralyfi, quos affectus quies necessario sequitur. Differt etiam ab illis mentis perturbationibus per spumam in ore collectam, quæ peculiaris est admodum huius morbi nota, non tamen in omnibus semper apparet. Nam qui ob nidorem vel fumos acres epilepsiam patiuntur, in his confestim soluitur, etiam sine spuma, quæ fit cum diutius durata accessio, & cum ob frequentem inspirationem & expirationem aqua tenuis agitatur, & spiritu, aut substantia quadam vaporosa circumplectitur, ex qua spuma generari solet. Occupat hoc genus morbi pueros potius, quia maxima fit effusio in illis ad caput, ut ostendit somnus, qui primis diebus & mensibus eos detinet. Eam ob causam Aristot. iubeat nutrices à vino abstinere, quod multos vapores excitet, eosque paruulos corripit potius, quam adolescentes, & iuuenes, quam prouectiores. Ob id matrem puerorum nonnulli appellant. Frequentius in aliquibus regionibus morbus hic, quam in aliis grassatur, ut Florentiæ magis est familiaris, quam in alia Italiæ parte. Quod tribus de causis accidere puto. Prima & potissima, est substantia cerebri tenuis & valde sensilis, ob quem sensum facilem hunc morbum incurrunt, ut melancholici dicuntur natura ingeniosi. Quod autem substantiam habeant subtilem, ostendit eorum ciuium perspicax ingenium & iudicium acre. Altera causa esse potest victus ratio vaporosa & flatulenta. Tertiam esse puto, quod hic morbus sit hereditarius. Cum enim multi olim hunc morbum passi sunt, plures liberos ad eum suscipiendum idoneos procreant. Nam ut Hipp. scriptum relinquit, Sani sanos, & ægri ægros pueros generant. Est & hic morbus frequens in Prouincia, quæ ab eiusdem incolis vocatur (la goutte) ut in Aluernia, quod non aliunde accidere puto, quam ex praua victus ratione, & vinorum mixtorum, quæ apud illos sunt, usu. Sunt enim valde fumosa, cruda, aliis permixta, unde caput vaporibus tentant & implent. Habent etiam cerebrum valde sensile, quantum id vinorum vsui tribuendum magis existimarim. eo quod qui illuc commigrant, in similem propensionem incidisse obserua-

ti sint. In aliis regionibus minùs frequens est.

Curatio puerorum.

*Vitæ
ratio.*

Primum præscribatur optima victus ratio & nutriti & infanti. Deinde medicamenta sumenda. Nutrici vinum interdicator, fugiat venerem, quæ lac ipsum corrumpit, vel materiam lactis mutat. Ab ira, & corporis omnino, ac vehementi animi commotione absteineat. Flatulentis & acerbis alimentis non utatur. Si biliosa sit, mutanda est, aut frequenter euacuanda medicamentis leuiter laxantibus, & sine magna agitatione humorum. Exhibendum lac asininum, in quo decoquantur, vel infundantur, quæ magis humori n. xio determinata sunt, vt si biliosa sit, decoquantur rosæ & violæ recentes, vel infundantur & sub dio maneant. Si melancholica fuerit, epithymum, polypodium, senna cum aniso decoquantur. Si pituitosa, agaricus, vel carthamus, vel viscus quercinum, vel pœonia recens, quæ vim habent purgandi pituitam, vel eadem ventre galli antiqui conclusa coquantur. Quod si hæc parùm prosint, mulieri dentur fortiora medicamenta, pilulæ, vel aliæ compositiones superiùs traditæ, cum de humorum vacuatione in capitis doloribus ageremus. Eo autem die, quo sumet medicamenta fortissima, mamillam puero non porrigat nisi serò. Exhibebimus autem puero puluerem superiore capite præscriptum cum lacte vel melle manè. Valent enim à tota proprietate feseli, pœoniæ radix, & viscus quercinum. Vel fiat sequens.

P V L V I S.

R. violarum ʒ. j. cumini, carui, feselij ana ʒ. ij. seminis pœoniæ, rutæ ana ʒ. j. cineris cranij hominis, vel cuniculi, vel hyrundinum, vel mustellæ, ʒ. iij. fiat pulvis tenuissimus, de quo capiat ʒ. ʒ. sacchari candi ʒ. j. cum quaviolar. vel cum syrupo violaceo, vel cum aqua callithrici, vel cum lacte recenter mulso, vel cum melle rosato. Nostræ mulieres frequenter in hoc affectu usurpant compositionem diamoschi dulcis, quæ minus probanda est, quia nimis tentat caput ob odorem, in parua tamen quâtitate temporis paroxysmi dari potest, vt, quod in capite est, discutiatur. Aliæ mithridaticam compositionem, aliæ theriacam exhibent, quod

quod Galenus improbat. Hæc enim remedia fortissima pueros læderent, qui calidiores sunt, & ad dissolutionem promptissimi. Florætinæ mulieres cauterio occiput vrunt, idque habent in communi vsu, edoctæ quotidiana experientia. Rusticæ pueros sacerdotibus deferunt, vt cauterio, vel carbone ignito partem illam posteriorem vrât, quod maximè confert, si epilepsia facta fuerit per idiopathiam. Si enim per sympathiam aut ventriculi, aut partium infernarum, hoc esset potius trahere humores ad cerebrum, quàm idem euacuare. Tunc autem optimum est extra partem vapores vehementer deriuare. Supra partem inspergere oportet puluerem sequentem, quia vti oxyrrhodino mulieres reformidant.

℞. corros gra. myrthi ana ʒ. β seminis lactucæ ʒ. j. *Puluis ad graecorum tinctorum, santali rubri (quia minus odoratum est) coralli rubri vsi (vratur corallum, vt facilius in puluerem reducat) & loti (vt maiorē tenuitatem habeat) ana ʒ. j. β garyophyllorum & cyperi ana ʒ. ij. fiat puluis subtilissimus, qui aceto irroratus, & leuiter exiccatus inspergatur parti bregmatis.*

Si autem alius non sit libera, iniiciatur clyster ex *Clyster.* hordeo, melle, & saccharo. Hac ratione pueri & infantes liberantur.

Curatio maiorum natu.

Si autem maiores natu, vel iuniores & adolēcentes corripit, in principio mittatur sanguis ex vtraque cephalica, si multus sit: sin paucus, secetur vena poplitis ad materiæ deriuationem, quod iubet Gal. lib. de curat. per sang. missionē. Caput oxyrrhodino frequenter perfundatur, vt Celsus iubet, & ratio faciendum censet potissimum in his, qui per cōsensum læduntur, eadem ratione, qua Galen. in Methodo commune Phrenitidi, Lethargo, & similibus affectibus esse asserit, vt oxyrrhodinum in principio admoveamus ad repellendum à capite humorem, qualiscunque sit. Cibus sit euchymus, nec vaporosus. Vinū quoq; vitetur, quia epilepsia facit, vt & Ceruisia, & Zitum, & alia decoctio facta cum cinamo & similia, quæ caput tentât. Ex his enim omnibus vapor multus in caput tollitur, qui accessionem

Sanguinis missio.

Perfusio capiti.

Vistustatio.

Pilula.

epilepticam accersit. Utatur pilulis paratis ex agarico, myrob. rhabar. & aliis medicamentis humori vacuando accommodatis. Parantur autem pilulæ absque croco, myrrha, & aliis, quæ caput tentare nata sunt. Sarcocol. la, & peronia sufficienter purgant. Myrobal. laudantur. Aliquam astringentem relinquunt, neque humores multum exagitant. Agaricus, tum quia bilem, pituitam, aliosque humores euacuat, tum quia siccatur & cerebrum

Purgatio.

& nervos, commendatur. Detur tamen absque zinzibere. Sufficit enim aqueam pituitam trahere. Quod si à bile, vel in corpore bilioso fiat, dari debet agaricus cum syrupo violato, vel rosato. Si à pituita, cum hydromelite. Leuiter & frequenter euacuandi sunt, cum incipiunt laborare. Nam si antiquus morbus fuerit, fortissimis medicamentis humor vacuandus erit, ut colocyntide, scammono, euphorbio, lapide lazuli, & similibus, citra tamen magnam humorum agitationem. Quod si cacochymia sit in venis & aliis partibus multum remotis à ventriculo, utilissimum erit humores præparare, quod facilius expellatur, facta prius illorum distinctione. Si enim corpus pituitosum, & multis flatibus refertum sit, concoquere oportet pituitam detergentibus & leuiter incidentibus potius, quam fortiter aperientibus. Ad eius etiam concoctionem valet mel ros. collatum, hydromel, syr. de stechade cum aquis callitrici, beton. hyssopi, rutæ, vel cum earum herbarum decocto, aut cum radicibus peroniæ, polypodij, querc. & acori. Si autem pituita sit viscida & lenta, mel scilliticum erit ex usu. Incidit enim & deterget. Epilepticus ex Galeni sententiæ usus est oxymelite scillitico ad euacuationem. Hoc tamen consilium Galenum non dedisse asserunt, quod facile crediderim. Si vero bilis sit concoquenda, id commodè fit cum syrupo endiuæ simplicis, syrup. capill. ven. acetoso simplici & violarum, cum aquis viciocho. end. papa. portulacæ & similium. Si materia sit melancholica, conueniunt de fumaris simpl. de stechade, de pomis compositus ad euacuationem. Simplex ad concoctionem descriptus à Mesue de dolore cap. à pituita. Cum aquis vel decoctione herbarum, bugil. fumar. borrag. beton. callitrici & similium, Finitis syrupis iniiciatur

iniciatur clyster ante medicamento assumptionem ex decoctione herbarum detergentium cum melle & succo ciclae, vel mercurialis. In crastinum dentur vel pilulae, vel electuaria, vel potiones. Quae omnia descripta sunt capite de dol. cap. qui fiunt pro consensum, pro humorum varietate. Si autem alicui syrupus compositus cum medicamento, laxante gravior sit, paretur talis.

Syrupus.

R. polyp. quer. ʒ. iij. rad. pœoniae & seminis eiusdem an. ʒ. ij. callithrici, violatriæ, merc. an. M. j. summitatum rutæ, pulg. vtriusque beton. hyssopi, an. M. ʒ. pass. enuclear. prunorum & sebesten ana P. xx. anisi fœseli, ana ʒ. iij. seminis carthami confusi, & sennæ orienta. an. ʒ. ij. flo. vio. P. ij. buglos. anthos, an. P. j. fiat decoctio in hydro melite, & ad ʒ. j. ʒ. In qua infunde ag. ʒ. j. ʒ. Leuiter decoquantur & fiat syrupus. Arom. ʒ. j. vel ij. galangæ entisæ, addendo sacchari parum. Capiat tribus diebus continuis, Vere, & Autumno, post priorem euacuationem.

Idem præstat syr. de fumaria comp. vel syr. de pomis comp. si exhibeatur cum aqua callithrici. Quod si alium mouere magis velis, vel corpus purgare, detur cum decocto agarici, vel mercurialis, cum decoctione myro.

Epilepsia per consensum curatio.

Si epilepsia per consensum fiat, decoctum galli antiqui, cum brassica marina, polypodio aut passulis plurimum valer, vel si deest brassica, eius loco substituatur senna, vel cum decoctione pœoniae maris, vel fœminæ recentis, quia iuuat, & ventrem purgat. Pilulae optimæ parantur citra crocum & myrrham hoc modo.

R. aga. ʒ. ij. zinziberis, salis gemmæ, cinamomi, spicæ vtriusque, cubeb. ana ʒ. ʒ. castorei gr. vj. aloes non lotæ ʒ. ʒ. cum succo merc. fiant pilulae, de quibus capiat pilulam vnā, vel duas singulis diebus per spatium duorum vel trium mensium. Quod si duabus non moueatur, capiat quatuor, vel quinque, vel sex, vel septem, semel in hebdomada, vel adde troc. alanda. gr. ij. vel iij. pro vna dosi.

Pilulae eadem valent ad melancholiæ euacuationem, dummodo tantillum epithymi addatur, quantum agarici,

*Ad epilepsiam biliosam & per consersum & triculifaciam
parentur in hunc modum.*

*℞. rhabar. tenuissimè puluerisati & irrorati aqua viol.
3. ij. myrob. citrino. & indor. confric. & in infus. in succo
ros. ana 3. j. agarici 3. ℥. cinamomi, spicæ, fœli ana ʒ. ℥.
aloes 3. iij. cum syru. rosato formentur pilulæ 6. pro 3. de
quibus capiat quatuor, quinque, vel sex semel in hebd.
per duos sequentes dies. Hæ pilulæ ab aliis differunt, quod
astringentia & bilem purgâtia recipiant. Agaricus etiam
non trociscatus in minore dosi ponitur. Den que sine
castoreo parantur, quod humores pituitosos frigidos
fundit & liquat. Conficitur puluis ad euacuationem pi-
tuitosæ aquæ aut liquidæ hoc modo.*

*Puluis ad
pituitam.* *℞. tartari vini albi vnc. ℥. fennæ orient. vnc. j. salis
gemmæ & zinziber, ana ʒ. j. anisi 3. j. fiat puluis, ex quo
capiat cochlear vnum cum decocto mercurialis vel
cum iure capi, vel pulli, vel parca quantitate syrapi vio.
vel ros.*

Si fortiorem velis pro morbo antiquo, adde turbith
infusum in hydromelite, & rosacei 3. j. scammoni ʒ. j.
Mutandæ sunt formæ medicamentorum, in quibus eua-
cuare frequenter est necesse, facta vniuersali purgatio-
ne. Si æger frequenter expuere solebat, si stupido ani-
mo & multum dormiat, argumentum est multum pi-
tuitæ in cerebro coaceruatum esse, à qua fumi & spiritus
eleuantur, quibus concitatis in ventriculis cerebri fit e-
pilepsia, tunc pituita apophlegmatismis elicienda est, vt
cubeb. pyretro, nasturcio, quæ per se masticari debent,
vel in puluerem reddita, & simul iuncta excipiantur ce-
ra, vel potius ficibus, vel passulis, & masticentur, loquen-
do, vel vociferando, vt materia trahentibus his facilius
cedat. Repete masticatoria, quæ capite de Alopecia di-
cta sunt, item errhina. Hæc sunt masticanda ante pran-
dium & cœnam. Oliuæ sale conditæ & diu masticare
pituitam e cerebro potentissimè trahunt & citra fasti-
dium ægri. Hæc fiant per tres aut quatuor dies, quibus
vtilissimum erit herbas attenuâtes & incidentes in bro-
diis dare, vel prisana, ad eliquationem humorum, vel a-
quâ hyrundinum, de qua postea dicemus, & castoreum.

Multè

Multò tamen facilius euacuantur cerebri recrementa pituitosa, vel pituita permixta, si prius eliquata fuerint. Post istas particulares euacuationes, theriaca, quæ materiâ absument in parte, danda est, nisi valde antiqua fuerit. Nam tunc etiam loco castorei cum sternutamentis usurpari potest, ante theriaces, vel mythriddatij, vel asynkriti assumptionem. Quod si ex istis masticatoriis maior excitetur fluxio, exhibendæ sunt pilul. præscriptæ ad pituitæ euacuationem, & in crastinum danda theriaca recens, vel trium anno. Si verò æger biliosus fuerit, aut substantiam cerebri tenuem & subtilem habeat, recens danda erit. Sin stupido sit animo ob largâ illam humiditatem, tunc exhibemus theriacâ antiquam ad illam humiditatem absumentam. Idem præstat opiata sequens.

Opiata.

R. conf. anthos, stechados, ana ʒ. ʒ. zinziberis viridis melle conditi ʒ. ij. cineris cranij hominis ʒ. j. cineris cuculli, vel hyrundinum, vel mustellæ, rasuræ eboris, vel cornu capræ ana ʒ. ʒ. pulueris diagalangæ ʒ. ij. cum syr. capil. vel de stechade ʒ. ʒ. vel conser. corticis citri, cum syr. de papauere fiat opiata, de qua capiat ad quantitatem castanæ manè, ieiuno stomacho, superbibendo parum aquæ callithrici, vel hyssopi. Hæc opiata conuenit in morbo antiquato, in quo multum pituitæ trahere oportet. Si ab humorum vel vaporum acrimonia fiat, sequens erit paranda.

R. conf. viol. vnc. ij. conser. eicho. vnc. ʒ. conf. acori vulgaris ʒ. iij. cineris cranij vnc. ʒ. rasuræ eboris, ʒ. iij. ad nimium sensum stupefaciendum (vel syr. capil. ven. si minus sit sensus exactus) fiat opiata. Capiat ieiunus ad quantitatem castanæ. Eorum caput perfundendum est oxyrhodino, vel puluere sequenti inspergendum in sequentem modum.

Puluis.

R. granorum myrrihi & granorum tinctorum, rosarum, coriandri ana vnc. ʒ. sant. rub. viol. nenuph. capit. papaueris ana ʒ. iij. florum anthos, stecha. ana ʒ. ʒ. fiat puluis tenuissimus, ut collyriū. cum quo irrorato aceto & resiccato inspergatur pars anterior capitis. Pulueres, qui ad epilepsiam arcendam præscribuntur, non debent

esse multum odorati, quia vt capitis grauitatem faciunt, sic in dispositis ad epilepsiam, paroxysmum accerunt. Ob id santalum rubrum, non moscatellium neque citrinum apponere volumus, neque alia, quæ malum odorem inspirant. Item capita papaueris addimus, tum ad obtundendam acrimoniam vaporum, tum ad sensum menyngum obtundendum. Ob quem nimium sensum facile conuulsionem patiuntur epileptici aliqui. Quare stupidis, & his, qui epilepsiam à proprietate cerebri patiuntur, minus conuenit hic puluis, & remedia suprâ scripta, sed potius alia scripta in dolore capitis à materia frigida. In antiqua epilepsia aqua sequens mirificè confert, & potissimum in paroxysmo data, illos subito excitat.

Aqua excellentissima.

R. hyrundinum N. 40. rutæ M. 2. castorei vnc 1 vini albi lb. iij. distillantur in balneo mariæ, & aqua seruetur vsui. Ex ea dentur cochlearia duo in paroxysmo, vel manè extra paroxysmum, præcedente vniuersali purgatione totius corporis & capitis. Valet enim intus assumpta, & extrinsecus apposita in conuulsione & paralyti, sed magis in paralyti, & efficacior est oleis. Quare si quis in hoc affectu vtivelit, paret in maiori quantitate. Idem etiam præstat aqua theriacalis descripta in dolore capitis à morbo Hispanico. In hunc usum confert puluis descriptus in affectibus oculorum ex hyrundinibus & viperis factus. Si epilepsia fiat in pueris propter vermes, quod multi credunt, hoc facerent, quia mordendo os ventriculi materiam quandam commouerent. Nam si Galeno credimus, epilepsia ex sola intemperie nõ fit. Quare oportet vermes putrescere, & ex eorum putrefactione fumos putres, & tetros circumferri, & internam partem ventriculorum cerebri diuexare. Quanquam conuulsio à plenitudine, & ab inanitione, & à materia venenosa fiat. Sed hoc de particularibus conuulsionibus ab Hyppocr. scriptum fuisse existimo. Prius enim æger moreretur, quàm ex cerebri inanitione epilepsia sequeretur. Cæterum non dicitur epilepsia, etiam si conuellantur omnes partes, nisi mens lædatur, vt Galenus de locis affectis demonstrat. Si ergo causa huius affectus

affectus sint vermes, dentur medic. amara purgantia pituitam, & vermes necantia. Adhibentur enim supra umbilicum vnguenta ex aloe, myrrha, absynthio, & aliis amarioris odoratis composita, non ut solent mulierculæ & pharmacopolæ, qui supra os ventriculi non verentur adhibere fella, bitumen iudaicum, vel liquidum, quod petroleum appellant. Quæ omnia supra os ventriculi adhibita, nocent. Umbilico igitur potius admoueri debent ad vermes occidendos & deturbandos. Fiunt & alia, quæ cap. de vermibus dicuntur. Si per consensum vteri & retentionem mensium fiat, mouendi sunt menses, aut si à retentione seminis corrupti, ratione cuius fit epilepsia, inditur pessarium altero capite descriptum, & quod & laxat partem, & attrahit. Alia remedia superius posita erunt ex usu. Possunt tamen addi aliqui pul. odorati in opiat, ut citius medic. ab utero trahatur, ut pulueres diambrae, diamoschi, diagalangæ, & alij resiccantes & odorati.

Curatio insultus epileptici.

Quæ superius dicta sunt de epilepsia curatione, extra paroxysmum facienda sunt, quæ magis ad præcautionem, quàm ad curationem instituuntur. Quæ sequuntur, ad insultus epilepticos & paroxysmos conducent. Sunt autem duplicia. Alia ad symptomatis mitigationem instituuntur, alia ad morbi facti curationem. Si æger multum moueatur, conuellaturque, oportet medicum inhibere motionem vehementiorem, ne corpus nimium defatigetur. Nam in totum prohibere, nihil aliud est, quàm retardare paroxysmi solutionem. Cum enim concutiuntur partes, materia discutitur, quæ partem internam grauat. Secundum est dare aliqua, quæ naribus obiecta, sua tenuitate partium, ad ventriculorum cavitatem penetrare possint, & materiam illam absumere digerendo resiccandoque. Sunt autem illa ipsa, quæ epilepsiam prædunt, vel eam inducunt, ut lachrymæ foetidæ, quale est ammoniacum, sagapenum, assa foetida bitumen castoreum, folia rutæ, pulegium regale & ceruinum, calamyntha & id genus alia. Nec cuiquam mirum esse debet, si hæc epilepsiam concitent, materiam commouendo, eandemque commotam discutiant longiori tempore. Eadem ratione id faciunt, quod præonia collo-

suspensa, attenuando, incidendo, & discutiendo. Potest etiam dari aqua illa distillationis, hyrundinum ad 3. ij. quæ ori imposita sua tenuitate partium discutit, & se in partes abditissimas insinuat, vel danda in maiore quantitate, si spumam reddat, quia cum spuma medicamentum reicitur. Olea, quæ sunt valde tenuium partium, in aures distillando adhibenda, & supra capitis commissuras, ut oleum de spica, oleum sampsu. oleum de cinamomo, de nuce moscata, de macere, vel alia, quæ citra distillationem parantur, ut oleum rutaceum. fycionium de abro. addita aqua vitæ ad tertiam partem. Vngantur futuræ, ut penetrationem acquirant. Si per consensum fiat, supra partem affectam synapismus, vel vesicatorium ex fermento, & cantharidibus adhibendum. Nam cucurbitulæ propter succussionem non possent adherere, alioqui viles essent. Si per consensum vteri fiat, erunt ea instituenda, quæ ad vteri suffocationem præscribuntur, ut foetida naribus, odorata verò admouenda, nisi mulieribus vtero gerentibus, in quibus sufficit succussionem nimiam inhibere. Compositiones, quæ sunt antidota discutiunt, & materiam absument, sed illa oportet esse antiqua quanquam in vehementiori corporis agitatione, minus antiqua conueniunt. Si fiat per consensum alicuius partis exterioris, ut digitorum manus vel pedis, fiat strictura inter partem & caput, vel corporis truncum, ut si in manu, à cubito ad alas ponenda est, quia æqualiter & melius ligatur hæc pars, per quam aura tenuis defertur ad caput, quàm à cubito ad carpum, quia vno osse constat, cubitus autem duo ossa habet. Ob id vasa, quæ inter duo ossa latitant, constringi nequeunt. Idem faciendum est in tibia, cum inde defertur illa aura, in qua ligaturam à parte inferiore incipere oportet, ab eaque constrictionem arctiorem faciendo, & sensim remittendo vsque ad superiorem.

De conuulsione. CAP. XXVII.

Spasmus siue conuulsio à repletionem, & ab inanitione fit. Est & non proportionatus ad materiam. Conuulsio facta ab inanitione lethalis. Quare satius erit prohibere ne fiat, auferendo causam, quæ conuulsionem potest excitare, velut in febre ardentissima, si tanta siccitas

in partium fuerit, & conuulsionem minetur, spinam dorsi inungere oportet, ne nervi supra modum exsiccati, conuulsionem patiantur. Huiusmodi conuulsiones quæ fiunt à febribus, solent vt plurimum sequi phrenitim. Ordinentur itaque inunctiones siue irrigationes, partim ex refrigerantibus ob febrem, partim ex humectantibus ob nervorum siccitatem hoc modo.

R. ol. viol. ʒ. iij. ol. amygd. dulc. & de lilio ana ʒ. ij. lactis mul. ʒ. j. mucilag. seminis psillij ʒ. ss. misce. fiat vnguentum, quo vngatur spina dorsi. Ad intra danda sunt, quæ humectant & refrigerant. Fiat inunctio fortis pro principio hoc modo.

R. ol. narcissi, liliorum ana q. j. ol. amygd. viol. vel sesamini ana ʒ. ij. mucil. seminis psillij & lini ana ʒ. j. pinguedinis gallinæ & porci, ana ʒ. iij. misce ad formam linimenti, quo inungatur spina dorsi. Potest fieri irrigatio supra caput hoc modo.

R. flor. viol. nenuphar. & liliorum & narcissi ana p. j. viol. mal. cum tota an. M. ij. chamepith. & hederæ terrestres ana M. ss. (Si febris sit admodum ardens, possunt addi folia salicis, & cucurbitæ ana M. j.) seminis lini & fœnug. ana ʒ. j. fiat decoctio in aqua, & cum decoctione fiat irroratio supra caput. Potest addi aliquod oleum remolliens, vt amygd. dulc. vel viol. si timeatur nimia calfactio. Potest addi in decoctione hordeum mundatum ad maiorem humectationem, tepidum applicetur, ne ob caliditatem resoluat potius quàm humectet. Spasmus si ab inanitione fiat, post vomitiones & inanitiones, tunc danda est opera, vt corpus reficiatur, & fiant *Conuulsio ab inanitione.* similes inunctiones. Si fiat ab inanitione cum astrictione ventris, leniatur clystere molliente, vt facto cum decoctione capitis veruecis. Detur cassia extracta cum ol. amygd. dulc. (Nam hoc modo magis lenit & humectat) vel detur manna in brodio pulli, vel decoctum galli antiqui, cum quo decocta sint malux, vel blitum, vulgò spinachia appellant. Dentur ad intra, quæ humiditatem reparant, vt testudinum carnes, & canerorum fluuiatilium, vel marinorum. Dentur electuaria restaurantia humiditatem, vel diapenidium sine speciebus, pulvis restaurans humiditates, conf. humectantes, vt radice buglos. *Elect. Conser.*

viol. flor. borrag. & nenuphar. Pineæ etiam laudantur, & omnia, quæ profunt heclicis & cõsumptis. Si conuulsio fiat à vulnere, post multam sang. profusionem, in-
Conuulsio à vulnere. curabilis est, & proinde relinquenda. Quòd si eius curationem tentare velis, erit curanda iisdem remediis.

Spasmus à punctura.

Si autem fiat spasmus à punctura facta in neruo, vel in tendone, (quem spasmum non proportionatum ad materiam vocant) vulnus dilateretur, & intra vulnus ol. ponatur tereb. vel de euphorbio. Fiat emplastrum de galbano, & maneat diu apertum vulnus: tum vt medicamenti vis facilius penetret, tum vt venenosa illa qualitas, & sanies extrahatur. Si oboriatur dolor, sedandus erit, ne fiat inflammatio. Quòd si istis remediis non prohibeatur conuulsio, propter sympath. & consensum cum cerebro, si inueniatur tendo, vel neruus ictus, per *Herba cõtra Venenum.* transuersum scindatur, in parte altiore, quàm punctura. Satiùs enim est motum alicuius partis perire, quàm totum animal.

A punctura animalis venenosi.

Si à punctura alicuius animalis venenosi fiat conuulsio, apponatur supra partem cucurbitula cum multo igne, vel cauterium, vel apponatur illius veneni amuletum, seu antipharmacum. Ad intra sumat theriacam, cum decoctione illius herbæ, quæ respectum habet ad tale venenum. Si proprium antipharmacum ignores, aut cuius animalis sit punctura, confugiendum est ad communia antipharmaca, vt ad rutam, pentaphilum, scabiosam, chamep. & alia id genus, vt in decoctione radic. gentianæ, tunicis vel trifolij foetidi, quod Diosc. vocat menyantes. Si adaugeatur dosi castorei vel carpobalsami, remedium erit magis proprium, & determinatum. Theriaca etiam exterius admota, & intra vulnus posita confert. Nam à tota substantia venenum absorbit, & non repellit intrò, vt aliqui putant, quin potius attrahit. In spasmo facta à punctura, possumus etiam vt inunctionibus inferius describendis, quæ fieri debent non supra vulnus, sed in partibus conuulsis, & super nucam, & spinam, & originem nervorum mouentium partem conuulsam.

Qua in parte fieri debeat inunctio.

Spasmi per consensum vteri & ex Vermibus curatio.

Si spasmus fiat per consensum vteri, dentur remedia præscripta in epilepsia facta per consensum vteri. Si à vermibus, occidantur vermes & expellantur à corpore, Spina inungatur vnguento, vel aliquo oleo mediocriter calido. Si fiat à plenitudine, erit à pituita, vel sanguine, sed rarò. Si à sanguine trahatur iteratis vicibus, & ^{à plenit.} *spasmus.* non euacuatione vna insigni. Nam omnis euacuatio insignis maximè & subito, corpus refrigerat. Fiant inunctiones ex ol. mediis. Si ob pituitam redundantem, concoquenda erit materia, & euacuanda, vt in paralyfi monstratum. Nam curatio paralyfis & huius spasmi eadem esse videtur. Hoc tantum interest, quòd con ^{Curatio} *spasmi à* uulsio fit à materia magis crassa, & minus subtili, quæ ^{plenit.} *plena.* neruorum nõ potest penetrare soliditatem. In hoc spasm ^{Vnctioes} *mi* genere, vtimur etiam emollientibus, vt in vnguentis, axungis anatis, anseris, gallinæ, vt in balneis, mal. semine lini & fœnug. &c. Inunctiones ergo differunt. Nam in spasmio malactica aliqua cum digerentibus recipiunt, in quo maior adhibenda est cura, ne id, quod subtile est resoluatur per fortiter exiccantia & digerentia. Primum ^{Pilula.} *vtantur pilulis leuioribus*, vt in paralyfi est dictum. Coquatur materia syr. mediis præscriptis in paralyfi. Purgetur pilulis coctis & foetidis, addita aliqua parte castorei. Semper enim addere oportet aliquod medicamentum affectioni proprium. Vtuntur sæpe pilulis de beniouino, descriptis de paralyfi & epilepsia. Fiant opiatæ vt supra monstrauimus eodem capite & de epilepsia. Quòd si non ^{Opiata.} *lint accipere opiatam*, fiant pilulæ, vt dictum est cap. de epilep. vel capiat tabellâ j. diamoschi diambre, vel diagalangæ, superbibendo parû aquæ rutæ, vel chamepit. Vtatur balneis naturalibus, vel arte paratis. Sed balnea artificialia magis laudatur in principio, quæ fiant hoc modo.

BALNEVM.

℞. radic. bismal. & liliorum ana ℥b. j. radic. ireos ℥b. ℥. maluæ, bismal ciclæ, branchæ vrsinæ, geranij maioris (quod est simile folio mal.) ana M. iij. florum cham. meliloti, samb. ana p. iij. florum ischen. & anthos ana p.

j. seminis lini, fœnug. an. lb. ij. seminis bismal. & anethi (si tamen adsit anethum recens cum floribus, accipe potius summitates eius, quàm semen siccum) seminis sesami ana qr. j. florum narcissi p. ij. Aut si non reperiuntur flores, pone radices eius ad lb. j. fiat decoctio pro balneo. Adde olei veteris lb. iiij. ingrediatur ter vel quater balneum in die. Balneum hoc est pro conuulsione antiqua, vbi nerui sunt duri. Quod si non tanta sit durities, & sit in principio, addantur digerentia & exiccantia, vt absynth. conisæ, chamep. saluix, & origani ana M j. Auferantur, quæ supra modum emolliunt. Nam balnei vsus est ad materiæ resolutionem & remollitionem. In principio itaque, dum materia non est admodum impasta, nec exiccata, magis est resoluedum: sicut vbi morbus est antiquus, quando duri facti sunt nerui, magis est emolliendum, ne ob nimiam resolutionem magis indurescant. Vngatur vnctione mitiori post balneum. Fiet autem balneum efficacius & magis emolliens, si decoquantur in eo aliquot capita veruecis, aut vulpes integra vel catus. Si non reperiuntur in promptu animalia ipsa, ponantur pelles eorundem. Post vsus istius balnei, fiat alterum magis digerens, vel in prædicta decoctione addantur aliqua digerentia, vt chamepith. beton. meliss. absynth. abrotoni vtriusque, arthem. matric. ana M. j. augeatur dos rad. ireos. Adde rad. cucum. agrestis lb. ss. & rad. ebuli tantundem. Nam plurimum commédatur. Optima est etiam radix, & herba glycirrizæ si reperiatur. Post hoc secundum balneum, inungatur fortiori vnctione. Inunctiones sunt meliores ex oleis mitioribus, & pinguedinibus minus calidis. Olea sunt antiquorum amygd. de florib. narcissi, de lilio & cæt. Olea fortiora sunt, amygd. amar. antiquum, de Kerua, sæx ol. liliorum, amurca ol. communis. Oleum de mastiche, tametsi astringat, habet tamen & vim emolliendi. Extrema olea sunt de piperibus, de costo, de bdellio, sicionium, irinum, amaracinum de croco. Pinguedines sunt gallinæ, testudinis, porci, anatis, seuum veruecinum, pinguedo anguillæ. Fortiores sunt, pinguedo cati, anseris, pardi, leonis, vrsi, asini, viperarum. Addantur & medullæ, vt coruina, cruris

Quid faciendum in principio.

Olea.

Olea fortiora, & extrema. Pingued.

viruli, &c. Conficiantur itaque vnguenta, velut per gradus quosdam digesta. Mitius erit tale.

R. olei amygd. dulc. ol. liliorum ana ℥. iij. ping. gal-
lipæ, anser. porci, ana q. j. medullæ cruris vituli ℥. ij. mu-
tælaginis, seminis lini, ℥. j. β. ceræ parū, fiat vnguentum.
Adde castorei ℥. ij. vt fiat proprium affectioni curandæ.
Vnguentum fortius.

R. fæcis ol. liliorum, olei de Kerua, vel sesamini ana
q. j. ping. anseris, vrsi, vel caudæ mutonis, vel cati ana ℥.
ij. mucil. seminis lini & scænug. ana j. β. propoleos ℥.
ij. bdellij dissoluti in vino ℥. β. castorei ℥. ij. pyretri ℥.
j. cum cera q. f. fiat vnguentum. Fortissimum tale erit.

R. ol. vulpini ℥. j. ol. liliorum & narcissi ana q. j. pin-
gued. testudinis, vel sang. eiusdem ℥. ij. ping. anguillæ,
dum torretur in veru collectæ ℥. ij. bdellij dissol. in ace-
to scil. ℥. β. styracis liquidæ ℥. j. vermium terrestrium
contritorum diligentissimè q. f. castor. ℥. ij. styrac. rubræ
℥. ij. mell. anacardini ℥. β. vel theriacæ antiquæ ℥. j. ce-
ræ q. f. fiat vnguentum.

Conuulsio à congelatione humorum.

Si conuulsio fiat ob congelationem humoris, & sen-
tiantur partes conuulsæ, admodum duræ & frigidæ,
optimum est adiungere, quæ calfaciunt magis, vt quis
adaugeat dosim castorei. Nam quæ dura sunt & disten-
ta, propter frigiditatem sunt curanda calorificis reme-
diis, qualia esse possunt, vnguentum dialtheæ, œsopus,
emplastrum de meliloto, si in oleo liliorum dissoluatur,
vel in oleo seminis lini, vel oleo sesamino. Multum e-
nim conferunt. Ad intra detur theriaca, compositio
mythridatica, vel castoreum, vel assa foetida, quocun-
que modo exhibeantur, siue in porcionibus, opiatīs, pilu-
lis aut aliter. Plurimum enim iuuant. Optimū erit si ca-
piat ℥. β. castorei cum ℥. ij. ol. amygdal. dulc. Sæpius
iterare oportet, & balnea & inunctiones, modò vtendo
mitioribus, modò fortioribus, vt magis commodum vi-
debitur, perinde ac in curatione scirrhi, cum hæc con-
uulsionis species fiat, ob nervorum cum duritie conge-
latione. Practici laudant pinguedinem anseris, si pare-
tur hoc modo. Accipe catum in multas partes diuisum,
& ponatur intra ventrem anseris, herbæ chamæpith.

*Ratio curandi alicuius conuulsio-
nis species.* M. j. pinguedinis porci, vel lardi rancidi q. j. bdellij, aff. fœtidæ, castorei ana ʒ. ij. recipiatur pinguedo, dum affertur. Si addatur anguilla similiter concisa in multas partes, erit remedium efficacius. Si voles decoquere vulpem in ol. antiquo, erit adhuc præstantius, sed ex supradictis similiter fiat, & vnâ cū pelle coquatur. Eadem

Topica remedia. ratione curabitur, siue sit tetanus, siue opisthotonos, siue emprosthotonos, quia huiusmodi rigores magna ex parte proueniunt ex congelatione. Topica remedia erunt magis calfacientia, & partes erūt inuoluendæ multa lana succida. Assignantur cucurbitulæ in parte opposita contractioni, vt si contractio fiat ad partem anteriorem, ponantur supra scapulas, & in colli principio. Si autem in partem posteriorem conuulsio fiat, ponatur ventosæ prope clauiculas. Si in partem sinistram, in parte dextra & contrâ. Sed maiores & plures debent poni supra caput musculorum illam partem mouētium, quàm in fine, vel in medio musculorum, cū musculus semper contrahatur versus suum principium. Non ergo ponantur cucurbitulæ supra tendones, quia impediretur contractio, quæ propria est functio musculi.

De conuulsione caput alterum.

Differentia.

Spasmus Græcè, conuulsio Latine, est contractio in nervis ad suam originem seu principium citra voluntatem cum rigiditate. Est autem cum motu, aut sine motu. Si absque motu sit, Latinis rigor dicitur. Accidit autem ceruici, cuius tres sunt species seu differentia. Prima Græcis Tetanos, quando ceruix recta, atq; immobilis manet, & in neutram partem inflectitur: altera, Emprosthotonos, cū mentum pectori adnectitur: tertia, Opisthotonos, cū caput in dorsum ac scapulas cōuel- litur. Fit autem hic affectus contractis potius, aut congelatis, vel inflatis musculis à pituita viscida, quàm affecto nervo, vel post aliquem morbum malè curatum, & non satis exiccatum. Accidit autem Synoche digitis pedum vel manuum, vel cubito, vel genu, quando nervi breuiores fiunt, vel ob icterum, vel ob tumorem scirrhosum, vel pituitosum, aut propter atrophiam, aut congelationem, aut propter vitionem. Spasmus autem quâdoq; est vniuersalis, vt in Epilepsia, in qua cerebrum to- rum

tum in se contrahitur : quandoque particularis , vt brachij vel cruris. Fiet aliquando ob sanie collectam in aliqua parte capitis ob vulnus aliquod , aut puncto nervo , aut tendone alicuius partis. Quod autem ad huius mali causas attinet, sciendum est, duas duntaxat ab Hipp. constitutas esse, Plenitudinem, & inanitionem. Præter *causæ* has duas, Medici posteriores tertiam addiderunt, quæ dicitur per condolentiam, dolente, scilicet, nervo, ob puncturam, aut ictum animalium venenosorum. Hanc verò speciem Galen. semper ad inanitionem refert, quæ cum fiat à materia venenosa, eademq; pauca, satius esset causam potius ad plenitudinem, quàm id inanitionem referre. Est enim partis plenitudo. Convulsio alia curatur, alia non curatur. Quæ ex inanitione accidit (vt post largam sanguinis evacuationem, aut post febres ardentes, aut post meningum inflammationes cerebrivæ) lethalis est. Quæ fit à plenitudine, siue per condolentiam, siue per proprietatem, evacuata materia, curatur. Porro fit quædam convulsio ob immoderatam evacuationem quæ curari potest : sed hæc potius à flatibus medicamenti, aut agitatione materiæ fit, quæ potius plenitudinē, quàm inanitionē indicat. Prouenit neruorum origine contracta. Ab inanitione, cū incipit, curatur aliquando. Quare statim adhibenda sunt remedia, quæ illam inhibere valeant Facilius est enim viam præcludere, quàm factam euincere. Huic autem occurrimus, cū causam quæ illam nata est excitare, auferimus, vt in febre ardentissima, cerebrum irrigamus, irrigationibus viam & principium neruorum humectantibus & totam spinam oleis frigidis & humidis inungimus. Olea ad id faciendum sunt accommodatiora, oleum violarum, amygd. dulc. de lilio recens, non magna (nam potius resoluit) de seminibus frigidis maioribus, vt oleum cucurbitæ, & peponis. Aliquando axungias adiungimus recentes, vt gallinæ, porci, anatis, & piscium, vt anguillarum, mugilum, & similiū, quod oleum extrahitur ex hepate in sartagine frictō, quod funditur & liquatur. Huiusmodi autem liquor oleum appellatur. Oleum etiam ex hepate raiarum, & gallorum confectum mirifice prodest. Ex his addita pauca cera noua, linimenta paramus,

Irrigatio

quibus & adiungimus butyrū recens in multo lacte ablutū. Cōferunt & mucilagines psilij & cydoniorū multo lacte, aut aqua viol. aut lact. ablutæ & dilutæ. Parātur irrigationes ex oleis supradictis, vel in sequētem modum.

R. violarum, maluarum, lactucæ, ana M. iij. semi. frigidorum maiorum conuassatorum ana ℥. ij. florum violarum, borraginis, buglossi. ana p. iij. fiat decoctio cum aqua, partes irrigentur. Ex eisdem parari poterit balneum ~~gu~~cta, videlicet, dosi, modo Phrenitim non patiatur, aut futurus sit sudor, aut alia excretio critica. Eo enim tempore satius erit à balneo abstinere, & linimentis vti. Post irrigationem vngatur sic.

Linimentum.

R. olei violati, olei amygdalarum dulc. recens. ana ℥. ij. olei liliorum recent. vel olei florum narcissi ℥. ij. pingued. porci recent. ℥. iij. axungie anguillarum, & mygilum ana ℥. ij. ceræ nouæ parum, fiat linimentum, quod abluatur lacte muliebri recenter mulso, & eo tota

Vicium varso.

spina inungatur. Exhibeantur alimenta corpus multum humectantia, qualia sunt iuscula, quibus ad faciliorem distributionem guttæ aliquot vini addi possunt. Lac quoq; recessis mulsum exhiberi potest, modo febris non adsit. Succus carnis aut aqua stillatitia ex porcillis lactantibus multum confert. Parari etiam potest gelatina, ex carnibus aut piscibus citra piper, aut alia odorata. Addi tamen poterit ad gratiam & penetrationem cinamomi parum. Huic etiam parua quantitas aceti addatur, aut nulla proorsus. Fit & alia gelatina ex carne confusa, amygdalis, & farina orobi, quibus adduntur semina frigida maiora, ad maiorem humectationem. Decoctam anguillarum, vel ius album piscium saxatiliū cum oleo amygdalarum dulc. paratum, sufficienter humectant. Commodè exhibemus carnem cicularem vel schillarum gibbarum, vel testudinum, vel cancrorum fluuitalium, vel marinorum, vel stagni. Quod si canceri parentur eo modo, quo solent in Pontificum cœna, cibus & deliciarior & melior erit. Parantur autem sic. Canceri fluuiales aqua multa communi abluantur, marini in decocto hordei, vt deponant falsuginem, quæ est in parte externa: deinde vini suffocentur in lacte recenter mulso, vel in eodem decoquantur vel

in iure

In iure capi pinguis. Multum hic cibus humectat, & facile cōcoquitur, quare in atrophia, & phthisicis, & in quibus venus est prouocanda, conuenit. Iniici possunt clysteres ad humectationem ex decocto pulli, & oleis supradictis, vel ex iure piscium pinguium, vel gallinarum, vel porcellorum, vel ex oleo tantum, vel ex decocto herbarum prædictarum, vel iniiciatur aliqua portio irrigationis supradictæ, aut cremor hordei. Sumenda quoque aliqua interna remedia, vt conseruæ, buglossæ, viol. flor. borraginis, vel nenupharum, quibus adiungantur aliqui pulueres, modo recentes sint, vt pul. diacitonites sine speciebus, puluis restaurans humiditates, & diatragacanth. siue caphura, nuclei pinicarum infusi in lacte, vel in aqua violarum, quomodocunque administrati conueniunt. Curatio conuulsionis, quæ à plenitudine sanguinis, quauis raro oriatur, statim à sanguinis missione auspicanda est, iteratis vicibus. Omnis enim repentina euacuatio vim naturæ infert. Poterit tamen aliud elui clystere euacuante & attrahente. Spina autè oleis moderatè calidis inungenda, vt oleo chamom. amygd. amararum, oleo sesamino, & oleo comuni, non antiquo, quibus adiungi poterunt axungie supradictæ, modo sint antiquæ. Quod si recentes sint, ℞. β. castorei pro ℥. ij. vnguenti poni poterit, quibus addimus aquam vitæ imbecilliorē, ad maiorem penetrationem. Si verò à pituita flatulenta spumosa, vel falsa conuulsio euerit iniecto clystere, pituita est concoquenda, & ad expulsionem præparanda, cum pilulis leuibus vacuanda. Post valentiùs præparanda, & rursum fortibus pilulis euacuanda, quales sunt, quæ cap. de paralyfi præscriptæ sunt. Si tamen morbus est vehementior, ac dolorem magnum affert, qui vires prosterнат, citra concoctionem etiam vacuanda est potentioribus remediis. Periculum enim esset, ne dum concoquimus, vires deiciantur, & æger moriatur. Pilulæ quæ multum & potenter & facile purgant, sunt, quæ ex lachrymis parantur, ex agarico, colocynthide, & turbith, quibus semper adiungenda sunt grana aliquot castorei, vel euphorbi. Vti possunt pilulis de beniouino, descriptis cap. de paralyfi. Sumenda quoque sunt an-

tidota antiqua: vt theriaca, mithridatum, aurea Alexandrina, vel pul. diagalangæ, aromatici rosati, pul. diamofchi, & diambrae, vel eligenda sunt, quæ magis discutiant flatum, calfaciunt, attenuant, & quæ tenuium sunt partium. Inungenda porro est spina vnguentis paratis in Officinis, vt Martiato, Aragon, Dialthea, vel oleis deficcantibus & digerentibus cum quadam remolitione, qualia sunt oleum therebintinae, irinum, liliorum, amygdalarum amararum, olei de bethen, de spica, de thymo, rorismarini. Parentur autem, si fieri potest, per sublimationem. Oleum de piperibus si paratum fuerit sine myrobalanis, & hyosciami, vt monstraui-
mus in officina nostra, conuenientissimum erit. Etiam oleum de costo, vel de castoreo in summa refrigeratione. Ex bdellio, galbano, opopanace dissolutis in multo oleo, & addita aqua vitæ, vnguentum parari poterit Castoreum, vel id quod in castoreo reperitur, si excipiat multo oleo, eoque mitiori, medicamentum erit efficacissimum in omni conuulsione, quæ a frigido humore ortum trahit. Aqua ex hyrundinibus, & castoreo parata exhibita, conuulsionem à plenitudine subito cessare facit. Eius descriptio est in cap. de Epilepsia. Vi-
ctus ratio extenuans esse debet. Interdicendum est vino, & his, quæ multum aperiunt, quia sua tenuitate ne-
uos tendunt, ad eosque crudos suos deducunt, & potissimum ante corporis purgationem. Legumina, & omnia cruda & flatulenta morbum hunc faciunt, eundemque augent. Frictiones corporis, purgato corpore, ad materiam discussionem plurimum faciunt. Per condolentiam fit conuulsio cerebri, cum mouetur in sese, vt

*Vitus
ratio.*

Conuulsio expellat, quod perferit. Fit & aliquando affectu ore
per eundem ventriculi, vel vulnerata aliqua parte, & maxime pun-
lentiam. ctura, vt ab ictu feræ venenata, vel à materia collecta

Conuulsio inter cerebri meninges, easdem pungens. Curatur au-
per cõsen- tem hæc denudato cerebro trepano, aut alio instru-
sum ven- mento, vt materia illa per vulnus illatum euacuari pos-
trictuli. sit, aut per rimulam ossis dilatatam euaporari, aut si

A pun-
ctura.

magna inflammatio non adsit, trahatur epipasticis me-
dicamentis Si verò conuulsio sit neruo puncto, aut ten-
sione, aperiatur punctura, vt sanies expiret, si angustior
sit

fit, dilatetur, & cucurbitula adhibeatur, vel medicamen- *A punctu*
 tum epipasticum, vt trahat æruginosam, vel venenosam *ra.*
 materiam, ne ibi retenta putrescat. Imponatur euphor-
 bium, vel castoreū, vel succi alij calidiores. Quod si con-
 uulsio hæc à nullis remediis compesci potest, neruus, vel
 tendo secetur à Chirurgis. Præstat enim prius nerui, vel
 tendonis actionem deperdere, quàm hominem certa
 morte interimere. Si ob morsum oris ventriculi fiat, æru-
 ginosa & biliosa materia purganda est vomitione, vel me-
 dicamento purgante, & ventriculus abluendus diligen-
 ter. Si propter vermes, occidendi & impellendi, vt oleo *A Vermib.*
 nucum, & paucis bitumine imposito vmbilico. Topica *buss.*
 remedia supra spinam adhibeantur, qualia superius enu-
 merata sunt. Habenda tamen ratio est eorum, quæ mi-
 nus siccant, & magis emolliunt partes tensas. Rigores si-
 ue tensiones cervicis curantur eodem modo, quo spas-
 mus à plenitudine. Cum incipit, mittatur sanguis, vt in
 apoplexia, sed sensim. Olea quoque, vnguenta, cataplas-
 mata digerentia, emollientia, & tumores liquantia, in
 principio moderata, in fine ex castoreo, & aliis calidio-
 ribus paranda erunt. Cucurbitulæ etiam affigendæ, in
 opisthotono, circa clauiculam in emprosthotono, super
 dorsum inter omoplatas: in tetano vicissim in vtraque
 parte. Hippoc. Aphorism 21. lib. 5. commendat perfusio-
 nem aquæ frigidæ, quæ tamen periculosa est, nec ten-
 tanda, nisi in principio, ætate media, iuvene bene car-
 noso, & in leui affectione. Periculum enim esset magis
 materiam congelari, & impingi, quàm calorem à frigore
 vltro compulsam congregari.

Observatio in superiora duo capita de conuulsione.

Conuulsio est vitiosus motus, musculis sese ad prin-
 cipium contrahentibus. Si quis verò contendat in rera-
 no motum nullum esse, quod ceruix immobilis sit, nec
 huc nec illuc flectatur, is sic habeat à Gale. lib. de motu
 muscul. Tonicum motum esse inter cæteros valde ve-
 hementem. Quod si quis quærat, cur cum tetani, opi-
 sthotoni, & emprosthotoni, ipsi authores meminerint,
 nullam fecere mentionem conuulsionis colli in sini-
 stram aut dextram, cum æquè in latus atque retrorsum
 vel antrosum moueatur, Huic sic est satisfaciendum.

Collum adduci in pectus duobus musculis sat imbecillis: retrò verò flecti sex bene validis, & sex infirmioribus: tot verò musculis opus fuisse, vt retrò conuerteretur, quoniam grauitate sua antrorsum propendebat, & suo nutu illuc ferebatur. Retrorsum non nisi magna vi, & contentione impellitur, idque pluribus musculis, quàm antrorsum. Sic conuulsio duobus anterioribus musculis fit emprosthoronos: posterioribus duodecim, opisthoronos, vtrisque pariter, tetanos. At posteriorem quædam summæ margines, latèque aponeuroses, in latera capitis pertinentes. Præterea anteriorum & posteriorum æquabilis intentio, motus obliquos efficiunt. Itaque si contractum in dextram aut sinistram collum videatur, eius conuulsionis vna eadèmq; ratio est, vnòque genere curationis continetur cum superioribus. In conuulsione non est vsurpandum remedium Hippoc. nempe frigida perfusio, nisi magna curatione. Conuulsione à plenitudine medemur primùm purgatione ex pilulis cochiis, vel solis vel dilutis aqua vitæ, pilulis foetidis, addita aliqua portione castorei. Catharticus paratis ex agar. colocyn. turbith. Si metuimus ne hæc sua violentia noceant, panno ligata hæc incoquenda sunt decocto herbarum, quæ neruis profunt, vt chamæp. chamed. hyss. florum stechados, anthos, & similibus, adiecta nuce moscata, & reliquis id genus. Sic ea noxam omnem exuent, & valdè purgabunt. Sanguinis missionem nullus scriptorum præscribit. In tetano tamen aliisque colli conuulsionibus, vt & in epilepsia, secare potest venam, non omnibus cognitam, quæ in prima dorsi vertebra conspicitur elata, & per summum vertebrarum spinæ ad eos vsque sacrum deorsum perrepat, & paulò supra primam dorsi vertebra in spinam subiens occulitur. Si sanguis deriuatione à collo deducitur, & vnà cum sanguine, quicquid humoris pituitosi musculos colli perfundit, ac imbuat, aut si nunquam ea apparet, eo in loco sunt efficiendæ cucurbitulæ cum scarificatione. Ex topicis primo loco vtilia sunt acopa, & modicè calfacientia, ex oleis emollientibus, ac calfacientibus, vt de lilio, chamo, æsypo, butyro & vnguento resumptiuo, quod vere acopum est, si auferatur

*Conuulsio
à plenitudine
Cathartica.*

Herba.

Topica.

tur mucilago psyllij, & cydoniorum, quæ ob id adiecta est, quod interdum simul laxandum est, & refrigerandum. Inspissanda hæc sunt cum cera recenti, & quæ à propoli non sit repurgata, tum quod sic non facile defluit, & remedium ob propolim efficacius emolliat, ut quæ vi molliendi bdellio non cedat. Hæc si malum non tollant, transcendendum erit ad magis discutientia, ut oleum rutaceum, laurinum, irinum, axungias anatis, anferis, petroleum, quod propter tenuitatem penetrat altissime & potentissime discutit. His adiungi potest nonnihil aquæ vitæ, quod in profundas partes vim medicamenti ferat, cum pul. castorei, myrrhæ, aloes, croci, nucis moscatæ & similibus. Sunt earundem virium dialthea, martiatum, aragum, oleum de piperibus, de costis, & alia huiusmodi. Fouentur & conuulsæ partes decocto herbarum discutientium, aut catapl. admoueat ex eisdem paratum. Profunt & in tetano ea remedia, quibus vtuntur in angina, ut hyrundinum cinis & nidus earundem. Huc pertinet quod diximus cap. de apoplex. de theriaca, & mythridato. Hic enim eandem rationem sequimur. Conuulsionem à siccitate insanabilem scribunt, non tamen continuo spes omnis abiicienda est. Experientia enim cognitum est, profuisse nonnullis remedia, præsertim balnea & illitus. Balnea fiunt ex mal. althea, viol. decocto pedum veruecis & capitis. Illitus fiunt ex ol. viol. amygdalarum dulcium, liliorum, multo butyro, rad. mandragoræ, cum intestinis & capitibus veruecis & medulla porci multa, & vino modico decocta, adiecto modico castoreo, ne frigiditate lædat. Et trita cum superioribus nervos contractos laxat, & molliat promptissime. His remediis cum nonnihil pars conuulsa remissa fuerit, cogendus est paulatim æger membrum distendere, donec ad habitum naturalem redierit, aut pars est paulatim explicanda alligatis bacillis, & ressellis. Conuulsio si à fungis, aut veneno, aut bile æruginosa, vel prassina accidat, non est statim cingendus vomitus. Nam dum reuomuntur, os ventriculi lædunt. Turius est ea clystere acri trahere deorsum, aut pilulis deicere, spinamque superioribus medicamentis ad conuulsionem à plenitudine præscriptis inungere

Propolis emollit.

Olea discutientia & adiposa.

Conuulsionis à siccitate curatio. Balnea. Vntiones.

additis oleis calfacientibus, & nonnihil astringentibus; vt oleum de mastiche, terebinth. & menthæ. Guido à Cauliaco in spasmo à siccitate statim à principio masticatoria, errhina, gargarismata præscribit, cum alij nullam purgationem probent. Id verò facit, vt eiectionis excrementis (quæ cerebrum propter imbecillitatem à siccitate contractum colligunt) ipsum commodius postea humectare liceat.

De tortura oris. CAP. XXXVIII.

Tortura oris, quæ & spasmus dicitur caninus, etiam si levis sit, magnam tamen adhiberi diligentiam vult in curatione. Primum detur clyster, vt in aliis affectibus monstratum est. Concoquitur materia pituitosa syr. supra descriptis. Post exactam euacuationem purgetur cerebrum caput purgiis acrioribus, postea vtatur masticatoriis. Mastice tantum radicem pyretri in parte sana, aut aliud simile, aut masticatorium præscriptum cap. de epileps. Vtatur gargaris. acerbis factis ex digerentibus. Teneat in ore ex formulis in paralyti linguæ præscriptis: nihil enim est in hac affectione præstantius, quæ si cum aqua vitæ formentur, erunt magis huic affectui accommodata, & dosis castorei augeatur ad 3. j. ss. Fiant inunctiones ex oleo de costo, bdellio, de terebinthina, de baccis lauri, de piperibus, de semine behen & ol. sinapi. Post inunctiones applicetur sacculus paratus sic.

R. pulicariæ, herbæ paralyf. orig. calamenti, folium lauri, & rutæ, anthosana M. ss. florum stechad. saluiaz, sambucian. p. j. radic. pyretri 3. j. fiat sacculus interbastatus, qui calfactus supra regulam irroratam vino, applicetur supra partem affectam post inunctionem, aut potius applicetur in posteriorem partem capitis, vsque ad quintam vertebra. Nam à secunda & tertia oriuntur nervi mouentes mandibulas. Ex iisdem herbis fiat decoctio in aceto, & pars affecta suffumigetur ex fumo decoctionis eius. Potest fieri emplastrum ex gummi & aliis calfacientibus. Ex emplastris optimum erit cherroneum, & de meliloto, si malaxentur cum oleo rutæ, vel de piperibus, vel sicyonio. i. oleo ex radicibus cucumeris agrestis. Oleum sicyonium Dioscoridi est oleum album,

album, & est duplex, simplex quod ex decoctione cucu- *Oleum si-*
mer. agrest. tantum fit: Compositum recipit etiam rad. *cyoniz*
enulæ campanæ, & multa alia. Adduntur castorei 3.ij *duplex*
& euphorbij 3.j.

Annotatio in cap. de tortura oris.

Convulsio lato musculo, qui faciem tegit, & ex quo musculi narium, superciliorum, & labiorum fiunt, accidit. Quare si nervis ortis à primis vertebriis & ramis tertie coniugationis accidit refrigeratio, vel obstructio ob sudorem refrigeratum, vel ob ventum aliquem refrigerantem, sequitur labrorum & narium contractio, & pars, quæ contracta est, alteram scilicet, suam trahit, atque ita caninus spasmus accidit. Qui hodie medicinam faciunt, oris torturam vocant. Quod si pars tam dextra, quam sinistra lædatur, & contrahitur, sequitur risus sardonius, sic dictus, quod qui ita sunt affecti, semper ridere videantur. Vatracum apium risus appellatur à nonnullis, quod sumptum in maiori quantitate talem affectum inducat. Tortura oris si levis sit contractio, non debet negligi, sed magna diligentia in eius curatione studendum, alioqui diu durat, & difficilius postea curatur. Primum igitur si plenitudo adsit, sine cruditate tamen, injecto prius clystere, sanguis detrahatur è venis linguæ. Apponantur cucurbitulæ in radice colli, minuatur materia pilulis, concoquatur syrupis pituitam concoquentibus, veatur remediis præscriptis in curatione spasmi à plenitudine. Hæc enim est exacta euacuatio.

De tremore. CAP. XXXIX.

TRemor à multis causis fit, ac proinde multis curatur rationibus. In hoc tamen conveniunt omnes curandi rationes, ut semper auferamus causam, postea corroboremus cerebrum & nervos, ut si fiat propter ebrietatem, bibat aquam, vel potius mustam, seu hydro-mel. Optimum erit in aqua decoquere aliquot folia salviæ, vel lauandulæ (nam mirum in modum in hac affectione conferunt, quare non sunt prætermittenda, tam in remediis intrò sumptis, quam in externis) vel stech. Si à frigidis & crassis humoribus tremor fiat, purgetur pituita, præcedente concoctione, remediis præscriptis

Cugatio. cap. de dolore capitis à pituita, & de paralyfi. Fiant opiatæ ad corroborationem & exiccationem cerebri (præsertim his qui sunt humidiores cerebro) quales fuerunt præscriptæ capite de epileps. maximè illa, quæ recipit cineres cranijs hominis. Vel fiat talis præstantissima.

R. conseru. acori j. galangæ crassæ, conseru. anthos & florum saluæ an. 3 j ciner. cranijs hominis 3. ß. cereb. leporis 3. j. radic. & seminis pæoniæ, radic. damasonij (quod Alisma Græcis dicitur, vulgò plantago aquatica. Vim habet in hoc affectu maximam) ana 3. j. castor. & asphaltiana 3. ß. pul. diagalangæ 3. iij. syr. conseru. secacul. vel conseru. satyrionis, vel syr. de stechade q. s. Si addatur conserua ipsa satyrionis, efficacior erit. Vel cum tremor sit à nimio coitu, adde seminis vrticæ 3 j. ß. Hæc opiata erit conueniens in omni tremore, à quacunque causa fiat, nisi à nimio coitu. Tunc enim non est ponenda conserua satyrionis, neque syr. conseruationis eiusdem, sed potest poni syr. cap. vel syr. de menta quæ impedit venerem, sua siccitate semen absumendo, ut ruta citra refrigerationem, ob cuius timorem non audemus uti syr. de nenuph. aut alio multum refrigerante. Nam quamuis habeant vim minuendi seminis, quæ ratione videntur conferre in hoc affectu, sua tamen insigni frigiditate, noxam maiorem inferunt. Qui ob immodicam venerem tremunt, refici debent optimis alimentis. Si tremor accidat ob frequentem contactum argenti viui, ut solet accidere aurificis in deaurando, fiat inunctio ex oleis calidis, & aliquo pacto constringentibus, ut sic

*Tremor à
Venere im-
modica.
A contactu
argenti
vivi.*

R. schenanthi, spicæ, cali. aro. cyperi, nucis moscatæ ana 3. j hermodact. satyr. an. 3. ß. succi saluæ gr. j. ol. de castor. 3. iij. ceræ parum, fiat vnguentum satis liquidum. Hoc vnguentum valet in omni causa, sed in hac potissimum. Pro diuitibus huiusmodi tremore laborantibus, adde auri limati 3. ß. illinantur manus & superiores vertebrae metaphreni. Loco auri pro pauperibus adde 3. ij. theriacæ. Membra trementia etiam possunt abluui vrina. Tremor accidit aliquando propter fumigationem aliquam factam ex semine hyoscyami, & pap.

*Tremor à
fumiga-
tione.*

albi,

sibi, quo aliqui vtuntur ad occidendos cyrones. Quaresi
 qui eo vti velit, addenda est prædictis media pars ste-
 chados vel saluæ. Qui ob eam causam tremunt, ab- *Tremor &*
 luant manus cum decoctione florum stechad. saluæ, & *caussa non*
 radic. galangæ. Fumigatio ex semine hyosc. generat *manifesta*
 quiddam in dentibus simile paruis vermibus albis, &
 dolorem dentium sedat. Qui sine manifesta causa tre-
 munt, vel propter pituitam aut refrigerationem, aut a-
 liam causam, vtantur pilulis nostris de beniouino, &
 nunquam abluant manus, nisi in prandio & cœna. Nam
 frequens ablutio manus ex frigida, maximè nocet, ita
 vt non solum tremorem foueat, sed etiam generet. Vta-
 tur aqua tepida pro lotionem, nec nimium calidis, aut fri-
 gidis, sed decoctione saluæ, & florum stechad, vt dictum
 est, cum radice galangæ.

De palpitatione.

CAP. XL.

Incestigatio fit à flatibus, flatus, à debili calore, & à ma-
 teria pituitosa, vnde flatibus solent abundare, qui ca-
 lorem natium, & costricticem facultatem ventriculi im-
 becillam habent. Quare purgetur corpus pilulis mediis
 in paralyti præscriptis, postea corroboretur ventriculus,
 aliqua vnctione moderata, non nimium calida. Nam
 quæ nimium calfaciunt, tantum abest, vt ventriculum
 calfaciant, & corroborent, vt potius refrigerent rarefa-
 ciendo, vel ex alto trahendo calorem internum ad circun-
 ferentiam. Nam maior caliditas attrahit ad se minorem.
 vt apparet æstate, quo tempore externa frigiditas facile
 subintrat, rarefacta cuti ob aeris calorem. Quamobrem
 in vnctionibus sunt apponenda minus calida, & quæ
 vim habeant astringendi, vt oleum nardinum, ros. lenti-
 scinum, cidoniorum, mastiches Eadem ratione & sche-
 nanth. & spica, & cyperus & alia id genus multum con-
 ferunt ventriculo. Inunctiones magis laudantur, quam
 sacculi, aut emplastra. Nam illa facile ad interna pene-
 trant, quæ ponuntur in sacculo non item: solus enim
 vapor penetrat. Emplastrum mediam velut naturam, &
 efficaciam obtinet, nisi quod etiam ex accidenti plus,
 quam reliqua calfacere potest, ob vim illam emplasti-
 cam, constipantem cutis meatus. Ad intra dentur illa,
 quæ calfaciunt ventriculum, & flatus discutiunt, cui rei est

animaduertendum. Nam tribus aut quatuor horis ante pastum, dare possumus quæ fortiter calfaciunt, & flatus discutiunt, modò iecur non sit præcalidum, qualia sunt diatrium pip. diacyminum, dianisum, aromat. ros. diagalanga & similia. Hæc non debent dari immediate post, nec ante pastum, quia sua caliditate, & tenuitate secum statim ad primas venas alimentum semicrudum raperent. Hinc patet illos errare, qui pulueres maxime à cibo non calidos à pastu exhibent, qui debent esse mediocriter debet ex- calidi: à cibo autem quæ calfaciunt minùs, & attenuant, hiberi ni- minùsque discutiunt flatus (vt suprà meminimus) vt est mium ca- puluis ille præscriptus in dolore capitis per consensum lidia. ventriculi à pituita. Accipiant etiam anisum conditum à pastu. Suprà autem partem affectam, ponatur spongia noua macerata in lixiuio, vel vtatur aqua sulphurea, vel aluminosa, vel fiat sacculus ex discutientibus flatus, vel apponatur emplastrum de baccis lauri, sed hoc vbi esset tanta flaruum copia, vt leuioribus non possint discui. Vel fiat talis inunctio.

R. olei rutæ. nardini an. ʒ. j. viticis, cumini, carui ana ʒ. j. ceræ parum, fiat vnguentum. Si voceris in principio, fiat vnctio ex oleo ros. addita aliqua parte ol. de absynthio, ne partes faciliè flatus recipiant.

De Melancholia a morbo.

CAP. XLI.

Melancholia alia est propter vitium cerebri tantum, alia per consensum totius corporis, alia flatuosa, (hypochondriacam vocant, Arabes verò mirachiam.) Quæ sit per consensum totius corporis, curatur sic. Detur clyster à principio. Si facienda sit sanguinis missio, postridie fiat. Si sanguis sit niger & admodum crassus, extrahe quantum æger potest tolerare: si autem sit. Syr. cō- flavus sit, tenuis & rubicundus, sistatur statim. Concoq. sang. quatur materia syrupis appropriatis, quales sunt syr. de crassum bugloss. borrag. epithymo, de pomis simpl. & compos. & melac. de fumaria, viol. etiam & endiuia adduntur, & alij infrigidantes, quando flaua bilis permixta est, aut si ex bile adusta fiat. Herbae autem, ex quibus fiunt aquæ & syr. sunt buglossa, borrago, melissa, endiuia, fumus terræ, ca- quibus syr. pill. ven. ceterach, polypod. adianthum, scabiosa, ocy- & aqua. mum, chamed. chamepith.

Ex

Ex radicibus inter omnes laudatur radix veratri ni- *Radices.*
 gri, & enulæ campanæ. His possumus addere radicem
 behen albi & rub. radic. polygonati, pentaphilli, phili-
 pendulæ, & corticem radic. capparis, & fraxini, & tamar-
 isci, radic. tormentillæ, & zedoariæ. Addendi sunt *Flores.*
 etiam flores buglos. borrag. anth. sampf. chamomillæ,
 nymph. flechad. tamarisci, genistæ. In summa quæ-
 cunque habent lætificandi vim, & quæ splenem respi-
 ciant. Pro principio itaque fiat syrup. digestius cum
 aquis. Vt

R. syr. de epithy. de bugl. ana ʒ. ij. de fum. de po- *Syr.*
 mis simpl. ana ʒ. j. β. aquæ bugl. borrag. ana qr. j Si ad-
 sit siccitas, vel permixtio bilis, adde aquæ viol. end.
 vel lupul. ʒ. ij. Si non adsit insomnitas, neque corpo-
 ris tanta siccitas, adde aquæ melissæ & enulæ camp. an.
 qr. β.

R. elect. de gemmis tab. j. pro dosi, vel diamarg. frig.
 vel alterius elect. pro melanch. vel ex eorum pulueribus
 aro. Purgabitur in principio decoctione polypod. quer.
 thymi, epithymi, diamanna, & frequentius reiterabitur.
 Cum morbus altas radices egerit, vel contumax fuerit,
 ordinentur syr. fortiores, & medic. laxantia fortiora, vt *Syr. fortior*
 hoc modo.

R. syr. de pomis compos. ʒ. iiij. syrup. de epithy. & de
 fumaria an. ʒ. ij. aquarum mel. capil. ven. bugl. borrag.
 ana qr. j. aquæ enulæ camp. ʒ. ij. fiat syr. pro 4. dosibus,
 cla. aro. cum pul. de gemmis vel lætitæ Gal. vel diamar. *Purgantia*
 frigi. Purgetur fortiori pharmaco. Soluentia sunt con- *fortiora.*
 fectio hamech, diaph. diasenæ sol. diamannæ. Ex pilu-
 lis sunt, de fumaria, indæ de lapide lazuli, vel arme-
 ne, sed ex istis oportet eligere, quæ facile & sine mo-
 lestia euacuant, non autem quæ fortius. Præeligendæ
 tamen sunt potiones, vt quæ minus exiccent quàm pi-
 lulæ. Nam pilulæ multum & fortiter euacuant, & cor-
 pus supra modum exiccant, ex qua exiccatione peius ha-
 bet æger. Sed vt facilius & potentius euacuetur humor
 potionibus, accipiantur hæc electuaria, in decoctioni-
 bus alterantibus, & euacuantibus succum melancholi-
 cum, hoc modo.

R. gly. rasæ, rad. enulæ camp. ana ʒ. β. rad. buglo. ʒ. j.

pass. mund. pa. x prunorum N. xx. capil. ven. & ceterach, an. M. ss. qu. sem. frig. maiorum an. 3. iij. seminis apij, petro & ocymian. 3 ss. seminis cuscute, summitatum thymi, folliculorum senæ an. 3. ss. florum cord. ana p. j. fiat decoctio. In q. j. diss. diaph. 3. iij. confect. hamech. 3. ij. diasenæ 3. j. syr. de pomis compositi vel viol. 3. j. Si diues sit, potes addere 3. j. infusionis rhab. si pauper, syr. ros. lax. 3. j. & tunc loco diaph. ponatur cath. Possunt etiam addi alia elect. solutiua, si videamus aliquem alium ex humoribus esse permistum, pro ratione humoris permitti, vt si videatur pituita permixta, potest addi elect. de citro sol. 3. j. Si bilis sit, elect. de succo ros. vel diaprunis sol. 3. j. Postridie medicamenti detur portio sequens.

R. syr. viol. 3. ij. aquæ hordei perfecte cocti 3. iij. fiat potio, capiat postridie medicamenti. Hæc potio humectat, & siccitatem vel asperitatem relictam à medicamentis lenit. Si dentur pilulæ, corpus sit præparatum, accipiant clysterem emollientem die præcedente.

Pilula.

R. mass. pil. ind. & de fumaria an. ʒ. ij. fiant pil. viij. cum vino. Si fortiores, oportet.

R. mass. pil. indæ & de lapide lazulian. ʒ. j. ss. fiant pil. cum syr. de pomis compos. vel augeatur dosi, vel minuatur pro viribus ægrotantis. Delicatis & diutibus potest hoc modo parari medicamentum quod est præstantissimum.

Potio post purg. vniuersales.

R. flor. viol. bugl. borrag. & anth. an. p. j. sum. thy. & polyp. quer. an. 3. ij. senæ orient. 3. j. pass. mund. 3. j. fiat decoctio in aqua bugl. & fumi in col. 3. iij. diss. confect. alchermes communiter præparatæ 3. ij. diagridij gr. vj. syr. de pomis compos. 3. j. vel syr. ros. lax. aut viol. aut de fumar. compos. tantundem. Hæc potio danda post vniuersales purgationes. Soluit mirum in modum melancholiam sine molestia: nec minus iuuat, quàm si quis acciperet decoctum veratri. Nam confectio alchermes si præpararetur cum vero lapide lazuli, soluit ichores melancholicos. Si non reperiatur vera confectio alchermes, adde communi modo paratæ lapidem lazuli ablutum cum aqua bugl. & ros. donec aqua remaneat clara,

*Cautio
confect
alcher-
mes.*

& co-

& colore lazuli non ampliùs inficiatur ad ʒ. ij. Si nullo modo reperiatur confectio alkermes (quia nunquam vsus est Falco in morbis, in quibus suspicio erat de fluxu ventris, quæ vim habet soluendi paulò minus, quàm confectio hamech) vtatur puluere sequenti.

℞. sum. thymi ʒ. ʒ. epith. ʒ. j. seminis cusc. ʒ. iij. lapid. *Puluis.*
lazuli abluti, vt diximus, ʒ. ij. diagrid. ʒ. j. cinamomi, macis, garyoph. spicæ nar. perlarum non perforatarum ana ʒ. ʒ. mastich. ʒ. j. mosci gr. vj. fiat pul. vel, vt meliùs conseruetur, adde syr. de pomis compos. q. s. ad incorporandum, & fiat ad formam opiatæ, cuius dosis erit à ʒ. ij. ad ʒ. j. ʒ. pul. verò ad ʒ. j. Potest etiam fieri sine mosco, nisi quando volumus magis roborare, quàm euacuare: pro pauperibus potest etià fieri aliud puluis hoc modo.

℞. polyp. sum. thymi ana ʒ. j. ʒ. foliorum senæ, florù *Pul. pro*
samb. seminis cuscute, med. seminis carth. ana ʒ. j. cin- *pauper.*
ristartari albi ʒ. ʒ. cinamomi, spicæ, anisi ana ʒ. j. sacch.
candi ʒ. ij. misce, fiat pul. vt ere, vt suprâ. Pro robustio-
ribus & astrictis aluo, adde diagridij, mastich. ana ʒ. ʒ.
Flores sambuci maximè conferunt purgandis ichori-
bus melancholicis. Ideo acetum ex floribus eius dan- *Acetum*
dum in acetariis. Saccharum candum ponitur loco sa- *ex florib.*
lis indi ad gustum, sed magis ad corrigendam siccitatem *sambuci.*
aliorum permixtorum. Est verò sal indum sacch. can *Sal. Indis.*
dum, quod fluebat è cannis apertis, & scissis, & tandem
concresebat vi, & calore solis. Diagridium additur.
Nam quanuis bilem purgare dicatur, purgat etiam me-
lancholiam, si cum purgantibus melancholiam miscea-
tur. Vt puluis prior fiat efficacior ad purgationem me-
lancholiæ, si modò corpus quadratum sit, & non exto-
nuatum, potest dari ex ipso puluere ad ʒ. iij. cum deco-
ctione veratri nigri, & florum nymph. vel amaranthi.
Oportet tamen prius aluum esse liberam, & solutam, &
corpus bene præparatum. vt si fiat hoc modo.

℞. veratri nigri ʒ. j. pass. mund. ʒ. j. prunor. sic. ana M.
x. flor. nymph. vel amaranthi p. j. fiat decoctio. In ʒ. ij.
decoctionis misce pul. præscripti ʒ. ij. adde ad dulcoran-
dum syr. viol. ʒ. j. Hoc tamen decocto non vtantur, nisi
post vniuersales purgationes, nec adeo formidandù est
veratrum, vt ab eo omnino abstinemus. Nā cum Hip.

ait veratrum excitare conuulsionem, eamque lethalem esse. Intelligendum id est, si exhibeatur in substantia, vt solebant antiqui. Vsus tamen erit in decoctione, vel in infusione. Non est tam periculosus, quin potius fortibus, & extremis morbis melancholicis plurimum confert, maximè si corrigatur cum floribus amaranti, aut nenuph. loco florum sesamoidis, quod semper est obseruandum. Reprimitur enim ab iis, ac temperatur acrimonia eius.

C O N S E R V A.

Pulvere poterunt vti semel in hebdomada. decocto verò semel in mense. Fiunt confectioes & opiatæ ex conf. & pul. Conseruæ sunt rad. bugl. & flor. eiusdem, flor. borrag. viol. (ad humectationem) & nenupharis, maximè cum est insomnitas vel siccitas. Conserua satyr. cum sit calida & humida, & enulæ campanæ. Nam his post conseruam, buglos. nullæ sunt efficaciores, & magis propriæ huic affectioni Conserua capil. ven. ceterach. scolop. vulgar. conser. cort. citri cum sacch. conditi, conf. yring. non vituperanda, maximè cum est melancholia hypochondriaca. Mirobala. conditi, conser. radic. polygon. (si parata reperiatur, quam in aliquibus Officinis pro secacul solent præparare) conseruæ anth. stech. cum admiscantur conser. viol. vel nenuph. & vt deducatur vis medicamenti ad caput. Confectio alkermes, &

Conserua
satyr. ar- triphera magna sine opio in mulieribus. Conserua sa-
thr. t. pro- tymionis est præstantissima in hac affectione melanco-
dest. lica & arthritide, vt probatum est experientia. Hinc ali-
Pulueres. qui putarunt esse hermodactylos. Pulueres sunt di-
marg. frigid. & calidum, dianthos, plinis cum mosco, de
gemma, lætitia Gal. diacameron, diambra & his simi-
les, & omnia, quæ cordialia dicuntur. Ex conser. eligere
oportet, quæ maiorem habent vim lætificandi, vt sunt
conser. satyrionis, enulæ camp. rad. buglossi & hoc est
commune in omnibus. Interdum verò vel ob tempe-
rumentum vel symptoma aliquod, vel quia morbus sit
per consensum ventriculi, vteri vel splenis, aliquam ex
conseruis accipere oportet, quæ respiciat partem prima-
riò affectam, vel symptoma. Idem faciendum est in ele-
ctione puluerum, syr. & omnium aliorum remediorum.

Sed

Sed quæ proprietate id faciunt, communia esse solent auxilia in omnibus causis & illa nunquam prætermittere oportet. Quod si fortè cum tali proprietate qualitatem habeant manifestam affectioni contrariam, castiganda erit illa qualitas, addendo conseruas, aut pul. aut aliquid, quod sit affectioni vile, & qualitati illius medicamenti contrarium, vt si hoc modo fiat opiata communis, à quacurque causa sit.

℞. conser. radic. buglossi. 3. ij. conser. enulæ camp. 3. ℞. Quod si propter amariorem hæc ingrata sit, pone tantum 3. ij. tum etiam quia vim habet exiccandi cum illa proprietate lætificandi. Adde conseruam aliquam humidam, qualis est conserua viol. aut nenuph. sed satius est conseruam satyrionis addere, quæ humectat simul, & maiorem vim habet lætificandi. Verùm conser. viol. & nenuph. cum adsunt vigilæ, vel siccitas & caliditas pro conseruis enulæ camp. & satyrionis rectè ponuntur vel cum illis debent misceri. Vt si ob consensum ventriculi morbus fuerit, debes addere conseruam corticis citri conditi cum sacch. Vt etiam eum sit ob consensum splenis, conserua florum tamarisci vel scolopendriæ. Si sit per consensum vteri, conse. anthos. pul. lætiæ Gal. 3. ij. pul. de gemmis 3. j. Pro diuitibus pone confect. al. kermes 3. j. ℞. cum syrup conseru. myrobal. fiat opiata. Cum per consensum vteri, triphera magna sine opio erit danda, & conserua diambæ. Et pro syr. conser. myrobal. ponatur syr. de arthemisia. vel cum sit per consensum ventriculi, pone illius loco syr. conseru. corticis citri. Potest fieri alia opiata pro ditioribus sic.

℞. myrobal. emblicorum & chebul. conditorum ana N. ij. corticis citri cum saccharo conditi, & radic. buglossi ana 3. j. conseruæ anth. & florum borrag. ana 3. ℞. conseruæ satyrionis 3. iiij. confect. al. kermes 3. ij. huic adde lapidis lazuli abluti & assati 3. ℞. elect. de gemmis, & diacameron ana 3. j. confect. de hyacintho, syr. de pomis simpl. q. s. fiat opiata, de qua capiat bis in hebdomada ad quantitatem auellanæ, & superbibat parum vini lymphati cum aqua buglossi. vel melissi. vel enulæ camp. Dosis conseru. satyr. erit augenda, si à retento semine fiat melancholia. Vtatur sæpe electuario diamargar.

frigid. & contradic. bugloss. Possunt fieri epithemata supra cor, & inunctiones supra partes, per quarum consensum excitatur morbus. Epit. pro corde fiunt hoc modo.

R. aquæ. ros. q. j. aquæ bugloss. endiuivæ vel acerof. vel borrag ana ʒ. ij. sandali albi & rub. corall. ana ʒ. ss. croci ʒ. j. misce, fiat epithema, quod ut citius & promptius fiat, accipe ʒ. j. diamarg. frig. loco puluerum, addendo ʒ. vj. croci, & cum aquis fiat epith. Adde ocymi ʒ. ij. & cum pauco panno scarlatæ applicetur cordi tepide. Vel ne toties refrigeretur, fiat sacculus talis, & applicetur.

Sacculus.

R. florum cord. ros. ana p. ij. florum nenuph. & sambuciana p. j. foliorum meliss. siccæ & seminis ocymi, behen albi & rub. sandal. omnium ana ʒ. j. macis ʒ. ss. contundantur, fiat sacculus interbastatus & irroratus aqua ros. & melissæ, ponatur supra pectus. Inunctiones fiunt pro dispositione locorum, unde affectus manant, ut pro ventriculo fiat inunctio, vel sacculus ad eius confortationem, & flatuum consumptionem.

Topica pro Vtero.

Pro vtero fiant etiam topica remedia varia. Si ob retentionem mensium, vel propter duritiem quandam, & scirrhum per cuius consensum melancholia fiat, ordinetur emplastrum illud ceroneum. Vel fiat vnguentum ex eodem illo emplastro diss. in oleo liliorum. Si ob retentionem seminis, addenda sunt, quæ semen minuunt (quod & obseruandum in strangulationibus vteri ob retentum semen, ut, scilicet, in omnibus remediis tam internis, quam externis utamur minuentibus semen) ut si vntioni supradictæ addas ol. rutaceum, vel de menta, nisi adsit caliditas manifesta. Tunc enim optimum erit addere oleum de nenuph. de semine lact. aut pap. & seminis agni casti. Si ab alia causa occulta, ut post immoderatum fluxum aliquando accidit, utendū est emplastro pro matrice, aut emplastro de mastiche, addēdo mosci, vel ambre grana aliquot. Post vniuersalia remedia optimum est vti balneo aquæ dulcis. Nam medicamētoſa inimica sunt, eò quod nimium exiccent. Fiat ergo balneū aquæ tepide, & si velis addere deco. sequentem, efficacius erit.

Balneū.

R. flor. ros. bugloss. viol. borrag. nenupha. ana p. iij. mal.

mal. viol. bugl. borrag. ana M. ij. meliss. lauendulae ana M. ss. fiat deco. pro balneo, in quo innatet saepe longè à pastu. Consumptis, & valde exiccatis omnia decoq. cum capitibus aliquot veruecis, addendo hordeum mundat. In ea deco. potest addi florum cham. sambuci, & anthos ana p. j. Fiunt etiam lotiones capitis, cum materia tantum in capite est, & per proprietatem caput afficitur, vel ad conciliandum somnum, vel ad resolutionem materiae. Vt concilietur somnus, vtantur lotionibus praescriptis in capite de phrenitide, vt floribus viol. nenuph. & aliis, quae vim habent humectandi, & mediocriter refrigerandi, & non summe, ne incrassentur & sopiantur spiritus. Hoc tamen differunt, quod obseruare oportet, vt capita pap. aut semen hyoscyami, aut cortex mandragorae, aut alia, quae insigniter refrigerant, vt solanum furiosum, nullo modo ponantur, nisi semen papaueris albi, quod cum frigidityte habet quandam familiaritatem, & humiditatem. Pro digestionem siue resolutionem materiae sic.

R. meliss. beto, ana M. ss. flor. cham. melil. ana p. j. flor. samb. ros. & anth. ana p. ss. foliorum feneg. j. summi. thymi 3. ss. fiat deco. ex qua fit lotio capitis. *Lotio cap.*

Lotiones pedum cum ad conciliandum somnum, tum ad diuersionem laudantur à practicis. Caetera posita supra commissuram capitis coronalem multum laudantur, sed oportet diutius remanere, vt os capitis vstionem sentiat, postea prepararetur vt decidat eschara cum butyro, & diutius maneat vlcus apertum. Nonnulli laudant trepanationem, quae sit separata cute capitis, & fracto osse cranij. Nam casu fortuito multi sic curati sunt, fracta caluaria, quod mihi non videtur omnino reiiciendum. Nam & ratione & *Trepana-*
tiu. experientia comprobatur. Visa est mulier melanch. & *tiu.*

maniaca nostro tempore, cui ob casum apertum est cranium, vnde effluxit aqua, & curata est ab insania. Quare si pari ratione trepanetur, vapores atri, & si quid est aliud praeter naturam in cerebro, vacuantur. In epilepsia itidem facta ab humore melanch. est aperiendum caput. Post usum syr. & euacuationem, dandum est apoz. *Apoze.* sequens aetate, quandoquidem valebit etiam in fine veris, & in melancholia, cum admiscetur fluida bilis, vel cum temperamentum est calidius & siccus.

℞. cort. rad. capp. & fraxini, rad. bugl. & satyr. ana ℥. j. gly. ras. rad. enulæ camp. philip. quinque folij ℥. ana ℔. summi. lupuli, aspar. & fumi scab. bugl. borrag. agrim. ceterac. polytric. ana M. j. acetos. vel oxyl. absynthij pontici, beth. meliss. ana M. ℔. pass. prunorum, sebest. iu. iub. ana N. xx. seminis ocymi, seminis citri ana 3. ij. seminis melonum 3. ℔. polyp. querc. 3. ij. summi. thymi. seminis cuscute ana 3. j. epith. & seminis carth. ana 3. vj. arg. recen. tro. 3. j. cicerum rub. p. j. fiat decoct. in sero caprino, & in ℔. ij. col. adde succi endi. cich. & bugloss. ana q. j. sacch. q. s. fiat syr. aro. cum 3. ℔. cinam. & 3. j. lactitiæ Gal. sit mediæ deco. & cap. in sex matutinis. Hoc syr. possumus vti initio melanch. factæ à sæce sanguinis vel à melanc. naturali adusta, facta prius sang. missione. Huic dec. addere possumus veratri 3. ℔. florum nenuph. viol. ana p. j. vel florum amaranthi, si reperiantur. Si hæc addantur, vtemur isto apoz. in morbi processu, de quo accipiant tertio quoque die, & ante primam dosim capiāt clysterem. Possunt addi prædictæ deco. omnes species myrobal. modò non ponatur veratrum. Nam veratrum & myrobala. se non compatiuntur, neque fit aliqua sigillatio, quæ necessaria est medicam. purgantibus. Præterea quæ inferunt violentiam corpori. non debent diutius retineri intra corpus. Quare non sunt miscenda cum astringentibus, sed potius cum aliis, quæ violenter illa educunt foras.

Cautio.

De melancholia, Caput alterum.

Melancholia est dementia, aut si maior, desipientia, sine febre cum timore & mœstitia. Differt autē à phrenitide & mania. Phrenitis enim est alienatio mētis cum febre, & cum quodam furore, aut in composito motu. Mania verò furor est sine febre, & timore, & mœstitia. Melancholia symptoma est, cui à causa putata nomen est inditum, vt testatur Gal. 1. methodi medendi cap. 2. cum de nominū diuersitate, quæ ægritudinibus imposuerunt ipsi primi nominum auctores, agit. Fit autem à succo frigido, teste Gal lib. de symp. causis. Sola enim melancholica demētia à frigidiorē succo, vt causa, euenire solet. Hoc verò intellexit de vera melanch. quæ vitio totius corporis vel cerebri fit, non de hypochondriaca, quæ

quæ magna ex parte fit à fumis malignis, & acrioribus ad cerebrum eleuatis. Porro tres in vniuersum melanch. sunt differentia, quæ à partibus vnde ortum habent, discernuntur. In omnibus verò cerebrum afficitur. Sed aliquando cerebrum tantum, quia humor melanch. à partis intemperie generatus, vel post aliquas capitis inflammationes relictus, hunc affectum gignit. Dignoscitur autem vitio tantum capitis fieri, & non per consensum, si tales causæ præcesserint, & nulla appareant signa in toto corpore redundantis humoris melanch. neque victus ratio, quæ atram bilem procreare potuerit, præcesserit, & si misso sanguine ad maiorem fidem, non appareat crassus, nec ater, neque tempus anni, neque regio, nec ætas declinans, aut temperies melanch. vel biliola declinans, quæ solet mutari in melanchol. habitudinem, vel si suppressæ non sunt hæmor. vel verax curata, vel corporis habitus non sit gracilis, niger, hirsutus, nec latas habeat venas, nec distentas ob flatum, non sanguinis copia. Si in solitudine, curis, multis laboribus, victu tenui & sordido educatus fuerit (talis enim aptus est ad melanch. per consensum totius corporis.) Quod si moeror & mœstitia diu perseverauerint sine tali corporis constitutione, indicium est cerebrum tantum affectum esse. communia enim signa sunt, metus, tristitia sine causâ manifesta, extremam mœstitiam inducens, odium hominum, & auersio, iuxta hanc Hippocrat. sententiam. Si timor & mœstitia diu, & longo tempore perseverent, ex eo atra bilis significatur. Qui ex hypochond. vitium contraxerint, eos sanè cruditates, quas plurimi flatum consequuntur, aciditatus, ardor & grauitas intestinorum arguunt. Augetur autem his insania, aucta cruditate. Optima autem concoct. aut alui deiectione, vel ructu vel vomitu leuantur ægri. Hæc *Soudiquis* sequi solet, vel mesenterij, vel splenis affectus. In hac hypochond. sursum conuelluntur. Multum edunt, parum dormiunt, & pauca excrementa deiciunt per aluum. Quare ob recrementorum in intestinis retentionem magis læditur mens. Hæc omnia indicant partes inferiores ventris, vel calida intemperie laborare, vel effusam esse bilem atram per mesenterium, & partes ventris. Hæc autem magna intestinorum cali-

ditas vrit, & chylum afflat, vnde fit multa effumatio ad caput ob retentionem recrementorum nimium exicatorum. Hæc calida intemperies, vt omnis alia, concoctionem lædit. Ob id si calidis vescuntur alimentis, nidulentos ructus emittunt. Si duris & siccis, acidos. Infinitæ verò sunt melancholicorum imaginationes. Aliquando enim dementia sequitur corporis dispositionem: aliquando studium, quo maximè delectabatur, qui ea correptus est. Alij se numine afflatos existimant, & in eo errore sunt, vt omnia futura se vaticinari putant, *ἐνθουσιασμοῖς* Græci vocant. Sunt qui avaritiæ iphiantes, de pecuniis congerendis perpetuò cogitant. Alij perditæ amant, & nihil nisi de amore loquuntur. Hos Græci *ἰπποκρίτους* vocant. Alij ob longas inedia, studia, & meditationes cælestes, de rebus sacris & de religione semper agitant. Alij se Reges, Imperatores, Papas, Cardinales existimant. Alij poetico furore perciti, semper versus scribere volunt. Nonnulli vbi ad corporis euacuationem deueniunt, veneno se læsos dicunt, & sepius de hac re medicos consulunt. Multi sunt præterea qui secundum corporis dispositionem melancholia afficiuntur, vt qui multo semine abundant, ad venerem propensi anôsas mulieres depereunt. Qui vermes habent, serpentes in ventre se habere imaginantur. Alij secundum vitæ institutum imaginationes habent, vt quidam sacerdotes semper preces murmurant, & templa construere volunt. Qui contentiōibus forensibus insudauerunt, nihil nisi arecta, & libellos supplicatorios scribunt & recensent. Melancholici autem talibus imaginationibus vigilantes afficiuntur, quales nobis somniantibus accidunt, vino, crapula, amore, pecuniis, vel alia re affectis. Est & alia insanix species, in quam incidunt sepius, qui vitiatos & crassos humores habent, & mores brutales. Insaniunt enim luporum more. Quare *λύγινθροποι* vocantur. Affecti verò lycanthropia noctu per sylvas, luporum more, discurrunt, & hominibus insidiantur, ita vt merito lupos esse dicamus: hi etiam, quia hominum osores sunt, *μοσχόλυθοι* appellari possunt. Melancholia, quæ fit vitio totius corporis, difficillimè curatur, vt quæ vitio cerebri fit. Si post morbum euenerit, o

ptima-

prima victus ratione, & medicamentis, curatur. Sed quæ est hæreditaria, vt illa (baillarguet) dicta, & aliæ multæ familiares nostræ regionis & Hispaniæ, ferè nunquam curatur. Quæ verò ab hypochondriis ortum habet, curationem admittit, optima victus ratione adhibita, & vfu medicamentorum repellentium, & corroborantium caput. Melancholica infania, quæ corporis vitio fit, est, cum humor melancholicus in toto corpore collectus est, à quo spiritus vitales & animales inficiuntur, & turbulenti fiunt. Ob id mens læditur. Quare cum causa fit in toto corpore, vniuersalibus euacuationibus, corpus ab huiusmodi humoribus est repurgandum. Cum igitur sanguini materia permixta sit, missione sanguinis vacuanda est, præmisso clystere, qui quidem in omni specie, & toto morbi decursu conuenientissimè exhiberi potest. Nam ferè in omnibus alius est adstricta, & flatibus est distenta. Fiant ergo ex emollientibus, purgantibus, & discutientibus flatibus, & humorem concoquentibus, vt

R. rad. maluæ, bisimaluæ cum radicibus, buglos. borraginis, mercurialis ana M. j. pass. prunorum, ficuum dulcium ana p. x. seminum anisi, viticis, & cuscute ana 3. iij. seminis maluæ, & melon. ana 3. β. seminis lini 3. j. (lubricat & concoquit) florum chamo. buglos. borrag. viol. sambuci (concoquunt enim & humectant) ana p. j. fiat decoctio in iure capitis veruecis. Et in lb. j. dissol. diaphœnici 3. ij. mellis violati, & succi mercurialis ana 3. ij. (hic optimè vacuat bilem à liene, & ab astantibus) olei violati & chamo. ana 3. j. β. vel liliorum vel amygd. 3. iij. misce, fiat clyster, cap. duabus horis ante cœnam. In crastinum mittatur sanguis è basilica. Vulnus autem fiat satis latum. Et si sanguis spissus & ater satis appareat, mittatur quantum videbitur. Materia enim sanguini est permixta. Si tenuis & clarus, statim sistatur. Est enim argumento, materiam affectus non esse sanguinem crassum, sed bilem, quam sanguinis missione vacuare non debemus, sed potius medicamento chologogo. Periculum enim esset, ne misso sanguine furiosus euadat æger. Quare in omnibus affectibus melancholicis, vt in cancro, febre quart. lepra & aliis affecti-

*Observa-
tio in san-
guinis mis-
sione.*

bus: quos à sanguine melancholico nasci putamus, ob-
servandum est vt sanguinis missionem præcedat exer-
citatio, quo sanguis crassus & ater agitetur, & facilius
extrahatur. Motio autem sine defatigatione esse debet,
ne vires debiliores reddantur. Quare post coitum, aut
longam inediam, aut magnam lassitudinem, à sangui-
nis missione est abstinendum. Vtile erit etiam, si ante-
quam corpus exerceatur, caput perfundamus oxyrrho-
dino, ne ad illud tanta fiat effusio, ne plus iusto in-
caleseat. Et sic post missionem sanguinis, quietem im-
perabimus. Porro materia concoquenda est syrup. con-
coquentibus, non euacuantibus. Et quia aliqua melan-
cholia magis fit vel à bile vsta, vel in bilioso corpore,
alia verò in pituitoso, considerata totius corporis
constitutio, & natura, vel mores animi, vel insanæ spe-
cies, vt si ad iram, vel bellum, vel contentiones, procliuus
fit, tunc ob bilem, & melancholiam, vel biliosam natu-
ram, permiscendi erunt bilem extinguentes syrups, vt
syrup. viol. qui exhibitus cum aqua buglossæ, vel borra-
ginis, ob suam humiditatem convenientissimus erit,
vel syrup. de buglossa, vel de borragine. Si verò melan-
cholia laborans, habitudinem corporis, & accidentia
ferat pituitam referentia, vt qui voraces sunt, qui pi-
tuitam vomunt, sunt flaccidi, segnes, & ad omnem mo-
tam inepti, aut tardi, aut minus vigiles. In iis syrups,
qui incidunt & attenuant citra magnam exiccationem,
conueniunt, vt syrup. acetosus datus cum aqua fœniculi,
petroselinii, vel graminis, vel syrup. capillorum veneris,
vel alius ex detergentibus, vel syrup. de liquir. cum aqua
buglossi, vel borraginis. Porro si melancholica sint acci-
dentia, & habitus corporis melancholicus, sanguis ater
& crassus, & omnia frigiditatem testentur, vt mœror,
timor, pigritia, taciturnitas, & hominum odium, tunc
syrupos melancholico humori accommodatos præscri-
bimus, vt qui vtraque qualitate, nimirum actiua, & pas-
siua conueniunt. Quales sunt syrups de borragine, de
buglossa, & syrups conseruationis satyrionis, qui vna
tantum qualitate, vt qui modicè calfaciunt & attenuant,
in quorum numero sunt, syrup. capill. veneris, & syrupus
acetosus permixtus aquæ buglossi, vel qui multum hu-
meant,

meſtant, vt ſyr. violatus, vel de cucurbita, de lactuca. Nihil enim eſt, quod ſagis conueniat in humoris melancholici coctione & præparatione, quàm quæ humida ſunt. Ob ſuam enim ſiccitatem reſiſtit curationi humor melancholicus, nec facile cedit medicamentis. Vinum niſi tentaret caput, & calidius eſſet, conuenientiſſimum eſſet ad humorem melancholicum coquendum, maturandum, & præparandum. Quare in omnibus morbis melancholicis, in quibus caput non eſt affectum, vinum commodiſſimè exhiberi poterit, vt in febre quartana, vinum album, tenue, aquoſum, debile. Sunt alij ſyr. qui melancholico humori non conueniunt, niſi ob humorem alium permixtum, vel ob aliam occaſionem, vt ſyr. end. ſimpl. vel compoſ. niſi ob bilem, vel hepatis obſtructionem, vt mel roſatum, vel ſyrup. de ſtechade ad pituitam, quibus ſanè humida quædam ſemper ſunt adiungenda, ne corpus exiceent. Ob quam reſiccationem multum læduntur ægri. Syr. compoſiti non conueniunt eo tempore, quo volumus, vel humorem, vel meatus ad humorum euacuationem præparare, ſed in ipſa euacuatione, vel poſt vniuerſalem euacuationem, vt ſyr. de fumaria compoſ. de thymo, de epithymo, de pomis compoſitis, ſyrupus Sabor regis, & ſimilia apozemata, qualia ab Empiricis medicis, aut parum methodicis in principio morborum dantur citra magnam commodum, ſed potiùs damno ægrotantis. In his componendis herbarum delectus habendus eſt, & aquarum, vt cap. de ſyr. libro noſtro de formis remediorum abundè dictum eſt. Herbx autem communes omnibus cauſis ſunt bugloſ, berrago, poligonati radic. & ſatyriõis. Quod ſi ſplenis ſit obſtructio, aut affectus nimis frigidus, herbæ capillares, aut ſcabioſa conuenient. In magis frigido, meliſſa, ocym, chamedrys, chamepithis, enula campana recens, ſi magna ſplenis obſtructio abſit, rad. capparum, fraxini, pentaphili, filipendulæ, behæ alb. & rub. rad. ſi verè eſſent, huic affectui valde conuenirent. Sed quia falſæ ſunt, reiiciendæ ſunt, & earum loco ſubſtitui debent radic. borraginis & bugloſ. Herbx ad euacuationem accommodatiores ſunt, quæ extenuant, aperiunt ſplenis obſtructiones, & quæ aliquam

*Febri
quartana
vinū al-
bum &
tenue con-
uenit.*

vim laxandi habent, vt mercurialis, borrago, summitates thymi, fennæ folia, & folliculi. Flores ad concoctionem & præparationem humorum, vel spirituum conuenientes sunt borrag. bugloss. Ad refrigerandum & tumultus animi, & agitationes compescendas, flores violarum, nenupharis conueniunt. Ad resolutionem & humoris præparationem, flores chamom. anthos, stechados ad euacuationem flores sambuci, genestæ, violarum recent. maluarum. Radices vacuantes sunt, cortex rad. capparis & sambuci, rad. azari, vel cyclaminis vel cucumeris agrestis, vel ellebori albi, vel nigri (vendi solet multò species quædam aconiti eius loco.) Ex his omnibus fiunt decoctiones syr. & aquæ omnibus causis determinatæ. Si igitur æger sit habitu & temperamento melancholico, fiat talis syrupus.

Syrupus.

℞. syr. de borragine, & capill. ven. ana ʒ iij. aquæ borraginis lb. j. aquæ melissæ ʒ iij. misce, fiat syr. capiat in quatuor matutinis. Si pro delicatis paretur, aromatizari potest pul. diarrhodon abbat. Et capiat in crastinum missionis sanguinis. Si sit acrimonia in humoribus, vile erit huic syr. addere aquam violatam, vel syr. violatum. Tertio quoque die iniciatur clyster, si aluus sit adstricta, aut excrementa dura. Finitis autem syr. exhibeatur sequens potio.

Potio.

℞. syru. de epithymo ʒ. iiij. capiat manè cum decoctione mercurialis. In crastinum ad maiorem eradicationem, detur sequens potio.

Polypod.

℞. polypodij querni ʒ. ij. (nisi ponatur in magna quantitate, non euacuat bilem) pass. enucleatarum p. x. anisi ʒ. iiij. sem. cuscutæ, summitatum thymi, folliculorum fennæ orientalis ana ʒ. lb. florum bugloss. borrag. violarum ana p. j. fiat decoctio in aqua fumarie cum fol. mercurialis M. j. in quart. j. colatura dissolue diaphœnici ʒ. ij. confectionis hamech ʒ. iiij. syr. rosati laxatiui ʒ. j. misce, fiat potio. Capiat manè cum custodia. Confe. hamech conuenit, quando materia bene cocta est, data in forma boli, vel dissoluta in aqua graminis, vel capillis veneris. Si autem materia probè cocta non esset, minus conueniret, ob myrobalanos, quæ eam compositionem ingrediuntur. Diacartham. quanquam pituitam

tantum euacuare creditur, commodissime tamen exhiberi poterit, cum decoctione prædicta, vel cum aliis succum melancholicum purgantibus. Post exhibitionem medicamenti laxantis, maxime conuenit cremor hordei: hietæ ab antiquis in huiusmodi curatione recipiuntur. Sed hæc tantum, quæ veratrum, vel colocynth. recipiunt, huic morbo sunt accommodatæ. Dandæ sunt autem cum aquis bugloss borrag. vel cum decoctione fructuum laxantium, & refrigerantium, vt pass. sicuum, prunorum & tamar. Hæc verò danda non sunt, nisi in constitutionibus frigidis, vel multum humidis, vt pituitosis. Nimirum enim siccant. Pilulæ etiam hoc nomine nimis probantur, quòd calefaciant, & nimis siccant, vt pilulæ indæ, de lapide lazuli, de fumaria, de lapide armeno, vel quæ ex veratro parantur. Exhibeantur autem post longam præparationem. Præparantur cibis & potionibus humidis, si veratrum sit dandum. Post istas autem pilulas dare oportet syrupi violati ℥. ij. cum aquæ hordei perfecte cocti, in aqua borraginis ad ventriculi humectationem, & deterfionem. In crastinum comedat poma dulcia cocta & refrigerata, quæ frequenter sumantur in prima mensa. Post hanc primam euacuationem, instituenda est optima victus ratio, & viuanda concoctio vnguentis, vel linimentis impositis supra hypochondria, & totum ventrem. Parantur autem ex oleis temperatis, relaxantibus leuiter, & aperientibus, vt ex ol. chamemel. amygd. dulc. vel amararum, & vino dulci. Anerinum in inferiore ventris parte est imponendum, vel rutac. aliquando ad flatuum discussionem. Non erit etiam inutile partes epigastrii fouere decocto sequenti, quia concoquit, & partes illas humore melancholico terreo siccatas, vel constrictas, relaxat.

℞. florum chamemel. meliloti, viol. an. p. ij. rad. enulæ campanæ, irid. florentiæ an. ʒ. v. fiat decoctio in aqua & vino albo. Foueatur venter. Quòd si multi flatus adsint, adde semen apij, vel anethi vel petroselin. an. ʒ. ss foueantur manè, & postea inungatur. Decoquantur folia maluæ cum rad. & flores, semen lini, quando fortius est emolliendum, vel cum volumus multum euacuare, vel scyrhum emollire. Balnea aquæ dulcis vel ex

decoctione præcedentium herbarum, & florum vtilia sunt. Concoquant enim & digerant. Postvsum autem horum balnearum, vel fotuum, syrupis compositis vti possumus, vt syrupo de pomis comp. syrupo de fumaria comp. vel syrupo de epithymo, vel de thymo. Tales quia inspissantur, quò melius seruari possint, vt gratiores fiant, dilui debent decoctione alicuius herbæ, quæ vim laxandi aut aperiendi habeat, vt cum decocto mercuriali, vel pass. vel folliculorum fennæ, vel borrag. vel corti. sambuci, vel cum aqua, aut decocto fumariz, aut cum aquis graminis, asparagi, vel enulæ campanæ, vel fiat syr. in hunc modum.

Carica.

R. rad. enulæ campanæ recent. rad. bugloss. & liquiritiz an. ʒ. j. pass. enuclearum p. xx. prunorum dulc. N. x. ficuum. (Quamquam non prohibentur ab Alexandr. Trall. Sed cum reiecit ficus à medicamentis laxantibus, intellexit de recentibus. Caricæ verò quia humectant & detergunt, conuenient. Discutitur enim flatus aniso permixto. Ab eo igitur non probantur in cibis, verum in medicamentis non sunt reiciendæ, quia detergunt, & discutientibus flatus miscentur) ficuum P. v. pomorum dulcium N. ij. mercurialis, borraginis, herbarum capil. an. M. j. seminis anisi ʒ. ii. j. seminis apij, petros. ocymi an. ʒ. ij. polypodij querni, recentis ʒ. ii. j. fennæ orientalis, medullæ semin. carthami an. ʒ. ij. corticis medianæ sambuci ʒ. ii. j. flor. anthos, bugloss. borrag. viol. ana p. ij. fiat decoctio, & in lb. ij. diss. sacch. q. s. fiat syrupus arom. cum ʒ. ij. diarrh. abb. Viatur in quatuor matutinis cõtinuis, quibus finitis, addere possumus vltimæ dosi ʒ. j. rhabbari expressi, vel pilularum superius enumeratarum ʒ. ss. vel ʒ. ij. vt de fumariz, vel indarum, vel de lapide lazuli. Deinde studiosè est adnitendum, vt ventriculus reficiatur, qui frequentius medicamentis est deiectus & minùs concoquit. fiat ergo talis inunctio.

R. olei de absynthio & nardini an. ʒ. ij. ceræ parum, fiat linimentum. Vngatur ventriculus. Tempore inunctionis addatur vini albi odoriferi vel acerbi parum. Absumat tab. j. diarrhodon abb. si obstructions absint. Si verò frigidior morbus sit, aromatici rosati, vel diagaangæ, superbibendo parum vini diluti aqua absinthij

vel melissæ. Interea detur opiata sequens, ad animi tenebras abigendas, & spirituum clarificationem.

R. conferuæ rad. bugloss. florum borraginis an. ʒ. ij. *Opiata.*
yringiorum ʒ. j. aro. ros. ʒ. ʒ. pul. diamargari frigidi ʒ. ij.
diarrho. abb. ʒ. j. cum syr. conseruationis enulæ, aut satyrionis fiat opiata. Capiat ʒ. ij. manè, superbibendo parum vini diluti aqua bugloss. capil. ven. vel callithrici, vel sic.

R. conferuæ enulæ campanæ recentis & conferuæ florum violarum ana ʒ. j. conf. anthos, bugloss. borrag. ana ʒ. ʒ. pul. diamargariti frigid. ʒ. j. conf. alkermes ʒ. ij. cum syr. de bugloss. fiat opiata. Capiat manè ad quantitatem auellanæ, superbibendo parum aquæ bugloss. & capil. ven.

De melancholia ob cerebrum affectum.

IN cerebro ob intemperaturam frigidam & siccam ægri, humor melancholicus genitus melancholiam facit, vel temperamentum calidius bilem aut sanguinem adassauerit, melancholicus sit humor in capite, qui aliquando epilepsiam, aliquando melancholiam committit, vt Gal. ex Hippo. probat in Epidem. vbi inquit, Melancholici magna ex parte afficiuntur comitiali morbo, & contrà morbo comitiali laborantes melancholia. Si enim infirmitas in corpus repit, epileptici, si verò in mentem, melancholici redduntur. Quòd Gal. sic exposuit, Bilem, dum cerebro, veluti parti instrumentali, nocet, ad cerebri corpus conuerti ait. Id quod in obstructionibus fieri constat. Cum verò temperamentum mutando, vt similari nocet, eam mentem rapere dicit. Si ergo vitio huius humoris fiat melancholia, danda erit opera vt humor genitus vacuetur, intemperies auferatur, & optima victus ratione sensim immutetur. Quòd si post primam ætatem facta sit, emendari poterit: Si verò hæreditaria, in prima ætate minuenda erit optima victus ratione, quæ affectui contraria esset. Igitur purgantibus medicamentis vtendum in facta, supradictis, vt masticatoriis, & erthinis, si humor aliquis subesse appareat (Alioqui rarò vacuantibus, quia valde calefiunt, & siccant quod vitandum est) sed potiùs alterantibus vtendū, vt embrocationibus ex alto factis, vel decoctio-

nibus, vel oleis, vnguentis, aliisque remediis tam sumptis, quàm admotis. Sternutatoria non sunt negligenda, ante errhina & masticatoria. Decoctiones materiam concoquentes vsurpandæ sunt, vt syrupi laxantes, obseruando capitis temperiem, imaginationes, somnium, insomnia, naturam. Verùm vt temperaturæ humores generantis, vel humoris cognitionem habeamus, obseruandum, an frequenter moveatur, aut multum loquatur, aut vigiliis potius, quàm somno delectetur. Tunc enim à caliditate humorum fieri certissimū erit. Aut si inflammatio præcesserit, & post eam discussa non fuerit, tunc refrigerare & humectare conuenit. Quòd si nulla talia accidentia, sed potius contraria appareant, à frigiditate oriri coniiciamus. Quare quæ calefaciunt & humectant, eligenda. Qui verò citra castigationem vel delectum vitur omnibus remediis ab antiquis & neotericis præscriptis, plus nocet, quàm iuuat. Quare, vt in syrupis delectum imperamus, sic in pul. & conf. Nam conf. anthos, stechados, capil. ven. ceterach, bugl. borrag. viol. nenupharum, satyrii, corticis citri conditi, enula, ab omnibus præscribuntur. Sed non omnes in omnibus & semper conueniunt. Quare diuidendæ sunt in communes, & proprias aliquibus causis, & accidentibus. Communes voco, quæ sunt temperatæ & cordiales, quæ non multum calefaciunt, & humectant aliquantulum. Quales sunt conseruæ rad. bugl. borrag. satyrionis. Hæ in omnibus speciebus, omni tempore, & symptomate conueniunt, excepta conserua satyrii, quæ in amantibus non conuenit. At conseruæ humide & frigide, non nisi cum adest magna vel corporis vel cerebri calefactio, vel cum vrgent vigiliæ, vel cum apponuntur calidiora & sicciora, vel cum vtimur confectione alkermes, vel puluere diamosci, diambre, laticie Galeni & similibus. Conseruæ anthos, stechados non nisi in frigidior, aut humidior causa vsurpantur, quia siccant. Conseruæ capillorum veneris, tamarisci, ceterach conuenientissimæ sunt, si morbus cum obstructione hepatis, vel splenis fuerit. Pulueres confectionum huic morbo accommodati sunt, confect. alkermes, diamargar. frigidi & calidi, diambre, diamosci, laticans. (Qui omnes

mnēs siccant, alij magis, alij minùs. Omnes calefaciunt, præter diamarg. frig. Quod habet tamen aliquid caloris cum siccitate) si permisceantur conferuis & syrupis. Et ex his opiatae fiunt pro humoris, & temperamenti ratione, vt pro bilioso homine, vel pro melancholia orta post inflammationem, parari sic poterit.

R. conf. florum buglos. & borrag. (conueniunt ma- *Opiata.*
gis flores conferuæ, quàm rad.) ana 3. j. conf. viol. 3. ij.
pul. diamarg. frigidi 3. ij. diatrag. frig. 3. j. cum syr. viol.
fiat opiata. Capiat manè, & sero, longè à pastu. Hæc opiata conuenit tum in temperamenti calidis, tum etiam in vigiliarum instantia, quia humectat sufficienter, neque calefacit supra primum gradum. Quod si non tantum fuerit humectandum, sed aliquantum refrigerandum, syr. de pomis simplex, vel nenupharis, vel violatus poni poterit in morbo, & temperatur frigida, & pro taciturno, ac somnolento parari poterit sequens.

R. conf. enulæ campanæ 3. ss. buglossi. & anthos ana *Opiata.*
3. j. conferuæ violarum 3. ss. pul. diamoschi, & confectionis alchermes præparatæ ex cyanæo lapide vsto, & abluto an. 3. ij. cum syrupo de pomis, fiat opiata. Morbus hic potius ab intemperie sicca prouenit, quàm è copia humoris. Aliquando à sola intemperie relictæ. Vidi mulierem melancholia affectam, quæ nunquam sapiebat, neque ad primum statum redire poterat, nisi cum vrero gereret. Tunc enim multum non insaniebat, aut nullo modo. Quo tempore magis laborare debebat, si à materia affectus ortum traheret. Verum quia sanguinis redundantis copia retineatur, ex quo vapores eleuantur, intemperies illa sicca, vel humor fccus genitus in cerebro contemperatur & mitescit. Hoc autem erit nobis argumento, melancholicos potius cibis, & balneis, aut potionibus & irrigationibus esse humectandos, quàm horum corpora medicamenti laxantibus calefacienda & exiceanda. Gal. lib. 3. de locis affectis cap. vltimo, vsu balnei aquæ dulcis cum victu humido malum curasse scribit, cum ait: Interim monendi sunt amici, qui me curantem viderunt, frequentius balneis & victu humido, & boni succi, nullo adhibito præsidio, huiusmodi me morbum curasse, vbi nondum

ob longum temporis tractum nocuus humor multum
vacuationi resisteret. Cum verò diuturnus iam est sa-
ctus, fortiora prædictis adhibenda sunt remedia. Hu-
mectatio autem longa, si ab intemperie fiat, morbum
curat & euincit. Si ab humore fiat, materiam ad eua-
cuationem præparat. Sola enim siccitas est, quæ mor-
bos siccos curationi contumaces facit. Tum enim cu-
rantur, cum pinguescunt, quod est signum certissimum
humectationis. Quare danda est opera, ut totum cor-
pus humectetur balneis, potissimum si à toto corpo-
re ortus sit morbus. Quod si vitio cerebri fiat, humectan-
dum erit caput & irrigandum, irrigationibus humectan-
tibus, aut humiditate substantifica, aut madefactiva, ut
irrigationibus, balneis, embrochis, & vnguentis humi-
dis, & minimè digerentibus. Substantifica verò cibis
humidis & euchymis, laudatisque potionibus. Inci-
piendum ab humectatione madefactiva. Vtilis enim
est ad meliorem nutritionem, hoc est, ad humectatio-
nem substantificam. Nam balnea aquæ dulcis siue hu-
mectatoria, partes relaxant, alimentum ad eas trahunt,
vel missum, & appositum conseruant, & partes, ut prius,
non assant, neque vrunt. Verum post medicamenta la-
xantia, priusquam vtamur humectantibus balneis, non
erit inutile uti balneo leuiter digerente, & detergente,
ut si quid in parte hæreat, detergeatur, & melior postea
fiat nutritio. Tale erit, si ex decoctione borrag. bugl.
mal. & florum chamemel. & hordeo paretur. In eo ma-
nè nate æger, citra defatigationem, reiectis prius alui
recrementis. Postea leniter detergatur, & vngatur ad
eundem scopum sequenti vnguento.

*Vnguen-
tum.*

R. olei amygdalarum dulcium, & olei chamemel. æ-
na partes æquales, vel vngatur oleo amygd. amararum
recenter parato, continet per vnam aut alteram he-
bdomadam, alternis diebus, vel quotidie. Post usum
huius balnei erit optimum rursus ventrem laxare, syru-
po superius descripto ad atræ bilis euacuationem, vel
vtatur puluere sequenti, in iure galli antiqui, vel cremo-
re hordei, vel pul. loco, vtatur opiata in sequentibus de-
scripta.

Pulvis.

R. summitatum thymi, epithymi, sennæ orientalis

ana 3. j. salis communis, & sacchari candi ana 3. iij. tartari ex vino albo 3. ss. medullæ carth. 3. j. fiat pulvis, cap. iij. cum iure galli antiqui, vel capi, vel in iure albo alicuius piscis saxatilis, vel lupi, vel caripioni, vel mugilum, vel truitarum, vel aliarum non palustrium. Quod si detur in decoc. capi facti passulis, ficibus, polypodio, efficacius laxabit, vel dissolue decoctione sequenti.

R. violarum, mercu. borraginis, ana M. j. fiat decoct. *Decoctio.*
Et in q. j. dis. pul. præordinati 3. ij. vel 3. iij. vel detur in decocto hordei mundati, addita syr. violati 3. j. Sic trahitur humor, qui in splene est, & toto corpore. Qui si à capite trahendus est, tribus diebus continuis eo utendum est, & parum edendum. Ex lapide armeno, vel lazuli pulvis talis fieri potest, qui potenter atram bilem trahit. Verum per se dari non potest, vel nisi prius cremor hordei sit sumptus, vel exhibeatur cum supradictis decoctionibus. Parari autem sic poterit.

3. lapidis armeni, vel lazuli abluti decies in aqua violarum 3. j. sennæ orientalis 3. ij. polypodij, querni recentis 3. j. ss. seminis anisi, bismalux, cuscutæ ana 3. j. sacchari candi 3. iij. semin. frigidorum malorum, minutim incisorum, semin. violarum ana 3. ij. florum sambuci 3. iij. fiat pulv. capiat ad 3. ij. à 3. j. cum supradictis decoctionibus, vel fiat talis confectio solutiva ex lapide lazuli, vel armento.

R. thymi, epithymiana 3. ss. agar. 3. lapidis armeni, vel lazuli loti decies in aqua fontis, postea in aqua violarum 3. ij. diagridij 3. iij. garyophilorum, cinamomi ana 3. j. cum syrupo rosarum laxativo fiat opiata, cui adde syrupi de pomis redolentibus tertiam partem ad syr. rosat. lax. ut si 3. iij. syr. rosati ponantur, 3. j. syrup. de pomis erit miscenda. Hæc compositio ad imitationem Aureæ Alexandrinæ facta est, sed hieram prætermisimus. Syr. autem rosat. solutivum ad augendum vim laxandi, & ad castigationem aliorum medicamentorum tantum addimus. Cinamomi etiam crass. parum adiunximus, ad ventriculi corroboracionem. Hæc compositio maiorem partem scammonij, quam par sit, recipere videtur. Sed tantum abest, ut hoc nomine vituperanda sit, ut securius ex sit utendum. Lapidem enim lazuli, vel

armeni, quo citius è ventriculo exeunt, eo melius est, & conducibilius. Adde quod vomitionem agarici & lapidis lazuli impedit, & maximè, quia cinamomum deorsum turbat, & eorum ingratum saporem castigat. Syrupus de pomis caliditatem temperat. Si hieram imposuissimus, calidiùs medicamentum redderetur. Sed ea forma melius operatur, & minùs ventriculum lædit. Quòd si bilioso, vel multum siccò danda esset hæc compositio, danda esset cum decoctione frigida & humida, vel cum syr. violato, vel cass. admiscenda, modò cum decoctione anisi detur, vel fiat in sequentem modum.

℞. conferuæ violarum & cass. recenter extractæ, ana ℥. ij. thamarindorum electorum ℥. iij. pul. opiata præordinatæ ℥. j. misce cum paucò syr. de rosis siccis, fiat opiata, capiat ℥. ss. in forma boli, vel dissoluatur in iure galli pinguis, vel in aqua violarum, & capill. veneris, capiat mane. Statim post assumptionem detur cremor hordei cum saccharo. Prohibet enim vomitionem, & oris ventriculi resiccationem. In verè melancholicis dari potest in puluere cum iure pingui, vel decoctione polypodij querni. Euacuatione rursus facta vel hac opiata, vel puluere, redeat ad balnea aquæ dulcis, vel fiat sequens decoctio pro balneo, pro irrigatione, vel pro ablutione capitis vel pedum.

℞. violarum M. iij. florum bugloss. borraginis ana p. iij. quat. semin. frigidorum maiorum conquassatorum ana ℥. ij. fiat decoctio in aqua cisternæ, vel fluuiorum vel fontis q. s. Natet in ea decoctione manè, & ex eadem irrigetur caput ex alto guttatim, post irrigationem vngatur vnguento sequenti.

℞. olei, de semine cucurbitæ, & cucumeris ana ℥. ij. olei amygdalarum dulc. ℥. iij. inungatur caput. Tempore inunctionis adde lactis mulieris tertiam partem. Agitentur & applicentur manè, vel post mediam noctem. Conuenit omni speciei, quæ per essentiam fit. In ea verò, quæ per consensum fit addendum est olei rosati ad duplum. Et inunctio fieri debet serò ante lecti ingressum. Si somnus sit conciliandus, loco olei amygdalarum, violatum est apponendum. Quòd si nõ sufficiat, adde parum olei de papauere, vel de semine lactuce.

Aliquan-

Aliquando etiam in ea specie, quæ per consensum fit, non erit præter rationem caput frequenter oxyrrhodo perfundere in hunc modum parato, vt,

℞. olei rosati ℥. iij. aquæ myrthillorum ℥. ij. aceti ℥. j. misce, vagatur pars anterior capitis. In principio semper est repellendum, donec affectio cessauerit. Deinde illa digerentia modicè calida applicanda. Nam qui caput resiccant, ex stulto insanum faciunt.

De melancholia hypochondriaca. CAP. XLII.

HYPochondriaca affectio topica remedia propria habet, & proprias euacuationes differentes ab euacuatione aliarum specierum melancholiæ. Nam ventriculus vel per proprietatem, vel per cōsensum, magna ex parte laborat, ob id non est fortioribus remediis exasperandus, sed eget mitioribus. Mitiora erunt, quæ in hæc affectione mitiora dicuntur, non autem talia simpliciter. Morbus nempe est contumax, ob idq; fortiora remedia expostulat, quando sunt illa communia, quæ mitiora simpliciter dicuntur, vt cass. fistula, & catholicum. primum prouocetur vomitus, maximè si cognoscamus pituitam asseruatam in ventriculo, quæ vomitu *Vomit. ser.* possit expurgari. Fiat sanguinis missio, si plethora adaucta sit ex mediana sinistra: vel si fiat ob retentionem *Missio sanguinis.* mensium, vel venarum hæmorrhoidarum. Quod si possis è vena poplitis, magis laudanda est, postea prouocentur hæmorrhoides, vel menses. Non enim primum hæmorrhoid. aut menses prouocare oportet, sed prius, quod est in corpore collectum, debet euacuari, deinde ad illorū prouocationem veniendū, quod fit acrioribus medicamentis, & diureticis. Aliàs enim ob plenitudinē *Prouocatio hæmorrh. & mēsum.* neq; cucurb. affixæ parti domesticæ femoris prodesse, & medicamentorum applicatione nimia fieret in partem attractio, & super vires illius. Quare soluenda primum plethora, basilicæ sectione, postmodum veniendum ad saphenam. Sic vomitus prouocandus est, cum in ventriculo est cruditas. Facta euacuatione per vomitum, & venæ sectionem, purgandus est humor, qui *Curatio.* primum coq. syr. præscriptis. Hoc tamen obseruandum est, vt quoties fit affectio hæc ob splenis obstructionem vel menses suppressos, addantur in syru. magistralibus

ea, quæ obstructions aperiunt, & habent aliquam aromaticitatem, ob quam possint corroborare partes internas, & viscera, vt sunt valeriana, asarum, cyperus, spica, cum radicibus aperitiuis, quod non est faciendum in aliis speciebus. Nam diuretica sunt huic affectioni contraria, cum sint acris omnia. Vel addantur aquæ cum syr. quæ vim habent aperiendi, & fiat hoc modo.

*Syr. aperi-
entes.*

R. syr. de bizantiis & capil. ven. ana ʒ. j. syr. de borrag. vel de bugloss. vel de epith. vel de fumaria ana ʒ. ij. aquarum bugloss. borrag. fœnic. & melissana q. j. misce pro iij. dosibus vel fac hanc decoctionem sequentem.

R. rad. petr. graminis, aspar. ana ʒ. j. valerianæ, cyp. ri ana ʒ. ij. herbarum cap. meliss. beton. matric. ana M. j. borrag. & bugl. ana M. ʒ. feminis anis. fœnic. carui ana ʒ. j. ocymi, cubeb. ana ʒ. ʒ. fiat decoctio & in colatura dissol. ex syr. præscriptis vel de syr. Regis Sab. descripto à Mes. cap. de melancholia. Valet hic syr. ad omnes affectiones melancholicas, præcipue in quartana, si assumatur cum decocto saluæ & melissæ. Si quis utatur vino albo, in quo maduerit salua per noctem, factis prius euacuationibus, curatur à quartana. Purgetur frequenter cum decoctione epithymi, vel senæ, vel polyp. & aliis leniter purgantibus melancholiam. In aliis speciebus melanch. laudantur myrobal. sed in hac, cum fiat ab obstructione, parum laudo, sicut nec cum fit à suppressis mensibus, vel hæmorrhoidibus. Nam omnes illæ astringunt, & astringendo sic laxant quod tenuius est, quod crassius est, remanet, unde obstructio

*Curatio
quartana.*

*Cautio
myrobal.*

*Vsus cassiæ
sic impro-
batur.*

augetur. Neque etiam laudandus est in his vsus cassiæ, vel compositionum, in quibus ingreditur, vt quæ flatu gignat, & in flatulentis multas tortiones. Quod si cogamur his uti, aut cass. ob aliam causam, vel ob penuriam aliorum medicamentorum, addemus pul. anis. ʒ. ʒ. quod est faciendum in phrenitide cum cassiam damus, aut cath. Ab istis ad fortiora veniendum est, vt ad pilulas indas, de lapide lazuli, hieras omnes, sed de colocynthid. Iustini, Ruffi, & aliorum, & ad portionem illam, quæ recipiebat confectionem alkermes supra descriptam superiori cap. Et post assumptionem hieræ, vel pil. detur hordeum mundatum liquidissimum,

paratum

parum cum aqua tantum, & non cum decoct. carniū, & addatur sacch. in suff. quantitate. Vt antur etiam ptisana, atq; hoc ad robur oris ventriculi, & ad deterfionem oesophagi, in his præcipue, qui vomitui sunt obnoxij. Deinde superdormiant parum, donec medicamentum sit redactum de potentia ad actum, atque tunc operatio erit salubrior. Si medicamentum sit imbecillius, laudabile erit dare decoct. aliquam, post duas aut tres horas (seruata proportionē, vt tandem eodem tempore operentur pilulæ, & decoctū) purgantem melanch. vel dentur syr. de pomis compo. 3. ij. cum decocto cicérū rub. Vel syru. regis Sabot cum deco. epith. Medicamenta, quæ assumentur ad corroborandum ventriculum & alias partes *Corroborantia os Ventriculi.* sunt hæc, aro. res. diagalanga, & alia electaria corroborantia facultatem coctricem, & carminentia ventositatem. Laudantur tales clysteres.

R. matric. m j rad. alth 3. j. polyp. quer. 3. ij. epit. summitatum thymi. flor. geniffæ, & sambuci, camomill an. p. ij. flor. buglos. borrag. anthos an. p. j. fiat decoct. cui adde anis. fœni sem. vrticæ an. 3. j. sem. rutæ 3. ss. Et in fœ. j. col. diss. mel. ros 3. ij. hieræ picræ, & benedictæ ana 3. iij. (Adduntur & aliæ hieræ vt Archigenis Ruffi, colocynth sed in minori dosi) ol. chamo. 3. ij. fiat clyster. Residentia clysteris ponatur supra ventrem ad modum cataplasmatiss, Vel applicentur ventosæ cum scarificatione supra ventrem. Vel fiat picatio supra ventrem, prius oleo inunctū, & hæc omnia mîrè iuuant præsertim cucurbitulæ: quia melancholicus humor non solum est in venis, sed etiam in musculis sparsus, & aliis partibus. Sed corroborandus est ventriculus foris per sacculos, vnguenta & emplastra applicata, vt & splen, hepar, & aliæ partes, quarū cōsensu hæc affectio fit, confirmantur. In hac affectione summè laudatur decoctum galli in fœcti cum pass. & prunis, & pul. præscripto cap. de melancholia pro pauperibus, cuius est vsque ad 3. iij.

De melancholia hypochondriaca caput alterum.

Hypochondriaca affectio fit vitio splenis, mesenterij, & intestinorum. Aliquando est sola intemperies in principio, sed tandem vrit calidos humores. Alimenta coctū difficilia non concoquuntur, hinc cruditates, &

flatus multi gignuntur. Dioclem citat Galen. lib. 3. de locis effect. qui ait os ventriculi inflammari, ac propter inflammationem ipsum obstrui, & prohibere ne alimenta statuto tempore ad intestinum descendant. Quamobrem diutius manentia in ventriculo quam par est, & tumores, & aestus, & reliqua, quæ prædicta sunt, efficiunt. Hæc sunt, quæ Diocles literis prodidit, quæ Galen non reprehendit, sed in eadem est sententia. Et hæc paulò post confirmare videtur, cum ait: Atque videtur etiam in ipso inflammatio esse. Sanguis autem in parte inflammata, contentus est crassior, & atræ bili magis conformis. Itaque quemadmodum elato à ventriculo ad oculos fuliginoso quodam, aut fumoso halitu, aut crassis vaporibus similia, vt in suffusione, accidentia contingunt: eadem ratione sublata ad cerebrum ab atræ bile euaporatione, veluti fuliginosa fumosaque melancholia in mente euenient accidenti. Hactenus Galenus. Ego aliquando post *βουλιμίαν* & tristitiam morbo tali laboraui. Verùm non audebam dormire. Fiebat enim tanta effusio vaporum ad cerebrum, vt caput grauari & mentem affici mille modis sentirem. Horrebam quum humor acidus circa ventriculum mouebatur, vel quum reuocabam ad memoriam aliquid, quod mihi timorem incuteret. Multos ructus emittebam, cor palpitabat, mens erat affecta. Quare hunc affectum nihil aliud esse existimo, quam intemperiem mesenterij, vel venarum meseraicarum, quæ ad intestina, & ventriculum deducuntur. Neque probo Dioclis & Galeni opin. qui dicunt os ventriculi, quod intestinis continuatur, inflammari. Si enim inflammaretur, & in tumorem eleuaretur, febris continua esset, vt in aliis inflammationibus internis, ac morbus acutus esset. At in hoc affectu neq. febris adest, neque morbus acutus, sed qui in multos menses producit. Quare potius intemperiem esse siccam existimo, cum aliqua caliditate, sine affluxu, sed cum obstructione potius, à sanguinis crassitie, vt gravitates harum partium indicant, & recrementorum acrimonia, flatus acidi vel nidorulenti, & vaporum sublatio magna ad cerebrum. Quæ non nisi à calore adassante humorem illum, & sanguine crasso fieri possunt. Re-

manet

Vera causa

est.

manet autem crassior pars sanguinis, tenui ad cerebrū delata. Quamobrem ad curationem hæc necessaria sunt. *Curatio.* Victus ratio optima (potissimum enim talium morborum, qui circa partes concoctioni destinatas accidunt, optima victus ratio remedium fit) quæ intemperiem emendat, & flatibus gignendis materiam non præbet: ventrem lenientia, nec eundem constringentia, recrementa vacuantia, vt mitiora medicamenta ventriculo & intemperiei apta, vsus repellentium à capite, quod est potissimum in huius morbi curatione. Vomitus præterea utilis est in iis, qui facile vomunt. Euacuantur enim plura recrementa & flatus multi, quare post cibum concitandus est aqua tepida, vel syru. violato in maiori quantitate assumpto. Postea clysteres iniiciendi, quales suprà descripti sunt. Quibus peractis syr. aperientes leuiter sine magna calefactione dandi. Si tollenda sit obstructio, fiat potus ex syr. capil. ven. & endi. cum aqua cichorij, graminis, portulacæ, endiuiz, vt

R. syr. capillorum ℥. iij. aqua graminis, cichorij, end. ana ℥. ij. misce cap. Si magis sit aperiendum, syr. de bizantius vel endiuiz simpl. vel compositus, cum aqua buglossi, borrag. exhibere poterimus, vel fiat talis.

R. rad. borraginis, & graminis ana ℥. j. corticis citri ℥. ℥. cichorij, endiuiz borrag. herb. capillarium ana m. j. quatuor sem. frigidorum maiorum ana ℥. ℥. anisi, foeniculi ana ℥. j. florum chamom. violarū, borraginis, thamarisci ana p. j. fiat decoctio & in ℔. j. dissolue succ. pomorū ℥. iij. sacchari q. s. fiat syr. aromatizetur cum ℥. j. pulueris diarrhodon abb. cap. manè. Finitis syr. capiat sequentem potionem.

R. mercurialis, buglossi ana m. j. viol. m. ℥. pass. sebesten ana N. xx. anisi ℥. ij. senæ orientalis, medullæ carth. & epithymi ana ℥. ij. polypodij quer. recentis qr. j. fiat decoctio, & in colaturæ qr. j. dissolue syr. rosati solutiu ℥. ij. cinamonij ℥. j. capiat manè. Si magis laxare velis, calissæ vel cath. ℥. ℥. adiunge supradictis, fiat euacuatio, vt suprà dictum est, duobus diebus continuando, quod fiet, si residuum decoctionis in syrupum coquatur, & in crastinum capiat quart. j. Vel datur clyster ante medicamentum, vel in crastinum vratur medicamento

cum 3. ij. succi mercurialis. Vtatur frequenter pomis dulcibus coctis & refrigeratis, vel parum acidis cum paucis saccharo, in prima mensa. In fine vero mensæ edat mediam partem pomi assii vel calefacti tantum, non superbibendo. Pruna prima mensa profunt. Vitanda sunt medicamenta & alimenta, sicca, siue adstringentia, quæque aliquando exhibentur iis, qui facile vomunt, ut pyra, poma, mala cotonea cocta. Difficile enim coquuntur, & flatos multos gignunt. Satiusest itaque parum bibere, cum concoctio fieri incipit. Impedit enim effumationem, & cibi adassationem. Flatus si multi sint, discutiendi sunt assumpto aromatico rosato, vel paucis aniso. His autem quotidie non est vtendum, ut neque pul. cordialibus, quæ corpus siccant & morbum augent. Talis autem parari sic potest.

R. anisi 3. j. cort. citri. 3. β. margar. florum bugloss & borrag. 3. β. pul. diar. abb. 3. j. sacch. ros. tab. 3. ii. j. misce, fiat pul. cap. cochlear vnum. In omnibus speciebus melancholiz conuenient sacculi, & epithemata, qualia sunt in cap. de incubone. Victus ratio huiusmodi sit, quæ atram bilem minime possit creare. Alimentis igitur vtatur, quæ frigidiores sanguinem coquunt, & tenuem gignunt, & quæ non effumant ad cerebrum, nec ventrem siccant, & constipant. Edant ex fructibus poma, quæ & medicamenta & alimenta esse possunt, quouis modo sumpta. Pruna, vix, cerusa dulcia, pepones, cucurbitæ, & lactucæ coctæ erunt ex usu. Ex carnibus conuenient caro vitulorum, hoedorum, porcellorum, caponum pinguium, gallinarum, pullorum earundem, & columborum, si sint elixi cum lactuca vel borragine. Cremor ptisanæ exhiberi poterit conuenientissime, non tota ptisana, cum paucis cinamomo & aniso & sine amygdalis, nisi sint recentes, aut diu in aqua frigida maceratæ, & frequenter inter contundendum, aqua frigida conspergæ Vinum mihi non placet, quare aqua, quæ facile per hypochondria descendat, detur. Quod si à vino abstinere noluerit, eligatur aduiculus, ut album aquosum. Satiusest tamen poscam bibere bene dilutam. Omnes fructus, qui effumant ad caput, vel omnes cibi, qui nidorem multum reddunt, vel quæcunque

Quinque cum aromatis, vel multa pinguedine, butyro, lacte, caseo, & oleo parantur, non sunt ex usu, Iuscula in parua quantitate sumpta iuuant, in magna verò fluctuationem faciunt, & cruditatem. Quies corporis, leues frictiones pedum, & eorundem ablutio cum decoctione irrigationis multum conferunt. Animi tranquillitas tenenda fabulis, aut alio quouis modo, animum euocare ab omni cogitatione oportet, nec eorum morbi mentionem ullam facere. Gaudeat verò & lætetur, & habeat qui cantu, aut aliis musicis instrumentis hilaritatem excitentur.

De mania.

CAP. XLIII.

Mania non multum differt curatione à melancholia, nisi quòd maior sit intentio obtundendi acrimoniam humoris refrigerando & humectando. Sed in sanguinis missione conueniunt, nisi quod nò tanta sanguinis copia est extrahenda in mania. Dantur etiam clysteres, vel ante, vel post sanguinis missionem, emollientes, cum quadam attractione ad diuersionem. Concoquitur humor peccans syr. magis frigidis, & magis respicientibus bilem, additis tamen aliquibus syr. qui humores adustos respiciunt, vt sunt syr. de fumaria, de bugloss, de borragine, de epithymo, sed in minori dosi, & syr. endiuæ simpl. viol. de nenuph. & de pap. cum volumus somnum conciliare. Syr. etiam de cicho. non est reiciendus. Syr. endiuæ compositus non conuenit, quia vim habet aperiendi, & calfacit.

Syr. cōcoq.

Aquæ, quæ syr. commiscantur, sunt endiuæ, cichor. scariol. lupuli, addendo aquam bugloss. borrag. meliss. ros. acetos. fuinor. scolopendrie, lact. & similes. Pro præparatione materiæ fiat talis syr. cum morbus sit à bile affata.

Aqua.

R. syr. viol. & endiuæ simpl. ana ʒ. j. syr. de fumaria & bugloss. ana ʒ. ij. aquarum cichor. scariolæ, lupuli, bugloss. borrag. ana q. j. misce, fiat syrupus, qui aromatizetur cum ʒ. j. sandali albi, quia cinamomum esset calidius, vt & sandal. citrinum. Sunt commiscenda, quæ humores affatos respiciunt pro ratione temporis, ætatis, locorum, temperamenti, & symptomatum in maiori vel minori quantitate. Si magis ferociat biliosum temperamētum,

*In tempo.
bilioso quid
agendum.*

*In melan-
chol. quid.*

& tempus sit æstium, adsitque vigiliarum instantia, & bilis redundet in toto corpore, tunc oportet, vt quæ refrigerant, humectant, & increassant, superabundent. Sin autem humor melancholicus, tristitia, mœror, tempus autumnale, & temperamentum totum sit melancholicum, quæ melancholiam digerunt, & euacuunt, præpolere debent Purgandi cum decoctione myrobal. & epithymi, vel cum cath fortificato cum elect diaprun. sol. vel de succo ros. Myrob laudatur in hac affectione, quia laxant astringendo, atque ita impediunt vaporum ascensum ad caput. In processu autem purgantur cum pilu. de 5. generibus myrob. sine quibus, & tandem ad fortissima per media devenientes, cum pilulis de lapide lazuli, & indis, addita tertia parte rhabarba. Non tamen pilulas illas intelligimus de 5. generibus myrobal. quæ vulgò parantur ad morbos articulares, ob hermodact. admixtionem, qui magis nocerent, sed quæ poterunt fieri ex 5. generibus myrob. Syr. ros. lax. cum decoctione follic. senæ & epithymi, quæ laudantur pro principio multum, vel cum adsunt vigilæ. Quod si addantur gr. 2. vel 3. diagridij, cum opus est insigni euacuatione fiat efficacius medicamentum. Nam propter vigilas electuaria multum exiccantia, & pilulæ fortiores non competunt, sed syr. violatus eo tempore laudatur cum decoctione fructuum, addita manna vel cath. Quod si addas 3. i. diasenæ, vel diamannę in processu, multam proficies. Pro principio igitur fiat talis purgatio.

Purgatio pro principio.

R. prunorum, pass. sebest ana N. xx. florum cordana p. j. rosar. recen. si reperiantur (nam recentes addunt vim purgatoriam) p. 2. summitatum thymi vel epith. polypod. vel senæ vnc i fiat decoctio in qr. j. col. dissol. tamarindorum elect vnc. ss. syr. viol. vnc. i. vel, vt magis purget, syr. ros. lax. vnc. 2. maxime quando non reperiuntur rosæ recentes. Vbi ponitur syru. viola. possunt addi grana 2. diagridij, & tantundem macis, vel mastich. si timeatur noxa ventriculi, & habebit parem vim cum syrup. ros. lax. In eadem decoctione potes addere cass. fistulæ extractæ 3. vj. diapru. solutiui, vel elect. de succo ros. vel oxylapathi (quod maxime proprium est

est purgandæ bili) 3. j. pro diuitibus possumus addere infusionem 3. j. rhab. Pro pauperibus autem additur syr. ros. laxatiuus, vel myrobal. citrini in infusione, vel in decoctione ad 3. ij. vel iij. fiat decoctio ex myrobal. maximè laudanda hoc modo.

R. gly. ras. 3. ij. pass. prun. sebest. ana N. xx. quatuor sem. frigidorum maiorum an. 3. j. florum anthos vel stechad. 3. j. trium florum cord. p. j. tamarindorum 3. j. myrobal. cytrini & indorum ana 3. ij. (si non ponat ir. rhab. vt si sit pauper, auge myrobal. ad 3. iij.) polypod. querc. seminis cuscute an. 3. vj. fiat decoctio in q. j. col. diss. cath. 3. iij. confect. hamech. 3. j. fiat potio. Additur gly. quia lenit asperitatem inductam à myrob. vt facilius fluat medicamentum. In forma pilul. fieri possunt sic.

R. omniũ myrob. 3. ss. epith. seminis cuscute; ocymi, flor. stech. an. 3. j. cinam. croci an. 3. ss. cum syr. ros. lax. fiant pil. vij. pro 3. cap. 3. j. pro dosi, in processu autẽ, vel post syr. digestiuum, possunt addi g. aliquot diagridij, vel si maioris vti maiori euacuatione, fiat sic.

R. mass. pil. sine quibus scrup. iij. cum aqua vel succo bugloss. vel cum vino, vel syr. viol. fiant pilulæ vij. Et hæ pilulæ erunt mediæ inter primas, & modò describendas. Nam pilulæ sine quibus purgant bilem sine molestia, & earum compositio est optimè confecta. Fortiores.

R. mass. pil. sine quibus, vel aureorum scrup. ij. inde vel de lapide lazuli scrup. j. fiant pilulæ vij. cum aqua bugloss. vel cum syr. viol. Erunt autem fortissimæ, si dentur tantum pilulæ inde. Sunt enim de robustissimis ob veratrum, lapidem lazuli. & colocynthid. Vel si dentur tantum pilulæ de lapide lazuli. Sed hæ sunt magis propriæ melancholiæ, quàm manie si per se sumantur, & non misceantur cum aliis respicientibus bilem, vel cum rhab. Quare si velis, vt magis propriæ fiant manie, adde rhab. scrup. j. vel scrup. ss. & fomentur cum syr. viol. vel ros. Supra caput conueniunt irrigationes frigida & humida, & ex ol. refrigerato, & humido. Pro principio laudatur oleum ros. postea additur ol. viol. vel de semine lact. oleum nenuph. vel de papauere, cum vigiliæ ægrum vexant. Additur & oleum amygd. dulcium,

sed hoc magis ad humectationem. Oleum de cucurbita optimum est. Summè autem frigidis non est vtendum, nisi cum cautela, quia spiritus congelant & reddunt immobiles. Oleū rosat. in omni morbo cum fluore, à quacunque materia laudatur in morbi principio. Irrigatur seu perfunditur caput lacte mulieris, præsertim puitosa, vel fiat decoctio ad capitis irrigationem hoc modo.

R. florum viol. p. ij. florum cham. meli. ros. nenuph. an. p. j. seminis lact. iij. seminis pap. albi ʒ. j. fiat decoctio. Quod si velis magis humectare, adde aliquot pedes & caput veruecis, & hordei mandati p. j. & hæc decoctio erit pro principio, & pro instantia vigiliarum: vel pro iis, qui post morbum acutum & vigilias diuturnas sine febre insaniunt. In processu & declinatione fieri potest sicut in phrenitide, Catelli dissecti apponuntur calidi supra caput, qui sua actuali caliditate, confortant caput. & digerunt sine exiccatione, vt etiam pulmones arietis. Vel fiat decoctio quæ vim habet digerendi cum quadam humectatione, vt hæc præscripta, si semen pap. & lactucæ auferas, & addas florum chamo. melil. stech. an. p. j. præter id quod ponebatur. Sic faciendum de vntionibus. Nam à principio potest fieri talis.

R. al. ros. & viol. ana ʒ. iij. misce, irrigetur pars anterior capitis, vel adde lactis mulieris ʒ. j. & fiat medium inter repellens, & digerens. Magis digerens fiet hoc modo.

R. ol. viol. ʒ. iij. olei amygd. dulc. & lactis mulieris & ol. chamom. ana ʒ. ij. misce, fiat capitis inunctio. Oleum cham. digerit sine attractione & roborat caput. In vera declinatione ad corroborationem cerebri, potest fieri, *Cucussa.* cucussa ex astringentibus, & aromaticis, vt dictum cap. de phrenit. & de dolore capitis à pituita. Laudantur etiam *Cauteria.* cauteria, vt id, quod est congestum in capite, euacuetur, & fieri debent supra commissuram coronalem. Aliquando hic morbus fit propter multitudinem sanguinis, & tunc competit missio sanguinis ad magnam quantitatem. Clyster etiam & inunctio illa repellens primò conueniunt, vt fumi repellatur, & vapores, qui mittuntur ad caput. Si fiat à crapula, ieiunet, postea detur clyster. Si perseveret, mittatur sanguis, sed primum & statim

statim post clysterem, irrigatur prima illa inunctione, cui si addas succum hederæ, vel caulii, fiet medicamentum proprium huic causæ, nepe ebrietati. Quod si ventriculus sit adhuc plenus vino & crapula, prouocetur vomitus ante clysterem, & sanguinis missionem.

De Mania Cap. alterum.

Mania est insania absque febre. Differt autem, vt Gal. testatur, à phrenitide, quod sine febre fiat: à melancholia, quod sine metu, & tristitia accadat, sed cū audacia, multiloquio, saltu, agitatione corporis inordinata, oculorum frequenti motu, cum aspectu toruo, intrepido & inuerecundo. Differt præterea & à melancholia, materia ipsa. Melancholia enim ab humore frigido, vt Galenus vult, & vt sympto. indicant: mania verò ob tenuium & biliosorum humorum euenit malignitatem. Est autem duplex. Alia ex humorum naturalium, alia ex non naturalium adustione. Quare duas constituit differentias generales, quæ sub se innumerabiles differentias pro corporum affectuum differentia continent. Si ergo à sanguine bilioso affato, vel à sanguine melancholico, aut melacholiæ permisto fiat: caninam efficiet maniam. Ea correpti rixantur, multum loquuntur, agitantur. Verum propter sanguinem, frequenter rident, & aliquando obediunt, sed statim redeunt ad insaniam. Aliquando ita stant, vt ad se rediisse videantur. Verum leui occasione ad pristinam insaniam statim redeunt, mordent adstantes, amicos afficiunt iniuriis, vulnerant & verberant. Si verò à melancholia adusta fiat, vel à sanguine melancholico adaffato, fit ferinus furor, deteriores euadunt, excitantur rabidi affectus, insaniunt aliquando cum studio, ita vt semper aliquid mali meditentur. Quare vincendi sunt, ne alicui noceant, aut sibi manus inferant, aut se præcipites dent. Aspectus horridos, & mores ferinos habet. Ob id lupinam Arabes cognominauerunt, & dæmonium lupinum, ad prioris generis differentiam, quod etiam dæmonium, sed caninum vocant, à moribus caninis.

CVRATIO.

Curatur hic affectus, vt phrenitis, quantum ad remedia vniuersalia. Sed non nihil interest in particulari

bus. Missio enim sanguinis facienda non est, quia & sine febre sit, & materia est per totam cerebri substantiam diffusa, & humor multum supra naturam sanguinis. Statim enim incandescit bilis illa assata & torrida, separata sanguinis humiditate. Iniiciantur clysteres, quales in phrenitide, qui attrahant & à capite euellant, sine magna calefactione. Fiat igitur hoc modo.

R. malux, bismalux, cicla, mercurialis ana M. j. borraginis M. iij. prunorum Pa. xx. quatuor seminum frigid. maiorum an. 3. ʒ. anisi 3. ij. florum buglossæ, viol. borraginis, chamomillæ ana p. j. fiat decoctio in iure capitis veruecis. & in tb. ʒ. dissol. mellis ros. & loch. de cassia ana 3. ij. ucci mercurialis, & cicla an. 3. j. ʒ. olei viol. 3. iij. misce, iniiciatur manè. Affigantur cucurbitulae collo sine scarificatione, & caput perfundatur sequenti medicamento.

R. olei violati 3. iij. olei de semine lactucæ 3. ij. ouorum fortiter agitatorum 3. j. Agitentur simul, & tempore applicationis, adde lactis muliebris 3. iij. Aut si videatur aliqua materia moueri ad cerebrum, oleum rosatum vel myrthinum addi poterit cum pauco aceto debili, ad repellendum. Hoc autem est faciendum potissimum, quando sunt euacuandi, ne ex materia à medicamentis agitata caput fumos recipiat. In purgatione, magis utendum est medicamentis humidis, quam resiccantibus, quales sunt syrupi præscripti ad melancholiam factam in homine bilioso. Vel prius concoquatur materia syrupis concoquentibus. Quod si à bilis vltione fiat, parari potest sequens syrupus.

R. syrupi violati 3. iij. syrup. endiuixæ simplic. & borraginis an. 3. j. aquarum lact. vel violarum, vel portulacæ, vel nenupharis tb. j. misce, cap. in quatuor matutinis, tertio quoque die iniiciatur clyster. Deinde detur bolus sequens.

R. cath. 3. ʒ. elect. de succo rosarum 3. iij. misce, fiat bolus, vel dissoluatur in aqua violarum, vel borrag. vel fumarix vel sic.

R. tripheræ persicæ 3. ʒ. confectio. hamech. 3. ij. dissol. in aqua bugloss. & capil. ven. adde syr. violati 3. ij. mixta exhibeantur, vel sic.

R. prur.

R. prunorum, sebestem, ana pa. x. quatuor seminum frigidorum maiorum ana 3. ij. anisi 3. j. senæ orientalis 3. ss. thamarindorum 3. j. florum violarum, buglossi. ana p. j. fiat decoctio. In q. j. dissol. syrupi rosati laxativi 3. iiij. cap. manè. In hoc modo myrobal. in decoctione ponendi sunt, quia laxant & effumationem prohibent. Confricandi sunt in succo rosarum, ut maiorem vim laxandi habeant. Non probo usum pilularum neque medicamentorum multum laxantium nisi cum decoctione humida. Hæc sunt, quæ in curatione maniae caninae convenire poterunt. Iisdem uti possumus in lupina, verum permiscenda sunt quæ atram bilem magis concoquant humectando, & humores adassatos euacuent, ut syrupi in melancholia præscripti, quales sunt de borragine, violatus cum decoctione vel aquis earundem herbarum.

R. syr. de borragine 3. iiij. syrupi violati vel de succo cucurbitæ 3. ij. aquæ buglossi. vel nenupharis, vel violarum tb. j. misce, capiat in quatuor dosibus. Syrupi compositi ut de fumaria, vel de thymo post concoctionem soli sunt accipiendi, quia leuiter purgant, vel ad purgationem corpus præparant, vel purgationem absolunt, si dentur cum decoctione laxante post usum medicamentorum laxantium. In multum melancholico ea omnia, quæ præscripta sunt ad melancholiam euacuationem, exceptis pilulis, dari poterunt, ut confectio. hamech, diacanthami cum catholico, vel cum decoctione epithymi, mercurialis, sambuci vel aliorum melancholiam laxantium, fiat syrupus in hunc modum.

R. confectionis hamech 3. ij. pulueris præscripti ex lapide armeno 3. j. dissolue in aquæ violarum sufficienti quantitate. Quibus adde syrupi de fumaria compositi, alias de thymo, de epithymo 3. j. succi rosarum iiij. fiat porio, vel,

R. glycyrrhizæ rasæ 3. j. corticis mediæ sambuci 3. ij. senæ orientalis 3. ss. prunorum, sebestem, passularum ana pa. x. anisi 3. ij. polypodij quercini recentis 3. ij. florum violarum p. j. myrobalan. citrinorum, indorum confricatorum cum oleo amygdalarum dulcium ana 3. j. ca-

marindorum ℥. ℞. vel ℥. j. summitatum thymi & epithymi ana ℥. ij. fiat decoctio. In quartario vno dissolue confectionis hamech ℥. ij. syrupi violati ℥. ℞. fiat potio. Residuo decoctionis adde syrupi rosati solutiui & de fumaria, compositi ana ℥. iij. fiat syrupus. Adde decoctioni sacch. quantum sufficit. Utatur hoc syrupo sexto quoque die, donec euacuatus erit sufficienter. Si vigiliis æger torqueatur, præscribantur potiones somnum conciliantes.

℞. syr. violati ℥. j. syr. de papauere ℥. ℞. aquæ violarum & lactucæ ana ℥. ij. misc. cap. cum ibit dormitum. In rabidis, & qui multum mouentur, stupefacientibus est vtendum. Quare maior quantitas syrupi de papauere est ponenda, vt

℞. syrupi de papauere ℥. ij. aquæ nenupharis, violarum, lactucæ ana ℥. j. misc. cap. sero. Ad eundem scopum parari poterunt embrochæ ex frigidis & humidis. Quibus & addi poterunt stupefacientia.

℞. lactuc. domestic, & agrest. violarum, sol. cucurbitulæ ana M. j. seminis cucurbitæ, lactucæ, papa. albi, melon ana ℥. flor. nenupharis & vio. an. p. j. fiat decoct. qua abluantur pedes & caput. Eadem partes perfundantur vel irrigentur oleis supra scriptis cap. de melancholia. Nam in ea, quæ sit in corpore bilioso, refrigerare & humectare oportet. Hic tantum addenda, quæ incompositas, & inordinatas motiones sistunt, quæq; stupefaciunt. Ob id capita papaueris, & cortic. mandragoræ addere debemus, vt & opium dissolutum in lacte naribus apponimus. In declinatione vt in phrenitide aliqua digressione addenda. Quare irrogationes humidis flores chamemel. anthos, vel stechados addi poterunt, sic.

℞. flor. violarum, nenupharis ana p. iij. semin. coriandri ℥. j. quat. seminum frigidorum mai. ana ℥. ℞. flor. chamemeli p. ij. flor. thymi p. ℞. decoquantur in iure capitis veruecis, vel in iure pipionum integrorum vel hyrundin. tepidè applicentur supra caput, vel fiat pul. quo sinapisetur caput in declinatione vel cum nullus adest furor, vel cum bene dormiunt, vt

℞. coriandri ℥. ij. anisi ℥. ℞. grano. tinctorum ℥. ij. flor. violarum & chamomillæ ana ℥. ij. flor. anthos p. ℞. fiat

§. fiat pulvis quo sinapisetur caput serò, vel manè in iis qui non bene dormiunt non impediatur somnus. Abluendum est caput vino albo in quo decocti sunt flores violarum & chamemeli. Digerunt enim & cerebrū corroborant. Quod multò magis efficerent, si tertia pars olei rosati, vel cydonjorum, vel myrthillorum iis adderetur. Sed iis vtendum tantum in fine declinationis. Nutriantur eduliis humidis vt cremore hordei cum saccharo vel cum lacte capræ parato, vtatur etiam pulve ex farina hordei vel tritici æquis partibus decoctis cum iure galli, capi, vel pulli, vel gallinæ, vel hœdi, vel vituli, vel cum decocto pedum veruecis. Pisces saxatiles vel fluuiatiles his multum profunt, vt fructus horarij, vt cucurbitæ cucum. si cum carne decoquantur, lactucæ, pepones crudi, vt etiam poterunt pomis, pyris, prunis, vuis, cerasis aliisque laxantibus ventrem. Abstineant ab amygdalis, nucleis, pincis, dactylis, & aliis effumantibus ad caput. Contineantur in loco obscuro & hominū frequentiam deuient, nec cum multis colloquantur. Sunt qui verberibus cæsi, & in carcere detenti, & optima victus ratione vsi, curati sunt. Nihil est quod magis vel atræ vel flauæ bilis acrimoniam minuat, quàm cibi humectatio. Quare qui cibos respuunt & potum, in his malum hoc diutius prorogatur, vel rabidi intereunt.

De incubo.

CAP. XLIIII.

Eφιάλτης Græcis, incubus Latinis dicitur, & incubo ab incubando. Ob summam enim venarum plenitudinem, thoracis scilicet, quiddam nobis incumbere, & supra nos stare putamus, respirationem opprimens, & impediens ac vocem simul, ita vt suffocari in eo ægrotañtes videantur. Quare à Themisíone, vt Paulus testatur, πνιγμων à suffocando vocatur. Solet etiam post primum somnum, & non nisi in somno euenire, vel sentiri, ob id incubonem dici existimo. Cum enim dormimus, non tam liberè respiramus, quàm cum vigilamus. Atque inter dormiendum, vel in inchoata actione fumi & flatus eleuati pulmones, & septum premunt. Quare cum suspirio, & suffocationis timore, & motu difficili thoracis expergiscuntur. Oritur id vitij ex crapula pessima victus ratione, & à multitudine crassi sanguinis.

Curatio.

Ad eius curationem detur primum clyster discutiens flatus, & euacuans in paroxysmo. Si fiat à plenitudine, curata prius ventriculi cruditate, à sanguinis missione curatio est aspicienda. Vena autem basilica, vel mediana secanda est. Quòd si dum fluit sanguis, videatur tenuis, vel splendidus, statim supprimatur. Si verò crassus appareat, vacua tantum, quantum pro corporis habitu satis esse coniicies. Et quo securius fiat, trahatur quantitas sanguinis, quam concreescere sinamus, & si in eius parte superiore, multum pituitæ albæ appareat, à missione sanguinis abstinendum est, & medicamentis concoquentibus pituita est coquenda, & pilulis fortioribus euacuanda. Exhibeantur quoque opiata, quæ ad melancholiam veram sunt præscriptæ, minuta tamen quantitate humidorum, & aucta dosi discutiendum flatus.

Pul. discutiens flatus.

Vel detur pul. flatus discutiens, descriptus in dolore capitis, aut oculorum affectibus. Vel paratur ex anisi ℥. iij. arom. ros. ℥. ij. cinamom. mu. sacchar. cap. à pastu. Si in sanguine multum sit feri, purgetur, & minus vratur calidis & incidentibus, sed modicè resiccantibus. Si sanguis ater sit, dentur quæ ad curationem melanch. hypochondriæ instituta sunt, & præter illa, præscribatur sequens opiata.

Opiata.

℞. confer. ênulæ camp ℥. iij. cortic. citri conditi ℥. j. confect. aroma. rosa. ℥. ss. dianthos & diag. ana j. cum syr. capil. ven. fiat opiata, cap. ad quantitatem auellanae superbibendo parum vini. Vngatur pectus sequenti vnguento.

Vnct.

℞. olei anethi & chamø. ana ℥. iij. vini albi ℥. ij. agitentur & fiat inunctio, supraventriculum & thoracem. Fiat & sacculus, qui cordi applicetur sic.

Sacculus.

℞. cortic. citri sicci, galangæ, cyperi, ocymi, seminis citri ana ℥. ij. florû anthos stechad. bueloss. ana ℥. j. pul. diamarg. frigidi ℥. j. pul. de gemmæ ℥. ss. fiat sacculus interfusus ad formam scuti, qui irroratus aqua mellissæ, tepidè admoueatur cordi. Porro congruens est victus, ut parcè semper in cœna cibis sumatur, vel si fieri poterit, ab eo absteineat. Cibus sit boni succi, qui non inflet, nec flatus generet, faciliè coquatur, modicè zlas, nec vapores multos in caput mittat. Quare legumina vitanda

Victus ratio.

vitanda omnia, ut fructus oleosi, radices, quæ inflant, & non extenuant. Morbus hic si diu perseveret, & quotidie inuadat, in apoplexiam trāsit, præcipue si illa plenitudo ad caput vsque perueniat, sæpe melancholiam hypochondriacam sequitur. Dormiant in latus & non supini. Tunc enim iterum comprimit pulmones, vel thorax concidit, nec tam facile dilatur. Atque hæc de melancholiæ speciebus.

De amantibus.

CAP. XLV.

DE amantibus nihil nobis est dicendum, quia illi nullam curam sibi adhibere volunt. Tamen si sanguine abundant, vera secetur. Imperandus victus tenuis & alicuius rei studium. Qui enim amoris semper indulgent, his difficile potest abigi affectio. Si verò mens ad alias curas reuocetur, ab ea insania poterunt reuocari. Seminis redundantia & otium sunt causæ amoris insani, unde Ouidius, Quia si tollas, periere cupidinis artes. Quod si insaniant, curandi erunt, ut maniaci: si tristes, ut melancholici. A melancholicis autem medicamenta auferantur, quæ venerem excitare nata sunt, ut satyrium, & conferua eryngij, quibus utimur in affectu melancholico.

De ophthalmia.

CAP. XLVI.

INflammatiō coniunctivæ, quæ ophthalmia dicitur, alia vera est, alia non vera. Vera alia à sanguine, alia à bile, alia à pituita falsa, alia cum dolore capitis, alia sine eius dolore. Si cum dolore capitis fiat, primum oportet dolorem capitis sedare, postea ad curam inflammationis descendere, quia dolor fouet & auget cussam morbi. Fluorem enim excitat. Inflammatio curabitur hoc modo. Si fiat à sanguine, detrahatur à cephalica partis dolentis in magna quantitate, vel reiteretur quia simul & tollitur plethora, & fit diuersio, cum habeat consensum cephalica cum parte affecta. Aliquando enim sola sanguinis missione curatur ophthalmia. Apponantur cucurbitulæ cum scarificatione supra collū & spatulas. Detur clyster, vel ante sanguinis missionem, vel post statim. Clyster sit molliens cum quadam attractione, ut reuellat à capite, ut si ponantur indi maioris 3. iij. in clystere. His peractis non supra partem dolen-

Decubitus

Curatio

inflammat.

Missio

sanguinis.

Clyster.

tem, sed in circuitu oculi admoueatur medicamentum aliquod repellēs. Medicamenta repellentia confici possunt, vel ex oleis, vel ex succis herbarum, vel ex pulueribus incorporatis cum aceto, vel alio liquore frigido. Olea reiiciuntur, tanquam inimica huic affectioni, quia oculum offendūt, & partes aliquas habent calidas. Quare possunt & rarefacere, & disponere partem ad suscipiendum fluorem. Ob id ex succis, vel alio modo facere oportet. Ex succis repellens hoc modo fiet.

Repellēs.

℞. succi plantag. ℥b. j. intingantur panni, & supra partem affectam in circuitu ponantur. Vel succi solani, vitium, salicis, lactu. sumach, vel rhu. cariariorum. In summa quæcunque refrigerant, & leuem quandam astringitionem habent, sunt eligenda, vt est etiam acetosa. Alio modo potest fieri sic.

Repellēs.

℞. rosa. rubra. flor. nymph. & viol. ana ʒ. iij. sandal. omnium ana ʒ. iij. seminis pap. albi, corticis mali granati, sumach berber. ana ʒ. j. boli armeni, myrtil. ana ʒ. ss. fiat pul. subtiliss. qui incorporetur cum aceto & albumine oui, fiat ad formā vnguenti, applicetur supra frontem, tempora & partes vicinas. Incorporentur cum aceto ad penetrationem, & cum oui albumine, tum ad repellendum, tum ad vim emplasticam, vt melius adhæreat medicamentum. Supra oculum nulla in primis diebus debent addi fortiter repellētia, præsertim ante purgationem, vt sunt tro. albi Ras. cum opio, & omnia alia, quæ opium recipiunt. Sunt enim talia reiicienda propter opium, alioqui minimè. Si tamen dolor vehemens infestet, & morbus sit à bile, id non semper obseruatur.

Topici.

In principio.

In principio itaque ponatur supra oculum aqua cuspidum rosarum, vel aqua ros. vel albumē oui fortiter agitarum, vel lac mulieris pituitosæ. Minus tamen laudatur lac, quia citissimè acescit, & corrumpitur. Componuntur ex his medicamenta sic.

℞. aquæ ros. ʒ. iij. albuminis oui fortiter agitati ʒ. ij. lactis mulieris ʒ. j. vel,

℞. musc. seminis psilij, vel cydoniorum extra cum aqua ros. ʒ. iij. aquæ ros. ʒ. ij. albuminis oui ʒ. j. misce, vel fiat talis aqua.

℞. medullæ panis albi ʒ. iij. infundantur per noctem in qua

in aqua ros. Si hæc aqua in oculum instilletur, sedat do- *In incre-*
lorem, & compescit fluore, & aliquo modo digerit. Si ac- *mento,*
cedat incrementum, & aliquid saniei appareat, vel aliqua
pars materiæ cõiuncta sit, adde mucilag. scœnug. ʒ. ss. Va-
let quippe scœnug. in omni ferè morbi tempore, etiam in *Fœnum-*
principio ad doloris sedatione, siue decoctũ, siue mucigrac.
lago, ob moderatũ calore, quem habet & lentorem. Sed
maximè in declinatione, loco albuminis oui. Galen. lau-
dat in oculorum morbis medicamenta, quæ lentore ha-
bent, quia aspera maximè offendunt oculum, ob pluri-
mum sensum, quem habet. Potest etiam hoc modo fieri.
℞. tro. alborum Ras. sine opio ʒ. j. aquæ ros. vel verbe- *Collyriũ.*
næ ʒ. iij. fiat collyr. addendo albuminis oui fortiter agita-
ri ʒ. j. Post vsum istorum aliqua digerẽtia sunt illis admi-
scenda, vt si aquam aliquam misceamus superioribus, vel
mucilag. scœnug. aut eius decoctum, vel chamo. vel meli-
loti. Nam hæc omnia digerũt sine magna attrectatione.
Cauendum autem à nimium calidis. Nam quæ multum
calidæ sunt, plus attrahunt, quàm digerunt, vbi præser-
tim est plenitudo, vel fiat sic collyrium.

℞. seminis scœnug. mundati à pul. & abluti semel tantũ *Aliud.*
in aqua frigida ʒ. ij. fiat decoctio, & in decoctione adde al-
buminis oui fortiter agitati ʒ. ij. misce. Abluitur scœnug.
ob pul. à quo oculus exasperatur. Sed melius est, vt excu- *Quo para-*
tiatur per cribrum, & fricetur panno, & tandem ad ma-
iorem mundiciem lauetur in aqua frigida semel tantũ,
ne ob multam lotionem amittat vim digerendi, quæ est
in superficie.

℞. florum chamo. melil. ana ʒ. j. fiat decoctio in aqua *Aliud.*
ros. ne sit tantum digerens. In q. j. decoctionis adde sar-
cocollæ nutritæ in lacte mulieris ʒ. j. ss. vel ruthiæ præ-
paratæ ʒ. j. vel ex ambobus simul, misce, fiat collyrium.
Albumen oui addere oportet, sed in minori quantitate, *Albumen*
quum in primis collyriis, quibus utebamur in morbi *oui.*
principio. Nam in collyriis digerentibus additur tan-
tum, vt vim aliorum medicamentorum sua viscositate
retineat supra partem effectam, quæ rotunda est, vbi nõ
facile medicamenta retinentur, in aliis collyriis additur
pro principio, vt repellat, & asperitatem oculorum re- *Sarcocol-*
paret. Sarcocolla digerit sine morsu, & attractione. In la.

*In statu.**Digerentia.**Repellentia.*

lacte mulieris nutritur, ut amittat quicquid acrimonie habet. Parua autem quantitas nutritionis addenda, ut statim absumatur. Periculum enim esset, ne antequam maior quantitas absumeretur, acresceret, atque oculum læderet. Accedente statu ad digerentia magis declinare oportet. Talia erunt supradicta, ut scenug. chamo. mel. flores, sarcocolla, tuthia, aloe, crocus, succus vel aqua scenic. rutæ & chelidonij, euphras. Decoctio fiat tantum in aqua frigida. & non in aqua ros. Rosæ etiam omittantur, vel addatur succus, vel aqua prædictarum herbarum, ut in declinatione additur aloe, ad digestionem materiæ. Additur & crocus, tum ad digestionem, tum ad doloris sedationem. Fiunt decoctiones & fumum recipiunt. Sed hoc magis fit ad materiæ præparationem, quam ad euacuationem, ut in suffusione. Hæc remedia sunt magis propria & determinata materiæ & causis, addendo vel minuendo, quæ posita sunt, vel addendo alia, quæ propria sunt, vel quæ respiciunt humorem, vel ob symptoma, quod quidem peruertit curationem. Ut ad doloris sedationem digerentibus supra dictis pro ophthalmia à bile dicta, debet recipere troc. albos Ras. cum opio, vel in decoctionibus semen pap. augeri debet, vel alia, quæ magis refrigerant, adiungi, ut hyoscyami folia decocta cum paucis croco addi possunt, sed hoc in dolore fortissimo, & digerentia mitiora esse oportet, vel addere aliqua, quæ acrimoniam eorum minuant, ut flores viol. Et in digerentibus pro materia melancholica, sunt, qui addunt in decoctionibus epithymum, quod mihi videtur ad acrimoniam magis, quam ad necessitatem. Laudarem porius in hoc casu, quæ humectant, ut materia præparetur ad concoctionem.

*Ophthalmia à bile.**Anodynū præstantiss.*

Pro ophthalmia à bile vel cum dolor est fortissimus à quacunque causa, paratur hoc modo medicamentum anodynum præstantissimum.

R. poma dulcia & decoquantur sub cineribus & ponantur supra oculum loco cataplasmati. Si decoquantur cum aqua ros. ubi maior est intentio repellendi, medicamentum est efficacius, & minorem habet crassitiem. Sed ob id minus calfacit, quam quod crassiores habet consisten-

Consistentiam, idque per accidens. Si autem ob doloris mitigationem, decoquatur in lacte mulieris pituitosa, adde camphoræ ℥. ij. in ℥. j. pomorum. Quod si tanta caliditas non sit, à qua excitetur dolor, sed potius plenitudo, aut flatus, adde croci ℥. ij. simul cum camphora. Sed non sufficit mittere sanguinem, quin euacuare oportet ichores sanguinis, vel materiam melancholicam, biliosam, vel pituitosam concoquere & euacuare. Purgatur sanguis nulla expectata coctione, huiusmodi decocto.

R. prunorum, sebesten. ana M. xx. florum cord. ana p. j. *Purgatio*
 quatuor semin. frigid. ma ana 3. j. myrob. citri & tama *sanguinis.*
 rind. ana 3. ℔. fiat decoctio. In q. j. col. adde syr. ros. lax.
 3. ij. fiat potio. Adduntur myrob. quia vim habent obtundendi acrimoniam, & purgandi bilem, & ichores sanguinis. Pro diuitibus addi potest 3. j. shabarb. sed minuaturs dosis syr. ros. lax. vel adde syr. viol. pro ros. Si hic nō reperiatur, adde 3. j. vel ij. adde g. ij. vel iij. diagridij, & mastiches tantundem. Potest etiam purgari cura electario de succo ros. diaprunis simpl. vel solu. vel cath. Respuentibus medicamentum datur syr. viol. cum gr. aliquor dragridij in aqua hord. vel decoctione prunorum, descripta cap. de dolore capitis à sanguine. Si fiat à bile, non tanta trahatur sanguinis copia, sed alteratio & vacuatio maiores sunt. Concoquatur materia concoquentibus materiam biliosam, sed non omnibus. Nam quoties morbus est cum fluore, syr. bilem concoquentes cum facultate illa aperiendi, non sunt exhibendi, sed potius incrassantes, & prohibentes fluxum humorum subtilium. Hoc est commune præceptum in *Commune*
 omni morbo ex bilis confluxu, ut potius compescatur *præcept. ii.*
 eius fluor. & incrassetur bilis. Optimus igitur erit syr. *Syrup. in-*
 ros. de ros. siccis, syr. nenuph. viol. myrrhin. de berbe- *crassantes*
 ris. de granatis, de aërosa, de agresta, de acetositate ci- *bilem.*
 tri, & similes. Aquæ autem optimæ erunt, quæ habent *Aquæ.*
 similem facultatem, ut aqua solani, plantag. verbenæ, ros. lupul. cichor. & end. Nam si syr. incrassantibus misceantur, non tantum vim aperiendi habent, ut nocere possint. Inter illa, quæ refrigerant sine apertione, sunt quædam, quæ tota substantia acumen v. s. minuant,

vel aqua lact. Ob id omittenda sunt. Componatur autem hoc modo syr.

Syrupus.

℞. syr. vio. 3. iij. aquæ plantag. ros. euphras. vel verbenæ (nam semper admiscenda sunt ea, quæ partem affectam respiciunt, vel quæ magis destinata sunt parti affectæ, vel ipsi affectui) ana q. j. misce pro iij. dosibus.

℞. elect. diatrag. frig. vel diamar. frig. tab. j. pro dosi. Syr. viol. est eligendus in prima dosi, quia lenit aluum. Illa autem, quæ ventrem astringunt, non sumantur, nisi cum venter facile fluit, vel post aliquam ventris lenitionem, & materiæ aliquam diminutionem, vt euacuatione facta, cum volumus adhuc alterare, commodè adhibentur astringentes. Purgetur cum elect. aliquo purgante bilem, vel cum syr. aliquo lax. qualis est ros. & viol. fit laxatiuus cum g. iij. diagridij. Illa etiam, quæ fuere præscripta superius, sed aucta dosi, vel accipiendo ea, quæ diagrid. recipiunt. Nam ea magis propria sunt ad bilem purgandam. Alia verò ad ventris lenitionem, vel ad ichores sanguinis.

Curatio

ophthalm.

à pituita

aut melā-

cholia.

Balnea

& meri-

potio.

Si fiat ophthalmia à pituita, vel melancholia, eo modo procedere oportet, quo demonstratum est cap. de dolore capitis facto à simili materia, nisi quod mitiora esse oportet remedia, quia morbus hic est cum flore. Vel curabitur curatione ophthalmiæ non veræ. Balneà in declinatione cuiusque ophthal. laudatur, & meripotiones, sed non à principio, quia materiam dissoluant, sicut nec in aliis morbis comperunt, nisi sub finem, quia exagitant materiam nondum euacuatam, & liquefaciunt humores, fiuntque aptiores ad fluendum. Quare post euacuationes, tantum illis vtetur.

De ophthalmia non vera. CAP. XLVII.

NON vera ophthalmia magna ex parte prouenit à causis procatarticis. Curatur variis modis, & in hoc omnes curæ conueniunt, quod semper causam auferre conuenit, vt si à nimia portione proueniat, abstineant à vino. Si ob radios solares, vel lunares. domise cōtineant, & contegant caput. Si propter esum cæparum, alliorum, erucæ, aut sinapi (quia hæc sua acrimonia fluxiones ad oculos excitant) abstineant ab iis omnibus. Si verò cum aliis causis aliqua materia capite cōtineatur, adhi-

adhibeantur cucurbitulæ cum scarificatione frequenter *Cucurb.
phlebor.*
supra ceruicem & spatulas. Fiat sanguinis missio, si pau-
ca sit quantitas materiæ, de vena quæ est inter spatulas.
Confert enim & in dolore capitis cum est in anteriore
eius parte, & in oculorum affectibus, quia diuertitur
humorum fluxus. Præscribantur pilulæ aliquæ ex iis *Pilula.*
quæ Myrobal. recipiunt, addendo aliquid cochiarum.
Myrobal. competunt in omni morbo, in quo necessaria
est restrictio, quicumque sit ab influxu materiæ, maximè
si sit materia subtilis: sicut contrà fugienda sunt quæ
vim habent aperiendi, fiant itaque hoc modo pilulæ.

℞. mass. pil. sine quibus, & cochiarum ana ʒ. ij. fiant
pilulæ vij. cum aqua fœn. euphras. vel chelidonij, cap.
post mediam noctem. Si pituita peccet, concoquatur *Syrup. co-
cog. pitui-
tam.*
cum melle rosato vel cum syru. aliq. mediocriter inci-
dente, addita aliqua parte syru. de stecha. Vt si fiat hoc
modo.

℞. mel. ros. col. ʒ. ij. syr. stech ʒ. ss. syr. de hyss. vel de
bizantijs ʒ. ij. aquarum fœn. euphras. verbenæ, chelidon.
an. q. r. j. misce pro 4 dosibus manè.

℞. elect. diatr. frig. vel diaprunis simpl. tab. j. pro dosi. *Purgatia
pituitam.*
Præscribantur pilulæ, vel potio purgans pituitam, vel
ex elect. indo maior vel de citro sol. & similibus, in de-
coctione capitali diss. Addatur in decoctione beto. vel
fœnic. vel euphras. vel verbenæ. Pilulæ si præscribantur,
sint superioribus fortiores, quales erunt cochia, aureæ,
lucis maiores & minores. Caueant à pilulis indis, & aliis
medicamentis, quæ veratrum recipiunt, siue sint pilulæ,
siue potiones, siue vomitoria: Nam veratrum est ocu-
lis inimicum. Fiant collyria & fementa ad mitigatio-
nem doloris, & ad materiæ digestionem. Mitigabi-
tur dolor, vt postea suo loco monstrabimus: quia vt
diuersæ sunt causæ doloris, ita diuersis modis sedandus
est. Vti possumus aliis collyrijs præscriptis, in quibus
opium non recipitur. Possunt fieri embrocationes, in
partibus circumuicinis cum succis præscriptis, vel cara-
plasmata seu emplastra præscripta. Potest fieri sequens
emplastrum, si materia sit admodum subtilis, & fluat
per venas exteriores, quo vt possumus, & in forrissimo
dolorè, & in suffusionibus, & in lachrymis inuoluta-

Collyria.

*Embro-
catio.*

riis, cuius scopus est, vt partim trahatur materia ad partem externam, quod facit pix, partim vt compescatur fluoꝝ astringentibus.

*Empla-
strum.*

R. picis, cort. thu. boli ar. ros. rub. siccarum, gallarum an. 3. j. seminis berberis, sumac, mastich. thur. an. 3. *℞.* spicæ nardi, opij. ana 3. j. incorporentur simul cum terebinth. fiat emplastrum quod apponatur circa tempora. Spica nardi ponitur, quia tenuitate partium facit alia penetrare. Opium vero ad fluoꝝ compescendos est efficacissimum. Emplastrum aliud.

*Spica nar-
di.*

*Opium
aliud.*

R. mastich. thur. hypocisthidos ladani ana 3. j. picis 3. ij. ol. lentisci parum, fiat emplastrum, & applicetur temporibus. Si materia sit frigida, vt in doloribus dentium, & aliis effluxionibus oculorum, potest fieri aliud emplastrum, addendo aliqua astringentia, vt,

Aliud.

R. picis naual. 3. *℞.* mastich. thur. myrrhæ ana 3. j. cypri, spicæ nardi, (chenanth. ros. ana 3. j. acaciæ, lycij an. 3. ij. fiat emplastrum incorporando cum terebinthina, & applicetur temporibus. Si non reperiatur lycium, ponatur in duplici quantitate acacia, & pro vera acacia possumus vri succo prunellorum communium, vt fit. Quod si velis meliorem efficere, fiet ex lentisco, vt docet Diosc. cap. de lentisco. Eadem ratione potest fieri lycium ex rhu obsoniorum, vulgò sumac, hoc modo. Rhu obsoniorum maceratum per triduum, tandem saepe decoquitur, & sumitur residentia, quam vltius decoquimus, donec incrassescat ad mell consistentiam Si superscriptum emplastrum non proffit, ne timeas adiungere opij 3. j. vel seminis pap. albi 3. Non vera ophthalmia fit aliquando propter ælium, statim, si timeatur nimia inflammatio, mittatur sanguis, vt sedetur dolor. Postea ad digestionem sanguinis illius ecchymosis factæ in oculo, instilletur sanguis columbæ, vel turturis calidus in oculo. Fit etiam hic morbus per consensum ventriculi. hoc est, quia ventriculus causam præbet aut morbum fouet. In his commendatur vomitus, modò excitari possit sine magna perturbatione. Nam motus vehementes materiam exagitant, & humores agitati facilius in partes imbecilliores fluunt. In omni ophthal. masticatoria & garga. post vniuersales purgationes conueniunt, caput purgia

Rhu.

*Ophthal-
mia ab
æli cura-
tio.*

*Per con-
sensum ve-
triculi cu-
ratio.*

*Mastica-
toria &
garg.*

non

non item. Nam nerui optici non longè à meatibus illis, *Ex & su nō*
 per quos euacuatur pituita, ortum ducunt. Ob id facile *caput-*
 materia traheretur ad oculos. Præterea caputpurgia *purg.*
 gis trahunt materiam ad partem anteriorem, & masti-
 catoria trahunt etiam ad posteriorem. Neque valeret
 obiectio, quod multi practici hoc iubeant, dicentes Ga-
 lenum ita fecisse in aliquibus oculorum affectibus. Qui-
 bus respondendum, id fieri leuiori quodam caputpur-
 gio, quod quidem habet tantum vim aperiendi nares,
 non autem trahendi pituitam à cerebro. Satiùs erit ita-
 que masticatorio pituitam extrahere.

De dolore oculorum. CAP. XLVIII.

Dolor oculorum, vt à multis variisque causis fit, di-
 uersis etiam modis curatur. Fit autem dolor à ple-
 nitudine, ab acrimonia humorum, & à flatu distribuen-
 te. Vel multæ causæ simul iunguntur, vt acrimonia cum
 plenitudine Si dolor fiat à plenitudine, nihil profunt to- *A pleni-*
 pica remedia, siue sint anodyna, siue repellètia, siue acri- *tudine.*
 moniam reprimentia. Nam quæ repellunt, ob plenitudi-
 nem nō possunt humores retrò pellere, & distentionem
 maiorem faciunt, ob idque dolorem potius augent. Di-
 gerentia magis attrahunt, quàm digerūt, & sic morbum
 etiam augent. Soluitur autem dolor sanguinis missio-
 ne, clystere attrahente. Deriuatur cucurbitulis applicatis
 supra spatulas, vel applicatione sanguisug. in fronte.

Si verò humor aliquis ob suam acrimoniam dolorem
 excitet, purg. pilulis aureis, cochiis, sine quibus, lucis &
 similibus, vel potionibus ex myrob. & tamarindis. Den- *Curatio*
 tur syr. cum aquis accommodatis ad extinctionem acri- *plenitudi-*
 moniæ humorum. Admoueantur topica remedia, & po- *nis.*
 nantur in circuitu oculi, quæ talem vim habent. Super *Curatio*
 oculum fiant fomentationes vel emplastra, vel collyr. ex *eius ab a-*
 is, quæ dolorē sedant. Si verò dolor fiat à flatibus, quan- *crimonia.*
 quam flatu non euacuantur medicamentis, sunt tamen *Curatio à*
 danda quæ pituitam euacuant Nam à pituita flatim ge- *flatibus.*
 nerantur. Partes in circuitu erunt calfacientibus & di-
 cutientibus flatu fouendæ, & topica supra oculū fient,
 ex mediocriter digerentibus, anodynis, & flatu discu-
 tientibus. Si causæ diuersæ concurrāt, admiscenda erunt
 medicamenta pro ratione causarum, Dolor à plenitudi-

Quibus se ne mitigandus erit fortis aquæ calidæ, quæ partes suæ
datur do- liditate moderatas relaxat, & aliquo modo euacuat, fa-
lor a ple- ctis prius, quæ oportet, fiat hæc fomentatio.

nitudine. R. flor. mal. viol. ros. an. ʒ. j. florum cham ʒ. ʒ. semi-
 nis lini, & fœnug. an. ʒ. iij. seminis pap. albi ʒ. j. fiat de-
Fomenta- co. ex qua foueatur oculus dolens. Applicetur in circui-
tio. tu aliquod medicamentum astringens, vt repellat hu-
 mores, qualia sunt descripta cap. de ophthalmia non ve-
 ra, vel fiat tale.

R. ros. rub. & flor. nenuph, ana ʒ. ij. seminis berber.
 sumach, corticis mali gra. sandal. rub. an. ʒ. ij. boli arme-
 ni ʒ. ʒ. pul. & incorpo. cum succo plantag. vel lactucæ,
 fol. vitis, vel salicis, vel myrthi. Addendo ol. rosarum,
 omphac. an. ʒ. ij. acetum parum, fiat ad formam vnguenti
 crassioris, & ponatur in circuitu oculi. Si dolor non re-
 mittatur, digerentia augeantur, vt semen fœnug. & cha-
 momillæ, fiat etiam sic collyrium.

Collyriū.

R. muscilag. seminis psilij, gum. traga. an. ʒ. j. tuthiæ
 præparatæ, sarcocollæ nutritæ in lacte mulieris an. ʒ. ij.
 aloes ʒ. ʒ. aquæ ros. ʒ. iij. alb. oui fortiter agitati ʒ. ij. cro-
 ci ʒ. ʒ. fiat collyr. Vel fiat tale cataplasma.

R. flor. pap. cornuti, & pap. albi an. quartam partem
 M j. florum cham ros. an. ʒ. j. fœnug. ʒ. ʒ. fiat decoctio &
 contundantur simul, addendo amyli ʒ. iij. croci ʒ. j. fiat
 ad formam cataplas. Quod si fortius velis medicamen-
 tum, & magis sedans dolorem sine periculo, adde vitel-
Quibus se los ouorum N. ij. Quod si aliqua albuminis pars rema-
datur ab neat, non erit peius remedium. Si autem ab humorum a-
acrimonia crimonia fiat dolor, fortioribus remediis vti oportet, vt
 tro. albo Ras. cum opio, & omnibus aliis collyriis, & re-
 mediis, quæ recipiunt opium, vt,

R. Pompholig. tuthiæ præparatæ, sarcocollæ nutritæ
 in lacte mulieris an. ʒ. ʒ. cerusæ lotæ ʒ. j. acaciæ, lycij, hy-
 pocist. gum. trag. semin. pap. albi an. ʒ. j. vel succi pap.
 cornuti ʒ. iij. croci ʒ. ʒ. (Vel loco sem. pap. albi, & succi
 pap. cornuti adde opij ʒ. ʒ.) formetur tro. cū illo succo,
 vel cum aqua ros. in qua maceratum sit traga. Cū vo-
 les vti, reducantur in tenuissimum pul. & misceatur hu-
 ius pul. ʒ. j. cum aquæ ros. ʒ. iij. & aquæ albuminis oui
 ʒ. ij. fiat collyrium. Alij trocisci.

℞. sarcocollæ nutritæ in lacte mulieris ʒ. v. camphoræ ʒ. j. opij ʒ. ʒ. amyli gum. tragac. an. ʒ. ij. croci gr. xij. fiant tro. cum aqua ros. & musci. feminis psilij, aut lini. Et hoc erit fortissimum remedium, in dolore fortissimo facto ab humorum acrimonia, si recipiatur in aqua *Quibus se-* verbenæ, vel ros. reducitur ad mediocritatem: & si reci-*datur à* piantur in decocto fœnug. vel cham. Si autem dolor fiat *flatibus.* à flatibus, fiat tale collyrium.

℞. fœnug. ʒ. j. florum cham. ʒ. ʒ. sem. fœn. ʒ. ij. cumini ʒ. j. pip. nigri ʒ. j. fiat decoct. cum tali decoctione irrigetur pars affecta & residentia dictæ decoct. contundatur, addendo farinæ hord. & fabarum an. ʒ. j. fiat ad formam cataplas. ponatur super partes vicinas. Vel fiat tale colly.

℞. aquæ fœnic. rutæ an. ʒ. ij. cumini subtiliss. pul. florum cham. an. ʒ. ʒ. ʒ. thur. croci, sarcocollæ an. ʒ. j. fiat pul. ut alcohol, & inde collyrium, quod ut parti adhæreat, adde muscil. fœnu. ʒ. ʒ. Istis mitigantibus dolorem addimus interdum magis astringentia, ut cum fluxionem sistere volumus, vel oculis debilibus robur addere. Aliquando abstergentia, ut sanies, vel humor alius abstergatur. Adduntur etiam concoctoria, ut thus, myrrha ad concoctionem materiæ. Adduntur in summa, quæcunque sunt necessaria dispositioni coniunctæ, ut si dolor sit cum vlcere, sedatur dolor, & admiscantur astringentia sine morfu. Si abstersum fuerit vlcus, consolidantia & exiccantia, ut in aliis vlceribus fit. Facta vniuersali purgatione fiat quod sequitur.

℞. spongiæ bedegaris ʒ. ij. boli armeni ʒ. ʒ. corticis mali granati, acatiæ, semi. berberis, coriandri an. ʒ. ij. opij ʒ. j. corticis thuris, mastiches, hypoc. an. ʒ. ʒ. cum cera rubra incorporentur. Fiat emplastrum. Apponatur temporibus, & retro aures, vel

℞. micæ panis ʒ. j. temperetur per noctem in ʒ. vj. aquæ rosarum, & ʒ. ij. peculi earundem. Distilla in oculum. Cum facta fuerit defluxio, & si aliquod vestigium rubrum appareat, vratur aqua sequenti.

℞. vitrioli albi ʒ. ʒ. diss. in ʒ. iij. aquæ suprâ dictæ. Instilletur in oculum.

℞. sanguinis draconis, tuthiæ præparatæ an. ʒ. j. opij ʒ. j. cum mucagine gammi tragacathi fiant troscisci, de

quibus capiat, & iniiciat in aquam cuspidum ros. & ex aqua abluat oculum, vel sic

R. trocisc. prædictorum ʒ j. pomi fortiter decocti & agitati in mortario ʒ j. misceantur simul, fiat in formam linimenti. Apponatur, cum ibit dormitum, supra palpebras. Si his remediis non cesset dolor, ad extremum remedium confugiendum, nempe ad vsum cauterij, vel ruptorij in parte postica capitis.

De Pterygio.

C A P. X L I X.

Pterygium videtur esse quod Arabes, Zebet, vocant, alij vngulam. Nihil aliud est, quam membrana genita supra adnatam ex maiori cantho. Oritur etiam ex minori, sed magis carnosæ est. Fit autem post ophthalmiam aut carbunculum palpebrarum, aut post aliquam solutionem continui, vt ob scabiem. Gignitur ex multitudine sanguinis, qui ex venis effluit, & panniculum generat. Ita possimus hanc affectionem dicere hypofarcosim in hac parte Curatur sanguinis detractione, tenui victu, resiccantibus & exedentibus medicamentis supra partem apposis, si sit minor affectus. Quod si membrana illa admodum magna, multumq; carnosæ & spissæ fuerit, non nisi incisione curatur. Ego sientes inhibeo, sanguinis missione, & tenui victu, atque incisione venarum, quæ in adnata apparent. Scindendæ autem sunt per transversum, ne rursus cohæreant, & sanguinem parti suppeditent. Si filo comprehendî possunt, accuruata, breuissimo tempore contabescit panniculus ille. Facit ad curationem pilulis frequenter corpus evacuari, idque ante cibum, vt non solum humoré, sed & aliquam partem alimenti subtrahant. Pilulæ de hiæra, de aromatibus, addito pauco ag. vel pilulæ assieret conuenient duabus horis ante pastum. Post primum somnum semel atque iterum pilulas cochias, vel alias, quæ colocynthidem, aut alia fortiter trahentia recipiunt, dare conueniet. Quod si quis ante harum pil. vsum, corpus fluxile facere voluerit, id præstabit syr. concoquentibus. pituitam crassam, vel melle anth. rosarum, vel scyl. syr. de stechade, syr. acetoso. Purgato bene corpore vtatur theriaca antiqua, quæ succos absomit. Idem præstat mythridentum, & aurea Alexandrina. Supra partem

*Syr. conco-
quent. pi-
tuitam.*

ponen-

ponenda sunt medicamenta in forma pul. Conficiuntur autem pul. ex erodentibus, vt ære, calchanto, atramento futorio, scammaris, calchitide. Sed hæc vrunt & dolorem maximum inferunt. Quare non sunt adhibenda, nisi cum mitioribus, alioqui prodesse non possumus. Ob id primò sacch. candum tritum diligentissimè erit apponendum, quia satis cōminuit sine morfu. Item omphacium cum mucilagine fœnug. positum in pauca quantitate potentissimè absument. Pul. argenti viui præcipitati idem efficit, sine magno dolore. Potentissimum & sine dolore est illud quod ex testis ouorum paratur. Macerantur in aceto diu, & postea in puluerem tenuissimum rediguntur, pul. inspergitur oculo. Lapis pumicis tenuissimè tritus absument, & ærugo æris vltà mitius erodit, quàm non vltà. Quod si his remediis non absumentur. nouacula aut forcipibus abscindenda erit. Ego in muliere, quæ carbunculum passa erat. 3. ij. carnis ab oculo detraxi, abscissione per multas vices.

De Phlyctenis.

CAP. L.

Phlyctenæ sunt propriè vesicæ parvæ aqua plenæ, quæ fiunt in omnibus partibus à seroso humore, sicutque similes bulis aquæ feruentis. Fiant in oculo supra corneam, quæ ex multis membranis composita est, & humor tenuis aquosusque abscedere facit, & tumorem præter naturam fieri. In principio cum fiunt, si cum rubore oculorum sint, mittendus est sanguis, cucurbitulis vt retrahatur materia.

Dandi syr. & medicamenta, quæ ichores, & tenues syr. humores, à quibus fiunt, euacuent. Vt syr. ros. lax. cum decocto mercur. ciclæ, vel brassicæ marinæ, aut aliis enumeratis cap. de alopecia, vel decocto carth. & folliculis senæ, prunorū, sebesten, tamarindorum. Clysteres aeres *Clyster.* deorsum humores trahentes vtilis sunt. Et quia phlyctenæ fiunt cum quodam affluxu, à principio vtile erit mucilaginem psilij, vel cydoniorum extractum cum aqua ros. vel myrthi, intra palpebras adhibere. Possunt & dolorem sedare, ardorem minuere, & repellere. Al- *Repellentia.* bumem oui idem præstat fortiter agitatum cum pauca aqua plantag. vel solatri, vel peculi ros. aut myrthi, quod

frequentissimè adhibeatur. Neque verentur practici opij portiunculam in lacte, vel in sapa dilutam, ad doloris sedationem cum paucis croco adhibere. Aut poma cocta diligentissimè contrita, aut mala cotonea, aut granata bene cocta, & confusa, quibus optimum est, ne nimiam asperitatem inducant, parum vnguenti ros. admiscere, & palpebris admoovere. Si repellentibus nō cedat materia, sed pustulæ perseuerent, ad digestionem, & resolutionem mucilago fœnug. supradictis est admiscenda, vel collyria sunt adhibenda, quæ vim habeant astringendi simul, & digerendi, qualia erunt, quæ ex lycio parabuntur vel quæ nunc parari possunt ex amurco, omphacio, & acacia: hæc enim omnia digerunt, cum quadam astrictione. Diluenda sunt aqua rosar. vel peculi rosar. vel myrthi, cum defluxionem pertimescimus, vel in aqua fœnic. vel rutæ, vel chelidonij, quando nulla est defluxionis suspicio. His vtendum, donec humor discutatur, vel cuticula disrumpatur, & in vlcus vertatur.

De Vlcerebus oculorum.

CAP. LI.

Vlcera fiunt circa oculos, vel in ipsis oculis, vt in cantho. Fit ægilops in cornea, quæ spissa est, & dilacerari potest. Vlcera accidunt, vt post phlyctenas à causa aliqua procatartica. vt à spina, frusto vitri, gladio, lapide & aliis incidentibus aut rumpentibus. Fiunt in adnata vel in cornea, vel in superficie, vel altè descendunt,

Curatio à causa procatartica. vt aliquando humores profluant. Si à causa procatartica, statim, quæ constringunt, adduntur, & ad præcautionem sanguinis mittitur, ne oboriatur inflammatio. Clysteres iniiciendi, collyr. paranda ex resiccantibus. Nam

cum recens sit vulnus, & pars multum sicca, oportet moliri consolidationem. Quare albumen oui fortiter agitatam, cum succo hyperici vulnus coalescere facit. Trocisci albi Ras. cum sarcocolla, & de thure sunt efficacissimi. His vtendum donec cicatrice obducatur pars. In fine additur tuthia, vel antimonium, cerusa, & alia quæ cicatricem inducere possunt. Si verò vlcus fiat post

Curatio à phlyctene. phlyctenem, detergendum est prius, deinde agglutinandum supradictis remediis.

Curatio

Curatio ab humoribus acribus.

Quòd si ab acribus humoribus factum fuerit, corpus ab acribus humoribus est repurgandum frequenter. Euacuabitur autem remediis præscriptis cap. de ophthalmia, vel tali opiata.

℞. mucil. feminis psil. integri ext. cum aqua viol. ʒ. ij. pulpæ tamarindorum, sebest. & prunorū ana ʒ. j. cass. nouiter extr. & cath. ana ʒ. ij. senæ oriental. & medullæ carth. ana ʒ. j. anisi & fœnic. ana ʒ. ij. gly. ras. ʒ. j. cum syr. ros. lax. fiat opiata, cap. ʒ. j. semel in hebdomada. Si non *Deterget.* velit in forma boli, dissoluat in decoctione mercur. vel sero lactis. Deterguntur autem hæc vlcera detergentibus sine morſu, vt decocto fœnug. addito sacch. aut melle, aut syr. ros. lax. vel syr. de ros. siccis, quæ sine magno morſu detergunt. His addimus & myrrham. Seruari debent hæc remedia in vase æneo, vt aliquid æruginis contrahant. Quòd si fortè dolor oriatur ob nimium sensum, aut medicamentorum acrimoniam, temperanda erunt mucilagine psilij, aut opij pauca quantitate, aut lac mulsum recens est iniiciendum. Sunt autem conficienda collyria in consistentia mellis vel palpebris apposita partem contingant. Amurca, omphacatia, lycium, hypocistis, & succus ex balauftijs, vel cytoniis paratur, quæ omnia detergunt & siccant, cum quadam astringitione, & digerunt. Alia collyria supra descripta, vtilissima erunt, vt tro. de thur. &c. & potissimum, quæ myrrham, sarcocollam, & aloen lotam recipiunt, vt si hoc modo fieret.

COLLYRIA.

℞. sarcocollæ nutritæ in aqua peculi ros. ʒ. j. myrrh. sacch. candi ana ʒ. ʒ. thur. aloes ana ʒ. ij. tenuissime triturentur, & cum vitello oui indurato, & diligentissime confuso, reducantur in formam vnguenti, addendo parum mellis, apponatur palpebris tantum. In processu additur tuthia diligentissime trita & lota, antimonium, vel cornua cerui, vel capræ vsta & lota ad siccandum sine morſu. Ad cicatricem inducendam ex iis tantum paratur.

℞. plumbi vsti & loti diligentiff. & pul. tenuiff. antimon. cerus. lotæ, cornu cerui vsti & loti, coralli rub.

ana 3.j. excipiantur melle, & fiat collyr. vel excipiantur mucilag. gummi trag. vel vitello oui affiato, & diligentiff. trito, addendo aliquid, quod lentorem habeat, ad retinendum, vt mucilago pſilij, aut gummi trag. Non eſt inutile oculos frequenter vino lauare, diluto aqua ſœnic. cū eſt detergendum, vel cum aqua peculi roſ. vel myrthi, quando inducenda eſt cicatrix, donec ad perfectam curationem ventum ſit. Hunc morbum ſequuntur ſymptomata, ſcilicet cicatrices, & albugines oculorum, de quibus iam agemus.

De cicatriciſu & albuginibus oculorum.

CAPVT LII.

Cicatrix à ſuffuſione facile diſtinguitur, quòd cicatrix ſemper alba & in parte externa apparear: ſuffuſio verò in parte interna. Cicatricem præceſſit vlcus, vel ophthalmia. Cicatrices non auferuntur in totum, ſed ſi pupillam occupet, exteruntur, ne viſionem impediant. Albugo autem cicatrix eſt denſior, quæ etiam in parte externa apparet. Quare oportet optimam victus rationem imperare, & aliquas euacuationes facere, non ad morbi curationem, ſed ne ad oculum fiat attractio medicamentiſ detergentibus, & minuentibus cicatrices. Habent enim omnia talia medicamenta morſum quendam, quibus ſi quis vtatur in corpore pleth. vel cacoch. frequentes inflammationes excitabit. Purgabitur autem pil. capitalibus, & maſſicatoriis. Aut ſi æger valde obnoxius ſit deſluxionibus oculorum, cucurbitulas in lateribus, & in occipitio apponemus, vel ruptorum in occipitio, vt reuocentur excrementa ad partem poſteriorem. Tunc nos tuto vti poſſumus prædictis medicamentiſ citra inflammationis periculum. Neq; ſtatim iſta ſunt apponenda cicatrice nondū perfecta, ne ea diſrumpatur. In principio ſufficere poſſunt ea, quæ ſunt præſcripta ad deterſionem vlceris, demum ad ſella eſt veniendum, tertio ad fortiora. Fel Ouranoſcopi, ſcorpionis, & paſtinacæ vtriuſque. Valet mirum in modum fel hirci, vel bouis: & auium rapacium, vt milui, aquilæ, & aliarum, ob tenuitatem valent. Sed quæ magnam admodum partium tenuitatem habent in ſuffuſione potius ſunt uſurpanda, quia affectus initio eſt. In albugine verò

Curatio.

In principio.

In albugine.

verò & cicatrice, cum affectus sit externus, satis possunt fella crassa, & potissimum si liquida sint, & melle excipiantur. Succi multarum herbarum ad hoc commendantur, & potissimum amararum, vel earum, quæ nitro- *Succi.* se sunt, ut chelidonijs succus, centaurij minoris, absynth. marrubij, item amurca. ompha. paratum in vase æneo. Succus anagallidos cæruleo flore cyclaminis, aristolochiæ, rutæ. Omnes hi succi, melle excepti palpebris adduntur, vel adduntur aliqua acida, & simul inspissantur. Arida, quæ multum abstergunt, sunt sacch. candum, os sepia, myrrha, spuma nitri, sal ammoniacum, stercus lacertæ, cornu cerui vstû, vel capræ. Ex his omnibus cōficiuntur collyria, ad consistentiam mellis, ut hoc modo.

R. ompha. præparati, ut à Diosc. monstratur, amurcæ *Collyr.* anaz. j. ossis sepia, stercoris lacerti, cornu cerui ana 3. j. s. mellis parum, incorporentur simul, & cum penicillo adhibeantur ei tantum parti palpebræ, quæ e regione est. Paratur etiam aqua ex melle, & herbis ad deterfionem oculorum, & visus obtenebrationem, ut,

R. mell. lb. j. rad. fœnic. & aristoloch. rotundæ, vel longæ ana lb. s. chelidoniæ, rutæ, summitatum fœnic. ana M. iij. flor. ros. recentium & centaurij minoris ana p. iij. macerentur simul in melle, addendo urinae pueri impubis lb. ij. idque in vase æneo per decem dies, agitando tantum quarto quoque die, & æruginem radendo & simul miscendo. Distillantur omnia simul, & aqua feruetur vsui. Radices inciduntur in taleolas. Vas æneum reponatur ad solem, vel in fimo. Hæc aqua, quia liquidissima est, & in canthos efflueret, ut alia liquida, ei dolorem faceret si adnatam contingeret, inspissanda est mucilagine, cum prædicta, aqua extracta, vel vitello oui, & mucilagine gum. trag. Adhibeatur e directo pupillæ tantum in palpebris, ut supra monstratum est.

De sugillatis.

C A P. LIII.

Sugillata dicuntur quando sanguis intra tunicas colligitur, vulgò maculam appellant, Græci verò *σφαιμα*. Est veluti effusio sanguinis extra vasa per tunicas oculi. Fit potissimum à causa externa, ut ictu, & apparet totus oculus sanguine perfusus, qui si refrigetur, & diu maneat, liuescit, & denigratur, quemadmodum

Curatio in aliis sugillatis. Si multus sit, in pus conuertitur, cum
princip. non possit discuti, ὑπόπυος facit, ob id & à nonnullis hæc
 affectio, ὑπόπυος dicta est. Curatur, vt alij ictus. In prin-
 cipio sanguinis missione, & deriuatione per cucurbitu-
 las in colli lateribus positas, & quibusdam leuiter repel-
 lentibus, vt plus sanguinis à vena rupta, aut contusa non
 effluat. Apponuntur illa, quæ vim habent leuiter re-
 pellendi, vt albumen oui, aqua peculi ros. & myrtil.

*Quid post
fluxū sãg.
faciend.*

Quod si post ictum Medicus vocetur, sanguisq; iam de-
 fluxerit priusquam omnino denigretur, probant sangui-
 nem columbarum turturū, & aliarum auium calidarum
 apponere, vt discutiatur, lac muliebre cum pauco thure,
 aut croco. Deinde ad fortiora digerētia veniendum est,
 vt ad mucilaginem scœnug. vel decoctum melil. vel cha-
 mo. & oculum fouere, ad humorū illum discutiendum,

*Fortiora
digerētia.*

In inuete id oportet frequenter apponere. In inueteratis autem
etatis quid valet aqua illa nostra distillata descripta in fine superio-
 ris cap. diluta cum vitello. oui, vel pomo putrefacto per-
 mixta. Raphanus supra corneam appositus discutiit, sed
 melius accommodatur succus eius melle exceptus. Myr-
 rha, omphacium, amurca, & fella auium in declinatione
 valent ad discutiendum. Non est inutile in hac causa de-
 coctum parare ex foliis scœnic. liliorum, & chelidonij,
 vel euphras. & seminis seseleos, & fumum illum, aut va-
 pore recipere, vel eadem decoctione partem fouere.
 Quæcunque dicta sunt ad resolutionem phlyctenarum,
 hic valere possunt, vel quæ ad suffusionem dicentur.

De pare sub cornea. C A P. LIIII.

SI autem sanguis suppuretur, dolorem facit in oculo,
 qui prius non erat, & oculus quodammodo inflam-
 matur. Mutatur color ille sanguinis in albedinem quan-
 dam. Ex his colligimus ὑπόπυος factum esse. Rarò fit sine
 præcedente contusione. Pulsatio etiam in oculo senti-
 tur cuius est pus sub cornea collectū. Rubor est in toto
 oculo, & dolor in partibus circumuicinis sentitur. Quia
 iam missus fuit sanguis, non videtur rursus hic trahen-
 dus, sed quia dolor ad partem attrahit, optimum erit
 sanguinem mittere, & cucurbitulas, vt prius, apponere,
 habita ratione ætatis, virium, &c. Sed non tanta quan-
 titas in hoc affectu trahitur, cum in effusione sanguinis

*Cura:io
à missio.
sang.*

per

per corneam iam est extractus, quàm si non fuisset extractus. Quia dolor vehementissimus est, sedandus primum erit lacte recens mulso, decocto fœnug. & lini. Si inflam- *Sedantia*
matio sentiatur magna, non erit absurdum aliquid viol. *dolorem.*
vel solani illis admiscere. Sedato utcūque dolore, & pure iam facto, ad leuiter discutientia veniendum est, vt mel, mucilaginem fœnug. cum paucis sacch. vel melle. Adde succum etiam fœnic. & alia digerentia supra enumerata. Si nulla ratione ob crassitiem expurgari possit, *Digerentia.*
dolorque magnus & vehemens perseueret, punctura curandus est affectus. Fieri enim non potest vt crassus ille humor totus discutiatur. Accidit interdum, vt resoluta maiori parte in loco inferiori colligatur, pupillam nihil aut parum obtenebrans. Tunc vtile est exsiccatibus exsiccare, quod reliquum est, & in ea parte relinquere. Punctura fieri debet in latere, quemadmodum in transpositione panniculi facti ex suffusione, vt frequenter acum immittendo, & extrahendo aliquid puris tandem euacuetur. Nec oportet nos esse tam sollicitos, vt totum pus extrahatur. Id enim fieri non posset citra euacuationem aquei humoris, qui non nisi in iuuenibus regeneratur. Id quod remanet, modò pupillam non impediat, exsicce-
tur. Vulnus factum curatur, vt diximus supra in cap. de vlceribus oculorum. Vtilissimum esset acum vacuum confingere, & suctu pus illud haurire. Acus cōfectio docetur sequenti cap.

De suffusione seu catarrha. CAP. LV.

Suffusio tres habet constitutiones. Nam in principio videtur tantum esse spiritus, vel effusio quædam quæ spiritus disgregat & obtenebrat, facitque vt muscas, & lucentia quædam corpora præ oculis obuersantia videat, literas cum legit, virides, aut alterius coloris esse iudicat. Tunc dicitur suffusionis principium esse, fitque ob ventriculi affectum, vel ob cerebri plenitudinem. Si à ventriculo fiat, id accidit per circuitus, & paroxysmos, secundum quod melius vel peius concoquant, augentur, vel minuuntur illi. Si ab affectibus ventriculi id fiat, procuranda est in ventriculo proba concoctio, quod fiet recrementa in eo collecta vacuando. Nam *Si à ventriculo. Vitis quid.*
sola intemperies nunquam id efficit, nisi caliditas ac-

*Euacuās.**Misſio ſan-
guinis.**Euacuan-
tia pitui-
tam.**Pilula.*

cedat, quæ in ſumum alimenta vertit. Euacuetur autem
vel pituita, vel bilis, idque mitioribus medicamentis, vt
ſi bilis fuerit, opiata iam præſcripta capite de vlceribus
oculorum, cui addendum erit rhabar. cum paucis eina-
momo. Valet etiam compositio illa triphera perſicæ,
cath. ſyrup. laxatiuus, cum decoctione ſollic. ſenæ, & fre-
quenter euacuari debent, vt bis in hebdomada, vt fre-
quenti illa euacuatione purgetur materia illa, quæ iden-
tidem generatur, & ſummi ad inferiora reuocentur. Quod
ſi quis mallet vt pilulis, conficiendæ erunt ex rhab. hie-
ra, & myrobal. citriniſ. Sed pilulæ magis conueniunt
in pituitoso affectu, aliæ medicamentorum formæ in
bilioſo. Nam pilulæ calfaciunt, & magis effumant. Si
appareant ſigna plenitudinis ſanguinis, mitti debet ex
cephalica. Ad pituitam euacuandam valet decoctum
agarici, aut infuſio in aliqua parte folliculorum ſenæ,
pilulæ affaieret, & aliæ, quæ ex myrobal. parantur. Ga-
lenus hiera picra multos ſe curaffe etiam per epiſtolam
teſtatur. Sed pilulæ tales parandæ ſunt ſine croco &
myrrha, vel, vt ipſe docet, minuta eorum quantitate.
Nam iſta ad cerebrum effuniant. Pilulæ de aromat. ſunt
præſtantiffimæ, quibus vellem parum agar. adiungere
vel ſarcocollæ. Vtuntur frequenter pilulis. Nam qui
huic affectui obnoxij ſunt, ſerè ſemper aſtricta ſunt al-
uo. Ob id ſolicitanda eſt balanis, pilulis, vel elimentis
aluum ſollicitantibus, vt prunis, pomis, in bilioſis ſicis
conueniunt. Item in ſculis ex mercur. ciela, & aliis her-
bis aluum ſoluentibus. Bibant aquam, ſi fieri poteſt, ab-
ſtineantque ab omnibus oleaginoſis fructibus, auel-
lantis, amygdalis, pinearum nucleis. Hæc enim caput
tentant, ſummiſque replent. Legumina omnia fugienda
ſunt, & potiſſimum fabæ, & magis recentes, quàm ſiccæ.
Eſperata omnia & odorata nocent, frictiones in parti-
bus inferioribus faciendæ, nunquam in capite. Et quia
hæc affectio recipit ſumos, vel propter intemperaturam
calidam ſunt in capite, erit optimum in principio ro-
borare partem oxyrrhodino, & ſumos illos propellere,
& faciem frequenter abluere aqua frigida cum paucis
aceto, vel aqua roſ. vel myrthi. Frequenter pedes abluere
iuiuat. Supra oculos nollem in principio aliqua dige-
renuia.

rentia apponi, sed potius propellentia quedam cum leui deterfione, vel succum cichorei, plantag. vel acaciam, vel parum amurcæ dilutæ in aqua ros. vel omphacij tantillum. Si autem morbus hic processerit, vapor ille in aquam vertitur, & incipit apparere veluti nubes in parte interna. Ad aquam affectionem curandam vimur remediis suprascriptis, & collyria conficimus ex fellibus, & maiori quantitate amurcæ, vel omphacij, quibus addimus parum piperis vel myrrhæ, & in totum vitimur fortioribus digerentibus & discutientibus. Et quia fortioribus collyriis est vitendum ad discussionem, vitile erit raptorum, aut cauterium in occipito apponere ad reuellendum, ne fortiora hæc collyria inflammationem excitent. Temporibus etiam emplastra astringentia adhibenda, ad prohibendam fluxionem per venas illas externas. Proficit venam illam temporum incidere aliquibus, quanquam defluxio per interiores venas adhuc fiat. Si non curatur istis collyriis, vel aqua illa nostra mellis, descripta cap. de cicatricibus vel collyrio sequenti, in panniculum vertitur, & acu transponenda. Collyr. tale est.

Collyria

Raptorum

Emplastra

R. mucilag. sem. fenug. diligenter prius loti in aqua fœnis. & extractæ cum aqua mellis ʒ. iij. fellis Ouranoscopi, vel scorpionis marini, aut paltinacæ, aut drac. marini ʒ. ss. omphacij secundum artem parati ʒ. j. sacch. candi, stercoris laceri ana ʒ. j. piperis ʒ. vj. incorporentur simul, & reducantur ad consistentiam mellis, seruentur in vase æneo, applicetur palpebris in parua quantitate. Interdiu, si oboriatur inflammatio à prædicto remedio demulceatur lacte recenti, cōtinuet, donec in totum curatus fuerit. Solebāt antiqui punctura hunc affectum curare (ut patet ex introductorio Gale. lib. ita inscripto) qui docent hanc curationem fortuito inuentam fuisse, cum capra pateretur hunc affectum, & in aculeum incidisset. Perforata enim cornea effluxit aqua, & curata est. Si quis moliri voluerit hanc curandi rationem, eo modo, quo pus extrahitur, non erit omnino absurdum. Solent medici in istis affectionibus, pilulas fortiores imperare, vt cochias, lucis, maiores, & minores. Item compositiones illas exiccantes,

Ut theriacam antiquam, mythrid. Masticatoria & errhina conueniunt, sed magis masticatoria quàm errhina. Nam hæc magis ad oculos trahunt humores. Argumento est, quòd si acriora fuerint, lachrymas mouent. Adde quòd plus humoris euacuatur per masticatoria, & cum minori impetu, agitationeque, quam per errhina.

Mastica- Masticatoria parantur ex eubebis, pyretro, semine fœnic. mastiche, & aliis trahentibus p^r uitam, & non amar-
toria. ris. Præscribimus pulueres à pastu, vel condita. Pulue-

Pulueres. fiunt ex coriandro, fœniculo, aniso, & aliis, quorum for-
Condita. mulas complures lib. nostro de compositione medicâ. subiecimus. Condita faciunt ex cortice citri, & myrobalanis, sed ablui debent ista, & contundi, eisque addendum sacch. ros. tabularum, si per consensum ventriculi fiat: sin minus, sacch. aliud. Debent parari sine odoratis, ne caput tentent: aut eorum quantitas pauca admodum præscribi debet, ut

℞. cortic. citri & carniū cydoniorum ana ʒ. j. myrobal. emblicorum locorum in vino, & postea in aqua fœnic. N. j. (si pauper sit, hoc carere poterit) pul. coralli vsti & loti in aqua fœniculi vel beton. vel absynth. vel menthæ ʒ. ij. diarrhod. alb. ʒ. ss. vel cinamomi crassi ʒ. j. sacch. ad duplum omnium, fiat conditum, de quo cap. post cœnam. Conuenit admodum, quando per consensum ventriculi fit affectus iste. Quòd si fiat à cerebri humiditate nimia, vtilissimum erit parare puluerem ex cineribus viperarum, & cranij, semine fœnic. feseleos, vel cineris hyrundinum, ut hoc modo.

A nimia post cœnam. Conuenit admodum, quando per consensum ventriculi fit affectus iste. Quòd si fiat à cerebri
humidita humiditate nimia, vtilissimum erit parare puluerem ex
te cerebri cineribus viperarum, & cranij, semine fœnic. feseleos,
affectio. vel cineris hyrundinum, ut hoc modo.

℞. cineris hyrundinum, cranij hominis ana ʒ. ij. cineris viperarum ʒ. ss. anisi, fœnic. ana ʒ. ij. feseleos ʒ. ss. cinamomi crassi ʒ. j. ss. misce, fiat pul. cui adde sacch. candidum ad medium pul. Utantur post p^astum, vel manè, diluto cum aqua fœniculi, vel chelid. vel rutæ. &c. vel superbibendo prædictas aquas. Valet etiam in epilepsia, potissimum si apposueris parum cineris inuolucrorum testiculorum castorei. Potest etiam assumi tab. i. diagalangæ singulis matutinis, si fiat per consensum ventriculi, ut melior concoctio fiat vel diarrh. abb. vel triasand. Si tamen humor sit concretus, & in panniculum conuersus, non curatur, nisi sola chirurgia.

De suffusione ex prima dictatione.

Suffusio alia vera est, & à proprietate, alia non vera, *Duplex*
sed per consensum ventriculi facta, & vocatur à Galeno *Suffusio.*

symptoma simile suffusioni. Hæc suffusio facile curatur
à principio, cum adhuc nulla est firma dispositio in oculo,
sed tantum veluti apparent muscæ ob oculos, quam
se plerunque curasse per literas, exhibitione hieræ pic-
cræ, testatur Galen. 6. de locis aff. &c. Vera autem suffusio

non ita facile per hieram picram curatur. Non vera cu- *Quibus*
ratur vomitu in facile vomentibus, & frequenti purga- *curatur nō*
tione cum hiera, vel pilulis de arom. mastichinis, aliis *vera.*

ventriculo appropriatis Pilulæ de myrob. commendan-
tur, quia cum quadam astrictione purgant, & prohibent
fumos afferri ad caput à ventriculo. Corroboratur ven-

triculi concoctio elect. ros. nouellæ vel diag vel aro. ros.
cum aqua absynthij vel vino. A pastu datur pul. claudens *Pulu. à*
os ventriculi, & vetans fumos ad caput attolli, qualis est *pastu.*

ille, qui præscriptus est, in dolore capitis per consensum
ventriculi, vel hic sequens, qui erit magis proprius huic
affectioni.

℞. corian. præpar. vnicæ cooperturæ, anisi conditi a-
na 3. ℞. fœnic. 3. iij. (ratione partis affectæ) euphras. betō.
ana 3. ij. pul. diacydonit. sine speciebus, corall. rub. ana 3.
j. ℞. sacch. q. s. fiat pul. de quo capiat cochlearia duo post
suos pastus, nihil superbibendo. Puluis hic componitur
ex mediocriter astringentibus, & non multum refrige-
rantibus, ne coctio ventriculi lædatur. Scopus est, vt
claudatur os ventriculi, ne vapores ascendant ad cere-
brum, quem vsum præstat coriandrum. Nam quanuis *Coriano-*
dicitur nocere oculis, id de herba, non semine intelli- *drum.*

gendum est. Affigantur cucurbitulæ, sine scarificatione,
in parte posteriore colli ad diuersionem. Abluat oculos
manè aqua fœnic. vel euphras. vel rutæ, vel chelidonij. *Aqua ad-*
Quod si addatur mell. communis portioncula, vel mel. *oculos.*

ros. fellis vaccæ, efficacius erit. Potest confici tale medi-
camentum, quod præparandum est æstate, vt sit vsui to-
to anno, cum opus erit. Et facit ad conseruationem oculo-
rum, ad suffusiones leuiiores, & pro his, qui sunt obtu-
so visu.

℞. chelidonix, fœnic. verbenæ, rutæ ana m. j. mellis

ros.col. lb. ss. seminis rapæ contusi ʒ. ij. herbæ contundantur, & ponantur in sole, & quotidie agitentur. Post quadraginta dies exprimantur omnia. & succus expressus vsui reseruetur in vase æneo. Qui obrusè vident, addita aliqua portione aquæ ros. vel albuminis ouorum,

Si per proprietatem morbum.

vtantur. Nam in his, cum non sunt malè affecti oculi, debet obrundi acrimonia illorum medicamentorum. Si morbus fiat per proprietatem, vel per consensum, sed iam antiquus sit, & factus proprius oculorum, facienda est diuersis sanguinis missione, si sanguis abundet. Concoquendus & vacuandus humor peccans, & euacuatio sit frequens, sed leui medicamento, vt si pituita abundet in toto corpore, est concoquenda & euacuanda: vt monstratum est in dolore cap. à pituita, additis tamen syr. & aquis, quæ oculos respiciunt, & sumendo pilulas oculis determinatas. Si bilis vel melancholia vel alius humor permisceatur, concoquendus & euacuandus, vt diximus in dolore cap. à permixtis humoribus. Vtatur frequenter pilulis ante cibum sine custodia, vt sunt assieret, de hiera, de arom. addito agarico. Vtatur theriaca, vel mythridatio, cum aquis fœnic. euphras. vel rutæ.

Pilula.

Post syr digestiuos pilulæ convenient fortiores, vt sunt cochiz, sine quibus, de sarcocolla, lucis, maiores & minor. de myrobal. Quod si semel g aliquot castorei addantur, vt in epilepsia monstratum est, multum proderit. Formandæ sunt hæ pilulæ cum aquis aut succis herbarum oculis appropriatarum, vt fœnic. rutæ, chelid. verbenæ. Si per istas euacuationes diuersi humor ab oculis, admoveantur cucurbitulæ, circa colli partem posteriorem frequenter, aut in eadem parte applicetur cauterium actuale, vel potentiale, & maneat diu vlcus apertum. Vel retrò aures applicetur vesicatorium, quia propter venas maior est consensus cum oculis, quam cum occipite. Fiant masticatoria & gargar. ad euacuationem humoris. Postea veniendum est ad topica remedia, sed non nisi omnibus his peractis. Si morbus sit in principio adhuc, & tantum sit aqua, vel aqueus quidam vapor appareat, potest resiccantibus & digerentibus medicamentis curari, qualia sunt illa omnia & armata, & eiusmodi. Posset etiam curari manu, si componatur

Topica.

Digerentia in primo.

tale instrumentum. Fiat acus caua instar syringæ, & vt facilius dissecet corneam, & subingrediatur, paretur vt calamus scriptorius, mittatur intra vulnus, exactissime iungatur vulneri, nec aer attrahatur, & sugendo acum attrahat per eam ex oculo aquam. Præparandus est oculus, ac si cataracta coniuncta & firmata detrahenda esset. Præparare solent cursores ocularij, posito in ore cymino aut pipere, quod diu mastichet, & tandem sæpè insufflent in oculum, vt aer incalescat, & præparetur oculus. Qui sugit acum, debet cessare, vbi æger incipit videre, ne nimia suctione humores proprii oculorum turbentur, vel aliquid aquei humoris attrahatur. Apertio non in lateribus fieri debet, sed potiùs in parte interiori, quò facilius humor fluat, & trahatur. Medicamentis curari potest hoc modo. Primum foueatur pars sequenti decoctione, vt abstergatur cornea, & aliqua ex parte reddatur obsequenti, & mollior, vt

Præparatio oculi.

Fotus.

R. seminis scœnug. ʒ. ij. paleæ auenæ (confert enim à tota substantia) M. j. herbæ scœnic. vel seminis eiusdem, beton euphras. an. M. ʒ. rutæ tertiam partem M. j. si. deco. in fine cuius adde florùm chamo. meliss & follic. senæ ana ʒ. j. (Sena tam extra, quàm intra iuuat oculos) foueatur pars, vel fumum recipiat, aut vaporem. Postea fiat talis aqua.

Sena confert oculis.

R. mell. optimi lb. j. piper. ʒ. ij. distillantur in alambico vitreo, & aqua seruetur vsui, quæ iniiciatur in oculum pro necessitate. Hęc aqua pro pueris est, & delicatis, & laborare incipientibus hoc morbo, scilicet, suffusione. Fiat talis pul.

Aqua.

R. sacch. candi ʒ. j. piper. nigri ʒ. j. cumini ʒ. ʒ. sterco-
ris lacerti ʒ. j. misce, fiat pul. subtilissimus, mittatur in oculum. Fiat fortior hoc modo.

Pulvis.

R. fellis perdicis, vulturis, vel aquilæ, vel miluij, vel pagri piscis ʒ. ij. exsiccentur in furno, & redigantur in puluerem sacch. candi ʒ. j. piper. marchasitæ vstæ, & diligentissime lotæ, æris vsti & loti in aqua ros. ana ʒ. ʒ. fiat pul. subtilissimus, formentur tro. cum aqua ros. capiat ʒ. j. cum decoct. scœnic. & albuminis ouorum ʒ. j. vel cape tro. ʒ. j. & cum ʒ. ij. deco. sequentis, fiat collyrium.

Collyr.

R. fœnug. abluti, vt decet ꝓ. j. seminis fœnic. ꝓ. ij. florum chamo. meli. an. ꝓ. j. fiat decoct. in col. ꝓ. ij. diff. tro. descriptorum ꝓ. j. albuminis ouorum ꝓ. j. fiat collyr. Marchasita hoc modo comburitur. Primum confri- catur melle, & ponitur intravas figulinum, & vritur in furno. Vritur autem facilè. Nam multas partes habet i- gneas, & sulphureas, tandem extinguatur aut butyro, aut aqua aliqua, secundum intentionem nostram, vt in affectibus oculorum, aqua fœniculi, & similibus, aut a- qua ros. si timeas acrimoniam. Quod si à tro. fiat aci- monia, oculus fomentetur cum eadem decoctione, vt dolor mitigetur, & in oculum iniiciatur lac muliebre, vel aqua albuminis oui. Alij tro. pro collyrio fiunt hoc modo.

Collyr.

R. marchaf. vstæ & preparatæ, antimonij, etiam præpar. ana ꝓ. ss. sarcocollæ nutritæ in lacte mulieris ꝓ. j. thur. myrrhæ, croci ana ꝓ. ij. galbani ꝓ. j. fiat puluis subtilissimus, formentur tro. cum aqua ros. vel verbe- næ, addendo sacch. candi ꝓ. ss. vitrioli albi ꝓ. ij. seruetur vsui. Vfus erit, vel cum aqua ros. vel decocto fœnugr. & albumine ouorum, dosis est ꝓ. j. pro ꝓ. ij. aquæ eo- rum. Crocus ponitur, quia digerit & lenit dolorem. Pro pueris imbecillibusque vtemur melle, conseruis fellis vaccæ, vel bouis præparati, vt Dioscor. docet, cap. de felle. Hoc enim mel plurimum valet, tum in abster- gendo maculas oculorum & suffusiones, tum etiam in digerendo, est tamen ipso felle imbecillius. Nam mel acquirit acrimoniam, & vim abstergendi longè maio- rem, & fellis acrimonia retunditur ratione mellis. V- tendum est itaque felle ipso pro medicamento medio, & eiusmodi melle pro imbecilliore inter media. Con- seruatur fel in melle, hoc modo, Accipitur fel cum sua vesica, & optimè ligatur in collo suo, & inmergitur in aqua feruenti, & illic tenetur immersum per quartam partem vnus horæ, postea ponatur in vase vitreo se- mipleno melle communi optimo, & seruetur vsui. Ma- net enim cum humiditate sua, & non lapidescit, nec tam acre est, ac si siccaretur in sole, aut in camino iuxta ignem. Ad eosdem vsus fit etiam aqua fortissima hoc modo.

*Crocus.**Mel.**Fel.**Seruatur
felic.**R. mell.*

℞. mell. optimi lb. j. mellis conferuæ fellis prædicti, *Aqua for-*
 sacch. candian. 3. ij. fœnic. euphras. chelid. rutæ an. ℞. po-
 nantur simul in alambico vitreo, addendo piperis, myr-
 rhæ, croci an. 3. j. fiat sublimatio in balneo mariæ, vt
 decet. Aqua seruetur vsui. Hæc aqua per se mittitur in
 oculum. Quod si fortior sit, & lachrymas moueat, vel
 dolorem excitet, fiet mitior admistione mucilaginum
 seminis fœnug. simulque consistentiam acquireret, vel
 misceatur cum decocto eiusdem, vel albumine oui, cum
 timetur inflammatio. Vel extrahatur mucilago seminis
 phil. fœnug. & lini, vt aliquam consistentiam habeat, &
 ad formam vnguenti reducatur, ne medicamentum sit
 nimis liquidum, & defluat, vt, scilicet, tantum aquæ po-
 natur, quantum necesse est ad mucilaginum extractio-
 nem, vt si fiat hoc modo.)

℞. aquæ sublimationis præscriptæ 3. ij. fœnugr. 3. j.
 vel 3. ℞. extrahatur mucilago, vt artis est, quæ ponatur
 cum penicillo in palpebris, vel in tarso palpebrarum.
 Nam pars ea, quæ est cartilaginosa, minus est sensibilis, &
 medicamentum diutius remanet super partem affectâ,
 conuiuendo & nictando. Si consistentiam sufficientem
 non habeat, adde pinguedinis porci, vel gallinæ parum,
 vel cum pomata excipiat, vel cum vnguento ros. si pe-
 riculum imminet inflammationis, & ad formam vn-
 guenti reducatur, & applicetur palpebris, quod est fa-
 ciendum in omnibus remediis, & collyriis acribus præ-
 scriptis à Gal. Rasi, & aliis antiquis. Non sunt enim ta-
 lia acria oculis imponenda, sed palpebris tantum. Nam
 illa omnia habent morsum & acrimoniam, quæ oculus
 nō potest ferre ob *error me-* & plurimum sensum. Qua- *dicor.*
 re grauitè peccant, qui in oculos talia iniiciunt, vt quo-
 tidie vulgus Medicorum facit. Poterit etiam fieri se-
 quens remedium præstantissimum.

℞. la. di salini & rancidi in frustula dissecti lb. j. pone
 in vase æneo macerandum per 40. dies aut plures, si sit
 opus, in vrina pueri, donec vas rubigine exedatur inte-
 rius. Sit in loco aliquo calido, vt vrgente canicula in si- *Lardum*
 mo sepeliatur, & sit clausum vas illud diligentissimè. *salsum.*
 Post illud tempus abiicientur omnia, & ærugo radatur,
 vsui seruetur. Ponitur lardum in vase æneo, vt accipiat

vim acrem ab ære, & digerentem. Nam à vitreo aut terreo non reciperet. Sunt, qui æruginē sola vñ sunt, sed acior est, quàm vt oculus ferre possit, quàm ob causam addere oportet sacch. cādī partes quatuor, æruginis partem vnā, & cum mucilagine seminis fœnug. vel cum albumine qui applicetur supra partem. Quod si oboritur dolor, fiat, vt supra dictum est. Hæc remedia valent non solum ad suffusionem, sed ad maculas corneæ, pterygia, & superfluam carnem. Sed à mitioribus ad fortiora veniendum est per media. Pueris & aliis delicatis, mitissima oportet facere, & maximè in principio, postea facilius ferunt fortiora. Quam ob causam simplicia

*Ex quibus
collyr. me-
tallica.*

per classes sunt ponenda. Simplicia, ex quibus collyr. conficiuntur, sunt hæc, ex mineralibus pompholix, cadmia, spodium, quod vulgò tuthiam appellant, calchitis, id est, vitriolum Romanum vñtum, vitriolum album,

*Gummi.
Succi.*

flos æris, æs vñtum, aliqui addunt cornu cerui vñtum, quia exsiccatur, fella animalium. Ex gummi myrrha, sarcocolla, aloë, thus. Ex succis herbarum, chelidonix, euphras. rute, fœnic. verbenæ sacch. candum, mel, albumen oui, fœnugr. & eius mucilago, piper, cuminum, fœniculus, &c. Mitiora sunt mel, sacch. cand. myrrha abluta, thus, sarcocolla nutrita. Ex fellibus sunt mitiora fella piscium, vt pagri, anihias (vulgò cauthenam vocat) soleæ. Media sunt fella quadrupedum, inter quæ mitissimum est fel porci, vaccæ, capræ, tauri, hirci. Fella etiam piscium, mustellorum, quos vulgò catos vocant,

Fella.

canes, & vulpeculam. Ex auium fellibus, fel gallinæ mitissimum est. Media sunt, thus, myrrha, aloë, mel, confer. fellis tauri vel vaccæ. Fortissima ex fellibus sunt in summa omnia fella auium, & præsertim viuientium rapina, & animalium venenosorum, vt serpentium, viperæ, canis rabidi. Inter fella auium alia sunt aliis fortiora, vt fel perdicis fortius est, milui, & fel m'lu fortius, aquilæ aut vulturis. Fortissima sunt, flos æris, cadmia, & marchasita vñta, ex qua confici potest cadmia. Nam cadmiam naturalem nō habemus. Artificialis verò fit ex marchasita in furno vñta, vitriolum album, & romanum, æs vñtum. Ex succis herbarum fortissimi sunt

De aquis. succus chelidoni, rusæ. Aquæ etiam sunt per classes digerendæ

gerendæ, quarum alia miscetur collyriis ad sedationem doloris tantum, ut aqua ros. alia ad præcautionem, ne oboriatur inflammatio, ut aqua cuspidum ros. Aliæ, ut ad hærentiam præstent, ut aqua albuminis ouorum. lac. Aliæ digerunt simul, & dolorem leuant, ut decoctum fœnug. Et hæc commisceantur fortissimis remediis, ut reducantur ad mediocritatem. Sunt & compositiones quædam imbecilliores, quædam fortiores, & quædam fortissimæ. Mitiores sunt pulueres, ut pul. ex pipere, saccharo cando descriptus superius. Vel potest reduci ad formam vnguenti, si cum mucilag. fœnug. vel psilij incorporetur. Si timeatur abrosio cum penicillo applicetur palpebris oculorum, idque circa cartilagine. Media sunt, pul. ille citrinus à Rase compos. & aqua mell. cum pipere superius descripta. Fortissima sunt, pul. superior ex felle & marchasita, ære combusto, & aquæ conseruationis mellis, in quo sit seruatum fel. Imbecillum ex fortissimis erit decoctum Gaiaci vel elenij. Decoquatur Gaiacum in aqua oculis commoda, aut cum aqua rosarum si timeatur acrimonia. Mitissima remedia componuntur ex primis, addita magna quantitate albuminis ouorum vel decocto fœnug. & illa in oculum tuto imponi possunt. & citra inflammationis periculum. Media remedia, si intra oculum iniici debent, habent ad doloris sedationem decoctum fœnug. chamo. meli. Fortissima autem nunquam intra oculum sunt immittenda ob facultatem sensus, sed faciendum, ut supra positum est.

De compositionibus.

De pupilla dilatatione per diminutione. CAP. LVI.

MYdriasis dilatatio est pupillæ, quæ sensim, vel repente fit. Si repente à causâ quadam violenta, ut vulnere, fiat, tunc disrumpitur extremas rhagoidis, qua parte rugata est circa iridem. Hæc non curatur, sed sufficit, si vulnus sanetur. Tantum tentabimus in principio ne dilateretur magis fluxu copiosi sanguinis, sitque venæ sectione, derinatione, & medicamentis astringentibus, repellendæ & corroborando. Si sensim fiat, accidit à multis flatibus, vel humoribus intra oculum fluentibus. Quam ob causam frequenter sunt euacuandi, & discutiendi flatus, tum qui in toto corpore geniti sunt, tum

Si repente curatio.

Si sensim fiat curatio.

in oculo. Medicamentis topicis discutientibus addenda sunt aliqua astringentia, quæ parti robur addant, vt si fieret decoctum ad fœtum ex semine fœniculi, rutæ, anethi, his adderemus flores ros. rubi, myrthi, & hyperici, ad mediam partem aliorum: decoctio fieri potest in aqua peculi ros. vel myrthi, & addere vini albi quartam partem. Ista si fiant in dilatationis principio, illam prohibere possunt. Post hæc collyriū spissum fieri debet ex acacia, hypocisthide, cortice thuris, tuthia, sanguine draconis, inspissando cum pauco vino. Hoc poterit præcauere & curare. Sed si iam facta sit, nunquam vel difficillime in suum redibit statum, propterea quod pars illa rugatam suam contractionem amisit, ob distentionem internam. Et magna ex parte ægroti conqueruntur tantum, quando est facta, quia sine dolore fit. Diminutio pupillæ priori morbo contraria est, in qua pupilla plus iusto corrugatur, & angustior redditur ob phthisim, vt si humores minuantur, vel plus iusto exiccentur, propter aliquam causam exiccantem, & astringentem. Hic etiam morbus fit sensim, nisi quando vulnere aliqua pars albuginei humoris euacuata est. Tunc enim affatim contrahitur. Sed si à siccitate vel consumptione humoris fiat, nō potest longiori tempore fieri, & restitui, quod fiet bene alendo corpus & fouendo oculum aqua tepida, cui parum vini adiciatur. Sunt, qui velint addere emollientes herbas, vt bismaluum, sed quæ emolliunt, sunt valde oculis periculosa. Ego malle ex axungis & mucilagibus collyrium spissum facere, & palpebris adhibere, post aquæ tepidæ fotum, vel post receptionem

Collyrium. vaporis decocti violarum & chama. Collyrium parabitur, vel ex pomata, vel butyro recenti, vel axungia anatis, vel gallinæ, porci & similibus, vt

℞. pomatæ ʒ. j. mucilag. seminis lini extr. cum aqua viol. ʒ. iij. axungia anseris, vel anatis ʒ. ij. incorporentur simul, fiat ad formam linimenti, applicetur palpebris.

De visus debilitate C A P. LVII.

Debilitas visus à multis causis fit, & pro varietate causarum varia sunt remedia. Si sit debilitas visus post aliquam insignem euacuationem vel sanguinis, vel aliam quamlibet, tunc curare oportet, per restorantia humi-

humiditatem natiuam. Cùm enim prouenit ab inanitione, id accidit ob penuriam spirituum. Quare instaurandi sunt, quod ut fiat, plurima sanguinis generatio procuranda est. Ob id oportet eos optimis alimentis reficere, ut optimo vino, & aliis præsentaneis alimentis, quæ multum nutrant, & parum excrementi generent. Commendatur usus raparum, vel naporum, si decoquantur cum salvia, vel fœnic vel betonica, vel hyssopo. Nam *Rapæ in-* rapæ & napi creduntur tota substantia visum iuuare, *uant vi-* quibus adduntur flatus discutientia, ne obesse possint. *sum.* Vti possunt puluere sequenti post pastum & in introitu lecti. ut cùm cibi vaporibus, & fumis ad caput ferantur faciliè. Quæ enim dantur ob cerebrum, hac ratione sunt danda post pastum.

[R. fileris montani, euphras. ana 3. ij. nucis moscatæ, *puluis post* garyoph. macis ana 3. j. seminis anis seminis rapæ ana *pastum.* 3. ij. seminis fœnic. 3. ss. cinamomi 3. j. sacch. ros. tab. ad duplum fiat pulu. de quo cap. cochlear vnum in introitu lecti. Quod si timeatur nimia apertio, & attenuatio, adde corall. amborum ana 3. j. vel dyacitonitè sine speciebus 3. ss. cum corallis. Vel si ponatur per se, vel sine illis 3. j. coriand. vnica cooperturæ 3. ij. fiat pul. augetur dosi sacchari. Si in oculo sit causâ debilitationis *Debilis* illius, ut nimia siccitas, vnde cornea corrugatur, hume- *à siccitate.* ctetur totum corpus optimis alimentis, & fiant irrigationes supra totum caput, ut monstratum est cap. de dolore ca à melancholia. Et oculus humectatur cum lacte mulieris, vel foveatur cū decocto hordei mundati, addita sexta parte seminis lini. Vtuntur similiter puluere præcedente, sed optimū erit addere pinearū & amygdal. mundatarum ana 3. ss. & cum syr. cōseruationis myrob. reducere potes in formam opiatae cui adde pulueris nestaurantis humiditates 3. j. vel ij. vel pul. diatrag. 3. j. & hac opiata vtatur serò, loco pulueris. Vtatur manè hordeo mundato parato cum amygd. pineis & fisticis. Si au- *Ab humi-* tem ab humiditate fiat visus debilitas, vtantur iœdia, *ditate* & fugiant omnia humida. Vtantur fumigio communi *ment.* post purgationem totius corporis factam cum pilulis fœtidis, lucis, elephanginis, de agarico. Si materia viscida sit & crassa, & sit in capite, vel in toto corpore, con-

coquatur cum syr. de hyss. de stechade, cum aquis fœnic. saluiz, rutæ, & aliis propriis. Vtuntur semel in hebdomada ad exiccationem totius corporis, & capitis confortationē theriaca antiqua, vel mithrydatio, vel elect. diagalangæ cum aqua fœniculi. Masticatoriis, gargarismatis, caputpurgis, caputpurgetur. Vtuntur myrebal. condit. & zinziber. condito. A cœna edant frustum panis assi. Sed theriacalis est medicamentum præstantissimum, sed quia non paratur, neque bene parari potest, propter exemplaris deprauationem, vti potest serpens, abscisso capite & cauda, abiectis intestinis, omnibusque internis, & pelle. Vtatur in vase fictili, & cineres misceantur sequentibus aromatis, quæ non debent vti, quia per vstionem amitterent vim illam aromaticam, ob quam confortant & corroborant.

R. nucis moscatæ, garyoph. macis, cubeb. cinamomi, pip. longi & nigri ana 3. ij. ziozib. 3. j. cal. aro. galangæ, spicæ, schenanth. seminis fœnic. carui, cumini ana ʒ. j. misce. fiat pul. subtilissimus, cui misceatur cinerum supradictorum 3. vj. hoc pul. vtantur cum vino, vel aqua fœnic. & aliquando in iuseulis à ʒ. j. ad 3. j. semel, vel bis in hebdomada. Si velis addere mediam partem salis, vtantur pro sale. Pro topico remedio vtatur melle conferuæ illius fellis, & aqua mellis, vel succis præparatis sub diebus canicularibus cum aliqua aqua appropriata, vtatur pro collyrio. Ad conseruationem visus fit medicamentum præstantissimum hoc modo.

Topica.

Collyr. ad visus conseruationem.

R. tuthæ ablutæ cum vrina pueri, & rursus ter cum aqua fœnic 3. iij. coralli albi diligentissime contriti, mag non perforatarum ana 3. j. cornu cerui vsti, vel capræ, vel alterius animalis 3. & foliorum auri N. ij. fiat pul. subtilissimus, quo vtatur cum aqua fœnic. vel euphras. pro collyrio. Et hæc magis ad conseruationem, quam ad ablationem alicuius humoris, vel eiusdem exiccationem. Aliud collyrium.

Collyr. præstantiss.

R. humoris crystallini, vel pupillerum piscium, vel lupi, vel luci ana 3. j. vel lapidum repertorum in capite lupi, pagri, aselli, vel alterius piscis diligentissime contritorum 3. j. siteris montani, seminis fœnic. ana 3. ij. euphrasæ, rutæ, chelidon. ana 3. & caput hyrundinum vstorum

ſtorum 3. iij. loco lapidis capitis hyrundinum, fellis perdicis, & gallinæ, vel agni, vel hœdi 3. j. pulu. ſimul. Adde mellis roſati collati lb. ſ. vini albi parum. Ponatur ſimul in vaſe vitreo, agitentur quotidie, & remaneât in ſole, poſtea ſeruentur in vaſe æneo. Viſus erit cum mucilagine fœnugræci vel cum aqua aliqua oculis appropriata, idque in ægrotantibus ſuffuſione laborantibus: in ſanis autem, ponendo parum in palpebris, mane, & nocte cum aqua fœniculi, & rutæ abſtergendo. Poſſunt etiam fieri trociſci, cum aqua roſarum non addito melle. Poſſeſt fieri dragea ad omnem debilitatem viſus ſic.

R. pinearum in parua fruſta incifarum 3. ij. ſeminis anif. integri 3. j. ſ. ſeminis rapæ, vel napi 3. j. cooperian. tur ſacch. & fiat dragea, vel fiat pul. addendo ſacch. ad pondus omnium. Vtuntur à paſtu.

De Viſus obſcuritate.

CAP. LVIII.

Viſus obſcuritas à multis cauſſis fit Nam affectus vel eſt in oculis, vel in ſpiritibus. In oculis, vel in humoribus, vel in tunicis. In humoribus, vt in glaucedine, quia denſior eſt, non bene recipit ſpecies aut ſpiritus viſorios. Aut in cornea affectus eſt, aut propter morboſ ſuperius enumeratos, vt ob albuginem, vel cicatricem, aut ob rhagoidis dilatationem. His affectibus quomodo ſit occurrédum, ſuperius diximus. Quòd ſi ipla cornea ob tenebretur ob aliqué humoré receptum, vtile erit corpus euacuare, & vt collyriis detergentibus, deſcriptis cap. de ſuffuſione, & de oculi macula Propter ſpiritus viſorios ſit etiam *modiſſimis*, ratione quorum vel omnino nihil, aut parum vident. Si nihil prorſus videant, nulla apparente affectione in aliquibus oculi partibus, tunc dicimus fieri ab obſtructione meatuum, per quos ſpiritus viſorius ad oculos deſcendit, & illa curatur difficillimè, ſi antiquata fuerit. Vidimus aliquando puellam repente factam cæcam, cui iniectione clyſteris viſum ſtatim reſtituimus, præter expectationem. Quamobrem colligimus eam obſtructionem fieri, & à craſſis vaporibus, non ſolum ab humoribus. Quæ à craſſis ſit vaporibus, curatur laxatibus medicamentis, vt pilulis, opiatis.

Curatio ab humore.

*Obſtruccio duo-
bus modis.*

Nam hic affectus accidit magna ex parte iis, qui in al-

uo diutius excrementa retinent, vel qui malè conco-
quunt. Pilula de aromatibus, de hiera cum agarico, si-
ne croco, & myrrha conuenientissimæ erunt, & aliæ quæ
sine magna agitatione trahunt pituitam, quæ est ma-

*A crassis
Gaporibus
curatio.*

teria vaporum. Si autem à crassis humoribus, vel ob
vulnus illatum, & descendens in partes profundas ocu-
li, & neruum opticum, nullo pacto curantur. Si diutius
perdurauit visus obscuritas ob aliquam obstructionem,
non curatur, propterea quòd partes concidunt, cum
spiritus amplius non recipiunt, quæ cavitates postea
difficillimè dilatantur. Adde quòd spiritus illorum, qui
obstructionem patiuntur à crassis humoribus, crassi,
turbulentiores, & pauci sunt: ob id obscurius, & minùs

*A pauci-
tate spiri-
tuum cu-
ratio.*

vident. Si sine obstructione id fiat ob spirituum pauci-
tatem aut crassitiem, obscurè vident, vt post morbos
qui fuerunt cum magno fluore sanguinis, aut alui, aut
sudoris, & in senibus ob spirituum paucitatem, & in-
strumentorum siccitatem quæ ea corrugat. In tali caus-
sa oportet sanguinem restituere optima victus ratio-
ne, assumendo ea alimenta, quæ bene nutriunt, neque
corpus multitudine recrementorum replent. Inter illa
vinum aqua dilutum plurimum iuuat, si album & te-
nue fuerit, & caput non teniet. Optimum erit cinamo-
mum vel semen fœnic. alimentis admiscere, vt ptisanæ,
vel iusculis. Si autem à spirituum crassitie, tunc victu at-
tenuante vtendum erit, & alimentis attenuantibus, &
incidentibus: nec moliemur euacuationes magnas, quia
substantiam spirituum dissipant. Vtile erit vti decocto

*A crassi-
tie spirit.
curat.*

Apozema

tenuantium & incidentium, & leuiter detergentium,
quale hoc.

℞. radic. fœnic. ʒ. ij. rusci, aspar. ana ʒ. j. gly. ras. ʒ. ʒ.
radic. cyperi & galangæ maioris ana ʒ. iiij. puleg. orig.
summitatum fœnic. beto. ana M. j. seminis anis. fœnic.
seseli, rutæ ana ʒ. j. flor. anth. & stechad. ana p. j. fiat de-
coctio in lb. j. ʒ. diss. syr. acetos. simpl. ʒ. vj. mell. ros.
col. ʒ. iiij. misce, fiat syr. Aro. cum ʒ. ij. aro. ro. capiat in
sex matutinis post assumptionem ʒ. j. pilul. de hiera. Fi-
nitis syr. rursum capiat pilulas sequentes.

PILULÆ.

℞. pilul. de aromatibus ʒ. j. agar. ʒ. ij. cum
aqua

aqua fœnic. fiant pilulæ, capiat post mediam noctem. In crastinum masticer semen fœniculi, & cubearum. Sequentibus diebus capiat 3. j. confectiois arom. ros. vel diagalangæ. Deinde vtatur sæpe pulu. à nobis descripto capite de suffusione, qui ex viperis constat, vel paretur sic:

R. cineris hyrundinum & viperarum ana 3. j. tro. de *Pulu. v.* viperis 3. ss. fœnic. 3. vj. sesel. 3. ij. seminis carui macerati in aceto 3. j. cinam. 3. iij. galangæ 3. ij. piper. 3. j. sacch. candi ad medium, fiat pul. Vtatur, vt de alio dictum est. Frequenter abluere pedes, est saluberrimum, & maxime lixiuio. Aqua nostra ex melle descripta cap. 52. oculis imposita deterget, si quid esset virij in cornea. Illam aquam in corpus assumere, si non paretur in vase æneo, vtilissimum est, vt fiat hoc modo.

R. rad. fœnic. & cyperi ana 3. iij. summitatum fœnic. *Aqua pro* verbenæ, chelid. euphras. ana M. ij. ligni gaiaci 3. iij. *oculis.* florum anthos, & stechad. ana p. ij. centaurij minor. p. j. mell. tb. ij. vini albi tb. incidantur herbæ & radices, & macerentur per diem naturalem, distillentur, & aqua seruetur vsui, capiat 3. ij. manè, ieiuno ventriculo. Collyria facta ad suffusionem, vsui esse possunt, quæcunque detergant. Si ob obtenebrationem humorum fiat visus obscuritas, collyria detergentia, & quæ sunt præscripta ad dilatationem pupillæ à flatibus, hic erunt ex vsu. Hæc de visus obscuritate dicta sufficiant, quod ad præsens institutum attinet.

De Nyctalope.

C A P. LIX.

NYctalope est nocturna cæcitas, qua detenti vident interdium, noctu nihil, aut parum. Huius causa est eadem cum his, qui parum acutè vident ob crassos spiritus, vel crassitiem instrumentorum & tunicarum. Fit autem, quia pauca illa spirituum quantitas, non sufficit ad illuminandum oculum, alioqui crassum, aut nimia humiditate obtenebratum, quæ maior esse solet noctu, quàm interdium, ob lunæ influxum, quæ sub calore moderato humores liquefacit. Oculus etiam ex Aristotelis sententia aqueus est.

Id etiam experimur in hominibus eiusmodi, quod in nouilunio melius vident, & minus acutè in plenilunio

Spirituū crassities. Idem euenire videmus in equis quibusdā. Cum autem causa istius affectionis sit spirituum crassities, sanguis extenuandus, & incidendus syr. descripto superiore capite.

Plenitudo humorum Quod si plenitudo humorum adsit, purgandi sunt pilulis coctis, & aliis post materiæ præparationem Sanguis

Masticatoria. trahendus, si is videatur in capite redundare, ex venarum inflatione, cucurbitulæ etiam adhibendæ. Masticatoria

imperanda sunt ex pyretro, cubebis, semine fœnic. aut aliis à capite attrahentibus Errhina minùs conueniunt. Pilulis optimum est castoreum addere, & scammonium, vt Aetio placet, qui sequutus vestigia Galeni, pilulas ex ʒ. ss. scāmōnij, & ʒ. j. castorei, & ʒ. ss. salis gemmæ confecit, quamuis trahenda esset pituita. Scammonium enim per se trahit bilem, sed quoties pituitosis adduntur attenuantia, incidentia, vel liquefacientia biliosa, etiā pituitam purgant. Sed hæc pilulæ vehementiores sunt, quare optimum erit admiscere agaricum, vel pilulas de aromatibus ad molem augendam, & ventriculi robur. Et quia crassities tunicarum, & obtenebratio potest hunc affectum augere, aquam mellis imponimus, & alia medicamenta, quæ detergere possunt. Antiqui ferè omnes commendarunt iecur hircinum multis modis præparatum, primò assum, & cum sale comestum, vel faniæ, quæ excidit, dum affatur in veru, appositam oculis, vel nidorem oculis apertis exceptum. Hoc remedium imbecilius inuenio, nisi cum felle torreatur. Tunc enim illius sanies est efficacissima. Vel si fœniculi folia, vel rutæ, vel chelidonij affigantur. Loco eorum fiat fots ex decoctione sequenti.

Hircinum iecur ad oculos.

Folij.

R. chelid. rutæ an. M. ss. summitatum fœnic. M. j. feminis fœli & fœnug. an. ʒ. j. fiat decoctio in aqua & vino & fumum recipiat. Si rubedo in oculis appareat, vel eos lachrymantes habeat, quantitas vini minuatur, & ponatur plus aquæ, ne decoctum sua acrimonia proritet fluxionem. Vfus aquæ mellis descriptæ cap. de obscuritate visus, & omnia alia tum assumenda, tum admouenda huic affectui conueniunt.

De oculi exitu.

CAP. LX.

Oculi exitus duplex est, vel quando totus præcidit, vel quando ob vulnus illatum adnatæ, quæ oculum

lum intra retinet, excidit, & ob vulnus septimi musculi, qui vtrūque transuersus est, in inferiore parte situs, ossi alligatus in minore cantho, illa curatur, sanato vulnere. Si vero extrā promineat magis, quā secundum naturam, tunc dicitur oculi exitus, sitque propter vehementissimum conatum, & aeris suppressionem ad aliquid expellendum, vt mulieribus, cum difficulter pariunt, contingit, vt cum reddimus vrinam cum magna difficultate, excrementa alui admodum dura, vel cum vomitione difficile. Tunc enim expressione illa facta in cerebro, ob retentionem spiritus attracti ad extrā expellunt, potissimum ij, qui molles & laxas partes habent circa oculum. Quare ad eorum maturationem nihil aliud necessarium esse video, quā leuiter comprimendo ad intra eos reponere, astringentibus, resiccantibusque medicamentis vti, vt partes relaxatas intendere possint. Id fiet forū aquæ frigidæ, vel aquæ myrthi, vel peculi rosarum. Iis addi potest parua quantitas aceti, & clausis oculis supra palpebras, & supra supercilia pannos intinctos apponere, vel linimenta conficere ex astringentibus, quibus retinetur sanguis. Posset etiam apponi supra illas partes alumen dissolutum in aqua & sale, quæ citra morsum adnatam exsiccare possunt & contrahere, quia à pericranio fit, vnde & fronte, & aliis partibus continuis contractis, adnata contrahitur. Linimentum sequens id efficacissime præstare poterit.

Curatio.

Linimentum.

R. acaciæ, balaustiorum, myrti, cortic. mali granati, rad. bistortæ, gall. immaturarum ana 3. ij. boli ar. 3. ss. cortic. thur. croci ana 3. ss. ol. ros. & myrth. ana 3. ij. succi cotoneorum, & aceti ros. ana 3. j. incorpora simul, & reduce ad formam nutriti, applicetur supra frontem, & in genis. Fit etiam aliquando ob nimiam humiditatem, aut propter flatus. Quare si à nimia humiditate fiat, purgatio totius corporis, & cerebri primum erit necessaria, & cucurbitularum appositio in occipitio. Supra oculum topica remedia adhiberi poterunt. Quod si à flatibus fiat, erunt aliqua calida astringentia his admiscenda, quæ sunt piper longum, caryoph. cyper. & similia, quæ calfaciunt, & astringunt. Frigida omnia adhibeantur supra oculū, nisi in hac vltima causa. Nam illa oportet esse

A nimia humid. cur.

A flatibus curatio.

Calor tepidus laxat.

multum calida, quantum pars ferre poterit, quia tepidus calor partes relaxat, & affectum augere potest. Vnde bene pilulis post partum, resiccantibus & discutientibus flatus, ut quæ parantur ex aniso, cineribus & aliis.

De lachrymis inuoluntariis. CAP. LXI.

Lachrymarum materia est humiditas aquea, quæ in cerebro continetur, tenuis & splendida, quæ citra admissionem aeris, vel refrigerationem per oculos guttatim redditur, ob id à saliva differt, quæ spumea est ob aeris admissionem. A muco verò spissitudine, ob refrigerationem incrassato. Non differt ab aqua, quæ in coriza redditur, nisi quod aliquantulum acris est aqua corizæ ob intemperaturam calidam. Lachrymæ tamen aliquando acres sunt, & exulcerant, aliquando sine acrimonia fluunt, vel ob canthorum oculi apertionem, ut in his, qui carnem canthi maioris absumptam habent, quæ claudit & replet, magnūque influxū prohibet, non aliter, quam pannus, spongia, aut bombax obstruens foramen aliquod. Fluunt autem ob facultatis expultricis irritationem, ut à fumo, cæpe, aliisq. acribus. Lachrymæ ipsæ mouentur, fundendo, & irritando facultatē expultricem ob compressionem cerebri. Fitque compressio à multis causis, vel ab aere ambiente repente & affatim refrigerante, ut & in mœrore fit, quoniā ob melancholiæ motionem, vel malum aliquod animo cōceptum comprimitur cerebrum. Fit & lachrymarū profusio in profundo risu. Mulieres, senes & pueri sunt ad lachrymas procliuiiores, ob copiam humoris aquei contenti in cerebro. Qui multos serosos humores in cerebro habent, ij lachrymantur inuoluntariè, ut vulgus Medicorum loquitur. Nullæ enim sunt voluntariæ. Nos tamen inuoluntarias dicimus, quòd nulla tristitiæ occasione fluat. Hippoc. matum esse signum ait, lachrymas ægrorum inuoluntarias. Id enim arguit summam facultatis concentricis cerebri imbecillitatem, & humoris aquei copiam. Sed quæ ob timorem, vel cogitationem mortis fluunt, aliquid boni portendunt, nec illos morituros dicimus, quod & notū est mulieribus. Qui enim ob mortis timorem lachrymantur, indicant se sana mente & animo bene constare, quod certè in acutis optimum est.

Lachry-

Lachryma inuoluntaria.

lachrymæ igitur è diuerſis cauſſis fiunt, ſcilicet ex internis & externis. Ab externis, vt fumo acri, odore acri caparū aut alliorum, vel vlcere palpebrarū, & corneæ, ob dolorem immodicum, ſplendorē ſolis, vel arena, aut alio incidente in oculū, quæ omnia facilè curantur cauſæ remotione. Quæ verò à cauſſis internis, difficilè curantur, maximè cum per interiores venas aqua in oculum deſcendit. Nam ſi per venas, quæ ſunt extra caluariam, aqua in oculum deſcendat, facilitus multò prohibetur, remediis aſtringentibus, & appoſitione emplaſtorum aſtringētium ſupra tempora, qualia præſcripta ſunt cap. de ſuffuſione. Illis addi poteſt lanæ ſordidæ lb. j. ſi combuſta in furno extingatur cum aqua cuſpidum roſ. & cineris albumini ouorum miſceantur, & ſupra tempora apponantur. Poteſt applicari cauterium actuale in temporibus, vel poſt aures, vel ſupra verticem capitis, & vlcus diu remaneat apertum. Supra oculum ponatur aliquod collyrium ex ſequentibus. Purgetur frequenter pilulis capitalibus, coquatur materia, & ruruſum euacuetur pilulis fortioribus. Pilulæ, quibus frequenter purge-
*Cauſſæ lachry. di-
 plices.*
Cauteriu.
Pilula,
Exiccantia.
*Fluxus per inter-
 nas.*

T O P I C A.

In hac ſpecie ſiant cauteria retro aures, & ſi fieri poſſet, diſſectio arteriæ eſſet ſummum remedium. In hac ſpecie faciunt cauteria retro aures, & ſecant arterias externas. Sed hoc inutile eſt, quia per internas ſumi acres lachrymas mouēte fluunt. Applicetur cauterium ſupra commiſſuram coronalem, & ſupra oculos ponatur, quæ vim habent conſtringendi, & exiccandi, vt aquæ roſ. cupidum roſ. caprif. myrtil. aquæ decoctionis, vel diſtilla-

Roboran- tionis malorum granatorum. Sunt tamen admiscenda
etia oculos. aliqua, quæ oculos à proprietate corroborent, vt aqua
 verbenæ, rutæ, fœnic. ne ob refrigerationem obtunda-
 tur acumẽ visus, in crassata cornea, & spiritibus repulsis.
Acacia Acacia, succus prunellorum, lycium, amurca olei cocta,
materia. & redacta ad mellis crassitiem super omnia laudantur.
 Margaritæ, & coralli ambo vsti, cornu cerui etiam v-
 stum, tuthia præparata, sarcô. aloe, rosæ, spica nardi &
 quæ aliquam habent astrictionem, commendantur.
 Componuntur autem hoc modo collyria.

Collyria.

R. tro. albo. Raf. sine opio (vel cum opio, si dolor ad-
 sit) 3. j. aquæ cuspidum ros. qr. j. aquæ fœnic. 3. misce, fiat
 collyr. Vel sic.

R. tuthiæ præparatæ 3. j. sarcocollæ nutritæ 3. ʒ. thu-
 ris, mastiches ana ʒ. ʒ. spicæ ʒ. ʒ. fiant tro. cum oui albu-
 mine, vel succo cydoniorum. Vel

R. acaciæ, amurcæ præparatæ, vt Diosc. docet, ana 3.
 j. tuthiæ 3. j. ʒ. margarit. non perforat. lapidis hæmati-
 tes ana 3. ʒ. gummi trag. assi, coralli vtriusque vsti ana
 ʒ. j. pulueriscentur subtilissimè & cum succo rosat. vel cy-
 doniorum fiant trocisci, & erunt præstantissimi. Fient
 efficaciores, si addas stomomatis ferri exiccati, & pulue-
 rizati diligenter 3. ʒ. Possunt dissolui cum aquis præ-
 scriptis. Sed si dissoluantur in aqua cuspidum rosarum,
 & myrrill. 3. iij. aquæ verbenæ 3. j. erit collyrium effica-
 cissimum. Valde efficax erit sic.

R. malorum granatorum acetos ʒb. ʒ. coquantur &
 cõtundantur fortiter, postea fiat expressio, & in ea expres-
 sione dissolue vnum ex tro. præscriptis. Diutius remane-
 bit medicamentum supra partẽ affectâ, si fiat hoc modo.

R. amurcæ Diosc. 3. iij. succi prunell 3. j. myrobal. di-
 ligentissimè tritorum, corallorum, vnionum ana 3. ʒ.
 tuthiæ, mastich. thuris ana ʒ. j. incorporentur simul
 cum albumine oui fortiter agitato, vel cum syr. de rosis
 siccis. vel myrril. & fiat ad formam linimenti, quod
 manè & serò ponatur in canthis oculorum, & in palpe-
 bris. Manè lauet oculos in aqua cuspidum rosarum.
 Possunt addi aliqua, quæ fortiter exiccant, sed illa o-
 portet diligentissimè vsta esse, & sæpius lota, & rursus
 exicca-

exiccata. Lota quidem in aqua cuspidum rosarum, vel myrtil. donec acrimonia careant. Vt vitriolum rom-
num & album, cadmia, plumbum, marchasita, & simi-
lia. Hæc omnia oportet aliis commiscere, & optimum
est tunc addere aliqua, quæ acrimoniam obtundant, vel
ob frigiditatem, vel lentorem hoc modo.

R. vitrioli albivsti, extincti in aqua cuspid. ros. exic-
cati, & rursus abluti, & hoc decies aut pluries, donec a-
qua pura remaneat (sic de marchasita & aliis facien-
dum) ʒ. j. margaritarum non perforatarum, vel earum
loco, pro pauperibus. pusillarum piscium, vel alterius a-
nimalis, vt bouis ʒ. ss gummi trag. & arab. vstorum &
ablutorum, coral. vstorum & ablutorum, acaciæ, amur-
æ olei præparatæ, vt ante dictum est, an. ʒ. ij. opij ʒ. ss.
cerusæ lotæ ʒ. ij. plumbi vsti & loti, fuliginis thuris, vel
mastich. vel alterius gummi an. ʒ. ss. puluerisanda pul-
ueriscentur, & cum albumine oui fiant trocisci. Opium
hic ponitur ad extinctionem acrimoniæ fuliginis, & a-
liorum acrium. Si autem hic morbus fiat per abscissio-
nem carnis lachrymalis, siue canthi, difficilis est restau-
ratio. Vtatur tamen istis remediis astringentibus, vt aliæ
partes circumiacentes constringantur, & foramen clau-
dant, & obstruant. Sunt tamen augenda & addenda, quæ
sarcotica magis sunt, vt thus, sarcocolla, panax, mastix,
farina orobi & similia. Si fistula lachrymalis adsit, rele-
getur ad chirurgos.

Per ab-
scissionem
carnis la-
chrymas.

Sarcotica

De Aegylope.

C A P. LXII.

Aegylops primum est tuberculum in cantho ma-
iore factum, quod in fistulam lachrymalem ver-
titur. Fit autem tumor ille à lachrymis retentis, aut
ab humoribus corruptis acribus à capite in eam par-
tem descendentibus, & facillimè à principio curatur.
Sed quia paruus est tumor, & sensim fit, negligitur,
nisi cum per defluxionem repentè fit, & dolorem ex-
citât. Si fiat sine dolore, sine aliqua inflammatione est.
Purgatio sufficit, & aliqua digerentia supra tumorem
apposita, vt emplastrum diuinum, ceroneum, & simi-
lia discutientia, vt diapalma. Si per defluxionem repen-
tè fiat tumor maior est, & cum dolore. Tunc mittendus
est sanguis, & à parte propellendum medicamentis

Astring.

repellentibus. Optima erunt, quæ præscriptimus ad extum oculi. Debent illa astringentia in cantho, & supra buccas, & maxillam inferiorem vsque ad aures extendi.

Eucurb.

*Sedantia
dolorem.*

*Suppura-
tio.*

*Residuum
morbus.*

*Quibus
curatur
fistula.*

Nam sanguinis attractio non solum fit per venas internas, sed & per illas exteriores. Quare & cucurbitulæ supra iugulares venas positæ, non parum conferunt ad illam inflammationem cohibendam. Si dolor vrgeat, eum sedare oportet, vt pomo cocto in lacte, vel lac mulsum iniectum, vel mucilago psilij, & fœnug. simul per mixta, & extracta cum aqua violarum & supra partem tumoris apposita. Diligenter inspicere oportet, num tumor suppuratus sit: nam cum suppuratur: ob id citò partem aperire oportet, ne materia diutius retenta, sinum faciat, & os lædat. Quare si pauca sit materia, per canthum expurgari poterit, citra dissectionem. Quod si maior fuerit, vel diutius retenta, vel per decubitus tumor factus fuerit, ferro aperire oportet. Quod si morbus rediuius fuerit, vel perseuerarit, post apertionem factam nouacula eligere oportet, quæ in parte os cariosum fuerit, & in ea cauterium tantum est adhibendum. Quod si factus fuerit per defluxionem, & multum materiæ congregetur, non solum os vire oportet, sed venam & arteriam, quæ sunt in ipso angulo canthi interni, ne noua fiat defluxio. Procurandum erit, vt escara decidat, & siccioribus medicamentis & astringentibus, & inducenda cicatrix, vt partes illæ laxiores constriuantur. Solet enim hæc affectio mulieribus, & quibus sunt hæ partes humidiores, accidere. Curavi ego aliquando fistulam incipientem medicamentis laxantibus, & topicis medicamentis supra partem appositis, citra dissectionem, nempe digerentibus, & postea fortiter exiccantibus, qualia sunt illa, quæ parantur ex calcitide, alumine, flore æris, tuthia, plumbo, antimonio, aliisque mineralibus grauib. Profunt enim & sua siccitate, & digerendi facultate, & suo pondere, quo partem compressam retinent, & subsidere faciunt, atque ita materiæ receptionem impediunt. In eadem parte sunt aliquando vlcera phagedenica ab acris humoribus, quæ non nisi vsta parte, & maximè venis & arteriis curantur, quale vidimus in quodam

dam Franciscano, qui post multorum medicamentorū *Quibus cu*
 remedia, & vstionem factam, alia vstione curatus à no- *ratur pha*
 bis est, venis & arteriis ad viuum & penitus adustis. Ci- *gedenica*
 tissime enim postea curatum fuit vlcus, neque ab eo
 tempore recruduit. In quibusdam materia suppura-
 tur, liquidaque & tenuis, per foramen, quod est in parte
 interna oculi, per quod venæ aliquæ, & neruorum por-
 tio tertiæ coniugationis ad partes narium internas de-
 scendunt, pus reddunt, digito compressa illa parte ma-
 gni canthi. Hanc affectionem medicamentis fortiter
 astringentibus inhibere oportet, vel vstione facta satis
 ptofundè sub oculo. Pars erit constringenda. Sed si
 facile expurgetur, nihilque remaneat, suaderem, vt
 morbus negligeretur, cum non mereatur tormentum.
 Sed danda est opera, vt illæ partes exiccentur, constra-
 nganturque, & oculi nimia illa humiditas frequentibus
 pilulis euacuetur, roboreturque pars, ne tam facile la-
 chrymas, aut humiditatem recipiat. Ad exiccationē il-
 lam internam optimus erit pul. præscriptus cap. de suf-
 fusionē, qui fit extrinsecus hyrundinum, &c. Potest et-
 iam confici cinis ex testudinibus, ostreis, conchis mari-
 nis, ex quibus fiat lixiuium, quo pars foueatur, prius-
 quam os sit factum cariosum, idque addito pauco ace-
 to, vel succo rutæ. Id curare poterit, si initio mitius fiat
 lixiuium, & sensim fortius. Residentia lixiuij, siue calx
 illa extincta, antimonio permixta cum pauco aceto, &
 oleo ros. ad formam linimenti reducat, & supra par-
 tem apponatur.

De hemorrhagia à naribus. CAP. LXIII.

Sanguis in hepate, venis & corde naturaliter contine-
 tur, nec in forma sanguinis, nisi præter naturā egre-
 ditur. Ob id statim putrescit extra vasa. Vnde Hipp. scri-
 psit, si in ventrem sanguis descendat, necesse est putre-
 scere. Sanguis autem affluit vel per crism, scilicet acuti
 morbi, vel post dolores capitis. sed quia hoc fit natura
 impellente, & cum vtilitate, nō est supprimendus. Nam,
 vt scripsit Hipp. Capite dolente, si pus vel sanguis, vel *Effluuij*
 aqua effluat per nares, aures, & os, vtile est. In crisi lau- *sanguinis*
 detur sanguinis fluxus, modò præcesserint signa coctio- *multa*
 nis, & immoderatus non sit. Quicūque enim admodum *caussa*

excedit, etiam menstrualis, præter naturam est. Huius profluvij causæ sunt multæ. Profluit enim ex vena, aut arteria resecata, orificio diuisa, aut relaxata. Diuiditur autem ipsa tunica, vulneratione, contusione, ruptione, aut erosione. Si sanguis fuerit acris, fluit ab omnibus venis disruptis, sed maximè ab interioribus per anastomosim, aut diapedesim, aut diaurosim, quia venæ parte interna molliores & rariores sunt. Quare à venis exterioribus non nisi erosio, vel disruptis sanguis fluit, quia cutis externa est densior interna. Ab utero verò, non nisi per apertionem osculorum. E naribus magis per arroffionem, ex pulmonibus per arroffionem, & ob sanguinis acrimoniam, & rupturam, ob magnam fluitum quantitatem fluit. In eo autem supprimendo causa fluxionis diligenter est attendenda. Si enim per resudationem à quacunque parte fluxerit, nunquam sistitur, donec corpus à serosis humoribus, quibus refertum est, euacuatum sit, & sanguis crassior euadat, victus ratione in crassante, & venæ fiant densiores. Si per arroffionem venæ fluat, sola caustica, quæ crustam inducunt, erunt vsui, quemadmodum emplastica & astringentia, si per anastomosim. Medicamenta igitur causæ unicuique accommodata, & propria magis eligantur. Sunt enim quædam medicamenta, quæ sua frigiditate sanguinis feruorem extinguunt, atque ita sanguinem retinent, vt succus umbilici veneris, semperuiui, lactucæ, aquæ tribuli aquatici, &c. Omnia, quæ frigida sunt & humida, vel parùm sicca, vt solanum. Hæc autem magis prosunt, si apponantur circa partes calfactas, & vicinas, & prius excipiantur farina lentium, vel hordei, quibus adde aceti parum. Si fluat è naribus, talia medicamenta in lateribus colli & temporibus sunt apponenda, frigida nimirum, & astringentia. Et non solum partibus his vicinis, sed & supra venas ipsas sanguinem reicientes. Sua enim astrictione & repellunt, & partem constringunt, meatus etiam dilatatos & apertos quodammodo occludunt. Huius generis sunt succus sanguinariæ, herniariæ, bursæ pastoris, caudæ equinæ, plantaginis, foliorum vitis, sorborum, prunorum agrestium, cydoniorum & similia. Sunt & alia medicamenta emplastica, quæ suo lentore,

Quæ sanguinis feruorem extinguunt

Quæ sistunt fluxum narium.

Herba astringentes.

lentore, frigiditate & siccitate, sanguinis impetum si- *Empla-*
stunt & retinent, meatus obstruendo, vt oui albumen, *stra sang.*
farina volatilis, amyllum, mucilago cydoniorum, vel *sisten.*

piliij, & potissimum, si aliqua exiccantia his adiungan-
tur, vt sang. drac. bolus arm. gypsum, lycium, sanguis et- *Pili lepori.*
iam animalium terrestrium exiccatus. Hæc autem in

apertione, ruptura & vulneribus maximè sunt adhiben-
da. Aloë & rhus his annumerari possunt, quibus & pi-
los leporis adiungit Gal. qui non à facultate astringen-
di, aut occulta proprietate sanguinem retinent, sed
quæ vulneris labra adducta beneficio emplasticorum
retinent. Quod si per se ponantur, sanguinis partem
crassiorem retinent, serosam autem trāsmitunt. Dein-
de sanguis concretus obstruendo vasis osculum, san-
guinem retinet. Eadem ratione flos salicis & omnes a-
lij, qui abeunt in pappos. Lanugo etiam fructuum, vt *Flos sali-*
cydoniorum, & lana, quæ ex fructibus carpitur, vt pla- *cis.*

tani, bombacis, & castanearum, sanguinem sistunt. Te-
la aranearum idem etiam præstat. Sunt & alia medica- *Sanguine*
menta, quæ citò sanguinem retinent, apposita, qualia *retinenda.*

sunt multum resiccantia, vt cinis testæ, ouorum, can-
crorum, gallarum. His proximè accedunt, quæ vrendo
exiccant, quibus potissimum vtimur in fluxu sanguinis
arteriosi, & magnarum venarum, vt vitriolum vstum,
auripig. sandaraca, atramentum sutorium, & similia
caustica. Sunt autem hæc apponenda in forma sicca,
vel excepta aliquo lento humore, si per se cōsistentiam
non habeant. Quæ autem liquida sunt & spissa parùm,
tentis excipiuntur. Vt autem ista medicamenta sangui-
nis impetum retinere valeant, sanguis aliò reuocandus.

Quod si multus fuerit, nec æger adhuc debilitatus, san- *Sanguinis*
guinis missio erit facienda, modò ætas & reliqua con- *miss. in ro-*
sentiant: sin minus, diuertendus est sanguis, sine euacua- *bastis.*

tione. Id fiat ligaturis, cucurbitulis apposis regioni
hepatis, quod confert, siue è naribus, siue ex vtero, aut
ab alia parte fluat sanguis. Iecur enim sanguinis offici- *In debili-*
na, omnium venarum origo est, & ad id, velut ad cen- *tibus non*
trum, omnes referuntur. Ligatura circa testes est utilis- *mittitur*
sima, vt & oxycrati perfusio, quando sanguinis feruor *sanguis.*
est minuendus.

Fluxor è naribus.

Si è naribus fluat sanguis, vtilissimum erit totam faciem aquis frigidis perfundere, & spongas antiquas, id est, frequenter lavatas, ut falsedo ablata sit, immersas succis prædictarum herbarum, vel in aceto, & aqua temporibus apponere, siue continere in ore aquam cisternæ frigidissimam, subinde renouando, quod imperat Gal. lib. de paratu facilibus. Sic enim constringuntur venæ internæ oris, & per consequentiam aliæ. Lapis, qui in cyprini palato visitur, si frigidus ore contineatur, sanguinis fluxum, vel narium, vel oris promptissimè compefcit. Laudat Galen. diligentem aurium obturationem, quod prodesse nulla alia ratione existimo posse, nisi forte quod sinus primus ramorum venarum, & secundus duræ menyngis, per quos potissimum cerebrum sanguinem recipit, comprimantur, ex quo obstruantur, & sanguis consequentia quadam retineatur, nisi forte legendum sit, nares esse comprimendas, quibus compressis sanguis sistitur. Potest fieri pulu. constrictius hoc modo.

Pul. con-
strictius.

Olea con-
strim.

R. boli armeni ʒ. j. cortic. mali granati. balauftiorum, gall. ana ʒ. iij. capitum papaueris albi ʒ. ij. sang. drac. ʒ. j. pul. & incorporentur albumine oui, vel aceto, ponantur super tempora & frontem, & venas iugulares. Possunt fieri pul. ex magis astringentibus, & refriger. supra numeratis. Vtiles etiam erunt, qui præscripti sunt, pro aqua descendente in oculum in suffusione: verum hoc loco magis refrigerare oportet. Fieri etiam possunt inunctiones ex oleo constringente, ut myrtill. cydoniorum, ros. omphacino, additis quibusdam succis multum constringentibus, & refrigerantibus, ut cydoniorum, poligoni, & similium. Coquantur olea ad succorum consumptionem, alioqui coire non possunt in formam vnguenti propter succorum humiditatem, quæ oleis commisceri nequit. His cera postea adiungitur alba, acetum verò tempore inunctionis. Nihil prohibet etiam puluerem constrictium in parua quantitate ponere. Iis pars colli inungatur, per quam venæ & arteriæ ad caput ascendunt. Additur & corall. ut medicamentum fiat efficacius. Potest etiam sine cera & oleo ex succis

succis & aceto fieri nutritum, additis lithargyro, bolo armeno, cerusa, aut aliis emplasticis mineralibus, quæ tamen diutius hærebunt parti, si aliqua quantitas olei ros. omphacini addatur. Vel fiat embrocatio ex succis *Embrocatio.*
herbarum frigidarum sic.

R. succi plantag. polygoni ana ℥. iiij. succi burf. past. ℥. ij. aceti parū, facta residentia ponatur supra frontē, vel farina hordei, & inspergantur, & partibus supradictis applicentur. In locum succorum etiam substitui herbarū aquæ possunt, quo tempore non reperiuntur, vt hyeme.

R. aquarum ros. vel peculi ros. vel prunellorum, vel myrtill. vel plantag. ℥. iiij. aceti ℥. j. intincti panni applicentur fronti, vel temporibus, & circa collum. Ex eis-*Epithimus*
dem potest hepar epithimari, modò actu frigida non applicentur, vt in fronte, nisi sit fluxus sanguinis à feruore. Naribus autem hæc admoueantur, vt cinis testæ ouorum insufflatus in nares, vel exceptus linimento. Citissime sanguinē sistit pul. constrictius præscriptus, albumine oui exceptus. Idem præstat stercus suillum recens, aut exiccatum naribus admotum, cui pul. ros. adiungere oportet, ob fœtorem, & quæcunque supra enumerata sunt, eodem modo adhibita sanguinis feruorem sistunt, modò sint emplastica, vel resiccantia, quæ aliquam consistentiam habent. Hæc verò statim adhiberi non debent, sed iam facta diuersione, aut post embrocationes, aut remedia alia sanguinem repellentia. Nam hæc remedia nares, non repulso, aut alio attracto sanguine, claudent, qui defluit in os, pulmones, ventriculum. Si fluxus ob nimiam sanguinis tenuitatem fiat, *Fluxus sanguinis ob eius tenuitatem.*
conuenient syrupi incrassantes, & infrigidantes exhibiti cum aquis frigidis, vt syr. viol. de nenuph. de papauere de berberis, & myrtill. vel ex conserua radic. symphiti. Idem faciendum, si à nimia sanguinis acrimonia fluxus oriatur. Purgandus tandem erit, si non retineatur, decoctione myrobal. sebesten, tamarindorum, rhab. infuso non expresso, syr. ros. laxatiuo. Hæc enim cum astringitione vel extinctione bilem euacuant. Si verò sanguis fluat ob tenuitatem, vel seri copiam, medicamentis laxantibus purgandi sunt. Sed adiungenda sunt, quæ aquas euacuent citra magnam cale-

*Appen-
denda col-
lo*

factionem, vt serum lactis, potissimum a sinæ, quod sub-
dio per totam noctem fuit expositum, vt magis refri-
geret, in quo infundantur folia senæ, & brassica mari-
na, vel bacca hederæ, & alia, quæ cap. de hydropæ di-
cuntur. Sensim & frequenter euacuandi sunt. Vulgus
appendit collo corallum, iaspidem, ambram, quæ ma-
gis contactu suo frigido feruorem sanguinis extin-
guendo retinent, quàm alia occulta proprietate. Ve-
rùm hoc melius præstant, si collo circumligentur, &
tam maxime contingant partem, per quam venæ iugu-
lares caput petunt. Idem præstabit cathena aurea, vel
argentea, vel ferrea, vel plumbea, vel in partem poste-
riorem pendeant, supra quam incumbit magna vena &
arteria. Has partes refrigerare succis herbarum frigi-
dis supradictis, non est inutile. Est etiam vtile timorem
incutere ægotanti subitum, vt à circumferentia ad cen-
trum sanguis reuocetur. Æger omnibus modis est re-
frigerandus, aëre frigido, potionibus, herbis & poten-
tia & actu frigidis. Imperanda est quies totius corpo-
ris, & animi potissimum, linguæ & maxillarum. Nam si
frequenter loquantur, aut maxillas moueant, fluxum
sanguinis continuant. Ob id alimenta actu frigida dan-
da sunt, & quæ citra masticationem deuorari possunt,
vt amyllum paratum in decoctione pedum veruecis,
hordeum mundatum, vel cremor ptisanæ ex sacch. &
aqua ros. sine amygdalis: quibus adiungimus quædam
emplastica ad sanguinis inspissationem, vt albuamen
oui crudum fortiter agutatum, gummi trag. aut arabi-
ci, vel emplastica refrigerantia, qualia sunt bolus ar-
menus, terra sigill. rubrica fabril. creta, argilla & simi-
lia, quæ nullum odorem, vel saporem ingratum habet,
vt etiam puluis corali, vel cinis ossis sepiæ lotus. Hæc
sanguinem inspissant, siccando serosa recrementa. Sunt,
qui sanguinem proprium in sartagine frixum edendum
præbeant, sed mihi parum placet hominis sanguine ve-
sci. Interdicantur vino, nisi valde debiles, quibus au-
sterum valde conceditur, dilutum multa aqua cisternæ,
vel fluuiorum. Oculos clausos habeant, ne sanguinem
profluentem, & res rubras videant. Mouet enim fa-
cultatem expultricem phantasia ab obiecto mora. Si

fluxus

*Vitæ
vario.*

Fluxus sanguinis narium accidat mulieri, vel puellæ, cui per aliquod tempus suppressi sint menses, aut postquā menses ratione ætatis cessarunt, vel nondum fluere incœperunt, cum tamen fluere debuissent, non est statim compescendus. Solet enim natura, quod per vterum ex purgare consueuerat aut debuerat, nunc impedita per superiora reiicere. Ex quibus prohibetur, ad venas pulmonis retrudi solet, & eas rumpere, vnde fit hæmoptotica passio, à qua tabes, dolores capitis, ophthalmia, faciei rubor. Quare aliquot diebus post paroxysmum, vel in ipso paroxismo, si immodica fuerit euacuatio, fiat missio sanguinis ex vena poplitis, & affigantur cucurbitulæ, circa regionem vteri & inguinum. Sedato fluxu menses prouocentur medicamentis. In mulieribus minus est periculosus sanguinis fluxus, quàm in viris, ob id non tam citò compescendus. Ego curauì quendam solis syrurp. aquas & serosos humores euacuantibus, qui per os singulis diebus reiiciebat duas aut tres lb. sanguinis.

Fluxus mens. suppressione.

Reiectio nis sang. per os curatio.

Remedia fuere hæc.

℞. rad. plantag. ʒ. ij. rad. consolid. maior. ʒ. j. herniaria, herbarum capil. centinodia, fum. ana M j. anis. ʒ. ij. quatuor sem. frig. maior ana ʒ. j. semi. nasturtij torrefacti ʒ. j. fiat decoctio In lb. j. diss. sacch. q. s. fiat syrup. de quo capiat manè ad quantitatem ʒ. iij.

Syr.

℞. succi brass. marinæ, arthemis. ana ʒ. iij. succi sceni. marini, & cucumer. agrest. & cyclam. ana ʒ. j. excipiantur farina lupinorum, cui adde parum terebint. fiat ad formam cataplas. applicetur, vt diximus.

Cataplas.

℞. cancrorum stagni N. xxx. abluantur in aqua hordei, & macerentur, deinde vrantur in furno, fiat pul. de quo cap. ʒ. ij. cum aqua plantaginis, & absynthij, adde coralli ʒ. lb.

Pul. cancrorum.

De fluxu sanguinis è naribus.

Fluxus sanguinis è naribus, modò non sit criticus, constringendus statim est. Constringitur autem sanguinis missione, sed oportet foramen esse paruum, vt minor quantitas fluat, & reuellat magis. Facienda autem ex basilica, aut mediana, vel cephalica eiusdem partis. Diuersio etiam fit per ventosas affixas supra

hypochondria, seruata etiam rectitudine, vt si à dextra fluat nare, in dextra parte: ligaturis dolorosis etiam auertitur sanguis. Teneat caput erectum, & non inspicat res rubras, nec vinum bibat. Perfundatur caput aqua frigida, vel supra spatulas & collum ponatur panus madefactus in aqua frigida, nisi debilis esset, vel nimis frigidus. Fiat pul.

*Pul. re-
strictius.*

℞. boli armeni ℥. j. cort. mali granati, balaustiorum, gall. ana ℥. iij. seminis papaueris albi ℥. ij. pul. & incorporentur cum albumine oui, vel aceto, & ponatur supra tempora, & frontem.

De Polypo.

C A P. LXIII.

Polypus tumor est narium proprius, qui videtur esse carnosus ex carne illa laxa & fungosa, quæ intra nares latitat. Fit autem quotiescunque hæc caro laxior, & rasser est, & cerebrum valde humidum mittit viscidam & flatulentam quandam materiam, quæ hanc partem inflando facit, vt maior appareat, & potissimum in coniunctione lunæ; in declinatione contabescit & minuitur. Est tumor hic aliquando inter nares, neque multum apparet. Aliquando ad extremum vsque narium proppendit. Aliquando in ea cavitare, quæ est à naribus ad os, visitur. Est autem ventri polypi similis. Nam id, quod pendet, figuram habet rotundam, & facile in varios colores mutatur, polypi modo, nunc albus, nunc cineritius, nunc liuidus, aliquando rubeus apparet, narium impedit respirationem. Quod si fieret in vtraque nare, imminet periculum suffocationis, nisi aperto ore dormiant. Huius tumoris curatio est difficilis, & satius esset, cum incipit fieri, eius incrementum prohibere, quàm eius curationem postea tentare. Nam factus sui ablationem indicat, cum sit toto genere præter naturam, vel medicamentis arrodentibus carnosum illum tumorem minuire. Inhibebitur, si in principio, purgato corpore & capite, & sanguinis missione è cephalica, & cucurbitulis sæpe appositis in lateribus colli, supra partem apponantur fortiter astringentia, vel si vtrunque accreuerit, caustica cum quibusdam astringentibus. Igitur in principio aqua sequens vtilissima erit.

*Curatio
difficilis.*

*Aqua vti-
lissima.*

℞. vuarum immaturarum lb. iij. cort. mali ḡ balaustio-

laustiorum, sumach ana lb. ij. distillentur omnibus maceratis in aceto, deinde adde aluminis lb. j. vitrioli ʒ. iij. distillentur iterum omnia simul, & aqua illa tangantur partes internæ narium. Aqua separationis auri idem præstabit. Si peruenerit ad aliquam magnitudinem, sandaracam, & auripigmentum in prædictis aquis excipere oportet, ut pars vratur, & constringatur. Troscisci Andronis, Musæ, Polydæ, idem efficere possunt, sed quia spissa sunt, minus commodè adhibentur, & magis conueniunt in ozena, quàm in polypo. Debent autem ista apponi, quum luna decrescit, quo tempore minor tumor est, & melius adhibetur remedia ipsa radici, cum tumor non impediatur, quò minus partes illæ internæ à medicamentis tangantur. Multis profuit vsus gaiaci cum tenui victu. Curantur chirurgia. Nam si parvus est, conficitur canula argentea, per quam dimittimus cauterium internæ parti narium circa septum. In rusticis, & iis, qui parum curant de forma narium, forcipibus scindemus. De ~~ma~~ supra partem cauterium adhibendum, alioqui vratur in vna parte, altera intacta. Et si quid reliquum fuerit exustionis expers, inde renascitur nouus polypus. Dum istis vtimur, optimum erit, caput exiccare pulueribus, & aliis remediis, nec non & totum corpus, sed præcipue caput.

De Ozenâ.

CAP. LXV.

Ozenæ dictæ sunt ab aliqua polypi specie, quæ graueolens est, sed hoc valde miror, quòd cum piscis ille musci odorem referat, ozenæ ingratum & foetidum, hæ ab illo nomen acceperint. Ozenæ nihil aliud sunt, quàm polypus exulceratus, aut vlcus illius partis fungosæ, quæ intra partes reperitur. Et sic differt vlcus hoc ab aliis vlceribus, quæ sunt in aliis nasi internis, quòd talia sine magno pure & foetore fiant: Ozenæ non item, sed & olfactum impediunt. Nam cum hæc pars fungosa sit, & in tumorem eleuetur, spirationem ossium ethmoidis impedit, ob idque recrementa diutius retenta putrent, vnde foetor & graueolentia. Difficillimè curatur ob venarum frequentiam, & pituitæ expurgationem. Differt à polypo, quòd huius materia non tam acris sit, alioqui exulceraret: ozenæ autem materia acris, ~~gena~~.

Curatio. mordax, arrodens & putrida est. Curatur purgatione totius corporis exacta. Masticatoriis ex mastiche, pituita capitis purgatur, quibus si adiungatur scammonium, potentius trahet, & deriuabit materiam in proximiorē partem. In principio ante omnia alia medicamentum utilissimum erit uti aqua illa pro polypo descripta capite superiore, vel lixiuo parato ex cineribus caulium, fabarum. Item aqua forti diluta oxymelite. Detergunt hæc omnia, & carnem putrem exedunt ut omphacium antiquum paratum ad oculorum affectus, dissolutum in aqua calamenti, & œnomelite. Posset etiam in principio vnguentum Ægyptiacum dissolutum in aqua hordei prodesse, ad vlceris deterfionem. Deinde sunt conficienda vnguenta, quæ astringant, & detergant, & summè exiccant, ut vnguentum pompholigos, addito alumine, chalcitide, & cortice mali granati. vel conficiantur sic.

℞. omphacij ʒ. ss. cort. mali granati, balaustiorum ana ʒ. iij. myrrhæ, alumini, ladani ʒ. ij. chalcit. aloes, cortic. thur. ana ʒ. j. ol. ros. & myrrh. ana ʒ. ij. ceræ rub. q. s. fiat vnguentum, quod applicetur parti narium internæ, vel diss. in vino aut aqua myrril. aut peculi ros. Id frequenter naribus attrahatur, ore aqua pleno. In istis vnguentis abstinendum a foetidis, & miscenda sunt aliqua odorata, propter foetidum illum odorem, qui alias offendit. Ex supradictis confici potest pul. & insufflari ad vlcis exiccationem. Fiet ex eisdem, ex quibus compositum est vltimum vnguentum. In vlcibus narium post aliquam deterfionem, nihil aliud efficacius inueni, quàm fumigium, quod partes illas profundas attingit & siccat. Parandum autem ex potentissimè resiccantibus, ut auripigmento rub. vel lu. eo, cinabari, quibus addenda sunt aliqua odorata, ex quibus fuligo excitatur, & vlcera siccantur, ut myrrha, thus, mastic. beniouin, &c. ut sic.

Remedium efficacissimum.

℞. ladani puri, hypocist. mastich. myrrhæ ana ʒ. iij. Syrac. rub. & calaminthæ, cortic. thur. sandaracæ, auripigmenti rub. ana ʒ. ij. excipiantur omnia terebinth. & fiant tro. quibus fumigentur serò & manè in cubiculo.

Opti:

Optimum est etiam illis parare candelas ex cera rubra: Nam fuligo talis candelæ, plurimum iuuat exiccationes, maximè si contineatur in cubiculo bene clauso, & angusto. Quòd autem fuligo recipiatur, idem experimur, cum diutius in studioso moram trahimus noctu. Nam postea sputum & excrementa narium fuligine illa denigrata redduntur. Hac ratione nos vlcus curauimus, quod neque ab Italis, neque à Gallis medicis curari potuerat. Vlcera alia narium, vt quæ sunt in alis narium ipsarum, fortiter resiccantibus circa morsum, & sarcoticis sufficienter curantur, quibusdam astringentibus additis. Mineralia diligentissimè lota cum cortice mali granati, & aloe lota talia vlcera curant. Vnguentum paratum ex pompholyge cum balaustiiis talia vlcera curat. Item frequenter partem lauare decoctione tali vel aqua distillata.

Alia vlcera narium quibus curantur.

R. balaustiorum & cortic. malorum granatorum ana. lb. iij. plantag. caudæ equinæ, pilosellæ, linguæ passerinæ & herniariæ ana M. ij. rad. bistorræ lb. β. foliorum myrthi vel summitatum pyri syluestris ana M. j. contundantur & simul distillantur, & fiat aqua, de qua frequenter abluat nares. His adde aluminis gr. j. vel fiat decoctio ex supradictis, & frequenter abluat nares exiccando eas, postea fumigio præscripto ad curationem ozenarum.

Lotio narium.

De Parotidibus. CAP. LXVI.

Parotides nomen acceperunt à loco. Fiunt enim tumores post aures propter partis laxitatem, & magna vasa venarum & arteriarum, ad cerebrum contendentium, per quæ defluxiones potissimum frigidæ principio, aliquando post longas febres & acutas, quæ ad tertium aut quartum diem peruenerunt, & post febres quotidianas, vel tertianas extensas. Fiunt enim per *transientia*, cum materia, quæ cerebrum obsederat, ad has partes *in parotidibus non* adenosas irrupit. Ob id in istis tumoribus nunquam repellentibus medicamentis vtimur, quanuis in inflammationibus aurium aliquibus vtamur. Materia enim quæ facit inflammationem in aure, pauca est, & per vasa *grauiter repellentibus.* valde angusta refluit, quæ magis qualitate peccabat, quàm quantitate. Castigata medicamèto refrigerate, si re-

Curatio.

pellatur ad intra, nil adfert mali: At materia parotidum multa est, & per latiores venas & arterias retunderetur in cerebrum, magno totius corporis incommodo. Ob id si incipiant, corpus diligenter purgamus pituita, & aliquando sanguinem mittimus, si magna sit totius corporis plenitudo, & si sit circa partem calor, rubedo, & magna pulsatio sentiat. Supra partem relaxantia, & per partem digerentia apponimus, vel ol. cham. lilio. irinum, amygd. amar. aneth. Lana succida olea ista excipiuntur, & supra partem adhibentur. Succida poni debet, cum volumus ad eam partem à cerebro materiam trahere. Quod si fluat sufficienter & multum, lota lana melior erit. Cataplasmata parantur ex herbis & farinis digerentibus, vt

CATAPLASMA.

℞. bismal. cum radic. vel liliorum. q. j. pariet. absynth. ana M. furf. p. j. florum cham. melil. an. p. j. coq. pistentur & per colum transmittantur, quibus adde axung. porci & butyr. an. ʒ. ij. ol. cham. irini ana ʒ. iij. misce, fiat cataplasma, vel sic.

℞. farinæ fœn. & fari. hord. an. q. j. decoquantur in aqua & ol. chame. vel irino, vel anethino, & fiat pul. applicetur cataplasmatibus modo. Hæc remedia digerunt moderatè, & dolorem solvunt, quibus si adiungatur mel, vim maiorem habebunt digerendi, vt

*Digerentia
reliquas
morbi.*

℞. farinæ fabarum, farinæ hordei ana q. j. mel. communis q. ss. leuiter coquantur simul, & fiat cataplasma. Si materia resoluatur aliqua ex parte, remaneat quæ aliquid indigestum, dolorem tamen non faciat, tunc medicamenta in cerati formam redacta, commodius parti adhibebuntur, vt diachil. mag. iteratum, cheroneum, & in fine vtemur emplastro diapalma, duplicata quantitate calciteos, addendo iridis ʒ. j. in ʒ. iij. emplastri. Vel reducantur ad consistent. am cerati, cum oleo irino, liliorum, vel anethino. Quod si digeri non possit ob materiæ multitudinem, aut crassitiem, in pus vertetur. Tunc iuuanda erit maturantibus & suppurantibus, & vnguento basilicone, vel cataplasmate supra descripto in hoc capite, addita magna quantitate farinæ frumenti & axungia porci, quo vti poterimus in principio, in quo

Suppurantia.

oportet & maturationem & materię digestionem procurare, deinde sequenti.

R. maluarum *M. j.* rad. bismal. *qr. j.* sic. *pa. xx.* coquantur & pistentur diligenter, per colum transmittantur, quibus adde *axung. porci ℥. iiij.* olei communis *℥. iiij.* farine frumenti leuiter decoctę in colatura decoctionis herbarum *lb. ℥.* misceantur simul, & reducantur ad formam cataplasmaris. Hoc fortius reddetur, si farinam aut mucilaginem seminis fœnugręci addideris ad *qr. ℥.* Vbi incipiet materia suppurari, vt magis trahatur ad circumferentiam, fermentum acre ponitur in cataplasmate prædicto, vel vnguentum basiliconis, quod picem habet. Medicamentum suppuratiuum & epispasticum est. Si cutis sit extenuata valde, solo felle porci supraposito abscessus rumpitur. Quod si ob cutim duriores non rumpitur, tunc ferro id tentandum. Vlcus detergendū, & implendum, cicatrizandūque, vt in aliis partibus.

De aurium dolore. CAP. LXVII.

Dolor aurium a materia calida, frigida, vermibus, contusione, & flatibus fit. Si fiat a materia calida, vt in inflammatione, curandus erit missione sanguinis & anodynis. Secunda autem est cephalica eiusdem lateris. Clysteres ad reuulsionem, vt in cap. de oculorum doloribus, conueniunt, & cucurbitulę sunt scapulis applicandę. Sedabitur dolor topicis remedijs, quę erunt fomentationes, cataplasmata, inunctiones. Fomentatio quidem talis.

R. viol. lact. plant. solani an. *M. j.* fol. pap. vel hyosc. vel mandr. tertiam partem *M. j.* fiat dec. ex qua fomentum, vel fumum recipiat. Melior erit, si non ponantur narcotica, vt papauer, hyosquiamus. Vel si fiat sic.

R. mal. bismal. cum toto, viol. lact. salicis an. *M. j.* flor. chamo. melil. ros. ana *p. j.* fiat decoct. qua foueatur pars vt dictum est. Hęc erit optima in inflammatione, cum est digerenda materia. Quod si magis digerentem velis, adde fœnug. semen lini, & semina digerentia, dicta in cap. de dolore oculorum. Inunctiones fiunt ex ol. refrigerantibus, vt ros. viol. nenu. de semine lact. de pap. de pomis mandragorę. Additur etiam acetur, quia

Lenientia
dolorem. pars non timet acrimoniam. Adduntur & succi aliqui, vt solani, papaueris, coriandri. lact. vmbilici veneris, & in dolore fortissimo opium. Decoquantur aliqua in oleo, & maximè cum dolorem lenire volumus, & digerere, vt aselli, lùbrici, cantharides nigre, cochleæ marinæ, aut terrestres, & maximè humor, quem eructant. Habent enim magnam vim mitigandi dolores. quæ cochleæ, quia à tota substantia dolorem sedât, ob id tam in causâ frigida, quàm in calida possunt adhiberi, modò coquantur in ol. appropriato ipsi causæ, vt frigido, in causâ calida, & calido, in frigida, vel in ol. medio & temperato, præsertim vbi non est perfectum à qua causâ fiat, vt medulla cruris porci saliti. Est enim præstantissimum remedium, in omni causâ, sed magis à materia frigida, vt paretur tale medicamentum.

Medulla
cruris por-
ci.

℞. olei viol. vel rosati ℥. iij. ol. amygdal. ℥. j. s. asello-
rum, vel lumbricorum, vel scarabeorum ℥. j. contundan-
tur & decoquantur in ol. quod postea iniiciatur in au-
rem tepidè Incoqui etiam possunt fructus, semina, flo-
res, pro necessitate affectionum. Albumen oui fortiter
agitatum ad doloris sedationem est accommodum, vt
Cataplas- & lac recens mulsum Fiunt etiam hoc modo.

Albumen
oui.
Cataplas-
ma.

℞. radic. liliorum & mal. ana ℥. j. solani hyosquiami
ana M. s. ros. rub. florum nenuphar, ana p. j. flor. chamo.
melil. ana p. s. fiat decoctio addendo farinæ hordei, &
lentium ana ℥. iij. Herbæ & radices contundantur, & o-
mnibus mixtis simul fiat cataplasma. Addendo ol. ros.
vel viol. vel nenuph. vel similia ℥. ij. vel pinguedinis
anseris, vel porci tantundem. Potest etiam corpus altera-
ri syrup. refrigerantibus, & incrassantibus, vt dictum est
in dolore oculorum. Si purgatione indigeat, cum de-
coctione myrobalanorum & ramarindorum purgetur,
vel syrupo rosato lax. addita aliqua parte rarb. infusi in
aqua end. Si dolor sit in toto capite, sedandus erit, vt
monstratum, cum irrigatione, vel vnctione aliqua. Si
delirium accadat, fiat, vt dictum est cap. de paraphre-
nitide.

Alteratio
corporis.
Purgatio.

Curatio à materia frigida.

Si dolor fiat à materia frigida, detur primùm clyster
acutus, & si redundet sanguis, mittatur in parua quan-
titate,

titate: vel affigantur cucurbitulæ scapulis cum scalpella-
 ratione loco phlebotomæ. Coquatur humor syr pitui-
 tam alterantibus. Purgetur pilulis capitalibus. Inciatur
 in aurem ol. laurinum, costinum, chamomillæ, amataci-
 num, liliorum, nardinum, nucum, amygdal. dulc. vel a-
 mar. sesaminum, anethinum, lambicorum, scorio-
 num, & alia id genus. Fiant foci ex herbis calfacienti- *Foci ex*
 bus, & digerentibus, cuiusmodi sunt, ura, melissa, beto *herbis di-*
 nica, absynth. folia lauri, rosm. & alia de cap de dolo *gerentibus*
 re capitis à materia frigida. Adipes, quibus utimur, sunt *Adipes.*
 anatis, gallinæ, anseris, & aliorum. Succi herbarum, ut *Succi.*
 pariet. sambuci, matric. absynth. Quando fit à materia
 frigida, raro aut nunquam utendum opio, nisi admo-
 dum vehemens fuerit dolor. Tunc enim opium addere
 possumus, adiungendo cast. rei, croci tantundem. In
 materia calida non id obseruandum.

Si à flatibus, vel obstructione fiat auris dolor, exte- *Curatio à*
 nuanda & purganda pituita à toto corpore: simili modo *flatibus*
 faciendum est in auribus. Inciendi enim sunt, quæ at- *ex obstr.*
 tenuant & discutiunt flatus. Laudantur allia, cepæ, radix *ctione.*
 ari, serpentariæ, brionix, cucumeris agrestis, & omnia a-
 lia, quæ commendantur supra in dolore auris à materia
 frigida. Possunt ista præscribi sic.

R. succi squillæ, aut Larri, aut brionix, aut cepæ ʒ. ij.
 aceti ʒ. ʒ. m. sce. & in aure tepidè inciatur, vel sic.

R. cepæ, rad. serpentariæ, veratri (maximè si est cum
 surditate) an ʒ. j. foliorum lauri, rutæ, orig. puleg. cala-
 menti vel aliarum herbarum calidarum ana M. ʒ. fiat
 decoctio in vino albo, vel aqua, vel vino antiquo com-
 muni, vel amygd. dulc. quod est medium, exprimantur
 fortiter, & expressum decoctum in aurem mittatur. Si
 contundantur residentia, & addatur porci pinguedo, fiat
 cataplasma apponendum supra aurem. Si proueniat
 ab inflammatione, curetur, ut supra dictum est, à mate-
 ria calida, nisi quòd maior sanguinis quantitas de-
 trahenda est. Addenda sunt leuiter astringentia. Nam
 in hac inflammatione non est tutum multum repellen-
 tibus uti, etiam in principio, sicut nec in augmento &
 declinatione, nimium calidis & humidis, quia conser-
 uanda est partis temperies, quæ est frigida & sicca. Ita-

Curatio ab
inflam-
matione.

que addenda sunt aliqua sicca : vel vtendum minùs humectantibus.

Curatio suppurationū.

Si veniat ad suppurationem, abstergetur detergentibus medicamentis, & ducatur ad cicatricem. Eam ob causam prudenter fit, si vt in statu, & incremento, iniectiōibus & cataplasma. addatur parum mellis, vt in declinatione vel aliquod, atque etiam in statu, vt abscessus rumpatur. Sin abscessus sit frigidus, vtendum est remediis suprā scriptis, vt ol. calidis. Sed à principio vti oportet mitigantibus dolorem, vt hoc modo.

Pro principio.

R. ol. viol. ʒ. ij. ol. chama. & amygd. dulc. an. ʒ. j. misce pro principio. Postea vtatur sequenti.

R. ol. amygd. dulc. & cham. an. ʒ. iij. ol. liliorū ʒ. ij. misce, iniiciatur in aurem. Tandem ad digerētia magis erit veniendum. Potest vti hac decoctione seu cataplasmate.

R. seminis lini, & fœnug. an. ʒ. ss. flor. chama. melil. ros. an. p. j. radi. bistortæ ʒ. j. fiat decoctio, contundatur & fiat cataplasma, addendo olei ros. & viol. an. ʒ. iij. Et hoc pro principio. Nam & si materia est frigida, sunt addenda aliqua, quæ quodammodo repellant, vt ol. ros. ol. violaceum. Ad mitigationem doloris potest fieri fomentatio, vel iniectio cum decoctione, vel euaporatio in aurem. Accedente statu auferenda sunt illa olea frigida, & sunt commiscenda, quæ digerunt: vt ol. amygd. dulc. liliorum, laurinum, amaracum, sycionium, vel succus tantum foliorum cucum. agrestis.

Pro statu.

Absterforia.

Si rumpatur abscessus, abstergetur, & reducatur ad cicatricem. Fiant medicamenta absterforia cum succo ciclæ, apij, porri, & cum succo foliorum cucum. agrest. vel cum decoctione lupinorum, & hordei, & cum melle conseruationis fellis vaccæ, vel communi. Postea curetur cum sarcoticis, & fortiter exiccantibus. Potest enim auris ferre talia medicamenta ob suam temperiem siccam. Ad vlcis exiccationem optimum erit vti hac suffumigatione.

Suffumigatio

R. thur. mastich. sarco. gum. iuniperi, myrrhæ ana ʒ. iij. ladani puri, hypochist. an. ʒ. ij. auripig. rub. an. ʒ. j. excipiantur terebinthina, & fiant trocisci, quos ponant supra carbones, & fumū recipiāt per embotum, quod auri appli-

applicetur, & non arētē iungatur. Nam fumus non ascēdet sursum, nisi pareat aliquis exitus. Scoria ferri in aceto scillitico decocta vlcera aurium citissimē curat. Si à vermibus fiat auris dolor, iniiciatur in aurem decoctum *Curatio à Vermibus.* lupinorum, vel succus absynthij, vel decoctum agarici, vel succus persicariz maioris, vel alia, quæ vim habeant enecandi vermes. Postea iniiciantur specillo. Idem faciendum est, cum dolor provenit ob rem aliquam incidentem in aures.

Si dolor fiat à contusione, mittatur sanguis ad prohibendam inflammationem. Si fortis sit dolor, applicetur supra partem, quæ aliquo modo astringunt, nisi fortissimus dolor adsit. Tunc enim mitigandus esset mollibus, ut si à principio, ponatur olei rosati cum aceto, vel albumine oui fortiter agitato. Potest etiam addi pulvis myrtill. vel rhab. supra partem. Si autem dolor fortissimus esset, fiat catapl. ex oui albumine, & vitello fortiter agitatis, & addatur ol. chamomillæ & viol. an. ʒ. ij. farinæ hordei, florum chamomillæ ana ʒ. j. fiat cataplasma, ponatur supra partem affectam. Si dolor non sedetur hoc remedio, fiat aliquod ex præcedentibus, ut ex foliis papaveris, hyosquiami, vel addatur succus alicuius herbe ex prædictis cataplasmatibus.

De Aurium tinnitu.

CAP. LXVIII.

Eodem modo, iisdem remediis curatur tinnitus aurium, cui maximē conducit medulla cruris porci supradicta. Fiet autem præstantissimum remedium hoc modo.

R. colocy. ʒ. ʒ. succi rutæ & amaraci ana ʒ. j. cumini, *Oleū præcarui ana ʒ. ij. fiat decoctio in vino & ol. amygd. amar. præstantiss.* decoquantur usque ad consumptionem vini & exprimantur omnia, & colentur. Utantur hoc ol. frequenter iniiciendo in aurem. Et semper habeant aures obturatas bombace moscato. Aliud præstantissimum remedium, maximē si cum surditate sit aurium tinnitus.

R. radic. ellebor. albi ʒ. iij. foliorum lauri & rutæ ana M. ʒ. foliorum fraxini M. j. fiat deco. in ol. amygd. amar. vel de kernæ, vel nucum, sed hoc erit efficacius, & cū vino albo, vel maluatico decoq. ad consumptionem vini, exprimantur fortiter, & colentur. Iniice de col. in aurem

Sternuta-vt suprâ. Maximè conferunt sternutamenta ad tinnitus *mētamax.* aurium curandos, si frequenter excitentur. Nam flatus *conferunt.* cerebri non minus per aures, quàm per nares discutuntur. Aures semper habeant occlusas, donec perfectè curati fuerint, maximè quando ventus australis vel borealis fiat, sed magis cum borealis, quod maximè obseruandum est in scotomaticis. Nā si aures flatibus oppleantur, paroxysmum excitant. Idem fit in epilepticis. Vtatur pul. post pastum carminante ventositates, qualis est præscriptus cap. de scotomia, vel fiat hoc modo.

Pulu.

℞. cymini, carui, maceratorum in aceto, & leuiter coctorum ana 3. iij. fileris montani, fœnic. an. 3. j. cinamomi, macis, ana 3. ij. anis. 3. iij. coriandri 3. j. β. sacch. ad duplum omnium, fiat pul qui si ingratus sit ori, dosis cinamomi augeatur. Capiat à pastu cochlear vnum.

De surditate.

C A P. L X I X.

Curatio.

Surditas omnis curari non potest, vt quæ post morbum acutum accidit, & antiqua. Talis verò dicitur, si duos excessit annos. Quæ curationē admittit, his remediis curari potest. Primum leuiter purgetur corpus, & frequenter, vt bis in hebdomada capiendopilulas sine custodia, quales sunt de hiera simpl. & compos. de assaieret & similes. Concoquatur humor peccans appropriatus, & euacuetur fortioribus pilulis. Post pilulas vtatur theriaca, vel mythridatio. Intra vel circa aurem ponantur, quæ vim habent deobstruendi, calf. & attrah. vt sunt, quæ suprâ in tinnitu aurium dicta sunt. Olea, quæ maximè commendantur, sunt ol. raphaninum. de scorpinibus, nucum, oleum vetus, in quo decoq. colocynthis, ol. cucumer. agreß. laurinum, balsami, pilos. petroleum, & omnia, quæ sunt tenuium partium. Sed duo vltima sunt ponenda cum maxima animaduersione Nam facillimè penetrant, & facilè dolorem & inflammationem excitâr. Miscenda est itaque pauca eorum quâtitas cum ol. imbecilliore, vt cum ol. amyg. amar. Maximè commendatur medicamentum illud, quod cōpositum est ex foliis rutæ, fraxini, & rad. elleb. albi, cap. superiore, & quæcunque illic sunt præscripta. Sternutamenta, mastica, caputpurg. maximè laudantur ante vsum topicorum. Si

Quæ conueniunt aut topica.

surditas à sanie vel vlcere proueniat, abstergenda erit sanies,

sanies, & vlcus exiccandum, & corpus euacuandum. *Surditas*
 Iniicienda in aurem sunt, quæ vim habent abstergerendi, *tis à sanie*
 succus cepæ, porci, cuc. agrest. cum melle, vel ex fellibus *curat.*
 mitioribus, quale est porcinum, vel agninum. Postea
 tutò adhibentur, quæ vim habent exiccandi, vt vlcus
 ducatur ad cicatricem. Dissoluantur trocisci in succo,
 vel decoctione aliqua medicamentorum abstergentiû,
 vel exiccantium, vt trocisci albi Raf. sine opio, & alia,
 quæ ex cerusa, pompholige, seu tuthia parantur.
 Præstantissimum remedium fiet hoc modo.

R. scorix ferri ʒ. j. decoq. in vino, quod postea ini-
 ciatur in aurem. Fit etiam decoctio in aceto, sed cauen-
 dum est, ne acetum nimium acré sit. Nam sua acrimo-
 nia irritat vlcus. Alia quoque, quæ fortiter exiccant,
 plurimum valent, siue in forma vnguenti, siue iniectioni-
 nis. Sed non sunt probandæ iniectiones ex oleis in hac
 specie. Nam oleum est vlceribus inimicum, & maxi-
 mè aurium vlceribus. Quòd si ponatur ol. id fit, vt ob-
 tundatur acrimonia aliquorum exiccantium cum ve-
 hementi morfu, alioqui nunquam ponendum est. Sur- *Surditas*
 ditas, quæ post ictum prouenit, si per aliquot menses *ab ictu*
 perseveret, incurabilis est, quoniam cum fractura, vel *incura.*
 distentione nerui, & tympani est. Quæ autem à catar- *A catar-*
 rho fit, curatur auertendo in aliam parrem fluxionem, *rho surdi-*
 & consumendo, quod parti impactum est. *tas.*

De sternutatione.

C A P. LXX.

Sternutatio est motus facultatis animalis à causa
 præter naturam commotæ, in quo flatuosæ cuiusdam
 substantiæ confertim per nares cum spiritu fit expulsio.
 Non solum enim, qui è cerebro sonum edit, excernitur
 spiritus, verum etiam è pulmone euidenter efferri con-
 spicitur, sese vniuersim & repentè contrahente, pellere,
 ob eamque causam sternutatione fieri, cuius omnes ex-
 pulsiones per cohibitionem, & retentione spiritus fieri
 consueuerunt. Nec verò cuiquam mirum videri debet,
 spiritum vnico impetu, tum à thorace, tum à capite ex-
 cuti. Thorax enim cerebri motum sequitur, quod com-
 mune è natura factum esse videtur, vt respirationis ne-
 cessitas eodem tempore per vtranq; partē expelleretur,
 ne alioqui altera alterius munus interturbaret. Strepit

Dua sunt autem spiritus ille, vel quia confestim erumpit, vel quia *caussa ster* ei per angustum, vt scribit Hipp. est exitus. *mutatio-* *vis.* sunt sternutationis causæ: vna, quæ à cerebro prodit, de qua Hipp. scripsit, sternutamentum è capite concitari calfacto cerebro, aut humectato eius inani spacio, aëre intus contento foras erumpente, illudque generationis principium habet appetitionem naturæ, flatuosum illum spiritum excernere gestiæntis. Ideo verò calfacto cerebro, & præhumectatis eius ventriculis fieri dixerit, quia calor siue internus, siue externus à quauis causa, vel etiam frigiditate ambiente, intentior factus humiditates in cerebro attenuat, & rarefacit, atque in flatuosum spiritum vertit. Atque ob eam causam inter bona iudicia in morbis exitialibus, exceptis his, qui pulmones exercent, recensuit Hipp. Securitatem enim (vt Gal. explicat) polliceri videntur, si præcedente morbo superuenerint, etiam si lethalem esse alia signa declaræt. Sunt enim coctionis argumenta, & cerebri facultatem robustam ostendunt, quæ defectis ex nare flatuosis spiritibus cum quadam humiditate, interdum sensu perceptibili, & manifesto, interdum obscuro, & insensibili sternutamenta commouent. Ad hæc indicant naturam antea torpentem & languentem, nunc expergefieri, & excitari, & per eam motionem reminisci. Addit verò alio in loco capitis grauitatem, cephalalgeasque varias, quas vaporosi spiritus copia excitauit, euidenter subleuare, quia fit rarefactis humoribus in capite contentis, & naturæ impetu excretis, qui rarefiunt è naturæ calore sese exuscitante, excalfacti, propter cuius imbecillitatem prius coaceruata fuerat superuacanea humiditas. Atque hæc commodè præstat sternutatio, quæ à cerebro initium motionis habet. Altera verò causa est, quæ ab altera causa cietur, cum quid mordax & vellicans, veluti penna naribus inditur, aut si naribus sursum elatis, aër frigidus inspiretur, sua qualitate cerebri meninges ferit, & sursum mouet. Ex eodem facultas ad excutiendam molestiã è narium meatibus, vt in tussi à pulmonibus, & aspera arteria concitatur, & spiritus per eos valentiùs, vel confestim delatus, sibi vias non aliter, quàm tibias aut fistulas artifices, expurgant. Magis ta-

men eos humores, qui in aspera arteria hærentes difficulter reuincuntur & solvuntur, sternutationes expellunt, utpote quæ validiorem, quam tussis, habeant impetum. Quibus vires sunt adeo imbecillæ, ut excrementa in thorace contenta excurrere nequeant, nares sibi lacessendo sternutamentum superueniens, bonum esse scribit Hippocrates. Sic etiam singultum sanari experientia patet. Sunt autem, quos ubi præhendit hæc affectio, semel exercet, alij, quos sæpe, sed quia sine periculo his accidere, raroque corporis affectionem noxamque maiorem attulisse visi sunt, pauci sunt, qui de illius curatione scripserint. Sæpe tamen multi sternutando moriebantur, animamque efflabant, aut epileptico insultu conuellebantur, & concutiebantur, unde inualuit consuetudo apud Christianos, ut sternutanti bene precetur, quod ex gentium persuasione sumptum est, quæ aliquid omnis, ut

*Christia-
norum
consuet.*

eorum monumenta testantur, nimium superstitiosè adiciiebant. Verùm de his satis. Si cui frequentior sternutationis concussio molestiam adferat, apprehensis naribus & spiritu retento per aliquod tempus cõpescit. Dicimus enim cõtracto cerebro eam fieri. Cùm ergo sternutamentum retinemus, dilatatum cerebrum servamus, ex quo concitationem eius frequenter sistimus. Si verò aer, aut spiritus mordax, aut rei cuiuspiam odor, ut rosarum bene multumque redolentium, vel gratus, & acutus, ut cinamomi, aut vini, aut tenuis quædam substantia naribus recepta, qualis est pul. euphorbij. veratri, costi, & similium, ex quibus medicamenta sternutamentum mouentia efficiuntur, hanc excitat (quod sæpe euenire solet) qui pul. hos præparant, nares sibi diligenter obturent, vel pro remedio erit contraria substantia naribus admosa, ut est, opium, mandragoræ radicem, vel panem olfacere, quæ omnia morsum contrarium causarum frangere, & obtundere celerrimè possunt.

De catarrho.

C A P. LXXI.

Defluxio siue catarrhus interdum à materia frigida, interdum à calida est, atque modò ad fauces, modò, pectus, modò ad aures, ad oculos partim fluit, quorum omnium curationes postea mōstrabimus. Si materia sit calida, & venæ distentæ appareant, vel si ad oculos, pa-

*Quando
mittendus
sanguis.*

*Quibus
retinetur
catarrhus.*

*Calidis
hac con-
ueniunt.*

latum, vel ad pulmones fluat, vel si cum febre gignatur, sanguinem mittere oportet, nunquam autem alia ratione. Diuertendus erit clystere, & purgatione, vel cum decoctione tamarindorum, & aliorum soluentium, & incrassantium. Eos leuiter purgare oportet, ne materia, quæ fluit, magis exagitetur, sed potius sistendus est defluxus. Postea extra paroxysmum eradicabitur materia. Ad retentionem catarrhi, fiunt gargarismata, fumigia, & lacellationes, supra caput, & caput purgia, sed fumigia magis laudantur, postea caput purgia, & cum materia ad fauces fluit, gargarismata, cum ad oculos sit defluxio fumigia fiunt diuersis modis, & rationibus, & magis sunt necessaria in materia frigida, quam calida. Quæ tamen calidis catarrhis conueniunt, hæc sunt.

R. fumigij aceti demissi supra lapidem ignitum, vel ferrum, vel fiat sic.

R. ros. rub. coriandri præparati ana ʒ. j. gummi hederæ, sandaracæ, mastich. olibani, ana ʒ. ij. tro. de camphora ʒ. ʒ. seminis papa. albi ʒ. ij. concass. & fiat fumig. quo suffumigantur cooperimenta capitis, & recipiat aliquem fumum. Optimum erit pro catarrho valde subtili, & calido gargarisma, quod faciendum erit ex incrassantibus & astringentibus, vt si quis ex syr. de papau. cum aqua ros. vel plantaginis gargarisma conficiat, vel ex decoctione cotoneorum, malorum granatorum, & ros. ana ʒ. j. seminis pap. albi ʒ. j. fiat decoctum, in quo addatur syr. iuiubarum, viol. vel de papa. qf. In garga. enim ponitur syr. ad dulcorandum. Pro tb. j. decoctionis solent poni ʒ. iij. syruporum. Bonum est tenere in ore formulas de bolo, vel pilulas de arnogloss. tabula vna diapapaueris albi. Vel si velis, conficiantur formulæ ex astringentibus & incrassantibus sic.

R. mastich. thur. ana ʒ. ʒ. opij ʒ. ij. penidiarum ʒ. iij. cum syr. iuiubarum, fiant formulæ, teneat in ore. Vel sic.

*In fluxu
retento
quid fa-
ciendum.*

R. pul. diapap. albi ʒ. j. seminis papaueris albi leuiter conuassati ʒ. ʒ. boli armeni, terræ sigillatæ ana ʒ. ij. sacch. candi, penidiarum ana ʒ. ij. succi gly. ʒ. j. fiant formulæ cum syr. iuiubarum, vel cum aqua infusionis gummi trag. teneat in ore. Fluxu aliqua ex parte retento

conco-

concoquenda erit materia syrup. incrassantibus, quia semper aliquid ad fauces defluit, vel ad pulmones, & morbus est cum fluore, ob id reuocandi sunt syrup. alterantes materiam calidam cum quadam apertione, vel magna deterfione, vt syr. cichorei. & alij id genus. Eligendi autem sunt, qui refrigerant, & incrassant, & syr. in-
 partes exasperatas leniendi vim habent, quales sunt *crass. re-*
 syr. viol. de iuiub. de n. nuph. de papa. & similes, si cum *friger.*
 decoctione pectorali misceantur, vel alio remedio magis appropriato. Et miscetur his syr. interdum syrupus de ros. succis, sed id faciendum tantum, cum materia est mixta, vel violarum, vel ros. cum alijs syrupis. In materia calida præscribi possunt in minori dosi. Aquæ *Aqua*
 laudantur, vt viol. ros. capil. ven. scabios. & similes. Fiunt decoctione ex astringentibus, vel lenientibus pro necessitate, vt,

℞. olubani, mastichis ana ʒ. ij. concoquantur leuiter in aqua. In lb. j. col. diss. syr. de papauere & iuiub. ana ʒ. ij. & hoc erit in principio cum materia adhuc fluit.

℞. syr. de pap. ʒ. j. syr. iuiub. & viol. ana ʒ. ij. datur cum *Astringē-*
 aqua hord. & fiat hoc modo decoctum. *tia in*

℞. glyc. ras. ʒ. iij. ros. rub. viol. ana p. j. quat. semin. fri- *princip.*
 gid. maior. ana ʒ. ij. seminis papaueris albi ʒ. j. pass. contritarum cum grana (quia intentio est astringendi) sebesten ana N. x. hord. integri (cum magis incrassare volumus & lenire, quàm abstergere) p. j. fiat decoctio. In col. diss. syrup. viol. & iuiubarum ana ʒ. iij. misce, pro iij. dosibus

℞. elect. diatrag. frigid. tabellam j. pro dosi. Cum autem materia fluit ad fauces, abstergentibus abstinemus, & utemur tantum lenientibus & incrassantibus & concoquentibus, vt postea monstrabitur. Euacuatur autem pilulis, sine quibus, cochiis & alijs euacuantibus capite sed multum, sine quibus, cū tertia parte cochiarum, vel electario aliquo laxatiuo, vt de citro sol. indo, diaph. Addetur aliqua pars diacart. syr. ros. laxatiui cum aliqua parte syr. viol. & cum decoctione pectorali, aut syr. viol. cum decoctione myrobal. cui addimus interdum grana aliquot diagridij, maxime cum utimur syr. & decoctione.

*Quando
 abstinendum
 ab abstergentibus.*

*Catarrhus frigidus.**Gargarisma.*

Catarrhus frigidus constringendus est magis, sed cum astringentibus calidis, vel mediocriter incrassantibus. Ergo si fiat, garg. astringens fiet hoc modo.

℞. ciperi, cal. arom. glyci. ana ʒ. ij. fol. lentisci vel myrtill. ana M. ʒ. cortic. thur. ʒ. ʒ. fiat decoctio. In colatura diss. diamori ʒ. ij. mellis ros. ʒ. ʒ. fiat gargarisma. Liquiritia ponitur magis ad leniendum partes exulceratas, & ad dulcorandum. Semper enim ab indicatione partis miscenda sunt, quæ leniant asperitatem. Potest sic fieri fumigium.

Fumigium.

℞. ros. rub. nigellæ torrefactæ, gummi hederæ, boracis facti ana ʒ. j. coriandri ʒ. ij. auripigmenti cuiuslibet ʒ. j. contundantur, fiat fumigium, quo fumigentur panni, & cooperimenta capit. Et si tussis non adsit, potest aliquid fumi per os recipere. Possunt adhiberi ligni aloes ʒ. iiij. galliæ & aliptæ moscatæ, styracis, calami. ana ʒ. iiij. pro ditioribus. Minuatur materia clystere acri, concoquatur syr. calid. Et si fluat adhuc materia, miscantur aliqua leuiter astringentia, vel frigida aliqua, quæ vim habent incrassandi, vt,

℞. mellis ros. col. ʒ. j. syr. de glyc. vel de hyss. iuiub. aut viol. ʒ. j. Si autem materia tota iam defluerit, sunt tantum vsurpandi syrupi materiam concoquentes, & detergentes. Euacuabitur autem pilulis coctiis in maiore dosi, quam superius factum est, de sarcocolla, de agar. assaieret, de hiera composita, de mastiche, non autem aureis nec aliis fortioribus. In frigida materia datur theriaca, media, vel mythrid. vt in calida theriaca recens danda. Teneant in ore thus, aut bolum armenum ad sistendam defluxionem, vel fiant formulæ sic.

℞. thuris, mastiches, cyperi ana ʒ. j. succi gly. boli arm. præparati ʒ. ij. sacch. candi. penidiarum ana ʒ. iiij. gummi trag. arabici ana ʒ. ij. carnis pass. cum aliis contusarum ʒ. ʒ. formentur cum syr. viol. vel de iuiub.

In catarrho perseverante quid agend.

formulæ instar lupinorum. In catarrho perseverante optimum est dare pilulas de styrace ad sistendum fluxum, quæ tametsi opium recipiunt, non sunt vituperandæ. Recipiunt enim styracem, & alia, quæ frigiditatem eius reprimunt. Pilulæ Mes. vel de arnoglossa, vulgò cynogloss.

no gloss. ad omnes catarrhos magis conueniunt in materia calida, quam frigida. Nam opium & hyosquiamus superant. In catarrho frigido ad cerebri robur, bonum est vii hoc puluere capitali.

R. cyperi, corti. ciuri ficci an. 3. j. caryoph. cardamomi an. 3. j. B. nig. torrefactæ, granorum tinctorum, coriandri preparati an. ʒ. iiii. macis 3. j. n. elis. siccæ sampsuci an. ʒ. ij. B. stecha. ros. rub. an. ʒ. ij. fiat pul. quo sinapizetur pars anterior capitis serò, in lecti ingressu, & manè. Fiat byetrum sequens.

R. meliss. beto. ocymi, sampsuci an. M. B. salis torrefacti, thuris, mastich. an. 3. ij. rad. acc 3. ij. nucis moscatæ, caryoph. styrac. cal. ladani an. 3. j. B. ros. p. B. cum syndone rub. fiat byetrum. Vel pomum odoriferum.

R. nigellæ torrefactæ 3. ij. nucis cupressi, caryophyllo- rum, sampsuci ficci an. 3. j. ligni aloes, gallæ mosc. an. ʒ. ij. ladani 3. ij. cum cera fiat pomū odoriferum, ad sistendum catarrhum post euacuationem. Si defluxio fiat ad aliquam partem, vel ad pectus, vel ad collum, curanda erit hoc modo, parti adhibendo sequentia vnguenta ad resolutionem, quæ dicentur cap. de angina.

De grauedine.

CAP. LXXII.

HVmorem tenuem, crudum, & aquosæ pituitæ persimilem, qui per nares affatim à cerebro prolabitur, & in quibusdam tempore frigido stillatim decidit, Græci corizam, Latini grauedinem, nostri (Roupie) appellant. Illa autem est defluxio, quæ ex cerebro in illam partem per ossa ethmoidea decumbit, cuius materia est cerebri excrementum, quàm gignunt intemperans, humidiorque vietus, & capitis imbecillitas intemperiesque frigida, aut calidior, aut copiosius & non satis congruens cerebro suppeditatum alimentum. Id enim facile procreat excrementa pituitosa, quum refrigeratum non est subigendo alimento, aut perdomando. Nam quale per diarrhoeam in ventre per cruditatem malum est, tale grauedo in capite, quæ in senibus frequentior est, iuuenibus verò minus. Intemperies calidior generationis causâ est, quòd maiorem vaporum humorumque

copiam cerebrum ad se euocat, quàm prae copia possit digerere: constitutiones ad hæc calidæ & humidæ caput replentes idem præstant. Eam vero materiam expellit, & à capite deturbat frigus exprimens. Vbi enim ab aliqua causa repletum fuerit caput, frigus superueniens veluti manu quapiam extrinsecus apprehenso, & compresso tanquam spongia cerebro, contentam humiditatem exprimit, & in partes capite inferiores detrudit. Æstus præterea, ut solis & causarum similium, vim calfaciendi habentium, quam ex accidenti interdum frigus obtinet, dum calorem naturalem intro agit, & reuocat, eoque modo interiori reddit, humores in capite cummulatos liquando, & dissoluendo efficiunt, ut pondere suo in subiectas partes profluant, grauedinisque causæ existant, qui si acrem quendam & mordacem qualitatem prius in ventriculis cerebri contraxerint, ea per se potens est facultatis expultricis munus minus ad excretionem aptum sollicitare. Quam ob causam stercuramenta præcedere consueuerunt, vel ob flatuosi spiritus cum eiusmodi excrementis commixtionem, vel ob fluxionem confertim prolabentem, quibus efficitur, ut nec diu adhærens, nec diu retenta in ossibus ethmoidis, crassitudinem nullam acquirat, nec ab ære immutationem ullam recipiat, unde & calida (nisi per frigora ingentia, cum ad extremitatem narium delata est, perfrigeretur) & tenuis feròque persimilis, dum distillat, apparet. Excitatur interdum alia grauedinis species crassior, à crassiore & simul flatuosa pituita, quæ ob id diutius naribus adhæret, easque obstruit, & molestiam magnam in illis parit, in qua, ut & in superiore, qualitatis & quantitatis, eorumque excrementorum atque unæ causarum, quæ præcesserunt, contemplatio, capitis affectum demonstrat, siue calida fuerit, ut ex solis æstu, & similium calfactione, siue frigida, ut in refrigeratione. Hoc etiam pituitæ generatione accidit, ut quæ à vehementissima frigiditate, ne euadat, accidat. Et quæ à calore caput repente salsa aut acris, sicut & quæ propter exiguam sit frigiditatem, nullam ad gustum manifestam qualitatem, aut certè paucam dulcedinem præ se ferat. Quibus præterea grauedines ex solis offensione accidunt, caput

caput ipsis non modò calidum, sed etiam sanguine plenum conspicitur, adeo ut omnes venæ, quæ in oculis, temporibus, fronte, & tota facie conspicuæ sunt, turgescant, & inflentur. Perfrigeratis vero cutis minùs calida est, oculi non admodum tumentes, nec ullus in facie calor, sed minorem præ se fert molem.

Curatio.

Vtriusque autem affectionis curatio, cerebri resiccatione, vel levi refrigeratione, ut materia inspissetur, perficitur: denique cum probò successu tale fumigium sum in me expertus. Laminam ferream, donec omnino candescat, igni subiicito, calfactam aceto rosæ illic sensim instillato irriga, vaporémque ex eo elatum per nares recipito. Quòd si efficaciorém velis, rosas siccas simul cū aceto super laminam ipsam ferream conijcito, & in fine fabas integras, & aceto inspersas, aut dum vruntur, laminam ipsam rursus aceto irriga, quæ ad horum symptomatum leuium curationem sufficiunt. Cætera, quæ à nobis de catarrho dicta sunt, huic instituto (affectionis tamen & partis indicatione obserua) accommodari possunt.

De dentium dolore. C A P. LXXV.

Dolor dentium fit ob deflexum alicuius humoris frigidi, quem cohibere oportet. Si tempus patitur, & dolor perseveret, sed non admodum vigeat, purgetur pilulis euacuantibus pituitam. Postea apponentur emplastra, quæ fuere præscripta de ophthalmia non vera vel fiat emplastrum ex pice sola, vel si reperiatur emplastrum contra rupturam, vel comitissæ, vel de mastiche, sumatur, vel fiat tale magistraliter.

Purgatio.

Emplastrum.

℞. thur. hypoch. ladani ana 3. iij. picis, mastich. ana 3. ij. ol. lentisci parum, fiat emplastrum, & hoc confert, quando dolor fit ab influxu materiæ crassæ & frigidæ. Quòd si perseveret, & materia calida, acrisque sentiat, adde seminis papauæ. albi 3. j. vel meconij 3. j. Prodest in principio aliquid opi, aut spinæ albæ adicere. Ad doloris sedationem fiat talis decoctio.

℞. sol. sal. M. β. radic. pentaphili 3. ℥ gall. 3. ij, fiat decoctio in vino styptico, quo colluatur os. Hæc decoctio sedat dolorem, & sistit fluxionem. Vel fiat sic.

Ad sedationem doloris decoctio.

*Mastica-
torum.
Topica.*

*Fumiga-
tio.*

*Medica-
mentum.*

R. hederæ M j. cortic. mori, vel lentisci 3. j. gall. 3. *℞.*
fiat decoctio in vino styptico, quo colluatur os. Si purga-
tum sit corpus, aut alioqui caput non sit plenum multa
pituita, mastice pyretrum, alioqui magis attraheret, &
maiolem dolorem excitaret. Præstantissimum reme-
dium est theriaca dentes fricare, vel mythrîd. aut syncrî-
to, modò hæc remedia non sint nimis antiqua. Nam ex-
iccant & stupefaciunt. Succus allij missus in aurem è di-
recto partis affectæ, leuat dolorem, quod facient & o-
mnia quæ calfaciunt vti ruta, matric. vel oleum aliquod
calfaciens immissum in aurem, vti laurinum, costinum.
Si dens corrosus fuerit, extrahatur. Fumigatio cum re
aliqua calida recepta per emporum sedat dolorem, vti
ex decoctione saturiæ. Si vermes adsint, admisceantur
amara, vti occidantur, & fricentur dentes theriaca. Supra
dentes feliciter ponitur hoc.

R. aloes 3. j. caphuræ 3. *℞.* aquæ vitæ 3. *℞.* dissol. & cum
bombace admove denti. Aduerte, nunquam aut raro
dentes dolere, nisi arrosi fuerint, & corrosio vique ad ca-
uitatem internam pënetret, ac neruum tangat. Præterea
omnium maximè dolere maxillares seu molares, inci-
sorios autem raro, aut nunquam. Quare vt affectus is
tollatur, cauterio aut aqua separationis auri dentes adu-
runt: Sic enim neruus sensum illum exactum amittit.
Id si frequentius fiat, & fortius imprimatur, ac dens cor-
rosus fuerit valde, in partes sensim rumpitur, & extrahi-
tur. Dentes etiam corrosi ferro euelluntur. Quod si ob
cruciatum quis ferre id noluerit, aqua forti replenda est
cauitas dentis. Nam alimentorum & præsertim dul-
cium porrio, in cauo dentis retenta, putrescit, atque ita
dolorem infert, vel fœtorem, & erosionem auget. Quare
& ratione & experientia optimum reperies, dentis ca-
uum implere, ne quidpiam ingrediatur, quod partem
illam sensilem contingat. Repletur verò mastiche man-
sa, & mollita. Nam si apponuntur, quæ dura sunt, dolo-
rem excitabunt. Sunt qui cera opplent, sed meo iudicio,
ea parum conuenit, quia vim emolliendi habet, præser-
tim si recens fuerit. Si tamen ea velimus vti, admiscebi-
mus salem vel alumen, vel aliud, quod siccet, & astrin-
gat, præsertim si dens madeat. Vel ceram albam potius,

vt quæ ficior est, ac vim quandam astringentem obtinet. propter eius præparationem: vel rubram, quæ ob cinabrium dentes præparat, vt facilius euellantur, vel in partes confringantur. Viridis tamen magis laudanda est, quæ vehementer siccet ob æruginem. Post hæc siccantibus aliis erit vtendum, ne ea, quæ dentes extergunt, tandem eos acrimonia sua erodât. Si fœtor adfit, adde moscum: si putredo, myrrham, & opple cavitatem. Potest autem repleri bombace, qui odorem mosci habeat. Soler enim moscus in eo asseruari. Id tamen faciendum non est in his, qui obnoxij sunt dolori capitis, aut vertigini, quia odoribus læduntur.

De dentibus tremulis. CAP. LXXIIII.

Tremunt dentes, & maximè incisorij qui vna tantum radice nituntur, relaxatis gingiuis. Relaxantur autem ob nimiam humiditatem, vt videre licet post sudationem in morbo gallico, cum non solum tremunt, sed plerunque etiam decidunt. Ob id oportet medicamenta non solum esse siccantia, verum etiam astringentia, vt alumen, nux cupressi, radix pentaph. & bistortæ, rosæ & earum semen, & capitulum, & similia his adduntur, quæ siccant cum quadam caliditate, modò nulla sit inflammatio, vt flores anthos, qui siccant simul & corroborant. Abstinentum à chalcite, cortice mali granati, gallis, balauistiis, quia dentes denigrant.

R. radic. pentaph. & bistortæ ana ʒ. ij. ros. cupulorum gland. spongiæ bedegar. ana ʒ. ʒ. fiat decoctio in aqua cisternæ, vel ferratæ.

R. aquæ cuspid. ros. ʒ. ʒ. aluminis ʒ. ʒ. misce, fiat decoctio, foueantur dentes.

R. aluminis, corall. rub. ana ʒ. ij. sumach. spong. bedegaris. rad. bistortæ ana ʒ. j. pulueriscentur & cum succo cydoniorum fiat confectio. Prodest aqua aluminosa. Præsertim si inflammatio adfit, vel aphthæ in aliqua parte oris: Vel gutta aquæ separationis auri diluta aqua plantaginis vel peculi ros. vel caudæ equinæ, vel etiam aqua communi, si alia desit. Hæc enim dentes stabiliunt & simul dealbant. Relaxantur etiam dentes, carne gingiarum absumpta, quæ replebat, & firmabat interualla

Relaxatio dentium.

Relaxationis alia causa.

dentium. Absumitur autem caro propter carnem dentium. Huic affectui occurrimus ablatione cariei, quæ est supergenita. Deinde aceto scill. dentes fricamus. Postea vtimur puluere præscripto, qui carnem siccando regignit. Magis conueniens remedium fieri, additis sarco-
 tici, vt thure, & eius cortice, radice panac. aut ireos, aristoloch. vel farina orobi, nisi amaror prohibeat. Pistolochiæ & ireos radix id præstat, & odorem gratum & iucundum spirat. Nam in affectibus oris ea medicamenta deligenda sunt, quæ odorem, vel saporem nullum, vel iucundum habent. sed odor quidam castigari potest admixtis odoratis: ingratus autem sapor, non item facile. Solet enim emendari dulcibus. Ea tamen dentes putrefaciunt, & dolorem excitant dentium. Citra tamen noxam hæc addimus, mel rosa. col. & melius oxymel scill. Sacch. ficus & similia dentes corrumpunt. Quare non possum probare, quod multi faciunt, qui in dentium dolore ficibus vtuntur. Nam si hæc, cum non adesset, dolorem inducunt, multo magis præsentem adaugent. Omnis itaque dentium affectus. siccantibus & astringentibus curatur, ac dolor lenitur, quem in aliis partibus astringentium vsus solet augere. Ob id olea omnia, & a-
 xungia denique, quæcunque vim habent relaxandi, & emolliendi, fugienda sunt. Fit aliquando, vt caro illa, quæ est in interuallis dentium, supercrescat, & sanguis intermandendum reiciatur. Tunc frigidis & astringentibus caro illa laxior duranda est: vt aqua aluminosa, quæ repellit sua frigiditate, & astrictione. Prodest etiam colluere os succo cydoniorum, aut alicuius herbar, quæ sit prædita simili facultate: Vel mandere pyrum, vel malum cydonium. Postea vile fuerit pulu. coralli rub. & spongiæ bedeg. & radic. bistortæ inspergere.

Dentium dealbatio. CAP. LXV.

Dentes nigri dealbantur hoc modo: Aspera & siccantia, quæ sua vi deterforia dentes dealbant, vtuntur, & tamen demum in medicamenta sicca, aut opiata redduntur, aut puluerisata, & gummi arab. excepta formantur in dentifricia.

Dentifric. R. aluminis. coralli albi, rad. bistortæ ana ʒ. j. fiat pul. quo fricentur dentes. Efficacius est, si os sepiæ, aut cornu cerui,

cerui, aut cinis panis hordei, pariet. rad. betæ, asphodel-
lorum, ouorum, ostreorum addantur hoc modo.

℞. parietar. capil. ven. ceterach. an. M. j panis hord. ʒ. *Pala.*
ʒiij. cortic. ouorum N. xxx coralli rub. cortic. thur. cornu
cerui an. ʒ. ʒ. ponatur in vase, coquantur in furno. Adde
cineribus ad odoris gratiam, caryoph. coriandri, cina-
momi an. ʒ. ʒ. ofsis sepia ʒ. iiij. fiat pul.

℞. pul. præscripti ʒ. ij. aluminis ʒ. j. cum mosco, gum. *Dentifric.*
mi trag. & arab. extracta cum aqua ros. aut cuspid. ros.
aut aqua cisternæ, aut ferrata, aut vino astringente,
siant dentifricia oblonga, fricentur in sole, vno ex istis
dentes.

℞. cineris præscripti ʒ. iiij. salis communis, dentium
equorum vstorum an. ʒ. j. cum oxymel. scill. fiat opiata,
qua fricentur sæpe dentes, & abluit post, cum aceto scill.
Hoc ad dentium corrosionem multum confert. Vti-
lius adhuc erit, si myrrham addas, vel hoc modo com-
ponas.

℞. aluminis vsti, myrrhæ, massices an. ʒ. ʒ. salis ʒ. j.
excipiantur cera alba, & ablutum prius dentis cauum
mixtione impleatur. Ad dealbandos dentes & conser-
uandos.

℞. panis frumenti, amborum corall. cornu cerui an.
ʒ. ʒ. aluminis ʒ. ij. parietar. capil. ven. ana M. j cortic.
ouorum N. iiij. aliàs N. x. ponantur omnia in vase fictili
in furno, & perfectè conterantur, & cinis seruetur vsui,
& fiat sic.

℞. cineris præparati ʒ. iiij. cinamomi ʒ. ij. caryophil.
macis an. ʒ. spicæ, cal. arom. an. ʒ. ʒ. mell. ros. col. q. s. ad
incorporandum aceti scill. ʒ. j. fiat ad formam opiatæ, *Opiata pro*
qua manè fricentur dentes, & postea vino abluantur. *dentibus.*
Hæc conseruat à putredine, & dealbat dentes, & est me-
dicamentum non ingratum: & quibus malè olet anhe-
litus ob dentes corrosos, competit. Possunt addi mosci
vel ambra grana aliquot, vt foetorem dentium emen-
des. Si dentes tremulos velis confirmare, & conseruare,
adde mastich. ros. rub. nucis cupressi ana ʒ. j. Ad deal-
bandos dentes parantur dentifricia ex radic. bismal. sic
paratæ. Corrigitur radix bismal. & mundatur diligen-
tissimè, & diuiditur in partes longas quinque vel sex di-

gitos, decoquatur in aqua, sale, & alumine. Si addatur radix ireos, decoctio magis odorifera erit. Vbi decoctæ sunt radices, ponuntur in furno, vel sole, exsiccantur, & illis radicibus dentes fricantur, purgantur. Antiqui magis probabant lentiscum, quia absterfionem habet, quæ gingiuas roborat. Laudatur autem bismal. quia mollis est, nec lædit carnem gingiuarum, & astringionem acquirit ex alumine, eius quoque lentor ab eodem alumine & sale castigatur.

De oris fœtore.

CAP. LXXVI.

*Causa fœ-
tqris.*

Fœtor oris vel propter corrolum dentem fit (relinquitur enim in cauitate dentium aliquid ex alimentis assumpris, quod dum putrescit, os fœtens reddit) vel propter vlcus in interna parte oris factum, vel propter pulmonis vlcus, vel propter alimenti corruptionem, vel propter nimium vsum carnis. Nam, vt experientia compertum est, omnia animalia, quæ carne vescuntur cruda, vel multa, animam male olentem habent. Item propter nimiam humiditatem partium oris. Pro diuersitate harum causarum, oportet rationem curandi inuenire. Si à corroso dente proueniat, sufficit dentifricio ex lentisco, aut alia re, post pastum, cibi reliquias auferre, sale dentes confricare, & vino, vel aqua os abluere, aut aqua & aceto. Si ita corrosus dens sit, vt sæpe dolorem inducat, extrahatur. Si autem vlcus sordidum sit in causa, diligenter detergatur aquis supradictis in cap. de Ozena, addita aqua ros. vel myrt. Idem facit si ab humiditate nimia vt nimio sputo accidat, facta prius purgatione pilulis de assaieret, aut aliis fortioribus, si opus fuerit: Deinde aqua cisternæ sale, & aceto ros. os frequenter abluere. Si ab vlcere pulmonis, curandum est vlcus. sed qui patiuntur talia vlcera, frequenter vtuntur rebus dulcibus, quæ fœtorem oris faciunt. Ob id odorata aliqua in ore continere debent. quæ sunt illis orportuna, vt conserua ros. Si autem à cibi corruptione odor aciditatem referat, purgandus est pituita ventriculus, & postea aromatici rosati confectione, vel de cinamomo, vel de elect. diatr. ventriculi concoctionem emendare. Si verò alium odorem referat, medicamenta alia danda sunt, quæ bilem, & alimenta corrupta euacuent, & ventriculum vtrun-

*A cibi cor-
ruptione.*

que

que exiccent vt rhâb. succus rosarum, syr. ros. vel decoctum mirobal. Deinde vtantur elect. odoratis, vt diarmarg. frig. triasand. & aliis resiccantibus. Hoc enim commune est in omnibus fœtoribus, vt exiccentur. Nîmia enim humiditas semper putrilaginem facit. Vtatur alimentis siccioribus, vt pane asso. Abstineant ab odoratis, vt cæpis, alliis, porris. Vtatur cinamomo, garyoph. aceto rosato, & aliis resiccantibus. Ob id pulueres præscripti à nobis ex cineribus, additis & auctis odoratis, viles erunt. Addendum autem erit saccharum ros. tabulatum.

De Aphthis.

CAP. LXXVII.

Aphthæ dicuntur vlcuscula in partibus internis oris facta in pueris ex lactis acrimonia, vel putredine, vel ab alia causa externa, vt pane corroso à muribus, vel ab humoribus acris partibus illas molliores, & delicatas exulcerantibus. Sunt vndiquaque rubicundæ, & circa medium albæ. Mutant odorem pro natura sanguinis eius, qui laborat. Nam aliquando color ille ex-*Curatio* saturatus est, & niger, aliquando flavescit. Si à causa *causa pro-* procatarctica ortum habuerint, iufficiunt topica reme-*catartica* dia, quæ vim astringendi habent, & insigniter resiccandi, vt aqua, quæ à nobis fuit præscripta ad polypum, quæ penicillo tangantur partes exulceratæ.

Reliquæ oris partes colluantur aqua peculi rosarum vel solani vel acetosæ, vel aqua rosata, cum guttula vna aceti: Vel abluant cum aqua vltimò descripta ad vlceranarium. Omphacium dissolutum in aliqua ex istis aquis astringentibus mirum in modum prodest Vnguenta commodè non præscribuntur in istis affectibus. In robustioribus tangantur aqua forti, diluta cum aqua plantaginis, vel aqua, in qua sublimatum est decoctum. Penicillo tangantur, & postea abluantur reliquæ partes oris succo mali granati, vel aqua rosata, vel myrtill. vel aliarum. Si talia vlcera facta fuerint à causa inter-*Curatio* na, appareantque partes oris internæ, vtcunq; inflam-*causa in-* matæ, prodest sanguinis missio ex cephalica, deinterna. de è venis sub lingua. Gargarismata seu collutiones oris ex frigidis, vel astringentibus parare oportet. Si vlcera sordida fuerint, mel rosatum, vel syrupum r o-

fatum laxatiuum, vel ex ros. ficcis addere oportet, & frequenter os abluere, & vlceribus diuersis ad collutiones oris repellentes, aucta facultate resiccandi, medicamentis resiccantibus proderit vti, vt alumine dissolutò in aqua ex corticibus granatorum distillata: vel herbæ, quæ resiccant & astringunt, in vino sunt decoquendæ, & aqua ferrata, & sic curabuntur.

De memoria imminuta ob vulnus aut febrem

Appendix capitis 21.

MEmoria minuitur ob vulnera capitis non solum partis posterioris, sed etiam anterioris partis cerebri, vt obseruauimus in quodam, ex comitatu Vicecomitis Vticensis, valde erudito, & Græcis Latinisque litteris satis instructo, cui cum ensis in oculum altè immisus fuisset, ob illud vulnus memoriam omnino amisit, vt omnium litterarum oblitus fuerit, coactusque post aliquot annos Luteriam repetere, vt ab elementis litteras disceret. Ego tamen existimo partem posteriorem cerebri læsam fuisse. Nam cavitas oculorum altè descendit, & ad mediam vsque regionem, vel ultra, penetrat, à qua regione initium spinalis medullæ oritur, quæ basis est ventriculi posterioris, in quo sitam memoriam omnes antiqui crediderunt.

LIBRI PRIMI FINIS.

GVLIEL.



GVLIELMI RONDE-
LETII D. MEDICI, DE MOR-
BORVM CVRANDORVM

METHODO,

LIBER SECVNDVS.

In quo affectus thoracis, & partium vita-
lium explicantur.

De Strumis.

CAPVT I.



STRUMÆ sunt à materia valde vi-
scida & crassa, ob id parum differunt à
curatione scirrhi. Ante omnia vtantur
pilulis sine custodia. Postea coquatur
humor attenuâtibus, incidentibus, ab-
stergentibus, vt est mel rosatum, syr. de
bizantiis, de hyss. de stechade, quinq; rad. mel. scil. syr. de
pomis cõpositus, cū aquis elenij, hyss. cap. ven. marrubij,
beto. vel melissæ, fœni. apij, petro. gram. asparagi. Purga-
tur pilulis fœtidis, cochiis, assâieret, diaturbith, aga. infu-
so in oxymelite. Syr. concoquens talis erit.

℞. mel. ros. syr. de bizantiis an. ʒ. j. syr. de stechade ʒ. ij.
aquarum fœnic. apij, capi. ven. elenij, hyss. an. q̃r. j. misce,
fiat syr. aro. cum ʒ. j. zinzib. Vel potest fieri decoctio &
misceri syr. Sed melius erit in principio vti syr. & aquis
tanquã leuioribus remediis. Post syrupos, paulò fortius
vacuare oportet, quàm factum sit per pil. sine custodia.

℞. massæ pil. assâieret, turbith. an. ʒ. ij. salis gemmæ
& zinzib. an. gr. iij. cum succo ireos, vel gladioli, fiant pi-
lulæ. Vel sic.

℞. mass. pil. cochiarum, turbitan ʒ. j. salis gemmæ,
zinzib. pilu. fœtidarū an. ʒ. ʒ. fiant pilulæ cum aqua hyss.
vel fiat decoctum ex concoquentibus puitam, in cuius
col. infundatur ag. tro. ʒ. j. vel ponatur in decoct. Quod

si vomitum timeas, infundatur in oxymelite diaturbith 3. j. elect. de citro sol. vel diacarth. 3. j. syr. capil. ven. 3. j. vel mell. ros. 3. ℥. fiat potio. Nunquam in curatione huius morbi debent omitti ag. & turbith addendo semper zinzib. & salis gemmæ tertiam, aut quartam partem, alioqui purgaretur tantum, quod est subtilius, & crassius remaneret. Post purgationes detur theriaca vetus, pul. ros. no. mythri. diatrium pipereum, diagalanga, pliris cum mosco, & alia, quæ cerebrum siccant & roborant, & materiam præparant ad digestionem & resolutionem. Interpellatis igitur aliquot diebus fiat tale apozema.

℞. radic. ireos, galangæ crassæ, radi. petro. graminis, aspar. apij, olusatiana 3. ij. radic. balauitij, & cheliden. minoris & cucum. agrestis ana 3. ℥. (Caue, ne accipias apium risus pro vatrachio) melissæ, beton. capil. ven. adianth. marrubij, ceterac. pollicriciana M. j. scabiosæ M. ℥. seminis petro. apij, anis. scfeli, scenic. carui, vel cymini ana 3. j. pass. mundatarum 3. iiij. seminis iuniper. polypod. elenij ana 3. j. senæ 3. ℥. cretæ marinæ (vulgò scenic. marinum vocant) summitatum thymi ana M. j. turbith. & esulæ maceratorum in melle ana 3. iiij. fiat decoctio in lb. j. ℥. diss. oxymel. scill. syr. de stechade ana 3. iiij. syr. de pomis compos 3. ij. fiat syr. perfectè coctus, arom. cum 3. ℥. vel 3. iiij. zinzib. vel 3. iiij. cubeb. Capiat quarto quoque die 3. v. cum aqua decoctionis cicerum rub. vel cum decocto gaiac. Si sufficienter non moueat ventrem, æger quiescat aliquot diebus & pilulas accipiat, postea redeat ad syr.

℞. syr. præscripti 3. iiij. diaris simplic 3. ij. misce, fiat lohot, capiat lambendo, maximè si strumas habeat prope asperam arteriam aut gulam. Nam concoquit & digerit materias, & ad euacuationem præparat. Corroborantur interea internæ partes, & exsiccentur, vt dictum est, theriaca, mythrid. vel opiata sequenti.

℞. conferu. elenij, vel ireos, vel gladioli, vel radic. apij 3. iiij. conferu. capil. ven. 3. j. conferu. anthos, stechados ana 3. ℥. pul. diagal. & aromat. ros. ana 3. j. ℥. pul. ros. no. & pliris cum mosco ana 3. j. syru. conseruari. citri. q. s. fiat opiata, cap. bis in hebdomada ad quantitatem

tem auellanae, superbibendo parum vini. Extrinsecus sunt vnctiones, catap. emplastra emollientia, digerentia. Emollire prius oportet, postea digerere, vt in scirrhus faciendum docet Gal. 14. meth. Hoc est intelligendum de scrophulis iam factis, & induratis. Nam vt monstrabimus cap. de inflammatione tonsillarum, modicè resiccantia & astringentia in principio strumas curant, absumendo paucam illam materiam. Cum iam factæ strumæ incipiunt apparere, nec multum intumescunt, mitiora remedia excipere oportet, quæ sine attractione digerunt, & emolliunt, vt ol. amygd. amar. de lilio, ex decocto mal. farinæ seminis lini, & fœnugr. ficuum, & axung. porci, fiat cataplasma cum diachil. communi. Ista sæpe sufficiunt in principio. Sed postquam glandulæ imbutæ sunt humore frigido, & coagulato, digerentibus magis, & emollientibus opus est, vt ol. liliorum antiquo, de kerya antiquo, iririno, sycionio, & aliis eiusmodi. Pinguedines, quæ sunt partium subtilium, & magis digerunt, vt anatis, anseris, gallinæ, tunc sunt accommodæ. Sic etiam vulpis, taxi, leonis. Magis emollientia erunt, radix bismal. liliorum, cuc. agrest. Nam hæc emolliunt & valenter digerunt Radix iarri, dracunculi, ireos, gladioli, medulla cruris vituli, cerui, addè bdellium. Ex his fiat cataplasma sic.

℞. bismal. cum toto, liliorum ana ℥. ij. florum cham. melil. ana p. j. fiat decoctio. In col. adde farinæ fabarum, lini & fœnug ana ℥. iij. axung. porci sine sale lb. j. fiat cataplas. contusis prius herbis. Addi potest oleum antiquum, vel ol. amygd. amar. vel liliorum, vel irinum. Interdum apponitur mel in catap. quod vim habet digerendi, concoquendi. Hæc pro principio fiant. Postea fiat talis vnctio.

℞. ol. liliorum, chamo. irini ana ℥. ij. mucilag. seminis lini, fœnug. ana ℥. j. florum chamom. meliloti ana p. ss. propoleos ℥. j. ceræ citrinæ q. s. fiat vnguentum, addendo pinguedinis gallinæ, & anseris ana ℥. ij. vel apponatur diachilum magnum, ireatum. Postea reiteretur cataplasma. Sed vt fortiora recipiat, sic parandum erit.

℞. radic. cucum. agrest. ireos ana ℥. j. radic. bismal. acanthi, liliorum ana ℥. ij. scill. ℥. florum chamomillæ,

melil. sambuci ana p. j. seminis lini, fœnug. bismal. ana ʒ. j. fiat decoctio in aqua & pauco aceto. Omnia contundantur, & contusis adde pingued gal. anseris, medullæ cruris vituli ana ʒ. iiij. misce cataplasma. Si velis addere oleum, adde ex fortioribus, & fiat hoc.

℞. opopanax. bdellij, galbani, ammoniaci, diss. in aceto scill. ana ʒ. β. Quod si non reperiatur acetum scill. adde scillæ affatæ sub cineribus ʒ. j. ol. cimini agrest. vel succi narciss. vel radic. eiusdem ʒ. ij. musc. seminis lini, & fœnugr. medullæ cruris vituli, propoleos ana ʒ. iiij. contundantur omnia, & confusa reducantur in formam vnguenti. Continuet donec resoluantur. Quod si essent in aliquo loco, vnde possent facile extrahi sine periculo neruorum descendantium, aut venarum, aut articularum, extirpandæ sunt: postea vlcus diligentissime siccatum ducatur ad cicatricem. Sed extirpare parum est tutum, ob accidentia, quæ sequuntur, maximè si in profundiore parte delitescant. Præterea ad suppurationem ducere est periculosum. Nam periculum est, ne interius rumpantur, & sanies defluat in pulmones, & eum suffocet. Strumas pungere radio pastinatæ, easdem curat, vt ingruentes prohibet. Præterea idem facere os ranæ piscatricis scribit Plin. sed cum nullum habeat os in cauda, id dictum puto de Raia. Sunt & multa alia, quæ à substantia, magis videntur facere, quam à manifesta causa, vt & hoc vnguentum.

℞. cineris agnicasti flore cæruleo, senectutis serpentis ana ʒ. j. ceræ parum. Incorporentur simul, fiat ad formam vnguenti, addendo parum ol. amygdal. amar. Multi credunt tale vnguentum valere à proprietate occulta, sed mihi videtur præstare facultatē exiccatoria, qua pollent agnus castus, & spoliū serpentis. Additur verò ol. amygd. ne affatim exiccando, tenuis substantia tantum absumatur. Spoliū viperæ efficacius est, vel cinis viperarum, vel trocisci viperarum, quia digerunt, siccant, materiāque consumunt, & ad intrā & extrā. Efficacissimum ad illas absumendas est medicamentum paratum ex rad. gladioli, quæ vel contunditur cum melle & comeditur, vel siccata in puluerem reduciqur, vel fiat talis opiata.

℞. gladioli conditi, vel exiccati ℥. j. cineris viperarum ℥. j. ℞. cineris spongiarum marinarum non lotarum ante vſtionem ℥. ℞. pulueris de gemmis ℥. j. cum ſyrupo de bizantiis, fiat opiata, de qua capiat ad quantitatem caſtanæ horis quatuor ante prandium. Vtatur puluere præſcripto capite de ſuffuſione, addēdo ſalis torrefacti ℥. ij. vel pul. noſtro præſcripto in conſilio ſcrophularū, qui talis eſt.

℞. cinerum viperarum ℥. ij. cornu cerui vſti ℥. ℞. rad. galang. irid. cinamomi ana ℥. j. ſalis vſti ℥. iij. piperis nigri ℥. ij. fiat pul. tenuiſſimus, de quo capiat alternis diebus manè, horis quatuor ante prandium vnū cochlear, & pro ſale in condimentis, aucta ſalis quantitate. Si ſuppurentur, fiat vt dictum eſt in conſilio. Si his remediis non curentur, remittantur ad regem Galliæ.

De columella inflammatione. CAP. II.

Columellæ inflammatio, aut aliarum partium, curatur, vt angina: id eſt, mittendo ſanguinem è brachio, & venis ſub lingua, & appoſitione cucurbitularum cum ſcarificatione in lateribus colli, gargarifmatis in principio aſtringentibus, deinde diſcutientibus vtendum. Sed eligenda ſunt illa, quæ ſapore ſuo, aut odore palato ingrata non ſunt, & potiùs alimenta ſunt medicamentofa, quàm purè alimenta. Ob id decoctum, vel ſuccus fructuum acidorum, vel acerborum mirum in modum valet, vt ſuccus vix acerbæ, pomorum, nucum, mororum, pyrorum, prunorum acidorum, ceraſorum, ſorborum, meſpilorum, malorum granatorum acidorum & cotoneorum, vel decoctū eorundem. Ex herbis laudantur plantago, portulaca, ſolanum, lingua paſſerina, pyloſella, &c. Vel aquæ diſtillatæ, ex quibus citiùs parantur gargarifmata, vt aqua caprif. roſar. peculi. roſar. plantag. ſolat. myrthi, cortic. mal. granatorum. Aqua ciſternæ cum pauco aceto non eſt inutilis. Repellentia medicamenta ſiunt magna ex parte cum aceto, vel ſi fiant ex ſuccis fructuum. In principio acetum roſ. additur, vt citiſſimè repellat. Si autem morbus præceſſerit, ſitque à parte digerendum aliquid, fructus digerentes, vel mel, vel ſacch. vel ſyrup. vel diamoròn, vel dianucum permiscemus, aut quia medicamentum mi-

nus gratum videtur. At diamoron & dianucum, quia videtur parum habere astringentis, meliores erunt in incremento, quam in principio. Fructus detergentes, & digerentes sunt, ficus, pass. amygd. contritæ. Ex herbis digerunt hyss. origanum, puleg. & aliæ calidæ, & siccæ, nec admodum amaræ. Gly. inter detergentiâ ponitur, vt & decoctum hordei, fabarum, rosar. recentium, vel syrup. ros. vel de rosis siccis, piper, zinzib. cinamomum, galanga potentissimè digerunt. Myrrha idem præstat, sed propter amarorem ingrata est. Sapa & mel detergent. Parantur igitur remedia sic. Primum ex paratu facilibus, vt aqua cisternæ, & aceto, vel vino malorum granatorum acidorum, vel cum succo cydoniorum, sicut aliorum succorum astringentia qui in officinis seruantur. Vel ex aquis distillatis herbarum, aut fructuum astringentium cum succis prædictis, vel cum syr. astringente, vt,

R. aquarum peculi ros. & plantag. ana ℥. iiij. syr. de ros. siccis, vel de granatis, vel myrthi, vel cydoniorum, ℥. iiij. aceti parum, fiat gargarisma. Idem syrupi misceri possunt decocto herbarum vel fructuum præcedentium, vel quando materiæ coniunctæ aliquid est. Paretur hoc modo.

R. hord. integ p. j. gly. ras. ℥. j. pass. cum arillis contusarum pa. xx. ros. rub. p. j. fiat decoctio in aqua cisternæ. In lb. j. dissolue sapa, vel mell. ros. vel diamoronis ℥. iiij. fiat garg. pro incremento & statu. Quod si fieret adhuc magna defluxio, liberum erit addere aliquid ex succis, vel aquis astringentibus. Syrupi astringentes hoc tempore conueniunt, quia etiam detergent ob satch. In de-
e. inatione autem, vel vbi multa pituita retenta est in partibus circumuicinis, fiat hoc modo.

R. gly. ras. ℥. ij. foliorum hyss. vel origani, vel puleg. M. j. pass. à gigartis mundatarum, ficuum pinguium ana pa. xx. anisi ℥. iiij. florum anth. & stechad. ana p. j. fiat decoctio ad lb. ij. In qua dissolue oxymel. simp. vel mel. ros. ℥. iiij. sape ℥. ij. misce, fiat garg. Vel dissolue cum prædicta decoctione syr. de gly. addendo parum cinamomi, vel zinzib. vel piperis in fine decoctionis. Sed eo tempore, quo est vtendum detergentibus & digerentibus eclegma.

eclegmata magis conueniunt. Parantur autem ex dulcibus & pulueribus digerentibus, vt ex pul. diairis simp. diairis Salomonis, sacch. cādo cum syr. perfectè coctis. Verum si istis eclegmatis addatur aliquantula quantitas piperis, vel cinamomi, vel zinzib. citissimè morbum digerunt, & pituitam retentam ob inflammationem expurgant. Probaui ego aliquando eclegma Scribonij Largi ex pipere, myrrha, & melle, in muliere, quæ suffocabatur, & desperata erat. Infra vnum diem reiecit incredibilem pituitæ quantitatem, & materiæ, quæ circa columellam, glandes, & fauces propter inflammationem retenta erat. Sine myrrha poterit sic parari.

R. piperis 3. ss. pul. iridis venetiæ 3. ij. succi 3. j. ss. sacch. cādi 3. ij. mell. 3. j. misce, fiat lohot, capiat lambendo. Fiunt etiam in minis delicatis ex decocto rad. gladio li cum multo melle, in declinatione & defluxionibus pituitosis factis. Sua enim partium tenuitate materiam incidunt & extenuant. Mel autem deterget. Ob idque multam pituitam reddunt. In partibus externis adhibentur illa cataplasmata resiccantia, quæ in angina præscribuntur, & est abstinendum ab oleis & vnguentis nimium laxantibus, quod in angina proprium est. Nam in ea non timemus de relaxatione vuluæ, vt hîc. Et in hoc differt curatio columellæ inflammate ab angina, & in repellendo. Nam in angina adduntur aliqua dulcia ad deterfionem: in inflammatione columellæ vt possumus aceto, & aliis astringentibus circa deterfionem in principio, quia affectio hæc nequit tam subito suffocationem adferre. In angina potest & ob tumorem, & pituitā ibi retentam ab inflammatione. Ob id statim à principio vtimur diamoron, vel melle ad illius deterfionem.

De columellæ laxatione, & siceribus ac tabe.

CAP. III.

VVa dicitur, quando ob inflammationem rotunda, & subnigra, aut liuida apparet vix modo. Quare primum est scarificanda, & si ex eo melius non habeat, abscindenda, tum quia maior est, tum quia corrupta. Columella autem dicitur, quando longior facta est, ad instar columnæ. Fit autem longior ob eius extensionem

aut (vt loquuntur practici) ob relaxationem. Relaxatur autē, quia multa frigiditate humida defluente à cerebro humectata est. Curatur si pauca sit materia, & caput non admodum plenum recrementis, solo contactu piperis longi, quod quidem calfacit, exiccat, & leuiter astringit. Reductum in tenuissimum puluerem apponitur supra gladium aut spatulam, aut intra paruum cochlear, & tangitur eius extremitas, qua bis aut ter contacta, pituitam expuunt, & citò contrahitur, & breuior redditur. Quòd si plenitudo fuerit in capite, & multa pituita adhuc defluit, optimum est pilulis pituitam educentibus corpus euacuare. Quòd si multus & viscidus & crassus humor sit, detergendus, incidendus, & iterum euacuandus est, & pars tangenda prædicto pipere, & garg. astringente pars siccanda & astringenda est. Sufficit aliquādo aqua cisternæ dilutum acetum, vel vinum malorū gran. vel aquæ astringentes. Si autem perseuerauerit in ea magnitudine, etiam si sine inflammatione sit, summitas eius abscindenda est, vt breuior fiat. Nam si longior fuerit quàm pro sua natura, partem superiorem œsophagi tangit, & nauseam parit. Illis, qui hac laborant affectione, semper videtur adesse bolus in illa parte superiore œsophagi. Illis notis etiam sine inspectione agnosci potest, an plus iusto elongata fuerit. Fiunt frequentissimè vlcera circa illam partem, & potissimū à morbo Italico, quæ, vt aphthæ, curanda sunt, hoc est, aquis illis astringentibus, & leuiter arrodentibus, ne serpent, vt aqua illa fortè bene diluta, vel aqua, in qua decoctum sublimatum est. Deinde vniuersalem morbi Italici curationem adhibere oportet, si post hæc non coalescant. Contabescit hæc pars, & veluti lorum efficitur aliquando, quæ affectio à nimia siccitate, vel atrophia illius partis fit, & non curatur.

De tonsillarum inflammatione. CAP. IIII.

Paristmia siue tonsillæ, & anthiades eodem modo curantur, quo inflammatio columellæ (nam & ipsæ inflammationes sunt) & raro accidit inflammatio in vna parte, quin & aliæ partes ob vicinitatem etiam lædantur. Distinguuntur autem, quòd paristmia sine inflammatio partium internarum oris, inter trachiam arteriam & œso-

resophagum Anthiades verò sunt, inflammationes glandularum, quæ sunt post linguam in eius radice, quæ citra inflammationem aliquando inflantur, & defluxione pituitæ intumescunt, ita vt cibi transglutionem impediant. Nostri rustici (furouls) vocant, quas curant longa frictione facta in carpo, existimantes tumores quosdam factos, & apertos frictione illa dura in carpo prædictum affectum tollere. Prodest autem re vera ob diuersione. Nos curamus vacuando pituitam, & humiditates capitis. Sunt enim positæ non longè à foraminibus, quibus pituita mota palatum expurgatur. Post euacuationem illam vniuersalem factam pilulis pituitam educentibus, deriuatio per errhina multum confert. Quod si pauca sit materia in capite, aut euacuata probè per errhina, vtilissimum est masticatoria parare ex attrahentibus, & detergentibus. vt id, quod continetur circa illas partes laxas, & multis foraminibus perforatas, educatur. Nam quemadmodum in inflammationibus parua illa euacuatio sanguinis, facta per venas linguæ, magnam utilitatem præstat, sic & masticatoriis leuantur partes vicinæ. Et quia masticatorium hoc fit etiam ex detergentibus, id quod in parte collectum est, euacuatur & discutitur. Hoc autem modo parabuntur.

R. cubeb. zinzib. ana ʒ. j. excipiantur ficibus, masticentque frequenter & expuant. Compositio illa ex amygd. & melle perfecte cocto (vulgo turones) masticatur vtiliter in hoc affectu. Quod si piperis aliquantulum recipiat, pituitam liquabit, & euacuabit. Idem etiam præstant bis cocta ex sacch. amygd. & paucis cinamomo, vel zinzib. parata. Idem masticationes Italicæ, & panis papalis. Detergendo enim & fundendo pituitam, eam reddunt paratiorem spuitioni, & non minus efficacia sunt, quàm eclégmata, & palato non minus grata. Pignolatum etiam ad id confert. Sunt & vtilissima condimenta, quæ ex sapa & paucis aceto fiunt, & quæ capas recipiunt. Incidunt enim & attenuant, potissimum quando pituita multum viscida est. Gargarismata leuiter astringentia, & aliquantulum detergentia profunt, de quibus capite de angina dicitur. Inunctiones in parte externa ex resiccantibus, in principio profunt.

In declinatione, & cum consistit defluxio, digerentia cum aliquibus emollientibus. Hoc autem faciendum est, ne relaxantibus medicamentis partes laxiores redditæ maiorem defluxionem recipiant. Digerentia in declinatione cum aliquibus emollientibus miscenda sunt, quia glandulæ istæ indurantur facîle, & morbus in scirrhum degenerat, qui nunquam aucta ratio curatur in his. Sunt autem illa medicamenta apponenda in lateribus arteriæ sub maxilla inferiore. Et quia hoc videtur pugnare cum consuetudine, rationem subiungo. Hanc ex Diosc. loco vno colligo, quia tunc nucibus cupressi strumas curari posse. Hæc videntur pugnare cum practiciis, qui omnes vtuntur astringentibus in parte interna, & relaxantibus in externa. Sed quia partes laxæ sunt, cum defluit materia, non sunt laxandæ, sed cum consistit defluxio, vt materia ad extra trahatur. Quare in omnibus illis affectibus effectivissimum in principio, si medicus vocaretur, au illas futuras defluxiones præcognosceret medicamenta utique resiccantia cum leui quadam assictione intus & extra ponere. Quod in me ipso frequenter expertus sum, & anginam & defluxiones ad fauces prohibui, & multos à scrophulis incipientibus vindicaui, nucibus illis cupressi supra partem apposisis. Potest fieri tale cataplasma.

Ænidi hyrund. 3. i. j. pul. nucum cupressi. 3. j. ros 3. ss. excipiantur oxymel. fiat ad formam cataplasmatidis, applicetur in lateribus colli. Hoc medicamentum leniter astringit partes laxas, pituitamque illam tenuem iam defluxam exsiccat. Si indurata fuerint glandulæ illæ internæ, curandæ sunt, vt scrophulæ. Nam scrophulæ ad hæc sunt induratae.

De tonsillarum & ulceribus serpentibus.

Tonsillarum & columellæ vlcera eodem modo curantur, quo & aphthæ, vt supradictum est, in quibus vnum est obseruandum, quod cum omnia vlcera interna oris serpentia sint, idque ob partem molliorē & laxitatem (quod non accidit partibus externis) vehementioribus exsiccantibus, & astringentibus gaudent, quàm externa vlcera, tum ne amplius serpāt, tum quia semper à salua sunt humidiora, vnde & medicamentorum vis refrin-

refringitur. Particularis curatio sumitur à similibus.

De angina. CAP. V.

A Ngina facile cognoscitur ex impedita respiratio-
ne, & dolore circa laryngem & œsophagum. Si
itaque inflammatio musculorum gutturis, vel colli, vel
vux fiat, ita ut sinanche sit, primum detur clyster, mitra-
tur sanguis de basilica dextra, affigantur cucurbitulæ
cum scarificatione in spatulis. Debet autem sanguis mit-
ti de cephalica dextra, quacunque hora veneris ut ma-
teriam minuas & diuertras, ne augeatur morbus. In prin-
cipio anginae competunt repellentia ad intrâ, nunquam
autem ad extrâ. Nam materia semper ad exteriora tra-
henda est, ob periculum suffocationis. Fiat igitur tale
garg. ad materiae repulsionem.

℞. aquarum solani, plantag. & caprifol. an. ℥b. ꝑ. aceti
℥. ꝑ. diamoron 3. iij. fiat garg. vel sic.

℞. summitatum rubi vel myrthi, vel lentisci, vel te-
rebinthi, vel pyri sylvestris aut sorbi M. j. ros. rub. cort.
malignan. ana 3. j. fiat decoctio. In ℥b. j. col. dissolue dia-
morois 3. iij. vel vini malorum granatorum acido-
rum 3. iij. fiat gargarisma. Post aliquam repercussio-
nem post hæc garg. factam, & intermediis horis aliquot
vel diebus, si morbus detur inducias, fiat sectio venarum
sub lingua, quæ non solum confert in angina, & in in-
flammatione vux, sed etiam omnium internarum
partium oris. Possunt tamen & tutius secari venæ sub
lingua eodem die ad materiae derivationem, quæ facile
fluit, & locum replet, unde dispnoea & sæpissime suffo-
catio. Post horam fiat aliud garg. pro augmento, vel su-
periori addantur aliqua, quæ vim digerendi habeant, &
concoquendi humoris, ut si addas gly. pass. & aliqua a-
stringentia, ut mel. ros. & fiat sic.

℞. ros. rub. fol. myrthi, vel lentisei ana M. j. gly. 3. j.
pass. mundatarum, ficuum ana N. xx. hord. integri ꝑa. j.
fiat deco. In ℥b. j. col. diss. mell. ros. col. diamoron ana
3. j. fiat garg. Si possint transglutire, sunt qui dant portio-
nem pro ratione humoris peccantis, post diem sectionis
venæ. Clysteres etiam fortes ab initio prosunt ad re-
uulsionem. Accedente magis declinatione minuenda
sunt, quæ repellunt, & augenda quæ digerunt.

℞. gly. rasæ ꝓ. j. ros. rub. cyperi ana ꝓ. ij. cortic. malū gran. ꝓ. j. pass. mundat. ficuum iuiubar. an. N. xx. hord. integ. ꝓ. j. hyss. vel orig. vel calamenti ꝓ. j. fiat decoctio. In tb. j. colaturæ misce sapæ, mellis ros. ana ꝓ. ij. dianucum ꝓ. j. oxymellis simplicis ꝓ. iiij. fiat gargarisma, quod continuare licet ad perfectam vsque curationem, præterquam in principio. Fiat talis inunctio.

℞. ol. liliorum, & cham. an. ꝓ. iiij. vngatur collum calidè, & à principio ponatur bombax. Postea fiat alia inunctio fortior sic.

℞. vnguēti resumptiui, & vnguēti dialth. ana ꝓ. ij. facis ol. liliorum ꝓ. iiij. fiat vnguentum, ponatur supra locum affectum cum lana succida. Omnia relaxantia à principio ad extra sunt adhibenda, vt materia ad partes externas deriuetur, propter periculum suffocationis. Ad intra autem repellentia in principio. In incremento repellentia cum digerentibus. In fine autem digerentia cum asringentibus tantum. Principium huius morbi esse solet primus dies: augmentum, secundus: vigor, tertius & quartus: post hoc solet declinare. Pro statu & declinatione fiat vnguentum fortius, quod magis digerat hoc modo.

℞. vnguēti dialth. æsopi vel resumptiui ana ꝓ. iiij. ol. liliorum ꝓ. iiij. pulueris nidi hyrundinum ꝓ. iiij. incorporentur simul, & fiat cataplas. ponatur supra partem affectam. Et hoc est præsens remedium. Iuuat etiam, vt stercus canis rodentis ossa, siue assumatur, siue admoueat, sicut & spoliū serpentis. Post sanguinis missionem clysteres tertio quoque die sunt dandi, & debent esse satis fortes ad diuersionem, etiam si alius sua sponte satis fluat. Dandi sunt etiam syrup. concoctorij. Si autem deprehendatur humor esse calidus, vtendum est incrassantibus syrup. vt violato, iuiubino, vt supra monstratum est capite de catarrho. Si autem materia pituitosa appareat, concoquatur syrupis calidis, vt syrupo de hyss. de glyc. mell. rosat. & aliis huiusmodi, vt syrup. de prass. qui multum probatur, & aliis detergentibus. Cum verò pilulas nequeant deuorare, dissoluantur pilulæ, vel fiant portiones. Sed pauca sit quantitas potionis, (quia non facile possunt deglu-

Syrup. cō-
coq.

tere)

tire) & fiat efficacior. Vt autem melius possint deglutire, ponatur ventosa in collo, circa secundam vertebra. Dilatat enim vias illas. Vtatur lohot ad abstersionem, & maturationem.

In principio fieri potest lohot ex diatragacantho & Pro principio
diapapauere, vt *angina*

R. elect. diatraga. frigid 3. ij. elect. diapapaueris albi 3. j. syr. iuiubarum & diamoro. ana 3. j. fiat lohot, quo vtatur. Addi potest syr. de papauere, vel myrtil. & hoc pro principio. Accedente statu minuenda sunt hæc fortia incrassatiua, & ad mitiora veniendum, vt ad syrup. viol. & tandem ad syropos de gly. de hyss. de prass. ad elect. diaris simpl. Salomonis, & alia, quæ magis sunt digerentia, vt

R. pulueris diatrag. frig. 3. j. diaris simpl. 3. iij. syrupi de papau. vel de liquir. vel de hyss. vel de prass. 3. j. fiat lohot, cui adde stercoris canis ossa rodentis 3. ij. vel cineris hyrundinum, vel nidi hyrundinum tantundem. Præstantissimum remedium pro declinatione est, & maxime cum à pituita sit morbus, (quod quidem non minus valet in peripneumonia à pituita) sed respuitur à delicatis ob amarorem & odorem. Tale est.

R. piperis 3. ss. croci, myrrhæ an. 3. j. mell. despumati 3. ss. misce, fiat ad modum lohot. Oxyssel simplex & squilliticum, & alia quæ incidunt & attenuant, conueniunt, maxime cum multa pituita retinetur in illis partibus ob tumorem. Pro delicatis sic fieri poterit.

R. piperis 3. ss. succi glæ. 3. j. diaris simpl. 3. j. croci 3. ij. saccha. vel syr. de hyss. q. j. fiat ad formam lohot, capiatur lambendo.

De raucedine.

CAP. VI.

Raucedo fit ob defluxum alicuius materiæ in trachiam arteriam, ob id concoquendus est humor, & euacuandus. Concoquatur syrup. calidis & lenientibus trachiam arteriam. Si materia sit salsa, vel aliquam habeat subtilitatem, & caliditatem, concoquatur syrup viol. & de iuiubis. Si viscida sit & crassa, melle ros. & anthos vel squill. Commiscentur syrup. cum decoctione hordei, vel cum decoctione pectorali. Datur interdum syr. de papauere, cum syrup. de stechad. &

fit medicamentum medium ex duobus illis contrariis. Sed dandi sunt cum decoctione gly. vel in aquis hyss. meliss. capill. vener. Si igitur materia sit calida, vel nimis subtilis, fiat sic.

R. syr. viol. & de pap. an. 3. β . cum aqua hordei fiat syr. qui detur à principio, cum materia adhuc fluit. Sequentibus diebus fiat alius syr. sic.

R. syr. de iuiubis & viol. an. 3. ij. syr. de gly. 3. j. cum decoctione hordei fiat syr. vel cum decoctione pectorali. Si autem à materia frigida, & multum viscida, concoquatur hoc modo.

R. mell. ros. col. 3. j. syr. de gly. 3. ij. aquarum hyss. meliss. capill. ven. enulæ camp. an. q. j. fortior erit, si addas syrup. de prassio, de stech. cum decoctione pectorali. Si clarif. & arom. velis, id fiat cum 3. j. cubeb. quæ à tota substantia vim habent clarificandi vocem. Purgetur pilulis præscriptis in capite de catarrho, vel cum electario indo, vel de citro solut. diss. in decoctione pectorali vel in aquis capil. vener. vel hyss. vel cum aqua decoctionis hordei.

Ad Vocis clarificationem Et antur tali lohot.

R. conf. ireos 3. iij. conf. anthos & stechad. an. 3. j. farinæ orobi & pul. gly. an. 3. ij. sacch. candi & penidi. an. 3. j. β . cum mel. ros. vel cum syrup. de hyss. vel de prass. fiat lohot. Optimum est uti frequenter pilulis nostris de beniouino, ut si bis, vel ter in hebdomada capiat pilulam vnam. Mirabilem enim vim habent clarificandi vocem. Potest & alio modo confici lohot, ut

R. pul. diairis simpl. 3. iij. vitellum oui N. j. terebinth. abiectis 3. iij. si adsit laricea 3. ij. farinæ orobi 3. β . cubeb. 3. ij. mel. despumari q. s. fiat lohot, vel cum syr. de gly. capiat lambendo. Utantur hoc gargarismate.

R. glycirr. ras. 3. j. ireos 3. β . pass. mandat. iuiub. & sic. an. N. x hordei integ. p. j. orobi p. β . fiat decoctio, in cuius tb j. adde mell. ros. col. & syrup. de prass. an. 3. ij. fiat garga. Fiat etiam garg. ex theriaca in decoctione præcedente, vel caulium, vel aqua hyss. vel in decoctione orobi. Teneant in ore elect. diatragac. frig. si materia acris sit, elect. diairis, pilulas bechicas, pilulas sub lingua, & alia, quæ vim habent abstergerendi, ut sacch. candum.

Utantur

Vtantur fumigio præscripto cap. de catarrho. Si verò rauceo fieret ob asperitatem, vel siccitatem, fiet talis decoctio.

℞. rad. bismal. ʒ. j. gly. ras. & radic. branchæ vrs. ana ʒ. ʒ. ʒ. pass. mundat iuiubarū, sebesten an. N. x. florum viol. mal. an. p. j. quat. semin. frig. ma. & seminis bombacis an. ʒ. iij. hordei mundati p. j. fiat decoctio. In tb. j. diss. syrup. viol. ʒ. iij. syrup. iuiubarum ʒ. j. misce, fiat syrup. pro tribus dosibus, vel cū simili decoctione fiant gargarismata, vel fiat lohot hoc modo.

℞. confer. viol. ʒ. j. butyr. recentis & lactis amygd. an. ʒ. iij. farinæ orobi ʒ. ʒ. elect. diatrag. frig. & diapenid. sine speciebus an. ʒ. j. ʒ. omnia simul incorpo. fiat ad formam lohot, addendo ad dulcorandum syr. viol. parum. Potest etiam fieri talis syr. qui utilis esset in omni rucedine, à quavis causa facta fuerit.

℞. rad. gly. & bismal. an. ʒ. j. ireos ʒ. ʒ. ʒ. vel galangæ ʒ. ij. caul. capil. ven. ceterac, pollytrici, adianth. hiss. mar. rub. an. M. j. seminis cubeb. vel mal. ʒ. ij. hord. integri, orobi an. p. j. ʒ. decoct. In cuius tb. j. diss. mell. vel sacchar. q. s. fiat syr. pro tribus dosibus matutinis. Pars aliqua inspissetur melle, & penidiis. Vtatur loco lohot.

De Pryalismo.

C A P. VII.

S Aliux frequentem & immoderatam reiectionem, cuius hoc loco modum compescendi tradere instituimus, Græci πρυαλισμὸν, ut apud Aetium, aut πρυαλισμὸν, ut Hipp. & Gal. in prorheticis ostenderunt, & vocauerunt. Saliux autem nomine humorem omnem, qui per os sine tussi, aut excreatione, vel vomitione reiicitur, saliax speciem referentem appellamus, cuius frequens & molesta exputio symptoma est, quod ob expellentis facultatis irritationem, aut retentricis imbecillitatem consequitur. Qui enim per tusses aut vomitiones excernitur, iam à pulmonibus, vel stomacho prodire necesse est. Saliuam verò naturalem, quæ nec qualitate, nec quantitate materiæ modum excedit, glandulæ vtrinq. linguæ assistentes, quas peculiari nomine nostri, Tonfillas, dixere, perpetuò eructant, tum ut madescat lingua, larinx, & ut quibusdam placet, pulmones, tam ut eius perfusione ciborum perfractio, & prima coctio

in ore exactius conficiatur. Quòd si Gal. credendum sit, nihil aliud erit, quàm residuum, & veluti optimæ reliquæ alimenti illarum partium, aut linguæ, totius materiæ partis, à qua producitur simile Hoc enim omnium animalis partium commune est, (quæ quidem vel aliis partibus vtilis humores, vel ad generis propagationem, vel conceptus nutritioni accommodatos gignendi vim habent.) vt talis humor sit alimenti partis ipsum generantis, qualis in ossium cauernulis, & inanitatibus reliquæ. In iecore verò sanguis, & spumosa in pulmonis carne humiditas. Sic etiam lingua & tonsillæ & oris partes fungosam albamque constitutionem habentes, cum id, quod affluit, sibi assimilandi vim sortitæ sunt, familiarem, & proprium humorem talem efficiunt, qualis saliuæ ex naturæ præscripto omnino est, cui tamen aliquid superuacanei humoris, qui è cerebro in palatum (cui illa à natura ad se expurgandum constituta via est) stillare solet, admisceri oportet. Crassiores enim cerebri sordes priores ventriculi suscipiunt, & congerunt, à quibus partibus per ossa nasi perductis sensim in peluim & infundibulum dilabuntur, deinde per cunei foramina in os sphenoides, & in palatum pedetentim instillant forasque deturbant, nec vnquam vsque adeo cerebrum est sanum, quin semper aliquid congerat superuacanei. Quandiu tamen secundum naturam se, & omnes partes oris habuerunt, nec immoderata, nec copiosior, sed pro naturæ mediocritate & vsu cumulabitur saliuæ. Vbi verò aut cerebrum humidius fuerit, aut excrementis immoderatis congerendis idoneum, vel oris partes intemperie aut imbecillitate aliqua, aut morbo partibus organicis proprio laborauerunt, illisque vel copiosius, vel non satis congruum suppeditabitur alimentum, aut vicinarum partium onera receperint, tum copiosiore colligi saliuam consentaneum. Capitis enim humiditas defluxionum in partes inferiores continua causa existit. Oris verò partium imbecillitas, aut glandularum, quæ in eo sunt, natura efficit, vt in has magis partes decumbant, aut aliæ partes sua excrementa transmittant facultatis expultricis munere. Multitudine enim, vel qualitate interdum sua, expultricis

facultatis munus continuo sollicitant. Id quod etiam præstant omnia, quæ mordendi ac pungendi, aut detergendi, qualia sunt alimenta, & medicamenta, vim habent, quæ tantò potentius id efficiunt, quantò minore caliditate prædita sunt. Caloris enim est humores fundere, meatus aperire, atque etiam attrahere. Hac ratione, quibus pituitam è cerebro per palatum volumus elicere, masticatoria eiusmodi facultates habentia præscribimus. Ob id non mirum si partibus oris inflammationem patientibus, aut ex aliquo affectu præter naturam calentibus, huiusmodi symptomata sæpe succedant, & si id non solius caloris ratione, verum etiam doloris aut partis affectæ natura efficiatur. Dolentium enim & imbecillarum partium natura est, aut ad se fluxiones attrahere, aut decumbentes in se recpere, largas quidem, ubi corpora plena sunt, & excrementis scatentia. Parciores verò, ubi excrementis vacant. Sic etiam fit, cum vlcus in ore est, & cum columella humore multò superius defluente madens, atque perfusa, laxior, longior euadat, propendensque in fauces, & in oesophagi caput illabatur. Suo namque pondere, & mole cutim distendit, rarioremque facit, & foramina partis interioris palati dilatat, vt nullo remorante continuo, affatimque pituitam à cerebro in os irruere sinat. Non paucis visa est argenti viui siue inunctio, siue intro assumptio, dum sua tenuitate fluxiones in os concitat, frequentis oris exspuitionis causam attulisse. Aliis verò luis veneræ labes, quæ istius mali seminarium esse deprehenditur, cum absque alia manifesta occasione contabescere simul corpus atrophiam, caputque dolere circa aures, & maxime noctu magis, quam interdiu torqueri conspicitur. Quicquid huic malo originem dederit, cum multarum affectionum, grauissimorumque symptomatum seriem post se trahant, formidandum semper erit. Cum enim tanta sit in os pituitæ defluxio, vt nequeat tota propelli, aut vlcera, fetoremque oris, & timores excitabit, aut si pars in asperam arteriam pulmonesque decurrit, tussis molestas, spirandi difficultates & tabes tandem accerset. Si verò ad stomachum deseratur, & concoctionis munus

interturbabit, & sic cruditates, lien erias, diarrhæasque sæpe excitabit, & si ab ipso ventriculo saluæ copiosioris origo sæpius reducatur. Læsa enim ventriculi concoctione, humore multo & aquoso innatante, eûsque tunicis impacto salua multa in os exergat, quæ frequentem expuitionem, siue tusim excitat. His melancholicorum humidique ventriculi notis, humidi copiosiorisque sputi reiectionem ascribimus. Sic etiam renuem plurimamque saluam pronuntiare & præcedere vomitionem Hippo. & Gal. tradiderunt, quod nos ob linguæ cum ventriculo, per membranam, consortium accidere non dubitamus. Vnde fit. vt cum superior ventriculi pars humore multo, aquoso, qui sua leuitate alius supernatare solet, imbuit fauces & linguam, & per consensum simul eadem perfundit. Hæc autem diligenter distinguere oportet, vt veram pyralismi causam & scaturiginem deprehendamus, sine qua suppressendæ copiosioris saluæ rationem veram inuenire posse sperandum non est. Cum enim in causarum morborumque eam excitantium remotione consistat, illud aggredi non sanato vlcere, quod illam promouebit, nanis laboris est. Proinde cum illud contigerit curato vlcere, saluæ exuperantiam in ore facilius exhauriemus, & intercipient, si gargarismatis astringentibus potentèrque resiccantibus citra vllam deterfionem, partem imbecillam corroborauimus. Sufficit enim medicamenta ingrata ori non esse. Quod si ex ingratissimis parentur, addita pauca quantitate syr. de ros. siccis, & cydoniorum, gratiora palato reddet. Illa autem gargarismata, quæ ad anginae & columellæ inflammationis principium præscripta sunt, huc non incommode transferri possunt. Sed ad vlcera oris curationem, istud interea vsurpare licebit, post contactum aquæ, quam fortem vocant, aut sublimati. Eiusmodi enim vlcera omnia, cum aphtharum conditionem retineant, ne latius serpent, medicinis astringentibus, & leuiter arrodentibus cohiberi volunt. Istud verò gargarisma tale erit.

℞. fol. myrth. plantag. pilosellæ ana M. j. cort. mali granati ʒ. j. ros. rub. vineæ ana M. ss fiat decoctio, in qua calibet ex vino albo. In cuius lb. iij. diss. aluminis

nis ʒ. j. Vtatur tali gargarismate. Acetū ob vlcus non est admiscendum. Vinum tamen addimus ad maiorem exicationem. Quin etiam lentisci folia, licet astringendi vi prædita, quæ vim habent epispasticam, seu attractori m, ab iis reicienda in hoc aff. ctu semper censemus. Vt verò palato gratiora efficiantur, syrupus de rosīs siccis, vel cydoniorum ʒ. iij. addere conueniet, & itis os colluere. Quod si aliquam absterfionem vlcus requirat, sufficiet melle rosat. col. vel syru. ros. laxat. id efficere pro vlceris curatione.

Curatio à columellæ relaxatione.

Si verò columellæ relaxatio, & dilatatio, ptyalismī causa sit, eius in priorem, & naturæ conuenientem statum reductio, ptyalismī etiam curatio erit. Hoc promde existente, ex curatione relaxationis columellæ repetenda remedia nobis erunt. Quando autem argenti viui vsus affectionem hanc inuoxerit, absterfis primū dentibus cum aqua peculi ros. in qua gutta vna ipsius aquæ fortis iniecta fuerit, superiore gargarismate, donec malum sedatum fuerit, vt edum est. Quod si luis venereæ soboles existat. curatione vniuersali, quæ morbo Italico debetur, à nobis suo loco tradita, necessario tollenda est, quæ vel inunctione, vel suffumigia, vel d. eta perficitur. Symptomata enim, quæ luem veneream consequuntur, licet curationem propriam, & peculiarem habeant, eam tamen sine vniuersali vnuquam admittēt. Ventriculi porrò coctionis læsionem, cruditatēque huic mordo interdum originem dare diximus. Quare quum istud eueniet, pilulis de hiera purgandum corpus est, deinde tum sumptis, tum ad motis concoctio promouenda, virēsque ventriculi corroborandæ sunt, & confirmandæ eo modo, quem, cum de cruditate & ventriculi imbecillitate ageremus, docuimus. Nec verò cum ex capitis vitio & humiditate, salua multa colligitur, omittenda sunt accommodata capiti topica remedia. Quæ tum ad illius resiccationem, tum ad sistendas defluxiones faciunt, quæ in catarrhi curationem à nobis descripta sint, satius est illuc recurrere. Aph. 12. lib. I. prorrhæici. In phrenitidis principio simpliciter & clementer habere, sed crebrò permutari, malum. Malus

quoque & frequens excreatus Galeno. Frequens enim excreatus, & propter os ventriculi ex humiditate imbecillum, & propter cerebrum humiditatibus refertum oritur. Excreatus frequens, aph. 6. eiusdem, & si aliud quodpiam signum affuerit, sunt phrenetica. Si quid expuatur tunc, quomodo in distillationibus interdum vsu venit, ob ea, quæ in os ipsum per narium foramina conflunt, fieri id consuevit. Contingit autem & aliquando frequens talis excreatus, vbi respirationis robur externum quidpiam attraxit, meatibus ipsis tum adhæserit, tum impactum fuerit. Ob eam autem causam excreatus, qui ex arbitrariis functionibus, vna existit frequens oblecta, læditur cognatione; quomodo & arbitraria quæuis functio. Cum igitur frequens excreatio contingerit, atque ob id glutinosum sputum, quod in canalibus à naribus ad os pertingentibus infarctum sit, vt ea delicatis quibusdam ob calidam & siccam cerebri intemperiem obtingat, impossibile non est. Gal. in aph. 3. Sectionis 3. prorrhethici in febribus non iudicatoris præterfluentia sputa ob copiam immoderatam, vel virtutis imbecillitatem fiunt, atque ob id sunt ægro leuia, id est, non contumacia, & versu facilia. Aph. 63. eiusdem. Tussiculi, cum frequenti sputo abscessum tollunt. Fieri potest. vt facta intro inclinatione per canalem naturalem effluat, quod tenuius est, ac conficientibus parotidibus succis ad oris capacitatem, & ita sæpe fieri sputum.

De tussi.

CAP. VIII.

Tussis symptoma est partium respirationi inservientium, & est motus facultatis expultricis, thoracis, vel pulmonum, volentis eiicere, quod est molestum. Talis est, qualis est ventriculi nausea & vomitus, & cerebri sternutatio. Tussis sequitur multos morbos, & à diuersis causis excitatur. Fit autem vel à sola intemperie, vel cum materia, ab intemperie frigida, & à nimia siccitate, vt in febribus hecticis, & in his, quibus exesa est columella, vel diuisa. Fit à compressione septi transversæ, vt in tumoribus hepatis arida tussis, vel tussicula. A materia fit, cum aliquid in arteriam delapsum est, siue sit humor, siue corpus aliquod, vt mica panis, potus,

aut aliud quoddam humidum, vt sanguis, pituita à capite, vt in catarrho, à materia, quæ in thoracem vel in pulmones, vel trachiam arteriam, vt à serosa humiditate, quæ in spatium resudauit, sicut in hydropo: vel à tenui materia, quæ ab inflammata membrana resudat, vt in pulmonis inflammatione, quando materia in arteriam resudat. Fit & à tuberculo innato in aliqua parte trachiæ arteriæ vel pulmonum. Cùm constet symptoma esse, & morbos sequi, illius nulla est curatio, cùm curatio ad morbum referatur. Sed illius ablatio erit, auferendo causam, scilicet, morbum curando, qui illius tussis causa est. Nam vt morbus non tollitur, nisi causa prius auferatur: sic neque symptoma. Nam, vt Philosophi dicunt, non tollitur affectus, qui fit, nisi auferatur causa, & ablata causa tollitur effectus, si morbus adhuc sit in generatione & in fieri, & à causa dependeat fiente vel conseruante. Verùm tussis, vt dolor & alia symptomata, modò tantum sua vehementia molestant ægrum, tunc eius neglecta causa ad mitigationem veniemus, tanquam ad id quod magis vrget. Mitigatur autem, vt dolor, id est, dispositionem minuendo, vel sensum partis auferendo, vel stupefaciendo, ne tussiant.

C V R A T I O.

Pro diuersitate causarum remedia instituimus, vt si ab aëris frigidi occurso, ab intemperie frigida fiat, sola spiritus cohibitione curatur. Si ob id, quod à parte inflammata resudat, tussis fiat, sputum prouocando, & inflammationem curando mitigatur. In aliis utilissima est tussis ad expellendum. Quare non adhibemus bethica, nisi ad expectorationē, vt sine molestia, aut magna contentione expellatur, quod debet expelli. Idem faciendum in inflammatione pulmonum, & in catarrhis. Quod si non tussiant, aliquando acetosis, vt oxymelite, syr. acetos. prouocamus, vt expellant, quod ob retentionem ægrum iugulare possit. Igitur ad molestiam tussis auferendam, & mitigandam, cognoscere oportet, ob quam causam prima, vel secunda tussis motione non expellatur. In principiis inflammationum, quia nihil aut parum à parte inflammata resudat, ob id tussunt, vel ob tumorem magis, quàm ob resudatam materiam. Quare

oportet prouocare diuersionem inflammationis, deinde resolutionem & expectationem, vt in capite de pleuritide dictum est. Habent commune principium inflammationes cum aliis tumoribus & defluxionibus, quod inspissantia in primis insultibus danda sunt, tum quia materiam tenuem inspissando expulsionem parant, & defluxionem compescunt. Ergo antequam instituantur topica, bechica, inspicere oportet, num materia tenuis sit, vel crassa, vel viscida. Nam ob tenuitatem, & visciditatem & crassitiem, non facile tussim reiciunt, quod molestat. Cognoscitur ex natura morbi & inspectione. Si ergo sit inflammatio, est tenuis, quia non nisi tenue exodat initio, si nihil omnino expellatur, & non faciat magnam difficultatem in respirando, & si post multam tussim aliquid tenue & spumofum reicitur. Quod si magna sit difficultas anhelandi, & post tussim, quod reicitur, spumofum, vel viscidum est, & crassum, attenuanda, detergenda: si verò tenuis, inspissanda & leuiter detergenda. Ad inspissationem tenuium defluxionum, & quod inspissationem recipere potest præcibimus, qualia sunt, amyllum, albumen oui fortiter agitatum, & saccharo mixtum. Syr. viol. debilitet, syr. de iuiubis mediocriter, & syr. de pap. diacod. Galeni pilulæ albæ, pul. diatrag. gummi trag. & arabicum. vsurpantur per se syrup. lambendo magis, quam alio modo, quia crassities syr. ad pulmones non permeat integris viribus. Si in ventriculum labantur, meatus venarum mesaraicarum, & ramos venæ portæ constipant, quod nostri solent facere. Ego sic facere consueui, & ex his componere volui, admixtis quibusdam seminibus frigidis maioribus, vt sua tenuitate aquosa alia deducant ad partem affectam, vt,

℞. rad. consol. maioris, vel bugloss. (habent humorem lentum) vel bismal. ʒ. j. iuiubarum N. xx. quatuor sem. frigid. maior. seminis mal. ana ʒ. ij. seminis papaueris albi ʒ. ss. florum viol. bugloss. ana p. j. fiat decoctio in aqua hord. mundati, & in tb. ss. diss. saccha. q. s. fiat syr. cap. in quatuor matutinis. Potest fieri ex aquis sic admiscendo syropos in officinis paratos.

℞. syr. de iuiub. ʒ. v. syr. de pap. ʒ. j. aquarum viol. bugloss.

Inspissantia.

gloss. ana q. j. misce, detur cum decoctione hordei loco
 aquarum distillatarum. Hæc inspissando materiã faciunt,
 ut facillè reiciatur. Postquam materia est inspissata, ad
 detergentia veniendum, sine incisione aut attenuatione. *Detergen-
 tia.*
 Quare addi potest gly. in syru. vel syr. de gly. vel de hyss.
 auferendus de pap. Vel adde mel. ros. vel vio. parum, vel
 saccharum candum. Sic fiet & detergentia & expectorã-
 tia tenuium fluxionum. Si tussis sit ob materium salsam, *Tussis à
 materia
 salsa.*
 detergentia leuiter cum refrigerantibus, & humectanti-
 bus saluginem eam minuunt, ut syr. violatus cum deco-
 ctione hordei mūdati, vel cum decoctione quatuor sem.
 frig. maiorum & semine malue, vel cum decoctione mal-
 uæ, radic. borrag. & similibus. Detur elect. diatraga-
 canthi.

A materia viscosa curatio.

Si tussis à materia viscosa, & crassa, tunc incidenda &
 detergentia, ut oxymel. te. syr. acetoso, de gly. lambendo
 utatur, vel cum decoctione sequenti.

℞. rad. elenij, & bechij, an. ʒ. ij. gly. ras. ʒ. j. beton hyss.
 scab. herbarum capil. an. M. j. marrub. M. ss. pass. fic. an. N.
 xx. quatuor semin. frig. mai. an. ʒ. iij. anis. ʒ. ij. florum ste-
 chad. anth. ana p. j. fiat decoctio in aqua hordei, & in tb.
 ij. diss. mell. communis & sacch. q. s. fiat syrupus. capiat in
 quatuor matutinis, vel detur syrup. de gly. capill. ven. de
 marrub. de oxymel. simpl. vel scill. cum decoctione ery-
 simi, cum pass. & quatuor seminibus frigidis maioribus,
 ne nimium materia exsiccetur & retineatur. Purgetur a-
 gar. infuso in vino, vel aqua hyss. vel dentur purgantia
 elect. ut diacarth. de citro, diaph. Pilulæ, quæ pituitam
 purgant, ut cochix, de sarcocolla, & similes. In tali tussi
 detur post purgationem ʒ. j. theriacæ antiquæ, ut in te-
 nuï defluxione, vel quæ sit ex irritatione sine multa ma-
 teria, theriaca recens. In thorace contenta materia est
 attenuanda. Quæ sunt in officinis eclegmata, sunt ingra-
 ta, & rancida, ut eclegma de pino sanum. Quare parentur
 ex pulueribus & syrupis, addendo aliqua, quæ sunt con-
 sistentia viscosa, vel spissa, vel pulpa iuiubarum præpara-
 rarum, pass. mucago ficuum. Alioqui terebinth. abietis
 addunt, ut hoc modo.

℞. mucag. fic. pulpæ pass. iuiubarum, vel sebesten ana

℥.j. amygd. dulc. contusarum, & pinearum infusarum in aqua hyss. an. ℥.j. pul. diatris simpl. 3. iij. diatrag. 3. j. cum syr. capil. ven. vel gly. fiat eclegma. Si esset incrassandum, adderemus iuiubarum, vel de pap. vel viol. Efficacissimum ex melle scill. & syr. de gly. simul mixtis & inspissatis pul. gly. & iridis. Fit & eclegma ex butyro recenti, terebinthina, & saccharo cando æquis partibus. Fiunt tabellæ & trocisci, quæ pilulæ bechicæ aliis dicuntur, ad expectorationem & deterfionem. Ad inspissationem vero & deterfionem leuem, additur farina hordei. Ad eandem valet saccharum candum, & penidiæ.

Tussis sine materia multa.

Tussis aliquando fit sine multa materia, à nimio sensu, vel facta irritatione. Nam, vt tenasmus post dysenteriam, & nausea post vomitum nimium, remanet, vel ob reliquias materiæ tenuis, quæ pungit partem & stimulat expultricem facultatem: ob id dare oportet cremorem hordei liquidum cum multo saccharo. Cum non proficiunt detergentia illa, danda sunt narcotica, ad sensum partis minuendum, & tussis sedationem, ad quam intentionem factæ sunt pilulæ ad omnes catarrhos. Confiuntur ex opio, & aliquibus pleuriticis, vt succo gly. myrrha, iride, styrace, vt,

℞. styrac. 3. ℥. myrrhæ, opij, croci, amyli, succi gly. ana 3. j. cum syrup. iuiubarum, fiat massa pilul. de qua capiat pilulas tres longè à cœna. Artheriacæ compositiones antiquorum vtilis, vt diacodium officinarum, & alia, quæ similia medicamenta recipiunt. Tussis inanis sine inflammatione, & influxione tenui, acri, & salsa, ob ferosa excrementa in thoracis spatio collecta, vt in hydrope. Fit etiam ob tumores hepatis, aut aliarum partium, quæ septum transversum comprimunt, vt in inflammatione hepatis, & aliis tumoribus, sed magis in inflammationibus quàm in scirrhis, fortè quia materia, quæ resudat, irritat facultatem expultricem. Quod vt intelligamus, an à tali causâ fiat, tangenda sunt hypochondria, si dura tensaque sint, & aliquod signum in vrina, vel egestionibus apparet.

Asthma magna ex parte fit a materia pituitosa, multum viscida, quæ opplet vacuitatem trachie arteriæ, & impedit aspirationem. Curatur autem concoquendo materiam, & euacuando. Concoquitur autem calidis & incidentibus, quæ admixtam habet quandam humiditatem, ne materia exsicceetur, quin potius educatur, vel cōcoquatur. Syr. concoctorij, qui multum laudatur, sunt syr. de hyss. de gly. de prass. oxymel simpl. & compos. & scil. mel. scill. syr. de stech. Aquæ miscendæ sunt aqua fœn hyss. scab. capil. ven. enulæ camp. vel serpentar. (si reperiatur, alioqui eius decoctum) & aqua viol. cum syr. de stechade, vel aliis fortiter exiccantibus. Sed melius complentur intentiones omnes, ubi fit decoctio in aqua, in qua syrupi miscentur. Sine decoctione fiat talis syrupus.

R. syr. de hyss. de gly. an. ʒ. iij. aquæ cap. ven. & viol. fœn an. q. j. misce pro tribus dosibus. Hic syr. erit ex imbecillioribus. Fortior verò sic.

R. syr. de gly. oxymel. simpl. syr. capil. ven. ana ʒ. ij. aquarum hyss. scabiosæ, vng. cabal. vel enulæ campanæ ana q. j. misce pro tribus dosibus, cum electuario. Syrupus fortissimus talis erit.

R. syr. de stechad. mell. sc. ana ʒ. ij. syr. viol. ʒ. j. aquarum enulæ campanæ, hyss. fœnic. scab. an. q. j. misce, fiat iulep. Aqua viol. in primo syrupo ponitur ad quandam humectationem materiæ, ne syrupi incidentes nimium siccant materiam, & propter siccitatem non educatur. Loco tamen aquæ, vel syrupi violati, possumus ponere decoctum hordei in syrupo, vel decoctum passularum quæ etiam humectabunt abundè, & eosdem vsus præstabunt, quos syrupus viol. In secundo ponitur syrupus capil. ven. quia mediocriter discutit. In tertio syrupo viol. ad eandem intentionem dictam, quia omnia alia tum syrupi, tum aquæ, potentissimè exsiccant. Id enim magis obseruandum est in eclegmatis, quam in syr. componendis, in quibus tamen id non est negligendum. Nam hi syr. non solum habent vim præparandi materiam, sed etiā educēdi per sputa, ob id oportet quādam humiditatem esse admixtam. Et in hoc differunt.

aperientia, & attenuantia istius materię, ab vritam pro-
 uocantibus, quę etiam aperientia sunt, eò quòd vretica
 omnia acia sunt, attenuandi, & siccandi vini habentia;
 in pectoralibus autem attenuantibus, oportet humidi-
 tatem quandam inesse, vt sputum facillè educi possit.
 Quod nos docuit Gal. amplissimè cap. 4 lib. 3. simplic.
 Purgetur frequenter sine magna perturbatione, & vio-
 lentia. Ob id pilulas præscribere oportet sine custodia,
 quibus vtimur ante vsum syrup & sæpe accipiant per
 interualla, vt tertio, vel quarto quoque die. Pilulę
 esse possunt de hiera compos. vel simpl. de agarico, de
 assaieret, & alię, quę diagrediata non sunt, neque my-
 robal. recipiunt, quibus vt in hoc affectu propter astri-
 ctionem non est tutum, nisi fortè cum asthma sit ob de-
 fluxus alicuius materię tenuis. Tunc possunt vt pilulis
 sine quibus, addito succo gly Non tamen his, aut aliis a-
 stringentibus vtimur, quia astrictio respirationis instru-
 menti contraria est. Post syr. concoctorios possumus
 dare pilulas fortiores, vel acutas cum turbit, addito
 zinzibere, vel succo gly vel decocto turbit vel agarici,
 vel cum decoctione summitatum thymi. Thymus enim
 multum valet in extenuanda & exsiccanda pituita, ma-
 ximè cum in decoctionibus ponitur, in quibus passim re-
 ciipiuntur, & alia lenientia, & humectantia. Potest dari
 diaphenicum vel elect. de citro cum decoctione pecto-
 rali. Vtatur theriaca antiqua, vel mythridatio post qua-
 cuationem, vel conserua enulę campanę, & capil. ven.
 vel ireos, & similibus. Vtatur pulueribus & elect. diatris
 simpl. & Salomonis. lohot sano, de pino, de capilibus, si-
 milibusque incidentibus. Potest fieri talis compositio,
 aut eclegma fortius.

R. conf. enulę camp. & ireos ana 3. iij. conf. capil. ven.
 3. j. pul. diatrag. frig. 3. ss. diatreos Salomonis, & pulmo-
 nis vulpis exsiccati, & præparati ana 3. j. sacch. candi 3. ij.
 cum syr. de hyss. fiat lohot. Vel fortius sic.

R. conseru. capil. ven. & anthos ana 3. ss. conser. enulę
 campanę, & florum stechad. ana 3. ij. pul. diatris simpl. &
 diatrag. frig. ana 3. ss. pul. diatris Salomonis, & galangę
 puluerisatę an. 3. j. pulmonis vulpis præparati 3. ss. mel.
 scill. 3. j. syr. capil. ven. q. s. fiat lohot. Valet etiam illud
 ecleg-

eclegma præscriptum capite de angina, quod recipit mel, crocum, myrrham, & piper. Vtuntur etiam vngtionibus factis ex vnguento resumptiuo, addito oleo de croco, vel fiat vnguentum ex oleis fortioribus, & pinguedinibus supra scriptis, vt ex ol. irino keruo. & similibus. Secundum lohot fiet fortius, si loco galangæ ponatur radix draguntij decocta in aqua hordei, donec mollescat, & diligentissimè pistata. Vtuntur suffitu præscripto cap. de catarrho quo fumigantur operaimenta capitis. Sed non fiat ista fumigatio intra cubiculum ægrotantis. Nam facile potest suffocari, nisi acrem liberimè trahat. Bonum est vti decocto præscripto cap. de tussi, ad materiæ concoctionem, loco syruporum, vel fiat tale apozema.

℞. rad. fœnic. & gly. ana ʒ. ij. radic. ireos, & galang. ana ʒ. ʒ. marubij, origani, pulegij, capil. ven. adianth. hyslopi, scab. ana M. ʒ. pass. mundatarum, sic. ana pa ʒ. quatuor sem. frig. maiorum ana ʒ. ij. seminis anisi, fœni. an. ʒ. j. ʒ. seminis apij, petro. & sesel. an. ʒ. ʒ. florum anth. stechad. & viol. ana p. j. sum. thymi ʒ. ʒ. fiat decoctio & cum syrupis ante scriptis fiat apozema, vel cum melle despumato, quo vtatur tum ad materiæ præparationem, tum etiam post purgationem, ad leniendum, & ad pectoris dilatationem. Optimum est semper in omnibus remediis vti syr. & apozematibus, medicamentis purgantibus. quæ si tus discutiunt. Solent enim asthmatici multis flatibus grauari, à quibus aliquando fit asthma, septum transuersum distendentibus, vnde non liberè fit respiratio.

De Peripneumonia. CAP. X.

Peripneumonia eodem modo curatur, quo pleuritis, hoc tantum addendum, quod sæpe peripneumonia fit ex catarrho. Ob id in decoctione in prima dosi, syrupis addenda sunt aliqua, quæ magis mouent aluum, vt parum agarici, senæ, carthami. Si fiat à materia calida, fiat venæ sectio, inunctiones, eclegmata, & omnia alia remedia, vt in pleuritide, exceptis duobus posterioribus. In peripneumonia sputum magis prouocare oportet, ad cuius prouocationem optimum remedium est illud, quod in angina conficiebatur, ex pipere, myrrha,

&c. nisi biliosa & sanguinea sit peripneumonia. Præcipuum in hac affectione, & in pleuritide, est ratio victus. Nam omnino abstinendum à vino & alimentis multum nutrientibus. Vrantur hordeato, passulis Et si ob imbecillitatem virium vti cogamur iusculis, fiant ex pullis, vel gallina leuiter cocta. In declinatione bonum est addere in iusculis parum croci, & hyssopi. Animaduertendum est, vt hordei coctura bene fiat. Nam nisi perfectissimè coquatur, flatus generat, & morbum augeat. Coctum autem perfectè est hordeum, vbi rubet. Aliud maximè obseruandum est, quòd si quarto, vel sexto die intipiant sudare, optimum est super partem affectam vesicas aqua calida plenas apponere, vt iuuetur illa excretio. Solet enim magna ex parte hic morbus solui sudoribus, vt in iuuenibus, fluxu sanguinis narium, larga & frequenti expuitione. Laxantia omnia medicamenta sunt inimica his affectibus, neque his vtendum, nisi cum magna præmeditatione. Quòd si rhabarbarum detur, vt aliquibus placet, infundatur in decoctione pectorali, vt eius astringitione corrigatur, & nunquam dandum est, nisi certissimè hunc morbum fieri à bila deprehendatur.

De sputo sanguinis.

C A P. X I.

Sputum sanguinis aliquando fit per arrosionem venæ, aliquando à ruptura venę, aliquando per apertionem osculorum venarum. Fit aliquando à pulmonibus, aliquando à faucibus, aliquando à cerebro. Sanguis ab ore & gingiuis reicitur, cum spuitione: à gutture, cum sreatu: à canna pulmonis, cum tussi: à pulmone, cum tussi satis forti: ab vlcere eius, cum tussi magna & in pauca quantitate, quod deterius est signum, quàm si in magna quantitate reiciatur, quia tunc est ab erosione visceris, & illud est ab apertione, seu rptione venæ. Aliquando reicitur à partibus pectoris, vt in pleuritide, & tunc cum fortiore tussi, quia oportet, vt perueniat ad pulmones, deinde reiciatur. Ob id distinguendum est, à qua causa fiat. Nam si fiat ob rupturam venæ, maiorem quantitatem sanguinis vel vnica vice, vel iteratis vicibus trahere oportet. Postea danda sunt ea, quæ vim astringendi habent. Si ob erosionem fiat, necessaria magis est purgatio, nisi ad diuersionem cogamur etiam aliquid

can-

Signa.

sanguinis detrahere. Curantur hoc modo. Si fiat à plenitudine, mittatur sanguis è basilica pro ægrotantis viribus. Quòd si in multis vicibus fiat, magis diuertit, & *Curatio* à minùs debilitat. Postea detur potus aquæ cum pauco *a-rup'ura* ceto. Si sanguis iam fluxerit, & periculum sit, ne aliquid *vena*. sanguinis remanserit in pulmonibus, postea detur portio sequens ad reprimendum sanguinem.

R. tro. de terra sigillata, vel de carabe, vel de spodio cum semine acetosæ 3. ß aquæ plantæ. vel cuspidum ros. vel bursæ pastor. 3. ij. syr. myrtill. vel cydoniorum, vel berberis 3. j. fiat potus.

Apponantur ventosæ super hypochondria ad regionem hepatis, & amotis ventosis epithimetur hepar, vt ostensum est cap. de fluxu sanguinis è naribus, vel cerato sandalino vngatur, addito oleo papaueris vel nenupharis. Potest fieri tale conditum, quo vtatur cum aqua ferrata.

R. confer. ros. antiquæ 3. ij. conf. symph. 3. j. pul. diarmarg. frig. & diapapaueris albi ana 3. j. tro. de terra sigillata 3. ß saech. ros. tab. q. s. fiat conditum. Optimum est etiam pectus ol. ros. vngere, vel myrthino. Nam ob id non impeditur respiratio. Vtuntur pro cibo hordeo *Victus* mundato, in quo ponant semen papa. albi. Abstineant *ratio*. à vino, & omnibus sanguinem generantibus. Vtuntur extremitatibus animalium, vt pedibus mutonum, & piscibus saxatilibus.

Quòd si multum comedere appetant, dentur his olera in brodiis, quæ in magna quantitate exhibita, parum nutriunt. Eligantur ea quæ vim habent refrigerandi, citra abstersionem insignem, vt lactuca, acetosa, spinachia, portulaca, plantago, cichoreum domesticum, vulgò, scariola, vocatum. Abstineant à maluis, betis, caulibus, & in summa omnibus acris, & calidis. Dari possunt poma acerba, pyra, mala cotonea. Si ob erosionem venæ fiat, sanguis extrahatur ad diuersionem, ob id venæ apertio debet esse parua, vt longiori tempore fiat diuersio, & minor quantitas euacuetur, quia in hac causa magis est necessaria purgatio, quam euacuatio. Ligaturis & cucurbitulis retineatur. Dentur syr. *Syrup. in-* qui inerscent, & obundant biliosi sanguinis acrimo *crassantes* niam, vt de pap. de nenuph. ros. de ros. siccis de granatis, *et aqua*.

de berberis. Aquæ etiam, quæ obtundunt acrimoniam, & inkrassant, vt portulaca, peculi ros. cãudæ equinæ, planta acetosæ, solani, & similes. Inter illa, quæ valde inkrassant, misceri potest aqua endiuix, & cich vt in syr. concoctoriis, pariter aqua lupuli potest misceri. Et statim post venæ sectionem, vel ligaturas, vel cucurbitulas detur. hæc potio.

℞. camphoræ gr. iij. aquæ ros. ʒ. ij. syr. de papau. ʒ. j. misce, fiat potio. Hæc mirum in modum astringit, & sanguinis feruorem compescit. Possunt postea fieri aliæ portiones ex tro. superscriptis & refrigerantibus. Concoquatur materia sic.

℞. syrupi de ros. siccis & de berberis ana ʒ. ij. syr. de papauere, aquæ ros. solani, plantag. an. q. j. misce pro tribus dosibus. Purgetur postea sic.

℞. prunorum, sebesten ana N. xx. tamarindorum ʒ. ʒ. myrobal. citrinorum, cheb. & indorum ana ʒ. iij. florum violarum p. j. quatuor semin. frigid. mai. ana ʒ. ʒ. fiat decoctio in q. j. dissolue colaturæ mannæ gran. ʒ. j. rhab. electi ʒ. j. syrup ros. lax. ʒ. j. fiat potio. Pauperibus loco mannæ potest poni diaprunis simpl. ʒ. j. Et loco rhab. cath. ʒ. ʒ. vel syr. ros. laxatiui in dosi maiore. Potest fieri in forma boli sic.

℞. cass. extr. pulpæ tamarindorum, & sebesten ana ʒ. iij. semin. berb. gr. iij. cum sacch. fiat bolus, capiat duabus horis ante prandium, vel sic.

℞. cath. & diaprunis simpl. ana ʒ. ʒ. cum sacch. fiat bolus. Possunt etiam fieri pilulæ pro iis, qui recusant portiones & bolos sic.

℞. rhab. ʒ. ʒ. cortic. myrobal. citri & chebul. ana ʒ. j. seminis nasturtij torrefacti gr. ij. pulpæ tamarindorū, vel sebesten ʒ. ʒ. cum syr. ros. laxat. formentur pilulæ, capiat ante cœnam duabus horis pilulas vj. sequentibus diebus reliquis. His autem conditum tale vel opiata fiat.

℞. conferuæ nenuphar. & ros. antiquæ ana ʒ. j. conferuæ consolidæ & acetos. an. ʒ. ʒ. gummi tragac. & arab. an. ʒ. ʒ. marg. non perforat. diligentissime contritarum ʒ. ʒ. terræ sigillatæ, boli arm. corallorum an. ʒ. j. sacch. ros. q. s. fiat conditum. Pro pauperibus loco margaritarum

rum pone troc. de spodio, vel de carabe, vel de terra figillata ad ʒ. j. diapap. albi ʒ. ʒ. vel diatrag. addito semine papaueris albi ʒ. j. Fit etiam opiata ad consolidationem ferè eodem modo, nisi quòd adduntur, quæ glutinandi vim habent, vt

R. conferuæ symphiti ʒ. ij. ichthyocollæ gūmi trag. & arab. an. ʒ. j. corallorum, carabæ an. ʒ. ʒ. boli armeni, mastiches, corticis thuris an. ʒ. j. sang. draconis ʒ. ʒ. cum syrupis conferua. symph. vel syr. de papauere vel iuiub. (si nimia constrictio timeatur) q. s. fiat opiata, de qua capiat ad quantitatem castaneæ, superbibat parum aquæ consolidæ, vel plantaginis vel caudæ equinæ. Si sanguis fluat per diapedesim, simili modo purgandus est, & retinendus magis glutinantibus, & obstruentibus, quàm obtundentibus acrimoniam. Solet enim hoc fieri, vel ob venæ raritatem, vel sanguinis reuitatem. Ob id laudantur alimenta, quæ emplasticam vim habent, & obstruentem, vt polenta cum lacte, & omnia, quæ ex lacte & farina parantur. Si sanguis fluat ex gutture, sufficit masticatio portulacæ, vel gummi, tragac. vel arab. vel fiat gargarisma ex aqua cuspid. ros. solani, vel plantag. vel ex succo portulacæ. Nam aqua illam vim non habet, vel cum syr. de portulaca si paratus inueniatur, vel cum simili syr. astringente, vt sunt syr. myrthinus, de nenuphare berberis, cydoniorum. Sanguinem aliquando reiciunt, sed defluxum è cerebro in pulmones, quòd apprehenditur ex nigredine. Nam solet esse concretus, & per aliquot dies antè stillauit sanguis è naribus. His darinon debent astringentia, nec sanguinem retinentia, sed potius, quæ coagulatum sanguinem dissoluunt, vt pix, mumia, vel asphaltum, aqua nucum, coagulum boedi vel leporis, admixtis cientibus sputum, vt saccharo, melle & ex syrupis, de glycyrrhiza, de hyssopo & similibus. Oportet enim sanguinè illum extra corpus reicere, ne putreat, & internas partes corrumpat.

De Ulcere pulmonis & phthisi.

C A P. XII.

Phthisis fit à sanguinis sputo, cum sanguis remanet intra pulmones, & illic putrefactus acquirit acrimoniam, qua erodit substantiam pulmonis. Fit magna ex parte ob Medicorum imperitiā sanguinis sputum

curantium, qui nulla facta diuersione, vel per sanguinis misionem, vel per ligaturas aut cucurbitulas, aut alio modo. statim dant potiones astringentes, quæ sanguineum defluxum in pulmones ibi retinent, cum debeant potius aquam mulsam, aut poscam dare, & postea quæ constringant, vt monstratum est capite superiore. Et quoties timemus Phthisim à sputo sanguinis, debemus ea usurpare, quæ venam consolidant, vel sanguinem supprimunt, cum facultate dissoluendi sanguinem coagularum, vel quæ per sputum pulmones expurgant, vel contraria commiscentes, tale medicamentum conficere, quod vtrunque possit tum abstergere,

Consolidat tum venam consolidare. Radix consolidæ maioris id
maior sy- præstare poterit decocta cum carnibus, vel condita cum
deritis no- saccharo. Nam quouis modo sumatur, consolidat, & re-
ta. crementa pulmonum purgat. Eiusdem vis est syderitis.

Coagulum leporis fluentem sanguinem, & coagularum dissoluit. Crocus pectus dilatat, coquit, leuiter astringit, si cum aliis misceatur astringentibus. Fieri potest medicamentum, quod astringat, concoquat, expurget, & sine magno impedimento respirationis, quod in primis curandum est.

℞. conferuæ symphiti ʒ. j. sacchari rosati, conferuæ rosarum mediæ ætatis ana ʒ. ʒ. gummi tragacanthi, & arabici ana ʒ. ʒ. Si sanguis fluat in magna quantitate, adde seminis nasturtij tosti scrupulum j. hypocistidis scrupulum ʒ. syrupi de papauere q. s. Fiat lohot, quod erit fortius & magis expurgans, sed minus astringens, si gummi non assentur, & conferua rosarum sit recens, addasque croci parum, aut succi glycirrhizæ. Fiet verò magis astringens, si conferua sit vetus, gummi assentur. Addas corallum aut syrupum myrthinum, & myuam cydoniorum. Nam syrupus myrthinus indifferenter usurpatur. In fluxu sanguinis post poscam & mulsam, vtendum verè astringentibus, vt dictum est superius de sputo sanguinis. Retento fluxu sanguinis ad expurgationem eorum, quæ continentur in thorace, vtendum remediis, vt supra dictum est. Firmata autem & solidata vena, vtatur etiam magis expurgantibus, addito tamen bolo, aut terra sigillata, vel alio astringente. Aqua cha-

chalybeata utatur, & aliis appropriatis ad restaurationem humiditatis, quæ dicuntur postea. Porro fit phthisis ex defluxu pituitæ salsæ, quæ erodit substantiam pulmonum. Ob id ipsos oportet curare sic, ut abscindantur causæ, maximè antequam vlcus factum sit, vel maximè consumptum corpus. Ad hæc materia coquenda erit. Coquitur autem leuiter astringentibus, ut melle rosato, syrupo capillorum veneris, syrupo iuiubino, de hyssopo. Eligendi sunt syrupi pro varietate temperamentum.

Nam si materia sit subtilis, quod magna ex parte esse solet, erit incrassanda, & eius acrimonia obtundenda, si autem crassa sit, vel ob plenitudinem, vel ob assationem in pulmone factam, oportet dare syr. attenuantes, cum aliquibus lenientibus, ut

R. syr. iuiub & capil. ven. ana ʒ. iij. aquæ hord. lb. j. misce, pro tribus dosibus, vel ponatur aquæ capil. ven. viol. scabiosæ ana q. j. Si autem materia sit crassa, accipiat mel. ros. cum syr. capil. ven. vel de hyssopo.

R. mell. ros. ʒ. i. syr. capil. ven. de gly. ana ʒ. ij. ss. aquarum capill. vngulæ caballinæ, scab. enulæ camp. ana q. j. misce, pro tribus dosibus. Euacuetur cum pilulis de assaieret, vel de hiera simpl. de ag. vel decoctione pectorali cum diaph. elect. de citro, in do maiore. Sed hoc est faciendum cum materia adhuc fluit, & corpus adhuc consumptum non est. Nam tunc sunt omittenda medicamenta purgantia, quia exiccât corpus, & ad tabem perducunt. His, qui sunt aliquo pacto affecti, & iam vlcus fieri incipit, possumus dare decoctum agarici cum manna, aut cassia in decoctione pectorali, pituitosis & ubi materia est crassa. Biliosis autem & habentibus materiam calidam & salsam, syr. ros. laxarium cum decoctione, passul. sebesten, & ex his fiunt pilulæ sic.

R. myrobal. citri, chebulorum, indorum conficatarum cum ol. amygd. dulc. rhab. ana ʒ. ss. cinamomi, succi glyr. seminis bombac. & anis ana ʒ. j. cum syrup. viol. fiant pilulæ, vel cum terebinth. lota in aqua viol. vel aqua hordei. Capiat semel in mense. Hæ pilulæ laudantur, quia euacuant materiam quodammodo constringendo, & pectus abstergent. Quod si sit pituita crassa, poteris addere agar. tro. ʒ. ij & ob anhelitus dif-

ficulatatem croci gr. vj vel ʒ. β. Et erit proprium magis in toto abscessu, vt etiam aliquo pacto consumptos pilulis possemus expurgare. Potest etiam dari manna cum iure pulli, vel cassia cum semine anisi. vel detur decoctio galli antiqui parata, vt supra monstratum est, scilicet, vt euisceretur, & in ventre ponuntur sequentia.

R. pass. mundat. par. xx. pruno. iuiub. an. N. ex sebesten N. v. medullæ seminis carth. ʒ. vj. ponantur in ventre galli, coquatur in aquæ lb. vi. ad consumptionem tertiæ partis, vtatur mane iusculo. Et si satis non leniat, adde ʒ. j. vel ij. mannæ granatæ, singulis mensibus capiat ter aut quater, nisi venter sit supra modum laxus, & solutus. Potest addi radix gly. & simp. & agar. in decoctione. Hæc purgandi ratio est optima, quia ventrem lenit, & vires non deiecit, & medicamentum distribuitur per totum corpus. Vngatur pectus butyro, vel vnguento resumptiuo, vel ol. amygd. dulcium. Vtatur suffumigio dicto cap. de catarrho, quod mirum in modum exiccat cerebrum, & pulmonem. His, qui sunt parati ad hunc morbum, & qui incipiunt laborare, summum est remedium hordeatum mundatum dare cum sacch. ros. per tres horas post coenam in introitu lecti. Nam qui sunt obnoxij huic morbo, calido sunt hepate, vel ventriculo, vel corde, à quibus eleuantur fumi acres ad cerebrum, qui commixti pituitæ penetrationem addunt, & ad pulmones demittunt. Hordeatum mundatum obtundit acrimoniam vaporum, & eos inraffiat, & prohibet ne aliquid sursum ascēdat, nec minus pulmones absterget, & corpus vniuersum humedat. Vel vtatur conserua ros. antiqua è cibo, maximè post coenam, aut aliqua alia conserua, quæ consimilem effectum præster. Tota enim cura Medici esse debet in præcauendo, ne morbus fiat, vel si factus sit, ne crescat, nec citissimè augeatur. Nam illos curare optimè, difficillimum est. Procuratione vlcerum vtimur lacte asinino, quod quidem absterget vlcus, & corpus tabidum reficit, sed si fieri potest, citissimè mulsum accipiatur. Alteratur enim facilimè lac, & corrumpitur. Lac etiam præparare oportet. Nam interdum maior est intentio abstergendi, interdum consolidandi, aliàs refrigerandi. Cum refrigerare volu-

volumus, capram vel asinam nutrimus herbis refrigerantibus, vt salice, foliis vitis, lactuca. Si autem abstergere, damus eis hordeum integrum. Si magis nutrire volumus, damus hordei farinam, vel tritici. Lac dandum est vacuo ventriculo, & mundato ventre. Quamobrem non sunt imitandi illi, qui lac præscribunt non purgato ventre, cum sua natura facile lac ace scat, maxime in ventriculo. Nam putridi humores sunt vice fermenti, qui corrumpunt totam massam alimenti etiam optimi. Ergo ventriculus purgetur decocto galli antiqui, addita aliqua parte hordei mundati, vel integri iam semicocti, vel detur manna cum decocto galli. Quod si etiam purgato ventriculo, æger patiatur nidorosos ructus vel acidos, omittatur vsus lactis. Nam illis plus nocet, quam conferet, sed viatur hordeo mundato cum sacch. ros. Semper habeat in ore diatrag. vel diappendiatum, vel sacch. candum. Noctu autem saccharum ros. tabul. quo non est aliud præstantius in hoc morbo. Eua cuato agro. cessante aliqua ex parte defluxione, optimum est vti hoc remedio.

Similitudo,

℞. syr. capil. conf. anthosana ʒ. j. nucleorum pini infusorum in aqua hord. ʒ. β. apellanarum, amygd. dulc. ana ʒ. ij. feminis bombac. pap. albi melon. cucurb. citruli ana ʒ. j. cineris cancrorum fluuiatilium, vel stagnorum ablutorum prius in aqua hordei, coralli albi & rub. ana ʒ. β. croci ʒ. vj. mell. ros. ʒ. j. sacch. ros. tab. ʒ. j. cum syr. iuiubino, fiat ad formam lohot. Adde pulueris vulpis ʒ. β. Capiat per horam ante prandium & cœnam. Si necessaria sit purgatio materię in thorace contentę, addantur illa, quę sputum prouocant, vt succus gly. & gly. ipsa, sacch. candum, diaris simpl. Minuantur astringentia. Optimum est vti pul. præscripto à Philonio cap. de phthisi in Monacho. & ait hoc puluere multos fuisse curatos. Hic puluis complet omnes intentiones. Prohibet enim descensum pituitę ad pulmones, incrassando ob semen papaueris albi admixtum in magna quantitate, & quatenus iuuatur à gummi arab. & tragac. & melle. Lenit pectus, & materiam humectat, vt facilius per tussim extrahatur. Exiccatur autem pulmo à spodio. Fieret autem puluis hic præstantior sic,

℞. seminis pap. albi 3. ℥. gummi trag. & arab. farinæ orobi ana 3. j. ℥. seminis althææ portulacæ: cucum. melonum, citruli, bomb. ana 3. iij. ℥. ciner. cancrorum fluuiat. coralli albi vsti, succi gly ana 3. j. ℥. sacc. ros. tab ad pondus omnium, fiat pul. Dentur 3. ij. cum syr. de papauere, vel iuiubarum. Hic puluis est efficacior altero, quia semen bombacis recipit, & alia quæ magis humectant vt semen citruli, cucum. In minori quantitate recipit pro spodio, quod conficitur ex ossibus equi vel alterius animalis, cineris cancrorum, qui multum laudantur in cancro, & in morsu canis rabidi, & in hoc affectu, ob exiccationem & similitudinem, quam habet eorum caro cum pulmonibus. Ob id eius decoctum multum laudatur. Coralli & cineres cancrorum abluantur leuiter cum aqua hordei, post adustionem. Nec oportet accipere astaces fluuiorum (vulgò escreuices) qui habent similitudinem cum cancris. Cancri tamen non sunt, vt ex Aristot. constat, qui inquit solos cancos carere cauda, interea, quæ tenui testa integuntur. Sed adhuc astaces præstaret capere, quam leporem marinum, vt facit Syluius in suis succedaneis. Est enim prorsus venenum, & sua natura pulmones lædit. Ob id, qui obnoxij sunt huic morbo, loliginem non edant, quia lepus marinus istis commiscetur, ita vt vix ab ea discerni possit, nisi tetro suo odore. Sed pro cancris fluuiatilibus, qui passim reperiuntur in Italia, capiemus câcos marinos, vel stagni, qui eandem habent facultatem, quanuis imbecilliores, vt docuit Diosc. cap. 10. lib. 2. neque reiciantur ob falsedinem. Nam ea adustione deponitur. Cum autem in cibo, vel iusculis assumuntur debent prius abluï aqua hordei, & caro & iusculum assumenda sunt. Valent etiam contra venenum potum leporis marini. Non me latet in exemplaribus Græcis pro cancro marino, legi leporem marinum, sed corruptus est codex, vt patet ex Diosc. cap. de câcris lib. 2. & ex Plinio. Et pro lepore. legendum cancrum. Vtantur carne & decocto testudinû nemoralium, vel coclearû terrestrium. Vtantur alimentis procreantibus bonum succum, & qui non facile dissipentur, vt auenato, hordeo mundato, vel pulte cû lacte amygd. vel capræ, vel extremitatibus animaljû. Vtantur

*Cancer
fluuiæ.*

vino dulci, & oligophoro. Conficiantur morselli aliqui in formam pignolati, ad humectationem, vt,

R. carnis testudin. & cancrorum ana ʒ. j. nucleorum pini maceratorum in aqua ros. ʒ. j. β. pul. diatrag. frig. & restaurantis humiditatem ana ʒ. j. diairis simpl. ʒ. β. sacch. albiss. diss. in aqua capill. & ros. perfectè cocti q. s. fiat ad formam pignolati, remanentibus pincis integris, vel addè amygd. contus. q. s. fiat tarta. Sed magis laudatur confectio illa pignolati, quia cum pulueres in furno decoquuntur, humiditas amittitur. Si superueniat fluxus ventris, statim succurrere oportet. Nam phrithi superueniens fructus ventris, lethalis est. Succurritur astringentibus ventrem, sed magis ad extrà, vel remediis infusis per sedem: quia si per os sumantur, faciunt anhelitus difficultatem. Indantur autem, quæ indifferentia sunt, vt conser. ros. syrup. myrthinus, syrup. capill. ven. quia extenuat, sed per accidens. Si adsint vigilæ, syr. de papauere, qui est semper optimus in hoc morbo, nisi materia retineretur intra pulmones ob crassitiem. Nam tunc ab eo abstinere oportet. In frontali vrèdum est vel oxyrrhodino, vel syr. viol. cum aqua hordei. Si autem retineatur sputum, relaxantibus vnguētis pectus, & eclegmatis subueniendum est. Eclegmata sunt attenuantia, & sputum prouocantia, vt fiunt ex syr. de hyss. de glycir. capill. diairis simpl. & Salomonis, & similibus. Nunquam adeo attentum esse oportet ad id, quod magis vrget, vt omnino negligatur morbus aut aliud symptoma minus.

De empyeumate.

CAP. XIII.

Empyeuma fit aliquando à catarrho, & tunc curatur, vt tussis è materia viscida. Purgatur vniuersum corpus. Extenuatur humor, & præparatur, vt per sputum educi possit. Addimus ergo eis in medicamentis, ea quæ magis abstergunt, & quæ magis extenuant, nisi cum febris adest. Tunc enim minus calidis est utendum, attenuantibusque. Si autem fiat ab abscessu acervato, rupto, & in vacuum thoracis locum effuso, inter membranam costas succingentem, & pulmones, statim danda erit opera, vt id, quod potest digeri, digeratur, & reliquum coquatur. Hec fit vnguētis catapl. & potio-

nibus assumptis. Fiunt etiam cataplas. ex rebus maturantibus, & digerentibus sic.

℞. dactyl. sic. ana N. xx. rad. bismal. lilio. ana ʒ. ij. flor. cham. meliloti ana p. j. fiat decoctio, & omnia fortiter contundantur, quibus misce farinæ orobi, & fœnug. ana ʒ. iij. ol. liliorum, amygd. dulc. ana ʒ. iij. misce, fiat catap. Adde ceræ vel resinæ parum, & fiat vnguentum, vel emplastrum. Ex paratis vti possumus diachilo magno & paruo, & ireato, emplastro de meliloto. Portiones sũt hoc modo.

℞. rad. ireos. mal. glyc. ireos siccæ ana ʒ. j. sic. pass. an. N. xx. seminis bismal. seminis lini ana ʒ. iij. seminis melon & bombac. ana ʒ. ij. fiat decoctio. In col. diss. mell. q. s. fiat syr. vel apponantur syr. appropriati, vel sacch. vel sapa. Et in fine purgetur leuiter cum manna, vel cassia. Nam à principio vel sanguis missus est, vel purgatus. Aliqua ex parte iam maturato abscessu (non enim oportet expectare perfectam coctionem) conandum est, vt rumpatur abscessus. Non rumpitur autem ob conatum, nisi tussis prouocetur. Aliqui laudant potionem ex fermento, vel extra cauteria apponantur, si locus tangi possit. Quod si vrantur cauteriis, & sanies fluat, læuis, æqualis, & non fœtida, euadent. Si autem vt oleum, vel si cruenta sit, vel fœtida, malum est. Tunc fiat eclegma ad absterfionem pulmonũ, & cum perfecte pectus erit mundatum, ducatur vlcus ad exiccationem. Eclegmata erunt, quæ dicta sunt in pleuritide & tussi Et propter hæc possunt dari syr. sequentes, quos capiat lambendo.

℞. oxymel scill. ʒ. j. syr. capill. de hyss. ana ʒ. j. s. aut ʒ. ij. misce, capiat lambendo. Vtatur & lohot præscripto cap. de raucedine, ablatis cubebis. Si iam ad tabem deuenierit, curabitur vt phthificus. Deinde potest vti lohot ex pipere, myrrha, melle, vt dictum cap. de angina. Si febris sit magna, omittatur piper. Victus ratio sit talis, qualis erat phthificorum, & pleuriticorum, nempe hordei mundati. Quod si opus sit purgatione, purgetur cum decocto galli antiqui, vt dictum est supra.

De pleuritide Gera.

C A P. XIII.

Pleuritis alia vera, alia non vera. Pleuritis vera fit, vt plurimum à sanguine, vel à bile, aliquando à pituita, raro

raro à melancholia. Curatur syru. detur primùm clyster molliens, si tempus pariatur: postea fiat missio sanguinis è basilica, vel mediana eiusdem lateris ad magnam quantitatem. Quod si dolor non remittatur, fiat reiteratio. Vel post sanguinis missionem detur clyster. Si conficiatur talis decoctio pro clystere, poterit & ex ea fatus.

Clyster.

R. rad. mal. bisinal. liliorum an. ʒ. j. mal. viol. pariet. an. M. j. seminis lini, fœnug. an. ʒ. j. seminis bismal. ʒ. ʒ. (si flatus morbum faciant, aut augeat, adduntur, quæ illos discutiunt, vt semen anethi, anisi & fœ. an. ʒ. ij.) flor. ũ cham. melid. sambuci viol. an. p. j. fiat decoctio. In ʒ. j. col. dist. cass. mel. ros. col. vel sacch. rub. an. ʒ. ij. olei viol. (si febris sit ardens) vel chamomillæ (si à flatibus) ʒ. iiij. misce. fiat clyster. detur tertio quoque die, nisi venter solutus esset. Residuum decoctionis ponatur in vase æneo, vel in vesica porci (quæ magis laudatur, quia magis aptatur lateri, quam vas æneum, quod pondere etiam grauat) vel in spongia magna. Ponatur panni intra vesicam & latus, ne nimium humectetur. Post vesicæ ablationem, vngatur sic.

R. ol. amygd. dul. ʒ. ʒ. ol. liliorum & chamo. an. ʒ. j. cum pauca cera, fiat vnguentum. Si morbus sit adhuc in principio, vel febris sit admodum ardens, addi potest. ol. vio. tantundem, vel vngatur vnguento resumptiuo. Quod si timeatur propter antiquitatem eius nimia calfactio, abluatur cum aqua hordei, & addantur olea, quæ apta ad faciendum medicamentum idoneum tempori, vel morbo, vel symptomati, vt si æstate, vel in temperatura valde calida, & in hoc morbo cum feb. ardentissima, post ablationem adde ol. vio. ʒ. iiij. Si medius sit morbus, ol. cham. vel liliorum. Si autem morbus esset à materia frigida pituitosa, & tempus esset frigidum, accipe ol. irinum, vt in declinatione etiam omnium pleuritidū facimus, à quacunque materia fiant, quocunque anni tempore. Si non reperiat vnguentum resumptiuum, fiat sic.

Vnguentum.

R. buryri recentis sine sale, vel (si non adsit recens) abluti decies in aqua hordei ʒ. ij. ol. cham. & amygdal. dulc. ana ʒ. iiij. olei liliorum & irini, vel kerini. an. ʒ. j. (Si materia sit calida, loco irini pone viol.) mucilag. seminis lini & fœnug. extractæ cum aqua hordei ana ʒ. j. In ma-

teria calida addunt nonnulli mucilag. seminis psilij, & cydoniorum, sed illa parum placent, quia præter facultatem refrigerandi, habent vim emplasticā, & astringentiam. Quapropter satius erit addere maiorem quantitatem ol. vio. & minus calidis uti. Nam ol. vio. simul & acrimoniam caloris obtundit, & relaxat. Semper autem in pleuritide, & anguina addenda sunt, quæ digerunt, & relaxant in parte externa. & id citra admixtionem astringentium, quia nulla est opus astrictione, ad robur partis affectæ, ut est in hepate & ventriculo, ceræ q. s. fiat vnguentum. Additur trocus vnguento resumpto, vel huius vnguento enula camp. puluerisata cum materia est frigida, & multum viscida. Potest fieri sacculus, s. d. hoc magis, fit in pleuritide non vera, ut & emplastrum, quod suo loco monstrabitur. Quotidie detur talis decoctio pro syr.

℞. gly. ras. ʒ. j. pass. sic. iuiub. ana n. xx. (si à sanguine, & bile fiat, adde sebesten & prunor. dulc. tantundem) quar. sem. frig. maior. & semin. mal. vel bismal. ana ʒ. ij. florum cham. & viol. an. p. j. hordei integri p. j. anisi ʒ. j. fiat decoctio. In qua diss. syr. viol. & iuiub. ana ʒ. ij. misce, pro tribus donbus. Optimum erit in prima dosi ponere tantum syrup viol. ʒ. ij. manna gran. ʒ. j. vel ij. Quod si maiore opus esset lenitione ventris, adde cassiæ ʒ. ss. & hoc in primis dosibus faciendum est, ne impediatur significatio crisis, vel crisis ipsa. Non igitur detur quarto die, neque sexto, neque septimo. Decoctio cum syrupo dari potest quolibet die. Si autem materia sit viscida & frigida, ut possumus syr viol. sed admixto alio syr. incidente ut sunt de hyss. de gly. vel mel. Siue materia sit calida, siue frigida, teneant in ore sacchar. candum. Si calida sit, elect. diatrag. frigid. diapenid sine speciebus: si frigida, elect. diairis simpl. vel Salomonis. Fiant lohot ex iisdem, ut si materia incrassanda sit, fiant hoc modo.

℞. elect. diatrag. frig. ʒ. j. penid. & sacch. candi an. ʒ. j. syru. viol. & iuiub. an. ʒ. j. ss. misce, fiat lohot. Si maiorem incrassationem desideres, adde syr. pap. ʒ. ss. Cum autem ponimus syr. de pap. optimum est addere syr. capil. ven. Reparatur enim eius violentiam. Si materia sit frigida, fiat hoc modo.

℞. elect. diairis simpl. ʒ. j. pul. diairis Salomonis ʒ. ss. sacch.

Sacch. candi, diapenidiarum ana ʒ. j. syr. de gly. & capill. ven. an. ʒ. ij. misce, fiat lohot. Saccharum candum, & penidiæ in quavis materia ponuntur indifferenter. Melius est componere talia eclegmata, quàm paratis vti. Nam ob antiquitatem ranceiscunt, & illa magis parata sunt pro tussis a materia frigida, & pro expurgatione materiæ frigidaë pituitosæ, quàm pro pleuritide, in qua adest febris, & materia est incrassanda, vel attenuanda. Quare si quis paratis vtatur, propria reddet huic affectui, addendo syr. proprium morbo, vel tempori, vel temperamento, vt si timeatur nimia caliditas, accipe lohot sani, vel lohot de pino ʒ. j. syr. viol. & elect. diatrag. frig. an. ʒ. ij. fiat lohot. Accedente statu ad corroboracionem virium, & confortacionem solent Medici præscribere condita, vel in hoc addunt corroborantia, vt

R. conf. viol. ʒ. conf. buglos. & capill. ven. an. ʒ. ʒ. pul. diatrag. frig. & diapenid. sine speciebus ana ʒ. j. syr. iuiub. & viol. an. ʒ. j. misce, fiat lohot. & hoc est pro materia calida. In frigida vero potest fieri sic.

R. conf. capill. ven. ʒ. j. conf. viol. & buglosi ana ʒ. ʒ. conf. ireos, vel enulæ camp. ʒ. j. pul. diaris simpl. & diapenid. sine speciebus ana ʒ. j. syr. de gly. & capil. ven. ana ʒ. j. fiat lohot. Conserua viol. additur quamuis sit materia frigida, quia timetur caliditas ireos, & enulæ campanæ Sunt, qui citra delectum alios pul. addunt, vt in materia calida, diamar. frig. qui magis videtur retinere materiam, quàm corroborare Ego autem non nisi in materia calida, & in nimia quantitate, & in maxima necessitate vti vellē, vt in materia frigida elect. de gēmis. Circa statum solet subsequi instantia vigiliarum, & tunc præscribuntur potiones somniferæ, vt syr. viol. cum decocto hord. vel syr. de pap. si materia sit calida. Si autē materia sit viscida (quanquam rarò accidit, vt ab hac vigilie superflue sequantur. Materia enim viscida cum frigida sit, potius vererem conciliaret) meliù. erit frontali, aut inunctione frigida vti, vt ol. viol. quo concilietur somnus. Potiones enim frigidaë magis incrassant, & sputum retinent. Neq. his vti debemus, si expectandus sit fluxus criticus, vt fluxus narium. Quod si in materia frigida interdum cogamur vti potione somnifera, fiat vt sequitur.

R. syr. viol. & capil. ven. an. 3. j. syr. de pap. 3. ss. detur cum ptisana. Si velis addere pul. potest addi pul. diatrag. frig. diapenid. sine spec. & post somnum corrigere oportet, si quid retentum fuerit, vngendo pectus, dando lothot, quod fortius incidat. Dantur aliqua ad curationem istius morbi quæ magis à tota substantia prodesse constat, quàm ratione aliqua, vt decoctum pap. rub. in aqua scab. vel pimpinellæ, cineres priapi tauri cum vino vel cum aqua hord. Fit autè papaueris decoctio hoc modo.

R. florum pap. rub. M. ss. aquæ scab. lb. ss. aquæ pimpinellæ qr. j. concoquantur leuiter, adde sacch. parum, fiat ad formam iulep. dentur à principio b. s. vel ter in die 3. iij. Sequens dari potest omni tempore morbi.

R. cineris priapi tauri 3. j. detur si febris sit remissa cum vino. Vel cum aqua hordei, vel cum aqua capil. ven. vel cum brodio. Aqua vel decoctum cardui benedicti vel argentati mirè confert in vtraque pleuritide, verum an in peripneumonia etiam cōferat, nondum compertum est. Et ista sunt experientia comperta & confirmata, nec dari potest ratio quare tantopere is cinis priapi tauri conferat, nisi quod fortasse id proueniat à similitudine substantiæ priapi tauri cum membrana costas succingente. Est etiam emplastrum quod in materia frigida & viscida, & in pleuritide non vera laudandum est. Quanquam in omni pleuritide vulgus id præscribat.

R. picis naualis qr. j. ol. cham. 3. iij. sulphur. 3. j. malaxentur, fiat emplastrum, ponatur supra partem affectā. Si dolor fiat à flatibus, etiam multum prodest. Sed est mutandum emplastrum, prout mutatur dolor. Tempore sitis vtantur syr. viol. vel iuiubarum cum ptisana, si fiat à materia calida: Sin à viscida, syr. capil. ven. Potest fieri conditum pro siti in delicatis & imbecillis, vt

R. conf. viol. 3. ij. conf. bugloss. 3. j. pul. diatrag. frig. 3. j. sacch. candi 3. ij. sacch. tabarret q. s. fiat conditum Vtatur in statu tempore sitis, miscendo cum aqua hordei, vel excipiendo cochlear. ij. postea bibendo parum aquæ. In materia frigida minuatur dosis conf. viol. vsque ad 3. ss. & ponatur conf. capil. j. 3. & diaris 3. j. cum 3. j. diatrag. frig. Verum syr. diutius adhærent, & magis sputum promouent, quam condita.

Pleuritis non vera curatur ferè iisdem remediis, nisi quòd in parte externa fortiora remedia sunt adhibenda, vt emplastrum præscriptum, & sacculus sequens.
 ℞ flor. cham. samb. & melil. an. p. j. seminis anethi ʒ. ʒ. ʒ. fœnic. ʒ. ij. seminis mal. ʒ. j. ʒ. (Si addas in materia frigida vel ventosa, seminis rutæ vel cymi. ʒ. j. erit efficacius) fiat sacc. interbastatus, qui calfactus super patellam ardentem irroratam vino supra partem affectam applicetur. Vnguentum illud præscriptum fortificatum cum aliquo ol. magis digerente, erit optimum, vt si fiat sic.

℞. ol. liliorum cham. & irini ana ʒ. ij. ping. gallinæ, anatis, & butyr. ana ʒ. j. musc. seminis lini & fœnug. extr. cum aqua hord. an. ʒ. ʒ. pol. ireos, vel enulæ camp. ʒ. j. croci ʒ. ʒ. ceræ q. s. fiat linimentum, quo vngatur locus dolens. Potest addi vnguentum dialtheæ. Potest etiam fieri decoctio pro clystere & calefact. hoc modo.

℞. rad. bismal. & liliorum an. ʒ. ij. merc. ciclæ, parietar. branchæ vrsinæ ana M. seminis lini & fœnug. ana ʒ. j. seminis anethi, bismal. fœnic. & anethi an. ʒ. ʒ. ʒ. flor. cham. melil. samb. an. p. j. fiat decoctio (si materia sit valde frigida vel fiat à flatibus. potest addi seminis carui vel cymini vel rutæ ʒ. j.) in lb. j. col. dissol. mel. & cass. an. ʒ. ij. Si forte materia adhuc flueret, additur aliquid hieræ picræ, ad retractionem materiæ fluentis. Tunc etiam fumigio vtendum, vt diximus capite de catarrho. Igitur ponemus hieræ picræ ʒ. ʒ. vel elect. indi maior. ʒ. ij. Si dolor vehemens sit & omnia consentiant, fiat missio sanguinis, vt in vera pleuritide. Quòd si ætas vel cruditas materiæ, vel aliud impediat, apponendæ sunt ventosæ super nates sine scarificatione, si materia omnino frigida est, vel cum scarificatione, quando est permixtio sanguinis. Detur decoctio præcedens singulis matutinis, vt in vera pleurit. Augeatur anis. & fœnic. ad flatus discutiedos. Possunt etiam addi flores samb. in decocto. Accipiat clysterem tertio quoque die. In hac pleuritide appositio cucurbitarum supra partem affectam, lenito sæpè ventre, & misso sanguine, vel prius apposis cucurbitulis supra nates, vel supra spatulas in fortissimo dolore, vel materia iam accedente ad concoctionem mul-

tum valet. Quod si materia ad partem externam trahatur, & vertatur in sanietem (quod patet ex inundatione, & partis inflammatae pulsatione) operiatur locus, ut in aliis abscessibus, vel ut edum emplastro de meliloto, vel alio digerente, ut materia potius per insensilem transpirationem, quam per manifestam euacuationem educatur.

Alterum caput de pleuritide.

Pleuritis nomen accepit à costa, quāquam sit inflammatio membranae succingentis costas. Illa duplex. Altera, quæ extenditur per partē interiorē omnium costarum. Altera verò, quæ costam vndiquaque inuestit, tanquam periostrium costarum, & in utraque membrana fit inflammatio. Distinguitur autem species ex decubitu. Nam si æger in partem affectam decumbere potest, & non in oppositam, argumento est affectum esse in membrana extensa, quæ hypoficota dicetur, & hoc fit, quia cum in oppositam partē decumbit æger, pondere materiae collectæ illa membrana distenditur magis, & diuellitur à costis. Illa autem quæ fit in periostrio, contrario modo se habet. Nam in oppositam partem dormire possunt, in affectā verò minimè. Sed quia hæc nota communis est pleuritidi veræ & non veræ, ob id aliam notā adiungere oportet ad distinctionem harum. Nam si affectus sit in musculis externis, si digito prematur, dolorem sentiunt. Quod non accidit his, qui inflammationem in periostrio habent, nisi supra modum comprimatur costa. Fit etiam pleuritis in musculis intercostalibus, quæ species pulsatione deprehenditur. In multa enim inflammatione costarum materia comprimitur, præterquam in inflammatione musculorum intercostalium. Hac nota certissima deprehenditur, & in utrumque latus dormire possunt. Conveniunt omnes in dolore pūctorio, in pulsu duro, in difficultate anhelandi, febre verò & sputo distinguuntur. Nam omnes inflammationes internæ febrem habent, sed dolor lateris sine febre, à materia frigida vel flatulenta excitari solet. Nulla tussis, nulla exspuitio sequitur. quia materia in parte externa continetur. Omnibus aliis difficultas respirandi est maior, & dolor magis pungens, sputio magis sanguinolento, vel flava, vel spumosa. In inflammatione membranae internæ semper adest paucæ, aut multa

multa in morbi processu. Nam in salubribus tantū, mox
 apparet sputū. Verū in inflāmatione musculorum in-
 tercostalium minor fit resudatio, ob id expuitio minor.
 In ea parte quæ est in periostio ferè nulla apparet, & re-
 soluitur per insensilem trāspirationem & sudorem, mo-
 do missio sanguinis prohibuerit incrementum. Nā talis
 inflāmatio à pauca materia fit, & hoc maximè notandum
 est ad prædictionem. Nam communi prædictio pleuriti-
 dis est, quod si à principio, vel mox expuant facile, bene
 est sperandum. Si verò nō expuant, mortem prædicimus.
 Quod de illa interna inflāmatione est intelligendum,
 non de aliis. Hæc enim multum sanguinis, vel bilis, vel
 pituitæ recipit. Quare plus sanguinis extrahere oportet
 & maiore curam expirationis habere. Cum omnis pleu-
 ritis sit inflāmatio, & per defluxum alicuius humoris
 fiat, distinguendum est, à qua substantia fit. Nam fit à
 sanguine, vel à bile, vel à pituita, vel à bile atra. A san-
 guine frequenter fit, in iunioribus & iis, qui multo san-
 guine abundant. Cognoscitur autem ex totius corporis
 plethora, & sputo sanguinis. A bile frequenter, quia mul-
 tus sanguis tenuis in corde & pulmonibus à quibus par-
 tibus materia defluit per venam azigos continetur. Se-
 quitur iras, & exandescencias, & magnas exercitationes
 cum clamore magno. Color ex rubro fluescens ab aliis
 distinguit. A pituita sæpe fit in pituitosis post neglectas
 defluxiones, cuius sputum tardè apparet. A melancholia
 rarissimè fit. Nam ut ob lentorem pituita, ita ob crassi-
 tiem melancholia non facile fluit. Curantur autem fa-
 cile à sanguine, quia humor facile concoquitur, si san-
 guinis missio opportunè adhibita fuerit, id est, fluente
 materia, & multus sanguis extractus. Secundo biliosa ci-
 tō terminatur, difficilior tamen, quàm quæ à sanguine.
 Longissimè soluitur septima die, & sæpius sudoribus, &
 nonnusquam fluxu sanguinis narium. Pituitosa raro an-
 te decimum quartum curatur. Extenditur quandoque ad
 multos dies, ut de illa Anaxioménis videre est apud Gal.
 & Hipp. Veritur hæc affectio facile in peripneumoniam
 ob partium vicinitatem & consensum. Deprehenditur,
 quod dolor minuitur, sed febris & difficultas anhelandi
 magis apparet, sputum magis spumofum est, & genæ ru-

bent, & hi omnes ferè moriuntur. Quæ à melancholia fit, rarò aut nunquam curatur. Pleuritis, quæ post morbum alium diuturnum accidit, lethalis est, vt etiam ea, quæ fit in his, qui cachexia laborant. In caussa est, quod illa inflammatio non ab humoribus, sed nõ naturalibus sanguini permixtis fit, quæ quo magis à sanguinis natura distant, eò difficilius concoquuntur, & reguntur à natura. Solet solui fluxu ventris. Quare prudenter scripsit Hipp. A pleuritide, & Peripneumonia habitis, diarrhæa superueniens, lethalis est. Quòd si in principio harum inflammationum aliqua fiat per partem euacuatio, quia materiam fluentem auertit à parte inflammata, modò vires consent, & inflammatio à tali humore fiat, vtilis est, neque de illa intelligit Hipp. Nā dixit, habitis. Nam materia coniuncta per fluxum ventris purgari non potest, vt materia antecedens, quæ fortè ab hepate fluebat. Hæc enim per venas purgari potest. Soluitur nonnunquam pleuritis fluxu vrinæ, vt Gal. etiam testatus est. Sed tantum illæ inflammationes, quæ in superiori parte thoracis, & quæ ad radicem costarum fiunt. Illa enim pars maiorem consensum habet cum vena caua, per quam ad renes defluit. Neque est reformidandus transitus materię propter eor, cum materia illa cocta per crism expellitur. Tunc vni, quæ tenuis erat, hypostasim crassam & quasi fursuream habet, aut spissam. In omnibus istis febris est quasi symptoma, & ob febrem crises istę fiunt. Argumento est, quod post istas excretiones febris desinit, sed expectoratio per aliquot dies perseverat. Soluitur aliquando suppuratione, quæ si in parte interna sit, periculosa est, ob repentinam ruptionem tumoris. Suffocatur enim æger, aut fit empyema. Si verò in aliis partibus ad extra materia prorumpit, aperta curatur, & maxime ad suppurationem veniunt, quæ ob casum, vel ictum excitatæ fuerunt. Curatur autem hoc modo.

C V R A T I O.

Iniiciendus est clyster, si occasio mittendi sanguinis non vrgeat. Quòd si præterierit primus & secundus dies, statim sanguinem mittere oportet, quæcumque hora diei vel noctis, vel anni tempore, modò magnitudo morbi & virium robur illa indicent. Facienda verò à parte, quæ

quæ è directo est partis affectæ, & à maiore vena vt basilica, vna vice, si vires id facere possint, ad sanguinis mutationem, & doloris aliquam mitigationem extrahere oportet. Quod si ob virium imbecillitatem, vel agrotantis difficultatem, illam euacuationem ferre non possit, in duas diuidere oportet, sed quæ eadem die, vel paruo intervallo fiat, vel si videamus, per epicrasim facienda est & nisi magna fiat missio sanguinis ab ea parte, plus damni euenit, quàm vtilitatis. Nam illa pars sanguinis missione commouetur magis, sanguis, & venæ parum inaniuntur, per quas agitatus sanguis facilius ad partem affectam fluit. Facienda verò est à vena magna, quia facilius fit ex ea euacuatio & è directo partis, vt fiat *remissio*. Quæ rectitudo nō ob villos rectos, sed quia imitanda est natura, quæ solet facere suas excretiones secundū rectitudinem. Solent enim partes dextræ in dextras sua excrementa mittere, sinistræ in sinistras. Hæc autem sanguinis missio diuersio est, quæ ob materiā fluentem, non ob coniunctam fit, nisi cum post aliquot dies fit. In qua inflammatione aliqua materia impacta est, ratione cuius deriuatio facienda est, quæ si ad mutationem coloris sanguinis fiat, erit deriuatio & diuersio. Sanguinis missio, quæ à parte opposita fit, non potest esse utilis, nisi in principio, in quo nulla aut pauca materia collecta est, & continetur in magna vena, quæ rectitudinem habet cum parte dextra & sinistra. Neque audiendi sunt, qui docent semper esse faciendam in parte dextra, quòd vena azigos magis ad partem illam veniat quàm in aliam. Hoc tamen faciendum ad deriuationem existimamus. Qui primum ex parte opposita trahebant, deinde secunda missione sanguinis materiā impactam euacuare tentabant. Verum frustra fit per plura, quod per pauciora fieri potest. Quare ab eadem parte trahendus est sanguis, cum per illam partem & diuersio, & deriuatio fieri possint. In pueris & mulieribus vtero gerentibus, & in senibus aut his, qui ob aliquam occasionem, missionem sanguinis ferre nequeunt, cucurbitulæ appositæ in inguinibus in principio, quando materia fluit, materiā auerunt sine aliqua euacuatione corporis, & citra viriū dissolutionem, sed diutius retinendæ sunt, donec dolor vt-

cunque mitigatus fuerit. Clyster iniiciendus paulò post sanguinis missionem. Nihil refert si ante aut paulò post iniiciatur. Si venter non plus iusto fluat, pareatur sic.

℞. maluz, bism. cum rad. viol. an. M. ij. ficuum N. xx. semi. lini & scæneg. an. ʒ. j. anis ʒ. ʒ. flor melil. chamo & viol. an. P. ij. fiat decoctio. In tñ. j. decoctionis diss. mel. lis viol. ʒ. ij. olei cham. ʒ. iij. fiat clyster. Hic utilis est, quia emollit & leuiter deterget, & partes tensas laxat, facitque ad sedationem doloris. Ex vna parte decoctionis post sanguinis missionem impleantur vesicæ vel vasa ænea, vel macerentur spongiæ, vel filtra, & lateri apponantur ad sedationem doloris. Residentia contundatur, & per cribrum mittatur, cui addantur axungia porci ʒ. iij. butyri ʒ. ij. fiat cataplasma, applicetur supra partem affectam, vel ponatur in sacculo, & apponatur lateri. Melius est & cõmodius, si applicetur lateri, quam vas illud æneum, vel cucurbitula. Quare satius erit uti sacculis, vel filtro, vel spongia in decoctione maceratis. Deinde prouidendum de syrupo dando pro siti, de bechicis remediis & aliis dandis, quæ à materia & causa efficiente, vel à modo, quo affectio incipit, colliguntur. In principio respicere oportet, si expuat, aut non. Si expuat, color sputi & facilitas consideranda. Quale enim est sputum, talis est materia, quæ morbum committit. Si ergo sanguineus, à sanguine: sfflauescens, à bile. In istis duabus causis incrassantia in principio danda sunt, quæ materiam inspissent, magis in biliosa, minùs in sanguinea. Ergo pro siti in materia multum tenui, dare oportet pro potu syrupum violaceum, qui refrigerat, & leuiter inspissat. Vel si defluxio adhuc sit, syrupus iuiubinus, quia inspissat. Ideo magis conuenit tempore defluxionis. Quo etiam tempore dari poterit syrupus de papauere cum aqua pimpinellæ, vel cum aqua hordei. Inspissando intercipit defluxiones, & dolorem sedat. Quod ab oculis aliqua eussa fieri multi putant. Detur cum aqua hordei mundati in principio, vel cum decoctione iuiubarum, quia inspissat. Si verò tenuis sputio, & pituitosa sit, quod deprehenditur, quia morbus affatim incipit, & cum frigore quodam, si tussiant, & nihil expuant, vel parum, renue, & spumofum, dare oportet syrupum inspissantem, sed

sed cum decoctione hordei integri, vel passularum, vt syrupum violaceum, vel iuiubinum. Sed citius ad alios syropos veniendum, vt ad syrup. capil. ven. & illum dare oportet in decoctione liquiritiæ, vel hordei, & pass. & omnibus simul coctis. Hac eadem ratione parabitur decoctum, quod damus singulis matutinis. Debet autem fieri ex fractibus detergentibus, & iisdem syrupis.

Pro sanguinea.

℞. pass. pruno. dulc. & non acido iuiub. an. N. xx. quatuor semi. frig. maio. bombæcis & malux an. 3. ij. anisi 3. j. liquirit. raf. 3. j. florum viol. borrag. bugloss. an. p. j. fiat decoctio. In tb. j. diss. syr. viol. tb. ss. misce pro tribus dosibus. Capiat pro prima vice 3. vj. Reliquis duobus diebus 3. iij. tantum. Utatur donec morbus planè curatus fuerit, nisi superueniat magnus ventris fluxus. Tunc enim abstinere oportet ab istis decoctis detergentibus & lenientibus aluum. Sed tunc talis potio parari poterit, quæ neque ventrem irritabit, neque expectationem impedit.

℞. hordei mundati p. j. quat. sem. frig. maio. & anisi ana 3. iij. flor. bugloss. & borrag. ana p. j. fiat decoctio. In tb. j. dissol. syr. capill. ven. 3. j. misce Capiat pro tribus dosibus matutinis. Vel si vires debiles fuerint à principio, neque sanguis missus, & fluat materia, quæ morbum non leuat, tunc abstinendum ab his, & topicis remediis ventrè roborare oportet. Nam vt Hipp. scriptum reliquit, A Pleuritide, & Peripneu. &c. Fiat ergo inunctio supra ventrem in inferiorem & renes, vt capite de diarrhæa dictum est, vel sic.

℞. olei cydoniorum, vel myrtill. 3. iij. vel. ros. omph. succi cydoniorum & olei ros. an. 3. j. ss. misce, vngantur partes prædictæ. Quod si fortius constringendum, adde pul. myrtill. ros. rub. mastiches, macis. coralli rub. ana partes æquales. Sinapisentur partes post inunctionem. Dentur iuscula magis spissa, & alia, quæ ventrem, non neglecta expectatione, iuuant. Si verò morbus pituitosus, & materia crassa detergentibus tantum, in principio. In declinatione, incidētibus & detergentibus vtendum. Nam quæ incidunt, materiam deducunt ad partem affectam, sed vbi constitit defluxio, ad expectationem

faciunt, si crassa sit, incidentia & detergentia, vt oxymel, syr de liqui. & aliis similibus vtendum. Si igitur pituito. sa sit, parent tale.

℞. liqui. rasæ 3. j. passul. ficuum anapa. 10. anisi 3. iij. semin melonum & cucurb. ana 3. j. florum chamom. & buoloss. anap. j. hordei integri p. j. fiat decoctio in lb. j. dissol syr. capill. ven. & de liquir. ana 3. ij. misce, cap. manè 3. vj. Addimus sappam dulcem, vel parum mellis violati in valde pituitosis, non oxymel, neque syrup. de siechade. Hęc enim nimium attenuando & calefaciendo fluxionem nimiam facerent, & febrem incenderēt. Si quando detergentum, oxymel detur permixtum syr. præf. ad expectorationem pituitæ crassæ, relictæ, ne fiat peripneumonia, ex hoc transglutiendo parua quantitate manè, ne irritetur defluxio. Hoc damus iis, quibus sanguis missus est, vel cucurb. fuerunt affixæ. Quod si puer sit, vel senex, in prima dosi dissol. mannâ vel parum cassiæ, sed admodum rarè, neq; rhab. vel alia medicata. Neque ista, nisi cum magna præmeditatione, sed contentus clysteribus & decoctis istis curate soleo. Vidi multos perire ob medicamenta laxantia, & in hoc sequor Hipp. qui dicit, inflammationes internas medicamentis laxantibus non curandas, quia nihil à parte inflammata euacuant, & sanas colliquefaciunt. Non me latet, Hipp. imperasse medicamenta laxantia, si dolor ad hypocondrion extendatur, sed à Galeno non probatur Hipp. opinio, puto Hipp. loquendo, inflammationē hypocondriorum pro pleuritide intellexisse, in qua & Gal. in meth. med. concedit ad materiâ coniunctæ educationem, siue sit in splene, siue in caua hepatis parte, medicamenta laxantia. Tales enim partes consensum habent cum intestinis, quare conueniens est regio, sed quæ in thorace, vel in lateribus, continetur, nullum proprium consensum habet cum intestinis. Quare nullo pacto medicamentis laxantibus vtendū, sed solis clysteribus, vel decoctis. vt si aliquid in intestinis, vel ventriculo collectum sit, euacuent. In solo morbo pituitoso, qui fit per catarrhum siue defluxionem, conuenit medicamentum laxans, idque initio siue cum materia incipit moueri, & surgere, siue interna, siue externa, talem statim medica-

mentis laxantibus permixtis decocto, vt est frequenter agaricus decoctus cum decoctione pectorali & syr. ros. lax. euacuamus. Si sine febre, pilulas illas medias damus, vel decoctum tale paratur ad materiam illam fluentem turgentemque, vt,

℞. liquir. rasæ ʒ. j. pass. ficuum ana N. xx. fenic. senæ or ana ʒ. iij. agar. tro. ʒ. j. florum chamæ. viol. ana p. j. anisi ʒ. hordei mundati p. j. fiat decoctio. In q. j. dissol. syr. ros. laxa. ʒ. ij. mellis viol. ʒ. iij. misce, cap. prima vel secunda die defluxionis.

In pleuritide à bile, si post cachexiam fiat, in principio si non mittatur sanguis ob ætatem vel imbecillitatem, purgare oportet, quia materia ab hepate fluit, tunc decocto præscripto, tantum addimus syrup. ros. lax. ʒ. ij. & damus. Syr. enim minorem astringentem habet à rhab. & minus calefacit. Sed si dandum est rhab. oportet infundere in decoctione illa & leuissimè exprimere, & dandum in ipso principio, vt materiam antecedentem euacuet, & fluxionem intercipiat. Syr. viol. est adiungendus, & omnia dulcia, & hoc ad materiam antecedentis euacuationem. Cum materia impacta est, tum per sputum educere, & per topica remedia digerere oportet, quibus non est statim utendum, vt neq; fotu, neq; vnguento, neq; alio calefaciente medicamento, ne ad partem affectam aliquid fluat, sed cum dolor vehemens erit, tunc materiam collectam oportet discutere per partem, vt fotu ex decoctione clysteris, vel sacculis vel spōgiis, vel vnguento resumptiuo, vel pectorali, vel ex adipibus paretur sic.

℞. ol. amygdal. dulc. & viol. ana ʒ. iij. butyri recentis, vel ablusi aqua hordei ʒ. ij. ceræ citrinæ q. s. fiat linimentum pro biliosa vel sanguinea. Si vero à materia crassiore & pituitosa, fiat sic.

℞. ol. amygd. dulc. & chamæ. ana ʒ. ij. ol. anethini & liliorum ana ʒ. j. axung. gall. & anatis ana ʒ. j. & terebin. abietinæ ʒ. j. ceræ parum. fiat linimentum, vngatur locus dolens, vbi minus febricitat & facilius. Ceratum fieri potest ex emplastro diachilon dissoluto in ol. amygd. vel liliorum. Quod si esset non vera & in muscolis externis, vel intercostalibus, non erit absurdum vti emplastro ex pice malaxato cum oleo chamæ. vel anethino. Si fri-

gidior; addūtur huic emplastro ad discūssionē 3. iij. sulphuris, & fiat emplastrum. Linimenta magis iuuant & potissimum si post forū applicentur. Ad expectoratiōem inuenienda remedia, alia in principio, alia in declinatione. In omni principio, quæ minū detergūt vel minū attenuant, & conueniunt: quæ verò multū, nō sunt danda, quia defluxionem concitant. Quare penidias, & elect. diatrag. dare oportet in principio. In declinatione verò elect. diaris simpl. Sacch. candū. Item syr. viol. & iuiubinus in initio. In declinatione, tam calida, quā detergentia, ad materię discūssionem, absumtionēque: sed minū calida, in calida. In pituitosa verò, quæ id potenter præstant. Vt syr. de liquiritia & de prassio, oxymel, in materia viscida. Itē fiunt eclegmata ad expectoratiōem, sed maximè eo tempore, quo materia vtcunq; cocta, expellenda est, vel vbi retenta fuit, qualia parantur in Officinis, vt lohot sanum, sed illa sunt iniucunda, & æquoris parū grata. Ob id nos rarò vtīmur illis, sed vel ex pulueribus, vel electuariis suprā dictis, & syrup. fiunt eclegmata. Syrupi cocti, lēti sunt. Quod si inspissetur magis, vera fiunt eclegmata, vt hoc modo in calida.

R. elect. diatra. frig. 3. iij. penidiarū 3. j. syr. iuiub. q. s. fiat eclegma. Inspissat materiā tenuem, & inspissando facit, vt facile expectoretur: vel in materia calida expectoranda fiat pasta regalis conseruis, & aliis remediis, vt,

R. conf. viol. 3. ij. pul. diatrag. frig. 3. ij. penidiarum 3. j. cum syr. iuiubarum, fiat pasta regalis. Vel syrupi tantum dantur sen sim deglutiendo pro materia calida & in declinatione calidæ inflammationis, fiat hoc modo.

R. conseru. capil ven. 3. j. pul. diatrag. frig. & diaris simpl. ana 3. ij. sacch. candi 3. ij. syrup. de hyssop. q. s. fiat lohot, vel sic.

R. conf. capill. ven. 3. j. diaris simpl. 3. ij. sacch. candi, carniū passularum mundatarum, mucilaginis ficuum ana 3. j. cum syrup. de liquiritia fiat lohot. Hæc possunt dari in frigida, torrons vulgò vocati, ex amygdalis, vel nucleis pinearum, vel fiat hoc modo pasta.

R. amygd. dulc. 3. j. pinearum mund. infusarum in aqua hordei 3. j. medullæ seminis melonum, & cucurbitæ ana 3. j. sacch. candi 3. iij. syr. capillor. ven. & de liquir. q. s. ad excipien.

excipiendum, fiat ad formam lohot, vel pandaleonis.

R. pul. diairis, & diatrag frigidiana 3. j. sacch. dissoluti in aqua scabiotæ vel capil. vel buglossi q. s. vbi coctum est saccharum, ponatur puluis, & calidum sudatur in arcula (vulgò dicta marcepcin) & refrigeretur, & induretur ad formam electarij & lambendo capiat. Si retineatur sputum ob crassitiem, oxymel cum syr. de liquiritia dandū sensim transglutiēdo, sin verò ob tenuitatē, inspissandum, vt diximus. Circa statum in calidis inflammationibus vigilæ superflue infestant, in quibus conciliandus est somnus, sed citra materiæ retentionem. Quare si materia tenuis sit, & inspissatione egeat, citra aliquod periculū dari potest syr. ex pap. cū syr. violato, & aqua viol. vel hordei nō vbi materia ipsa est, vel detenta. Hoc enim magis delinit & inspissat. Paretur hoc modo.

R. syr. de pap. syr. viol. 3. j. β. aquæ viol. 3. iij. pul. diar. simpl. 3. j. misce, fiat potus, capiat hora decima longè æ cœna. Oxyrrhodo non perfundenda est pars capitis anterior. Quòd si materia crassior sit retenta, supradicto abstinere oportet, & hoc modo faciendum.

R. lactis amygdal. dulcium crudi 3. iij. croci gr. iij. puluer. diairis 3. j. capiat hora 10. Si ob hoc non dormiat, adde sem. pap. contusi, & ponatur in lacte amygd. Hoc medicamentum etiam in morbo pituitoso conuenit, sed oxyrrhodo non est vrendum ne defluxionem augeat. Hoc agendo spectare oportet sudorē die 7. maxime si à sanguine vel à bile fiat, & si quarta die maior apparuerit, sexta die fiet perturbatio. Nōnunquam fluxus sanguinis narium accidit, sed minùs liberè habent vt neque in peripneumonia Morbus pituitosus extenditur in 14. diem magna ex parte, in aliquibus ad 20. sed raro, vel quia victu pleniore sunt vfi, & neglexerunt remedia. Victus ratio tenuis in principio, si morbus sit mul. um acutus, à sanguine. & à bile, & in statu, & parum expuat, talium potus erit decoctum hordei, pass. Cibus verò, pruna si dulcia sint: sin minùs, passulæ leuiter decoctæ cum saccharo, cremore prisanæ vsque ad 7. diē. Si verò imbecilliores, modò expuant aliquid, oportet totam prisanam siue hordeum ipsum mūdātum paratum cum amygdalis. Quòd si vires ad statum vsq; per-

durare possent cum hoc victu, optimus erit syr. violatus tempore sit, & cum aqua hordei permisceri potest. Si verò morbus diuturnior sit, vel vires ferre non possint, danda est rota prisana, vel iusculum pulli, vel caponis semicocti, additis amygdalis, & in principio tenui, & quò magis expuit, eò magis augere cibum debemus. Abstineat vino & aqua cinamomi, & alia potione medicata. Utatur aqua decoctionis liquiritiæ cum syr. capill. ven. Non sunt alia negligenda remedia, quæ ab aliquibus usurpantur, qualia sunt, quæ ex pap. rubro parantur. In principio datum, quandiu defluxio sit, tale confert. Paratur decoctum in aqua pimpinellæ, & dantur ʒ. iiij. frequenter in primis diebus per vnum atque alterum diem. Hoc medicamentum inspissando retinet defluxionem, & quod in parte est, digerit. Ego frequenter vsus sum cū foelici successu. Aliqui usurpant bliti aquas, quas spinacias vocant: aliqui cardui benedicti aut aliarum aquarum, quæ sudores mouent, quæ si dentur facta defluxione, discutiunt, vt post 3. diem. Sed si antea dentur, augent morbum magis, quàm minuant, vt decoctum papaueris post materiæ defluxum sputum retinet. Alia duo noui, quæ efficacissima sunt, si suo tempore exhibeantur, vt rasura dentis apri, & cinis priapi tauri, exiccando, quod defluxum est, curant. Quare statim in principio dari non debent, neque postquam est expectorandum. Illa enim nimium siccando sputum retinerent. Post primum diem dari possunt cum vino, vt ad partem ducantur. Hæc in frigidis magis, quàm calidis conueniunt. Post sudores criticos, febris (quæ symptoma est) cessat, sed sputum perseverat. Quare non debent relinquere expectorantia, sed calidiora (si mitior reddita fuerit febris) aut cessauerit. Tunc emplastica ex diachilone lateri imponenda sunt & in pituitosa. Potes vti emplastris ex spice & sulphure, vel in diachilonis ʒ. iiij. addere sulphuris ʒ. iiij. ol. chamo. malaxatæ & lateri apponere. Quo maximè vtendum in doloribus, qui sunt ad extrà, vel mesopleuris, vt trahatur extrà, vel discutiatur, quidquid in parte relictum fuerit.

Doloris flatulenti curatio.

Quòd si flatulentus dolor sit, malaxentur cum oleo rutaceo,

rutaceo, anethino, & aliis hisce remediis. Citissimè curantur hac via, pueri, senes & grauidæ, sine aliqua sanguinis missione, vel purgatione sanitati restituti sunt. Hic morbus, si cū sputo sanguinis accadat, valde periculosus est, in quo morbo sanguis mittendus non est, quia, vt experientia cognitum est, retinet sanguinem, vnde maior sequitur inflammatio. Quam ob causam Hippo. 7. Epid. dolorem lateris enumerat inter ea, quæ sanguinis missionem impediunt. Cuius verba sunt hæc. Sunt nonnulli inter eos, qui sanguinea expuunt, quibus opportunè sanguinem auferre cōuenit. Aliis vero perinde ac illis non decet. Impedimēto autem sunt, tempus, laterum dolor, & bilis. Quare prudenter in hoc casu agendum est, de quo suo loco dicitur.

De Peripneumonia, Caput alterum.

Peripneumonia est inflammatio pulmonum, quæ cum febre est, ob cordis vicinitatem, vel ob morbi materiam. Pleuritis faciliè in hanc affectionem mutatur, & maxime lethalis est. Notæ pleuritidis adsunt, nisi quòd dolor punctorius non adest, sed grauis potius, quòd pulmones non sentiant. Maior difficultas anhelandi, & maxime, quando in dorso siti sunt, ob id recti sedere volūt. Nota propria, quæ affectum sequitur, est rubedo maxillarum, & totius faciei, ob sanguinem tenuem regurgitantem in superiores partes, per venas & arterias. Hæc nota, si Gal. credimus, est huius affectionis propria. Rubet facies in futuro sanguinis fluxu. In empyemate, maxillæ. Cū empyema pulmones inflammat, propriam dicimus omni inflammationi pulmonum tussim siccam in principio. Deinde spumofum sputum, cruentum, sæpius flavum. Fit autem hæc inflammatio, à sanguine bilioso, quo nutritur pulmo, & à pituita, quæ diu remansit in pulmone putrefacta, quæ pulmones infestat & post catarrhos, in senibus frequentius, & in iuuenibus à bile.

Prognosticum.

Est morbus acutissimus & periculosus, occidit biliosa frequenter quinto, pituitosa vix attingit 8. diem. Sæpissima accidentia, vt vigilæ, somni breues, perturbationes mentis, deliria, morituris partes externæ frigida. Ob maximā inflammationem internam nasus fit simus

& appententia deſicitur. Soluitur hæc inflammatio fluxu narium, ſi Actio credimus, quanquam Galen. de criſib. 3. contrariū docet his verbis. Contingit aliquādo propter ſanguinē è naribus fluentem phrenitim finire, non tamē lethargus, aut peripneumonia fluxum ſanguinis amant. Sed ſi quis attentē dicta Gal. inſpiciat. intelliget Gal. lo. qui de peripneumonia, quæ à pituita fit, in qua ſanguinis fluxio è narib. non conuenit. Sed in biliſa vel ſanguinea conuenit, vt in phrenitide, & argumento eſt Gale. de pituitoſa intellexiſſe, ex eo, quòd lethargo coniunxit. Lethargus enim pituitoſa inflammatio eſt, in qua ſanguis non eſt euacuandus, & nos vidimus aliquas peripneumonias fluxu ſanguinis finitas. In deterius vergunt poſt fluxum ſanguinis pituitoſæ.

Cutatio.

Curantur autem, vt pleuritis, miſſione ſanguinis & alui deiectione & expectoratione, ſed hoc intereſt, quod in pleuritide rectitudo ſeruanda. In peripneumonia ex vtraque parte fluit ſanguis. Differt etiam, quòd in peripneumonia prima ſanguinis detractio, minorem copiam, ſecunda maiorem requirit, & ſi in aliquo morbo, eſt facienda copioſa in hoc, quia affectus magnus eſt, & circa cor poſitus. Fit tanta deſluxio vel attractio ſanguinis tum ob cordis calorem, qui trahit, tum ob venarum frequentiam, tum ob ſanguinis tenuis copiam, quæ in cordis ſinibus eſſe ſolet. Ob partis affectæ dignitatem & interni affectus magnitudinem, trahendus eſt ſanguis, ſi fiat à ſanguine, vel bile naturali. Si verò à pituita, morbus mitior eſt, & ferè in ſenibus, & poſt alioſ morbos. Ob id ſanguinis miſſio neceſſaria non eſt, ſed oportet cucurbitulas in emunctoriis interioribus apponere, ad inhibendum, ne ſanguis ad partem affectam deſcendat. Nam ſi pituitoſus affectus ſit, frigidior redditur, neque concoquere, neque expellere, ob virium imbecillitatem poſſunt. Quare iniiciendus erit clyſter, & illæ decoctiones lenitiuæ dandæ in principio, quæ deſcriptæ ſunt. In pituitoſa, lenientes, & refrigerantes in biliſa. In biliſa plus debent refrigerare, quàm in pleuritide ob magnam caliditatem & ſiccitatem. In hac pituitoſa non oportet circa ſtatum vti nimium purgantibus clyſteribus

ribus, neque decoctis. Solet enim fluxus ventris superuenire, qui valde periculosus est. Nihil enim à parte affecta euacuat, & vires deiecit. Ob id Hipp. dicit, A pleuritide & peripneumonia habito, diarrhœa superueniens, lethalis est. Fiunt sic decoctiones.

R. radicis liquiritiæ, radicis mal. an. ʒ. j. viol. M. j. sebesten, iuiub. ana N. xx. quatuor seminum frigidorum maiorum an. ʒ. iij. Anisi ʒ. ij. fiat decoctio in aqua cucurbitæ, & in lb. j. col. dissol. syrupi violati, de cucurb. ana ʒ. ij. misce, cap. manè. In pituitosa, quæ præscripta sunt ad pleuritidem pituitosam, linimenta, quæ inflammationem extinguere possunt, sunt admoûenda, qualia sunt, quæ parantur ex oleo violato, de semine cucurbitæ, vel melonum, vel cucumeris, amygdal. dulc. recenter parato, vel fiant epithemata ex decoctione hordei, & seminum frigidorum maiorum, florum violarum. In collatura dissolue syrupi violati & syrupi cucurbitæ ana ʒ. iij. Intingantur panni, & frequenter applicentur. In ore teneat elect. diatrag frig. recenter paratum, vel fiat conditum sequens.

R. conferuæ violarum, buglossæ, borraginis ana ʒ. j. pulueris diatraganti frigidi recenter dispensati ʒ. ij. sacchari albi q. s. fiat conditum, vratur cum aqua decoctionis hordei mundati, & seminis cucumeris, vel sic.

R. mucaginis seminum cydoniorum, extractæ cum aquæ viol. ʒ. j. emulsionis q. s. frigidorum maiorum ʒ. j. sacchari candi & penidiarum ana ʒ. j. syrupi violati parum, fiat ad formam lohot, capiat lambendo. Pro pituitosa non sunt querenda alia remedia, quàm ea, quæ descripta sunt cap. de pleurit. Caput oxyrrhodino frequenter perfundendum. Frictiones & ligaturæ conueniunt in partibus inferioribus. Tenuissimo victu vtendum, & quò acutior est morbus, eò magis ad tenuitatem debet accedere. Quare sint contenti cremore hordei, aqua bullita, cum syr. viol. vel de cucur. in biliosa. In pituitosa decoctum hordei integri dandum cum syr. capil. ven. Alius si constricta sit, sollicitanda clementibus. Si superueniat fluxus ventris, mortem significat, & leniter refrigerantibus & constringentibus sistendus. Si suppuretur, soluitur in empyema. Quòd si euadat suffocationem, curanda est

vt sequēti capite docebimus, sed quomodo suffocet, explicandum, quia nonnulli se torquent ad inueniendum. Inflammatio est in substantia pulmonum. Si iuppuretur, & materia non resudet sensim, vel in arteriam, vel in spatium, sed affatim rumpatur & multa materia effluat in alteram cavitatem. Si in ramos tracheæ arteriæ, suffocationem facit, quia aer ingredi non potest, calesctus verò redditur, ob id suffocantur. Sed si in spatium (cū non sit tanta copia, vt totum spatium thoracis occupet) non suffoca, sed empyema facit.

De empyemate, siue purulento, siue suffocato
caput alterum.

Purulentos vocant Latini, quos Græci empyous, communi et eos in quorum corpore vniuerso pus est conditum. Proprie verò Medici solent vocare eos, qui in thorace & pulmonibus pus habent, ex quo tabidi fiunt, nisi citò excernatur. Deprehēduntur purulenti notis descriptis ab Hipp. lib. 2. prog. Inter omnes agnoscere purulentos his indicis conuenit. Principio si febris non dimittit, sed interdū tenuior, noctū vehementior, si copia ludonis elicitur, ac tussendi cupiditas est, neq. quidquam dignum extimatione expuunt. Si oculi caui redadantur, maxillæ verò rubescant & vngues manus curuentur, digiti potissimum summi calescant, atque in pedibus tumores consistant, neque cibum appetant, ac pustulæ circa corpus erumpant. Quæcunque ergo suppuratio diutius immoratur, alia habet signa, quibus admodum credere oportet. Quæcunque verò breuior, aliqua ex signis indicatur, qualia inter initia existunt, & item si æger difficulter spirat. Fit autem puris collectio post inflammationem, vel in vtroque latere, vel altero tantum, & quia fit per inflammationes suppuratas, vel pulmonum, vel lateris. Hinc deprehenditur, in altero tantum latere, si pleuritis, quæ alterum tantum latus occupare solet, præcesserit. Si verò post peripneumoniam in vtroque. Si in altero sit, notis ab Hipp. 2. prognost. con cap. 31. traditis dignoscitur. Si, inquit, suppuratio in altero tantum fuerit latere, vertere ægrum conuenit, & scire, nunquid dolorem in altero latere percipiat, & alterum altero calidius sit, atq., vbi in partē sanam decubuit, quæ admodum cū aliquo ontus

græue super eos pendere videtur. Si id fuerit, suppuratione in altero latere faigat, in quo onus existit. Quod si rigor fiat vt præ dolore portis, onus seu pondus habuerit, per pleuritidem purulentus factus est. Quicunque morbo laterali laborantes in 14 diebus non exurgantur, ij ad suppurationem vertuntur, quod intelligi debet de calida pleuritide. Nam si à frigido humore, non suppuratur tā breuiter, vt videre est de Anaxione, cui s meminit Gal. in commenta. A. hor. Quicunque ex morbo laterali suppuratus, si in 14. diebus non purgatur à die, qua fiet eruptio, liberantur. Si verò nō, ad tabem vertuntur. Quod vt plurimum fit, non semper. Curatur rarò hic morbus. Danda est tamen opera, vt cognoscamus, vt prædictione possimus vti. Circa principium, cum vires valent, & priusquam pulmones exulcerentur, si materia euacuetur per sputum, vel per aliam regionem, aliqua ex parte, vt per vrinas, euadere potest vel per vstionem vel sectionem. Quare Medicus diligenter inspicere debet, si inflammationes in suppurationes vertantur, vt inuet suppurationem, ruptionem & expurgationē, qua citissime fieri poterit. Si ergo calida pleuritis 14. die non expurgatur, suppurationem expectare oportet, & maxime si à contusione ortum habuerit, & si missus non sit sanguis. Cataplasmata supra latus apponere oportet, quæ vim concoctoriam habeant quale est sequens.

℞. rad. bismal. q. j. ficum. passul. enucleatarum ana N. o. flor. cham. mel. l. ana p. j. decoquantur, & contundantur omnia, & per cribrum discutiuntur, cui adde farinæ seminis lini, fœnug. tritici, an. 3. ij. ol. lil. amygd. & butyri recentis, & tereb. an. 3. ij. Incorporentur simul, & fiat cataplasma. Si placeret ad extrà trahere, adde fermenti acerrimi 3. ij. applicetur. Hoc miturat, & discutit. Fit emplastrum ex diachil. magno malaxato cum ol. anethi. vel amygd. dulc. Intus dentur, quæ aliquam materiam educere possunt, vt in rosumenda.

℞. liq. rasæ, rad. bismal. & symphit. an. 3. j. herb. capil. scab. agrimo. bechi ana M. j. quat. semin. frig. maio ana 3. j. Anisi 3. j. trium flo. cordialium communium, cham. anap. j. fiat decoctio. In lb. ij. diss. sappæ & mellis ana 3. iiij. sacchari candi 3. iiij. misce, fiat syrup. ar. 3. ij.

rad. iridis, capiat singulis matutinis ʒ. vj. in cremore pti-
sanæ ponantur semina frig. maio vel mel, vel saccharum
candum. Eclegmata sunt constituenda, quæ vim habent
maturandi & detergendi, vt sequens eclegma.

R. mucaginis ficuum pinguium ʒ. j. butyri recentis ʒ.
ij. ol. amyg. dulc. recentis ʒ. j. sacc. candi ʒ. ij. amyli ʒ. ij.
incorporentur simul, & fiat lobot, capiat lambendo.
Terebenthina veneta deuorata cum puluere liquiritiæ
ad ʒ. iij. lota in aqua hordei multum confert, & ad deter-
gendum, & ad maturandum, & ad discutendum. Si ma-
teria multa sit in pulmonibus, eclegmata, quæ purgare
possunt, valēt, qualia sunt dicta cap. de pleurit. puitiosa.
Si non rumpatur, practici imperant, vt deatur, quæ dis-
rumpere possunt. Sed illa non perueniunt ad partem af-
fectā. Melius esset, medicamenta syncritica lateri appo-
nere, quæ ad extra traherent, & postea ferro, vel cauterio
aperire, vt materia extrâ expurgeretur, non intro rūpatur.
Nam ruptio interna periculosa est suffocationis pericu-
lum. & post ruptionem materia commodè vacuari non
potest. Pulmone exulcerato fiunt phthisici, & moriūtur.
Quare siue pus collectum sit in spatio, siue mēbrana ad-
hæsit & suppurata sit, latus aperiendum priusquā corpus
contabescat & pulmones erosi sint. Nam postquam ex-
ulcerati sunt, difficillimè aut rarò coalescunt. Sed quod
secari aut vti debeant, ne id à me excogitatum videatur,
Hip. aph. subiungam, quo loco ostendit, qui euasuri sint,
qui secus. Ex eo aphorif. apparet & secari & vti ad cura-
tionem, & aph. 44. lib. 7. Quicunque suppurati vrantur
& secantur, si purum pus fluxerit & album, euadunt. Si
verò subcruentum, sæculeum foetidum, pereunt. Item
Paulus, Aetius & omnes alij ant qui Medici id facien-
dum imperant. Sed hodie à paucis fit, quia à paucis co-
gnoscutur pus collectum. vel si cognoscatur, Medici ti-
midi, neque secare audentes, in causa sunt, aut assisten-
tium timiditas, aut ægri. Non licet vrere, postquam o-
mnia interna corrupta sunt. Quare consulo, vt cum pus
collectum expurgari non posse cognoscimus, tenterur.
Galen. in commen. aphor. 27 lib. hanc rationem curadi
fortuna inuentam esse, attestatur. Miles enim quidā, cum
de sua salute desperaret, ad bellum accessit, & ab hoste
punctim

punctum læsus est in thorace. Pus fluxit, & liberatus fuit, ut apud nos iuuenis quidam à me fuit liberatus, qui per annum pus in thorace collectum post pleurifim gestavit, & quasi absumptus erat, vltus fuit, & per vulnus purgatum pus. Adhuc superest, & dicitur Salomon, sicuti & multi alij quorum nomina supprimo, & hoc de suppurationis vnum theorema addens. Omne pus factum in quacunque parte collectum, expurgandum esse. Quod per emissarium à natura institutum, expurgandum, siue trahendum, & faciendum, ut in abscessibus partium, apertione facta, vel ruptura, vel phlebotomia. Si sub craneo, trepano: in ventre punctura: Si in thorace, punctura, vel vltione. Punctura melior est. Quod si hæc pati nolint, tanquam deplorati prognosticis relinquendi sunt.

De cordis tremore.

C A P. XVI.

Cordis tremor vel palpitatio est motus cordis deprauatus. Deprauatur autem vel quia dilatatur præter naturam ob causam aliquam internam ut fumum, aut vaporem in sinibus cordis cõtentum, sed multò frequentius fit à flatibus in pericardio collectis. Argumento est, quòd omnes ferè melancholici, symptomate hoc afficiuntur, & qui cachexia laborant, ut puellæ, & qui in aquam intereurem incidunt. Hæc enim collecta in pericardio, quando agitantur, accessionem faciunt, quia partem superiorem cordis lædunt, & cum hæc quiescunt, minùs infestat hic morbus, nisi quòd semper est manifestior pulsatio cordis in his, quàm in aliis. Fit etiam propter longam meditationem, aut quando obliuiscuntur aerem illum calidum, aut fumos calidos reddere, neque possunt expirationem magnâ facere, hoc morbo magis diuexantur. Fit etiam à multitudine sanguinis, quod faciliè ab aliis causis distinguitur. Nam qui ob supradictas laborant, sani non sunt, qui à multitudine sanguinis, integra valetudine viuunt, & iis solet tantùm accidere, qui multis alimentis multum sanguinem gignentibus vtuntur, ut vino multo, carne multa. Iuuenibus & adultis subito siue alia præcedente causæ affectione solet accidere. Gal. lib. de locis affect. s. ca. i. illos potissimum iuuat & in hoc præsens est remedium missio sanguinis. Et quia multus sanguis in bene valentibus & crassus est, vel

sua copia obstructionē facit coarctatoriam, imperamus victum attenuantem & medicamenta alterantia cordialia, qualia dicuntur postea ad obstructionem. Si à flatibus fiat hæc affectio, leuissima corporis motione excitatur, & ferè asthmatici euadunt tandem. Vel fit accessio cum asthma, vel sentitur palpitatio in genis oculorū, vel in aliqua parte, aut dolores repētini, qui statim cessāt spōte sua: oculi etiam quodammodo obtenebrantur. Sonitus aut sibilus aurīū his solet accidere. Quare prima ventriculi concoctio perfecta procurari debet, & flatus qui in ventriculo & intestinis sunt collecti discutiantur. Id fiet duas adimplendo intētiōes, scilicet vt purgetur frequēter materia illa pituitosa, & aqua ex qua flatus gignuntur. Pilulis de aro. de hiera, cum agar. vel carth. Deinde syr. materiam concoquentibus cum decoctione anisi assumptis: & materiā præparare, & rursus euacuare paulò fortioribus pilulis, vt sine quibus, aureis, agreg. In crassum detur theriaca antiqua, vel confectio arom. ros. vt causa illa efficiens castigetur, nempe calor diminutus. Huc referre oportet omnia illa remedia, quæ dicuntur cap. de inflatione ventriculi. Si ab intemperie calida fiat tremor cordis, diamarg. frig. diatrag. frig. syr. de bugloss. & borrag. & omnia alia remedia quæ sunt inter calida & frigida pro curatione conueniunt, vt aurum, argentum, & quæ ex iis componuntur. Fiant tro. ex quibus potiones cum aquis affectui & morbo consentaneis, vt

℞. boli coral. an. 3. β. quat. semin. frig. ma. seminis citri an. 3. j. marg. 3. β. camphoræ 3. β. terantur omnia diligenter, fiant tro. cum aqua ros. adde mosci gr. iij. vel croci tantundem. Dari etiam possunt syr. infrigidantes, vt de nymphaea, iulep. ros. & similia. Si fiat à materia calida, vel à vaporibus necessaria erit phleb. Si adsit pleth. aperiatur vena dextri brachij: si à vaporibus, basilica sinistri. Sunt qui in omni palpitatione laudant missionem sanguinis, qui laudandi non sunt, si fiat iis quibus non competit, phleb. sed tantum euacuatio. Concoq. materia & euacuetur, si sit calida. syrup. de ribes, de limonibus, de agresta, de acetosi citri, iulep. ros. & simil. Miscentur aquæ quæ vim habent refrigerandi, vel mediam, siue temperatam, vt aqua bugloss. borrag. vt sic

℞. syr. de lymonibus, de acetos. citri an. ʒ. j. syr. de pomis simpl. de bugloss. an. ʒ. ij. aquarum acetos. ros. borrag. an. q. j. misce, pro 3. dosibus, aro. cum ʒ. ij. diamarg. frig. Purgetur autem materia, quæ circa cor est, medicamentis purgantibus humorem, adiunctis quibusdam cordialibus vel myrobal. in infusione, vel decoctione tamarindo. rhab. Succus vel syr. ros. manna, cass. laudantur. Sunt qui addunt etiam scammonium, quo uti non oportet nisi in summa necessitate, & additis quibusdam cordialibus. Nam hæc laxantia fortiter, sunt ex genere venenorum, & venena sua natura petunt cor, & lædunt. Ergo bene castigata addere oportet. Conficiantur pilulæ ex myrobal. sic

℞. omnium myrobal. conficatorum cum succo ros. an. ʒ. j. rhab. ʒ. ij. cinamomi, seminis ocymi an. j. spicæ utriusque an. ʒ. ʒ. cum syr. ros. & pulpa tamarind. fiant pilulæ de quibus cap. ʒ. j. vel ʒ. iiij. Quod si magis soluentes velis parare, per diem macerentur in succo ros. vel syr. ros. cum manna & infusione rhab. vel decoctione addendo quæ temperant calorem moderatè ut quatuor semina frigida maiora, flores cordiales. Purgentur sæpe, sed levi medicamento. Nam materia, quæ circa cor est, non faciliè educitur. Fiet talis opiata.

℞. radic. bugl. confer. ros. an. ʒ. j. vel confer. flor. bugl. borrag. acetos. capil. an. ʒ. j. pul. diamarg. frig. ʒ. j. ʒ. diatr. abb. & diatr. frig. an. ʒ. j. tro. de camphora ʒ. ʒ. cum syr. de bugloss. fiat opiata. de qua cap. bis aut ter in hebdomada. Superbibendo parum vini lymphati cum aqua ros. vel bugloss. fiat epith. supra cor.

℞. aquæ ros. bugl. an. q. j. aquæ end. q. ʒ. ʒ. tro. de camphora ʒ. j. sandali albi & rubri an. ʒ. ʒ. misce, fiat epithema, applicetur tepidè supra cor, irrorando cum aqua buglossæ & ros. Si autem à materia fiat frigida, coquatur & euacuetur. Coquetur syr. calidis, sed additis cordialibus ut sunt syr. de buglo. de borragine, decoctum hyss. syr. capil. ven. mel. ros. oxymel. syr. de bizantiis. Aquæ autem sunt borrag. bugloss. melissæ, beto. ut

℞. syr. capil. ven. buglossæ an. ʒ. ij. syr. conservationis corticis citri ʒ. j. aquarum roris marini, melissæ, borrag. bugloss. ana q. j. misce pro tribus dosibus matutinis.

Purgetur autem cum myrobal. emblicis, cum decoctione neag. vel eius infusione, aliquo cordiali addito. Turbith si maceretur per diem in lacte, deinde in melle, & addantur cordialia, congruet. Nollem, vt cæteri, vti colocynthide, quoniam lædit. Quare non nisi in magna necessitate illam vsurpo, nec est vsurpada, vt nec diagridium in causa calida, neque turbith, nisi in magna necessitate. Putgetur sic.

*A melan-
cholico hu-
more.*
℞. ag. tro in vino albo infusi 3 j. exprimatur fortiter, & cum decoctione pass. & florum cordial. in aqua viol. decoct. fiat potio, addendo mannæ 3. ij. Quod si non sufficit, adde decoctioni summitatum thymi, & seminis earth. an. 3. vj. Quod si pilulæ fiant ex his, addita hiera picra, bonum erit. Vel vtantur pilulis de hiera picra, addito ag. vel turbith infuso in lacte, & postea in melle, addendo macis mediam partem. Si fiat ab humore melancholico, dandi sunt syr. respicientes melacholiam, vt de summaria, de pomis, de epithymo, de scolopendria. Sic & in purgantibus est faciendum, cum syrupis præscriptis ad pituitam, additis semper flatus discutientibus in maiori quantitate. Si autem fiat ab obstructione, potest addi in decoctione herbæ fœnicul. marini q. j. vt pituita deiciat & obstructions soluat. Id autem est verū empetrum antiquorū, non vatis, vt existimant herbarij, tū quod non sit foliis portulacæ, nec albioribus. Est enim folio pingui, sed viridi. Ob id ab aliquib. à viriditate prasoides, & quod inter lapides crescat super muros, & antiqua ædificia, empetrum dicitur: vel propter mare, fœniculum marinum. Est autem sapore salso, vt ab antiquis monstratū est, & felicissimè prouenit in saxis marinis, & in rimis parietum spectantium mare. Aptæ erunt & alia deobstruentia. Ferè eadem erit ratio curandi hūc affectum ab obstructione, cum illo, qui fit à pituita, sed istis decoctionibus addenda erunt, anis. fœnic. & alia flatus discutientia vt galanga, garyoph. macis. Nam magna ex parte morbus hic ex generantibus flatus accidit, patientibus obstructions hepatis & lienis, vt licet videre in puellis patientibus cachexiam, & malè coloratis. Detur theriaca cum aqua buglossæ & melissæ. Post purgationem fiant electaria vel opiata elect. diamarg. cal. de gemis pliris

ris cum mosco, diambrae. dianthos, arom. rosa garyo. Multum valet confectio de hyacintho. & alchermes, conseruad. buglossae, borrag. anthos, florum bugloss. & elenij. Ex his conseruis & pulueribus fiunt opiatæ. Fiet optimum medicamentum, & alimentum ex corde porci, in quo inditi sint garyoph. in veru affato. vel super prunas, prius cocto in aqua, vt caro tenerior fiat, alioqui dura est, quia fibrosa, vt,

R. cordis porci N. ij. cordis cerui vel bouis N. iij. garyophill. galagæ maioris & minoris. seminis basiliconis ana 3. iij. macis 3. iij. flor. buglos. borrag. ana p. ij. florum anthos p. iij. temperentur in vino mal. per noctem & distillentur omnia in alambico. aqua seruetur vsui.

R. aquæ prædictæ 3. iij. sacchari parum. Fiat iulep. Aqua illa valet in omni passione cordis à materia frigida, flatuosa, vel à vaporibus, & in melancholica passione. Sed in materia non frigida adde aquæ rosarum partes æquales, & vtatur vel cum aqua buglos. vel borrag. Dosis huius aquæ est 3. ss. superbibendo vini hippocratici 3. ij. Sacculi ad forus cordis, qui magis laudantur, quam emplastra, vel epith. hoc modo.

R. garyoph. ros. flor. ana. 3. an. ss. ij. cort. citri sicci macis, ligni aloës, sandali albi & rubri & muscatelini seminis ocymij an. 3. j. spice celticæ & lauendulæ, foliorum lauri ana 3. ss. cõtundantur, fiat pul. & ex eo sacculus interbastatus, vt artis est, pro corde. Irroretur cum vino albo, & aqua bugl. applicetur calfactus. Optimum est hoc.

R. flor. cord. ana p. j. garyoph. maioris j. antophli. 3. j. decoquantur leuiter in aqua bugl. & melissæ. In tb. j. decoctionis adde vini albi. vel clari tb. iij. garyoph. 3. ij. cardamomi 3. ss. sacch. q. s. fiat syr. aro. cum. 3. j. cinamo. mi. Si à serosis humoribus auctis fiat palpitatio, danda est opera, vt euacuentur, qui in venis continentur. Nam id quod collectum est in pericardio, si nihil amplius in illud refudarit è venis, calore cordis absumetur. Serosi autem humores euacuantur vsu seri caprini, vel asinini, vel succo ros. decocto brassicæ marinæ, thymelæ, seminis carth. folic. senæ, & aliis medicamentis cep. de hydropo & cachexia. In hoc tantum differt, quod hæc remedia sunt imbecilliora, & magis cordialia, & ea,

*A serosis
humori-
bus.*

quæ minus cordi aduersantur, vsurpantur.

R. rad. graminis, rusci, asparag ana \mathfrak{z} . iij. rubiæ maior. \mathfrak{z} . ij. galang. & cyperi ana \mathfrak{z} . β . herbarum capil. sum. cichor. end. ana \mathcal{M} . j. seminis anisi, apij, petro. ana \mathfrak{z} . iij. medullæ seminis carth. polypod querc. senæ oriental. ana \mathfrak{z} . ij. cicer. rub p j seminis hederæ rad. iridis ana \mathfrak{z} . ij. foliorum brass. marinæ tertiam partem \mathcal{M} j. flor. anthos, bugloss. ana p. j fiat decoctio in sero caprino ad t \bar{b} j cui adde succi ros. & syr ros. lax ana \mathfrak{z} . 4. sacc. solidi \mathfrak{z} . vj. fiat syr. mediæ decoctionis, cap. \mathfrak{z} . vj. pro dosi alternis diebus vel quotidie. prout magis vel minus operabitur. Si pareretur tempore calido fiat sine sero, quia facili \bar{e} accessit, & syr. corrumpit. Præter illa remedia præscribenda cap. de cachexia, sunt adhibendi sacculi supra pectus, qui vim habent siccandi.

R. cortic. citri, sandal. omnium galang. cyperi ana \mathfrak{z} . ij. pul. de gemmis & diamarg. frig ana \mathfrak{z} . j. camphoræ \mathfrak{z} . β . bōbacc excipiantur, & fiat sacculus interbastatus, qui irroretur vino, & aqua mellisæ, applicetur supra mediū thoracis. Idem etiam potest apponi si à causâ flatulenta fiat affectus, addendo tantū anisum, vel cuminum, vel aliud flatus discutiens. Opiatæ etiā cor magis respicere debent, quā quæ in supra citatis capitib. describuntur, vt

R. cort. citri conditi cum sacch \mathfrak{z} . β . confer. anthos \mathfrak{z} . j. conferu. stechad. & florum cichor. ana \mathfrak{z} . iij. confect. a. ro. ros. \mathfrak{z} . j. pul. diagalangæ & diamarg. cal. vel de gemmis ana \mathfrak{z} . j. cum syr. conseruat. corticis citri fiat opiatæ. Hic aduertere oportet quòd neque conserua violarum vel bugloss vel borrag. addimus, quia nimis humectant, & hic potius siccandum quàm humectandum. Camphora in hoc morbo magnam vim habet, etiam in collo suspensa à quacunque causa proueniat. Optima victus ratio in hoc morbo est necessaria, quæ magis exiccans sit.

De Syncope.

CAP. XVII.

Syncope fit ob insignes euacuationes ob resolutos spiritus. Fit etiam à veneno ob passionem alicuius membri communicato cordi, & aliis causis. Si autem fiat post insignem euacuationem, vt sanguinis, ponatur supra lectum capite decliui. Irroretur aqua, vt excitetur. Detur parum vini diluti aqua frigida. Si autem post

medica-

CVRANDI MORBOS. 38

medicamentum nimis purgans, fiat syncope, detur statim theriaca recens. Quod si non adsit, detur antiqua addendo opij ꝑ. ij. cum vino & vngatur ventriculus & venter oleis sequentibus.

℞. olei cydoniorum, myrtill. ana ꝑ. j. ꝑ. ol. absynth. ꝑ. j. addatur parum aceti vngatur venter inferior. Fiant frictiones partium supernarum, vt brachiorum. Potest etiam addi vinum & mica panis inuncta vino. Qui autem ob sudores delinquant, à vino abstineant, & frictione. Nam talia magis mouent sudores, sed potius sunt meatus cutis obstruendi, vt sudor sistatur. Irroretur facies aqua rosarum etiam frigida. Euentiletur & leuiter operiatur. Fiat pul. sequens, qui ponatur in lecto, vt sinapizetur.

℞. florum ros. rub. nymph. labruscæ ana ꝑ. iij. ladanij puri ꝑ. iij. styracis ꝑ. ij. myr. berb. fuma. an. ꝑ. j. misce, fiat pul. qui ponatur intra lectum, vel fumigetur indusia, & alia quæ circa corpus ponantur. Inspergantur per cubiculum herbæ frigidae, vt summitates salicis, myrthi, oleæ, vitricis &c. Detur postea talis potus.

℞. diamarg. frig. diapap. albi, & elect. de gemmis ana ꝑ. j. aquarum ros. acetos. myrthi ana ꝑ. j. syr. de ros. siccis ꝑ. j. misce, fiat potio. Nullo pacto fricentur, sed sæpe mutant locum.

Si ab hausto veneno fiat syncope, statim vomitus prouocetur, & eo prouocato detur theriaca, aut mythr. Post theriacam si sentiat ardor, vel acrimonia ventriculi vel punctura, lac, vel butyr. accipiat, vel pul. fiat ex cordialibus refrigerantibus, & acrimoniam veneni obtundentibus, vt,

℞. diamarg. frig. ꝑ. j. tro. de camphora & confectio- nis de hyacinthis ana ꝑ. j. aquæ ros. nymph. bugl. ana ꝑ. j. syr. de acetos. citri, vel de limonibus ꝑ. j. misce, fiat potus, detur pars media & altera post aliquot horas. Si autem venenum frigidum esset, vel affectus frigidos induceret, fiat sic.

℞. confect. de hyacintho ꝑ. 2. pul. de gemmis ꝑ. j. aquarum beth. meliss. bugloss. elenij ana ꝑ. j. syr. de bugloss. ꝑ. j. fiat potus. Si deprehendantur quale fuerit venenum, detur antidotum. Zedoria in omni veneno va-

let. Potest etiam dari tormentilla, quæ ad syncopem & ad tremorem cordis mirum in modum valet. Si syncope in principio paroxyfmi febris accadat, optimum erit suffitu excitare sic.

R. ros. rub. ligni aloës, beniouin, styrac. ana 3. ij. carb. salicis contusi ad pondus omnium, fiant tro. cum terebinth. vel uti possumus alipta moscata. Si ob consensum alicuius partis, vel oris ventriculi, fiant topica remedia, quæ & parti & affectui conueniant, ut si ob consensum ventriculi, ob humores acres putres, prouocetur vomitus cum aqua calida & oleo, vel cum decoctione anethi, & raph. vel syr. acetos. Si materia fuerit euacuata, fiat vnctio supra ventriculum & os eius.

R. ol. ros. myr. cydon. ana 3. j. ß. ol. nardi 3. j. misce. Post vnctionem sinapizetur puluere sequenti.

R. ros. rub. sandali ana 3. j. coriand, mastich. cort. citri ficii ana 3. j. ß. fiat pul. subtilissimus, quo sinapizetur regio ventriculi, vel additis cera & ol. fiat vnguentum. Pro materia frigida fiat sic.

R. ol. nardini de absynth. de lentisco, vel de mastiche ana 3. ij. misce. Sic & pul. ex calidis & astringentibus fiet.

R. garyoph. masticis, macis, nucis moscatæ, sandali moscatell. ana 3. j. ß. spicæ, scœnanthos, ros. myrti ana 3. j. ß. misce, fiat pul. vel addendo parum ceræ & olei fiat vnguentum. Vel vratur cerato stomachico Gal. vngendo os ventriculi ante & post, circa decimātertiam vertebrā in latere sinistro, quia in eo magis inclinatur os ventriculi.

Si fiat per consensum alterius, vt vteri, curanda erit illa affectio vteri remediis, & corroboretur cor.

Si syncope proueniat ob defectum spirituum post labores, vel morbos, vel medicamentum, nutriatur alimentis optimi succi citò nutrientibus & humectantibus.

De lactis defectu. CAP. XVIII.

IN mammis ex sanguine generatur lac, & idē est cum sanguine, colore tantum differens. Nam lac in hepate infantis, citò & facili in sanguinem abit, & puto album esse sanguinem, prouidēque à natura dealbarum fuisse, ne videretur crudele pueros nutriri sanguine. Sed quod lac sanguini simile sit, ratio ostendit. Nam infans, cum in vitro esset, sanguine nutriebatur, & vnumquodque suo

suo simili nutritur. Oportet igitur sanguinem & lac si-
 militudinē habere. Tot sunt in lacte partes, quot in san-
 guine. Ergo eadem substantia, sed leui tantum altera-
 tione differunt, quam lac accepit à mammis, vel potius
 à venis, & secundum aliquos à glandulis mammarum.
 Cum igitur sanguis sit lactis materia, mulieres, quæ lac
 habere volunt, multo sanguine præditas esse oportet, &
 ut sanguis ad mammas fluat, curandum. Quare duæ e-
 runt causæ potissimum penuriæ lactis, aut quia paucus
 est sanguis, aut quia ad mammarum venas non perue-
 nit. Si multus sit sanguis in corpore, & ad mammas non
 perveniat, hoc fit vel propter venarum angustiam, aut ob-
 structionem, aut propter sanguinis crassitiem. Defectus
 sanguinis est, aut propter totius corporis atrophiam,
 quam mulier ob picam, aut alimentorum fastidium cō-
 traxit tempore imprægnationis, vel quia post partū tan-
 ta sanguinis copia fluxit, ut retractus sit ad partem infe-
 riorem, aut quia venæ plus iusto inanitæ sunt. Quare
 nutriendæ erunt optimis alimentis calidis & humidis,
 & multum sanguinem generantibus, ut vino optimo, iu-
 sculis, succo carnis, vitellis ouorum, casco, & aliis euchy-
 mis. Si propter crassitiem sanguis non fluat, leuiter inci-
 dentibus & attenuantibus, neque multum exiccantibus
 est utendum, & illa sunt potius alimēta medicamētosa,
 aut cōdimenta alimentis pe. mixta, ut herba fœnic. apij,
 petro. anethi folia erysimi. origani. Illa sunt iusculis ad-
 miscenda, & recentia esse debent, ne siccitate sua potius
 lac extinguant, quam generent. Zinzib. cinamomum in
 pauca quantitate in condimentis sunt utilia. Vinum te-
 nue, album vel fulvum conuenit. Neque illis usus est in-
 terdicendus cæparum coctarum, vel in brodiis, vel sub
 cineribus. Confricandæ sunt mammx, vel fouendæ aqua
 tepida, ut venæ, quæ ibi sunt, dilatentur. Neque audien-
 di sunt practici, qui puluēres ex semine fœnic. & aliis cal-
 facientibus, & attenuantibus, & resiccantibus compo-
 nunt, ut corallo, &c. Quid enim potest coral. ad genera-
 tionem sanguinis, cum non concoquatur, nec in sangui-
 nem vertatur ob siccitatem & duritiem, neque propter
 eius qualitatem, cum sit frigidus & siccus, potest iuua-
 re cōcoctionem, neque sanguinis generationem? Fœnt-

Culi herba ob suam humiditatem minùs siccatur, & ad sanguinis distributionem multum valet, & proinde ad lactis generationem. Quod si semen siccum sit, desiccatur. Nam ut eruca recens semen auget, sicca minuit, sic de semine fœnic. sentiendum est. Res calidæ & humidæ multum sanguinis generant, ut lac animalium in cibis sumptum, dulcia, & alia id genus. Si autem sanguis non fluat ob angustiam venarum, optimum erit aqua tepida mammas fovere, vel sinapismum debilem, aut tropacem supra pectus apponere, ut sanguinem ad partem trahant. Sed diutius non oportet super mammas sinere, ne id quod attrahunt, digerant, aut inflammationem in ea parte procreant. Hoc modo fiet.

R. ficuū maceratarū in aqua t̄b. j. pistentur diligenter, postea adde semin. sinapi tenuissimè triti ʒ. j. misce, ponatur supra mammas, vel dissoluatur & pix misceatur multo ol. & post aliquam frictionem applicetur supra mammas, vel potius in circuitu mammarum sub claviculis, & sub alis. Nam per illas regiones venæ ad mammas perueniunt. Frequenter sugere mammas, vel exprimere, lac effluere facit. Cucurbitularum appositio cum paucò igne, paulò infra claviculas, ad sanguinis attractionem prodest. Si menses nimis fluant, retinendi sunt prius. Parum se exerceant, bene alantur & dormiant.

De lactis exuberantia.

C A P. XIX.

Redundantia lactis laborant mulieres primis diebus post partum, quia multus sanguis mittitur, & non absorbitur, aut quia non sugitur. Quare mulieres, quæ hac redundantia laborant, si fieri potest, ante partum aliqua repellentia apponant supra mammas, ne tantam sanguinis copiam recipiāt. Nam postquam lac multum receptum est, non potest repelli, sed per mammas euacuari debet, aut suctu, aut alia ratione. Prohibetur autē sanguinem deorsum trahendo, & appositione cucurbitularum in emunctoriis, & pessariis, si sufficienter non fluat sanguis. Deinde linimento in circuitu mammarum, & sub alis imposito.

R. boli ar. ʒ. ij. spōg. bedeg rad. bistortæ, ana ʒ. ss. cum ol. ros. & paucò aceto reducātur ad formam linimenti, illinantur prædictæ partes. Supra mammas catag. digerentia

rantia sunt apponenda, vt quæ fiunt ex farina hordei, & oxymelite, vel ex herbis digerētibus cum quadam astringēte, vt menta, absynth. & aliis.

R. mentæ siccæ M. ij. absynth. M. j. fiat decoctio, tundantur, & per cribrum passentur, quibus adde farinæ fab. vel orobi, vel lupinorum ꝑ. ij. cum decoctione & pauco ol. liliorum, fiat catap. Supra papillam vtile erit radicem chelidonij maioris, decoctam & contritam superponere. Si hæc non proficiant, cerusam, litharg. cadmiam in vnguenta reducere vtile erit, & alia, quæ citra calfactionem digerunt, & medicamentis pituitam purgantibus corpus vacuare, & tenui victu, attenuante, & incidente copiam sanguinis absumere.

De lactis coagulatione. CAP. XX.

Concrescit lac in mammis, vel post vsum medicamentorum refrigerantium, aut nimis calfacientium, aut post contusionem aliquam. Dissoluitur autem cataplasmatibus, & vnguentis incidentibus & detergentibus, vt catapl. suprascripto, vel hoc sequenti.

R. succi apij qr. j. oxymel ꝑ. ij. farinæ cicerum rubr. & orizæ an. q. s. ad incorporandum, fiat catap. quod applicetur supra partem. Si his medicamentis non dissoluitur, vt glandulæ indurentur, & suppurentur, & tunc suppurantibus iuuanda est natura, vt si apponatur tale catap. l.

R. rad. althæ & lilior an. qr. j. fic. par. xx. decoq. in aqua, donec mollescant, quibus adde axungia porci non salitæ, aut butyri recentis qr. ꝑ. coq. & cocta contundatur, & fiat catap. adde olei communis parum. Quando materia est iam suppurata, aperitur locus, & curatur. Postea vt vlcus sordidum, de quo hic non agimus.

De inflammatione mammarum. CAP. XXI.

Fit aliquando ex redundantia sanguinis inflammatio in mammis. Erit autem curanda sanguinis missione, vi fluant menses, aut fluxuri sint, vel hæmorrhoides. Curatur medicamentis repellentibus positis in circuitu mammarum, deinde catap. sup. scripta ad digestionem vtilia erunt, potissimum in statu & declinatione. In incremento farinam hordei, & ol. ros. oportet his addere, vel aliqua repellentia digerentibus permiscere, vt si succo temperum excipiat far. hord. ol. cham. pul. ros. medi-

camētum fiet repellens, & digerēs. Quòd si ad suppurationem perueniat, vt vlcus putridum detergere oportet.

De mammatum incremento. C A P. XXII.

Mammæ crescunt, posteaquâ puella ad eam magnitudinem ferè peruenit, ad quam nata est peruenire, vel quia incipiunt pinguescere, ob redūdantiam alimenti, vel quia multus sanguis ad illas partes profluit ante mensium eruptionē. Aliis autem crescunt mammæ, quia aluntur flatulentis alimētis, vt castaneis, rapis, &c. Quòd mulieribus monticolis accidit. Quare si quis velit illarum incrementum prohibere, sanguinis attractionem impediat, & partes illas densas reddat, vt non faciliè sanguinem influentem recipiant. Ad id commendatur succus cicutæ (prohibet enim incrementum) aqua myrthi peculi ros. & aquæ distillationis pinearum cum pauco aceto, & alumine positæ sup. mammas intinctis pannis. Quòd si iam accreuerint, bonum illum habitum soluere oportet, & multum mouere menses, vt sanguis multus absumatur, & super partē medicamenta digerentia apponere, qualia sunt præscripta ad lactis resolutionem, aut vnguēta metallica, addendo salis communis, sulphuris, & aluminis an. 3. j. pro 3. j. Postquam detumuerunt, & flaccidæ factæ sunt, lutum, quod reperitur in molis, quibus acuuntur gladij, superponendum, cum pauco aceto vt indurentur. Lutum enim molarum cum aceto positum vsum chimolæ præstat, aut vulgo dicta bolus. Rubrica fabrilis eodem modo præparata, vel cum oleo myrthino, ros. omphacino, vel acacia vulgari, & quæcunque astringunt sine magna distentione, aut resolutione. Nam quæ resoluunt, illas emolliunt.

De mammatum scirrho. C A P. XXIII.

Scirrhus mamarum fit post inflammationes, aut concretiones lactis, aut diuturniorē vsum repellentium, quæ materiam cōgelarunt, aut post fortiter detergētia, quæ id, quod tenue est, euacuarunt, & quod est crassarum partium, crassius reddiderunt. Si autem glādulæ indurētur, strumæ, siue *χοληστές*, à Gal. qui dicit ardenes induratas esse *χοληστές*. Curatur autem scirrhus eadē ratione, qua in aliis partibus, nempe repellentibus & digerentibus. Dari possunt medicamēta incidētia & attenuantia,

uantia, ad attenuationem materiæ, & mensum pro-
uocationem, quod parcius fit, si sit in utero.

De mammatum ca. cro. CAP. XXIII.

Cancer tumor est durus, qui sensim incipit, scirrhus
similis, nisi quod dolorem parit. Scirrhus verò sine
dolore est. Cū incipit, sanguinis missione, purgatione, &
topicis remediis præscriptis curari potest, vel abscissio-
ne, si fieri possit. Abscindi autem potest, si parvus sit, &
altas radices nō gerat, & quando abscinditur, oportet se-
ctionem incipere à parte sterni proximiorē, procedēdo
ad superiorem partē, propterea quod venę maiores vlti-
mo loco sunt abscindendæ. Nam copia sanguinis vtrius-
que (scilicet venarum & artēriarū) ægriū & assilentes
perieret, & ægri vires deficeret. Ideo oportet hoc modo
incidere, deinde cauteriis sanguinē sistere. Neque statim
cōpescēdus est sanguis propterea quod vtrūque infectus
est euacuandus. Si cancer est magnus, & materia iam col-
lecta sit & putrefacta, satius est materiæ exitum dare,
quam materiam illam putrefactam relinquere. Nam ex-
periētia didicimus mater. à illā grauissimos dolores in-
ferre, qui post apertionē mitigantur. Adde quod ex dis-
sectione nouimus, thoracem repleri sero sanguineo ni-
mio vsu repellentiū quod superiori ann. 1553. mercatori
euidā euenit (Montagnac) ciuitate Gall. & Narbonen-
sis, qui priusquam moreretur, laborauit magna anhelandi
difficultate. Nihil aut parū expuebat, tandē vita decessit,
& in thorace repertæ sunt seri amphoræ quatuor. Quod
accidisse puto propter laminam illam plumbeam, quam
semper gestabat, & medicamenta fortiter refrigerantia,
& repellētia, quibus vsus est, etiam post suppurationem.
Argumento est sanguinē resudasse in pectus, quia tumor
maximus erat, qui detumuit, & longē minor factus est,
post vsum illorum remediorū. Et priusquam laboraret
difficultate anhelandi, ab eo tempore difficulter anhe-
lauit, donec ē vita excesserit. Serum illud erat sangui-
neum, id est, videbatur sanguis paucus in sero dissolutus,
nec tale esse, quale reperitur in peritoneo, & pericardio.

De hydrop. CAP. XXV.

Aliam

Hydrops ab aqua nomē accepit. In omni specie ran-
dem colligitur, etiam in illa, quæ ab Hipp. sicca di-
borū mor-
borum est.

*rationem
r-peres
libro 3.*

*Hydrops
quid.*

citur quam Tympanitem alio nomine vocant Medici in qua flatus multi sub peritoneo collecti sunt, sed tandem aqua è venis in spatium ventris veluti per diapedesim effluit, plus tamen aquæ in Ascis, quam in illa specie, plus verò aquosæ pituitæ in Hyposarca, vel Leucophlegmatia. Sunt qui distinguunt illam ab Anasarca, sed specie non differunt. Est autem Hydrops symptoma in actione hepatis læsa, sanguificatione, primario, vel per consensum. Sanguificatio, hepatis est actio. Ad carnem refertur tanquam ad præcipuam illius partem, vt doctè docuit Gal. lib. de Dogmatis Hippoc. & Platonis, ex sufficienti partium enumeratione. Est aliquando affectus in ipso hepate, intemperies omnis immoderata, calida, frigida, humida, & sicca, obstructio, abscessus, scirrhus per consensum omnium partium, quæ ad facultatem nutritoriam referantur, vt vetriculi, intestinorum, splenis, mesenterij, renum consensu, sed citius ob affectum partium, quæ vel magis excrementis suscipiendis seruiunt, vel ob vicinitatem, vel splenis, quia sanguinem sæculentum recipere debet & massam sanguinis sæculentam repurgare. Si frustretur illa vtilitate, recur tandem refrigeratur, & læditur sanguificatio. Item si renes non trahant lotium, replentur venæ lotio, & tunc fit aqua intercus. Fit etiam ob longos affectus mesenterij. Ob vicinitatem læduntur mesentericæ, & per consensum vetriculus, vt si ob caloris imbecillitatem, crudum chylum mittant, vel flatus gignant, vel pituitam, fit Tympanites, & Anasarca. Læditur, vel refrigeratur hepar, à contactu chyli frigidioris, vt omne agens in agendo repatiatur, repatiendo læditur Aqua intercus facile læsionem pulmonum sequitur. Nam phthisici, & hectici magna ex parte hydropici fiunt, nisi fluxione ventris corripiantur, & ob fluxum ventris morte præoccupentur. Hoc fieri puto propterea quòd in illis ab intemperie illa æquali, facultas cœcoctrix siue sanguificatio læsa est. Item Asthmatici hydropici fiunt tandem, quia aliqui, vt per anaxiomen cognouimus, aquam in spatio thoracis habent, quam cum corpus mouent, concitant, agitant, & pulmonum expirationem impediunt. Alij hydropici fiunt, quia cor per arterias consensum habet cū hepate. Quòd

si cor

si cor non probè diffluatur, tandem concipit calorem præter naturam, qui actionem lædens hepatis, hydro-
pem facit. Fiunt & ob immoderatum fluxum sanguinis,
& aliorum humorum, vt videmus ob immoderatum
fluorem hæmorrhoidarum, vel vteri, vel nasi, vel ob in-
tempestiuam missionem sanguinis, ob sputū sanguinis,
ob dysenteriam sanguinolentam, diarrhæam, & alium
fluxum longum humorum. A potione aquæ frigidissi-
mæ post corporis exercitium immoderatum, ob mor-
bum acutum, hydrops fit, vt Hippoc. docet. Hydropem
semper præcepit cachexia, & nunquā repête fit, sed post
aliquod tēpus. Non enim repentē feri potest, vt ad tan-
tam intemperiem hepar veniat, quæ hydropem gene-
ret, neque vel tanta flatus, vel feri fit collectio, vt hydro-
pem generare possit, nisi ex retentione vrinæ. Aliquam
hydropis speciem præ se fert, sed non est verus hydrops,
nisi perseveret. Nam collectio feri est id, quod sequitur
actionem læsam, neque à feri copia constituitur, sed à
sanguificatione læsa vt si ob calculos in vtero reconten-
tos aqua non descendat in v. sicam, retrocedit, & habi-
tum corporis implet sero, vt corpus præ humidum appa-
reat sine hepatis læsione. Nam si calculus deturbetur
deorsum, fluat vrina, statim prouocato sudore, redit ad
suam naturam corpus, vt citò fit citò curatur.

Prognosticum.

Facile dignoscitur hæc affectio, postquam ad aliquam
magnitudinē peruenit, sic & difficulter curatur. Quare
melius est venientem cognoscere, vel cū incipit, quo
tempore omnia sunt mitiora, & vires fortiores, quæ ge-
nus omne remedij ferre possunt. Tympanites agnoscitur
ex morbis, vel causis morbisicis præcedentibus, vt si
præcesserint multæ cruditates, multus flatus in vêtre, si-
ne aliqua euacuatione per sedem, vel per ructum, si ve-
næ magis distantæ appareant, quàm pro ratione pleni-
tudinis. Nam post longas ventriculi, aut hepatis aut alia-
rum partium cruditates, plenitudo esse potest, & pauco
cibo repleti difficilè respirant, ob flatus, qui distendunt
partes internas. Quòd si circa vmbilicum dolores sunt,
qui non soluantur, neque medicamentis, neque aliquo
modo, & flatus sub mesenterio, vel inter tunicas mesen-

terij congregati sunt, certò sperare debemus aquam siccam, vt Hip scriptū reliquit, scribens: Circa vmbilicum dolores, &c. Ascites verò deprehenditur, primū quod multū vrinæ in nobis generatur, & redditur, sed paulò post supprimitur, & in venis remanet, & grauitatē & pōdus facit. Cū corpus voluitur, sentitur aqua fluēs, veluti per canalem. Sitiunt, corpus contabescit in dies, & venter intumescit. Anasarca cognoscitur cū partes externæ frigidiores tactu deprehenduntur, & in ea frigiditate perseverant. Partes faciei quæ emaciatae erant longo morbo, tumidiore apparent, & palpebrae pedes crassiores & calidiores sentiuntur. Quod si præcesserit fluxus sanguinis immodicus, vel aquæ potio frigidioris, Anasarcam oportet expectare, & ne decipiamur, oportet diligenter interrogare, si id eueniat ob longas vigilias, vel quia laborans stabat noctu rectus. Solent enim tibiæ & pedes, vel ob imprægnationem, aut vigilias, aut stationē intumescere. Quod si prementi cedat caro, & remaneat veluti fouea quædam est vel partis cedema, vel initium Anasarcae. Hydrops, si à causâ calida ortum habet, difficilius curatur quā si à refrigeratione. In causâ est, quod medicamenta intrinsecus vel extrinsecus admota calida sunt, quæ aquam euacuant, vel siccant, vel detergunt, vel flatus abluunt, ob id intemperiem augent, quæ hoc symptoma attulit. Si à frigida, & causam & symptoma auferunt. Hydrops ob scirrhum hepatis vel splenis, nō curatur, neque si à scirrho procreetur, si scirrhus sit cōfirmatus exquisitūque, & antiquus. Morbus enim nullus curatur, cuius causâ tolli non potest. Adde quod scirrhū hepatis, difficilius curantur. & medicamenta emollientia aduersantur parti, quia astringentia semper expostulat, ad eius corroboracionem, ob id difficilius curatur. Præterea emollientia partes relaxant, & implentur magis flatu vel aqua. Pancreas cum aliis glandulis mesenterij in scirrhum vertitur, quod difficile deprehenditur, ob ventris inflationem, & quia nullus antiquorū obseruauit scirrhum hepatis in magna distentione, vel inflammatione, qui non potest deprehēdi facile.

C V R A T I O.

Curatur hydrops, ad curationē morbi, qui illius causâ est,

est. Quare considerandum, qualia, & quæ causâ præcessit intemperies, vel tumor aliquis. Si intemperies calida, vel à febre acuta relicta, vel à longo tempore in hepate facta, & praua victus ratione aucta, illa non potuit tandiu perseuerare, sine magna bilis generatione, & feri. Quare in primis euacuare bilem oportet, & meatus apertos retinere, vt illa descendant per intestina. Quod fiet commodissimè remedijs extinguentibus bilem flauam, & euacuantibus ichores citra magnam adstrictionem, vel calefactionem. Catholicon, syrup. ros. laxatiuus cum aqua endiuiz, vel graminis, vel asparagi dari possunt. Interea syrupus sequens præparabitur.

R. endiuiz, cicho. fumariz, herb. capill. agrimoniz, rostri porcini an. M. j. mercurialis, & absynthij ana M. ss. passul. prunorum, sebesten an. N. xx. thamarindorum 3. j. anisi 3. ij. florum bugl. borrag an. p. j. fiat decoctio. In lb. j. ss. dissolue succi rosa. & mercurialis an. 3. iiij. sacchari q. s. fiat syr. aromat. 3. ij. diarrhodon abbat. vltimę dosi adde expressionem, 3. ij. rhab. Deinde detur opiata sequens ad virium naturalium corroboracionem, & castigationem intemperaturę, vt

R. conseruę florum cichor. capillorum veneris, an. 3. j. pulpę passul. infusarũ in aqua endiuiz 3. j. ss. pul. diarr. abb. & triasa. an. 3. ij. rasurę eboris 3. j. cineris intestino- rum lupi loti in aqua endiuiz & absynthij 3. ss. cum syr. capillorum ven. vel de bisantiis, fiat opiata, capiat singulis matutinis superbibendo ex aquis sequentibus.

R. aquarum endiuiz, cichor. graminis, & absynthij an. q. r. j. dulcorentur, & capiat 3. iiij. post opiata, vtatur frequenter sequentibus supra hepar.

R. ol. absynthij & ros. an. 3. ij. ol. cydoniorum 3. ij. santali albi, rubri, coralli rub. an. 3. j. seminis endiuiz, portulacę, berberis an. 3. j. ss. cerę albę q. s. fiat linimentum pro hepate. Si morbus procedat, inflatio & aquę collectio appareat, oportet, non solum intemperiem extinguere, sed & quod genitum est. & congregatum, extrahere. Symptoma illud causę ratione habet, augeat intemperie, sitim facit. Quare instituemus tales syropos, quales in libro de formis docuimus, ad aquę eductionem. Suprascripto syr. vel syr. de endiuia composito, vel de

bisantiis, vel de eupatorio, addendo decoctum sequens vel ex illo decocto syrupum parare poterimus, sic

R. rad. petro. gra. & aspa. an. ʒ. anisi ʒ. ij. foliorum bras. marinæ, seminis hederæ ʒ. j. asari ʒ. ʒ. anisi ʒ. ij. fiat decoctio, quæ detur cum syrupis superscriptis, vel addendo sacchari q. s. fiat syrupus qui detur alternis diebus. Vel ubi non reperiuntur herbæ marinæ, ut chamelea vel brassica marina.

R. rad. iridis recentis ʒ. j. merc. circij cum rad. sonchi an. M. j. sennæ orien. q. r. j. rad. apios Dioscoridis ʒ. ij. asari ʒ. j. apij. petro. an. ʒ. ij. seminis hederæ ʒ. j. fiat decoctio in aqua endiuia, addendo passul. ʒ. ij. & in tb. ij. dissol. syr. ros. laxa. ʒ. iiij. sacch. q. s. fiat syr. cap. ʒ. vj. mane duobus vel tribus diebus continuis aromatizetur ʒ. iiij. diar. abb. Clysteres & cientes urinas admota faciunt ad educationem aquæ. Aqua enim & in magna vena, & aliis continetur, unde in spatium ventris defluit Quare cientes urinas profunt, quod onus venarum & antecedentem materiam euacuant. Sunt autem syrupi parati ex radicibus, vel succis herbarum aperientium & acrium, ut syr. de bisantiis, de quinque rad. in forma opiata. Trochisci dantur, vel in forma pulueris, admixtis, quæ iocinoris substantiam roborant, & aliqua, quæ intemperiem calidam tollant, vel minuant, vel astrictione leui sint, vel similitudine substantiæ iuuent. Parentur ergo ex conf. capill. rad. apij eryngiorum, carne, passul. carne hepatis lupi, vel cuculi, intestinis lupi, vel gallinæ, pulvere diarr. abb. trochiscis de eupatorio de rhab. Laudant practici dialaccam, & diacurcuma, sed has compositiones reiicio, nisi in anasarca, quia calidiores sunt & tam ingrata, ut vix assumi possint. Fiat ergo talis opiata.

R. conf. rad. apij ʒ. j. capil. & florum cicho. an. ʒ. ʒ. pul. diarr. abb. ʒ. ij. triasanta. ʒ. j. cineris lumbricorum & intestinorum lupi an. ʒ. ij. cum syru. de endiuia composito fiat opiata, capiat sero & mane, superbibendo aquam cicho. & gra. ʒ. iiij. faciunt penetrare opiata, & calorem temperant. Clysteres verò aquam trahunt è venis meseraicis, à quibus venis in omentum, & intra peritoneum refudat. Illæ enim venæ sanguinem plenum sero continent, quæ venæ raræ sunt peritoneo tantum vicini,

ne, ob id in spatium refudat serum quod sua tenuitate continere non possunt. Clysteres autem ex detergentibus, & aquam trahentibus fieri debent, non ex emollientibus, vt ex mercuriali, foliis brassicæ marinæ, ex beta, parietaria, radice ireos, & cucumer. siluestris, ex ciclamine, vel succo cum vrina hominis, vel cum sero caprarum, & iniiciendi sunt sine oleo, vt

R. merc. betæ, parie. an. M. j. brassicæ marinæ, vel thymelæ, vel chameleæ, M. ss. vel sennæ orien. ʒ. ij. florum hipperici, genestæ an. p. j. Anisi, apij, petro. an. ʒ. ij. carthami ʒ. j. fiat decoctio, & in lb. ss. colla. dissol. benedictæ ʒ. j. misce, fiat clyster, vel sic.

R. cucumeris agrestis, vel apios Dioscoridis, vel ciclaminis, vel asari ʒ. iiij. contundantur, & decoquantur in sero, vel in vrina, & iniiciantur, vel extrahantur succi ex herbis, vel radicibus, & fiat clyster: iniiciatur frequenter. Sunt, qui fermentum acre dissoluunt, quia trahit. Pituitosa medicamenta, vt turbitih, agaricus, cartha. infecta valent. Nam si sine zinzibere ponantur, aquosam pituitam & serosam trahunt. Postquā illa feri copia vasorum euacuata est magna ex parte, tunc tentare oportet euacuationem, vel assumptionem feri collecti sub peritoneo, non antè, ne plus trahant, quàm à parte euacuent. Euacuatio verò vel punctura vnà facta in ventre ad interna vsque, vel scarificata cute totius ventris ad aponeuroses musculorum. Nam si cutis & membrana illa, quæ cooperit rectos musculos paruis incisuris diuidatur, serum per ventrem refudat. Quod si paucum sit, totum euacuat & potissimum si in parte inferiore circa foramina vasorum spermaticorum. Sic multos curauim, apposis digredientibus & epipasticis supra ventrem De quibus postea dicemus Scarificatio hic minus periculosa est, quàm paracolesis. Illam autem antiquorum, quæ non nisi viribus valentibus fieri debet, & quibus scirrhus nullus est in aliquo viscere, rationem faciendi in nostra Chirurgia docebimus Supra ventrem exiccantia vel absumentia reliquum aquæ, poneda & diu retinenda sunt. Ponuntur etiam in parte inferiore vètris, quæ digerunt, & ciunt vrinas. Fiunt emplastra, vel cataplasmata, quia illa citra olei parari possunt. Emplastra excipiantur melle, vel mu-

co coclearum. Paratū habent de baccis lauri, quod huic conuenit, sed magis in Tympanite. Addatur coclearum marinarum cinis, vel terrestrium, vel purpuræ, vel buccini, vel scombrorū, & supra ventrē applicentur, addita pauca spica celtica, vel nardi, vel asari, vel valerianæ, sic.

℞. coclearum terrestrium, viuarum, non latorum. Contundantur diligenter, quibus adde spicæ nardi, scœnanthi, asari an. ʒ. iij. fiat cataplasma. Vel ad euacuationem aquæ, quæ in splene, & venis mesaraicis & perinei. Ad aquæ absorptionem applicentur succi herbarum, vel vnguentum de arthanita, siue de ciclamino, & vnguentum aragon sic.

℞. succi thimelæ cucumer. agrestis, & brasiçæ marinæ an. ʒ. ij. succi aristolochiæ, vel asari ʒ. j. spicæ nardi, fennæ, an. ʒ. iij. Excipiantur farina orobi, vel lupinorum, & applicetur supra vmbilici regionem. Alij supra vesicam ex ol. rutaceo, & vrina pueri ac succo pedis columbini parant. Mouet vrinas. Quare illud debet fieri, cum supra dicta remedia vrinam prouocantia dabuntur. Sudorem prouocantia non multum prosunt in hac specie, quia pauca aqua est in habitu corporis. Quod si quis velit sudorem prouocare, hoc debet facere, etiam aqua in venis colligitur, vt in fine, in Anasarca.

De Tympanite.

C A P. XXVI.

Tympanites hydrops est siccus, quia aqua in principio nulla est, sed flatus multi distendunt peritonœum, ita vt percussum sonum edat, vt tympanū. Fit post multos morbos, & post euacuationes ventris ob imbecillitatem caloris naturalis, qui a pituita vel ab humore aliquo flatus eleuat, quos discutere non potest. Quare vtriq; causæ occurrendum, nempe caloris naturalis imbecillitati, & humiditatibus crudis. Calor naturalis ob intemperiem frigidam debilitatur, cui occurritur, vel capite de intemperatura hepatis, vel ventriculi frigida, vel inflatione ventriculi. Sed calor resoluens in morbo acuto quandoque in causâ existit, cui difficilius occurritur. Moderatè calidis temperatis reficitur calor viscerum, vt ventriculi, intestinorum, hepatis, splenis. Hæc enim species ferè vitio ventriculi fit. Quare commodè curari poterit, si vetriculi inflatio, vel dolor colicus perseverat cir-

ca vmbilicum. Purgetur materia cruda pilulis de aromatibus, de hiera, sebellinis, ante pastum, frequenter exhibitis ante cœnam per horam. Deinde coquatur syrup. de bisantiis, de absynthio, de menta, cum decoctione seminum calidorum maiorum, vel minorum, vel sic.

R. cort. citri sicci ʒ. j. rad. eringij ʒ. ij. mentæ siccæ, hyssopi, beto. absynthij, ana M. j. cicho. endiviæ ana M. ʒ. anisi ʒ. ʒ. seminis apij, petro. ana ʒ. j. florum anthos, stachados ana p. j. fiat decoctio in aqua & vino. & in t̄b. ij. col. dissol. syr. conserua. corticis citri ʒ. iiij. sacch. q. s. fiat syr. aro. ʒ. ij. diagal. capiat in vj. matutinis. Finitis syrupis capiat pilulas sequentes.

R. pul. benedictæ ʒ. ʒ. agar. tro. ʒ. j. cum syr. de bisantiis, fiant pilulæ, capiat post mediam noctem, vel si pilulas deuorare non potest, capiat sequentem potionem.

R. syr. præscripti ʒ. iiij. In quo. dissolue elect. diacarthami ʒ. iiij. benedictæ ʒ. j. syr. capil. ʒ. j. misce, fiat potus, detur, vel sic.

R. carthami, fennæ orien. ana ʒ. ʒ. agar. anisi ana ʒ. ij. florum enth. p. j. fiat decoctio, & in q. j. dissol. elect. de citro sol ʒ. iiij. syr. ros. lax. ʒ. j. misce, capiat manè. In crastinum detur opiata sequens, vel electuarium dianisi, vel trium piperon, vel arom. ros.

R. conf. zinziberis viridis ʒ. j. conf. anthos ʒ. ʒ. cort. citri, & conseruæ eringiorum ana ʒ. vj. confect. aro. ros. ʒ. j. diagalange, & dianisi ana ʒ. iiij. cum syr. conf. cort. citri, fiat opiata, capiat ante prandium, & ante cœnam, superbibendo parum vini maluatici diluti aqua absynthij, vngatur hypochondria in principio sequenti vnguento. Postea vratur emplastris, vel cataplasmatibus.

R. ol. rutacei & anethini ana ʒ. iij. succi. rutæ & absynthij ana ʒ. j. vini ʒ. ij. coquantur ad consumptionem succorum, quibus adde. pul. diagalange, seminis apij, petro. cumini, carui ana ʒ. ʒ. ceræ q. s. fiat vnguentum, Vngatur venter, addendo vini albi, vel maluatici tempore inunctionis.

R. massæ empl. de baccis lauri t̄b. ʒ. fiat emplastrum. & cingulo sensim constringatur venter, vel fascia, vel ponatur cataplasma sequens.

R. ster. vaccæ t̄b. j. pul. cumini, & rutæ ana ʒ. j. incor-

porentur simul, & applicentur supra vëtre[m], cui in processu adde salis vel nitri, vel sulphuris ʒ. ʒ. interea iniiciendi sunt clysteres ex decoctione herbarum discutientium status, decoctarũ in vino, vel seminum discutientium sine oleo, hoc modo.

R. foliorum rutæ, maioranæ an. M. j Anisi ʒ. j. feminis apij, petro an. ʒ. iij. florum came anthos, stecad. an. p. j fiat decoctio in vino, & aqua, vel lixiuio de ili in lb. ʒ. dissol. benedictæ ʒ. j. si sit constipatio: si ve ò non sint recrementa, prætermittatur, vel ponatur ʒ. ʒ. tantum, fiat injectio manè. Pulueres ante pastum, & post pastum magis efficaces sunt in hac specie, quàm in alia: parantur ex discutientibus & siccantibus.

R. anisi, fœniculi, carui, cumini in aceto, maceratorum ana ʒ. ij. misce, fiat pulvis, capiat per horam ante prandium, & post cœnam duobus horis, ne si statim assumatur, crudũ serum deducat intra venas Sasellationes ex semine milij, & sale, & cumino, & aliis appropriatis.

De Atrophia.

CAP. XXVII.

Cum corpus ali definit, sensimque exarescit & absurmitur affectione ea, quam Græci atrophiam vocant, laborare dicitur. Quare nihil aliud est quàm nutritionis error, aut priuatio. Sæpe autem euenit, vt non totũ corpus, sed vna quæpiam pars solũ ex atrophia tabescat, ex quo atrophix duæ sunt constituendæ species. Vna, quæ totius corporis est altera, quæ partis alicuius tantũ. Quæ totius corporis est, ex alicuius partis nutritioni subseruientis vitio, aut imbecillitate procedit: quæ caloris spiritusque vitalis, aut naturalium functionũ, quarum ministerio attractrix facultas vitur, robur virisque obtundit vel extinguit. Pulmonũ enim exulceratio, & cordis affectus, potissimũq; marasmus, quia vitalem spiritum (qui vitæ omniumque functionum author est & principiũ) labefactant, in atrophiam corpus perducunt, sicuti etiam ventriculus, si tanta intemperie, aut imbecillitate laboret, vt alimentum vel probè conficere, aut satis diu retinere, donec concoxerit nequeat, malè corpus nutriri necesse erit, cum posteriores vitia prioris cõcoctionis non emendent. Accidit interdũ per immodicas euacuationes, & alui profluvia corpus alimenti penuria labo-

rare, propterea quod euacuetur nutritionis materia, & quod alimētum corpori esse debeat, veluti nec per diarrhæas, & dysenterias chylus ad hepar transmitti potest. Quare quæ talium affectionum, aut immodicarum in quavis parte corporis euacuationum causa esse potest, atrophix simul causa statuenda erit. Quæcunque pariter hepatis affectio obstabit, quò minus vel trahendi ad se chyli munere fungi possit, aut attractum in laudabilem sanguinem conuertendi, aut eam deniq; partium, quæ sanguini ab excrementis repurgando destinatae sūt, vt est vesicula fellea, lien, & renes, quæcunque, inquam, malè suum officium præstabit, consumptionis corporis tandè efficietur causa, vt etiam partes trahere ad se alimentum, aut tractum in sui substantiam cōvertere non possint, vnde atrophiam sibi asciscūt. Atq; hæ sunt atrophix causæ interiores. Externæ sunt, quæ illas aut gignunt, aut augent. Hæc ex alimentorū vitio procedunt, aut ex animi aut corporis affectibus, & iis, quæ extrinsecus corpori occurrūt. Alimentorū vitia aut ab eorum quantitate, vel qualitate procedunt, aut in præpostero eorum ordine, vel intempestiua eorum assumptione. Studia verò, & affectiones animi, corporisq; exercitationes importunæ, venerea, balnea, motus omnes corporis, vigilæ, inedia, iracundia, melancholia, & similes. Quibus perspectis & cognitis, vt corpus, quod ex atrophia contabescit, consumi prohibeatur, vel exhaustum restauretur, aut rursus nutriatur, causæ, quæ atrophiam efficere deprehenduntur, per eius emotionē, aut emendationem occurrendum erit, vt si ventriculi vitium in causa sit, corrigendum est, siue illud, morbus, aut symptoma, aut symptomatis causa existat. Cruditas enim, aut alimenti corruptio, vel eius per vomitionem, aut alui profluvia reiectio, vnde nutritioni materia exhauritur, atrophiam adducunt. Si verò iecoris obstructio distributionem impediat, si intemperies in sanguinis confectione errores committat. Si lienis, vesicæ, renūque noxa & imbecillitate suis facibus & excremento, siue bilioso, siue ichoroso non debile emendetur sanguis, sine illarum causarum emendatione, à quibus corpus exarescit, eius integritas seruari nequit. Quare inanis illorum

conatus, qui alimentis quantumvis euehymis, & laudabilibus refarcire corpus contendunt, si partes, quæ conficere debent cibos, non conficiant: quæ immutare, non immutent: quæ attrahere, non attrahant: quæ expurgare, non expurgent. Quemadmodum enim corpora impura, sic corpora admodum intemperata, vel obstructions, vel tumores in partibus naturalibus habentia, quanto plus nutriueris, tanto magis læseris. Cacochimæ enim quantitas, augetur, & excrementorum quantitas maior cumulatur, quæ licet venas distendant, & corporis molem, aut augeant, aut non imminuant, corpus tamen ali non permittunt, & in partibus radicalis substantiæ absorptionem accelerant, non aliter, quam tabem pulmonem vlcus inducit. Quod curationem antè recipere non est sperandum, quam illud sanatum sit, cum ex eo, qui per inspirationem in pulmonem attrahitur aer, perpetuo inficiatur, & inde vitalem in corde spiritum labefactet. Eadem est etiam ratio cordis affectuum per arduentes maximè febres hecticas. Quare in omni atrophiciæ curatione causæ eam procreantis habendam esse primo loco rationem semper existimamus. Deinde de reficiendo per alimenta corpore cogitandum, in quo modum tenere debemus, vt alimenta ægris primum, quæ cito & facile coquantur & distribuuntur, demus. Postea præscribamus ea remedia, quæ multum nutriunt, quauis tardius & difficilius coquantur. Ob eam causam iis, qui nec febre, nec obstructione, nec tumore partium internarum laborant, neque capite dolent, aut hypochondrionum distentiones & murmura patiuntur, lac in primis muliebre, deinde ouile, tertio vaccinum, addito paulo saccharo, ne concreascit, exhibendum censeo, non autem asininum, qui vis quædam purgandi & detergendi inest, vnde minus ad nutriendum aptum est, sed exulceratione pulmonum affectis ex usu esse tantum videtur. Succum carniū, vt perdicum, capri, vel coxæ veruecis, addito paulo vino, aut ex pane assumendi, qui si minus cocti sint, in scutella super carbones coquendi. Iuscula etiam ex carniū coctura tabefactis, admixto paulo vino, danda, quibus aliquando incoquere poterimus micam panis albi, vel farinam tritici, aut hordei, vel orizæ.

Dare etiam non inutile erit hordeatum ex amygdalis, & farina tritici, aut amygdalarum lacte, manè, & aliis omnibus supra enumeratis alendus est æger, quibus super dormire etiam quacunque hora post cibum conducit. Post somnum frictiones corporis lenes imperandæ, ol. amygd. dul. inungendo manum, vel ingrediendum balneum aquæ dulcis tepidum, à quo non prius exeundum, quam refrixerit, vel immixta aqua frigida, ne tepiditate balnei ad superficiem attractum alimentum simul per transpirationem exhalet. Passularum usus ad corporis nutritionem, & ad impinguandum commendatur, sed commodior erit, si paretur ad hunc modum.

℞. pass. ab arillis mundatarum & infusarum in aqua bugl. & borrag. & vino albo ℥. j. siccentur primò, deinde disponantur in vase vitreato, sinapizando saccharo tenuissimè pulverisato, seruentur in loco calido, & vtatur frequenter. Caro testudinis multum alimentum parit, & ob humiditatem, assumptum resarcire deprehenditur, sed illius iusculum potentius, cum vino sumptum. Sunt, qui eius sanguinem bibunt. Id quod quibusdam maximè ob venenum assumptum, aut aliquam qualitatem venenosam contabescentibus profuit, cum eius vis veneni inimica sit. Caro autem illa cocta contunditur, & immixtis amygd. & nucleis pinearum fiunt morcelli, vel placenta cum paucò saccharo in hunc modum.

℞. carnis testudinis nemoralis, vel aquaticæ ℥. iij. pinearum mundatarum, & amygd. dul. infusarum in aqua rosarum vel lactis, vel in aqua buglossæ ℥. ij. sacch. dissoluti in aqua ros. q. s. fiat placenta, coquatur in furno parum. Si farinæ tritici, vel orizæ ℥. j. admisceatur, præstantior erit ad nutriendum. Ad reficiendum ægros atrophici tabescentes multum præstat condimentum apud Hispanos vsitatum, quod (*blanc manger*) vocant. Componitur autem ex pulpis capi contusis, amygd. & saccharo, lacte, & farina orizæ, ex quibus fit illud gratissimum palato ferculum, & ad multum nutriendum aptissimum. Inter ea, quæ facile & potenter alunt, & gelatina commendatur cum saccharo, testiculi gallorum, & glandes omnes. cerebrum porci coctum, deinde in sartagine frictum & farinæ, melioris saporis gratia inuolutum, à Gal. in metho-

do laudatum, sed lib. de alimētis improbatum est, quòd nauseam moueat, malúmq; succum præbeat. Caro præterea porcellorum, quòd multum alimenti diutiusque hærentis, & permanentis suggeret, celebratur. Contrahitur interdum atrophiam ob derelictas & intermissas exercitationes, & quòd partes ad attrahendum & euacuandum imbecilliores efficiuntur. Quare frictiones in ea post alimenti coctionem sunt imperandæ, vel picationes, vel balnea tepida, vt ab iis attractio partium adiuuetur, sed summopere cauendus illorum vsus, nisi prima & secunda concoctione absoluta. De vniuersa corporis euacuatione dictum est. Restat de ea sermonem facere, quæ vnam quampiam tantum partem obsidet, cuius causa peculiaris, quod illius vitium est. Quod aut propter aliquam intemperiem aut resolutionem, aut eius partis relaxationem accidisse videri potest. Ex quo efficitur, vt partes illæ suo attrahendi alimenti munere malè fungantur, propter animalis spiritus interceptionem, qui eas immobiles, & veluti emortuas reddit, & in atrophiam, sicut per exercitationes intermissas, perducit, nisi ad facultatum consensum & conspirationem sit id referendum, quarum vna affecta reliquas in consensum suum trahere cōsentaneum est. Proinde curandus in ea atrophiam primùm est affectus, qui eam inducit, deinde in alimenti attractionem incumbendum, quæ picatione vel frictione ex oleo amygd. vt superius dictum est, perficitur.

De Ructu.

CAP. XXVIII.

Suo loco omissum fuerat.

R Vetus motus est facultatis expultricis ventriculi, quo flatuosus spiritus cum quodā murmure foras affatim excernitur. Quare symptoma est actionis læsæ. Illam enim flatus generatio sequitur, qui materia sunt huius affectionis, de qua superuacaneum est ob id plura dicere, cum flatuum procreatio, atque etiam cruditas generatio abundè à nobis suo loco sint explicata. Sed cum cruditatem non minùs calida, quàm frigida intemperies efficiat, vnaquæque illarum suam ructus speciem constituit. Frigida natura acidum, calida verò nidorosum ructum parit. Sub nidoroso comprehendo, qui aliquid aut putrens, aut putre redolens, veluti ouorum frictorū odorem


odorem referunt. Quod ad curationem siue sedationem symptomatis attinet, eo modo aggredienda est, quo ventriculi intemperiei emendationem demonstrauius, in paulò largiore quantitate, quæ discutiendi flatus vim habent. Compescere etiam ructum citissimè deprehenditur aque frigide potus, idq; celerius, si nidorulètus sit. Cuius rei causam nullà aliam video, quàm quòd aquæ frigiditas ventriculi sensum obtundit: vnde ab illo conatu expellendi desistit, licet id ructus causam augere videatur. Verùm illa inunctione extrinsecus facta super ventriculum ex oleis calefacientibus & naturæ ventriculi accommodatis, qualia sunt nard. & absynth. aut de menta, & cecrato stomachico emendabitur. Pulueres flatus discutientes ex usu erunt, si in illis sacchari quantitatè adgeamus, quæ aciditatem potentius castiget. Quod etiam multum præstant amygdalæ torrefactæ, & saccharo coopertæ. Ad nidorosum verò ructum sedandum utilis est vomitio, vel purgatio leuis, cum huiusmodi ructus corruptionis humorum in ventriculo existentium index sit. Post hæc aquæ frigidæ haustus prodest, vel pomorum coctorum cum saccharo prima mensa assumptio.

FINIS LIBRI SECVNDI.

METHODI CVRANDO-
RVM MORBORVM LIB. III.

De affectibus partium naturalium, & inferiorum,
Guil. Rondeletio D. Medico autore.

De affectibus Oesophagi. CAP. I.

 ESOPHAGO & ventriculo iudem ferè morbi accidunt. Sunt tamè oesophago magis peculiare, vt difficultas deglutiendi, vlcus, exco-riatio, quæ fit à causa procatactica vt veneno, vel alimento acri, vel malè manso, vel aspero, vel offe-

deuorato, aut à causa interna, vel humore acri defluente à cerebro, vel vomitu reiecto. Accidit & nonnunquam in febribus ardentibus, siti diu tolerata, & ob caliditatem, & siccitatem in acrioribus factis humoribus. Excoriatio dicitur summa tantum parte decisa. Vlcus verò, quando profundius penetrat. Huius affectus indicia sunt sensus doloris, dum vinum aut iusculum, aut quidpiam aliud calidum bibitur, si falsa & acris defluxio præcesserit, quæ circa illam partem firmata sit, aut si biliosus vomitus etiam, aut si venenum sumptum est adeò paucum, vt ad ventriculum non potuerit descendere. Si verò fiat ab offe impacto, aut re quapiam aspera deuorata, id ex sermone ægri fiet manifestum. Si dicat se post deglutionem in ea parte fluxum quidpiam sensisse, aut aliquid sanguinis reiecit. Hæ causæ sunt distinguendæ, vt pro diuersitate illarum quæ conferunt, inueniamus. Causa antecedens siue interna siue externa, primùm auferenda est. Quoniã verò huius morbi causa, vt plurimum, est acris defluxio, ea curetur, vt ostensum est cap. de catarrho.

Observatio in fluxionibus.

Observandum tamen, dum humor fluit, & nihil in parte firmatum est, nec humeris, nec collo cucurbitulas esse affigendas, vt quidam recentiores imperant, nec ligandas aut asperius fricandas partes exteriores. Id enim auget defluxionem, & ad partem affectam humores trahit. Satius verò fuerit capiti raso cucurbitulas admouere, si modò possint adiacere, & fluentis humoris impetum sistere. Postquam verò consistit fluxio, expedit, vt & in angina, deriuare ad partes vicinas, vel ab interna parte ad externam, & tum cucurbitularum vsus circa illas partes est utilis.

Observatio in apoplexia.

In apoplexia verò, quia humor in cerebro resolutionem facit vniuersalem, ac prohibita respiratione iugulat, vt humor ad inferiora trahatur, & cerebrum leuetur excrementorum copia, nos corpus confricamus, & vngimus oleo copiam relaxante, vt ol. chamo. de lilio, amygdal. dulc. vt partes fiant ad suscipiendam fluxionem aptiores, figimus cucurbitulas dorso. Trahimus per clysteres actes, At sic non faciendum in catarrho, quin po-

tius aliò diuertendus est humor, aut si nos cogat plenitudo purgare corpus, utemur iis, catarticis, quæ quandam attritionem relinquunt, quales sunt pilulæ assaeteret, & alix, quæ agaricum & myrob. recipiunt & malthichem, & aliquid rhab.

Excoriationis curatio.

In acri defluxione primum competunt syr & decocta incrassantia: deinde detergentia & incrassantia: postremo resiccantia & astringentia, quæ possunt excoriationem, vel vicus resiccare. Inter, in tamen videndum est, morbus sit simplex, an compositus, an causam præsentem habeat, aliudve symptoma, quod curam ad se trahat, ut si vnâ cum excoriatione magna sit inflammatio vel intemperies calida & sicca, vel si quod excoriationem facit, adhuc adhereat. Caliditas enim & inflammatio, tum morbum, tum curationem tardant. In magna caliditate medicamenta sint frigida, & quæ lentorem quandam habeant, ut adherere possint, & excoriationem non exasperent. Si inflammatio adsit, mitigatur sanguis, deinde detur in principio cremor hordei mundati, quoniam minus terget, magis lenit, dolorem sedat. Postea utetur cremore hordei integri, quia magis terget, vel decocto sebesten, vel mucilaginis, ut

℞. semin. psij non concass. semin. cydon. ana ʒ β semin. papauer. albi ʒ. iiij. infundantur in aqua ros & extrahatur mucilago, addatur parum sacch. ad dulcedinem. Præstantissimum est remedium totum ouum fortiter agitatum, addito paucò sacch. Si est inflammatio aut dolor magnus, aut nunc dicamentum venenolum deuoratum, ouum sit crudum. Nam si coctum esset, & incrassatum, deuolueretur in ventriculum, & ita nil prodesset. His remediis sæpe curatur levis excoriatio. Datur etiam commodè syr. de papauere, aut diacodium Gal. cum volumus compescere defluxionem, vel detergere. Habet enim saponem & gly. quæ detergent. Si propter immodicam siccitatem exsiccata sit, iisdem remediis erit utendum, nimirum frigidis, & humidis, ut syr. viol. gallinæ iusculo, aut pulli frigide sumpto.

Veneni curatio.

Venenum si sumptum est, iuscula sint pingua. Si affe-

*Abilioso
humore
excoriatio.*

ctus sic citra affluxum materiæ, potest caliditas, & siccitas ad motis castigari, vt effundendo collum oleo ros. si calor vrgeat, viol. si siccitas. Lac etiam tum sumptū, tum ad motum confert. Excoriatio à veneno si sit facta, aut bilioso humore à ventriculo descendente, neque aliud symptoma adfit, dentur quæ fluxu bilis acrimoniam extinguunt, & citra morsum detergent, quale est hoc.

R. gly. ras 3. ij. pass. 3. ss. sebest. iuiubarum, prun. an. pa. xx. (ficus non conueniunt, quia nimis detergent, & aliquid habent acrimonie à lacte suo) tamarind. elect. 3. ij. qua uor semi. frig. maior. & semin. mal. ana 3. ij. florum violarum p. j. fiat decoctio. De qua cap. 4. quoque die 3. iij. cum 3. ij. syru. ros. laxat. & de reliquo capiat assidue lambendo. Si bilis post eas euacuationes adhuc in ventriculo restet, quod ex amarore oris & nausea nosces, de orsum trahenda est, ne partem affectam exasperet magis. Idem faciendum est in acri fluxione. Si defluxio sit à pituita falsa, aliquid erit adficiendum, quod pituitam ducat. Notandum est tum medicamenta, tum alimenta liquida, & actu frigida, vel saltem temperata esse danda, fugienda verò acria omnia, falsa, amara, acetosa. Si vlcerus fuerit profundius, magis tergendum & siccandum est. Medicamenta eligantur, quæ circa magnam caliditatem siccent, & non habeant venenatam qualitatem, & quæ non sint ingrato sapore, nec multum medicamentosa: ob id metallica omnia sunt reiicienda, excepto alumine. Bolus ar. conuenit, terra sigillata, farina hordei, orobi, cicerum, fabarum, radix panacis, cortex thuris, corallus, sanguis draconis, pyra, cotonea, quibus adiungenda sunt quædam viscida, vt parti adhæreant. Vfus suffituum non est improbandus, quamuis videatur minus conferre, quam in vlceribus trachæ arteriæ, vel pulmonis. Sed fieri non potest, quin aliquid etiam gulam intret, dum in arteriam trahitur. Suffitus esto, qualem supra descripsimus cap. de catarrho.

De difficultate deglutiendi.

Quibusdam œsophagus dicitur musculus, quod Gal. refert 2. de motu muscul. quare & eum resolui posse dicunt. Est autem via oblonga & angusta ab ore in ventriculum ex duabus tunicis constans. Is interdum satis contra-

contrahi non potest, vt cibum propellat in ventriculum ac maximè potum, qui consistentiam non habet. Nam cibum facilius potest transmittere. Aliquando videtur cibus velut in lagenam dimitti. Vtrunque signum est pessimum in febribus acutis: siue propter imbecillitatem, siue propter nimiam dilatationem, non possint deglutire ægri. Cum eò peruenerunt, ferè sunt deplorati, & solis prognosticis relinquendi. Morbus hic quandoque fit à defluxione à capite, quod deprehenditur si vel capitis grauitas, vel tensio colli, vel defluxio in aliquam oris partem præcesserit. Vacuato capite, pars ægra siccanda *Pilula capit. Vacu-*
est. Vacuatur autem pil. de hiera, elephanginis ante ci-
bum. Postea imperantur syr. calfac. & siccantes, vt de *antes.*
hyss. de stechad. mel. ros. antho. Abstinentum ab aperiē *Syr. conue-*
nientibus, & de bizantiis, de quinque radic. quia nimis atte- *nientes.*
nuando, fluxionem augent, quod in omnibus morbis à *Cautione.*
defluxione, semper est obseruandum. Adiungimus herbas, vel decoct. herbarum similium, vt chamepith herbam paralyf. betonicam, saluiam, & similes. Affigendæ sunt cucurbitulæ ad euacuationem secundum longitudinem colli, & metaphreni in vtraque parte & maximè colli. Non est scarificandum, nisi pars affecta fuerit inflammata. Tunc enim post vniuersalem sanguinis missionem, licebit post admotas cucurbitulas scarificare, vt de angina diximus. In hoc autem morbo affiguntur magis, vt in partem affectam sanguis trahatur. Ad absorbendam nimiam illà humiditatem œsophagi, medicamenta partim admouentur, partim sumuntur. Admouentur quæ calfaciunt, & siccant, vt oleum nard. de costo, de pip. de lateribus & similia, quæ potius in lateribus colli admouenda sunt, quàm vel in anteriore, vel posteriore parte. Sic enim citius ad partem affectam perueniunt. Nos autem ol. de lilio imperamus, quantumuis & recentioribus & veteribus laudetur fæx liliorum. At veteres rectè suam faciem adhibuerunt Erant enim calida & sicca, quæ ad eius olei inspissationem ponebantur. Fæx ol. liliorum nunc nil aliud est, quàm partis aquosæ sedimentum, cui prorsus contraria est facultas ei, quam querimus. Inspissantur olea, conficiuntur vnguenta, parantur cataplasmata ex calidis & siccantibus hoc modo.

Admotæ.

Decoquantur herbæ vel radices, vel flores. Decocta admisceatur farina aliqua resiccans, vt hordeum si est inflammatio, farina orobi, fabarum, lolij. Additur aliquid cal. aro. vel spicæ, vel scœnanthos, macis, nucis mos. cy. per. garyoph. & parantur inde cataplasmata. Vtile est etiam addere guttas aliquot aceri ad penetrationem.

R. rad. enulæ camp. ʒ. ij. beth. saluæ, chamep. la. uend. puleg. an. M. j. si. decoct. pistentur, & per ceraceum passentur. Post incorporentur farinæ fabarum & orobi ana ʒ. ij. farinæ lolij ʒ. j. misce. fiat cataplasma. Non sunt addenda ol. vel adipēs, nisi sit aliquid ex prædictis calidis. Optimum est remedium ex ol. ac stercore, vel nido,

*Assumen-
da.*

*Confectio-
nes.*

vel cineribus hyrundinum vt in angina, in quâ olea relaxantia conueniunt, hic verò astringentia modicè, & siccan. Sumuntur per os illæ compositiones magnæ. multum antiquæ, vt theriaca, mythrid. aurea alexand. quæ omnia siccant, & nullo modo refrigerant, & incrassant, si antidota hæc vetusta sint, sin recentia, refrigerant, & incrassant, eoque nomine in hoc morbo fugienda sunt, nisi fortè tanto impetu flueret humor, vt astrictione sit

Conserua.

opus. Datur cōserua anthos, stech saluæ & enulæ camp. confectio aro. ros. diamosci, diagal. & similes. Sed quia hæc in ventriculum delabuntur, magis faciunt ad resiccationem materiæ antecedentis, quam coniunctæ. Admiscenda sunt viscida & lenta, quæ suo lentore adhærescant, & sua mora siccant, vt in affectibus trachæ arteriæ fieri solet. Talia enim miscentur, vt dū in cœsophago diutius morantur, penetrent in asperam arteriam, vt sic accipiamus cinerem stercoreis canis aut priapi tauri, aut hyrundinum, aut ossium, quæ valent in hoc affectu, & in angina, quia siccant & discutunt. Addimus mel, quia detegit & suo lentore adhæret, atque saporis est gratissimi, aut syr. conser. cortic. citri, syr. de stech. syr. conser. cortic. zizib. Sic fiet præstantissimum remedium.

Pulueres.

R. cine. hyrundinum, vel priapi tauri, vel oss. ʒ. iij. rad. ireos vener. ʒ. j. pulue. ros. nouellæ, aut diambræ, diagal. an. ʒ. ij. mell. anth. q. s. Si autem pituita sit multum viscida, mell. scill. aut oxymel miscendum erit, fiat vt lohot, quo vtatur lambendo. Cauendum à potu valde frigido, & valde calido. Nonnulli sunt, qui potum & non cibum

bum, alij cibum & non potum degluriunt. Nam vinū ob tenuitatem penetrat ad secundam tunicam, quæ quodāmodo est diuulsa ab interna. Sed non propter id variat curādi ratio. Nonnunquam post frequentes vomitiones & repletiones oesophagi pars inferior, & os ventriculi sic relaxantur, vt cibus contineri non possit. Huius verò mali alia sunt auxilia, quàm superioris, nempe astringentia tum foris, admotā tum intus sumpta, vt cum post alios cibos carnem cydoniorum, vel astringentia alia sumimus ori grata, aut frigidā bibimus. Extrinsecus adhibentur frigida astringentia cum calidis quibuldam, tum vt ad partem affectā penetrent, tum quia calore perpetuò ventriculū iuuant. Medicamēta in hoc morbo, & in inflammatione oris vētriculi eodem loco admoventur, nempe circa 13. vertebram ad latus sinistrum.

R. cortic. malorum granat. myrtil. seminis vērber. coriand. ana ʒ. ij. acatiæ corall. rub. an. ʒ. j. hypocistidos, ladani, an. ʒ. ss. picæ nardi. cyperi, gatioph. an. ʒ. j. ol. cydoniorum, vel myrthini, vel ol. ompha. ʒ. ij. ceræ albæ & aceti parum, fiat linimentum : vngatur pars exterior, si affectus sit in ore ventriculi. Poterit vngi pars anterior similiter. Poterit etiam fieri ex medicamentis eiusdem facultaris cataplasma.

Deo is Ventriculi inflammatione.

CAP. II.

INflamatur os ventriculi cum maximo dolore ob eius exactiorem sensum. Quare primū dolor sedandus est. Cataplasma in hunc vsum paratur.

R. farinæ hordei ʒ. vj. flor. chamæ. melil. & ros. ana p. ss. seminis coriand. sandalorum omnium an. ʒ. iij. spicæ nardi ʒ. ss. ol. ros. ʒ. iij. ol. chamæ & absynth. an. ʒ. j. misce fiat catapl. vel vnguentū addita pauca cera. Clyster molliens & detergens detur ad reuulsionem. Catartica per os sumpta nocent, quia ad partem affectā trahunt excrementa. In declinatione post doloris sedationem licet vti mitioribus: vt cassia, catholicone, rhab. Si est plenitudo, & vires valent, sanguis detrahendus est, maximè in phlegmonibus internis. Sed quia hunc affectum syncope, & virium imbecillitas, ob vehementem dolorem sæpe sequitur, in sanguinis missione summa cautio adhibenda est. Nam præcipuus scopus est in eo remedij ge-

nere, virium robur. Præscribuntur potiones, & confectio cordiales, ut in affectibus cordis, ut

Potio cordial.

℞. conf. viol. & bugl. an. ʒ. j. conferuæ ros. corti. citri conditi an. ʒ. ij. pul. diamarg. frig. ʒ. j. diarrhod. abb. ʒ. ʒ. coral. rub. ʒ. j. sacch. ros. tabul. q. s. fiat conditum, & in hoc morbi progressu. Nam circa initia confer. ros. & aliorum astring. dosis est augenda, minuenda verò viol.

Syr. refri.

ut magis roboret medicamentum, & repellat. Viles sunt syrupi refrigerantes, ut syrup. de ros. siccis, cydoniorum myrtill. de succo agrestæ, de berber. Et hoc in principio cum aqua ros. cuspid. ros. end. cichor. addendo parum aquæ absynth. vel mentæ, cum pulu. diarrh. abb. ʒ. j. In processu dentur syrupi minus astringentes, & magis refrigerantes. In magno & acri calore addimus syru. viol. de nymph. portulaca, end. simpl. Ab aliis syrupis abstinemus. Inflammatione curata pars astringentibus curetur, & iisdem medicamentis, quibus paulò superius in dilatatione oris ventriculi vti sumus.

De Ventriculi imbecillitate. C A P. III.

Ventriculus varios morbos patitur, & symptomata varia, quæ à diversis morbis nascuntur. Morbi autem sunt intemperies calida, frigida, humida, & sicca sine materia, vel cum materia, eaq; pituitosa, biliosa, vel melancholica. Quare si quis velit symptomatis occurrere, morbos agnoscat oportet, quod ex dolore, functione laesa, & alui recrementis dignoscetur. Difficilius verò dignoscuntur, quàm curantur. Intemperaturæ sine materia raro fiunt. Quod si fiant, diu sine ea esse non possunt. Nam omnis intemperies ventriculi nata est coctionem impedire. Quod si frigida intemperies vel sicca præsens sit, cruditatem faciunt, à qua multa pituita asseruatur in ventriculo. Si calida, vel cibos vitit, vel corrumpit, vel aliam cruditatem facit. Dignoscitur intemperies frigida ructibus acidis, ut calida ex nidorulentis, & sitis, quanquam sitis magis siccitatem significat. Frigidam intemperiem sequitur appetentia, & coctionis tarditas. Humida autem intemperies fluctuationem, & sitis inappetentiam, & coctionis tarditatem facit. Sicca tardam etiam coctionem facit. Nā quibus ventriculi siccitas adest, debilis est calor nativus. Potest esse ventriculi imbecillitas ex partis molitie,

Signa frigida.

Calida.

Humida.

litie, & nimia laxitate, citra intemperiem aliam, vel citra materiam, quod patet ex Gal. verbis lib. 1. ad Glauc. Vbi ait syncopen fieri ab imbecillitate ventriculi, quā solis curat astringentibus appositis supra ventriculum. Nam eodem in loco postea curat imbecillitatem, si coniuncta sit imbecillitati, frig. humiditati, vel siccitati. Idque cum materia, aut sine materia. Nos igitur incipiemus ab ea *Curatio* imbecillitate, quæ dignoscitur à functione læsa, nulla imbecilli- manifesta alicuius intemperiei nota alia apparente. Fit *tatio sine* itaque hæc affectio post multas comestationes, quæ ven- manifesta triculum multum distenderunt, aut quia ventriculus est *intēperie.*

suapte natura magis laxus, aut maior, quàm oporteat, & quia vsus est nimis relaxantibus. Omnes istæ causæ distentionem ventriculi faciunt, quæ facit vt minùs bene cibos amplectatur. Quod si non facit, non bene concoquit. Erunt igitur apponenda medicamenta in primis qualitatibus temperata, & astringentia. Quod si minùs profint, sunt augenda frigida astringentia, quia magis astringunt quàm calida, & ad intra repellendo calorem excitare possunt. Post cibum verò assumenda quæ per partem superiorem ventriculum possunt constringere, *Pul. con-* quales sunt pul. qui parantur ex aliquibus astringenti- *stringētes* bus, vt ros. cinamomo crasso, cortice cyperi, corallo & aliis, vt pul. diacytonitem sine speciebus. Sed quia ventriculi infrigidatio magis periculosa est, quàm calfactio, admiscemus aliqua constringentia calida, vt galangam, cyperum, & cynamomum. Vel imperamus, vt accipiant à cibo fructus astringentes, vt mala cotonea, pyra cocta vel condita. Diuitibus paramus condita ex myro- *Fructus* bal. cortice citri cum prædictis pulueribus, vt *astringē-*

et carniū cydoniorum conditorum cum saccharo *Condītum.* 3. ij. corti. citri conditi 3. j. myrobal. chebul. 3. j. abluantur cum vino styptico, & contundantur diligenter, quibus adde pulueris diacytonitem sine speciebus 3. ij. coralli rub. 3. j. ros. rub. cyperi, galang. crassi. an. 3. j. sacch. ros. rab. q. s. fiat conditum, capiat post pastum, nihil superbibendo. Extrinsecus apponuntur vnguenta ex oleo myr- *Vnguenta.* tino, & cydoniorum pauca quantitate ol. de absynth. vel nardino, quibus si addatur acetum ros. efficacius erit, & citius penetrabit. Potest fieri sinapizatio supra il-

lam irrigationem ex ol ad maiorem constrictionem, vt

Ad calidam intemperiem.

R. myrrill. mastich. nucis cupress. florum labruscæ & ros. rub. & cortic. citri & balaustiorum an. 3. j. sandal. lorum & coral. rub. 3. ss. garyoph. & spicæ nardi an. 3. ss. fiat pul. tenuiss qui inspergatur ab vnctione. Hæc eadem remedia vtilia erunt in intemperie calida, adauctis quibusdam refrigerantibus, vt si loco conditi fiat opiata, cui addatur pul. tria sandal. & diamarg frig. aut diatrag. frig. & detur tribus horis antepastum, superbibendo parum aquæ cichor. vel end. vel cisternæ. Parantur etiam aliæ ex conseruis refrigerantibus, vt ex conserua ros. viol. in minori quantitate, aut florum cichor. cum pulueribus prædictis, vt

R. conf. ros 3. j. cōf. flor. cichor. & nenuph. an. 3. ss. pul. tria 3. ij. diatrag. frig. 3. j. ss. diamar. frig. 3. j. cum syrup. end. simpl. fiat opiata. Nec erit præter institutum addere conseruam caulium, lactucæ (vocant vulgò *gorged' Auge*) & carnium cucurbitæ cōditarum. Refrigerant enim, & ventriculo & palato gratissima sunt medicamenta, vel abluantur in aqua frigida. Per duas horas antepastum ea comedant superbibendo parum aquæ.

Curatio frigida intemperiei.

Confectiones calfacientes.

Ad frigidam intemperiem valent vina generosa & antiqua præsumpta, duabus aut tribus horis antepastum, vel vinum illud hippocraticum, vel cui addita sint piperis grana aliquot. Confectio aro. ros. diagala. de cinamomo, ros. nouellæ. pliris sarcoti, diamosci, diambæ, & diarrhod. Danda est loco diatrium pipereon, vel diospoliticum, quia non minus calfaciunt, & ventriculo grata sunt magis. Dantur in forma opiata vel in tabulis. Zinziber conditum sufficienter calfacit. Cortex citri paulò minus: caro citri adhuc moderatè magis. Conseruæ anthos & stechad. satis calfaciunt, ob id opatis addi possunt. Augent etiam molem medicamenti, & plures partes ventriculi contingunt, cum maior est moles. Superbibant aquam absynthij, mentæ, hyss. & cum vino generoso. Syr. de absynth. de menta satis sufficienter calfaciunt ventriculū refrigeratum, & magis conueniunt, quam alij syr. propterea quòd leuiter astringunt ventriculū, quæ astrictio semper est huic parti necessaria.

Conserua calfacien.

Aqua calfac.

Curatio siccae intemperiei.

Intemperies sicca difficillimè curatur, vt omnes alij morbi. Curatur autem vsu lactis, quia humectat & nutrit bene, vsu vini non antiqui, & bene diluti, iusculis pinguibus ex capis, & gallinis, vel ex carne vituli lactantis, vel hoedi, quibus iusculis addendum est parum vini ad faciliorem distributionem, & concoctionem. Cremor ptisanæ paratæ cum ol. amygdal. dulc. vel cum axungia gallinæ, vel tota ptisana vino conspersa non parum conducunt. In iusculis carnis decoqui debent folia lactuæ, borrag. viol. Ad extra illinenda est ventriculi regio inferior (ne os ventriculi contingatur) ex oleis *Olea.* frequentibus, vt,

℞. ol. amygd. dulc. viol. an. ʒ. j. vngatur venter, vel addantur axung. gallinæ & anatis, & fiat linimentum, quibus adde, tempore inunctionis, guttas vini ad penetrationem. Quod si verearis nimiam relaxationem, adde parum ol. ros. vel cydoniorum. Intus autem dari possunt medicamenta aliqua, quæ humectent, vt syr. viol. de cucurbita cum aquis, bugl. viol. lact. &c. Aqua carnis porcellorum, vitulorum distillatæ magis, quam in alia affectione hîc conuenit, nisi diutius seruata sit & iam putrescat. Eius verò magnam quantitatem assumere oportet, semper addendo parum vini oligophori. Medicamenta pauca sunt, quæ habent vim humectandi substantificæ. Et in intemperie talia oportet esse remedia, qui cū hac affectione, semper adiuncta est totius corporis atrophia. Si tamen substantificam materiam non restituant, multa sunt, quæ magnam illam exiccationem retardant, & partes irrorant, vt semina illa frigida maiora in ptisana apposita, non rancida, sed recenter mundata. Item caro caulium, lactuæ, & cucurbitæ humectant. Quare si quis opiatam velit conficere, ex his fieri posset.

℞. caulium, lactuæ conditorum cum saccharo li. *Opiata.* quido ʒ. ij. carnis cucurbitæ eodem modo conditæ, ʒ. j. conferuæ radic. buglossi & viol. ana ʒ. ʒ. quatuor seminum frigidorum maiorum minutim incisorum ʒ. j. cinamomi scrupul. ij. (additur autem cinamomum ad penetrationem, & ne hæc humidiora flatus gignant, aut aliud simile præditum nonnulla vi adstringente, &

tenuitate partium (cum syr. viol. fiat opiata, de qua capiatur mane, & superbibatur parum vini bene diluti.

Victus ratio.

Balnea ex aqua tepida vtilissima erunt. Parum est exercendum corpus. Parum & frequenter comedendum. Multum dormiendum. Et quia propter usum istorum humidorum, frequenter multa gignuntur recrementa: satis erit iniicere clysterem, aut dare cassiam dissolutam in brodio pulli aut lacte asinae, vel dare mannam in eodem lacte. Sed accipienda est magna quantitas lactis, ut facilius pertorber ventrem, & laxet. Id faciendum per magna interualla, ut semel in mense. Nam si in ventriculo remorentur talia recrementa, perfectam concoctionem, & humectationem impediunt. Aqua carnis, de qua supra memini, paranda est ex porcellis & vitulis, & gallinis. Lac autem debet esse muliebre, aut ouile, & non ex asina, ut practici solent facere. Nam asinae lac plus feri habet quam alterius substantiae, & ad deterfionem magis quam ad nutritionem phthificis datur. Quod si aliud lac non reperiatur, vaccinum erit usurpandum, vel asinae nutritae in otio, herbis recentibus, ut hordeo & secali. Hordeum sit in aqua maceratum, & extortum, auena macerata & decocta etiam dari poterit. Tunc enim lac redditur crassius, minus serosum & laxans. Pisces saxatiles dare non est praeter rationem, & testudines aquaticas, & postea nemorales, quarum caro durior & siccior est, quam aquaticarum. Harum vero tenerior, & coctu facilior. Quare in hoc affectu magis conuenit, & omnia coctu facilia, quia concoctio in hac affectione difficilis est. Pisces meliores erunt, si in iure carnis decoquantur, vel ex iure albo sine porro & anetho sed ex aqua & ol. tantum. Succus carnis testiculi gallorum, inter praestantissima alimenta numeratur, ut & vitelli ouorum recentes, & tremuli. Cerebrum porci laudat Galenus, quod tamen difficilioris est concoctionis. Ego mallem cerebrum auium dare, quod concoquitur facilius aut cerebrum piscium, quia sunt substantia minus densa. Nuclei pinearum in lacte macerati humectant, & bene nutriunt, cuius rei argumento est, quod semen multum augent. Amygdalae recentes bene

Nuclei pinearum.

benè masticatæ ventriculū humectant. Vux recentes & suspensæ, & passæ non sunt prohibendæ, neque ficus etiam recentes. Facile enim concoquantur & saginant corpus. Argumento est, quod qui ficus & yuas edunt, visuntur pingues, sed ea pinguedo minùs durat, tamen propter id prohiberi non debent. Nam illa etsi tenuis & facilis humectatio, parat corpus ad solidiorem nutritionem. Eadem hic conveniunt, quæ in hæctica.

Curatio humida intemperies.

Humida intemperies faciliùs curatur, quàm sicca, quia partes humidæ faciliùs vim medicamentorū suscipiunt, quàm siccæ. Siccæ enim propterea quod partes cōciderunt, & densiores factæ sunt, nō facile cedūt medicamentis. Adde quod medicamenta humida, nō multum agunt neque multum resistunt. Curabitur humida ^{Vitæ} intemperies inedia, aut victu tenuiore, & resiccante, ut si abstineat à multo potu vini diluti, & potiùs utatur vino generoso meracioni, vel posca, vel oxymel, aut hydromel: parum coctis, & multum dilutis, ut magis detergant & minùs nutrant. Abstineant à iusculis. Utantur carnibus, & piscibus salsis, & assis. Pane biscocto cum multo sale vescantur. Frequenter absumant pilulas de aro. vel de hiera. Capiant cineres ex cornu cerui vel intestinorum gallinæ, vel priapi tauri, vel coralli vsti, vel trociscos de viperis, vel cineres viperarum. Ex his conficiatur pul. ut cap. de suffusione, vel conficiatur magis determinatus ventriculo, & intestinis, ut.

R. cineris intestinorum gall. ʒ. iij. cornu cerui, & coralli rub. vstorum ana ʒ. j. ciner. hyrundinum vel viperarum ʒ. ss. vel si utrunq; reperiat ana ʒ. ij. Quod si nō reperiat, prætermitti possunt. Galang. cinamomi pip. ana ʒ. j. sacch. candi ad medium omnium fiat pul. Potest etiam addi sal assum in furno loco sacchari, & uti pul. isto pro condimento alimenterum vel amotis odoratis sale vsto, & cinere intestinorum gallinæ tantum. Si paratur cum sacch. capiat ante pastū tribus horis cochlear j. nihil superbibendo. Istis pulueribus addi possunt pulveres parati ex fragmentis lapidum preciosorum, & qui vocantur de gemmis, & de margaritis, diarrho. diagalanga, aro. ros. vel ex istis & aliis opiata facere, sic.

Opiata.

*Empla-
stra.*

℞. cortic. citri conditi in forma sicca ʒ. j. confer. acon-
vulg. vel capill. ven. flor. anthos, vel saluæ ʒ. ss. conf. aro.
rol. & diamarg. frig. ana ʒ. ij. cineris intestinorum gal-
linæ ʒ. j. cum syr. de menta, fiat opiata, capiat mane ad
quantitatem fabæ, superbibendo parum vini antiqui
generosi diluti cum aqua absynthij. Supra ventriculum
emplastra magis siccant, quàm vnguenta, vt empla-
strum de maltiche, ceratum stomach. Gal. empl. diui-
num. Nec erit. disconueniens emplastrum de palma,
modò addatur aliquid odoratum, vt spica, vel galan-
ga. Vel si maceretur cum ol. nardino, vel de absynthio
& potentissimè exsiccabunt, nec ventriculi robur dei-
cient, cum astringendi vim habeant, & calfaciendi ob
medicamenta odorata addita. Corpus est diligenter
exercendum, ieiunandum, dormiendum sine cœna.

Curatio intemperiei cum materia.

*Vomitum
biliosum.*

Ventriculi intemperies, cal. frig. humid. & sicca cum
materia, eodem, quo supra, modo curatur, nisi quòd fre-
quentius vrimur pil. vel syrup. vel pulueribus laxantibus
humores redundantes, qui magna ex parte sunt, bilis,
pituita, & aliquando melancholia, sed rarò. Euacuantur
autem vomitu, si nihil prohibeat, vt affectus thoracis,
aut corporis constitutio. Acibo facilior est vomitus, an-
te cibum plus materiæ vacuatur. Si bilis vacuanda, post
iucula multa, vel post potationem liberaliorem prouo-
candus est vomitus. Nam bilis, vt oleū, his supernatat, &
ob id facilius euacuatur. Adde quòd acrimonia eius
tēperatur mixtione harū potionū. Datur. syr. viol. cum
aqua tepida, vel iusculū pingue sine sale, aut decoctum
betæ, cū ol. viol. vel cōmum, vel amygdalarum. Si autem
pituita euacuanda sit, manè ante cibum euacuetur, quia
pituita semper est in maiori quantitate, quàm bili, & in
fundo ventriculi, magis hæret. Ob id vomenda ante
cibum. Vel si lenta sit & nimis hæreat, syr. acetos. simpl.
dilutus aqua, vel decoctionis betarum, vel parū agar vel
asari propinadum erit, prius relaxata regione ventriculi,
oleo liliorum, vel amygd. inuncto, aut immisso digito,
aut penna oleo intincta. Quòd si fiat post corporis agi-
tationem, vel frictionē super ventriculū, in gyrum, faci-
lius & plus voment. Pituita pilulis de aro. aut de hiera

*Vomitum
pituita.*

cum agar. euacuanda sine aliquibus astringentibus. Bilis autem rhab. infuso syr. ros. & aliis mitioribus remediis purgantibus bilem leuissima medicamenta ob duas rationes sunt usurpanda, tum quia materia è longinquo non est vacuanda, & ventriculus non est vexandus fortioribus. Clysteres ad id multum faciunt, sed acres esse oportet, vt ex altioribus intestinis etiam euacuent. *Clysteres.* Hu- *Qui de-* mor peccans dignoscitur ex oris sapore, vt si amarus sit, *gnosce-* bilem significat puram: si salus, bilem & pituitam per- *humor &* mixtam: si acidus, pituitam & atram bilem: si insipidus, *trisculi.* pituitam aqueam, vel dulcem Id melius deprehenditur ex vomitu. Atra bilis commodissime euacuabitur decocto polyp. vel senæ, vel epith. decoctis in iure galli antiqui, vel rure piscium saxatiliu, vel decocto mercurialis. Si sint præscribendi syr. vel ad concoctionem, vel *syr. ad* ad alterationem, ad bilem sufficit syr. end. simpl. vel de *bilem.* absynth. cum aqua endiu. (quia non est magna caliditas ventriculi) vel syr. de cichor. sine rhab. aut syr. compos. cum rhab. addito in tanta quantitate, in quanta additur syr. de cichor. vel syr. ros. cum volumus euacuare, aut bilem detergere. Ad pituitam detergendam sufficit *Syr. ad pi-* hydromel, vel cremor hordei cum melle, aut oxymeli- *tuitam.* te. Si pituita incidenda & detergenda, syr. aceto. simpl. aut compos. syr. de bizantiis, & similes, leuiter incidentes, attenuantes, & detergentes conueniunt.

De ventriculi inflatione. CAP. IIII.

Inflatio ventriculi symptoma est, quod sequitur vitiatam concoctionem, & est vitiosa concoctio à causa frigida vel humida. Nam inflatio ventriculi fit à multis flatibus, qui solent fieri à debili calore, tanquam à causa efficiente ab alimentis flatulentis, & humidis, vel à pituitosis excrementis. Ergo qui vult huic symptomati mederi, auferat causas, nempe pituitam illam medicamentis pituitam deiciētibus & leuiter laxantibus, auferatur intemperies, & augeatur calor naturalis diminutus. Optimum erit igitur imperare pilul. de hiera, & de *pilula.* aromatibus, quæ utrunque faciunt, scilicet leuiter purgant, & calorem ventriculo suppeditant. Deinde si quis *Syr. conco-* velit illam pituitam coquere, & ventriculum corrob- *quentes.* rare, id fiet syr. vt syr. de menta, syrup. conseruationis

cortic. citri, syr. de stechade in pauca quantitate cum aliis quibusdam temperatis Mel. anthos. cum aquis hyss. mentæ, beth. & absynthij (quæ minus astringit, quam syr. vel decoctum herbæ. Ob id cum syr. attenuantibus, & detergentibus dari potest, non autem decoctum, vt prohibuit Gal.) vel fiat talis syr. qui tria præstabit, causam materialem expulsionis præparabit, efficientem minuere, & flatus discutiet, qui sunt immediata causa inflationis. Parabitur igitur ex leuiter attenuantibus medicè calidis, & flatus discutientibus, vt,

R. cortic. citri ℥. j. galangæ maior ℥. ss. mentæ sicca, hyss. sicci, beto. sicca ana M. j. anisi foeni. ana. ℥. iij. flor. anth. & stechad. ana P. j. fiat decoctio ad ℔. j. In fine decoctionis adde vini albi optimi ℔. ss. sacch. ℔. j. clar. & aro. cum ℥. j. cinamomi, fiat syr. cap. ℥. iij. ante prædium & ante cenam duabus aut tribus horis. Rusticis poterit dari decoctum cymini, vel seseli cum menra, vel hyss. in vino decoctis. His obseruare oportet, quod herbæ sicca sunt vsurpandæ non humidæ; neque fructus dulces ponendi, quia flatus gignunt talia. Additur vitium ad attenuandum & calfaciendum. Tertio quoque die capiat ℥. j. pilularum supradictarum in exitu lecti, deinde redeat ad syrup. vel dentur clysteres flatus discutientes, quorum formulam habes in libro nostro de componendis medicamentis. In talibus clysteribus parum apt nil olei ponendum est, nisi summè discutiat, vt ol. rutaceum. Ad extrâ ponatur emplastrum magnum supra totum ventrem, de baccis lauri, vel emplastrum stomachicū Gal. vel emplastra resiccantia & astringentia, additis seminib. calidis maioribus, & sulphure. Nam ista emplastra constriquentia prohibent illam magnam dilatationem ventriculi, & sic fortius flatus, vel supra vel infra trahuntur. Fiunt ex emplastro pro matrice, de mastice & cōtra rupturam. Addimus semina cumini, seseli, apij, carui, galangam, cyperū, & similia odorata, vt cunctæ astringentia, nisi dolor id prohibeat. Tunc enim ratione doloris, aliis discutientibus, & aliis vt cunque relaxantibus est vtendū. Sed si sine dolore fit, constructio adaugeri debet. Nam partes, quæ semel distentæ sunt, aut propter distentionem laxæ, non redeunt ad pristinā formam,

*Clyster
discuties.*

*Empla-
stra.*

nam, nisi vel fascia, vel alio modo retineantur compressa. Ob id in huiusmodi affectibus solemus imperare post aliquam euacuationem, & discussionem, vt regionem ventriculi sensim & leuiter comprimant, & quotidie magis ac magis constringant. Id commodissime fiet fascia supra emplastrum apposita. Opiata præscripta ad intemperiem frigidam, & pulueres vtilis sunt, & ad intemperiem humidam præscripti, vt & opiatæ. Abstinere a multo potu, a multis iusculis, leguminibus, & oleribus nimis dulcibus, quia talia flatus gignunt.

De ventriculi dolore.

C A P. V.

Dolor ventriculi à flatibus nimis distendentibus, vel à bile acri, vel à pituita multa fit, raro sine materia. Quare ad dolorem auferendum, recurrere oportet ad ea, quæ dicta sunt de intemperie ventriculi & inflatione eiusdem. Et ad præsentis doloris mitigationem, quæ est cum plenitudine, vel recrementorum, vel alimètorum, imperanda est vomitio, vt supra dictum est pro natura humoris. Deinde clysteribus retrahendum ad partem inferiorem. Supra partem anodyna erunt apponenda, vt post veram caliditatem à compressione & plenitudine alimètorum, qualia sunt ol. cham. anethinum, nard. Vel fiat forus, si à materia flatulenta fiat. Quod si à bile, post vomitionem optimum esset dare medicamen. bilem detergens, & ad inferiorem partem deducens, vt syr. ros. lax. cum deco. hord. vel aqua end. Nimis astringentia vitanda sunt, vt rhab. nisi in infusione aut decoct. ponatur. Quod si dolor vehementissimus esset, vel suspicio de aliqua materia venenosa, aut medic. venenoso assumpto, theriacam recetem dare summo opere proderit. Dolores ventriculi vehementissimi non fiunt, nisi à materia: modici & intemperati ab intemperaturis maximis fieri possunt. Quare diligenter animaduertere oportet, à qua materia exciretur, quod cognosci poterit, per ructus, vomitus, & alia signa superioribus capitibus prædicta. Qui dolent à cibo, magis à pituita, & multitudine laborant. Qui ante cibum, vel à bile, vel ab intemperie fit. Quod si cibo ingesto melius habeant, argumento erit, vel flatus in inferiorem partem detrusos fuisse, si pauci fuerint (nam multi suspendunt cibum) vel cibum

Vomitio.

Clyster.

Anodyna.

*Curatio
doloris à
bile.*

*Signa do-
loris.*

prohibere, ne bilis os vetriculi mordeat. Amaritudo oris & morfus vetriculi bilem etiam indicabunt. Intentio & remissio appetentiæ, bilem distinguunt ab acida pituita.

Distinctio Hæc sua aciditate partem superiorem vetriculi morde, *pituita a* & vellicat, atque appetentiam auget, bilis verò eam mi- *cida à bi-* nuit, & nauseam & morsum facit. His distinctis remedia *le.* sunt petenda ab affectibus supra enumeratis. Quòd si dolor fiat à nimio sensu, vt qui facile in animi defectio- nem incidunt, non erit præter rationem imperare vsum theriacæ recentis, factis prius quibusdam euacuationibus per clysteres & pilulas prædictas.

De Nausæa. CAP. VI.

Nausea appetitus est vomitus sine effectu, quod fieri solet, vel ob obiectum nobis parum gratum, vel ob alimenta putrida, & male olentia, quæ assumere ventriculus refugit, vel obcrementa pauca tunicis vetriculi adhærentia, vel intra tunicas collecta. Quare si nausea à viscidis humoribus adhærentibus fiat, oxymel dandum, vel syru. acetosus. Si à bile, detergentia sola sufficiunt vt decoctum hordei cum sacch. vel cum syr. endi. simpl. vel addèdo parum succi ros. diluti aqua tepida, vel magnam copiam decoctionis pulli cum multo sacchar. assumere, & postea digito in os immisso vomitum prouocare. Bilis facile euacuatur, & detergetur. Pituita magis contumax est. Quare decoctum rapha. cum syru. acet. dandum, vel cum decoctione radicum, & ol. vel butyr. rancidis, vt vomant facilius, sed magna quantitas est propinanda, vel vinum, vel brodium multum est assumendum, vt eorum copia ventriculus stimuletur ad vomitionem. Deinde pilulæ dandæ de hiera, de arob. cum aga. formandæ cum oxymel. Dandæ verò manè sunt, vt detur decoctum asa- ri pro vomitu ante vsum pilularum, deinde ventriculum corroborare oportet. Nam vomitum prouocant, ventri- culum perturbant.

De Vomitu. CAP. VII.

Vomitio fit, quando ventriculus cibum non potest continere, aut cum irritatur àcrementis. Non enim continet, vel quia alimenta sunt plura, quàm continere possit, vt ebris accidit, aut quia alimèta nimis sunt pingua, & leuia, aut ordine suo non assumuntur, vt si quis

quis assumat magnā quantitatem incisorum, qualia sunt
 patillorū caro, aut quæ vulgo (*paster, en por*) dicuntur, vel
 si liquida multa ingerantur, post atringentia multa &
 dura, vel quia ventriculus plenus flatibus, alimētum sus-
 spensum in superiori parte cōtinent. Aut quia multa dul-
 cia supra alia sunt assumpta, vt pepones, ficus, cerasa, &
 omnia alia dulcia, vel quæ parantur cum multo oleo, la-
 cte, vel butyro. Vel si cum suspitione alimenta aliqua as-
 sumpta fuerint. Recrementorum autem vomitio fit, pro-
 pter humorum conturbationem, vt & alimentorum, vt *Qui vo-*
 post nauigationem, vectionē in curru a cibo, vel contur- *mitus in-*
 bationē medicamentorum laxantium, vel ob influxum *uandus est*
 humorum copiosum & repentiū ad ventriculum, vt *qui com-*
 in die accessionis, & in diebus decretoriis. Vomitus alij *pescendi.*
 sunt suppressendi, alij iuuandi. Vomitus omnes optimo-
 rum alimentorū, qui fiunt post alias vomitiones ob de-
 bilitatem retentionis, vel irritationem expultricis, com-
 pescendi sunt, vt si sanguis per vomitum reddatur. Aliæ
 omnes sunt iuuandæ, donec corpus sufficienter à recre-
 mentis fuerit mundatum. Regio enim illa est aptissima
 ad reicienda excremēta, quæ sunt collecta in superiore
 vetriculi regione. Ob id nauigatio illa & vectio, quæ vo-
 mitū excitant sæpe curant dolores vetriculi diuturnos,
 & contumaces. Neque etiam retinendi sunt vomitus in
 illis morbis, qui fiunt à plenitudine ventris, vt in colico,
 nephritico, aut arthritico doloribus. Aut cū diuertit
 ab inflammationibus inferioribus internis, vel etiā à supe-
 rioribus, vt in doloribus capitis, aurium, &c. modò non
 affecta sint collum aut partes thoracis. In talibus enim
 cōpescendus est. Retinenda autē retinentur ligaturis fa-
 ctis in partib. inferioribus, vel cucurbita magna in fun-
 do vetriculi apposita. Pars superior vetriculi constri-
 gēda est, inferior & intestinorum relaxāda. Constringe-
 tur autē medicamentis suprā enumeratis cap. de vetricu-
 li imbecillitate, citra vllam qualitatem manifestē pec-
 cantem. Et quia emplastra tardius operantur, vnguenta
 parāda sunt, vel linimēta, vel inunctiones, supra quæ pul-
 uerē inungimus, vt cap. præscripto monstratum est. Sed
 hic aceti maior quantitas addēda est. Inunctio debet es-
 se in principio calidis, in fine frigidis. Nā calida omnia,

*In quibus
 non est in-
 hibenda
 vomitus.*

& frigida constringunt, tepida relaxant. Et debent iniungi sine frictione multa, sed fouendo leuiter tantum. Nam omnis agitatio, aut motio circa os ventriculi vomitum prouocat, vel fiat ex succis herbarum hoc modo.

R. succi cydon. ʒ ij. succi pyr. sorbarum vel vuz acerbae, ʒ. j. aceti albi ros. ʒ. ij. agitentur simul, & cum pauca farina excipiantur & applicentur supra os ventriculi & à parte posteriore, & ab anteriore Vel istis succis addatur olea astringentia, & simul decoquantur ad mediam consumptionem succorum, & cera addita, fit linimentum. Post vnguenti confectionem potest addi succus aliquis astringens, vt cydoniorum, &c. quantum ebibere poterit, agitando in mortario, vel mouedo cum spatula palmea, aut ligno alio astringente. Illud enim diutius parti adhaerebit, nec tam cito siccabitur, ob oleum & ceram, quam quod prius dixi, ex farina & succis parandum. Nam succi ex decoctione multum de sua astringentia deperdunt. Istis

*Quibus
compescuit
vomitum.*

duobus vltimis sapissimè vomitionem maximam compescuimus. Alimus puerum per quindecim dies iusculis liquidis, adhibita cucurbitula supra ventriculum, donec cibus esset concoctus, quæ liquida alioqui non conueniunt. Sed ob tenuitatem & morbum, alia medicamenta assumere non poterit. Sunt ergo danda alimenta in vomitione, quæ spissa sint, & vt cunque viscida, vt ventriculo adhaereant, minime pinguis, ori grata & actu frigida. Id etiam obseruandum in medicamentis. Nam tepida semper vomitum prouocant. Quare in cholera, morbo,

*Præsentissimum
remedium.*

aut vomitu bilioso, & aliis, nisi in quibus os ventriculi est nimis refrigeratum, præsentissimum remedium est aquam frigidam post cibum assumptum ebibere, vel cochlear vnum succi cydoniorum, aut syr. cydon. aut frustum cydon. aut pyri acerbis deuorare, aut puluerem constringentem. Sed quando masticandum est, minus conuenit, quia morbus ille inter masticandum agitatur. Ob id debet à pastu quiescere, non loqui, neque tussire, si fieri potest, donec cibus in partem inferiorem descenderit. Pulueres, qui à cibo assumuntur, debent esse gratissimi, neque multum sacchari recipere (atque illud esse debet sacchari ros. tab.) aut quæ saporem vel odorem medicamentosum habent ingratis. Ob id pulueres parari ex corallo, gra-

lo, granis vuarum, cortic. citri, & aliis minùs odoratis, vt
 sorbis vel pyris exsiccatìs, & in puluerem redactis ma-
 gis laudantur. Quòd si ex conditis paretur, vt carne cy-
 doniorum, myrob. nucibus conditis, diligentissimè ab-
 lui debent in aqua cisternæ, & contundi diligentissimè,
 & pulueri corallorum permisceri. Si vomitio fiat ob fla- *Curatio*
 tus cibum suspendentes, dantur medicamenta præscri- *Vomitùs à*
 pta ad inflationem ventriculi ante cibum: & inunctio- *flatibus.*
 nes ad flatus discutiendos, supra totam regionem ven-
 triculi fiant, parte superiori intacta. Clysteres in omni *Clysteres.*
 vomitione vtilissimi sunt, si modò paucam quantitatem
 iniiciamus, neque fortiter laxantia aut olentia apponan-
 tur. Nam si multa quantitas iniiciatur, pars colli, quæ
 ventriculo incumbit, repletur, & fundus vetriculi com-
 primitur, & illa facultate, qua irritat expultricem inte-
 stinorum, vomitum prouocat, vt experientia in multis
 ostendit. Fiunt ergo clysteres ex emollientibus herbis,
 & seminibus discutientibus flatus, floribus bene deco-
 ctis, in quibus dissoluatur mel ros. aut viol. aut cass. aut
 succus mercurial. aut ciclæ, ol. chamæ. vt sic.

R. mal. cum rad. & bism. an. M. j. Mercur. ciclæ, an. M.
 j. anis. vel fœni. ʒ. j. vel ʒ. j. ʒ. flo. chæ. vel anth. vel melil.
 p. j. fiat decoct. in qua dissolue mel. conf. vel viol. ʒ. ij. suc-
 ci mer. ciclæ, an. ʒ. j. ol. cham. ʒ. iij. vel butyr. vel pingue.
 porci ʒ. iij. sumatur tatum ʒb. ʒ. decoctionis propter ra-
 tionem prædictam. His, qui vomunt, non sunt clysteres *Cautio.*
 fortes præscribendi, quia pauca sunt incrementa, & hæc
 sufficienter attrahendo diuertunt. Post vomitionem ló-
 gam, vel in ea vomitione, quæ alimenta retinere nō po-
 test, iniiciuntur clyst. ex decocto capi, sine sale, sine sacc.
 oleoq. sed cum paucò vino ad nutritionē. Danda est ma-
 gna quātitas horum, vt partem superiorem conscendat,
 sed neque maior, quàm vt possint retinere. Verùm cum
 inanita sunt intestina, rapiunt talem clysterē, & retinent
 ad sui nutritionem. In his optimū est anisum decoque-
 re, vt & flatus discutiat. Nam intestina inanita replentur
 aere: qui prohibet ingressum clysteris. Tales clysteres
 iniiciendi sunt toties, quoties cibū assumere per os sole-
 bant. Proderūt enim tribus modis. Primūm nutriendo,
 vt docuimus lib. de cōpositione medicam. Flatùs discuti-

tiendo, quia quando ventriculus nil assumit, motus ille concitationis ventriculi ad vomitum conquiescit, & in sese contrahitur ventriculus. In hac caussa prodest etiā cucurbita, supra vmbilicum cum multo igne apposita.

De vomitu sanguinis. CAP. VIII.

Vomitus sanguinis fit, quando vel per rupturam, vel per anastomosin venarum sanguis in ventriculum defluit, & à ventriculo vomitione reicitur. Quare si liquidus reddatur, statim compescendus Si refrigeratus & coagulatus, dissoluendus est, & cucuādus. Si ipso fluyente liquido magna sanguinis redundantia in toto corpore appareat, aut magnus sanguinis influxus in ventriculo, optimum erit sanguinem mittere è poplite, quia omnes venæ ventriculi à venis portæ oriuntur. Quod si hæmorrhoides prouocari possent, maior fieret diuersio, vel aperiantur venæ sinistri brachij: quia venæ ventriculi magnum habent consensum cum splene, & maxime si sanguis ater & tenuis fuerit, qualis esse solet, qui ad splenem à vena portæ defertur. vel si maluerit, à dextra parte (quia sanguis omnis primùm ab hepate euacuatur) non erit incommodum. Supra ventriculum ponenda sunt astringentia, qualia indicauimus in vomitu, scilicet, ex succis vnguenta. vel fots ex herbarum succis & aceto. Deinde bibere poscam oportet & post eius reiectionem accipere potionem sequentem.

℞. succi burf. pastor. ʒ. ij. aceti guttas iij. vel iiij. bibat statim. Idē fieri potest ex succo plantag. vel caudæ equinæ, vel lingue passerinæ. Deinde dentur portiones ex quibusdā astringentibus & emplasticis, vt orificia venarum obturentur, quale est albū oui fortiter agitatum, assumptum crudum, vel bolus ar. vel terra sigillata, vel de carabe. Si autē sanguis fuerit coagulatus, syr. acetos. simp. vel posca meracior danda. Postea quæ dissoluunt sanguinem coagulatum, vt carabe. pix. mumia, coagulum hœdi. Sed quia illa valde ingrata sunt. ob foetorem reiciuntur. Magis probo aquā nucum distillatam, in pauca quantitate cum syr. acetoso, vel aquam rubiæ maioris. Ista leuissima sufficiunt: quia natura satis excitatur ad expulsionem per vomitum, & fortiora nimis ventriculum agitando, venarum ora recludunt, & erit satis rhabarbarum

Vena se-
cin.

Vena po-
pli.

Topica.

Potiones
astringen.

rum cum syr. ros. laxa. dare, vt per inferiorem partē sanguis reiciatur, sine contentione magna. Post hæc repetenda sunt superius enumerata, quę constringendo officia venarum, sanguinem sistunt. Ligaturæ & cucurbitæ adhibitæ in inguinibus, sunt vtilissimæ. *Victus ratio.* Cibis conuenientissimus his, qui sanguinem vomunt, est amyllum coctum in iure pedum veruecis, & frigida actū, omnia danda sunt. Fiunt condita, quibus vtitur cum aqua bul- *Syrupi.* lita: vel syrup. frigidi & astringentes, vt syru. myrthinus, cydoniorum, de ros. siccis, malorum granat. de berberis, de acetosa & similes. Conseruæ symphiri, ros. caro cydoniorum conditorum ad hunc affectum maximè conferunt. *Conserua.* Fiunt autem condita ex his conseruis, bolo. terra sigillata, sanguine drac. gum. trag. & aliis, quæ nulla aut pauca sunt prædita facultate odorata, vt

R. conser. symphiri, & carniū cydoniorum conditorum ana ʒ j bol. ar. coralli rub. an. ʒ. j. sacch. ros. tab. ad pondus omnium, fiat conditum. Opiatæ ex iisdem fiunt, addito aliquo syr. astringente, & auctis pulueribus.

De Vomitu sanguinis ex prima dictatione.

C A P. X.

Sanguis è ventriculo per vomitum reicitur. Si is fiat splendidus, naturalis & recens videatur, statim compescendus est sanguis missione, diuersione facta per ligaturas, cucurbitas, vnguenta, vel embrocationes factas supra ventriculum. Vnguenta quidem fient, vt sequitur. *Externa.*

R. thur. mastich. nucis cupressi, sumach. berber. cort. mali gran. an. ʒ ij. sang. drac. ʒ. ʒ. boli arm. terre sigil. myrtill. an. ʒ ij. ol. cydoniorum ʒ. ij. succi plantag. & ling. pass. (quæ & corignola, & polygonum vocatur) an. ʒ. ij. ceræ parum, fiat vnguentum Si incorporentur cum succis, non peccabitur, vt sic.

R. ol. ros. ol. myrthi an. ʒ. ij. succi plantag. ʒ j. acaciæ, hypoci. ladani an. ʒ. j. corall. amborum, seminis port. berber. acinorum vuarum (qui propriè dicuntur nuclei) an. ʒ. j. ceræ parum, fiat vnguentum, vel fiat pul. & post vnctionem oleorum supradictorum fiat sinapizatio. vel fiat sic.

R. sandal. corall. an. ʒ. ʒ. florum labruscæ, ros. rub. an. ʒ. j. ʒ. ʒ. sorborum, mespilorum exsiccatorum, aut carniū

derata fuerit, oportet etiam caliditatem & siccitatem magnam esse. Fit autem ob siccitatem & caliditatem totius ventriculi, vel œsophagi & oris, vt pulmonum, & trachiæ arteriæ. Ab intemperie tantum sine materia fit, vel etiam cum materia, à causis internis, & externis, vt versari in calido siccoque aëre aut iuxta ignem, excitat sitim, quia aër calidus & siccus partes exiccat, vel aëris constitutio sicca, æstatis, vsus piscium marinorum & frictorum in oleo, vel butyro. Carnes salæ & exiccatae in *Sitis ante* fumo. Si ab his postremis accidat sitis fiet magis post *pastū quid* pastum. Sin ante cibum aliquis sitiat, oportet alterum *significat:* duorum esse, aut humorem biliosum vel falsum in ven- *quid post* triculo collectum, aut siccitatem ob insignem aliquam *pastum.* euacuationem vrinæ, aut sudoris, aut aliam à medicamento factam. Si propter siccitatem pulmonum, aut trachiæ arteriæ proueniat, vel à febre calida & ardente, aut ab aëre inspirato nimium exiccante fit.

Curatio sitis sine materia.

Curatur sitis si sine materia sit, potu humido, vt aqua sola, vel paco vino permixta, aut aceto etiam multum diluta, aut syr. viol. syr. de cucur. & aliis humectantibus *Curatio ab* & refrigerantibus. Idem faciendum, si ab esu rerum sal- *exsiccatio* sarum fiat. Sin ob exiccationem trachiæ arteriæ, & pul- *ne arter.* monum, magis inspiratione aëris frigidi, quam potu recreantur, ob id oportet fenestras aperire, per quas aura lenis ingrediatur aëris cubiculi, refrigerationem & agitationem. Inspergere oportet folia vitis salicis, lact. & *Cur. sitis à* aliorum frigidorum & humidorum maceratorum prius *falsis hu-* in aqua & aceto. Si à falsis humoribus vel biliosis, e- *mor.* uacuatione illius humoris, & alteratione, quæ fiet, frigi- *Cur. sitis* dis & humectantibus curabitur. Si post largam aliquam *ab euacua-* euacuationem fiat cremore hordei, vino bene diluto in- *tionem.* sperso, aut iusculo pulli sine sale sedabitur, in quo decocta sint semina frigida maiora & herbæ humidæ. Si ob linguæ & palati siccitatem, abluant sæpe os aqua frigi- *Mitigatio* da, additis duabus guttis aceti, vel vini albi. Ad mitiga- *sitis in fe-* tionem sitis in febribus. cum timeamus nimium potum, *bribus.* vel ob hydropis periculum, vel ob fluxum ventris impe- ramus vt teneant in ore vel pruna, vel cerasa sicca mace- rata in aqua frigida, vel frequenter mutent, aut frustum

pomi aut ex mucilag. cydon. & pillij, vel gummi trag. extractis cum aqua viol. vel buglos. potius, quam cum aqua ros. remedia paramus. Nam aqua ros. exiccat, sed propter odorem gratum nonnihil eius apponitur, nisi dolor capitis adsit. Radix oly. recenter è terra euulsa masticata sitim sedat. Si ab intemperie ventriculi aliqua accidat, curabitur vt supra monstrauimus, capite proprio.

De appetentia canina.

CAP. XI.

Appetitus intenditur, quemadmodum & sitis à causis præter naturam. Is est duplex, scilicet, appetentia & uolimos. Conueniunt in hoc, quòd multum comedere cogantur. Sed appetentia canina facit, vt cibis, qui multi sunt assumpti, vomitione reddamus, & rursus assumamus cibum, & iterum euomamus, quod canibus solet accidere. Uolimos autem est appetentia, quam nisi sedent alimentis sumptis, in animi defectionem, & cardialgiam incidunt. Fit autem appetentia canina, vel propter intemperiem solam frigidam, aut ob pituitam acidam, vel melancholiam, vel ob totius corporis dissolutionem magnam. Excitatur etiam aliquando à causis procatarcticis, vt à nimia aëris refrigeratione, quod accidit iis, qui per montes frigidos & niuosos iter faciunt. Fit & potu aquæ frigidissimæ, refrigerato ore ventriculi. Ob id scripsit Hipp. aquam & aërem facere voracitatem, sed magis aquam, quam & voracem appellat. Fit & cum æger nutritur alimentis exigui nutrimenti, vt si vescatur oleribus, fructibus acidis, asparagis, radicibus, leguminibus, aut aliis alimentis imbecillioribus. Fit etiam ob longum usum alimentorum detergentium, vt si euum, vel gari, quod in me ipso expertus sum, qui cum me vellem cogere ad usum piscium, vtererque frequentissime garo parato ex lycoctionis (vulgus *Anchoyes*, vocat) & oxyleo, ficus etiam Massilienses ferè omnibus horis comedere, ita fuit pituita illa ventriculi & intestinorum deterfa, vt mihi superuenerit appetentia canina, deinde uolimos quæ me adhuc hodie infestat. Deprehenduntur huius affectus causæ, ex relatu ægrotantis, & his, quæ præcesserunt. Quòd si nullam ex numeratis causis procatarcticam causam præcessisse inueniamus, æternam esse suspicamur, nempe humores acidos in ventri-

ventriculo collectos, qui non alio modo, quàm acetum, vel omphacium appetentiam faciunt, os vetriculi pun- gendo, & exprimendo. Id multò certius ex sapore eo- rum, quæ euomuntur cognoscemus, idque ex egri re- latu, vel etiam si ante vomitum ex ructibus acidis tale præsentiat, & sapore eius acido. Curatur euacuando, & per vomitum & per ventrem. Vomitu quidem, si post primam illam vomitionem alimentorum dederimus vomitorium, vt iusculum pingue, vel decoctum rapha- ni, vel asari, vel oxymel. aut syr. acetos. simpl. Deinde pi- lulas ventriculo accommodatas, quales sunt de hiera, de aromatibus cum ag. Et pilulæ dandæ sunt potius, quàm alia medicamenta, quas oportet esse molles, vt fa- cillimè dissoluantur, & diu post vomitum factum ven- triculo inani dandæ sunt. Quòd si præcesserit clyster, vel si sequatur, pilularum actionem accelerabit. Si pi- lulas deuorare non possunt, dandæ erunt medicamenta in pauca quantitate, quæ ventriculum poterunt deter- gere. Sed ferè omnia talia vomitum ciunt, vt ag. scam- monium, colocynthis. Quare si dandum est ag. infun- datur in oxymel. aut syru. acetoso, & addatur cinamo- mum loco zinziberis. Quòd si addantur & grana ali- quot diagridij, citius eicientur per inferiora humores. Si alia medicamenta præter syr. assumere nolit, aut non possit, dandus erit syr. ros. lax. cum ʒ. ss. oxymel. & ʒ. j. cinamomi, & ʒ. ss. zinzib. atq; itaque fiet medicamētum phlegmagogum. Sufficiet autem leuis euacuatio, & rei- terata quia multos humores continent, ob frequentem vomitum. Deinde sunt opiatæ, vel electuaria, quæ vim calfaciendi habent, & corroborandi ventriculum, qua- lis est cinamomum, aro. ros. diagal. ros. nouellæ & aliæ similes. Extrinsecus corroborandus ventriculus calfa- ciētibus primùm, & leuiter astringētib. Deinde astring- entia sunt augenda, potissimùm ad os vetriculi para- ta. In principio sufficiet inungere vetriculū cum cerato stomach. Gal. vel cum ol. nardino, de absynth. ol. mastic. Deinde addenda erunt, quæ magis astringunt, vt ol. cy- don. lentisci-myri, vel vt prius docuimus, pul. astringē- tes inspergenda, aut cum astringentibus succis, & vino maluatico partē fouere, vt fecimus cap. de imbecillita-

te ventriculi. Si autem intemperie sola frigida, & sine materia fiat hic affectus, sufficiet alterare partem calfaciendo, & constringendo medicamentis & fascia. Nam & propter magnam ventriculi distentionem ingerunt multa alimenta, nec tam citò satiantur. Coguntur verò à cibi multitudine vomere. Si propter resolutionem magnam totius corporis fiat, aut quia vsus est alimentis detergentibus, & euacuantibus immodicè, optimis alimentis illos alere oportet, vitellis ouorù, succo carnis, optimo & generoso vino, pane intincto in maluatico vino, vel hippocratico. vel muscatelino. Hæc alimenta differunt ab iis, quæ ad voulimum præparantur: quòd in voulimo dantur multum alentia, & multum satiantia, & que ob id eligimus pingua, quæ sunt fugienda in appetentia canina, quòd vomitum prouocant, vt & oleaginosa omnia, & magis liquida, quæ suapte natura facillimè vomuntur. Istis tantum alimentis vtitur, cum volumus ab initio augere vomitum. Si propter alimenta, aut medicamenta plus iusto detergentia acciderit hæc affectio, viscosa sunt danda, vt cremor alicæ, ptisanæ, decoctum pedum veruecis, aut aliorum animalium.

De Voulimo.

CAP. XII.

Voulimia eodem modo curatur, quo appetentia canina. In hoc tantum differt, quòd alimenta oportet esse duriora, & tardiora ad concoctionem, vt alimentum inde factum diutius duret. Inter alia alimenta probatur caro suilla, & lucanica Bononienses, quæ cum integro pipere parantur. Multum enim alunt, & ventriculum calfaciunt. Alia alimenta, quæ cum pipere parantur, & aliis aromatibus conueniunt. Quòd si voulimia fieret ab humore acido, euacuatione tentare oporteret, sed cum maiore cautela, quam in appetentia canina. Nam ij facillimè in animi defectionem incidunt, post aliquam euacuationem. Sunt autem statim rescicendi vino, & rebus odoratis. Inunctiones & omnia alia præscripta cap. de appetentia canina, hic conueniunt.

De cibi fastidio.

CAP. XIII.

Cibi fastidium contraria est affectio appetentiæ caninae & voulimo. Nam in hac nullos cibos appetunt, aut si appetant, vitiatos appetunt, & tunc dicitur pica.

Fit

Est autem à caussis contrariis his, à quibus fames excitatur, scilicet, propter plenitudinem ventriculi, vel quòd inanitionem nullam sentiat os ventriculi. Non sentit, si plenus sit recrementis dulcibus: illa enim satietatem faciunt, vt acida appetitum. Pituita etiam insipida vel sanguis in ventriculo collectus faciunt satietatem. Biliosa recrementa, non quòd ventriculum replent, sed supra modum calfaciunt, appetentiam deiiciunt. Calor enim solida corpora laxando dissoluit, atq. ad attractionis functionem reddit imbecilliora. Nam vt frigus appetitum auget, sic caliditas eundem destruit, quemadmodum & medicamēta calida dulcia, pingua, & vina generosa, vt Hipp. scripsit, Torexis famem sedat. Vinum autem quia calefacit, & subito nutrit, famem auferre dicitur. Quare qui cœnam aut prandium à potu vini inchoant, hi parum aut nihil comedunt. Pingua, quia ventriculum relaxant, & quodammodo resupinant, appetitū deiiciunt. Deiicitur & post morbos acutos, in quorum principio multum alimētia assumpsere, id quod Hipp. scripsit Aph. 3. lib. 2. Omnes ferè, qui malè se habent, circa initia cupidè comedentes, nec quicquam proficiunt, ad postremum nil appetunt. Qui verò circa initia cibum fastidiunt, postea bene appetentes, hi in melius euadunt. Post chronicos etiam morbos fit, quòd ex his facultatum naturalium vis sit deiecta. In morbis præterea, in quibus non est facta insignis euacuatio per ventrem: Item in omnibus internis inflammationibus ob calorem ventriculi, in fluxibus præterea ventris, vel propter imbecillitatem, vel quia recrementa defluunt in ventriculum, vt quando pituita à cerebro in ventriculum descendit, & excrementa sunt spumosa. Deiicitur & appetentia ob relictum exercitium, aut quia nulla aut pauca fit resolutio, vt in multis obesitas, in his qui consueverunt frequenter coire, & non ampliùs coeunt. Aliqui cibos non appetunt, quia priusquam esuriant, iuscula aut alia alimenta assumunt, quod sæpe agrotantibus contingit ob muliercularum importunam diligentiam. Curatur hæc affectio contrariam causam inducendo, vt si propter satietatem comedere nequeunt, ieiunent. Qui ob recrementa in ventriculo collecta, sunt euacuandi vomitu,

aut deiectione. Detur syr. acetos. simpl. qui incidendo & detergendo pituitam, vomitum prouocat. Pilulæ etiam in exitu lecti assumptæ, appetitum possunt excitare, si ventrem moueant. Pilulæ ante cibum, vel sabellina, vel de hiera, de arob. cum pauco ag. si pituitosus fuerit humor, conueniunt, aut rhab. si bilis. Sed quia bilis ob calorem deiecit appetentiam, conuenientius erit dare decoctum tamarind. prunorum acidorum, & sebestem cum syr. ros. vel. rhab. In crastinum medicamenti, duabus horis ante pastum bibent aquam frigidissimam, nisi ventriculi imbecillitas, aut quid aliud prohibeat. Vtuntur pro condimento cibus acidis. vt multo aceto, omphacio, succo aranciorum. Gustent & aliqua falsa, vt oliuam, aut lactucas, ex aceto sine oleo, vel pauco, aut scariolam, aut cichoreum. Quod si pituita fuerit in causa, post euacuationem, optimum est illis dare acida, sed cum detergentibus, vt falsa. Nam quæ præter dulcedinem detergunt, satiant & inflant, vnde non prosunt affectui, nisi multum aceti addatur, vt parum dulcia videantur. Vtatur garo, oliuis, cappar. fœ. icul. mari conditis, salitis. Optimum est illis dare pisces salfos, non pingues ex aceto, vel frequenter iniicere clysteres, quò recrementa intestinorum abluantur. Vt breuiter dicam, in quibuscunque deiecit appetitus ob causam aliquam ventriculum calfacientem, vt medicamenta & alia, refrigeratione curantur: quibus verò ob plenitudinem ventriculi, totius corporis euacuatione: quibus ob derelictum exercitium, aut venerem, exerceant se, & coeant modicè. Si frictiones soluz non fiant, iterum procurentur. In omni inappetentia dentur alimenta actu frigida, & parua quantitas detur, propinenturque, inscio ærotante, quantum fieri potest. Vtantur pane asso, vel exsiccatò diu in aere, vel vtantur placëtis bene siccis, & bene salitis, & bene fermentatis, & non nimis subactis. Rustici nostri solent parare huiusmodi panes, superpositis lycoctonis, vt in Prouincia faciunt, quos non improbo, modò non recipiant nimis olei. Quæ parantur ex amygdal. lacte, butyro, & pineis, nimis satiant. Aëris frigidi inspiratio multum confert ad excitandum appetitum, vt ablutio corporis, & frequens indusiorum mutatio.

Nidores ciborum & odores replent. Quare in vultimo, & appetentia canina magis conuenient.

De Pica.

CAP. XIII.

Pica corrupta est appetentia, quæ vtero gerentibus, & puellis cachexia laborantibus ob mensium retentionem, aut seminis prouenit, à vitiatis & corruptis humoribus collectis in ventriculo, vt hominibus aliquando accidit melancholia laborantibus, aut aliis morbis, qui ab atra bile, aut diuersis humoribus fiunt. Nam ferè id euenit, vt ventriculus appetat similia alimèta humoribus in se contentis: vt atra bilis in ventriculo effusa sit, non vltà acida appetunt, vt mulieres vtero gerentes. Sin vltà sit & incinerata, carbones, cineres, & alia alimenta sicca appetunt, & assument, & illis delectantur. Qui salfos humores, salsa, qui alios, alia, ita vt ex eorum appetentia humorem coniiciamus collectum. Is humor est paucus, & serosus potius, quàm crassus. Ob id detergentia magis conueniunt, quàm fortiter laxan. Vomitus à cibo frequens, iuuat. Medicamenta superius enumerata cap. de anorexia, vtilia erunt, cass. tamarindi, cath. trip. persica. Ex syrupis, ros. laxat. de fumo. compos. & serum lactis cum infusione myrobal. vel ros. recentium, vel solic. senæ, quæ frequenter exhibeantur, vt quatuor aut quinque vicibus. Deinde castigetur ventriculi intemperies, si qua contracta ex recrementis. Id fit topicis remediis descriptis cap. de intemperie ventriculi.

De singultu.

CAP. XV.

Singultus est veluti conuulsio ventriculi. Fit autem cum ventriculus pungitur medicamento acri, vel humoribus acribus, aut quando pituita hæret tunicis ventriculi. Ventriculus enim contrahitur, vt quod illum molestat, eiiciat, vt sternutatione, epilepsia, & aliis affectibus accidit, in quibus faculas expultrix multum irritatur. Est hoc symptoma cum sono, quia in spatio vacuo ventriculi aliquis aër, aut spiritus continetur, qui cum premitur, & per angustam viam redditur, sonum facit, vt euentre docuit Hipp. in sternuramento, cum inquit, sternutamentum fit calfacto cerebro, aut humectata capitis parte inani. Aër enim intus contentus extrà prorumpit. Sonat autem, quia per angustum est ei

exitus. Curatur multis modis, pro caussarum varietate. Nam si fiat à pituita viscida in tunicis infarcta, dandum erit, quod pituitam incidat, detergeat, & euacuet per vomitum, vt syr. acetosus simpl. aut oxymel. simpl. aut squilliticum. Decoctum seminis asari, vel genistæ, vel raphani cum hydromelite. Quòd si non satis purgetur vomitu, dandæ sunt pilulæ, de aromatibus, de hiera, vel sabellinæ. Et post pilulas, optimum est dare hydromel, vt melius detergatur ventriculus. Quòd si morbus fuerit diuturnus, est concoquendus mell. ros. oxymel. syru. de byzantiis, aliisq; attenuantibus, incidentibus & detergentibus, in quorum numero poni potest syru. de stechade, si sine febre fuerit. Sunt fugienda, quæ aliquam habent astrictionem, vt syr. de menta, absynthio, & similes, nisi facta iam euacuatione humoris. Tunc enim conueniunt ad corroboracionem ventriculi, alioqui materiam iam infarctam magis impingunt. Concocto humore, rursus euacuandum est, idque pilulis fortioribus, vt quando à pituita fit, damus pilulas cochias cum pilulis de abro. vel de hiera, quibus addimus ḡ. iij. castorei, quoniam materia pituitosa valde frigida est. Post hanc euacuationem vtilissimum est dare syr. de absynt. cum aqua mentæ, vel confectioe aro. ros. vt diagal. vel diacyminum, vel decoctum paratum ex menta, & pulegio in hydromelite cla. & aro. cum 3. j. galangæ & 3. j. pip. Oportet hunc syr. esse perfectè coctum & sensim transglutire. Ad extra supra ventriculum optimus est fons ex ol. calfac. & maximè his, quæ vim habent discutiendi flatus, vt ol. rutaceum, anethinum, abrotanum, vel de absynth. aut illis addendum parum cymini, & galangam, & totam ventriculi regionem fouere oportet, & fascia diligenter ventrem comprimere. Minor enim fit singultus, quando minùs dilatatur ventriculus, aut minùs corpus exagitur. Possunt fieri sinapisationes, post inunctiones, vt monstratum est cap. de imbecillit. ventric. Et quia compressio per fasciam singultum facit minorem, ob id puto aëris retentionem, non tam calfaciendo, vt Gal. putauit, quàm intendendo septum transversum conferre. Eo enim distento premittur ventriculus. Mulieres imperant singultientibus vt cogitent

cogitent quo in loco viderint beatam Mariam lactantem Christum, ut ex illa cogitatione inspiratio retineatur, quæ prodest, ut dictum est. Timor repente factus ob repentinam spirituum motionem & cessationem à respiratione, idem præstare videtur. Si singultus à biliosis, vel corruptis cibis prouenerit, ex præcedente victus ratione dignoscitur, & ex ructibus, vel ex vomitione, sapore, & colore flauo, & calore. Quare non minus erit prouocanda vomitio, quam in pituitosis humoribus, sed hic detergentia magis danda sunt, quam incidentia. Humor enim est nimis tenuis, & sua tenuitate ventriculum penetrando, & acrimonia purgando, singultum facit. Syr. end. simpl. vel compos. dari potest ad humoris coactionem, & vomitus prouocationem. Sed quando ad vomitionem datur, cum aqua tepida, vel aqua decoctionis hord dari debet, & in magna quantitate, & tepidus. Post cuius assumptionem moueri debet corpus, saltem ventriculi regio confricari. Quod si non vomant, detur cyathus vnus decoctionis gly. vel passularum cum syrups prædictis, aut cum multo saccharo, aut hydromel bene dilutum exhibeatur, aut vomitio prouocetur. Infusum Rhab. cum decoctione pass. vel hord. vel gly. dandum est cum syru. rol. lax. aut syr. de absynth. Clysteres quoque dandi sunt, à quacunque causa fiat singultus, ad humoris deriuationem. In crastinum medicamentum dari potest ʒ. j. theriac. recentis, quando singultus est fortissimus, quo tempore etiam syru. de pap. cum aqua lact. noctu dandus est, addendo parum croci. Conciliat enim somnum & partem minus sensibilem facit, obtundendo sensum. Illius rei causa non veritus est Galenus compositiones dare paratas ex opio, ut Philonium & alia multa medicamenta calida, ut asyncriton etiam dari potest. Sed mihi non placent compositiones artheriacæ neque quæ astringentia & detergentia simul, cum opium recipiunt: quia laxantia opio permixta amittunt facultatem laxandi. Ob id theriaca recens vim medicamenti purgatoriam impedit. Non est igitur illa compositio Asclepiadis à Galeno tradita libro 8. κατὰ τέτατον, danda in solo singultu, quam prauera stomachicis ardorem sentientibus, & ad intercessos singultus, & voluulosas

stomachi affectiones. Et quia Fuschius hanc compositionem immutauit suo opere practico prætermittendo aliqua simplicia, visum nobis fuit operæpretium, descriptionem ex oleo citato huc transferre.

℞. costi, spicæ nardi, crysotal. ros. virid. mastic. an. ʒ. ʒ. aloes, asari an. ʒ. ij. opij ʒ. j. excipiatur succo psyllij, reduc ad formam patillorum, exhibe obolos tres, id est ʒ. j. ʒ. dissolutos in conuenienti succo. Hæc compositio recipere debet crocum. Nam Gal. in eius declaratione croci meminit. Recipit verò mastic. de quo nihil meminit. Cryso balanum aliqui putant esse nostram nucem moscatam, quam Gale. discutere & corroborare dixit. Habet. n. nux moscata vim astringendi, & roborandi. Hæc compositio optima erit, in illa affectuum complicatione, sed in singultu tamen minùs videtur cōuenire. Ob id satius esset, vt diximus, dare colica, quæ nulla astringentia recipiunt, vt asyncriton, philoniū, pilulas de cynoglossia, styrace, & similes confectiones. Possunt conuenire, quæ astringentia sine laxantibus, vel detergentibus recipiunt, quando singultus est cum vomitu, vel fluxu ventris, qualis esset prædicta compositio, ablata aloe, dando cum aliquo succo, vel aqua astringere. Fit etiam ab inanitione singultus post magnas vomitiones & superpurgationes cum vehementissima siti, quam speciem curare oportet lactis potu, optimis iusculis, & aliis corpus reficientibus, de quibus dictum est cum ageremus de siccitate vetriculi. Gal. præter hos modos singultus, nepe ab inanitione & repletione, dicit fieri ab acris humoribus, qui videntur cōprehendi sub repletionem. Sed quia videtur id magis præstare qualitate sua, vt medicamenta acria, ob id distinxit. De huius speciei curatione iam supra dictū satis est, cum de humorum acrum absterfione loqueremur, quod fiebat fyr. de end. & detergentibus citra incisionem. Quod si ab alimentis aut medicamentis acris fuerit factus singultus, citra magnam plenitudinem, præsens remedium est ol. amygd. dul. recens, vel oliuarum, vel butyrum assumere, vel prisanz cremorem, vel multum aquæ frigida bibere. Extinguit enim medicamenti acrimoniam, & sensum minuit. Ligaturæ ferè omnibus causis fieri possunt, quia inducendo dolorem singultum sedant.

Cholera morbus vel symptoma est, ventriculi immodica perturbatio infra supraque erumpens. Qui patiuntur hanc affectionem, biliosi a Plinio vocantur. Hic morbus fit ex corruptione alimentorum, & ratione medicamentorum. Alimenta corrumpuntur, vel quia ad id apta erant: vel quia in maiori quantitate assumpta fuerunt, & non potuerunt concoqui, sed corrupta sunt: vel quia eo ordine non sunt assumpta, quo debebant. Ut cucurbita putrescit facile, si aliis cibis misceatur, sic & pepones, & melopepones. Alimenta verò facillime corrumpuntur in corporibus intemper. quæ in temperat. coquuntur facile, ut dulcia, aut quæ exccandæ cholæ apta sunt peculiariter, ut pepones, mala armeniaca, chrysomela (*abricois* vocât) nuges, amygdal. acridæ, ut cepæ, allium. Corrumpuntur etiâ bona alimenta, quâuis ordine recto, & quâritate iusta fuerint assumpta, ob intemperiem ventriculi calidâ, & ob prauos humores in eo contentos, & maximè bilem. Excitant hunc affectû medicamenta, quæ sua natura cient vomitû, aut ad ventriculû trahunt excrementa. Ut veratrum, colocynthis, scammonium. Huic morbo medemur, si syncope, aut aliud symptoma tale non impediat, ablata causa. Quoniam primùm vnâ-quanque causam abscindere oportet, postea ad intemperiem venire. Sed quomodo sit auferenda causa, & per quâ regionem, docet Hipp. hoc aph. Quò natura repit, &c. In hoc affectu fit excretio per vomitum, & per secesum: ante omnia erit prospiciendum, an æger vomat facile, vel difficile, si sine conuulsione & syncope. Nam ipsis primùm esset occurrêdum, ut grauioribus, & magis urgentibus. Si verò facile solvatur aluus, per deiectionem purgandus est. Si vomitus sit difficilis, facilis reddatur non vomitione cõmuni, aut quocunque indifferenter, ut veratrum decocto raph. asæ. atriplicis, ol. & aceto. Sed si bilis in ventriculo est, aut alimenta in bilis naturâ corrupta sint (quod per nidorosos ructus agnoscitur) abstinendum a calidis, & iis, quæ bilem augment & intemperiem: utendû verò tantû aqua tepida, non parua quantitate (sic enim vertitur in bilem) sed copiosa, tum ne bile scat, ut ait Hippoc. tum ut ventriculi partes

omnes abluat, & citius reiiciatur. Quòd si pituita causa est reiectionis, aut cruditas, aut alimenta pituitosa, aut téperamentum pituitosum, cum aqua tepida, misce syr. acetosum, aut aliquid ex aliis vomitoriis. Eger si nendus est vomere, donec vitiosus humor totus, aut maiori ex parte reiectus fuerit, nec antea medicamentis astringentibus est vtendum: quoniam materia, quæ agitata est & quasi sursum elata, tetineri non potest, nec etiam debet, ne humoris corrupti vacuatio impediatur. Interim si singultus accidit, vel alius motus tremulus, aut similis conuulsioni, dàda est opera, vt cesset. His peractis ventriculus est corroborandus, ne attractis à partibus vicinis excrementis, vt à liene, iecore, ac intestinis, ea, quæ præter naturam est vacuatio, cōtinuetur. Nam ea excretio, quamuis utilis sit, si modum exceßerit, periculo non vacat, cū prostratis viribus mortem afferre possit. Ventriculus potius admotis, quàm sumptis est roborandus: quoniam admota melius corroborant, & sistunt, citra ventriculi nauseam, vel subuersionem. Quæ verò sumuntur, siue medicamenta, siue alimenta fuerint, reiiciuntur propter agitationem. Eger quiescat, & interim, quod admotum est, non erit otiosum. Sōnus si fieri potest, conciliandus, vt & qui concoctionem maxime iuuat, & excretionem retineat. Admota perpetuo esse debent astringentia: sed calida in frigida, & frigida in causa calida. Quæ verò admoventur vel sunt emplastra, vel sacculi, vel fots oleorum, vel decocta herbarum, vel succi earundem & fructuum, vel pul. In hoc autem morbo tam periculoso, & acuto eligenda sunt, quæ celerius iuuant, nempe, quæ citius penetrant, ob partium tenuitatem, & consistentiam sunt minime emplastica, ac valde astringunt, vt fots herbarum & oleorum. Nam sacculi & emplastra non nisi post multas horas id præstant. Olea, quia ferè vbique reperiuntur parata, primum vsurpabimus, tantisper dum fots parabitur. Oleum ob lentorem est acopum, & prohibet conuulsionem, vel laxat. In causa calida conueniunt, oleum ros. cydoniorum, myrtil. quæ refrigerant, roborant & astringunt. Oleum simpl. nisi fuerit omphac. non probo, nec violatum, nisi sit spasmus à sic-
citate

citāte & caliditate. Tunc enim aliis misceri posset, vt cum volumus iuuare excretionem in his, qui vomere non possunt, & ardorem sentiunt.

R. ol. viol. & omphac. ana ʒ. ij. ol. cydon. & myrtill. an. ʒ. j. aceti & vini parum ad penetrationem, sed acetum citius penetrat, & constringit: proinde magis competit, nisi sit conuulsio. Tunc enim vrimur vino mediocriter crasso. Non est negligenda iudicatio, quæ à parte somitur. Nam cum ventriculus habeat functionem toti corpori communem, quæ caliditate perficiunt, perpetuo calida (sed in minori quantitate) miscebimus, tum ad iuuandam cōcoctionem, tum ad penetrationem. Talia sunt oleum nardinum, de menta, de absynth. mastice. lentisc. Nardinum & de menta roborant sine magna astrictione. Hoc igitur artificiosum est, vt si ol. sint multum astringentia, & frigida, aliquid addamus ex calidis, quæ minus astringunt, vt calor vetriculi foueatur, & medicamentū penetret, & si tale medicamentū præscribatur.

R. ol. cydon. & myrtill. an. ʒ. iiij. addendum erit ol. de menta, vel nard. parum, vt ʒ. ʒ. Si autē reciperet ol. ros. ʒ. iiij. myrtill. ʒ. j. tunc quoniam hæc astringunt minus. miscendum esset lentisc. vel mastice. In causa frigida quauis calida vsurpanda sint, tamen quia frigidi est condensare, si magis constringere, quàm actionem partis corroborare volumus, licet aliquid frigidorum addere, vt

R. ol. mastich. de menta, & absynth. an. ʒ. ij. lentisc. aut myrtill. aut cytrij ʒ. j. Post oleorum inunctionem puluisculos inspergimus aut astringentes, aut roborantes, aut vtrunque efficientes, aut penetrantes & corroborantes maximè post refrigerantium oleorum vsum.

R. ol. ros. ʒ. iiij. olei cydon. & myrtill. ana ʒ. j. Tum adde puluerem talem.

R. spicæ nardi, scœnanth. cyperi, macis ana ʒ. j. ros. myrtill. sand. coriand. ana ʒ. ʒ. corall. rub. ʒ. j. fiat pul. tenuissimus, quo aspergatur post inunctionem. Possunt ex his puluerib. ol. & cera parari vnguenta, & cerata, quorū facultas diutius durat, & retinetur supra partem affectam. Ex his, quæ in officinis parantur, ceratum stomach. Gal. in causa frigida valet. Emplastrum de mastiche, de pelle arietina, & pro matrice, vsurpari possunt,

his additis, quæ huic morbo magis accommodata videbuntur, vt

R. mass. emplastri pro matrice, vel de pelle arietina 3. ij. coral. rub. coriand. santal. seminis berber. rhus, gallarum vel cortic. mali granati ana 3. ij. ol. cydon. lentisc. vel myrtil vel ros. 3. ij. ceræ albæ q. s. fiat vnguentum. Et hoc in causâ calida: in frigida verò sic.

R. mass. emplastri pro matrice 3. ij. coral. rub. cortic. mali grana. macis, mastic. ana 3. j. malaxentur cum ol. nardino, vel de absynth. Post vñctiones fiunt etiam fottus ex herbis siccis vel recentibus, radic. seminib. fructibus, floribus, aqua cisternæ, vel aceto, vel vino austero, facta decoctione, vt

R. corti. mespili vel cydo. vel querc. 3. ij. sum. myrth. & seminis eiusdem, vel sum. pyri syluestris, vel ligustri, vel oleastri M. ij. cortic. mali gra balaustiorum, sumac. berber. gallarū ana 3. j. flor. ros. p. j. fiat decoctio in aqua & pauco aceto pro fottu Si nō adsit myrthus recens, eius loco substitui possūt tenella germina pyri sylue. mespili, sorbi, corni, berberis, & aliorum similiū, addita menta, vel absynthio. vt supra de oleis dictum est, quo astringentium, quæ sibi viam præcludunt, facultas ad partem affectam deducatur. Myrthus alba & nigra, lentiscus, rebinthus constant facultatibus contrariis, nempe calfaciendi & refrigerandi, si viridis accipiat. Vbi igitur illarum arborum copia est, poterunt vtiliter vsurpari. In causâ frigida apponimus mentam, absynth. corti. citri, flores anthos, stech. ros. semina cal. maior. & aro. astringentia, vt cyper. macis, quæ in fine decoctionis iniiciuntur. Emplastra fiunt in declinatione, quia melius & diutius retinentur, ne tam frequenti vñctione opus sit. Fiunt etiam epithemata ex succis arborum, herbarum, fructuū arborum, vt in causâ calida è succo mespillorum, pyrorum, punicorum, cornorum, sorborum, vnedonum. His pānus madens ventriculo apponitur. In hoc morbo multum iuuat cucurbitula inter vmbilicū & stomachū affixa. Retinet enim, quod in vētriculo est necessum manere, siue cibus, siue medicamentum fuerit: humores retrahit, & vētriculū firmat. Sed si vomitus, vel morbi cholæræ excretio fiat ab hepate, supra hepar ponenda est:

*De causa
frigida
quid facto
opus.*

fin à liene, supra liené, si materia sit retinenda. Nec probo eorum consilium qui iecori aut lieni cum humores in ventriculum reiciunt, admovent astringentia remedia. Sic enim partes constringendo, vim illis addunt, ut fortius sua propellant excrementa. Vtilius itaq; esset ventriculum astringentibus corroborare, ne excrementa recipiat, & imposita lieni aut hepatis cucurbitula inde erumpentes humores retrahat. Admotis omnibus his remediis, ubi ventriculus perturbatus, paulum conquieuerit, ad sumenda transibimus, quæ admotis citius agunt. Quæ sumuntur, vel medicamenta vel alimenta sunt. Alimenta prius danda sunt, si periculum sit de virium lapsu. Viribus autem integris rectè faciunt, qui modicè detergentia exhibent, ut quicquid reliquum est humoris euacuetur, ut in materia calida dabimus aquam hordei cum paucis saccharo: in frigida cum paucis cinamomo. Quod si multus adhuc humor supersit, in calido fiat decoctio.

℞. myrob. citrinorum ʒ. ij. fiat decoc. in aqua hord. & in col. ʒ. iij. diss. sacch. parum. Si magis purgandum est, dari poterit rhab. & syr. rosar. lax. In causa frigida conveniunt pilulæ de hiera picra, de aro. & aliæ, quæ ventriculum sine molestia detergent, cum melle ros. formatæ. Hæc magis ad vomitum, quam ad cholera morbum conferunt. Nam cholera morbus ferè totum humorem, & plusquam sat est, euacuat. Alimenta sunt eligenda, quæ morbum minuunt, ut in causa calida panis maceratur succo granatorum, hordeatum cum aqua ros. & paucis saccharo, & quæ sine magno negotio nutriunt, & sine fastidio devorantur, & sic parata, ut non facile corrumpantur, ac reiciantur, ut assa. Alimenta probantur medicamentosa, ut cydonium coactum in causa calida; panis maceratus in succo granatorum cum paucis cina. vel in vino Hippocratico, cortex citri in causa frigida conveniunt. Non placet, quod practici tro. de olibano & similes prescribunt. hi enim odore & sapore ingrato ventriculum subvertunt. Quod ut melius intelligatur, eius medicamenti compositio ex Rase, Auicenna, & Halli in hunc locum translata est.

℞. boli ar. thur. an. ʒ. ij. ʒ. camph. galliæ moscatæ, garyoph. an. ʒ. ʒ. fiant tro. Hoc medicamentum propter

camph. insuauiore odorem, & saporem vomitum sub-
 uersionemque ventriculi excitat. Satiùs itaq; fuerit dare
 succum cydoniorum, aut condimenta ex cydoniato, &
 cinamomo, quæ æger intelligat à coquo, non à pharma-
 copola esse parata. Vel dabimus in causâ frig. tab. j. arg.
 ros. vel ro. no. Quòd si ob morbi vehementiam, valde
 astringentibus vtendum sit, deligantur, quæ vel nullum
 vel iucundum saporem, & odorem habent, vt bolus ar-
 mena, thus, galla, cortex castaneæ, berberis, coral. co-
 riand. vniones, rosæ, conser. ros. cortex citri cum saccha-
 ro conditi. Quòd si quis putet sine his tro. morbum cu-
 rari non posse, vbi omnia alia tentata non profuerint,
 dentur sub forma pilul. vt sine gulæ, & palati offensa de-
 uorentur. Condita etiam sunt, quæ vulgus putat dari ad
 vires corroborandas, de quibus magis, quàm de morbo
 sollicitum esse medicû cupit. In materia calida fiat tale.

℞. myrob. conditarum N. j. conf. ros. veteris ℥. j. ear-
 nis cydon. ℥. ij. coralli rub. ℥. vnionum ℥. ss. fragmen-
 torum lapidum preciosorum an. ℥. j. boli arm. vel terre
 sigill. ℥. sacc. ros. tab. q. s. fiat conditum, vel si æger mauult
 fiat opiata cum syr. de ros. siccis. Et ita fortius erit medi-
 camentum. sed æger eo non poterit vti cû aqua tempore
 sitis. Humor postquam euacuatus est, odoribusque & ad-
 motis recreatæ vires, cibus medicamentosus est offeren-
 dus, isque solidus, non liquidus, vt in causâ calida, ma-
 lum cydonium, perdix, aut pullus minutim cõcisus cum
 succo arâriorum. Auiculis abstinendum erit, quoniã ea-
 rum caro biliosa est, teste Hipp. In causâ frigida conuenit
 cydonium, si addatur parum cinamomi vel garyop. Hor-
 deatum optimum est in vtraque causâ: in frigida qui-
 dem, si parum cinamomi, garyoph. vel mentæ. vel aquæ
 mentæ admisceatur: in calida, si cum aqua ros. vel cusp.
 ros. & paucò saccharo detur. Parandum est sine amygd.
 quia faciliè vertuntur in bilem, nisi sint recentes, vel diu
 maceratæ in aqua frigida. Gelatina conueniet, si pare-
 tur ex santalis, aceto, & paucò cinamomo, in calida: ex
 aceto, cinamomo, galanga, macere, & aqua mentæ in
 causâ frigida. Retinetur cibus & humor diuertitur, cu-
 curbita affixa inter vmbilicum & vëtriculum, vt suprâ di-
 ctum est. Sunt topica remedia, quæ ab antiquis tradita
 sunt,

sunt, & à me experta, vt emplastrum de Ranis apud Mes.
emplast. de mica panis, & alia paratu facilia, vt

R. micæ panis alesi lb. ß. decoquatur in aceto & vino
austero. Adde mentæ viridis M. j. pistentur simul, & in-
corporentur, cum galliæ mosc. garyoph. macis ana 3. ß.
sandal. corian. myrril. sumac. ana 3. ij. extendatur supra
pannum, & applicetur. Hoc est pro calida vel media af-
fectione. In frigida oportet augere modum calidorum,
& decoquere panem in vino, & mentam siccam addere
ad hunc modum.

R. panis alesi lb. j. coquatur in aceto & aqua cisternæ, ad-
de mentæ viridis M. ij. pistentur, per setaceum transmit-
tantur. Adde mastich. garyoph. macis an. 3. ij. spicæ nardi,
cyperi, nucis cupressi an. 3. j. ladani, hypoci. an. 3. j. ß. in-
corporentur simul, fiat in modum cataplas. Vel minuendo
quantitatem panis, adde, vt agglutinetur, terebinth.
q. s. fiat vnguentum. In causa calida fiat sic.

R. mastich. 3. j. pul. & incorp. cum albumine oui, & ad-
moueat. Vel

R. acaciæ 3. ij. diss. in aceto & applica. Hoc modo fiet
præstantissimum.

R. ladani puri, hypoci. an. 3. ij. acaciæ 3. j. diss. in vino
styptico, vel ol. lentisc. vel mastich. vel de absynth. vel
nard. Possunt fieri ex farina lentium & hordei, sic.

R. farinæ lent. qr. j. sumac. berber. coriand. olib. ana
3. ij. succi plantag. aut cydon aut sorborum, aut rubi. q. s.
incorp. fiat cataplas. pro causa calida. Pro frigida.

R. farinæ hord. & lentium an. 3. ij. olibani, mastich.
ladani, macis, garyophil. an. 3. j. incorporentur cum suc-
co cydon. vino styptico & paucio aceto. Trifolium & sum-
ptum, & admotum, valde commendatur.

De cardialgia.

C A P. XVII.

Cardialgia dicitur oris ventriculi dolor, qua anti-
qui cor etiam appellarunt partem illam ob similia
symptomata, quæ huic parti accidere solent, his, quæ
cordi eueniunt, nempe animi defectio. Inde stomachi-
ca dicitur syncope, ad differentiam cardiacæ propriæ
dictæ. Fit autem vel ob materiæ biliosæ morsum, aut *Causa.*
ob crudorum humorum copiam, aut ob partis molli-

tiem & imbecillitatem. Quòd si ab humoribus biliosis fiat, magna ex parte nausea præcedere solet, vel subsequi, vel vomitio, & oris amaritudo aliqua præcessit, corporis aut animi motio, aut ira, aut accessio febris incipit, in qua solent humores agitari, & symptoma hoc facere. Fit etiam propter medicamenta, nimis conturbantia humores circa superiorem partem ventriculi ob eorum leuitatem, vel malitiam, vel quòd suapte natura vomitum nata sint facere. Accidit & cum redditur clyster, seu medicamentum cum difficultate, vel quia materia attracta ab aliis partibus, per coli reuolutionem, descendit, & supra ventriculum aliquandiu remanet, & lædit. Incumbit enim ventriculo colon. Hi promptissime incidunt in hanc affectionem, qui tenues habent humores, & partem oris ventriculi multum sensilem. Huic symptomati occurrendum est statim, vires reficiendo, & impetum naturæ iuuando. Quòd si natura per partem inferiorem difficile expurget, & ob coli obstructionem materia remoretur supra ventriculum, postquam redierint ad sese, iniiciatur clyster ex paucò vino, & melle. Sedabit enim dolorem, & leniet intestina, detergebítque. Si nausea præcesserit, & aptus ad vomitum fuerit, detur aqua tepida cum paucò vino, & digito intincto ol. & in os immisso prouocetur vomitio. Euacuatione facta siue per superiora, siue per inferiora, os ventriculi roboretur topicis remediis præscriptis cap. de imbecillitate ventriculi. Si in principio accessionis fiat, prouocetur vomitus, & odoratis naribus appositis, reficiatur æger. Quòd si apparet etiam virium imbecillitas, non erit præter rationem, vt Gal. docuit, paulò ante accessionem, cibo & potu ægrum reficere, vel dare cremorem ptisanæ cum paucò vino, aut brodium pulli cum paucò vino. Aliquando à cibi corruptione fit hæc affectio. Id deprehenditur nidorulentis ructibus, aut acidis. Eodem modo curatur atque ea, quæ à biliosis humoribus fit, hoc est, euacuando. Si à crudis humoribus, concoctionem procurando linimentis, & quibusdam leuiter detergentibus, & incidentibus assumptis. Quòd si tanta esset quantitas, quæ facultatem expultricem stimularet, dato cibo detergente, & utcumque inci-

Curatio.

Clyster.

Vomitio.

inci-

incidente optimum effiet prouocare vomitum, & dare magnam quantitatem cremoris hordei cum oxymel. quæ detergendo & incidendo euacuationem iuuabunt. Extrinsecus apponantur topica illa, quæ in intemperie frigida apponenda ostendemus cap. de imbecillitate ventriculi. Si propter medicamenti leuitatem, aut malignitatem accidat cardialgia, optimum erit vomitu reddere totum medicamentum, vel aliquam eius partem, vel acuto clystere deorsum trahere. Hæc omnia post accessiōem faciendæ sunt. Nam in accessiōe frictionibus, clamoribusque tentamus ægrum reuocari, & odoratis, & potione vini, vel data aliqua quantitate medicamenti cordialis. Asperio aquæ frigidæ, & euulsio pilorum, aliæque dolorifica faciendæ, (de quibus multa Gal. lib. *Commune* 2. ad Glau.) conferunt. Si mulier aut vir nimium *remediū.* congesta habeat indumenta, dilatanda sunt, vt melius respiret, & minus comprimatur pars affecta. Commune remedium in animi defectibus omnibus est, statim corpus extendere, & ita collocare, vt caput sit depressius reliquo corpore. Id puto fieri, quod in ea constitutione, paucus sit calor mouens ad partes superiores sanguinem, venæ & arteriæ concidunt, & propter duas illas causas sanguis venarum & arteriarum retractus ad cor, non potest ad caput recurrere. Cum autem depressius est, sanguis ille defluit ad partem decliuem, vt liquida omnia facere solent. Sed cum ista facimus, non sunt alia negligenda, neque longius portandi, sed eo in loco prosternendi, in quo corripuntur animi defectione.

De Diarrhea.

C A P. XVIII.

Diarrhea symptoma est multos morbos sequens. Dicitur Latinis alui profluuium. Nam in diarrhea maior copia humorum fluit, & reicitur per alium, quam *Distinctio* in lenteria, vel dysenteria. Facile autem discernitur *diarr. dys.* ab istis. Nam in lenteria alimenta, vt assumpta sunt, *et lenter.* aut parum immutata, reiciuntur: in dysenteria primum redditur mucus intestinorum, deinde pinguedo, tertio quedam ramenta, vel aliquid sanguinis: in diarrhea autem redduntur multa liquida recrementa. Et quia à diuersis causis prouenit, diligentissimè debemus perquirere omnes causas, vt à qua fiat, agnoscamus. Fit autem

*Causse
diar.*

propter morbos ventriculi & intestinorum, aut propter defluxionem humorum in ventriculum, & intestina. Fit & propter alimenta corrupta, vel ob plenitudinem, & multitudinem recrementorū. In principio vel declinatione alicuius morbi acuti accidere solet, vel post diuturnos morbos varij & diuersi humores purgantur. Ob id considerata sunt recrementa, quæ reiciuntur. Illa enim poterunt nobis indicare, à qua parte fluxerint, vt

*Signa di-
ar. capitis*

si spumosa fuerint & pituitosa, diarrheā fieri ob defluxum à capite factum significat, vt Hipp. aphor. 30. libr. 7. scripsit. Agnoscitur & ex iis, quæ circa caput apparent, vt grauitate, multitudine spuri, & quod mane magis fluat & noctu, quàm alio tēpore. Hæc species diarrhez longo tempore durat, & qui hac laborant, sentiunt ob pituitam fluentem ad ventriculum, dolorem, cruditatem alimentorum. Non multum sitiunt & sunt somnolenti. Quod si excrementa alui biliosa sint, & male olentia, tunc considerandum, an adsit febris, vel iecoris inflammatio. Nam odor ille grauis putredinē semper indicat. Putredo autē semper febrem adfert, vt & interna inflammatio. Cum tale apparet recrementū, considerandum, quo tempore cœperit fluere. morbi naturam, & partem inflammatam. Nam multum refert, si in principio vel declinatione talia reddantur, & si in inflammatione hepatis, vel pulmonū, vel si fiat in hydrope & phthisi & febre hectica, vel aliqua specie febrium biliosarum. In illis enim utilis est diarrhea. Si in declinatione apparentibus signis coctionis accadat, & in principio etiam, cum magna plenitudo adest, in morbis autē, qui cum tabe & atrophia iuncti sunt, mortem, vt Hipp. scripsit de tabidis Aphor. 14. lib. 5. quod nō solum de phthisi est intelligendū, sed de omni atrophia, vt in feb. hectica, hydrope, & aliis multis. Significat enim summam imbecillitatem partium naturalium, & potissimum facultatis retricis. Ferè omnes hydropicos diarrheā mori obseruauī. Partem vero inflammatam considerare oportet, quia in inflammationibus hepatis, splenis, ventriculi, & omnium partium naturalium diarrheā in declinatione est utilissima, si notæ concoctionis appareant. Quod si in inflammationibus pulmonum & costarum accadat, inutilis & pericu-

*Quibus
Stilis di-
arr.*

periculosa, quia nihil à partibus inflammatis euacuat, & corpus liquefacit: Id quod prudenter monuit Hipp. Aph. 17. lib. 6. Morbo laterali, vel peripneumonia correpto, &c. Si recrementa putrida fuerint, feb. nō adfit, neq; sentiatur dolor in aliqua parte, argumento est, illa fuisse diutius retenta à contractione alui, vel à corruptis alimentis fieri. Confirmabit coniecturā nostram, si quibus alimentis prius vsus fuerit æger, sciamus, vt si faciliè corruptibilibus qualia sunt pepones, cucurbitæ lac post cibos alios assumptum. Vel si comederit carnes perdicum diutius asservatas, & aliarum zuticularum, quarum substantia faciliè alteratur: aut nimis humida, quæ cum faciliè corrumpuntur, à natura reiciuntur, vt pisces. Alimenta acrida & salsa diarrheam aliquando faciunt, cum corpus recrementis redundat. Fit aliquando à diarrheâ ob ventris contractionem externam, vel à medicamentis, vel ab aere nimis cōstringentibus. Ea causâ procatarctica faciliè dignoscitur ex præcedentibus, & maximè fit post medicamentum purgans, si aëri frigido se exponat, vel si medicamentum effrene fuerit vt colocynthis malè præparata. Tunc iudicamus ventriculum esse causam diarrheæ, aut intestina, si nulla ex prædictis causis præcesserit, nullusque dolor in alia parte sentiatur, & sit ventriculus supercalfactus. Nimis enim calfaciendo, alimenta corrumpit. Aut propter intemperiem frigidam, multitudinēq; cibi nō potest cōcoquere. Sed illa causâ magis lienteria facit, quā diarrheâ. Intestinorum etiam laxitas, imbecillitas, & intemperaturæ, in causâ esse possunt.

*A corrup.
alimen-
tarum.*

*Ab ali-
mentis a-
cribus.*

A multitudine humorum agnoscitur fieri, si singulis annis bis aut ter soleat fieri, natura sese exonerante li-
quidis & serosis humoribus, & notæ illius redundantia appa-
ruerint, præcesseritque victus ratio talia gignens. Nulla talis euacuatio subita retinenda est, nisi in phthi-
sica, & quibus minùs conuenit, vt in inflammatione pul-
monum, & costarum. Quod si moliaris aliquid ad re-
tentionē, in principio oportet sint imbecilliora reme-
dia, vt quæ ad extrâ ponuntur, & datis quibusdam leuiter
astringentibus alimentis id faciendum, vt id, quod in gra-
cilioribus intestinis iam defluxit, non retineatur. Qua-
re in eiusmodi causis probò vsus lactus cocti, vel caly-

*A multi-
tudine.*

Topica.

beati cum paucō saccharo. Lac verò min⁹ coquitur in principio, vt magis detergat, postea multū vel ferro candente, vel lapillis serosa substantia absumatur. Lac caprinum vel ouile, vel vaccinū, nō asininū (quia nimis ventrem turbat) conuenit. Ad extra apponenda sunt illa medicamenta, quæ robur ventriculi augēt, constringendo, exsiccando, & modicē calfaciendo. Ob id oleum ros. omph. mastich. cum ol. de absynth. vel nardi, & paucō vino in principio, postea cum aceto, partibus ventris inferioris inuugendis conueniunt. Si ob humiditates, vel partiū laxitatē fiat, sacculi resiccantes conueniūt, vt ex milio torrefacto, vel oriza, vel lentibus cum sale, vel sine sale irroratis in sartagine cum paucō vino. Si vires deiciantur, & morb. hæc inferiora, & imbecilliora remedia negligat, ad fortiora transeundum est, vt ad vnguenta, forus, vel cataplasmata, quæ vim astringendi habeant, oleis que supradictis adduntur olea cydo. lentisci, myrt. & augetur quantitas aceti ros. Fiunt vnguenta, emplastra, & linimenta, qualia fuere descripta cap. de cholera morbo. Si à multitudine humorū fiat, fluatque sufficienter, danda erit opera, vt corpus alimētis crassioribus nutriatur, & humoribus acrimoniā alimētis potius frangamus, quā medicamentis astringentibus retineamus. Quod si cognouerimus purgationem sufficienter factam, medicamentis suprascriptis constringere tentabimus. Et quo securius ista astringētia adhibeantur, utilissimum erit dare prius leue quod medicamentū, laxās & astringens, vt si quid restet euacuandū, euacuetur, vt certius cognoscamus euacuationē esse factam humoris defluxu. Sunt autem conuenientissima remedia, quæ parantur ex rhab. myrob. mastiche, ex quibus pilulæ confici possunt, quæ in omni defluxu ventris tuto dantur.

R. myrob. citrini chebulana 3. β. mastich. ʒ. j. spice nardi ʒ. vj. cum syr. ros. lax. fiant pilulæ, de quibus capiatur 3. β. pro prima vice, deinde 3. j. si opus fuerit reiteratione. Si fluxus perseveret, appareatque humorum redundantia, certissimū indicium perfectæ purgationis est, si ægri fuerint citra febrem, vt Hipp. de medicamentis dixit, lib. 4. Aphor. 19. In his optimum est clysterem deterforium ad abluionē iniicere, & statim post astringentia

gentia supra ventrem, & circa sedem apponere. Vtitur etiam frequentius clysteribus istis detergentibus, quando non licuit medicamentum dare, vel ob virium imbecillitatem, vel ob ægri difficultatem. Parantur autem ex decocto hordei & ros. cum melle ros. Fiunt etiã ex sero lactis cum sacch. & melle, vel ex iure carnis non pinguis cum melle & sacch. ad maiorem quantitatem, quàm in aliis, quia minùs deterget ius, nisi accipiatur ius galli antiqui, aut concharum marinarum, vel mytulorum. Detergunt enim citra magnã attractionem, vel irritationem. Olea in his clysteribus non sunt ponenda. Dantur etiã in fluxu ventris clysteres, cum difficilè humor euacuatur, & cum torminibus ob flatum, aut materiæ visciditatem. Tunc ad doloris sedationem oleum anet. vel chamo. misceri potest, & maiorem quantitatem sacch. aut mell. aut aliorum detergentium oportet addere. Si materia acris & mordax sit, decoctum ex hordeo mundato est faciendum, & vitelli ouorum adiiciendi, qui & mitigant dolorem, & humoribus euacuandis permixti, faciunt vt facilius reddantur. Si crassi & viscosi humores sint, nec facilè descendât, hordeum integrum decoquitur. In quibus constringere, & detergere volumus, addimus ros. in fine, quibus abstinemus in principio, quia magis est detergendum, quã constringendum. Brodium, ius carniuum, ex quo parantur clysteres, si ad dolorem, & detersionem sumatur, pingues esse possunt, sin ad detersionem solam, pinguedo omnino est auferenda. Si pro dysenteria facta, aut quæ incipit, ius debet parari ex parte illa renum veruecis bene pingui. Seuum enim illud primùm confert ad inducendas partes, ne ab acrimonia humorum fiat vlcus, aut factum exasperetur.

Hæc satis demonstrata sunt à nobis lib. de componen. medicamentis. Cum est astringendum, oportet vel leuiter constringere, vel fortiter & tenuibus, vt ad partem illam intestinorum facultas astringens penetret. Nam si cōstringantur partes externæ tantum, fluxus ventris maior fiet. Quæ enim constrictio fit à musculis epigastri, excretionem auget, vt Gal. 1. ad Glauc. obiter annotauit. Ob id oportet talia esse tenuium partium, vel acetum misceri, vt facultas descendat ad partes illas

profundas. Ego sæpè in talibus medicamentis ab alijs præscriptis, solo aceto addito, fluxum ventris compe-
scui. Vtatur ergo præscriptis alijs addito aceto Fiant
fotus ex astringentibus, vt ex radicibus, herbis, fructi-
bus, floribus, & alijs resiccantibus, & astringentibus.
Nam quæ potentissimè siccant, astringunt.

℞. radic. bistortæ, quinque folij, vel tormentillæ ana
℥. iiij. cort. mali, granati, balaustiorum an. ℥. iiij. absynth.
ficci & mentæ siccæ ℥. ij. flor. ros. P. iiij. semin. myrti ℥.
j. fiat decoctio in aqua cisternæ, & pauco aceto, cū præ-
dicta decoctione fiat fotus. Macerentur radices in aqua
& aceto, priusquam decoquantur. Foveantur venter &
partes sedis. Possunt fieri ex residetia huius decocti, ca-
taplasma, diligenter contundendo, & per cribrum trās-
mittendo, & seuo hirci excipiendo, idque applicetur vē-
tri. Vel fiat decoctio ex fructibus, eodem modo paretur
fotus & cataplasma, semper addendo aliquid olei de
absynthio, vel de menta, aut aliquid foliorū absynthij,
aut mentæ, vt facultas coctoria & retentrix iuuentur.

Præstantissimum paratur sic.

℞. cotoneorum, vel pyrorum, vel sorb. vel mespil. vel
daetyl. viridium lb. j. macerentur in aceto, & aqua ci-
sternæ, & in iisdem decoquantur, addendo rosarum ab-
synth. ana M. j. cymini ℥. iiij. fiat decoctio, pistentur dili-
genter, & adde acaciæ ℥. ij. mastich. ℥. j. coralli & spogæ
bedeg. ana ℥. j. β. garyoph. spicæ nardi ana ℥. j. ol. ros. om
phac. myrtill. ana ℥. iiij. incorporentur, & reducantur ad
formam catapl. addendo ad maiorem consistentiā, &
adhærentiā, panis candidi lb. ij. in decoctione extendat-
tur supra totum ventrem. Accōmodari potest omnibus
fluxibus ventris, nisi quòd in diarrheā magis constri-
gendum, in lenteria magis calfaciendū, & corroboran-
dū: ob id cyperū, galang. nardū, garyo. & mast. in maiori
quantitate ponimus. Ladanum hypocist. & huiusmodi,
calida & constringentia. In dysenteria verò magis re-
siccamus constringendo. Ad intra damus aliqua alimēta
mendicamentosa, quæ sunt palato grata, vel sunt omni-
no saporis expertia. Ob id fructus illos astringentes, in
iufculis decoquendos imperamus recentes, vel exsicca-
tos. Quòd si penuria horum laboremus, succum cydo-
niorum

niorum in iusculis addemus. Ponimus etiam in polentis corallum vstum, cornu cerui vstum, aut pul. fructuum astringentium exsiccatorum. Et hæc tantum admiscemus alimentis in prima mēsa, vel manē. Damus farinam hordei coctam in furno, vel orizam, quæ nutriunt, & exsiccant, atque per consequens astringunt. Damus etiam aliqua medicamenta, parata ad constringendum, vt manē syr. cydo. vel myrtil. vel de ros. siccis, cū aquis herbarum astringentium, vel fructuum. Aqua absyn. his permiscenda est, quæ magis astringit, quàm ipsa herba, & vim aliorum medicamentorum deducit ad hepar, & alias partes naturales. Vulgus medicorum plurimum facit syr. de ribes, quem nesciunt ex quibus pareretur, & non habent, nisi adulteratum. Nam qui illum ad nos afferunt, ex vna tb. cōficiunt tb. x. Quare satius erit nostris syr. & aliis remediis, quàm istis adulteratis vti. Fiunt opiata ad constringendum, & corroborandum partes, vt ex carne cydoniorum condit. carne corticis citri, vel myrob. condit. prius lotis, & alijs constringentibus, vt

℞. carnis cydon. conditorum in frusta ʒ. j. corticis citri ʒ. ʒ. pul. coral. rub. ʒ. iij. acaciæ ʒ. j. syru. cydon. q. s. fiat opiata. His addi possunt pul. resiccantes, vt pul. diama. diacytonites, & similes. Vtuntur aqua ferrata, vel cisternæ. Cibos assumant, quasi frigidos, abstineant à iusculis, & alijs liquidis alimentis. Si autem fiat per defluxionem ab aliqua parte, remedia etiam erunt accommodata partibus, vt si fuerit biliosa, argument. est ab hepate defluere. Quare cucurbitula super illam partem apposita post sufficientē euacuationem, fluxum humoris poterit cohibere, & erit interea venter cohibendus astringentibus. Si autem à capite defluat, frequentius erit euacuandum pilulis & mastiche, vel pilulis præscriptis à principio capitis, addito aga. Utendum erit caput purgiis post pilulas, vel masticarorio ex mastiche, vel cubebis, vel nucemoscato. continuando per tres vel quatuor dies, & quinta, vel sexta die capiant theriacam aliquam, vel mythridatium. Hæc enim multum exsiccāt, multumque conferunt, vt & aurea alexandrina. Sacculi supra caput exsiccantes sunt apponēdi, vel emplastra exsiccantia, vel suffumigio exsiccare, vel lixiuio, vel pulue. capitali. Sacculi

*Vitus ran-
tio.*

A capite.

conficiuntur ex milio. punico & multo sale, & calidi supra caput applicantur, vel ex floribus & seminibus.

R. florum stechad. anth. an. p. iij. furs. macri, hord. vel frumenti M. j. frigrantur in sartagine, irrorando vino generoso. Et sacculi applicentur supra caput. Possunt etiam fieri emplastra duorum generum, alterum est attrahens, alterum constringens & exsiccans. Primum conficietur ex gummi attrahentibus, vt

R. gum. ammo. bdellij opopan. ana ʒ. ss. mastic. ʒ. j. extendantur super alutam pistillo calido, & supra commissuras, coronalem & sagittalem applicentur. Ob id emplastra ad formam hanc. T. fieri debent, vt partem futuræ coronalis & obeleæ contingant. Vel fiant ex pice liquefacta, & remollita ol. nardino, addendo si diues sit, pul. garyoph. nucis mosc. an. ʒ. j. pro ʒ. j. piscis, mosci ʒ. j. applicetur loco dicto. His aliquando additur stercus columbarum. In multa humiditate cerebri, hæc emplastra efficacissima sunt, quæ parantur hoc modo, vel etiam emplastra, quæ parantur in officinis lachrymas recipientia, quale est illud ceroneum dictum. Adhiberi verò debent, quando à recrementis genitis ab intemperie cerebri fluxio fit. Nam si dolor capitis, vel effusio ad cerebrum, etiam si absque dolore sit, in causa fuerit (vt solet fieri in his qui hepar, cor, renes, & alias partes calidiores habent) his abstinere debent. Nam caput tales vapores aut fumos, magis traheret, sed tunc aliò emplastrorum genere vtemur, scilicet, resiccantibus, & constringentibus leuiter. (Nam quæ fortiter constringunt, cerebrum comprimendo fluxionem augent, maximè si ante purgationem corporis, & capitis adhibeantur) vt empla. pro matrice, cõtra rupturam, quæ quanquã nomen habeat ab aliqua parte, vel affectu, aliis tamẽ partibus & affectibus conueniunt. Vel fiant his similia ex astringentibus resiccantibusque, permixtis quibusdã calidis ad penetrationem, vt

R. nucum cupress. rad. bistor. spong. bedeg. an. ʒ. iij. ros. galla. chalcitid. alum. an. ʒ. j. carioph. nucis moscat. & cypri, ros. rub. coriandri ana ʒ. j. fiat pulvis subtilissimus & cum sufficiente quantitate olei nardi. ceræ, & resinæ, fiat emplastrum pro cõmissuris: vel applicetur parti capitis posteriori, aut anteriori tonsis capillis è regione futurarum

rarum obelez & lambdoidis. His qui consueuerunt abluere caput optimum erit parare lixiuium ex cineribus quercus, & aliis astringentibus, vt nucibus cupressi, vel nuc. nucum, & lixiuiio addere salis M. j. vel decoquere flores fabinz, an. hos, stechad. & ros. & diligenter abluere caput tali lixiuiio, post exsiccare. Pul. tenuissimum capitum pergere possumus loco lixiuij vt

R. cyperi, nucis cupressi, nucis mosc. galand. ros. massic. ana 3. ij. myrtil. granorum tinctorum an. 3. j. s. flori ũ saluiz 3. j. cornu cerui, vsti, salis torrefacti ana 3. iij. fiat pul. tenuiss. quo sinapizetur caput sero & manè, vel ex sulphure, sale, chalcit. parari potest pul. pro pauperibus & multum humidis. Vti possunt vnguento parato ex ol. nard. cydo &c. vt dictum est e. de imbecilli. ventric. citra manifestam intemperiem, & post vnctionem sinapismo ibidem præscripto. Hæc autem ad exsiccationem capitis sunt, interim tamen partem recipientem negligere nõ oportet. Pro capite fumigia efficacissima sunt, quia eorũ substantia & vis ad partes internas multam humiditatem habentes penetrat, nempe fumus cum aere attrahitur per nares ad vetriculos cerebri, & si Galeno credimus, aliqua substantia medicamenti, quod de nigella lib. de instrumento odoratus monstrauit Quare fumigia resiccantia esse debent, & astringentia, neque nimis acia, ne facultatem expultricem cerebri incitando, ea ad excretionem moueant. Fiunt autem ex his, quæ fuliginem procreare possunt, aut si propter eorum siccitatem effirmare non possint, aliis multum fumum facientibus debent permisceri, vel ol. confricati, vt fument. Valde enim arida, quia nihil humidi habent, fumum non emittunt. Fiunt hoc modo.

R. ladani depurati, hypoci. ana 3. iij. massic. thur. ana 3. ij. nuc. cupressi, nucis mosc. ros. coriand. ana 3. j. caryo. 3. s. fiat pul. crassiusculus pro suffumigio, imponendo carbonibus. In hoc neque nigillam, neque myrrham, neque gummi hederæ addimus, quia acia sunt. Posset etiam addi sandar. in morbo antiquo, quia valde exsiccatur, & ne sua acrimonia lædat, excipitur terebinthina, vel mutilag. gummi tragac. & sunt tro. Aut, vt diximus de aridis, oleo amygd. confricatur. Nullum est re-

medium ad exsiccandum cum hoc cōferendum, nisi ob fœtorem valde ingrātū esset. Quare ros. beniouin, styracem & odorata ei admiscemus. Fumigetur cubiculum, in quo dormire solet, vt inter dormiendum respirando sine molestia trahat. Pais recipiens interim non est negligenda, sed topicis remediis præscriptis ad ventriculi imbecil itatem ab intemperie humida vtendum est, & opiata ibidem præscripta ex assumendis, non pulueribus, quia salem & alia recipiunt, quæ minùs cōueniunt. Tali opiatae addenda est caro cydon. vel fiat sic.

R. confer. acori vulg. 3 ij. carnis cydon. 3. j. conf. flor. anth. vel stech. 3. ss. confec. aro. ros. 3. vj. diagall. 3. j. ciner. intestinorū gallinæ, coral. rub. vsti. 3. j. rad. bistor. 3. ss. misce, fiat cum syr. de menta, vel cydo. ca. 3. ij. duabus aut tribus horis ante pastum: vel cap. cochlear j. pul. parati ex cinerib. conu cerui, intestinorum gallinæ, & nucum cupressi, quæ multum vrenda sunt, ne aliquid fuliginis remaneat, ob quam pul. amarus reddatur. Vel abluatur cum aqua astringente, vt myrthi, de absynthio, prunellorum, & diuitibus parentur opiatae ex myrob. abluræ in vino astringente, & aliis prædictis. In hac specie plus prosunt quæ exsiccant, quàm quæ constringunt. Viā ur oriza torrefacta, sine pinguedine multa in iure cocta. Viatur farina hord in furno cocta, & pane exsiccatō in furno. Abstineant à iusculis pinguibus, acribus, cibos assumant infra satietatē. Vescantur alimentis exsiccantibus, vt assis, frequenter edant ventriculos gallinarum elixos, vel assos. Abstineāt à vino generoso, viatur crasso & astringente, aqua ferrata, vel cisternæ diluto. Fricent corpus, nō caput, quod videatur, ne multum calfaciant. Euitent insolationem, & radios lunæ. Cū verò medicamentū fortius propter suam quantitatem, aut malam qualitatem irritat facultatem expultricem, debilitatque re- tentricē, partes nimis relaxando calfactionē, aut humores acres cōmouendo, diarrhæam facit. Quare optimum est aquam frigidam, si medicamentum calidum fuerit, & acris reiecta sint excrementa, haurire. Deterforius clyster etiam iniiciendus, & constringentibus intestina, & ventriculum corroborari oportet. Theriaca danda est, maximè quando medicamentum venenosum est. Si

*Vitium
ratio.*

ob sic

ob frigus aeris nos ambientis, tunc alia ratione curandus est is affectus, auferendo causam quæ est constipatio cutis & constrictio partium externarum, ad quam sequitur expressio recrementorum ad intestina. & ventriculum. Corpus inungere oportet oleo chamomelino, & leni frictione humores ad ambitum corporis retrahere. Quod si ista non sufficiant, esset optimum sudores mouere, vel balneo, vel stupha, vel appositis calidis circa corpus. Deinde partes ventris corroborandæ sunt, internis, & externis remediis suprà scriptis.

De lienteria. CAP. XIX.

Lenteria intestinorum lienteria dicitur. Fit autem quoties alimenta in ventriculo non retinentur tandiu, quandiu possunt concoqui, neque intestinis superioribus, quæ eandem habent facultatem. Non retinent autem, quia partes illæ, quæ rugosæ & sinuosæ naturaliter sunt replentur pituita vel medicamento lubricante, atque ita fit, ut alimenta eodem quo assumpta fuere, modo citissime reddantur. Fit & aliquando ob alimenta nimis pingua, quæ partes illas nimis lubricant, ita ut retinere nequeant. Imbecillitas etiam illarum partium huius affectus causa est, qui & accidit propter obstructionem venarum mesaraicarum, & tunc chylosus fluxus fit. Fit autem incipiendo, aut post alios fluxus. Si post diarrheam, aut dysenteriam, aut longum morbum, lethalis est. Nam cum hi egeant magna virium reparatione, repararique non possint, nisi cibo & potu, hæc non rescient, nisi concoquantur, distribuantur, & assimilentur. In talibus enim hic affectus accidit, ob virium naturalium imbecillitatem, præsertim verò concoctricis & retentricis. Quare statim adhibenda erit cura, ut internis & externis, constringentibus medicamentis, & corroborantibus hic morbus castigetur, dictis cap. de diarrhea, de imbecillitate ventriculi ab intemperie frigida, vel humida, vel dicendis cap. de dysenteria. Si hæc affectio propter pitui- *Purgan.* tam lentam lubricantem ventriculum & intestina fiat, ante omnia purgetur medicamentis pituitosis, potissimum agarico tro. in melle infuso, & cum eodem melle propinato vel pilulis de hiera, de arom. cum agar. & mastiche. Post euacuationem & deterfionem dentur me-

*Concoctio-
nem iunā-
tia.*

dicamenta illa, quæ vetriculi cōcoctionē iuuare possunt vt confectio aromat. ros. diāgal. diarrh. ros. nouella. & similia A dextra apponentur emplastra illa suprà à nobis dicta, cap. de imbecillitate ventriculi, ab intemperie humida. In hac affectione plura calfacientia & corroborantia, quàm in alia specie fluoris alui esse debent. Ob id ceratum stomach. Gal. hic commendatur, & emplastrum diuinum, additis galanga, caryoph. & mastiche malaxatis cum ol. de mastich. vel de mēta. Cataplasma, quod parauimus adauctis odoratis hic conuenient. Item quæ ex pane, & odoratis præparantur, quale est hoc.

R. panis candidi lb. j. absynthij sicci, mentæ siccæ ana M. j. corticis citri sicci ʒ. ij. carnis cydonio. qr. j. corticis mali granati ʒ. j. fiat decoctio in vino styptico. Contundantur, & per cribrū mittantur, quibus adde ladani puri, & hypocistidos ana ʒ. ss. cyperi, galangæ, cariophyllorum mastichis, cardamomi, macis, nucis mosc. ana ʒ. ij. spicæ nardi ʒ. j. incorporētur simul, addendo olei de absynthio, & myrthini quantū sufficit, reducantur ad formam cataplasmatidis, applicentur supra totum ventriculum, vel fiat vnguentum tale.

R. ol. nardini, de absynthio, vel menta ana ʒ. ij. ol. cydoniorum ʒ. j. cariophyllorum nucis mosc. macis, galangæ, cinamomi, spicæ nardi ana ʒ. j. rosarum, florum cœnanthæ, id est, labruscæ ana ʒ. ss. ceræ quātum sufficit: fiat vnguentum, quo vngatur regio ventriculi. Item conueniet in diarrhœa, si pituitosa appareant recrementa. Si lienteria fiat ob alimenta pinguis, & oleosa, ab iis abstineant, & vtantur siccis, & spissis alimentis, quamquam illa difficillimè à ventriculo conficiantur, meliora sunt, quàm quæ citò nutriunt. Nam, vt Hipp. docuit 18. aph. lib. 2. Eorum quæ vniuersim & velociter nutriunt, &c.

*Vitrua-
tio.*

Cibi parati ex mica panis, semoula, aut aliis, quæ ex farina frumentacea parantur, optima sunt alimenta, si parentur cum iure gallorum, carne bubula potius quam vitulina, aut aliorum lactantium. Nam caro illa lubricitatem propter mucum inducit. Caro veruecis, ablata pinguedine, non est vituperanda. Alimenta assa sine lardo magis conueniunt. Oua indurata etiam profunt & alia alimenta, quæ in diarrhœa indicauimus.

Oportet.

Oportet alimēta in minori quantitate assumere, quā in aliis, vt auidius cibum appetant, & illum retineant. Erit vtilissimum cucurbitulam parvam apponere supra regionem ventriculi, vt diutius cibum retineatur, quod admonuimus cap. de vomitu. Fit aliquando lienteria ob multam bilem permixtam alimentis, vel affluxam in ecphyfim. quæ nimium, euacuando recrementa intesti-
norum, cibum facit descendere, priusquam fuerit perfecte coctus. Idem præstat saltatio multa à cibo, aut equitatio vehemens. Medicamenta etiam calfacientia post cibum assumpta, vt diatrium pip. diospolit. & alia quæ nimis incidunt, attenuant, & calfaciunt. quales sunt pul. à Medicorum vulgo præscripti, aut nimis constringentes, ita etiā fructus astringētes. Sed quæ ab aliis causis fit affectio, eis ablatis citò tollitur, nec diu perseverat. Fit & post veram dysenteriam, ob cicatricem, quæ nimium levis est & lubrica, ad cuius curationem commendāt practici vsum ciborum acriū, vt sinapi, cepæ, & alliorum, sed mihi parū videntur proficere talia. Nam vbi permiscētur humiditatibus corporis, suam acrimoniam amittunt, qua putant asperitatem induci. Et hoc tantum conueniret in superioribus intestinis, in quibus raro fit. quia in illis bilis non diu remoratur. Quare clysteribus id corrugare possent, & si tutum esset multū salis addere, melius esset, sed veremur ne talia pungant, expultricēque stimulet ad excretionem, fiatque nouus error peior priore. Si fluxus ventris sit chylosus, vel propter obstructionem venarum mesaraicarum, vel imbecillitatem hepatis non potentis trahere, fit. Quare si ab obstructione, dandæ erunt duæ, vel tres pipulæ de arom. vel de hiera. Si alius adhuc non multum fluxerit, etiam pilulas paratas ex 3. j. ag. ʒ. j. cinamomi, schen. cum syr. de bizatiis accipere possunt ad euacuationem pituitæ ventriculi, & intestinorum. Deinde dandi sunt syr. aperientes, vel de bizatiis, de radic. capil. ven. aut syr. de absynth. cum syr. acetos simpl. cum aquis aperientibus, vel cum decocto cyperi, cichorei, vel rubiæ maior. vel eryng. vel pastynac. agrest. Hec omnia aperiunt, & facultatē cōcoctricem non lædunt. Clarificandi erunt isti syr. & arom. cū pauco cinamomo, aut troch. diarrho. Deinde inungendus

venter ob. cham. cum vino albo, aut fiat vnguentum.

℞. ol. amyg. amaranthi ℥. iij. ol. nard. & cham. an. ℥. j. vini albi ℥. j. ℞. decoquantur leuiter, quibus adde cerę q. s. terebinth. abietinę ℥. ℞. spicę celticę, scēnanth. cyperi. galangę an. ℥. j. seminis apij, petr. ana ℥. ℞. fiat vnguentum, vngatur regio vētris circa vmbilicum. Nam in illis partibus obstructions aperiendę sunt. Supra ventriculum, magis constringere oportet. Quare si eodem vnguento vngatur ventriculus aliquo pul. astringente sinapizetur, vt pul. coralli cum garyoph. aut cum pul. cum granis myrthi, vel vuarum, aut aliorum astringentium. Danda sunt illa, quę leuiter obstructions aperiunt, de quibus plura dicentur cap. de obstructione hepatis. Hic magis aperiendum, quā constringendum est, quia medicamenta astringentia morbum augent. Sed quę nimis fortiter aperiunt, ventremque laxant, vt asarum, & similia, sunt fugienda, sic & dulcia, & alia nimis detergentia, quia alui fluorem augent. Dantur alia alimenta, quę sunt tenuium partium, & quę ad iecur possunt facile penetrare. Fugiant lenta, viscida, & crassa. Si ob imbecillitatem hepatis non trahentis alimentum, fiat fluxus chylosus, applicetur cucurbita supra iecur. Detur syr. & opiata, quę imbecillitatem facultatis attractricis castigare possunt, qualia sunt calida medicamenta & aperiencia. Nam iecur non attrahit ob caliditatem, vel propter obstructionem, aut satietatem. Quare ista calida & leuiter aperiencia, leuibus quibusdam astringentibus permixta, aperiunt obstructions. & distributionem alimenti ad iecur iuuabunt, & intemperiem frigidam emendabunt, sed de his suo loco.

De dysenteria.

CAP. XX.

Dysenteria vlcus est intestinorum ab humoribus aut medicamentis acris. Fit magna ex parte a bile, non raro a pituita falsa, interdum a melancholia per adustionem. Qualis sit, excrementorum color & tormina ostendunt. Quoniam hoc in morbo, ad partem affectā humores prauī defluunt, causā primū auferenda est medicamentis cholagogis, quę constrictionem quādam relinquunt, nec acrimoniam augent, nec multū laxant. Nam fluxum addere fluxui periculosum est.

Rhab.

Rhab. myrob. tamarindi conueniunt, minùs verò cath. quia nimia ventris lubricitas est fugienda. Igitur satius est cath. omittere, nisi tanta esset humorum copia in prin. Sed conuenientiùs vacuabitur sic.

R. rhab. 3. j. myrobal. citrinorum 3. j. aquæ capil. aut hord. perfectè cocti 3. ij. syr. capill. ven. 3. ss. fiat potus, qui poterit iterari, si morbus perseuerat. Non sunt imitandi Medici quidam nostri temporis, qui solent purgare hoc modo.

R. rhab. torrefacti 3. j. myrob. citrinorum similiter torrefactorum 3. ij. aquæ plantag. 3. ij. syr. de ros. siccis 3. j. addant etiam interdum semen nasturtij. Peccât enim tum quòd humorem vitiosum retinent, nimis astringentibus, tum quòd seminis nasturtij & reliquorum assatione medicamentum reddunt acrius propter empyreuma. Adde etiam, quòd vis rhab. & myrobal. exoluitur vstione. Illud etiam, quòd à nobis præscriptum est, bene purgat, & astringit satis. In principio oleo quandoque dare fortem expressionem rhab. Deinde rhab. in tota substantia. Si febris magna fuerit, aut ardor vehemens, addimus pulpam tamarindorum, vel semina berberis ad obtundendam bilis acrimoniam. Datur rhab. infusum potius, quàm in substantia, vel assum, vt à venis aliquid trahat, cum syr. ros. lax. Nonnulli sanguinis missionem impetrant, sed sine iudicio, & vtilitate, & cum magna ægroantium molestia. Vires enim deicit nec bilem, vt plurimum ex folliculo fellis fluentem retrahit, nec ad curationem vlcusis confert. Hoc autem intelligendû est de vera dysenteria, non de fluxu sanguinis siue dysenteria cruenta, quo casu venæ sectio commodissima est. Corpore purgato, vlcus sanandum est clysteribus primùm detergentibus, deinde sigillantibus. Terget hic sine acrimonia, ac ob id frequenter iniiciendus est.

R. hordei integri p. ij. fiat decoctio. In colaturæ lb. j. ss. diss. mel. ros. col. 3. j. vitel. quorum nu. ij. nulla hîc sunt astringentia, quoniam ea retinerent, quæ sunt excernenda. Nulla olea, nullæ axungię, quæ vlcus sordidum faciunt. Quòd si dolor magis vexet ægrum quàm morbus, tunc additur ol. ros. vel myrthinum, vel porci axungia, vt Gal. docuit. Ergo vnguentum ros. loco axungię

misceo, si quando flatus adiunctus sit, quod raro fiat, additur aliquid anisi vel cumini, & cum dolor urget, flos chama. & meliloti. Ardor plerunque magnus est, ob id decocto adiicitur vel plantago, vel eius succus, vel alia frigida, & leuiter astringentia. Vlcere satis deterfo, quod ex faniei paucitate dignoscitur, clyster iniiciendus est medius inter astringentes & detergentes, ut ab iis per medium ad illos transitus fiat, sic.

℞. hord. integrip. j. ros. rub. p. ℥. fiat decoctio in lb. j. diss. succi plantag. mell. ros. vel saccha. rub. an. ℥. j. vitellos ouorum nu. ij. clyster Hic & priores diu continendi sunt. Nam merè astringentes ante deterfionem multum nocent. Soleo tamen admotis astringentibus ventriculo, ventri, & renibus, excrementorum imperum prohibere hoc modo.

℞. ol. ros. myrtil. cydon. ana ℥. aceti ℥. j. misce, vngantur venter & renes. Id si non sufficit.

℞. gall. myrtill. nucis cupress. ros. rub. seminis berb. an. ℥. i. cortic. thur. coriandri an. ℥. ℥. coralli rub. ℥. ij. fiat pul. tenuissimus, quo sinapisetur post vnctionem. Vel fiat tale linimentum.

℞. pul. præscripti ℥. iij. ol. ros. omphac. myrtil. & cydon. ana ℥. ij. ceræ albæ q. s. fiat linimentum. Interdum oleis & succis astringentibus fouemus partes ventris, addito semper aceto, quod & astringit, & vim medicamenti ad partem affectam deducit Sed cum vtimur istis topicis clysteres non sunt omittendi, quorum constringentes & consolidantes sic sunt.

℞. hordei integri p. j. rosa. rub. p. ℥. fiat decoctio, & in libra vna colaturæ dissolue mellis rosati, & sacchari rubri ana ℥. j. vitellos ouorum N. ij. succi plantaginis ℥. j. fiat clyster. Prius istis diu oportet vti. Nam astringentes nihil prosunt, sed potius nocent ante deterfionem. Clysteres astringentes, & sigillantes tales sint.

℞. hord. integri ass. p. ij. taphi barbatum cum rad. linguz passerinæ, plantag. foliorum myrthi ana p. ij. ros. rub. p. j. fiat decoctio. In lb. j. ℥. diss. pingue. hirci ℥. j. succi plantaginis ℥. ij. fiat clyster. Vel sic.

℞. rad. consolidæ maioris, bistortæ an. ℥. ij. gall. nucis cupressi an. ℥. ℥. ros. rub. florū chameleontis an. p. ℥. fiat deco-

decoctio in aqua cisternæ. In lb. j. ss. dissolue succi plā-
rag. & sāguinariæ an. ʒ. j. pingued. hirci ʒ. ij. fiat clyster.
Aduerte, maiorem quantitatem clysteris iniiciendam
esse in hoc morbo, quā in aliis, vt ad lb. j. ss. aut ad lb.
ij quia inanita intestina tantum accipere possunt, & sic
melius tergentur, & astringentur. Pulueres clysteribus
non adicio, quia si remanerent supra partem affectā,
eam pungerent, & stimularentur, ac vix euacuarentur.
Quod si libet vti sanguine draconis, bolo armeno, ter-
ra sigillata, & similibus, infundantur in succis herbarū
vel in decoctione. Deinde colentur succi, aut decoctio,
& postea iniiciantur. Valde utilis est hæc potio.

℞. syr. de pap. ʒ. j. ss. syr. de ros. siccis ʒ. j. diamarg.
frig. ʒ. ss. boli ꝑ. ss. aquarum plantag. & caudæ equinæ
an. ʒ. ij. capiat dormiturus. Hæc potio humores incras-
sat, somnium conciliat, & astringit. Denique mirum in
modum prodest, vt sæpè sum expertus. Manè dentur
syr. astringentes & refrigerantes, vt de ros. siccis, cy-
don. myrtil. cum aquis similibus vt,

℞. syr. de ros. siccis, myrtill. an. ʒ. j. syr. de berber. aut
de agresta. ʒ. ss. aqua cuspid. ros. caudæ equinæ plan-
tag. vel linguæ passer. ad duplum. Fit etiam iulep. ex
succis herbarum, & aquis sic.

Succi burs. pastor. linguæ pass. depurati ana ʒ. iiij. a-
quæ cuspid. ros. vel myrtill. ʒ. iiij. succi citri ʒ. ij. sacch.
q. s. cla. cum pul. diamarg. frig. ʒ. j. Fiunt quoque con-
dita ex conferuis, pulueribus, & saccharo, quibus vtun-
tur in siti.

℞. Confer. ros. antiquæ ʒ. ij. confer. symphiti ʒ. ss. pul.
diamarg. frig. ʒ. j. ss. boli arm. coralli rub. an. ʒ. j. sacch.
ros. tabellati ad duplum omnium, fiat conditum quo
vtantur per se, vel cum aqua calybeata. Ex iisdem pa-
rantur opiata. Hoc tantum interest, quod in conditis
miscentur, quæ palato gratiora sunt, in opiatis verò
parum refert: ita vt etiam conueniant tro. de spodio,
de carabe, de terra sigillata.

℞. Conferuæ symphiti, carniū cydon. an. ʒ. j. pul.
tro. de terra sigillata, de spodio cum semine acétos. an.
ʒ. j. syr. cydon. q. s. fiat opiata, capiat manè duabus horis
ante pastum, ad quantitatem nucis.

Clyster abluens intestina, vulgò lauatiuus dictus ad absterfionem fit, sine tamen aliqua proritacione. Et hoc ab absterfuo differt, qui datur ad pituitæ absterfionem, fitque abstergentibus herbis, & facultatem proritantibus. Hic verò ex abstergentibus citra morsum. Et hoc facimus in dysenteria & tenasmo. dysenteria siquidem, vt vlcus est, omnino duplici abundat excremento, quod quidè auferendū est, antequam vtamur astringentibus, & sarcoticis, & eo vsq; his vtendum. Lauatiuus est, donec intestina omnino sint abluta. Conficitur autem ex decoctione hordei, melle ros. vitellis ouorum. Additur succus plantaginis, vbi videmus intestina aliqua ex parte abluta, tum vt aliqua fiat astrictio, tum vt intestina refrigerentur. Additur præterea mel cum succo plantaginis semper, donec vlcus sit sufficienter deterfum, eoque fit medicamentum compositum ex astrictione, & absterfione, quo vtimur ante clysterem constrictiuum & consolidatiuum, præceptum illud commune sequentes, ab vno remedio ad illud dissimile, per medium aliquod esse progrediendum, vt in inflammatione vtimur repellentibus simul, & digerentibus post repellentia pura, antequam solis vtamur digerentibus. Fit verò clyster sic.

℞. decoctionis hord. integ. ℥b. j. mellis ros. vel sacch. rub. ʒ. j. vitellos ouorum nū. ij. olei ros. ʒ. ij. misce, fiat clyster. In hoc vitelli ouorum abstergendo leniunt, eoque dolorem sedant, auferunt asperitatem, & coquunt. Oleum autem ros. refrigerat, dolorem sedat, & leuiter astringit. Sunt, qui loco decoctionis hordei accipiant decoctionem capitis veruecis, vel intestinorum. Præstat autem decoctum intestinorum ob similitudinem substantiæ, & pinguedinem eorum, & seuum, quod partes lenit exasperatas. Additur & in decoctione intestinorum hordeum. Cum volumus transire ad astringentia, addimus ros. succum & plantaginis.

℞. hord. integri p. j. foliorum plantag. M. ʒ. ros. rub. ʒ. j. fiat decoctio, in ℥b. j. col. diss. mellis ros. & succi plantag. ana ʒ. j. ol. ros. ʒ. ʒ. vitellos ouorum nū. ij. misce fiat clyster qui præscribendus est post præcedentem clysterem.

rem. Constrictius clyster ad ventris constrictionem præscribendus est duplex: Alius constrictius, in quo solum intendimus fluorem alui cōstringere, vt in diarrheæ, constâtque herbis, seminibus, & astringentibus. Herbæ in summa sunt omnes, quæ astringunt, vt bursæ pastoris, taplus, caules diutius cocti, folia sumach. myrthus, berberis, acetosa, lysimachia. Adduntur semina plantaginis, coriandri, fructus sumach. acetos. cupulæ glandium, galla immatura, glandes, pisidæ, rosæ albæ, & rubræ hoc modo.

R. tapl. barbati cum toto, radic. burs. pastor. hippur. acetosæ, fol. myrthiana M. j. seminis acetos. portulacæ, ana ʒ. iij gallarum, sorb. mespill. ana nu. xx. ros. rub. p. j. fiat decoctio, in aqua calybeata, vel pluuiali, in tb. j. col. diss. seui hirci ʒ. j. misce, fiat clyster. Alius constrictius & consolidatiuus, qui fit ex iisdē herbis, vt ex plantagine, polygono, foliis salicis, & aliis, quæ vim habent refrigerandi, & constringendi sanguinem. Additur in hoc clystere seuum hirci, quoniam coagulatur & concrescit citius ob siccitatem, & materiam terream, quàm aliud, concretum verò cooperit superficiem vlceris, & prohibet, quo minùs acrimonia humorū recrudescat. Vlceri quâdoque cicatricem inducit opera aliorū simplicium, quibus eo scopo vtimur, vt gum. arab. terra sigill. bolo armeno, mastiche, quæ omnia consolidant, vt

R. hippur. plantag. fol. myrth. sumac. tapl. barb. cum radica M. j. seminis berb. plantaginis, portul. coriand. ana ʒ. ij. florum ros. chamo. ana p. ʒ. vel ʒ. j. fiat decoct. in tb. j. colaturæ diss. acaciæ, hipoc. ana ʒ. iij. sacch. rub. vel mell. ros. ʒ. j. vitellos ouorum assatorum nu. ij. seui hirci, vel caprarum ʒ. iij. fiat clyster, vel fiat sic.

R. succi plantag. & polygon. ana ʒ. vj. ol. ros. ʒ. ij. seui hirci ʒ. iij. misce, & facta residentia adde pul. boli arm. sang. drac. vel lap. hematites, vel terræ sigillatæ, vel mastich. ana ʒ. j. Pulueres isti sunt subtilissimè terēdi, alioqui multum nocent vlceri pungēdo. Quæ viscida sunt, magis conueniunt, quàm nimis acida, propter læuorē, quem habent dissoluta, ob quem asperitatē non inducunt partibus, neque dolorem. Possunt & alia addi, quæ vim habent constringendi, & cōsolidandi, vel ladanum,

hypocistis & huiusmodi. Addit etiam Galen, aliquando pinguedinem porci, sed hoc tantum cum dysenteria magis est ab acrimonia humoris, quæ est obtundenda. Raro tamen ea utimur pinguedine, ob eius immodicam humiditatem. Ad sedationem enim doloris præstaret uti ol. ros. In deploratâ dysenteria, postquam optimè detersum vlcus est, si supprimi nō possit sāguinis fluor, cauda equina, & semine portu. plantaginis, & aliis astringentibus modò iniectis. Non imitandi veteres, qui sandaracā, auripig. calcē viam, & alia eiusmodi iniiebāt, in reliquas intestinorū partes omnes æquē agētia, ac in ea, quæ vlcera est. Quinimo in hoc casu solitus sum ungere imū ventrem, & posteriōrē partē ol. cydonio, & myrtill. ros. & aliis similibus astringentibus, cum multo aceto ad penetrationē, refrigerationē, exiccationem & repercussionem. Acetū enim insigniter astringit, proinde fluorem omnem compescit. Optimo autē successu semper propinaui poscam (quæ fit ex aqua & aceto) sāguinem spūētibus. Solent enim extingui sapa ignita aceto, & vapor inde elatus excipitur ano, in sella perforata sedente ægro. Potest simili modo alumen dissolui cum aliis astringentibus, & iniici, aut calx lota decies. Possit etiam in hos vsus accommodari ol. de hyperico, quod aptissimum est vlcerebus glutinandis.

De Tenasmo.

CAP. XXII.

Tenasmus affectus est recti intestini, diciturque assidua egerendi cupiditas sine magna euacuatione. Fit in principio: & post alios morbos, ut post dysenteriam maximè. Bilis enim acris & mordax, circa illam partem retenta, facultatem expultricē stimulat, & natura conatur expellere id, quod molestat. Et quia materia iā euacuata est, nihil reddi potest. Fit etiā a pituita falsa, vel lenta, retenta circa sedē. Fit etiam propter frigus externum partem illam constringens. Accidit & ob lapidē vesicæ magnū & inæqualem, qui sua inæqualitate pungendo vesicam pungit & intestinū, quod vesicæ adhæret. Idem facit calculus, & propter pōdus. Videtur enim ægrotantibus stercus aliquod circa sedem retineri, ob id stimulat ad frequentē excretionē. Fit & propter inflammationē adenarū, parastatarū Nam cum

cum materia acris est, & mordax, & rectū intestinum & penem simul afficit. Fit etiā ab vlcere recti intestini, & vermibus eiusdē. Item à stercoribus induratis, & retentis circa sedem. Dignoscitur hæc affectio, ex illa cōtentione excernendi. Causa autē inuestigatur, cum à procatartica aut interna proueniat. Nā si æger super lapidem frigidū sederit, aut in aëre frigido, aut vëto aliquo perflato, aluū exonerarit, vel vsus fuerit suppositorio, id ab ægri relatu poteris deprehendere. Itē si præcesserit dysenteria, vel medicamētum acre assumpserit. Sed si à pituita falsa, aut aliis causis proueniat, opus est maiore speculatione. Si pituitā reiiciat, dicatque se sentire morsum, à pituita fieri cōiiciemus. Si à stercore retento agnoscitur, quod diu æger nō assellauerit, recremēta sicca admodū, & sine muco reddere soleat. Si autē post recremēta indurata perseverauerit sensus ille, aut illa stimulatio, præcesserintque aliæ notæ calculi, vt urina retenta, urina turbulenta, & aliquando sanguinolēta, à calculo tenasmū fieri dicemus. Sin ab inflammatione parastatarū, adest penis distentio, & ardor urinae.

CURATIO.

Omnis tenasmus curatur auferendo causam. Quare si propter calculū fiat, impossibile est curari, non ablato calculo. Si ab inflammatione glādularum, aut sedis, adhibenda sunt remedia istis affectibus. Sed si affectio sit in recto intestino, vt bilis pro dysenteria, aut pituita falsa clystere detergente curabitur, iniiciēda verò pauca quantitas clysteris, quia extrema pars recti intestini tantū abluenda, sed frequenter iniiciendi sunt. Post vsū iniectionum sōuendæ sunt partes sedis eadem decoctione, vel si nimis stimulentur, addere etiā oportet aliqua sensum, & acrimoniā humoris temperatā. Clysteres detergētes erunt, quales diximus cap. de dysenteria. Valent etiā facti ex sero lactis cum sacch. vel cum melle, & vitellis ouorum. Quod si sit cum multo dolore, ol. ros. vel axungia porci miscentur. Quod si perseveret dolor, optimum erit sedere in decoctione intestinorum pingui. In hac decoctione sint malux, aut rad. alth. Quod si ardor sentiat, & caliditas præter naturam in ea parte, addēda erunt aliqua frigida citra astringētia.

tionem, vt fol. viol. cucurbitæ vel cucum. vel melonũ, vel lact. vel solani. Si pars fuerit deterfa, & dolor fedatus, constringentibus leuiter pars erit corroboranda. Quòd fi fequatur recti intestini relaxatio, & procidentia, curetur, vt proprio loco dicemus. Si à frigore externo factus fuerit morbus, optimum erit federe in aqua calida, vel in ol. dulci calido, vel fouere vino. Quòd fi morbus non expurgeretur, addemus quædam calfacientia, vt flores anthos, stechad. herbas calfacientes, vt pulegiũ vtrunque, orig. hyss. meliffam, saluiã, &c. Vel inungantur partes perinei, quæ sunt circa sedem, aliquo ol. calido, vt anethino, rutaceo. Si à recrementis retentis & induratis fiat, remollienda est pars, & relaxanda. Quare iniectio olei communis cum pauco vino vtilissima erit, vel decoctum pingue cum pauco sale & oleo, vel decocto maluarum, viol. branchæ vrsinæ, & mercur. seminis lini & fœnugræci. Quòd si non reiciatur istis clysteribus, addenda erunt aliqua magis relaxantia, vt cassia, benedicta, hiera. Idem erit faciendum in multa pituita viscida retenta circa anum. Medicamentum acre si fuerit huius affectus causa, detergendum est medicamentis præscriptis ad humoris acrimoniam, deinde aliqua pingua sunt iniicienda, vt butyrũ dissolutum in brodio pulli, vel axũgia porci, vel oleum amygdalarum. Hæc enim pingua acrimoniam frangunt. Si ab vlcere acciderit tenasmus, ob id pus acre & retentum fieri solet. Quare clysteres ad paris deterfionem in principio iniiciendi erunt, aucta mellis quantitate, aut sacchari. Vel additis vnguentis deterfiuis, quæ vlcus detergendo hoc symptoma auferunt. In principio, quia vlcus magna ex parte solet esse sordidũ, vnguentum ægyptiacum cum multo melle iniiciendum est, aut vnguentum apostolorum eodem modo præparatum. Sensim minuere oportet eorũ acrimoniam, quæ iniiciuntur, quia omnia vlcera post deterfionem magis dolorem sentiunt. Vlcus postea curatur ea ratione, quæ postea docebimus. Sed ad tenasum & vlceris curationem multũ confert talem facere iniectionem.

℞. hord. torref. p. ij. foliorum myrthi, oleæ, agrimonia M. j. florum centaurij minor p. j. ros. siccatum p. ss. absyn-

absynthij tertia m partem M. j. fiat decoctio, in hydro-
melite, & frequenter iniciatur, donec vlcus detersum
fuerit augendo, vel minuendo mel pro deterfione facta.
Quod si in hac iniectione vnguentum pompholig fide-
liter dispensatum dissoluatur, vlcus etiam curabit. Idē
facit emplastrum diapalm a, dissolutum in multo oleo,
ita vt iniici possit. Idem præstat vnguentum diuinum,
additis 3. ij. chalci. A vermium motione, & morfu circa
anum si fiat tenasmus, inicienda erunt medicamenta
valde amara frequenter, vel decoctum absynthij, mar-
rubij, persicariæ, centaurij minoris. & in col. dissoluēda
myrrha, aut fel bouis. Olea etiam addi possunt, vt ol. a-
mygd. vel de absynth. vel parum ol. de iunipero vel pe-
trolei, vel olei de spica. Satis est accipere 3. j. vel ij. ho-
rum cum aliis propter eorum insignem vim. Benedicta,
hierapicra, & alia laxan. post hæc amara cōmodissime
iniiciuntur. Possunt etiam dari pilulæ, ex aloë, myrrha,
aga.rha. & aliis amaris.

De Ani præcidentia.

CAP. XXII.

Rectum intestinum relaxationē patitur, quando ad
extra propendit, neq; sursum post affellationē re-
trahi potest. Intestinum enim rectum longius est factū,
vt cum recremēta reddere volumus propellatur extrā,
ne stercorea remaneāt in sinu illo, qui est inter clunes,
quod vt fiat, natura apposuit duos musculos, qui ex v-
traque parte, ipsū retrahunt. Quare quod non retraha-
tur, istis musculis imputandū est, vel quod sint imbecil-
liores, vel resoluti, vel quia intestinum protēditur & in-
flatur, & ob tumorem maiorem suo loco reponi nō po-
test. Fit autem resolutio earū partium post longā na-
tationem in aqua frigida, propter longam moram su-
pra terram humidam, quæ intemperatura nervos ab
offe sacro ortos tenuiores resoluit. Fit etiā post dysen-
teriam & tenasmū propter illam cōtentionem in red-
dendis excremētis, aut difficultatem in reddēdis durio-
ribus. Quare manibus reponere ipsū sensim oportet, &
leniter comprimēdo. Quod si pars illa externa rugosa,
inquinata fuerit, vino abluēda est. Si verò ob paralysem
non retrahatur, locus fouendus est. Nam per commo-
diorem partem nō possumus partes resolutas exsiccā-

re, vt & vnguētis supra coccygem, & os sacrum. Sed prius tentare oportet euacuationem, quæ sit vomitu à cibo commodius agitante cibum, vel medicamento in forma syr. detergentis. & facile purgantis, quale hoc.

R. gly. raf. ʒ. vj. polyp. querc. recent. ʒ. iij. pass. sic. ana N. xxx. betonicæ, marrub. saluæ, merc. ana M. j. medullæ feminis carth. ʒ. ij. senæ orient. ʒ. j. flor. anth. stechad. ana p. j. fiat decoctio in lb. j. β. dissol. mel. q. s. fiat syru. capiat primum ʒ. sex: deinde vtatur digestiuo sequenti per tres dies. Postea tertio quoque die capiat de apozemate supradicto.

R. mell. ros. col. ʒ. iij. syr. stechad. ʒ. ij. decocti hyss. vel betonicæ lb. j. fiat syr. aro. & cla. cū ʒ. ij. diagal. Efficacius reddetur apoz. si aga. tro. decoquatur, quod siue vomitū faciat, siue laxet, non potest non prodesse. Corpore euacuato & exiccato, attenuante & exiccante victu vtatur. Fotu sequenti vtatur.

R. puleg. vtriusque, marrub. beton. chamep. primule veris, verbasci an. M. j. foliorum cupres. lentis. vel myrth. an. β. florum anthos stech. saluæ an. P. ij. fiat decoctio in aqua & vino. In prædicta decoctione sedeat, vel spongiis nouis foueatur pars. Eadem decoctio fieri potest in lixiuio parato ex cineribus cyprèssi, vel lauri, vel roris. vel lentisci. Post fotum reponatur & sedeat supra scamnum ex ligno nucis valde calidum, quātum ferre poterit. Possunt fieri suffumigia ex resiccantibus & calfacientibus partem vt,

R. nucis mosc. macis, garyoph. cyperi galangæ ana ʒ. j. flor. anth. stech. an. ʒ. β. cortic. thur. mastich. thuris masculi ana ʒ. iij. ladani puri, hypocistidos ana ʒ. ij. excipiantur terebinth. & pice, fiant troc. lupinares, qui imponantur carbonibus, & fumus recipiatur per scabellum perforatum. Frequenter manibus comprimatur. Fumigio vti debemus post repositionem. Nam multo melius reponitur, quando molle est, & humidum, quàm cum magis exsiccatum. Linimenta parantur ex resiccantibus & calfacientibus, quæ sunt tenuium partium.

R. mastich. nard. & costini ana ʒ. ij. vini generosi vel mal. ʒ. j. pipe. longi & nigri galangæ, costi, cyperi an. ʒ. β. decoquantur in duplici vase, & oleo illo inungatur regio

offis sacri, vel addendo ceræ rubræ vel viridis q. s. fiat unguentum. Adde tempore inunctionis aquæ vitæ parum. Post repositionem vitatur hoc cataplasf.

℞. vīnæ, herniaræ, an. M. j. saluæ minutæ M. ss flor. stech. & saluæ, ros. an. 3. j. decoquantur in vino, & applicentur supra partem ad formam cataplasmatidis, vel contundantur & excipiantur terebint. vel pice liquefactis in ol. myrth. aut mastich. & reducantur ad formam emplastrī. Aliud efficacius.

℞. sterc. lacerti 3. iij. sterco. colum. & hyrund ana 3. j. sterco. capræ 3. ij. excipiantur terebinth. & applicentur supra os sacrum coccygémque. Possunt etiam dari, quæ fuere præscripta cap. de procidentia vteri.

De hæmorrhoidibus. CAP. XXIII.

Hæmorrhoides nihil aliud sunt, quàm venæ sedis dilatatæ aut factæ varicosæ. Fiunt autem iis porissimum, qui cum magnis conatibus & expressionibus intestinorū recremēta reddunt, mulieribus quæ frequenter & difficulter pariunt: qui flatulenti sunt, & cachexia laborant, vel qui calculum, aut vlcera penis, vel recti intestini patiuntur. Harum multæ sunt differentiæ, quæ à situ sumuntur, à calore, asperitate, vel à symptomate. A situ quòd aliæ sint internæ & non appareant, aliæ externæ, & circa sedem apparentes. Quare opus est distinctione ad diluendam quæstionem, num à vena caua, an à porta oriantur Nam internæ fiunt ex venis intestinorum, quæ mesariacæ dicuntur, aliæ autem à venis distributis circa sedem, quæ per eius loci pinguedinem perueniunt ad cutim. Ob id venæ internæ iis, qui laborant cachexia, frequentius aperiuntur, & iis qui difficulter excernunt, vel mulieribus, quæ difficulter pariunt, aut iis, qui frequenter vtuntur alio. Fluxus internarū maximè conuenit affectibus melancholicis, tumoribus splenis, hepatis, mesenterij externarū verò in affectibus renum. Sanguinis verò reiecti colore & consistentia differunt. Nam qui ab internis fluit, splendidus & tenuis est: qui ab externis, colorem habet magis saturum. Sanguis enim dilutus permixtus multæ substantiæ serosæ, magis tenuis & splendidus est, qualis aliquando redditur in fluxu hepatis. Nam sanguis venarum mesariicarum, ru-

dem tantum formam habet : qui verò ex ramis venæ ca-
uæ defluit, magis concoctus & elaboratus est, vnde &
color magis exiaturatus. Differunt tertio, quod aliæ le-
ues sint, vniſq; ſimiles & leuitate & colore: aliæ rugoſæ,
quas practici morales à moris vocant, vt alias vuales ab
vuis. A ſymptomate verò, quod aliæ ſint ab inflamma-
tione, aliæ ſine. Item aliæ ſanguinem effundunt, & no-
men generis ſeruant, aliæ nihil excernunt, & ob id cæcæ
dicuntur, quæ dolorem vehementiſſimum inducunt.
Fiunt per iſtas ſanguis per diauroſim, dianastoſim,
aut diapedeſim. Hi verò modi ſic deprehenduntur. Si
ſanguis ſit aquoſus, & paucus, per reſudationem fit: ſi
per anastoſim, paulo craſſior eſt, & in maiori quanti-
tate, & in forti compreſſione guttatim defluit, & nō niſi
cū redduntur excrementa alui. Si ob arroſionem venæ,
præceſſit vlcus circa ſedem, ſanguis fluit craſſior, & in
maiore quātitate, & etiam ſine compreſſione. Fiunt hæ-
morrhoides in quibuſdam per interualla, in aliquibus
quarto quoque anno, in aliis ſingulis annis, vt in hiſ, qui
multo ſanguine abundant. Quare ſi quis velit illas inhi-
bere, duo ſunt faciendæ, mittendus ſanguis è brachio, &
medicamenta repellentia circa ſedem ſunt apponendæ,
iniunſq; eſt comedendum. Quod ſi iam factæ ſint, & præ-
humidæ, doloremque inducant, relaxandæ ſunt, & ape-
riendæ, ſi ſponte ſua non aperiantur poſt relaxationem.

*Inhibendi
modus.* Aperiantur autem multifariam, vt medicamentis arro-
dentibus, & acribus, & ſucco cepæ, fellibus porci, ſucco
cyclaminis, mequila colocynt. & ſucco aliarum herba-
rum acrium, vt chameleæ, thymeleæ. Apponuntur ſupra
magis tumentes, ſi extrâ appareant, ſi intrus lateât, bala-
ni conficiuntur, intrôque mittuntur, vel iniiciuntur cly-
ſtes ex ſuccis, vel decocto, in quibus diſſol. ſella vel be-
nedicta, vel hiera. Quod ſi appareât, melius erit ſanguis-
ſugam apponere, & extrahere quantū volueris. Et quan-
do non poſſunt hyrudines apprehendere, non eſt malū
ferro aperire parua apertione. Sin apertæ ſint hæmor-
rhoides, neque ſufficiens quantitas ſanguinis emittatur,
ſedeant in aqua, quoad videatur ſanguis ſatis fluxiſſe.
Quibus conſueuerunt fluere, & ob ſuppreſſionem mor-
bus aliquis obortus eſt, vel morbi diſpoſitio, vt lepræ,
cancrī,

canceri, sputi sanguinis, hydropis, &c. sunt aperiendæ. Aperiuntur autem mollibus & delicatis, qui venas admodum delicatas habet, si panno aspero, aut follis asperis, podicem confricent. Talia sint folia ficus, cucum. agrest. aut aliarum arborum, vel herbarum, vt borrag vel pãno infecto succo cepæ, vel centaurij minoris, vel felle, vel cyclaminis, aut aliorum acrium, vt brass. marinæ, chaniel. thymel. Nos aptionem tentare debemus, priusquam vehementissimus dolor oboriatur. In bene sanis, in quibus neq; propter cachexiam, aut nimiam plenitudinē inflantur, curari debent in totum à principio. Id cōmodè fit auferendo causam primariā, & corroborando partes sedis. Et si mulier ob frequentē partum, & difficilem dolorem vel fluxum hæmorrhoidas patiatur, post tertium aut quartum mensem, incipiat vti repellētibus, ne sanguis accumuletur, & vt pars cōstringatur, ne tempore partus tam facilè dilateretur, & sanguinem recipiat.

Topica.

Commodissimum topicum remedium erit, quod paratur ex musc. pillij, & aqua peculi ros. vel myrthi, vel plantag. vel solani. Ponitur supra stupas, vel pannum rarum, & post deterfionem podicis confricatur iis stupis vel panno, vel linimentum sequens.

℞. ol. ros. vel myrtil. vel cydonio ʒ. iij. aquæ ros. succi plantag. vel ceterac. vel ling. pass. vel solatri, vel semperuiui, vel vmbil. ven. ana ʒ. ij. coquantur olea ad consumptionem succorum, postea in mortario plumbeo agitentur, donec crassitiem quandam acquirant, & colorē mutant. Tali vnguento fricetur pars, vt supra dictum est de musci. Potest etiam addi aliqua pars muscil. vel albuminis oui, vel cerus. lotæ, vel litharg. diligentissimè triti. Procurent, vt alui excremēta semper mollia sint, vt cum *Quibus* facilitate reiciantur, quod fiet vsu panis ex secali, vsu *remollitur* pomorum coctorum, prunorū aut herbarum emollientium, vel molliter detergentiū in iure pingui coctarum, *Quibus* vt mal. lact. borrag. ciclæ, mercur. spinac. &c. Eadem faciendum *videndum* in iis, qui ob difficultatem excernendi inflantur, - *in his qui* Vtantur frequenter cassia ante cibum, aut aliis lenientibus aluum. Abstineant à suppositoriis acribus, sed consueant *rare egerunt.* ciantur tantum ex larido pingui, vel candela ex sevo. Si ad extrā sint, foris ex repellentibus & cōstringentibus

feri possunt. Si interne immittantur succi per syringam & vnguenta liquida, vel fiant tentæ oblongæ vnguentis, illitæ, & immittantur. Eadem vnguenta valent in principio doloris, quibus addi possunt vitelli ouorum, & albumina frequenter agitata. In vehementissimo dolore & tumore iamiam facto magnæ butyr axungię liquefactæ, aut pomata commodè iniiciuntur, vel lini semina aut foenug. muscil. applicantur. Quod si hæc non proficiant, ad ea, quæ magis à proprietate occulta, quam manifesta conducunt, deueniendum, vt oleum de vermibus, in quo dicuntur aselli (serpens vocant) vel ol. de chrysomelis (vulgò abrigots, vocant) quæ ego puto prodesse, quia degerunt aliquam portionem humoris serosi, & ol. relaxat partem distentam. Ob id ad doloris sedationem diligentissime inspicere oportet, si pars sit cum aliqua inflammatione. Tunc enim refrigeranda & relaxanda est. Nam constringentia & verè repellentia in dolore vehementissimo non sunt apponenda, nisi fluxus immoderatus iunctus esset, & qui rarò iungitur, nisi per arrosionem fluant hæmorrhoides. In dolore cum caliditate magna vti mur vnguento ros. viol. vel supra dicto linimento, parato in mortario plumbeo, vel simile sit cum ol. viol. vel succo hyosquiami in pauca quantitate ponitur, vel ol. mandrag. in vehementissimo dolore. Cogimur aliquando ob vehementiæ doloris opiū diluere in ol. viol. vel cham. vel viol. vel lil. & amygd. dulc. aut in muscil. foenug. & supra partem apponere cum pauco croco. Si sine magna inflammatione sit, potiusq; ob distentionem dolor fiat, oportet retrahere sanguinem, ne fluat cucurbita apposta supra iecur, & lienem, & linimento ex ol. ros. myrrh. & aliis cōstringentibus supra renes. Supra partem dolentem illinuntur olea superius enumerata, nempe lumbricorum, asellorum, & aliorum emolliētium, & digerentium. Vel fiant talia linimenta.

℞. rad. lil. ℥b. ꝑ. ol. amygd. viol. axung. porci ana q. j. decoquantur simul, deinde pistentur, & ad formam linim. reducantur, vel catap. addendo vitellos ouorū coctorum contusos similiter N. iij. applicetur supra partem, vel,

℞. radic. liliorum ℥b. ꝑ. ol. amygdal. viol. axungię porci ana q. j. decoqu. simul, deinde pistentur, & ad formam linimenti reducantur, vel catapl. addendo vitellos

*Quæ con-
ducit pro-
prietate
occulta.*

Linimenta.

tellos ouorum contusos N.iiij. vel,

R. musc. foenu. feminis lini extr. cum vino ℥.ij. butyr. recen. ℥. iiij. seui hirci ℥. j. simul agitentur in mortario plumbeo, fiat linimentum, vel,

R. vermes terrestres, vel sanguisugas N.xx. coquatur in oleo amygdalarum dulcium, & diligentissime conrundantur, & applicentur.

R. facis ol liliorum, & ol. hyperici an. ℥. iij. seui hirci ℥. iij. fiat ad formam linimenti. Linimenta magis conueniunt, quam vnguenta. Quod si vnguenta parentur ex metallicis aut similibus, oportet esse diligentissime trita, vt collyria, & dissoluta supra cotem. Sedeat in decoctione sequenti.

R. radic. bismal. mal viol. an. M j. flor. chamo. mel. samb. hyper. an. p. ij. feminis lini, foenug. an. ℥. j. fiat decoctio in brodio pingui intestinorum, vel in aqua, quibus adde axungiae porci lb. j. Dolor aliquando prouenit propter asperitatem, cum altera alteram tangit & confricat, ob id necesse est interponere bombacem intinctum linimentis appropriatis, vt si cum inflammatione, vnguentis scriptis ex succo, & albumine oui, vel ol. ros. vel viol. conueniat, vel muscilago psillij, & cydon. Si sine inflammatione, remedia, quae parantur ex muscilagine feminis foenug vel lini, vel ex seuo & adipe, vel terebinthina abietina mixta axungiae gallinae. Fluxus immodicus haemorrhoidarum statim suppressendus, quia toto genere praeter naturam est, & rationem causae habet.

Refrigerat iecur & totum corporis habitum, & vires deicit. Supprimatur autem diuersionibus. Diuertitur autem *Quibus* euacuando sanguinem extra corpus, vel trahendo in partem remotam. Si multus non fluxerit sanguis, corpusque *supprimi-* multo sanguine abundet, vires valeant, & aetas non dis- *tur fluxus* suadeat, vena brachij aperienda erit parua apertione, ne *immodi-* multus sanguis affarim fluat, & vt magis tenuis & se- *cus.* rosus fluat. Si vero vel aeger debilis sit, aut propter multitudinem sanguinis defluxi, fiant ligaturae dolorosae in extremitate digitorum. Apponantur cucurbitulae supra iecur & lienem, vel sub alis, vt sanguis extra trahatur. Nam si sanguis multus sit in hepate vel liene, per illam regionem ad sedem defluit: apponendae erunt cucurb.

*Post di-
uersiones
quid fa-
ciendum.*

sub alis, vel in ea parte thoracis, in qua musculus brachij positus est. Diuersione facta, & reiectis alui excrementis vnguentum illud præscriptum ex succis herbarum, in mortario plumbeo agitatum vtile erit. Efficacius verò redditur, si huic vnguento dissoluatur ouum integrum cum testa assum diligentissimè contritum. Quòd si testa non bene còteratur, dolorem faciet. Ob id prius probe- tur manu, num quid asperi reperiatur. Vel auferatur testa, & cuticula illa interna oui aspi, & diligentissimè se- orsum puluerisetur: postea reliquo ouo contrito permi- sceantur. Erit & efficacius, si cerusam & lithargyrum receperit, vt prius dictum est. Si addatur bolus armena aut terra sigillata, vel fabrilis præparata, erit efficacissi- mum, & si herbarum astringentium succum in eo vn- guento posueris, vt plantag. tapsi, bar. linguæ pass. burs. pastor. vt hoc modo.

℞. succi plantag. burs. pastor. & tapsi. barb. an. ʒ. ij. syr. acetos. simpl. ʒ. iiij. còcoquantur simul leuiter, in quibus misce sang. drac. ʒ. j. boli vel terræ sigill. vel rubricæ fa- brilis ʒ. iiij. radi. bistortæ subtiliter pul. ʒ. j. β. cerus. lotæ ʒ. j. simul incorporentur & reducantur ad formam lini- menti. Hæc vnguenta, quæ sine ol. parantur, magis con- stringuntur, quàm quæ cum ol. sunt. Syr. acetos. conue- nientissimus est, quia & repellir, & ob sacchari viscosita- tem arida retinet, & facit adhærere supra partem. Possu- mus etiam vsurpare syr. myrtill cydo. & alios astringen- tes, vel succos, vt cydon. aut aliorum. Sapa etiam quâdo sedandus erit dolor, & erit constringendum, vtilis erit ad excipienda medicamenta. Mucilagines etiam ad ex- cipienda omnia ista & repellendum cònvenient. Si san- guis multus & crassius fluat, argumento est, vt supra di- ximus, sanguinem per deaurosimum euacuari. Quare inspi- ciendus est locus affectus, num in eo vlcus aliquod appa- reat, quod faciliè videri poterit, si æger in sella perforata sedeat supra mensam, aut aliquo loco edito & in luce, & frequenter locus detergatur. Ita enim deprehendetur à qua parte fluat sanguis, & tunc vnguenta ad curationem vlcis præscribenda erunt, quòdque à nobis præscriptum est ex cerusa & lithargyro, vtile esse poterit. Vel illud, quod recipit testam oui, quæ testa crustam facit & san- guinem

*Sanguis
crassus.*

guinem à quacunque parte fluentem citissimè retinet, & sine magno morsu resiccat. Deterget, vbi est detergendum, & crustam facit. Pul. ex testa non est abiiciendus, quia sanguis, qui ab vlcere effluit satis obtundit acrimoniam eius. In fluxu immoderato, & in vlceribus possunt fieri encathismata, vel potus, & oportet illa remedia esse actu frigida, vt constringant. Calor enim semper dilatat, trahit, & fluxiones auget, sed illa actualis frigiditas subito constringit partes, & sanguinem repellit, facitque condescere, qui concretus postea alium sanguinem retinet. Quare non erit præter rationem, si pulueres constringentes sanguine proprio, vel suillo, vel bubulo, vel asinino excepti, supra partem apponantur. Fiant autem ex his quæ constringunt, & vlcerationis curationem non impediunt. vt

*Pul. ex
oui testa.
In fluxu
immodico
quid.*

R. rad. bistortæ lb. ss. rad. rap. s. barb. & suberisan. qr. j. calcitrapæ (quam puto esse veram spinam albam) M. ij. vel scorpiuron. M. j. vel burs. pastor. virg. pastor. vel hermaria, vel ling. pass. M. j. syderitis M. ss. decoquantur in aqua cisternæ, & paucò vino astringente, & pars foveatur, vel sedeat in decoctione, & super herbas decoctionis. Vngere totam lumborum regionem vsque ad primam costam ol. vel vnguentis cōstringentibus, & nates etiam, non est inutile. In hoc fluxu astringentia intus assumpta non multum valent. Nam si debilia sint, euincuntur, & inefficacia, priusquam partem affectam contingant. Si efficaciora sint, & multum constringant, constringendo sanguinem exprimunt, & fluxum augent, ventremque siccant. Quare satius erit illis abstinere, & potissimum pilulis de bdellio ad id commendatis, quæ quanquam valent, ad vlcera sedis, vteri, & aliarum partium internarum, si sanguis fluat, non possunt conuenire tales, quales sunt in officinis. Cum enim careant vero bdellio, myrrham, quæ bdellij modo lentescit, vsurpant, & sic illud medicamentum potius mouet, quàm sistat, vt nos sæpe experti sumus. Myrrha enim multum mouet sanguinem, vt patet ex tro. de myrrha, qui menses prouocant. Quod si quis velit ad vlcera, vel ad fluxum, paret sine bdellio, & eius loco ponat sanguinem draco. vel gummi tragac. aut arab. Hæc pilulæ sic paratæ exsiccant serosam sanguinis

*Vntio
lumborū.*

*Pilula de
bdellio in
offi. para-
ta nō sunt
ex vsu.
Myrrha.*

substantiam, & crassiore reddunt, vt de rasura ossis sepe diximus. Incrassantia sanguinem præstare aliquam utilitatem poterunt, vt si fieret hoc modo opiata ex emplasticeis & siccantibus.

*Opiata
siccans.*

℞. conf. symph. ʒ. j. ros. antiq. ʒ. ʒ. gummi tragac. arab. sang. drac. an. ʒ. ij. boli armeni ʒ. iij. cum syr. de iuiub fiat opiata, vtatur mane & ante cœnam. Potest etiam addi rasura sepiæ & carabæ an. ʒ. iij.

Victus ratio.

Vtantur pro cibo amylo, horð. medicamento vel pœlenta ex farina hordei cocta in furno, parata cum iure pedum veruecis, vel porci, vituli, vel bouis. Sunt qui voluerunt hunc fluxum deriuare, idque prouocando sudorem vel vrinas, quod fieri nequit. Nam quæ prouocant vrinas, vel acria sunt, vel humida. Acria, vt verè crientia vrinas, qualia sunt spica celtica, nardi, semina apij, petro. & similia. Illa verò sua acrimonia fluxionem prouocât. Quatuor verò semina frigida maiora, ob humiditatem faciunt sanguinem liquidiorẽ, & magis serosum. Porro quæ sudores prouocant, ea sanguinem fundunt. Quare nullum horum tentare oportet.

De Vermibus.

CAP. XXIIII.

Causa

material.

Vermes toto genere præter naturam sunt, ob id expellendi. Sunt autem tria genera, &, vt aliquibus placet, quatuor, scilicet. rotundi, longi, & alij parui albi similes vermibus casei. Tertium genus est illud quod à latitudine, latus vermis dicitur, potestq; vermis aut tinea appellari. Nam Græci tineam vocant fasciam oblongam & albam. Hic verò trium aut quatuor digitorum est, aut quinque, qui secundum longitudinem intestinorum extenditur, vel circumplicatur, vt longiores aliquando sint ipsis intestinis, vt qui tricenum sint pedum, vel plurium teste Plinio. Fiunt autem à pituita, vel à chylo viscoso. Quod si talis materia continua sit, & extensa, animatur non, vt Aëtius putauit, quando tunica intestinorum interior abscedit. Nam impossibile, tunicam illam abscedere, & accipere vitam. Aliqui putarunt cucurbituos esse foetus lati lumbricis, sed id falsissimum est. Nam nulla est sexuû distinctio, & ex putredine generantur. Alij autem dixerunt cucurbituos esse frustra lati vermis, sed neque

id

id verū est. Nam cucurbitui videntur esse animalia, non partes animalis. Fiūt omnes in putredine, quia vt Arist. docet, quod est putrefactum, ad aliquid gerendum est ineptum. Sed cū ex aliqua materia, aliqua animalia generantur, quia illud totum quod est in ea re benignū absorbitur, ad generationē animalis. quod superest, est veluti sæx vel recrementū, & redundans, quod naturali calore destitutum, facile putrescit. Fiunt in sacco magis, *in quibus* quā in alia parte lumbrici: Ascarides circa sedē: Latipartibus *partibus* secundum longitudinem coli. Si multi sint, qui chylum *gignitur.* assumant, corpus minuitur, aut laborant quasi vouldima ob assumptionem alimēti. Si quiescant in suis locis alimentoque abundant, nihil noxæ adferunt. Sed si soluantur ab intestinis, & ventriculum ascendunt, potissimum teretes per os & nares reiciūtur, vel si os vētriculi mordeant, animi defectionem inducunt. Dignoscuntur autem *Signa.* tum ex his, tum ex acore anhelitus, tussicula inani, & sicca quæ aliquādo nonnullos infestat. Cum clamore expergiscuntur, qui laborant vermibus, & profundē satis dormiunt. Patiuntur quendam dentium stridorem. Cognoscuntur collecti in vētriculo ex eius morso, nausea, fastidio & vomitu. Si in tenuib. intestinis consistant, tunc fluorem alui faciunt vel lienteriam, vēter inflatur. Cerrissima nota est si aliquos reiecerint, vel assumpto medicamento purgante, aut amaro, aliqui descendant. Fiunt etiam quotidianis similes, & aliquando inordinatæ, vel horrificæ. Latus lumbricus ex illa cibi appetētia immodica facile deprehenditur, & ex gracilitate, & imbecillitate, quæ sentitur sine alia manifesta occasione. Certissimā notā omnes esse volūt, reicere cubitos, vel quia, vt aliquibus placet, sint frustra, vel quia parui remaneant, neq; possunt ad eam peruenire magnitudinē ob assumptum alimentum à maioribus. Ascarides autem in ano fiunt, & conglobati degunt infiniti, qui ob frequentem illam motionem aut succum tenasimum faciunt & ani pruritū. Et quo frequentius alui excrementa reddunt, eò melius se habere existimant. Apparent in excrementis semper aliqui, sed potissimum quando excrementa liquida, & biliosa sunt. Vermes sui ablationem indicant, cū sint toto genere præter naturam,

*Error me-
dicorum.*

potissimum quando morbum faciunt, & quando fluxum, vomitum, morsum, & alia symptomata enumerata suscitant. Quando autem vermes reiciuntur in morbis acutis, vt in febribus ardentissimis, & aliis morbis senum & puerorū, nō statim debemus nos ad illos nostram totam intentionem conuertere, vt mulierculæ faciunt, & medici mulieribus inferuientes, quod facit, vt ægri intereāt neglecto morbo, aut cū magis ad vermes curationem conuertunt, quā ad morbum, vt si febris continua, aut alius morbus biliosus, aut fluxus ventris aliquem occuparit, aut in morbis acutis in principio vermes reiecerit, semen contra dare solent, quod febrem maiorem accendit, vel corallum, & alia quæ astringunt, ad vermes occidendos, opportuna solēt administrare. Quæ omnia affectib. præcipuis aduersantur, vt multū amara febre & fluxui ventris, astringentia & siccantia febribus. Quare oportet medicum diligenter distinguere, num febris à vermibus dependeat, vel vtrum vermes reiciantur ob aliam causam, qui semper continentur in ventre. Quod si cognouerimus febrem aliunde fieri, quia quartana, vel tertiana, vel vera quotidiana est, nullūmq; quod vrgeat, symptoma ostendit, negligendi sunt, vel ea tantū medicamenta præscribenda, quæ affectui præcipuo, & vermibus conueniunt, vt medicamenta laxantia in febre: cum vermibus, laxantia amara, & leuiter astringentia in fluxu & vermibus. In febribus ab obstructione & vermibus dare possumus syru. de bizantiis & acetosum cum decoctione & graminis, portulacæ. Adhibere topica remedia supra vmbilicum, quæ vermes interficiant, & protrudant, si vermes cum febre iungantur, tunc oportet esse amara & laxantia, vt quæ parantur ex pul. ag. fellib. farinis amaris, aceto, succis herbarum, vt

℞. succi persicar. vel aizoi minor. ʒ. j. extrahatur cum aceto. In illis succis diss. fellis porci, vel tauri ʒ. j. aga. ʒ. ij. farinæ lupinorum q. s. ad inspissandam cum terebinthina, fiat ad formam cataplasmati, applicetur supra vmbilicum. In hoc nos abstinemus à portulaca, corallo & farina lentium, quia hæc omnia astringunt, quibus non vtimur, nisi cū vermes fluxui immodico iunguntur, quem compescere volumus, & post magnas euacua-

tiones,

tiones. Nam in principio etiam licebit uti supra dicto, aut alio calidiorē, si febris non adsit. Myrrha, aloë, bitumine, petroleo, & aliis vehemēter calfacientibus etiam abstinemus ob febrē, quibus in aliis utimur, cum sine febre vermes infestant. Si vermes in causa sint fluxui ventris. egeatque corpus purgatione, non est verēdum uti aliquo medicamento purgante, & præcedente cataplasmate. Quod si pueri fluxu lōgo, aut vomitione multa corpus satis purgatum fuerit, aut corpus redditum imbecillius, si diarrhœa sit, tale conueniet.

℞. ol. cydon. ℥. ij. succi portul. ℥. j. ℞. extrahatur cum aceto, farinę lentium ℥. j. ℞. coralli rub. cornu cerui vsti ana ℥. ij. incorporētur simul & cum pauca terebinthina, ut adhæreat, fiat ad formam cataplasmat. Quod si volueris vnguentum facere, coquatur in ol. succus, & minue quantitatem farinę, aut eius loco, adde cerę quantum sufficit, fiat vnguentum. In his omnibus topicis remediis acetum cōuenit ad penetrandum, sed maiorem addimus quantitatem, quando vel constringēdum est, vel refrigerandum, ut in febribus. Si autem liēteria sit, calidiora, & quę plus roborant ventriculum, eligenda sunt, ut facultas retentrix, & concoctrix simul reficiantur, & corroborentur. Fit autem hoc pacto.

℞. ol. de absynth. ℥. ij. ol. nardini ℥. j. succi mentæ ℥. ℞. myrrhæ ℥. j. aloës ℥. ij. mastiches, corall. rub. ana ℥. j. cerę parum fiat vnguentum, tempore inunctionis adde parum aceti, vel vini maluatici. Oportet etiam secundū illam rationem interna remedia inuenire, quę utriusque affectui profunt. Quod si sine istis accidentibus pueri vermibus torqueatur, remedia etiam calidissima, & efficacissima præscribēda sunt. Itaque si latus lumbricus vel teres, medicamenta laxantia, & amara in principio danda sunt, vel amara in principio, ut occidantur, & postea laxantia, ut occisi expellantur. Cōfectio illa quę diacarth. dicitur, potentissimum est remedium, datum pueris ad vermes deliciendos, & ad pituitā vel chylum corruptum, ex quo generantur, & nutriuntur, vel infusio agarici in oxymel. plurimum valet rhab. quādo vel fluxus ventris, vel bilis purgāda est. Potiones ad occiden-

Syrupi cō-
nuentes

minis, additis syr. conuenientibus. quales sunt syr. acetos. simpl. de bizantiis, si pituita extrenuanda sit, vt in febribus: vel syr. de limonibus, de acetos. citri, quādo obstructions aperiend. & refrigerandum. Syrup. endiuiae compositus, si est refrigerandum, vel laxandum, vel obstructions aperiendæ. Si ventriculus & intestina detergenda, & corroboranda sunt syr. de absinthio. Si verò refrigerandum, & astringendum, syr. end. simpl. magis conuenit. Fiant hoc modo.

℞. syr. acetos. simpl. vel de bizant. ʒ. j. vel ana ʒ. ʒ. aquarum graminis & aspar. ana ʒ. j. aquæ absynth. ʒ. ʒ. misce pro vna dosi, vtatur per tres aut quatuor dies, quibus finitis dentur medicamenta laxantia. Interim dum vtitur istis syr. iniiciūtur clysteres ex lacte, saccharo, vel melle. Si febris ad sit, ex hydromelite, vel iure pulli, & saccharo. Si fluxus vētris sit cum febre, ex decocto hordei & saccharo. Si fluxus ad sit sine febre, ex lacte calybeato, & pauco saccharo rosato. Die verò ante purgationem addantur aliqua laxantia in prædictis clysteribus. Si sine fluxu sint, vt succum ciclae. vel mercur. aut parum benedictæ vel hie. æ picrae. Et omnes isti clysteres parentur sine oleo, nisi quando iam attractos volumus euacuare, & medicamentis laxantibus vtimur, maxime si aluus sicca & astricta sit.

D. colico dolore.

CAP. XXV.

Colicus dolor symptoma est, quod sequitur continui solutionem, quæ fit à distentione coli, aut frigida intemperie. Intemperies autem frigida fit à pituita vitrea aliisque pituitæ speciebus, quæ lentore suo ita intestinalis adhæret, & frigiditate sua ita hædit, vt intestinum perforari videatur, & dolor fixus est in vna parte intestini, quæ nota discernitur ab ea, quæ fit à flatibus distendētibz intestinalia, & à multitudine alterius pituitæ. Fit etiam, sed raro, à materia calida, quæ calidam intemperiem inducendo, dolorem facit acrem, & velut mordicantem. Hæc species sequitur magna ex parte biliosos morbos, cum bilis retinetur, vt in ictero, febribus biliosis, & præcedit dysenteriam. Illis notis cognoscitur, aut si bilis retineatur, quæ solebat expurgari. Irritatur maxime auxiliis calorificis, cum in aliis causis

magnam

Nota a pituita vitrea.

Nota biliosa collisio.

magnam præstent utilitatem. Sequitur etiam magnas *Signa.*
 durities factas in intestinis, aut retentionem excremen-
 torum durorum in ventre, ob quas duas causas disten-
 duntur intestina copia recrementorum & flatuum. Co-
 gnoscitur ventris distensione & tumore, & à recre-
 mentorum retentione, quæ quotidie solebant excerni.
 Durities autemprehenditur tactu. Fieri etiam potest *Quibus est*
 ab inflammatione intestinorum. Colicus dolor conue- *conueniens*
 nit cum iliaco & nephritico, & vteri dolore. Ab iliaco *dolor colici-*
 quidem, quod in eo sit magna ex parte febris, & vo- *cus.*
 mitus, non solum pituitosus, vel biliosus, sed aliquid
 chyli per intestina, & aliquando nonnihil fætoris ha-
 bet. Hæc non solent in prima vomitione, neque in se-
 cunda apparere. Nam primis illis vomitionibus rei-
 ciuntur ea, quæ in ventriculo collecta sunt. Dolor ilia- *Distinctio*
 cus est magis fixus, & magis in circuitu umbilici: Coli *iliaci à co-*
 verò dolor magis in lateribus, & paulo infraventricu- *lica.*
 lum ob illam reuolutionem coli, supra fundum ventri-
 culi. Quare non est nota admodum certa, neque in coli-
 co dolore, neque in dysenteria præsentiscere dolorem
 in superiori parte. Discernitur autem ab vteri dolore, *Quomodo*
 quod dolor vteri fiat magis in ligamentis, quàm in alia *discerni-*
 parte, & maximè post partum. Discernitur hac certissi- *tur ab vte-*
 ma nota, quod dolor descendat ad inguina, & à multis *ri dolore.*
 credatur dolor coxendicus, propterea quod vteri liga-
 menta ferè ad internam coxendicis partem perueniât,
 & ligentur. Fiunt & vteri dolores, quibus difficulter
 fluunt menses, eo tempore, quo fluxuri sunt. Tunc do-
 lor circa renes magis sentitur, quàm in interioribus, &
 aliis partibus, ob distensionem factam in venis prove-
 nientibus, ad uterum cum vasis spermaticis, & ad cor-
 nuâ vteri. Dolor nephriticus duplex est, vnus, qui se- *Nephritici-*
 quitur inflammationes renum, alter, cum lapis aut pituita *cus du-*
 per vteretres descêdit. Si ob inflammationem renum, fe- *plex.*
 bris adest, quæ colicum dolorem ab hoc distinguit, est
 que sensus doloris cum maxima renum caliditate. Si ob
 calculum aut pituitam excitatus sit, dolor incipit à re-
 nibus, & in vesicam desinit, fixus est, & diutius durat. *Distinctio*
 Urina aquosa, & tenuis in principio, vel turbida aut re- *nephritici*
 tinetur urina. Hisce notis distinguitur a colico dolore, *à colico,*

Curatio colici à pituita vitrea.

Colicus dolor à pituita vitrea non curatur, nisi post multos dies, & post euacuationem, & alia multa remedia, quia pituita multum cruda est, & multum resistit concoctioni expulsionique. Quare erit vtendū fortioribus remediis. Si in principio æger vomat, optimum erit impetum naturæ iuuare larga portione olei & vini maluatici permixtis, aut leui decoctione asari. Si nō vomat, optimum est prouocare vomitū, si ad id aptus sit. Postea iniiciatur clyster molliens, & calefaciens multum, qualis est ille ex decoctione rutæ, pulegi j viriusq; hyss. aliisque attenuantibus. & calfacietibus paratus, vt. ℞. radic. bismal. liliorum, brion. ana q. j. puleg. viriusque, marrub. abrotani ana M. j. florum chamom. melil. fampf. vel anthos, vel stech. ana p. j. seminis lini, & fœn. ana ʒ. j. anis. fœn. sefel. ana ʒ. ʒ. fiat decoctio in aqua & vino albo. in ʒ. viij. diss. benedictæ ʒ. j. vel ʒ. j. ʒ. si difficilis sit aluo, vel indi maioris, vel diaph. vel hieræ picræ, vel hieræ colocynth. tātundem, butyri antiqui, vel pinguedinis porci antiquæ ʒ. ij. ol. veteris, vel aneth. vel rutæ. vel nucum ʒ. iij. Oleum autem præstantissimum est oleum nucum ob partium tenuitatē. Isti clysteres fortiores dandi sunt, & in principio, & post aliquam coctionem materiæ. In principio, quia est minuenda magna illa copia recremētorum recti intestini & coli, post concoctionem materiæ ad eradicationem. In medio tempore oportet clysteres esse minus trahētes & magis concoquētes, vt si fierent ex decocto paulo ante descripto, non additis laxantibus, addita magna quantitate, vel butyri, vel olei, vel pinguedinis, addito parū mellis, vel sacchari, vt semper aliquid detergatur, vel ex solis oleis, & vino. Euacuatis vtcunque recrementis crassis, induratis ab intestinis & vomitione vtcunque purgato ventriculo, crudis illis humoribus vitiosissimū erit pilulas de hiera simpl. præscribere, vel elephanginas, vel de benedicta, aut aliquas alias, quæ neque myrobal. neque medicamentum aliquod astringens recipiant, aut fortiter attrahens Illis enim fortioribus vtendum est post materiæ coctionem. Fiunt autem hoc modo.

Clyst. molliens & calefac.

Pilula.

℞. pilul. de hiera simp. vel de aromat. 3. ℥. castor. 3. ℥. cum syr. de stech. vel de bizan. vel de arthem. fiat pilulæ. Hæ ob castoreum liquefaciunt pituitam, & soluunt dolorem. Fieri etiam possunt pilulæ ad sedationem doloris, si admodum vrgeat, sic:

℞. pul. diagalan. 2. ro. ros. ana 3. ℥. castor 3. ℥. euphorb. *Pilule ad*
 3. x. ol. 2. diligentissime contusi cū pistillo ferreo calido, *sedationē*
 dissolutiq; in vino maluatico 3. j. ℥. piper. croci, myrrhæ *doloris.*
 ana 3. ℥. formentur pilulæ x pro 3. capiat pilul. 4. aut 5.

Quod si non sedetur dolor, dentur 9. aut 10. Sunt autem conficiendæ parvæ & molles, vt citius dissoluantur, & citius dolorem sedent, minúsque in vetriculo remorentur. Vtile est medico has pilul. habere paratas domi suæ. Nam ob insignem facultatem, & præsentem vtilitatem Pharmacopolæ his abuti possent. Eadem pilulæ vtilēs erūt in nephritico dolore, à calculo, vel à pituita, addito 3. j. carabæ ad 3. j. pilularum. Si ab inflammatione dolor vrgeat, eadem pilulæ sine euphorbio, pipere, & myrrhæ, vtilēs erunt. Ad concoctionem materiæ & sedationem doloris, post præcedentium remediorum vsum, cataplasmata, & residentia clysteris, fctus ex decoctione eiusdē, augendo seminum, florum, & herbarum quantitatem conuenientem. Post fctum & cataplas. inungatur regio ventris oleis calfacientibus, attenuantibus, incidentibus & relaxantibus, vt ol. antiquo, irino, kerino, rutaceo, quibus addendum est vinum maluaticum, vel parum aquæ vite, loco aceti ad penetrationem, vel addita cera, & pauca terebin. fiat vnguentum sic:

℞. axung. gall. vel baty. non saliti 3. ol. cham. aneti ana *Vnguentum.*
 3. j. ℥. terebin. 3. j. semín. apij petro. galangæ, spicæ vtrius *tum.*
 que an. 3. ℥. ceræ parum, fiat vnguentum, quo inungatur totus venter frequenter, addendo vini, vel aquæ vitæ parum, tempore inunctionis. Post vsum horum remediorum, dentur pilulæ priores, quibus adde pro 3. j. tro. alādal. 3. vj. ag. tro. 3. j. Clysteres, qui iniicientur, sint similes primis. In iusculis semper ponatur vinum maluaticum, vel decoquat aliquot 3. piper. aut galangæ, aut zinzib. vel in aqua bullita ad parum, potum cinamomi, vel cardamom. & hoc cum nulla adest febris. Nam si febris

adeſt, quod rarò euenit, minùs calorificis eſt vtendum. Si ſitis vrgeat ob clamòres, & dolores, neque adſit febris, detur ſyrup. capill. ven. cum decoctione piperis, vel aniſ. vel galangæ decoctorum in multa aqua. Nec eſt danda aqua hordei, ob flatuſ, quos gignit. Si quis velit concoque humorem ſyrupis, conueniunt omnes, qui ſine aceto parantur, & vim habent incidendi, attenuandi, & detergendi, vt ſyr. capill. de bizantiis, de ſtech. de gly. commiſcentur, vt fiant imbecilliores, & fortiores. Imbecilliores, vt:

S Y R V P I.

R. ſyr. capil. & de ſtech. de arthem. ana ꝑ. iiij. vel ſyr. de gly. & mell. anth. vel ſcill. cum ſyr. de bizantiis, vel capil. ana ꝑ. iiij. diſſoluantur ſyrup. in aquis ſimilibus, vt in aqua beth. meliſſ. hyſſ. abſynth. & mentæ, vel in decocto illarum herbarum, vel cum aqua bullita præſcripta, cum pipere, galanga, vel cinamomo. Si colicus dolor fiat ab aliqua materia pituitoſa, eadem ratione curandus erit, niſi quòd imbecilliora paulò oportet eſſe remedia. A flatib⁹ ſunt dolores in ventre, ſed aliquando flatuſ retinentur in inteſtiniſ, aliquando extra inteſtina, vt in meſenterio. Prima ſpecies facilè curatur remediis ſuprà ſcriptis ad pituitam, ad auctiſ. ſeminibus flatuſ diſcutientibus in clyſteribus, vnguentis, cataplaſ. aliſque remediis. Retinentur autem in inteſtiniſ obſeſces induratas. Quare primus clyſter emolliens erit, & fortiter euacuans. Secundus diſcutiens & euacuans. Tertius diſcutiens, & relaxans. Primus clyſter præſcriptus conuenire poteſt, ſecundus fiet hoc modo.

De clyſterum varie rate. R. mal. cum radic. biſmal. an. M. ij. beth. mercur. orig. ana M. j. fic paſſ. pa. xx. ſemin. lini & ſœnug. ana ꝑ. j. aniſ. ſœnic. carui, cumini ana ꝑ. j. ſ. flor. anth. ſtech. chamo. ana ꝑ. j. fiat decoctio in aqua & vino, & diu decoquantur herbæ, vt flatuſ deponant. In tñ. j. diſſ. mell. anth. ſacch. rub. ana ꝑ. iiij. benediſc. vel hierẽ, vel aliorum ſuprà enumeratorum ꝑ. j. ol. rutac. vel nucum ꝑ. iiij. miſce, fiat cly. In ſecundo clyſtere oportet plus decoctionis addere, quàm in primo. Nam in primo ſufficit ꝑ. octo inſpicere ob plenitudinem diſtendentem. Doſis laxantium augeatur, vel minuitur ſecundum operationem prioris clyſt. & ple-

& plenitudinem excrementorum. Sal in primis clysteribus addi potest, quia sollicitanda est facultas expultrix: in vltimis verò non est addendum, quia sua acrimonia dolorem excitat. Tertius clyster paritur hoc modo.

R. api. petro. anethi, cymini an. ʒ. ss. flor cham. melil. samb. ana p. j. fiat decoctio in vino & oleo antiquo, vel cham. vel rutac vel nucum de col. cap. ʒ. x vel xij. & iniiciantur. Vinum hippocraticum, malvatic. aut claretum (quod de melle, piperi, & cardamomo fit) conuenientissimum, si per se vel cum aliis iniiciatur. Si colicus dolor ab inflammatione, vel bile fiat, clysteres detergentes iniiciendi sunt, vt qui parantur ex decoctione hordei vel torrefacti, addita pauca quantitate anisi: miscentur enim etiam aliquando flatus. Saccharum rub. vel mel. viol. dissoluere oportet, vt

Discut. & relaxant.

Colic. dolor à calor.

R. hord. mundati, aut integri leuiter torrefacti p. ij. anis. ʒ. j. fiat decoctio in tb. j. collaturæ diss. mel. viol. vel sacch. rub ʒ. ij. fiat clyster. Si ab inflammatione fiat magis, quàm a bile, clysteres magis refrigerantes, & laxantes parandi sunt, vt

R. rad. bis mal. qr. j. fol mal viol. ana M. j. (fol. nucum cucurb. citruli, si reperiatur, poni possunt) sem. lini. ʒ. ss. quatuor seminum frig. maior & anis. an. ʒ. ij. fiat decoct. In tb. j. col. diss. mel. ros. vel viol. & sacch. rub. manæ granatæ, si diues sit, ʒ. ij. ol. ros. vel viol. ʒ. iij. fiat clyst. Butyrum, vel axung. porci non salita addi possunt ad ʒ. ij. lac omne iniiciendum in omni dolore, qui fit ab inflammatione, vel ab acerb. humor. addito sacc. ne retineatur. Glandes sufficiunt in inflammationibus ad irritandam facultatem expultricem, modò inflammatio sedem, aut partem inferiorem intestini non attingat. Quod si æger pilulas deuorare non possit, benedicta dissoluta, vel hiera, vel indum maius in decoctione anis. vel quatuor seminum calid. maio. vel in aquis calfac. possunt dari. Et in dolore à bile, si non fluat venter, syrup. ros. laxatiuus cum decoctione anisi detur. In dolore verò ab inflammatione non conueniunt medicameuta laxatiua, sed potius missio sangu. vel cassia dissoluta cum decoctione hordei, & anisi. Potest etiam poni cassia in clysteribus ad inflammationem, non in aliis, quia flatus gignit

*Præ-
tuo.*

cautio est ab hac affectione. abstinere à nimia cibi plenitudine, & ab alimentis flatulentis: frequenti vomitu vel euacuatione facta pilulis de hiera, vel de arom. sumptis semel in hebdomada: vel si vinum ponant in iusculis, vel si ante cibum vtantur pul. discutientibus flatus præscriptis in li. de compositione medicament. vel sumpta tab. j. diagal. aut aro. ros. superbibēdo parum vini albi diluti in aqua mentæ, vel absynthij. Alius est sollicitanda, ne retineantur excrementa, glandibus, vel clystere, vel ficibus sumptis ante pastum, aut prunis dulcibus decoctis cum multo saccharo, & ante cibum sumptis. Acidæ enim pruna ventrem lædunt, & colicum dolorem faciūt. Vtuntur tenui & attenuante victu.

De dolore colico ex prima dictatione. CAP. XXVI.

Primū sedetur dolor, dilatata ad tempus vera curatione, quæ causæ debetur. Ad hoc facit clyster molliens sic.

R. rad. alth. & lilio. an. ʒ. ij. mal. bismal. branch. vrs. an. M. j. pariet. M. ʒ. flor. cham. p. j. (Althea & cham. valent mirè ad dolores internos) fiat decoctio. In col. diff. buty. recens, & ol. commune, vel amygdal. dulc. aut de lilio. Clyster hic præcedere debet acres aut discutiētes, qui si in principio iniiciantur, exacerbant, eorum vi attenuata pituita ex crudis humoribus. Quod si donec hic clyster paratus sit, ob doloris vehementiam expectare non liceat, alter parabitur ex oleo & butyro simul liquatis, & succo mercurialis, aut betæ, quæ irritant facultatem expultricem, circa magnam calfactionem. Si dolor non sedetur hoc clystere, fiat alter ex eisdē, ex quibus superior, addendo semina calida maiora, vel minora ad ʒ. j. flor. anth. & stechad. ana p. j. In col. dissolue simul ol. discutientia, vt aneth. cham. rutæ. nucum, & reliqua huiusmodi. Sunt & dissoluenda cathartica, vt hiera picra, benedicta, indum maius, diaphenicum, quæ non tantum clysteri vim præbent discutientem, sed & purgatoriam. Validiora sunt seminibus calidis supra commemoratis, semen rutæ, feseli, baccæ lauri, & similia. Quidam admiscēt decoctis carth. & aga. Si dolor penetret & multum torqueat, ad narcotica confugiendum est, quorum duplex est vsus. Aut enim sola dantur, aut cum cathartico. Idq;

ratione

ratione & vtilissima, & certissima dantur cum cathartico duobus modis. Aut enim confectiones, opiatas cathartico immiscemus, vt

R. asyncriti vel theriacæ recentis, aut philon. ratione scam preparati ʒ. j. vsque ad ʒ. ij. quia valde sopita est facultas expultrix & impedita. Hoc cōuenit post clysterem. Aut ag. tro. ʒ. j. misce, fiat bolus. Aut opium miscetur purgantibus medicamentis, adiecta pari portione castorei, si ea castoreum non recipiant, vt

R. hieræ picræ, aut diaph. aut benedictæ, aut indi ma. io. ʒ. ʒ. opij casto. an. ʒ. iij. plus minus, fiat bolus. possent ei immiscere, quæ astringentia non recipiant. Pilulæ, quæ ex speciebus hieræ, aut ex gummi parantur, sunt vtiliores. Hac methodo causam morbi abscindimus, simul & dolorem tollimus. His sedatus dolor, si aliquando post ingrauescat, vel quia assidue à cæco in crassum fluit pituita, vel quia ex aliis partibus corporis humores in ventrem decumbunt, vel quia febres diuturnæ in dolorem colicum sunt permutatæ, tum vniuersum corpus purgandum est, ac humor concoquendus, qui morbum excitar, fouetque, coquitur apozemate sequente.

R. rad. alth. glyc. an. ʒ. j. ʒ. rad. apij, petro. vel quinque *Apoz. cō-*
communium an. j. pass. sic. an. pa. xx. quatuor seminū *quens.*
lid. maior. an. ʒ. ij. flor. cham. mell. an. p. j. anth. stech. ana
p. ʒ. in tb. j. ʒ. col. diss. sacch. q. s. aut mell. ros. aut syr. de
hyss. de stech. de bizant. de cala. Non est dādum oxymel,
quia valde nocere sum expertus propter acetum solūm,
intestinis & nervosis partibus aduersissimum: ænomeli,
eius loco, vtilissimè dari poterit. In purgatione faciendæ
sunt, quæ Rasis imperat, vt pote nimis violenta, quæque
periculum inflammationis sæpe adferunt, deturbati in
zgram partem humoribus, vt veratrum, turbith. colo-
cynth. scam. & alia id genus violenta. Nec conuenit rhab.
& myrobala. ob facultatem astringentem, cū opus sit
attenuatoria & deterforia. Faciunt enim cruciatus reci-
diuos. Nec sēna, vt quæ sua vi tormina pariat, nec cassia, *Quæ mi-*
nec pruna, manna, & eiusmodi dulcia vel aquea, & fatua: *nus conue-*
quoniam auctore Mes. facili in flatus vertuntur. Vtiles *nunt.*
sunt ad purgationē pilulæ ante cibum, de hiera simplici, *Pilula cō-*
de aro. imperiales, de benedicta, adiecta portiūcula aga- *uenientes.*

rici, quoniam he miscentur attenuantibus & discutienti-
bus magna ex parte aro. quibus ventriculus & omnia vi-
scera corroborantur. Dabimus & pil. lucis maiores. Nam
etsi myrobal. recipiant, tamen quoniam constant inci-
dentibus & attenuantibus conueniūt. Pilulæ fetidæ ma-
iores addi possunt, de castoreo. Si æger pilulas non pos-
sit deuorare, paranda erit potio ex expressione ag. iam-
diu tro. & in ea diluta hieræ, aut benedictæ portione exi-
gua. Post purgationem danda est in multos dies sequen-
tes rab. vna aro. ros. aut ros. nouell. aut diacymini, diagal.
diatrium pip. singulis matutinis, vt partes interiores vi-
mori læsæ reddantur suæ constitutioni pristinæ. Si do-
lor post summa narcotica repetar, & perseueret, lauetur
æger balneo ex eisdem medicamentis, ex quibus clyste-
res parantur, scilicet, mollientibus in colica stercore-
sa, & discutientibus in flatuosa. Sed aduerte vsum balnei,
ne i quibus non esse commodum ei, qui ad conuulsionem, resolu-
tionem, aut arthritidem sit procliuus. Nam liquefcent-
es, & calore balnei fusi crudi, & crassi humores, in eas
partes imbecillas decubunt. In huius periculi metu fo-
tus adhibendus erit. Cæterum ob id balneum vilius cê-
setur, quod partes omnes æqualiter calfacit. Fotuum
non est perpetuus calor, quoniam sæpe mutanda sunt
ea, quibus pars ægra fouetur. Proderit etiam instituere
puluerem post pastum ad iuuandam concoctionem, sed
non sic parandus, vt sine discrimine vulgò solêt, ex mul-
to coriandro, corallo & diacyron, sine speciebus, quasi
propositum sit os ventriculi constringere, & resiccare,
sicque efficere, ne vapores in cerebrum efferantur. Aliud
verò spectandum est, nempe vt crudis humoribus per-
frigeratus ventriculus modicè calfiat, sicque facilius &
melius concoquat. Nec iuuant multum calida, quoniã
cibum, priusquam elaboretur, crudum expellunt, sed
quæ modicè calfaciunt, & astringendi facultate quadam
prædita sunt, vt cortex & succus citri, cinamomum cras-
sum, &c. Pulueris post pastum exemplum erit.

*Pul. post
pastum.*

℞. anis. conditi ℥. iij. fœnic. ℥. j. β. coriand. ℥. β. cymi-
ni, carui, sefel. in aceto maceratorum, aut in vino albo
(vt calor mitigetur, & ingratus eorum sapor mirefcat)
ana ℥. j. corticis citri sicci, cinamomi crassi ana ℥. iij.
sacch.

facch. ad duplum omnium, vel ad pondus omnium fiat pul. cuius cochlear j. etiam supersumptum eos iuuabit, addito pipere longo, vel nigro iis, qui hoc morbo crebro vexantur. In hoc medicamento anis. est fundamentum, quoniam & suauiter olet, & grati est saporis, & viscera omnia corroborat. Sunt, qui in hoc morbo cataracticum metuunt, quod Galen. praeceperat cauendum ab iis, qui trahunt humores ad partem affectam. Sed non animaduertunt, quod Galen. tantum dixit de phlegmone, neque quicquam periculi esset, si in ea parte via esset, qua quod attractum est, excerni posset. Pulueribus post pastu gly. non est admiscenda, ut vulgus facere solet, quoniam ventrem laxat, & dissoluit. Coli dolor ab humoribus acerbis sanatur his eductis, clystere emolliente, & refrigerante, qui paratur, ut superiores, additis seminibus frigidis, & ol. viol. & violaria. Quamuis affectus sit calidus, non tamen conueniunt frigidiora, ut nymphaea, mandrag. quoniam ea frigidae intemperaturae intestinum nocent, sed potius lenientia, & detergentia citra caliditatem, ut decoctum hordei, parietaria, beta, sebesten, & similia. Cauendum ab usu prunorum, à quibus maxime dissoluitur ventriculus. Cæterum per os dantur rhab. tamarind. infusi cum syr. viol. aut tantillo syr. de papauere. Cinis intestinum lupi, cinis cornu cerui, ab occultae quadam proprietate valde conferre creduntur ad dolorem colicum, cuius rei ratio nulla reddi potest, sed solius experientiae est inuentum.

De dolore Ilei.

CAP. XXVII.

Ileos symptoma est intestinum gracilium, à Latinis conuoluulus, à Barbaris (miserere mei) dictus est, & quidē circumuoluulus à circumactione, quod videatur dolor circa umbilicum aegri. Fit autem à bile multa asseruata in gracilibus intestinis, vel à cibo corrupto, vel à cruditate. Retinentur autem haec excrementa ob factam obstructionē à recrementis, vel ob tumorem inflammationis. Dolorem vehementissimum haec omnia excitant, tum ob materiae acrimoniam tum ob partis sensum. Magis enim sentiunt, quam crassa intestina. Fit etiā ob peritonei structurā, aut propter laxationem, cum intestina recrementis plena, deuoluuntur in scrotum, vocaturq; Ileos,

Quamquam Ileum intestinum non deuoluatur, sed à similitudine symptomatis. Sequitur enim vomitio stercorosa, materia dura deuolvente in scrotum, & inflammata, quæ nota propria est Ileum. Discernitur notis narratis in colico dolore, & vomitu potissimum. Si fiat ab inflammatione intestinorum gracilium, sanguis est mittendus è brachio. Pars inferior exoneranda balneo, vel clystere detergente & emolliente, qualis fuit descriptus cap. superiori pro inflammatione intestinorum. Cucurbitulæ in inguinibus, aut circa inguinæ sunt apponendæ, etiâ cum scarificatione. Cataplasma ex farina hordei, fœnug. butyro, vel axungia porci, ol. chamo. parandum est. Vtilissimum est in vehementissimo dolore post sanguinis missionem & alia remedia, dare ℥.ij. ol. amygd. dulc. recentem extracti. Quod si hoc remedio, & alius non remittatur dolor, pil. suprascriptæ sine euphorb. pipere, & castoreo erunt ex usu. Vomitum, si à natura non adsit, optimum erit leuiter prouocare, aquæ tepidæ potione cum ol. vio. Nam pars media per interiorem, & superiorem partem expurgari potest. Inunctiones etiam faciendæ sunt supra partem dolentem ex relaxantibus & emollientibus, ut

℞. ol. amygd. dulc. de lilio an. ℥. ij. butyr. recentis & axung. gallinæ vel anaris an. ℥. j. mucil. seminis psilij ℥. j. s. terebinth. & ceræ parum, fiat linimentum. Vomitum non est compescenda, donec tota cacochymia fuerit euacuata. Fœtus ex decoctione herbarum emollientium faciendi. Post hæc remedia, theriaca recens erit admodum utilis, sumpta quinque horis post cibum, & maxime si iliacus dolor post medicamentum venenosum assumptionem oriatur. Si dolor à materia cruda fiat, erit iisdem vnctionibus, & cataplasmatibus, aliisque topicis concoquenda, ut prius in colico dolore dictum est. Diligentissimè est obseruandum, ut alimenta in forma liquida sint. Melius enim descendunt, & melius conficiuntur. Quod si obstructio fuerit soluta, non erit inutile dare aliquas pilulas, quæ ventriculum & intestina detergant, citra magnam calfactionem, maxime cum à putredine, & cruditate sit. Si autem ab inflammatione, minus conueniunt medicamenta laxantia, sed clysteres fortiores, postquam consistit defluxio, ut id, quod est impactum parti, per inferiora trahatur,

hatur. A principio autem si ex inflammatione fiat, non sunt dandi acres, neque trahentes, ne materia ad partem affectam trahatur, vt Gal. docuit, 13. meth. In aliis causis, quæ sunt citra inflammationem, licet etiam fortioribus vt iniectionibus. Nam Gal. tantum prohibet in inflammatione, & affectibus, qui sunt per defluxionem. Affectus magna ex parte lethalis est, nihilominus tentanda sunt remedia omnia, vt balnea quæ ex anodynis & relaxantibus fiunt, & non in principio, sed post euacuationes & postquam defluxio constitit, aut partes inferiores, & superiores euacuatae sunt. Soluit enim dolorem & humorem ad corporis habitum trahit.

De ileo dolore ex prima dictatione. C A P. XXVIII.

Inflammati, crasso & voluulo intestinis remedium est præstantissimum sanguinis missio vsque ad animi deliquium. Deinde vomitus prouocandus sola aqua tepida quæ distentas partes relaxando, dolorem mitigat, vel ol. viol. adiecto, quod idem efficit, & præterea calorem temperat. Vomitu idcirco purgantur superiora, vt ad partem inflammatam non defluant excrementa. A sanguinis missione imperanda est inedia ad 24. horas, quoad certum sit, detracto sanguine, inflammationis magnitudinem fuisse remissam. Quod si necessitas urgeat, cibibus dandus est, isque medicamentosus, vt iusculum galli veteris, cuius venter infarctus ficubus sit, passulis & seminibus frigidis, ac butyro. Passuli & caricæ dolores inflammationum mulcent, butyrum lenit, & aluum relaxat. Primò nõ erit inutile clysterem acrem iniicere, quo repurgentur intestina. Nec metuenda est acrimonia, quoniam malum est in superioribus intestinis procul à sede. Post hæc lauandus est æger balneo emolliente, ac refrigerante, vt ex mal. althea, violacea, & similibus. Nõ probatur eorum consilium, qui ex alto tepidam ventri affundunt. Nam etsi eiusmodi embrocationes in doloribus capitis laudant Gal. non tamen in cæteris partibus, & præsertim ventre conueniunt. Tepida enim facile refrigerantur, sicque calorem cum sanguine & spiritu intro pellunt, vnde augetur inflammatio. Satiùs verò fuerit, si propter balneum aliud remedium placeat, illinere ventrem iis, quæ modicè calfaciunt, & laxant, vt ol. cham. viol. mu-

cilaginibus seminis lini, & similibus. Dantur etiam narcotica, vt in dolore coli, sed recētia. At in dolore coli, inueterata: quoniam in recētib. vis opij nōdum est obrufa satis, & est plus in ileo, quā in colica refrigerandum.

De Hepatis affectibus. CAP. XXIX.

IEcur membrum est principale, cui commissā est facultas principalis, quam nutritoriam vocant, & illius gratia alia membra facta sunt quæ sunt sub septo transuerso, si generationis membra excipias. Nam intestina gracilia, venæ mesaraicæ ad alimentū præparationem à ventriculo delati, sunt facta. Splen, vesica fellis, renes, vesica, ad recipienda excremēta facta sunt, venæ ad sanguinis facti delationē, & conseruationem. Epiploon ad coctionem iuuādā. Quarum partium cū aliqua insigniter læditur, hepar etiam per cōsensum afficitur, vel eius coctio frustratur. Quare considerādum est hepar vt pars similis, & organica. Vt pars similis, laborat intemperie calida, frigida, humida, & sicca tantū, vel cōpositis, & rursū cum materia, vel sine materia, eaque vel calida, vel frigida. Si calida, aut est sanguis, aut bilis, aut aliter vincit alterū humorem. Sic fiunt in hepate multæ inflammationes à multo sanguine limolo, vel à sanguine bili permixto, inflammatio erysipelatodes, vel è contrā. Erysipelas exactū vix fit in hepate, sicut nec ob vicinam bilem inflammatio, vel ob copiam sanguinis. Si verò humor redundans crassus sit, vel est pituita, vel terreus humor melancholicus. Rursus isti humores, vel sunt in tota substantia multū sparsi, & faciunt tumores duros scirrhosos, aut œdemata, vel sunt in venis infarcti, lenti aut crassi, & obstructions pariunt. Fiunt & quandoque tumores ex crassis flatibus. Obstructio fit vel in meatibus chystris, ad quam sequitur ictēritia flaua, cū bilis non recipiatur à sua vesicula: Vel in eo meatu, qui est à vesicula fellea, ad intestina, & huius ratione duo sequuntur symptomata, alui astrictio, & coloris recrementorū mutatio: sunt enim alba aut cineritia. Si verò obstructio est in venis hepatis, vel in parte concaua, scilicet, in ramis venæ portæ, ad quā sequitur fluxus chylosus, vel lotius, vt practici vocant, quia excrementa similia sunt loturæ carniū. Vel obstructio fit in radicibus venæ ca-

uæ, &

ur, & tunc sequitur atrophía, & circa partem posteriorem iecoris grauitas in distributione alimenti, ob retardationem alimenti in caua parte iecinoris.

De imbecillitate iecoris.

Imbecillitas hepatis est, cum ob vires suas debiles sanguificationem non facit. Tales hepatici dici possunt. Sed hæc imbecillitas à morbis supradictis fit. Nam, vt Gal. in vniuersum dixit: Omnis intemperies nata est impedire actionē, & cum magna est intemperies, imbecillitas fit. Quare qui mederi voluerit huic imbecillitati, causam agnoscat oportet, quod erit promptum assequi ex effectibus causarum. Vt si calida intemperies, agnoscitur ex eo, quod calfaciendo chylum in bilem mutet, vnde sequitur vrina ruffa, alui excrementa crassa, biliosa, foetida, acrida. Si in ventriculum fluat, nausea, vel biliosa vomitio, oris amaritudo, sitis interna, manuum caliditas & pedum, & pulsus celer. In ambitu corporis sunt pruritus, & aliquando sentiuntur calidi fumi per cutem ferri. Hæc sunt, quæ calidam intemperiem ostendunt. Cum materia biliosa, raro fit intemperies, quin bilis retentio, vel febris aliqua præcesserit, vel nõ sequatur bilis, & serosorum humorum maior generatio. Raro calida tantum fit, ob id non multum debemus curare de ea. Adde quod de ea sola nunquam conqueruntur ægroti. Illa si fiat, facilius curatur, quam cognoscitur, nisi admodum sit insignis. Cognoscitur autem, quod volas manus plus iusto calidas sentiunt, & pedum. Sitis adest, ventris restrictio ob vehementem attractionem à nimio calore factam. Curatur frigidis assumptis admotisque. Assumuntur medicamenta vel alimenta medicamentosa, quæ efficaciora sunt, quàm medicamenta, quia melius ad partem affectam trahuntur. Efficax est aqua bibere loco vini. fontis vel fluminis, vel cisternæ, cui si addas guttas aliquot acetum vini albi, vel succi granatorum acidorum, multum refrigerabis. Non vituperarem usum vini albi, aquei, diluti pauca aqua. Item poma cruda comesta in prima mensa, pruna acida, vuae pensiles, cerasa acida & dulcia aliquando. Vfus cucurbitæ, & cucumeris in iusculis, pepones commendarem, si refrigerati absque sale ederentur prima mensa, & aqua superbiberent. & nulla calida simul assu-

signa intemperies calida.

Curatio.

Vitium ratio.

merent. Nam facile in bilem vertuntur, si iis misceantur. Vfus herbarum in iusculis aut acetariis, vt lact. scariolæ cichorei, sonchi. Vfus hordei mundati sine amygd. vel cum recentibus, & quatuor seminibus frig. maior. medicamenta dantur in forma syr. tabellarum, opiata. Syr. laudatur ex viol. nenuph. end. simpl. cucurbitæ, portul. Tabellæ sunt, diatrag. frigid. triasand. aucta dosi seminum. Conserua carnis cucurbitæ, lactucæ in aqua frigida lotæ. Extrinsicus adinouentur epithemata, vng. Epithemata fiunt ex succis herbarum frigidarum hepaticarum, vt cichorij plâtaginis, solatri, scariolæ, addito pauco aceto. Vel ex harum herbarum aquis distillatis, quibus adduntur aliqui pulueres, vt triasand. coralli, & aliorum puluerum ad refrigerationem. Aptæ cerata sunt, sandalium, rosatum cum aceto, & ceratum album Gal recentem dispensatum. Hæc sufficient ad intemperiem calidam auferendam, modò à calidis cibis, porione abstineant, & frequenter vtantur remediis præscriptis. Nam in affectibus ventriculi & hepatis oportet medicamentis frequenter refrigerare, idque sensim. Quia impeditur illa refrigeratio à frequenti ciborum assumptione, qui nisi frigidi sint, multum retardant refrigerium. Si auferatur caliditas præter naturam, quæ iecur faciebat imbecillius efficiendo, relaxandoque confortetur. Quod si quis velit sumpta indicatione à functione, quæ calore perficitur, spicam nardi vel celticam, vel parum absinthij frigidis admiscere, non multum lædent, sed proderunt, potissimum cum diu & frequenter, his vtendū frigidis, quæ partem suam frigiditate constipant & obstruunt, quæ obstructio caloris maioris causa esse potest. Adde quod frigida, cum sint crassarum partium, non facile penetrant, ob id bene adiunguntur supradictis frigidis spica nardi vel celtica, vel aliud tenuium partium, vt acetum.

De frigida hepatis intemperie. CAP. XXX.

FRigida intemperies, vt calidæ contraria est, sic est causa symptomatum contrariorum, vt prouentus pituitæ, totius corporis frigiditatis, caloris faciei albidioris, habitus corporis (nisi cordis calor impediatur) quasi tumescentis. Excrementa pauca insequuntur, & parum olentia ob cruditatem. Aliquando venter fluit, post longam

gam excrementorū retentionem. Et aliquando hæc intemperies vsu rerum frigidarū, intempestiua aquæ frigide potione, aut nimio rerum frigidarum vsu intus, vel extra post longam & largam sanguinis fluxionem, quæ totum refrigerat, & potissimum iecur. Curatur autem calfacientibus medicamentis, & alimentis, & extrinsecus adhibitis, victus ratione calfaciente, & medicamentis. Utatur optimo ac generoso vino & tenui, parū diluto, vel paucō. Utatur apio, nasturcio, menta, salvia, & aliis alimentis medicamentosis, semine apij, petro. anisi, fœniculi & similium. Utatur in iusculis, & aliis cibis, Cōmendantur aromata, vt piper longū nigrū, cinamomū, zinziber, crocus, galanga maior, & minor, cyperus, & alia multa talia, quæ calida sunt & tenuium partium. Quæ obstruunt, frigida sunt. Vix reperies insignem frigiditatem hepatis, sine aliqua obstructione. Ob id quæ tenuium sunt partium, conueniunt, quæ aperiunt, & liberāt ab illis. Extrinsecus ol. quale est nardinum, vel de absynthio, de abrotano, anethinū & similia conueniūt, quibus parum vini addimus. Ceratum stomachicum Gal. valet in hoc affectu, vel parari potest hoc modo.

*Videtur
ratiō.*

R. ol. nard. & de absynth. ana ℥. iij. ceræ par. fiat ceratum. Tempore inunctionis adde modicū vini maluatici. Ceratis adduntur arida, vt vnguenta fiant hoc modo.

Ol. experientia.

R. ol. nard. amygd. amar. ana ℥. ij. spicæ nardi celticæ, schenanth. galangæ ana ℥. j. ceræ q. s. fiat vnguentum. Vngatur hepar, vel hypochondria, adde vini parum. Hæc sufficienter calfaciunt, & aperiunt, corroborantque. Ad calfactionem, & corroboracionem præscribuntur confectioes aromaticæ, vt aro. ros. garyophylorum, diaga. Hæc in forma opiata cum conseruis sufficiunt, vt,

R. conf. cortic. citri ℥. j. conf. flor. roris. ℥. β. diag. 3. j. cum syr. capill. fiat opiata. Capiat superbibendo parum vini diluti aqua absynthij, vel marrubij, vel betonicæ. Hæc intemperiem castigare poterūt & imbecillitatem quæ ab intemperie frigida fit. Eadem etiam humidam castigant, aucta tantūm dosi resiccantiū, vt si antispod. aliquod opiata addatur ex spongia bedeg. vel cornu cerui, vel intestinis gallinæ & lupi, vel ex corall. aut eorc. Agnoscitur facili hæc intemperies, vt quæ faciat

partes omnes in tumorem eleuari, multa pituitosa serosa excrementa appareant, aut reddantur, & aliquando retineantur, & hydropem faciant. Tunc victus ratio magis reficcare debet.

De intemperie sicca hepatis. CAP. XXXI.

Sicca intemperies corpus reddit siccus & squallidus, sanguis paucus est crassusq; & venæ duriores, quam antea. Fit & intemperies post longas inedia, & vsum medicamentorum siccantium. Facile agnoscitur, & non facile curatur, quia difficile est rem siccam humectare, tū quia, quæ agunt, debilia sunt, & quæ patiuntur, multum resistunt. Adde quod partes exsiccatae concidunt, densiores redduntur, & medicamenta non possunt penetrare, & vbi penetrarunt, ob imbecillitatem facultatum naturalium, & maximè concoctricis in substantia membrorum solidorum. Illa quæ altæ radices non iecit, cibis curatur humectantibus, balneis, & inunctionibus. Alimenta sunt lac, butyrum, vitella ouorum, succus carnis, vinū, lac amygd. dulc. & sem. frigid. maior. pisana parata cum iure carnis vituli, vel porcelli. Medicamenta ex carnib. testudinum, & aliis parari possunt, sic.

℞. carniū testud. semicoctarum ℥. ij. pinearum infusarum in lacte. & amygd. dulc. ana ℥. iij. quatuor semin. frigid. maior. munda. ℥. j. pistentur simul: quibus adde amyli vel farinæ lentium tenuissimæ q. j. cum deco. testudinum fiat rarta parua addendo sacchar. lb. j. vitell. ouorum N. ij. cinamomi ℥. j. coquatur leuiter in furno, frequenter comedant, superbibant parum vini. Potus lactis vaccæ, vel ovis, vel mulieris erit ex vso. Balneis humectetur totum corpus, & ol. amygd. dulc. & viol. vngatur. Regatur, vt qui febre hectica, vel intemperie sicca ventriculi laborant, vt dictum est. In omnibus istis causis conueniunt, quæ a proprietate occulta iuant, vel similitudine substantiæ, vt hepar lupi, anseris, caro pass. sed magis in sicca vel frigida intemperie permiscantur quàm aliis propriis intemperaturis. Non differunt remediis intemperies ventriculi, & hepatis. Nam oportet vt sint contraria causis, & semper aliquam astringendi vim in vtriusque partis remediis esse, nisi cum obstructio id vetat.

De Hepatis inflammatione. CAP. XXXII.

Hepar quod multo sanguine abundat, & illo nutritur, multas & magnas venas habet, per quas magnum sanguinis fluxum, vel potius refluxum ad se patitur. Ob id aptum est ad inflammationes suscipiendas, quæ tumorem, dolorem, febrémq; necessariò secum adferunt, vnde respirandi difficultas, tum ob tumorem tum ob febrém, quæ maiorem refrigerandi necessitatem habet. Tussicula inanis, dolor verò gravis, quia nò sentitur, nisi in parte gibba sit. Tunc ob ligamentũ, quo cum diaphragmate iungitur, ligaturque, dolor punctorius sequitur, & cruenta excretio in iis, qui abundant sanguine. Urinæ ruffæ, & maxime, si inflammatio erysipelatoſa vel eryſipelas fuerit. Dolor ad claviculas ascendit, vt iis, qui tumorem scirrhum circa partem dorsi habent. Dolorem sentiunt ob membranę costas succingentis tensionem, quæ tenditur ob septi transuersi tensionem, & septum transuersum tenditur ob pondus hepatis deorsum trahens. Febris ardens est, lingua arida, rubensq; in principio tandem nigrescit, & aspera fit, sitis in exhausta, nausea, cibi fastidium, singultus. Hæc inflammationem significant, sed cum fiat in diuersis partibus, diuersa ratione curatur, quod factũ est. Distinguendum est, an affectus sit in gibba. Tunc partes illi vicinæ, & eius functio magis efficiuntur, vt septum transuersum magis opprimitur. Quare maior difficultas respirandi, tussicula inanis magis manifesta, urinæ magis accensæ. Tumor tactu minùs deprehenditur, sed retro magis sentitur dolor, & acutior ob ligamētã. Si in caua, singultus, nausæque magis diuexant. Fluxus ventris adest, vomitio biliosa etiã, maior sitis, linguæ ariditas, asperitasque. Sũt qui pro nota inflammationis, & potissimũ gibbæ, addũt, quod dolor est in dextera parte, sed illã notã falsam experientia agnoui. Nam si hepar inflammetur in vtraque parte, grauitas circa mendas costas percipitur, sed in clavicula dextra potius, quàm in contraria, quod dissectio docet. Hepatis enim extremitas ad sinistram venit. Quare si inflammatio fiat in extremitate hepatis, dolor in ea parte sentitur. Quare aliam notam addere oportet, quæ splenis inflammationem ab ea distinguat.

*Inflāma
tiohypoch.*

Nota.

In vtraq; enim dolor sub hypochōdrio sentitur, sed alior est doloris sedes in hepate, inferior in splene. Adde quòd cūm lien inflammatione laboret, tumor tactu deprehenditur. Nam ob grauitatē inferius descēdit, quā pro naturali constitutione. Est autem spongiosus, aptus ad suscipiendas defluxiones. Præterea multarum venarum & arteriarum ramos obtinet, per quos magnum fit humorum ad eum effluuium. Ad hæc sanguis fœculentus retinetur, ob quā copiam in tumorem eleuatur præter naturam. In musculis aliquando, non in subiectis partibus fit inflammatio hypochondriorum. Quare qui minus exercitati in partium affectarū cognitione sunt, internam pro externa, & cōtrā accipiunt. Cognoscūtur autem hac certissima nota, quòd si in parte fiat tumor, est vel inter cutē vel musculos. Illa tactu deprehēditur, visūq;. Nam si calida, rubescit cutis, si frigida, sine febre est, vel dura, laxa. Si in medio ventre, figuram musculorum seruat. Est longa & recta, vt ipsi recti sunt, tumor quoq; multū extra protenditur. Si verò in lateribus, maximus tumor erit, qui à partibus anterioribus per posteriores procedet, & extra prominebit in musculis obliquis dextris vel sinistris: Si in descēdente, tumor ad thoracem extēditur: si in ascendente, magis ad inguina veniet. Si in transuersalibus, magis læduntur partes profundæ & quæ e iugulo, comprimuntur intestina. Dolor est vehementior, quā in aliis musculis, quia musculus ille est mēbranosus circa finem, & nervos plures molliorēsq; obtinet, & cū peritoneo ita iungitur aponeurosi, vt vnum faciant. Hæc ad inflammationem splenis, musculorum sinistri lateris distinguendam vtilia erunt.

CVRATIO.

CVrantur inflammationes hepatis & lienis larga sanguinis missione, è directo partis affectæ. Cucurbitulæ sunt in vtraque affectione coxis affligēdæ ad diuersionem. Clyster iniiciendus, mollis, leuiter detergens & refrigerans, quales hic.

℞. mal. bismal. viol. cucurb. cucu. ana M. j. prunorum sebes. an. N. xx. quatuor sem. frig. maior. an. 3. iij. anis. 3. ij. flor. cham. viol. ana p. j. fiat decoctio. In lb. j. dyff. mel. viol. sacc. & cass. an. 3. j. ol. viol. 3. iij. misce, fiat clyster

ster. iniiciatur tertio quoq. die manè. Leuiter deterget, & refrigerat partes per consensum calfactas, aliquid excrementorum sensim euacuat, & maximè si inflammatio sit in caua aut in splene. Ad alterationem humorum tales syr. præscribendi sunt, qui possint feruorem castigare. Si in caua, debent leuiter detergere, & per ventrem, quod a parte inflàmata resudat, euacuare, nisi alius sua spontè nimis fluat. Tunc enim illi qui leuiter ràtùm detergant, & aliquam astrictionem habent, conueniunt.

R. syr. end. simpl. ʒ. 2. decoctionis hord. ʒ. 4. misce, fiat syr. vel sic.

Syr.

R. decoctionis cichor. end. scariolæ ana M. j. fiat decoctio, ad lb. i. in qua diss. vini malorum gran. ʒ. 2. sacch. q. s. fiat syr. Si cum ventris astrictione fuerit, sequens parari debet.

R. syr. viol. ʒ. 2. decoct. hord. ʒ. 3. misce. Si verò inflammatio est in caua, rúc in principio tales sunt, quales præscripsimus. Sed postquam constitit defluxio, ad leuiter aperientes transeundum est, vt ad syr. end. compos. cap. Et in declinatione ad syr. de bizant. Dandi sunt tales cù decoctione quatuor sem. frig. maiorum, vel aliorum diureticorum, vt cum radic. graminis, apij, petro. In extrema verò parte post missionem sanguinis, addenda sunt repellentia, ne fiat influxus. Talia erunt ol. vel vnguenta, vel cataplasma. Olea sunt, quæ refrigerant, & astringunt, vt ol. ros. myrtil. addito pauco aceto. Quod si fortius est repellendum, vel refrigerandum, succi herbarum addendi sunt, vt succus vitis, cichor. plantag. solani, portulacæ, prunorum, pyrorum, vel cotoæ eorum, quibus sunt panni intingendi, & superponendi, frequenterque mutandi. Ceratum sandalinum idem præstare poterit cum aceto. Vnguentum album Gal. In incremento ros. vnguentum vel ol. Oleum cham supradictis addendum est, & in declinatione nardinum, absynthites, irinum, & alia, quæ deterguunt, additis semper aliquibus astringentibus. Pro incremento tale cataplasma paretur.

R. dactyl. mundatorum N. x. vuarum, pass. cum arillis ʒ. 3. coquantur in aqua cum aceto, & fortiter contundantur, quibus adde florum cham. mel. ros. rub. ana p. i. spicæ nardi, scæn. ana ʒ. i. seminis apij, petro. ana ʒ. ss. se-

minis end. portulacæ ana ʒ. i. ʒ. ol. de absynth. & ros. an ʒ. i. farinæ hord. ʒ. i. misce, fiat cataplasma. vel,
 R. acac. & fic. an. ʒ. ʒ. coquantur in aqua & aceto, cōtu-
 sa per cribrum passentur, quibus adde flor. cham melil.
 samb. ana ʒ. i. farinæ semin. lini ʒ. i. cum sapa, fiat catapla-
 sma, addendo spicæ celticæ vel nardi ʒ. ʒ. vel ol. chamo.
 vel anethi ʒ. ʒ. applicentur supra regionem hepatis. Re-
 soluit magis, quam supradictum. Quare post principium
 apponendum erit. Idem poterit ex carne malorum co-
 toneorum, vel pyrorum, vel pomorum, vel vuarum im-
 maturarum fieri, additis aliis odoratis digerētibus vt spi-
 ca nardi, scē. cypero, sandal. &c. Si in declinatione post
 inflammationem durities remaneat, tunc innuenda, aut
 prætermittenda sunt astringentia, & remollientibus ca-
 stiganda. vt,

R. pass. cum a. illis, fic ana ʒ. ʒ. muc. lini & fœnug. extra-
 ctæ cum vino ana ʒ. ʒ. ol. chamom. & anethi, vel amygd.
 amar. aut duls ana ʒ. ʒ. styrac. calam. iridis, ana ʒ. ʒ. deco-
 quantur pass. & ficus in sapa, & cum eadem fiat catapla-
 sma, vel vnguentum, quia magis emollit, quò profundius
 descendat.

R. ol. amygd. & liliorum ana ʒ. ʒ. ammo. diss. in aceto ʒ.
 i. styrac. iridis ana ʒ. ʒ. spicæ nard. scē. ana ʒ. i. ceræ nouæ
 q. s. fiat vnguentum, quo inungatur serò & manè. In de-
 clinatione non erit prætermittendus syr. compos. ex a-
 perientibus & aluum laxantibus, vt

R. rad. apij petro. an. ʒ. ʒ. polyp. quer. recentis ʒ. ʒ. seneg.
 oriental. ʒ. i. anis. fœnic. apij, petro. an. ʒ. i. flor. cham. vio.
 an. p. i. fiat decoct. In sb. i. ʒ. col. diss. oxym. simp. vel ace-
 tos. simp. ʒ. ʒ. sacch. q. s. fiat syr. aro. cū ʒ. ʒ. cinamomi, cap.
 alternis diebus ʒ. ʒ.

Victus ratio.

Vtatur victu tenui & exquisito. Est enim morbus hic
 valde acutus, & maximè si erysipelas sit. Abstineat à car-
 nibus, vino, dulcibus. Vtatur lactucis, cremore prisanæ,
 & pomis coctis, iure pulli. Si sit erysipelas, plus infri-
 gidare oportet. Habenda est etiam ratio capitis, quo-
 niam delirium semper sequitur has affectiones. Expe-
 ctare oportet fluxum sanguinis in crisi, & maximè si
 in caua fuerit. Eodem modo curatur lienis inflammatio,
 differt

differt tamen situ affectio, & ob id offerunt in sanguinis missione, quæ à parte affecta fieri debet. Remedia in declinatione debent esse magis incidentia & aperientia, per ventrem potius, quam per urinas purgandi. Scirrhus, ut plurimum sequitur, qui curari debet iisdem remediis, sed fortioribus. Emollientia minus sunt verenda in lienis scirrho, quam hepatis.

De hepatis obstructione.

CAP. XXXIII.

Iecur venas habet maximè obstructioni obnoxias, ob earum parvitatem, & structuram. Vena enim porta in capillares definit, per cauum hepatis disseminata. Item vena caua à gibba nascitur ex capitalibus excipientibus sanguinem coctum, & utraque bile purgatam. Itaque qui venas habent astrictiores, ut frigidi temperie, plus obnoxij sunt obstructionibus, tam ob venarum angustiam, quam ob copiam pituitæ lentæ & crassæ. Sunt enim illa duo, causæ obstructionum potissimæ, nempe meatuum angustia, vel humorum crassities, vel lentor, *Causa ob-* vel sanguinis copia. Obstructio magna morbus est partis *structio-* instrumentariæ, & causâ malorum symptomatum, ut i- *nis.* cteritiæ, febris inflammationis, & atrophiz. Danda est igitur opera, ut agnoscatur & curetur. Agnoscitur ab affectu, ut si citra cibi distributionem gravitas circa iecur sentiatur, corpus calidius, si color appareat flauus vel *Signa.* pallidus. Quod si tensio vel tumor in hypochondrio dextro sentiatur, certissimum erit hepar obstructum. Si alui excrementa alba sunt, cineritiæve obstructio est in vesicula fellis ad echisim. Ad horum cognitionem multum facit pulsus frequens. Victus ratio, quæ præcessit, ut si crassis & viscidis vti sunt, aut si à cibo corpus supra modum exercuerint, aut si crassis alimentis in prima mensa vti fuerint, à cibo verò calidis. & tenuium parvum, & diatrium piper. vel pulueribus digestivis, ex pipere. cinamomo, & aliis tenuibus odoratis, ut solent multi Medici præscribere. Talia enim (teste Gal. lib. de sanit. tuenda) faciunt cibum crudum inter venas penetrare, & obstructionem facere. Vfus medicamentorum aperientium, ventriculo pleno crudis humoribus, sæpe causa fuit obstructionum.

Vitæ ratio.

Curatur optima vitæ ratione, eaque attenuante, & vsu medicamentorum. Sed potissimum fugiendum est, ne alimenta crassa lentæque iniiciantur, neque præposito ordine, nempe astringentia crassaque in principio. In fine verò aperientia, vel attenuantia. Vitanda est ciborum varietas, & copia. Eligenda, quæ detergunt ventriculum, & intestina. Vomitus utilis est iis, qui ad eum faciles sunt. Vinum album aut rubrum tenue utile est, & alimenta attenuantia, vt herbæ & radices. Constituta vitæ ratione attenuante, præscribantur alimenta medicamentosa, vt vsus caparum ex oxym. vel aceto. Iuscula, in quibus decoquantur radices apij, vel petro. vel fœniculi vel eorum semina. Capiat tertio quoque die pilulas duas ante pastum per tres horas ex minoribus, vt de hiera simp. de aromat. vel ante cibum, quæ odorata tantum cū aloe recipiunt. Deinde syr. dantur, vel oxym. aliquod diureticum. Syrupi sunt acetos. de quinque radic. capil. de byzan. oxym. simpl. vel diureticum & similia. Quæ liquida sunt, magis conueniunt, quàm spissa vel dura. Finitis syr. purgetur pilulis supradictis, addito ad duplum aga. vel detur diaph. aut compositio alia quæ pituitam soluat, vt,

Syrup.

R. diaph. 3. β cum aqua apij, vel graminis, vel decoctione cicer. rub. fiat potus. Indum maius idem præstat. Post euacuationem fiant opiata ex conferuis alterantibus tro. pul.

Vnguent.

R. confer. rad. apij, 3. j. confer. flor. cichor. & capill. ven. ana 3. β. pul. diarrh. abb. triasand. ana 3. 2. tra. de eupato. 3. j. cum syr. de byzan. fiat opiata, capiat ad quantitatem auellanæ, superbibendo parum vini albi diluti aqua apij vel asparagi. Ad extrâ vngantur hypochondria ad aperiendas obstructions, & concoctionem crudorum humorum, & discussionem flatuum.

R. ol. nard. & amyg. amar. ana 3. 3. succi apij 3. j. decoquantur ad succorum consumptionem, cui adde spicæ nard. & celricæ, scen. asari ana 3. 2. semin. apij, petro. ana 3. 1. cyperi & ros. an. 3. β. ceræ q. s. fiat vnguentum pro hypochondriis, tempore inunctionis adde aceti parū. Hæc pro hepatis obstructione sufficiant. Quod si fortiora remedia

remedia ex postules, veniendum erit ad ea quæ pro liene obstructo præscribuntur, de quibus postea. In hepatis obstructionibus medicamenta aperientia apprimè valent, quæ recipiunt aliqua iecur roborantia, quales sunt tro. de eupatorio, tro. diarrh. dialacca. de rhab. de absynth. diacucur. Verùm ex istis eligenda sunt minùs amara, aut ingrata, minùsque calida & acria. Noui quandam nobilem mulierem, quæ ad vlcus renum deuenit vsu cuiusdam compositionis, puto vocari (de vino) excerptæ à praxi de Tarenta. Quare si morbus sit contumax, longiori tempore his vtendum est. Neque sunt hæc fortissima & calidissima danda frequenter. Quòd si cogamur ingratiss & fortissimis vti, meliùs in forma pilul. dantur, quia meliùs, & sine fastidio deuorantur: neque affatim ad partem veniunt. Quare nequeunt tam calfacere, vel aperire, vt dissoluant vel lædant. Ego semper magis vsus sum pulueribus cordial. vt diarrh. triafan. diogal. & ar. ros. aliisque vel pul. tro. miscere sic.

R. tro. de rhab. vel de eupat. 3. β. pul. diarrh. abb. 3. ij. diagal. 3. j. cum vino aut syr. de byzantiis, vel end. compos. fiant pilulæ vj. pro 3. cap. 7. superbibendo aquæ end. vel cichor. & graminis, vel aspar. an. 3. ij. Cùm calor præter naturam multus non est, tunc syr. calidiores, vel aquas imperamus accipiendas. Rarò accidit obstructio sine calore, præter naturam, nisi in scirrhis. Fortissima remedia ad obstructionem hepatis erunt apta obstructionibus lienis: hac tamen ratione differunt, quòd minus astringentia addimus in liene, quàm in hepate, & ob humoris crassitiem fortiora esse oportet.

De Ictero. CAP. XXXIIII.

Icterus semper symptoma est, & triplex visitur. Propriè dictus flatus est, à bilis aspersione. Altera à splenis vitio, & niger dicitur. Tertius ex vtroque fit, & nomine peculiari caret, dici tamen potest virescens à colore. Est enim ex mixta bile flaua humori atro, aut cineritio, vnde ex viridi flauescit. quod sæpe in puellis videmus, quæ κλέραι sunt, id est, ex viride flauæ. Icterus fit vel affatim vel sensim. Qui sensim ob obstructionē meatus vesicæ fellæ fit. Is verò meatus duplex est. Alter ab hepate in chylum, alter à chylo in cephylum descendit.

Si hic obstruatur, alui excrementa alba erunt aut cineritia. Si alter, vesica plena existens, excrementa vnicunque colorata sunt. Hi affectus sequuntur febres, vel hepatis obstructions. Hæc autem curantur iisdem ferè remediis quibus obstructions hepatis, hoc tantum interest, quod in hepatis obstructionibus vitimur medicamentis purgantibus pituitosa: In ictero biliosa sine attractione, vel parua, ut succo ros. scam. sero lactis, rhab. infuso in vino, vel aqua graminis, & aliis. Purgato corpore, & per vienas, & per ventrem, detergenda cutis balneo, & bilis euacuanda cunctibus sudore, ut quicquid est in habitu, euacuetur, discutiatur, & detergatur. Balneum tale paretur.

℞. ciclae cum rad. mal. pariet. foliorum visci querc. ana M. 4. fol. chelid. sapon. ana M. ℞. fabar integ. lupinorum ana p. 3. flor. cham. melil. centaur. minor. ana p. 2. hord. integ p. 6. fiat decoct in qua nater & sudet in lecto manè continuando per quinque dies, & novis spongiis detergatur. Si in oculis & facie perseveret affectus, erethina purgantia bilem erunt ex usu. ut,

℞. succi ros. 3. 2. succi ciclae 3. 1. scam. 3. 1. mel. ros. 3. 3. decoquantur ad spissitudinem, & digito immittant in nares. Aqua ex vino albo abluat faciem. Quod si velit citissime mundari, lauet cum aqua distillationis peponum, vel cum decoctione balnei, sed hæc non sunt tenenda, nisi euacuata bile, castigata intemperie hepatis calidioris. Victu regio vitantur. Bibant vinum album tenue dilutum aqua decoctionis graminis. Quod si mulieri vtero gerenti accederet icterus, vitatur optima victus ratione, & applicetur sequens medicamentum carpis, & plantis pedum, & curabitur.

℞. fol. visci querc. M. 2. fol. chelid. marrub. ana M. ℞. contundantur in mortario addito paucò vino, & applicetur. Hic morbus fit in morbis acutis. post, vel ante septimum. Quod si aliquo die critico fiat, apparentibus signis concoctionis, optimum est indicium, & bene sperandum. modò non obduruerit iecur. Quod si obduruerit, & ante signa concoctionis, ante diem decretorium fiat, malum significat, & hunc affectum fieri ob bilis redundantiam, quam natura domare & concoquere non potest, & irritata copia aut qualitate, ante legitimum tempus

tempus expurgans, ad cutim transmittit. Illius non magnam curam habemus, sed morbi acuti, à quo maius imminet periculum. Quod si euadant, postea curatur symptoma.

De hepatis scirrho.

C A P. XXXV.

Scirrhum in hepate, splene, & renibus facile fieri evidētissimè docuit Gal 13. Methodi In hepate quidem quia sanguine limoso nutriatur: in splene, quòd humore recipiat crassum: in renibus, quia sanguine spisso nutriuntur. Est autem scirrhus tumor durus sine dolore. Fit post longas & diuturnas, atque magnas obstructions, & post inflammationes, vel ob usum eorum, quæ obstruunt, & indurant. Cùm enim iecur obstructum est, tenues mittit humores ad alia membra, & in seipso retinet crassos, quibus dum nutritur, induratur, si vel refrigeretur, vel calfiat, vel siccet. Frigida quippe inculcant, calida resolvunt quicquid est tenuius, sicca idem digerendo. Inflammatio idem facit, quod obstructio. Præterea usus nimis frigidorum, & verè repellentium, vel astringentium, scirrhum generat. Sunt verò duo scirrhorum genera. Alterum nondum omnino factum est, neque hydropem aut atrophiam facit, potèstque curari remediis dextrè apposis. Alterum confirmatum dicitur iam factum, & in habitum versum, quod hydropem aut marasmodum facit, nec admittit curationem. Quare tales ægritudines curandas non debet suscipere Medicus, nisi cum præfatione: neque symptomata quorum scirrhus causa est. Nam cùm causa tolli nō possit, quomodo tolli poterit effectus? Adde quòd malactica quodammodo istis aduersantur, quibus scirrhī curari debent. Agnoscitur scirrhus tactu, nisi cùm venter flatibus intumuerit. Tunc enim hepar infrā residet, muscoli ventris sursum eleuantur à flatibus, qua occasione decipiuntur Medici, cùm venter detumuit, quia duritiem, vel tunicā viscerum inveniunt. Memini me vidisse quendam, qui tales tumores duos à paucis diebus factos esse assereret, quòd tunc primū apparerent. Ægrotantes sunt interrogandi, num grauitatem & pondus sentiant in hypochondriis, vel si dolorem sentiant circa omoplatas, aut claviculas, si in vtrumque latus decubere possint. Nā qui tumores illos

habent, nō nisi super partem affectam dormire possunt, aut quiescere, non in latus contrariū, vel supra dorsum. Quod si sine febre sint, scirrhum esse confirmabimus. Nam idem inflammationibus internis accidit, quæ nunquam sine febre sunt, vel ad extrā tumores fiunt.

CVRATIO.

Curatur autem hoc modo tum hepatis, tum lienis durities. Purgentur modo supra dicto cap. de obstructionibus hepatis, verū in pilulis plus myrrhæ, vel bdellij, vel styracis ponimus, vel aliarum lachrymarum quæ humores liquefaciunt, incidunt, & fundunt. In primis pilulis satis erit myrrham, & styracem, mastichēque apponere. Deinde præparato corpore ad ammoniacum & alia venire. Pilulæ fiant sic.

R. aga. 3. j. myrrhæ, styrac. an. 3. ss. spicæ celticæ, schen. cinamomi an. 3. ss. excipiantur terebinth. & fiant pilulæ, de quib. cap. 3. ss. vel 3. j. manē in exitu lecti, deinde vtatur syr. incidentibus, & iis quæ acetum recipiunt, vt syr. acetos. simpl. & compos. & aliis, vt de bizantiis. eupato. oxymel simp. & diuretic. scill. cum decoctione bismal. vel mal. viol. vel decoctione seminis lini, bismal. apij, petro. vt,

R. syr. acetos. compos. oxymel, diuret. ana 3. iij. decoctionis pass. sic. lb j ss misce, vel,

R. rad. bismal. 3. j. graminis petro. asparag. irid. exting. ana 3. j. viol. fol. alkechāgi. cichor. end. borrag. an. M. j. marrub. M. ss. pass. sic. dactyll. munda. ana N. x. anis. fœnic. seminis alkechāgi ana. 3. iij. seminis bismal. quatuor semi. frig. maior. ana 3. j. flor. chamo. melil. samb. viol. anth. ana p. j. fiat decoctio in aqua & sapa ad lb. ij. In quibus diss. syr. acetos. simpl. 3. iij. aro. cum 3. ij. cinamo. & iridis 3. j. cap. in quinque matutinis, quo finito capiat pilulas sequentes post mediam noctem.

R. mass. pilularum de sagapeno, vel foetidarum 3. j. fiant pilu. vij. in crastinum dentur 3. ij. terebinth. abietis, quatuor horas ante prandium. Deinde vtatur opiata sequenti.

R. conf. capil. & viol. ana 3. j. pul. diarrh. abb. & diareos simpl. ana 3. ij. tro. de eupato, & de rhab. an. 3. j. cū syr. de bizantiis & viol. fiat opiata, de qua cap. manē ad quan-

quantitatem nucis, superbibendo parum vini albi dilu-
ti aqua borrag. & apij. Iſtis peractis inunctionibus emol-
lientibus, aut fotibus emollienda eſt pars, quod oleis pri-
mum tentare oportet, & paucio vino albo. Emolliunt ol.
amygd. dulc. ſeſam. liliorum, irinum. Additur vinum aut
acetum ad penetrationem, vt,

R. ol. amygd. dulc. ʒ. ij. ol. liliorum ʒ. ij. vini albi ʒ. j.
miſce, Succī addi poſſunt & pars irrigari & foueri Suc-
ci herbarum emollientium ſunt ſuccus iridis, cucum. a-
greſt. ciclam. ariſtol. ſolani veſicatorij. fiat hoc modo.

R. ſucci iridis ʒ. iij. ſucci apij ʒ. ij. ſucci abſynthij ʒ.
j. ol. amygd. dulc. ʒ. iij. vini albi ʒ. iij. miſce, & cum
col. foueatur regio. Si ex his ſuccis linimentum facere
volueris, decoqu. ſucci cum oleis, deinde adde butyri,
& pinguedinis galli, vel medullæ cruris vituli, aut por-
ci ana ʒ. j. miſce, fiat linimentum. Quod ſi ſpicam celti-
cam aut ſche. vel ſtyrac. myrrham, iridem addideris ce-
ræ, vnguentum efficacius fiet, quale eſt ſequens, quo v-
tendum poſt alia remedia, & maximè poſt fotus ſequen-
tes.

R. ſucci ciclam. irid. an. ʒ. ij. ſucci cucu. agreſt. & rad.
vlmi an. ʒ. j. ol. amygd. dulc. & liliorum an. ʒ. iij. deco-
quantur in duplici vaſe ad ſuccorum conſumptionem,
quibus adde pinguedinis porei, medullæ porci an. ʒ. iij.
tereb. ʒ. ij. propoleos ʒ. j. ſpicæ, trid. ſchen. myrrhæ, ſty-
rac. ariſtolo. rotundæ ana ʒ. ceræ q. ſ. fiat vnguentum,
quo vngatur pars poſt fotus ſequentes.

R. radic. vlmi mādrag. ana ʒ. ij. rad. irid. & ariſtol. an.
ʒ. j. fol. ſolatri, mal. biſmal. cum radic. ana M. j. viol. &
doronici. an. M. ſ. flor. chamo. meliloti, ſambuci, an. p. ij.
fiat decoctio in aqua, & vino albo, ſi pro hepate. ſin pro
liene, cum aceto, & cum ſpongiis ablutis fiat fotus, cui
adde abſynth. M. ſ. ſi pro hepate paretur, & poſt fotum
vngatur vnguento ſequenti. Quod ſi his remediis non
cedat, fortiora paranda erunt, vt,

R. rad. biſmal. irid. cucum. ana ʒ. vj. rad. ſamb. ebuli,
& ariſtol. ana ʒ. iij. rad. panac. ʒ. j. foliorum marrub. pu-
leg. mal. biſmal. geraniij maioris, & minor. pedis colū.
ana M. ij. ſeminis lini & ſcænug. ana q. j. flor. chamo.
melil. ſamb. ana p. ij. fiat decoctio in aqua decoctionis

intestinatorum & vino albo, & foueatur frequenter. Si pro hepate fiat, in fine decoctionis addere oportet spice vtriusque & asari ana 3.3. absynth. M. 1. hunc solum sequitur vnguentum.

℞. ol. hepatis galearum, vel raifarum, 3.3. ol. liliorum scorp. & lombric. ana 3.2. ammo. sagap. dissol. in oleis prædictis ana 3.2. styrac. cal 3.1. beniou. 3. β. irid. aristol. spice asari ana 3.3. medullæ porci, vituli, & cerui ana 3.3. ceræ nouæ q. s. fiat vnguentum, tempore vnctionis adde aceti scill. parum. His topicis per intervalla uti oportet, sed diu continuando. Et cum fastidiosum sit semper his uti, fiant empla. ut,

℞. mass. emplastr. ceron. 3.4. spice nardi 3.1. styr. cal. 3. β. cum. ol. irino fiat.

℞. mass. emplastri diachil. magni ireati 3.4. malaxentur cum ol. irino & de absynth. Applicetur regioni hepatis. Hæc emolliunt & corroborant. Danda sunt vicissim aliqua purgantia leuiter, ut materia liquefacta, & æquata euacuetur per sedem. Item & cientiā vrinam, ut per vrinam expurgetur pars gibba hepatis. Id annotatione dignum est, quod ex frequenti corporum dissectione obseruavi, omnes hydropicos, vel scirrhosos, glandulas, mesenterij induratas habere, & pancreas similiter. Quare non erit inutile totum ventrem oleis tingere, vel vnguentis, totumque ventrem fouere.

De Hydrop.

C A P. XXXVI.

Vide alterum caput sub finē libri secūdi.

HYdrops est aquæ serosæ collectio inter peritoneum & intestina, in thoracis spatio, & venis omnibus. Fit autem ex hepatis immodica refrigeratione, ex qua eius actio læditur, minuitur, corrumpitur. Ea vitia cum alimenta vertuntur in flatus, Tympanites fit: cum in ferum, Ascites: cum in pituitam liquidam, Anasarca, seu Leucophlegmatia. Hydrops fit, modo per proprietatem, modo per consensum. Per proprietatem, si affectus sit primarius in hepate, ut intemperies omnis, obstructio, inflammatio, & omnis humor præter naturam hepatis occupans. Per consensum partium internarum potissimum earum, quæ nutritioni dicatæ sunt, ut ventriculi, splenis, mesenterij, renum, intestinatorum gracilium, quæ si non fungantur suo munere, hepar refrigeratur, eiusque

eiúsque coctio corrumpitur. Vt si splen ob scirrhum nõ purgat sanguinem, aut renes propter obstructionem, vel aliam causam serum non trahant, aut propter imbecillitatem, vel obstructionem diuturnam emulgentium. Nascitur nonnunquam vitio chystris fellis, vt post icterum sæpe contingit. Accidit & post menses suppressos, vel immodicè fluentes, aut hæmorrhoidas superfluas, vnde supramodum refrigeratur hepar. Calorem enim innatus situs est in sanguine & spiritu, ob id post magnã eorum euacuationem, vniuersum corporis habitum refrigerari oportet, & maximè ac imprimis hepar, quod maiore opus habet calore, ob suam functionem. Si verò excrementa per vterum, aut hæmorrhoidas vacuari solita retineantur, refluunt ad hepar, & eius calorẽ velut suffocant. Nam melancholicus ille sanguis reparato frigidior, ipsum refrigerat. Cæterum non solã intemperies frigida, sed & calida natium calorẽ extinguunt. Omnis enim insignis intemperies actionem lædit, & corrumpit, quæ quidem sit à calore temperato. Quò fit, vt malè concoquant febricitantes, aliàsque naturales actiones minus rectè obeant.

Intemperies omnis actionem lædit.

ANASARCA.

IN anasarca omnes partes prætumidæ sunt, sed inferiores magis, ob humoris grauitatem, & earum partium frigiditatem, & pituitæ redundantiam. Tumidis partibus impressis digitus vestigium relinquit. Est enim velut œdema totius corporis. Acidum sæpissimè post morbos diuturnos, & febres pituitosæ. Ab hac distinguitur aliæ duæ species, in quibus partes contabescunt. Venter solus inflatur in principio, & tandem pedes.

ASCITES.

AScites à Tympanite distinguitur, quamuis Hipp. non secernat, ob similitudinẽ. In vtraq; enim subest aqua, flatus: sed differunt ratione maioris & minoris. In Ascite plus est aquæ, minus flatuum: In Tympanite contrà. In hoc est minor tumor, percussus venter ob distentionẽ sonum tympani reddit, & facies minus recedit à naturali habitu. In Ascite minor est ventris distictio, & maior caloris mutatio. Et quando ex vno latere in aliud mouetur eger, sonus defluëtis aquæ percipitur. Succedit

*Affecti
hepatis si-
gna.*

cachexiæ, morbis hepatis calidis, & obstructionibus, morbis lumborum, renū, vesicę. Cognita specie diligen- ter videndum, an hepar primario affectu laboret. Id verò cognoscetur ex dolore, & distentione partis, aut si nullus prædictorum morbus præcesserit. Et nunc omni cura stu- dioque erit prouidendum hepati. Quod si per consensum malè efficiatur, causæ primū occurrendum est. Hæc autè est abscindenda, deinde ad id, quod genitum est, venien- dum. Sed quia aqua collecta morbum facit, & auget, ea tanquam causa primū auferenda est, ac ne augeatur, ratio victus exiccans, & quodammodo refrigerans insti- tuenda est, in frigida calfaciens. Et quoniam plerunque hydrope sequitur cacohymiam prauis succi, qui aut ob- structionem, aut intemperiem pepererunt, vt causa vni- uersalis, euacuandi sunt. Quod vt fiat cōmodius, distin- guenda est causa. Infrigida commodè dabimus hieram picram, benedictam, quę multum nocent in calida. In hac autem vtemur cath. aut diaph. Triphas non pro- bo, quia myrobalanos recipiunt, nisi sit suspicio fluxus alui. Tūc enim tutò dari possunt. Sed, vt in reliquis mor- bis, ita in hoc quoque remedia debent esse propria, & (vt loquuntur) determinata. Vt si dentur cum aqua endi- graminis, cichor. Endiuia, in vtraque conuenit.

*Quæ non
conueniunt*

R. cath. ʒ. j. diaph. ʒ. j. aquæ endi. ʒ. iiij. syr. capill. ven. ʒ. j. misce, fiat potio. Non conuenit syr. viol. quia nimis humectat. Nec syr. ros. lax. si adsit obstructio, quamuis se- rosos humores educat. Quod si nulla sit aut levis, astri- ctio dari poterit cū aqua graminis, end. asparagi, fuma. vel cum decocto cicer. rub. Potest etiam dari pro mino- ratius decoctum fol. senę. Non sunt exhibendi syr. diu- retici, priusquam factū fuerit fluidum corpus, & aliqua ex parte purgatum, ad præparationem & auferendam in- temperiem calidam. Syr. endi. simpl. conuenit, syr. capil. de fumar. simpl. & compos. acetos. simpl. de bizantiis, de cicho. Atque vt hi liquidiores fiant, addimus aquas eius- dem facultatis, vt cicho. endi. capill. agrim. graminis, & asparagi. Porro, quæ tantū humectant, vel refrigerant, & astringunt, vt syr. de gran. de nymph. viol. de pap. de iuib. & similes, sunt reiciendi. In processu tamen admiscerur adstringentia, vt hepatis substantia corroboretur, qualia sunt

*Quæ con-
ueniunt.*

sant cyperus, absynth. spica. Sic ergo à nobis fieri solet.
 R. syr. endi. simpl. de bizant. ana ʒ. iij. aqua cichor. graminis, aspar. ana ʒ. iij. aquarum absynth. vel agrim. ʒ. ij. misce, atro cū ʒ. j. pul. triaf. aut diarrh. abba. aut sandal. rub. capiat in quinque matutinis. Si malit vti decoctis herbarum, poterunt concedi, quia minus calfaciunt. Aquæ sunt præferendæ in obstructionibus, aut in causâ frigida, ob partium tenuitatem. Interim dum syr. vritur, tertio quoque die clyster iniiciendus erit, & potissimum secundo & ultimo die, vt medicamentum, facilius & tutius agat. Clyster ex iis parandus, quæ humorem in ventre collectum, & aquas trahunt, circa magnam calfactionem Nūquam mollietia, qualis est malua omnis, misceri debent, sed ex detergentibus, discutientibus, purg. Clyster est ad hunc modum parandus.

R. merc. M. ij. ciclæ M. j. pariet. M. ʒ. pedis colūb. M. j. ʒ. anis. fœnic. ana ʒ. ʒ. fiat decoctio ad ʒ. j. col. dyff. suc. ci merc. & beatæ ana ʒ. j. ʒ. cath. ʒ. j. mell. anth. ʒ. ij. salis parum, fiat clyster. Oleum non est miscendum, quia relaxat, nisi fuerit aliquod ex his, quæ flatus dissipant, vt aneth. rutac. & similia. Iniecto clystere, postridie dabitur medicamentum purgans Sed quia pauca sunt propria & accommodata, decoctum parandū erit, in quo corrigantur inutilia, coctū cnidiū, semen lauriolæ. Castigatur aqua endi. & absynth. alioqui immodicè calfaciunt. Est autem potio commodior pilulis, quia citius descendit, distribuiturque. Pilulæ autem, cum tardius agant, longa mora nimis calfaciūt. Quod si liquidum medicamentum æger auerferet, huic bolus erit vtilior pilulis. Medicamenta sunt talia quæ tollāt obstructiones, aquas ducāt, & in causa calida bilē, simul & serosum euacuet. Mitiora sunt, semen carth. serum lactis, ag. Valentiora, cyclamen, laureola, thymel cham. brass. marina, scammon. herba asari. & hederæ semen, ebuli, samb. cortex.

R. pass. (ad corrigendum hepar, & leniendam asperitatem aliorū) ʒ. ij. seminis anisi ʒ. ij. seminis apij. petro. alch. cag. ana ʒ. j. medullæ seminis carth. ʒ. j. senæ oriér. ʒ. ʒ. ag. ʒ. j. ol. chamel vel thymel. ʒ. ij. vel ana ʒ. j. brass. mari. ʒ. iij. fiat decoct. in. q. j. col. dyff. elect. indi ma & de citro sol. ana ʒ. j. misce fiat potio, vel sic pro diutib.

R. decoctionis præcedentis ʒ. iij. rhab. infusi in vino albo, & aqua graminis ʒ. j. ʒ. spicæ cinamomi ana ʒ. vi. fiat leuis expressio, & ex ea potus. Virique potioni adde, si vis, ad dulcorandum syr. capill ʒ. j. vel syr. ros. lax ʒ. j. aucto pondere spicæ, & cinamomi. Ego soleo exhibere pauperibus elect. de succo ros. elect. de citro sol.

R. merc. M. ij. brass. marinæ M. ʒ. fiat decoctio in aqua absynt. & end. In col. diss. ele. & de succo ros. ʒ. iij. vel indi maioris ʒ. ij. syr. de byzant. vel ca. ʒ. j. misce, fiat potio. In bolo vis medicament. maleficia non sic castigari potest. Si tamen æger malit bolum sumere, fiat hoc modo.

R. cath. ʒ. ʒ. indi ma. elect. de succo ros. ana ʒ. ij. cum sacch. fiat bolus. Si pilulis uti velit, eligantur, quæ myrobal. non recipiant, & quæ ex aloë lota parantur, ut,

R. mass. pil. elephang. ʒ. j. ag. ʒ. ʒ. diagr. ʒ. iij. cum succo brass. aut ireos, for. pilulæ. Euacuato corpore hepar roborandum, data postridie tab. j. diarrh. abb. aut triasandali cum aqua endi. & absynthij. Vel præscribenda est opiata ex corrob. iecur sine magna caliditate, & resiccantibus atque absumentibus humores.

R. conse. flor. cichor. capill. ve. ceterach. (in duritie splenis) ana ʒ. ij. cons. anth. ʒ. j. quæ quamuis calida sit, non nocet, sed roborat cerebrum, hepar, ventriculum hepatis lupi, vel echini terrestris ʒ. j. vel amborum ʒ. ʒ. cineris cicadæ ʒ. ʒ. cornu cerui vsti ʒ. j. diarrh. trisan. ana ʒ. ij. cum syr. end. simpl. aut capill. fiat opiata de qua capiat bis in hebdomada, superbibendo parum aquæ graminis, end. acrimoniæ, vel absynth. & solani vesicatorij. Ad hepatis corroborationem fiat tale linimentum.

R. vnguenti ros ʒ. iij. sandal. albi & rub. ana ʒ. ij. flor. cichorij ʒ. iij. seminis apij, petro. end. an. ʒ. j. tro. de caphora ʒ. ʒ. spicæ vtriusque, schen ana ʒ. j. ol. de absynth. ʒ. j. misce, fiat linimentum, quo vngetur bis aut ter in hebdomada regio hepatis, addendo aceti parum. Interim dum vtitur vnguento, & opiata corroborante, tertio quoque die capiat clyst vel ʒ. iij. præscripti syr. vel vtatur apoz. sequenti ad ducendas aquas, sed præcedente tali.

R. merc. ciclæ, pedis colum. ana M. ij. fol. brass. ma. & chame. ana M. ij. quatuor sem. frig. maior. ʒ. iij. flor. cha. & genistæ ana P. j. fiat decoctio. In ʒ. j. diss. succi beræ & merc.

& merc. ana ʒ. j. vrinæ pueri ʒ. iij. mell. anthos. ʒ. ij. Si fortiorē velis, adde fermenti acerrimi ʒ. ij. fiat clyster, qui detur quarto quoque die, vel ante vsum syr. sequentium. Hic clyster potentissimè trahit aquas.

A P O Z E M A.

R. quinque radic. aperitiuarum ana ʒ. ij. end. cichor. herbarum capill. agrimo. ana M. j. seminis end. & albe. ana ʒ. ij. seminis apij, & petro. ana ʒ. j. fol. brass. marinæ cham. an. ʒ. ij. senæ ʒ. j. pass ʒ. iij. flor. cichor. bugl. cice. rub. ana P. j. fiat decoctio. In lb. j. diss. sacch. q. s. fiat syr. aro. cum ʒ. ij. diarrh. abb. Utatur alternis diebus, continuando per tres dies. Postea intermitat vsum, & utatur opiata. Non parū proderit vngere regionem vesicæ & renū, & ventri apponere hoc cataplasma.

R. ol. rutæ ʒ. iij. vini albi, vrinæ pueri ana ʒ. ij. succi pedis col. ʒ. iij. succi apij, petro. ana ʒ. asari, spicæ celticæ, seminis sesel. apij, petro. ana ʒ. j. ceræ nōnæ & terebinth. parū, fiat ad formam liniment. Coquantur succi in ol. in quo deinde cera dissoluatur. Valentius erit, si addas succum ireos, sed samb. vel cucum. agrest. vel brass. ma. & rursus coque ad consumptionem aquæ, postea vnge ventrem. Sunt, qui emplastrum de baccis lauri consulant, sed hoc magis in tympanite conuenit, quā in ascite, quoniam plus iusto calfacit. Cocleæ tritæ, & ventri impostæ à quibusdam multū commendantur. Quod sequitur optimum est.

R. stercor. vaccæ lb. ij. far. lupinorum ʒ. ij. sulphuris ʒ. iij. cymini ʒ. ss. incorporentur simul cum vino albo, & applicentur ventri, virata regione hepatis. His remediis, & optima viâ ratione (nimium exiccante, & non calfaciente) hūc morbum sæpe curauimus. Ager abstineat à iusculis, parcissimè bibat. Utatur in potu vino albo diluto aqua, in qua incoctæ sint herbæ capill. & radix graminis. Utatur assis. Quod si cōtendat id sibi permitti, nonnunquam elixa degustet. Abstineat ab omnibus fructibus exceptis passulis.

Ascita curatio.

Ascites, si à causâ frigida ortum habeat, audacius vtemur calorificis. In hac autem idem ordo seruandus est, quem secuti sumus in causâ calida. Remediorum

tempus & quantitas eadem, sed qualitas diuersa. Pro minoratiuo accipiant hæc.

R. diaph. ʒ. ss. diss. in decocto cicer. rub. aut in aqua graminis apij, & syr. de bizantiis, vel,

R. pil. eleph. ʒ. ss. ag. tro. ʒ. ij. cū syr. de bizant. fiant pil. capiat post primū somnum. Deinde vtatur syr. sequēti.

R. syr. de bizant. de eupath. de quinque radic. ana ʒ. ij. aquarum apij, petro. aspar. ana ʒ. iij. cū pul. diagal. arom. ros. aut cinamomi, fiat syr. capiat in tribus matutinis. Postea purgetur sic,

R. diaph. indi maior. ana ʒ. ij. elect. de citro sol. ʒ. j. ss. cum sacch. fiat bolus, vel cū decocto sequēti fiat potio.

R. pass. ʒ. ij. senæ, carth. ana ʒ. j. ag. ʒ. ij. apij petro. ana ʒ. j. flor. anth. P. j. fiat decoctio. In q. j. diss. diaph. ʒ. iij. diacarth. & de citro sol. ana ʒ. j. syr. capill. vel de bizant. ʒ. j. fiat potio. Hic adnotandum astringentia & cholagoga non conuenire.

R. pil. cochiarum ʒ. ss. ag. tro. ʒ. j. cum oxymel. fiant pil. vj. capiat post mediam noctē. Sūt, qui pilulas de mesereo, tanquam summum remedium imperent, sed earū vsus est periculosus, tum quia non rectè, neque ex vero mesereo parantur, tum quia huiusmodi medicamenta supra modum calida in forma pilul. diutius remanēt in ventriculo, vnde periculū est, ne pars aliqua interna lædatur. Quod si sumantur cū syr. citius penetrant, aquas ducunt, & magis purgāt sine molestia Sufficit aut pharmacum paulo fortius minoratiuo, quia tutius est per vrinæ materiā vacuare quàm per ventrē. Est enim in hoc morbo profluuium ventris periculosius. Purgato corpore vtatur alternatim opiata, syr. & vng. vt dictum est.

R. conf. elenij ʒ. ij. conf. flor. anth. ʒ. j. conf. flor. circho. iij. arom. ros. ʒ. j. ss. pul. diatrag. ʒ. j. hepatis lupi ʒ. ss. cum syr. de bizant. fiat opiata, capiat alternis diebus, superbibendo parum vini albi diluti aquis sequentibus.

R. aquarum apij, petro. absynth. ana q. j. post aliquot dies capiat clysterem, vt supra dictum est, qui à superiore non differat, nisi quod audacius huic miscere possumus calidiora & valentiora, vt est benedicta, hiera & similes. Corroboratis visceribus erit hoc apozema.

R. rad. aperit. ʒ. ij. corti. tamarisci & samb. præsertim si adfue-

Si adfuerit durities alicuius visceris, vt ferè fit) betonica, hyss. puleg. eupat. marrub. chamed. chamep. an. M. j. fol. absyn th. brass. ma. & chamel. an. M. ss quatuor semi. frig. ma an. 3. ij. senæ 3. j. medullæ carth. 3. ij. ag. tro. 3. ij. semi. hederæ 3. iij. asari 3. ij. flor. anth. P. j. Cicer. rub. P. j. fiat decoctio. In tb. ij. diss. sacch. qr. j. fiat syr. arom. cum 3. iij. aro. ros. vel diagal. capiat 3. iij. alternis diebus, intermediis vngatur vnguentis & cataplasmatibus. Vnguentorū viscera corroborantium hæc est formula.

R. ol. nardi. de absynth. amygd. amar. an. 3. iij. spicæ vtriusque, scen. asari ana 3. ij. cyperi, sandali an. 3. j. semi. seseli, apij, petro. ana 3. ss. ceræ parum, fiat linimentum, quo vngatur iecur & lien. Si durities sit in aliquo viscere, fiat sic.

R. vnguenti præscripti 3. ij. flor. chamo. & melil. an. 3. iij. styrac. vtriusque ana 3. ij. ammo. bdellij, opopan. diss. in aceto scill. an. 3. ss. terebint. 3. j. ceræ nouæ q. l. fiat vnguentum, quo inungatur pars indurata. Cataplasma conficitur ex iisdem rebus, aucta quantitate sulphuris & cymini. Interdum vtimur baccis lauri exceptis melle. Hoc remedium admotum scroto & ventri absumit, resoluítque citra magnum calorem. Fiunt etiā linimenta, epith. quæ aquas mirum in modum pellunt, ex chame. thymelea, laureola, cucum. agresti, apio, asaro, cicadis, cantharid. & aliis. Imponuntur autem vmbilico, regioni vesicæ, renum, & perinei, vt eorum vis ad meatus vrinarios citius perueniat, quibus vacuatis serofus humor attrahitur fuga vacui, qui in venis erat reliquus. Atque istud à me præclare expertum est in admirabili affectu cuiusdā. qui cum se aliquādo multa ingurgitasset aqua, sic toto corpore intumuerat, vt non procul abesset à suffocationis periculo. Ipse verò in ea opinione erat, vt crederet inutilem esse medicamentorum vsum, sed tandem coactus est fateri eorū vires. Parauit enim linimentum ex aliquot succis, mihi missis ex Gallia Narbonensi, quo admoto, cœpit vrinam reddere post sex horas, & tantam copiam vno atque altero die reddidit, quantum capere vix potuerunt sex magnæ matulæ, sic.

R. succi thymel. chamel. ciclam. & brass. mar. an. 3. ij. asari, spicæ nardi, scen. seminis apij, petro. rutæ, agni an.

3. j. farinæ lupin. & cicer rub. ana 3. j. s. incorp. simul, & cum cera fiat linimentum quo vng. vmbilicus, regio vesicæ, & perinei.

R. succi brass. ma. & cacuminum agni ana 3. ij. succi reos, aristol. rotund. ana 3. j. seminis api, petro. carui selseli ana 3. j. terebinth. 3. ij. ceræ parum. fiat linimentum. Fortius erit, si addas cinerem scorpionum, cicadarum integratum. Oleum non est miscendum, quia obtundit vim medicamentorum acrium. Quod si sine oleo medicamentum hoc non potest consistere, adde ol. scorpionum, & amyg. amar. ana 3. ij. Tibiis inflatis conuenit hoc lixiuium.

R. ciner. ficus, caulium & sarmentorum vitis an. lb. s. ciner. asphod. hermodac. an. qr. fiat lixiuium, in quo diss. salis communis lb. j. alum. qr. j. abluantur pedes, & postea imponatur tale cataplasma.

R. sterc. vaccæ lb. j. sterco. capræ lb. s. incorporentur cum lixiuio tonsorum, & vino, applicentur tibiis. Si malum perseveret, opiata loco dentur medicamenta validiora, vt dialacca, diacucur. sed quæ sapore sunt ingratisimo, ex iis & aliis propriis pil. sic compono.

R. diacucur. 3. i. dialacca, tro. de rhab. ana 3. s. hepatis lupi, cineris intestinorum lupi ana 3. ij. seminis hederæ 3. iij. cum syr. de absynth. fiant pilulæ ad magnitudinem pisi, capiat tres vel quatuor singulis diebus quatuor horas ante pastum. Conueniunt in omni specie hydropis, addito succo brass. marinæ.

Tympanite curatio.

Plus flatu in Tympanite, & minus aquæ subest. Conueniunt eadem remedia, quæ in Ascite, hoc addito, quod magis sunt flatu discutientia. Oportet igitur laxare & aperire mediocriter, discutere verò tam sumptis, quam admotis medicamentis valde calidis, præsertim in causa frigida. Nam in causa calida, minus calidis utendum est. Et quia flatu à cruditate, ventriculus roborandus calidis & astringentibus, vt,

R. olei mastic. 3. j. ol. nard. & de absynthio an. 3. ij. vng. ventriculus.

R. cerati stomach. Gale. 3. iij. applicetur. Imperamus etiam pul. à pastu, ad discutendum flatu, vt,

R. anisi

R. anisi conditi 3. ij. carui, cymini, fefel. an. 3. j. mace-
rentur in aceto per noctem, carnis citri 3. ij. cinamomi
crassi, & galang. an. 3. ss. facc. ros. tab. ad pondus omnium
fiat pul. capiat cochlear vnum à pastu.

R. diag. & diacucur. an. 3. iij. confect. aro. ros. 3. j. cine-
ris intestinorum lupi 3. ij. hepatis lupi 3. j. pellic. stoma-
chi gallinæ 3. ij. cū syr. conseruationis, cort. citri, fiat o-
piata, capiat ter in hebdomada 3. j. superbibendo parum
vini diluti aqua absynth. In ascite tantum purgandus est
venter, quoniam in hac sola specie, ingens copia aquæ col-
ligitur in peritoneo. Quod utilis sit hæc punctio, demō-
strari potest, quia per eam aqua euacuatur, quæ per aliā
regionē perfectē non potest euacuari. Nec adco pericu- *Apertio*
losa est ventris apertio, modò recte fiat Nā videmus eos, *Ventris.*
quibus vulneratus est venter, euadere, nisi vulnus pene-
tret in gracilia intestina. Prætereavtilem esse constat ex
euentu. Quibus enim casu quodam per vmbilicū aqua
erumpit, hi sunt curati. Quod si quis obiiciat hoc reme-
dio tēto multos interiisse, huic respōdebimus id cōti-
gisse, vel quia facultas hepatis in illis erat emortua, vt
postea sanguinem bonū gignere non potuerit, aut quia
remanerat scirrhus hepatis, aut lienis, vel quia morbus
natus erat ex pulmonis ulcere (Phthisici enim prope-
modum omnes in hydropē incidunt) vel quia in thorace
fuerit etiam collecta aqua, quæ vacuata non est, quod ex
tussi deprehendi potest. Hos desperatos esse dicit Hipp.
Sed sic intelligēdum est, nisi vtraq; pars pectoris aperia-
tur. In deploratis, qui ad extremā virium imbecillitatē
deuenerunt, qui scirrhum in hepate confirmatum, aut
liene, aut ulcus in pulmonibus habet, ac denique in se-
nio confectis, non debemus hoc remedium experiri.
Dum venter pungitur, non est spectandum ex vtra parte,
dextranē, an sinistra malum cœperit, vt quidam religio-
sus obseruant. Nam nihil refert vtram partem feces,
cū ex vtraque possit commodē vacuari aqua.

De lienis affectibus. CAP. XXXVII.

TOr & tales morbi fiunt in splene, quot & quales in
hepate. vt intemperaturæ, inflammationes, tumores
duri, obstructions, & morborum similium symptoma-
ta, vt icteri, hydropes. Quare cū fiunt simili modo,

etiam simili methodo, & fere eadem materia medica curantur. In hoc tantum differunt, quod morbi splenis valentiora medicamenta desiderant incidentia non ob substantiam partis (est enim tenuis & rara) sed ob materiam terreā & crassam, quam in se continet. In aperiēdo minus vtimur astringentibus, quia pars minus est principalis. & minus sui conseruationem indicat, quod de remediis externis velim intelligas. Nam cum ad splenis affectus fortissima remedia instituuntur, ad iecur etiam perueniunt, idque laedunt nimis fortiter aperiendo, vel dissoluendo. Differunt & in hoc, quod melancholia in splenis affectibus præcipue expurgatur, bilis in hepatis, in vtriusq; verò obstructione pituita, quoniam magna ex parte facit obstructiones sua crassitie. Quare eadem medicamenta curabunt intemperiem hepatis & lienis. Inflammatione laborantibus his partibus, in sanguinis missione differūt indicationes, ob situm partis, atque in topicorum admotione. Nam in hepate admoventur in dextra parte circa posteriora, si in gibba sit affectus: ad anteriora verò, si in caua: in sinistra & infra nothas costas applicantur splenitica. In curatione obstructionum & icteri sola medicamentorum vehementia differunt. Quare & fortissima remedia ad obstructiones & scirrhus hepatis præscripta erunt splenitica. Item quæ capreae & acetum recipiūt, quæq; minus astringūt, spleni magis sunt accommodata. Quare superfluum esset, ea hic repetere. Id tantum adnotare hic oportet, limaturā calybis incrementem lienem minuere, vt & aquam fabrorum ferrariorum, & semen portulacæ, cum ob eius facilem relaxationem aliquando intumescit. Quæ enim cōstringunt cogenda, substantiā raram minuunt. Aliud etiam notandum est, quod in tumoribus & doloribus splenis status discutientia, vt agnus castus, seseli, apij, & petroselinæ semina, succus rutæ multum iuuant. Colon intestinum spleni alligatur & incumbit, quod flatibus distentum, & agros & medicos sæpè fallit, sed hac nota discernuntur, quod spleniticus dolor grauis sit, colicus verò distendens, acutus & mobilis: Spleniticus in parte vna fixus est: in colico totus venter à flatibus distentus: in splenis verò affectibus, sola pars sinistra.

*Quæ lienem
minuunt.*

*Colici à
splenitico
distinctio.*

CAchexiam Græci vocant malum corporis habitum. Est autem color malus ex albo flauescens, vel virefcens, caro laxior, & omnes vires imbecilliores, & vt dicam breuiter, illa est corporis constitutio, quæ hydropem præcedit. Sequitur immoderatas sanguinis euacuationes per hæmorrhoidas, aut alias partes scirrhusque viscerum. Quare eadem cura erit huius, & imbecilli hepatis, aut cum affectu, quem præcedit, & quem sequitur, vt si cachexia sequatur scirrhum, & vergat in hydropem, tunc victus ratio sit exsiccans & attenuans. Exsiccandum quippe ob humiditatem incipientem, aut serum, quod est factum ab intemperie, & imbecillitate hepatis. Attenuans autem, vt semper causa huius affectus oppugnetur, ne, scilicet. materia crassa scirrhum faciens gignatur. Eadem est ratio medicamentorum. Sed cum habitus vertitur in aquam, magis digerentibus, quàm humidis emollientibus, magisque farinis siccis, quàm fortibus ex oleis, vel decoctionibus vtemur. Si cachexia fuerit ab immodica sanguinis euacuatione, corpus reficiendum humidis, pares refrigeratæ calfaciendæ, & habitus corporis siccandus. Quod si fiat ex eius retentione, hæmorrhoidas aperimus, corpus leuiter laxamus, ad quas omnes causas vsum harum pilularum experior efficacissimum.

℞. pul. dialacæ, vel diacucurmæ ʒ. j. rhab. ʒ. ij. diarr. abb. diagal. ana ʒ. j. cum syr. de absynth. fiant pilulæ parua, capiat quarto quoque die pilulas quatuor manè. Quod si affectus hic sit cum intemperie calida aut fluxu immodico, fiat vt sequitur. Pro febre sic.

℞. tro. de rhab. ʒ. ij. rhab. ʒ. j. ag. ʒ. ʒ. pul. diar. ʒ. j. cum syr. capill. fiant pilulæ. cap. sex bis in hebdomada mane, superbibendo aquæ end. & cichor. ana ʒ. j. Si febriant, magis conueniunt syr. quàm pilulæ. Sed qui tandiu vfi sunt syrupis, his minùs molestæ. Syr. conuenientes sunt, de bizan. de eupat. capill. ven. end. compos. vel de cich. cum rhab. vel end. addendo rhab. idem præstabit. Si cum fluxu immodico sit affectus, pilulæ sic fiant.

℞. myrob. citrinorum, chéb. ind. an. ʒ. j. confricentur cum succo ros. rhab. electi. ʒ. ij. diarrh. abb. & triasand.

an. 3. β . cum syr. capill. fiant pilulæ, capiat duas manè in exitu lecti. Post harum vsum ferè in omni causa conuenit opiata sequens.

\mathcal{R} . ciner. pellic. ventric. & intestinorum gallinæ ana \mathfrak{z} . ij cineris cancrorum marinorum locotum ante & post vstionem \mathfrak{z} . j. conser. flor. cichor. & capil. ven. an. \mathfrak{z} . j. pul. aro. ros. & diagal. an. 3. iij. cū syr. capill. fiat opiata (quando febris & intemperies calida adest, diarrh. & pul. triasand. loco aliorū pono) capiat singulis matutinis. Quod si aqua euacuata sit, superbibat parum vini, diluti aqua graminis & aspar. Si adsit caliditas, aqua cichor. & end. Si refrigeratio, aqua absynt. & mentæ. Si fluxus, aqua capil. ven. & absynth. Linimenta supra hypochondria sunt apponenda, quæ ex iecur corroborantibus conficiantur.

\mathcal{R} . ol. de absynth. nard. an. \mathfrak{z} . ij. ol. cydon. \mathfrak{z} . j. spicæ vtriusque ana \mathfrak{z} . j. cyperi, sandali rub & albi an. 3. β . coralli rub. vsti \mathfrak{z} . j. β . ceræ q. s. fiat vnguentum, vngantur hypochondria. Utatur optima victus ratione, & exercitio, nisi fluxus immodicus sit. Tunc enim frictions fiant in contrariam partem.

De renum inflammatione. CAP. XXXIX.

INflammatiō renum, vt aliæ inflammationes internæ curatur in genere, nempe auertentibus, dolorem mitigantibus, repellentibus, discutientibus, &c. Magis autem propria & peculiaris curandi ratio hæc est. Primum sanguinis motus aliò diuertendus est, secta basilica eiusdē lateris, idque initio. & si adsit plethora. Potest

Cap. ii lib. 13. met. me. Sectio Vena. etiam ē venā poplitis educi sanguis, vt quodam in loco Gal. imperat. Id verò commodè fiet, vbi iam cessauit fluxio, si partes inferiores non fuerint imbecillæ, & sanguis tenuis appareat. Huius autem venæ incidēdæ commoditas percipitur, ex eo, quod sit valde perspicua, & ei non mediocris sit cū renibus societas. Optima enim (vt scribit Gal. lib. de constitutione artis) vacuatio fit per magnam venam, & quæ habet consensum cū parte affecta.

Glans est clystere comodior. Ante venæ sectionem aluus exoneranda, ne venæ succis crudis, aut vaporibus malis repleantur. In hoc morbo glans comodior est clystere, potest tamen clysteris pauca quantitas iniici, alioquin ex maiori distenduntur intestina, atque ita renibus cōpressis dolor augetur. Clyster fit

fit molliens & refrigerans. Mercurialis, beta, pariet. & huius generis herbæ & ficus reiciendæ, nisi cum detergere oportet, vel abscessum rumpere. Nam nimis detergentia initio malum exasperant. Clyster optimus ad omnium internarum partium inflammationem, & potissimum circa sedem fit sic.

Clyster.

R. rad. bismal. lil. ʒ j. mal. viol. an. M. ij. pass. prun. an. pa. x. quatuor sem. frigid. ma. an. ʒ. ii. j. florum viol. p. ij. fiat decoctio in ʒ. vii. j. diff. mel. viol. sacch. rub. butyr. recen. an. ʒ. j. ol. chamæ ʒ ij. misce, fiat clyster, datur ante sanguinis missionem, vel statim post. Extrinsecus admoveatur epithema refrigerans, astringens, & repelleus.

Epithema

R. ros. nymph. an. ʒ. ii. j. succi plantag. solani an. ʒ. ii. j. aceti ʒ ij. fiat epithema. In succorum penuria aquis utimur. Valet quoque unguentum ros. vel unguentum Galeni pro renibus, quorum vis augenda est, additis succis convenientibus, ut plantag. sola. semperuiui, polygoni, & similibus. Quod si materia in ventriculo contineatur, proderit etiam ante sanguinis missionem vomitum ciere, reuulsionis ergo. Possunt & præscribi syr. ad sistendam fluxionem, qui respondeant actioni nephriticæ, illi verò exanodynis, attrahentibusque fiunt, ut hoc modo.

R. viol. solani, scariolæ, plantag. an. M. j. polygoni M. ʒ. tamarind. ʒ. j. seminis berber. port. & papaveris albi aut capitum eiusdem an. ʒ. ii. j. flor. ros. nymph. ana p. j. fiat decoctio. In lb. j. diff. sacch. q. s. fiat syr. quo utatur manè. Quod si alius astringitur, clystere vel glande sollicitanda erit, non autem decocto laxante, aut medicamento qualecunque sit, cui locus erit in declinatione.

Syrup.

A medicamentis enim duplex est incommodum, tum quod calida sint, tum quod humores attrahant ad partem affectam. Sed neque cassia, ut solent omnes, uti suadeo, quæ mihi non potest non esse suspecta, cum aliquid etiam caloris habeat. Dari etiam possunt initio syr. qui parantur in officinis in eadem utilitate, qua decoctum præscriptum, ut syr. refrigerantes. Et si alius satis fluat, leuiter astringentes, ut syr. viol. de nymph. myrtil de ros. siccis, de papa. præsertim cum dolor vrget. In fini utendum est Iulep Alexandrino. Sitim enim optime sedat.

Cassia suspecta.

Syr. astringentes.

atque horum decoctum & syr. vsus in principio tantum conuenit. Quod si fluxio non possit prorsus repelli, ac iam per membranam renum aliquid resudare videatur, tunc abstinendum à syr. astringentibus, & nimis incrassantibus. Utendum autem erit modicè, & citra morsum detergentibus, vt saccharo cum aqua, hydromelite in minus biliosis & senioribus. In biliosis detur decoctum pass. iuiub. hordei & glycir. in declinatione valentiora his profunt, vt quod parti impactum est, discutiatur. In hunc usum utile est hoc decoctum.

R. gly. 3. j. radic. ireos 3. ij. agri. ceterac. polytric. adianthi an. M j. pass 3. j. sic. N. vj. flor. buglossi. borrag. an. p. j. fiat. decoctio. In quo dissolue mell. ros. col. 3. iij. fiat syr. aro. cum 3. ij. cinamomi & 3. ss. scenanthos. Eodem fine dari possunt pilulæ.

R. myrrhæ, styrac. cinamomi, asari spicæ nardii, scenu galang. crass. an. 3. j. excipiantur terebinthina, fiant pilulæ, capiat 3. j. summo mane. Sumptis pilulis capiat 3. iij. decocti cicer. rub. cum pauco saccharo. Postea singulis diebus manè capiat pilulam vnã superbibendo parum aquæ hordei perfectè cocti. Topica discutientia sunt, vnguentum martiatum, & resumptiuum, quorum singulorum 3. j. addatur 3. j. rad. ireos, vel cineris coralli rub. vel cornu cerni, aut 3. ss. far. fabarum.

De renum vlcere.

CAP. XL.

Signa.

*Pus vesicæ
disting. à
pure renis.*

INflammationem renum & abscessum frigidum sequitur exulceratio. Nam post eruptione abscessus remanet vlcus. Deprehenditur dolore circa renes, cum pure multo reiecto vnà cū vrinis. Discernitur à pure vesicæ, quod pus vesicæ viscosum magis, & tenax sit, quia à parte neruosa defluit. Renum autè pus est quidem crassum, sed minus viscidum. Parum certum est, quod tradunt practici, pus renum magis permixtum vrinæ, vesicæ autem minus. Nam in vtriusque vlcere permixtum redditur, & postea in fundo residet. Id tantum verum est in penis vlcere, in quo prius redditur pus, deinde lotium, quasi sine pure. Fit interdum in vtroque rene, interdum alter tantum, id quod dolore apprehenditur. Nam si sit altera tantum, dolor in ea parte sentitur, vt Hippocrates ait. Vbi dolor, ibi morbus. Morbus hic quandoque ma-

ior,

ior, aliàs minor est. Irritatur autè facilè longo itinere, equitatione, vsu alimentorum acrium, aut medicamentorum diureticorum.

CVRATIO.

Curatur medicamentis detergentibus, deinde resiccantibus, sed difficilis curatio ob continuum vrinæ transitum. Si absque inflammatione, siti facilius curatur: Si *Detergen.* cum inflammatione, nunquam. Cum inflammatio adhuc durat, utilis est sanguinis missio è poplite, vel talo. Deinde quæ derergunt citra calfactionem, vt serum lactis asinæ, aut capræ cum saccharo ros. aut paucò melle. Si febris non adsit, lac omne dari potest Si febris adsit, malum dare, vt Hippocrates in aphorismis docuit. Vel detur tale apozema.

Apozema.

R. rad. bismal. consol. maio. an. ʒ. ij. glyc. ras. ʒ. ʒ. corticis cucurbitæ ʒ. iiij. agrimonix, ceterac. plantaginis an. M. j. sebest. pa. xx. seminis anisi ʒ. ij. seminis alchecangi, & bismalux, an. ʒ. j. papaueris albi ʒ. iiij. aut capitum papaueris ʒ. ij. florum trium cordialium an. p. ij. ros. q. ʒ. fiat decoctio in aquæ hordei lb. ij. diss. sacchari quantum sufficit, fiat syrupus, capiat manè, & serò tribus horis ante cibum. Et ne deducantur excrementa aliqua ad partem affectam, erit vtile ante vsum horum syr. vel vomitu vel medicamento leniente ventriculum & intestina detergere. A cibo melius vomunt, si os ventriculi ol. liliorum inungant, & aquam tepidam bibant, cum paucò oleo. Et iis tantùm danda sunt, qui facile vomunt. Item ea, quæ vomitum excitant, vlcus irritant, Dandum est medicamentum leuius, vt cassiæ in forma boli, vel cum decoctione hordei, & aqua bugloss. & viol. Carth. & diasebesten dari possunt. Syr. viol. ex multis infusionibus, & syrup. viol. in decoctione sebesten idem præstant. Oportet bis in mense bolum deuorare. Forma enim spissâ medicamenti commodior est liquida, propterea quòd per ventrem descendit, & minùs peruenit ad renes. Cremor hordei & alimentum, & medicamentum erit. Item albumen oui per se, aut cum vitello datum, dolorem mitigat. Sed optimum est addere semper sacch. ros. tab. ad deterfionem, vel puluerem sequentem.

PVLVIS.

R. coralli rub. vsti & diligenter loti in aquâ plantaginis & caudæ equinæ ʒ. ij. cine. corticis cucurbitulæ eodem modo loti ʒ. j. mastic. ʒ. ʒ. sang. drac. & sarcocollæ an. ʒ. iij. pul. hippur. ʒ. j. sacch. cand. & ros. tab. an. ʒ. iij. fiat pul. tenuissimus, vt alcohol, vtatur per se, capiendomanè cochlear vnū, superbibendo cyathum vnum aquæ plātaginis, vel caudæ equinæ, vel myrtil. cū pauca quantitate vini albi. Vel vtatur hoc puluere in cremore pisanæ, vel in lacte amygd. aut non in ouo tantum calfacto; Vtatur in cibis liquidis puluere illo veluti condimento, adaugendo quantitatē sacchari. Abstineant ab humidis & liquidis. Vtantur potius refrigerantibus & exiccantibus. Vtatur etiam iis, quibus venter potest leniri, vt mal. lact. pomis coctis, prunis. Abstineant à piperatis & acris, & coitu, & exercitatione. Sed pro exercitio vtantur frictione tibiarum. Si verò morbus sit sine inflammatione, vtimur frequētius medicamentis lenientibus aluum, & detergentibus & lacte ouium. In apozemate prædicto addi potest cortex fabarum, qui potētissimè deterget, mel. ros. col. vel syrup. de iuiub. vel de gly. In pul. præscripto augeatur quantitas sacchari candi, minuatur saccharum ros. tab. Post euacuationem factam, vtile erit aliqua ratione mouere sudores, vel ingressu stupharum, vel decocto gaiaci, quod mouet sudores, vlcera terget, & copiam vrinæ minuit: Ob id iuuat in omni vlcere renum & vesicæ. In parte externa supra renes, maxime si cum inflammatione vlcus sit, medicamenta aliqua ad refrigerationem, & exiccationem, apponenda sunt, vt vnguenta & emplastra, quæ talem vim habent, vt

*Mouens
sudores.
Decoctum
gaiaci.*

R. succi plantag. & folani an. ʒ. iij. ol. ros. omph. ana ʒ. iij. aceti ʒ. j. lithar. tenuiss. pul. ʒ. j. ʒ. cerussæ lotæ ʒ. j. tothyæ tenuiss. pul. ʒ. ij. sang. drac. ʒ. j. puluerisentur puluerisanda & reducantur ad formam litarg. nyruti. Vngantur renes, siue cum inflammatione sit vlcus, siue absque inflammatione.

De renum calculo.

CAP. XLI.

HVius duæ sunt causæ. Altera efficiens, calor renum ingens, humores assans, cogens, & in lapidem durans. Altera materialis, crassi & visceri humoris copia.

Sigua

Signa sunt grauis renum dolor, aculei infixi sensum *Signa.*
 præbens, locum non mutans, spina ægrè potest reflecti.
 Crus, quod è directo est, stupet, ob nerui orti à lumbis
 compressionem, fastidium adest, & vomitus. Vrina circa
 principiū pauca meitur, & aquosa propter obstructio-
 nem, postea perfectè supprimitur. Aluus nihil excernit,
 licet adsit permagna egrediendi cupiditas. Aliquando
 sanguis excernitur ob violentiā calculorum. Vrina tan-
 dem arenosam substantiam habet, præsertim vbi lapis è
 renibus emotus est, qui si leuis & rotundus sit, excerni-
 tur facilè: si asper, & alia quacunque forma præditus,
 præsertim angulosa, difficulter. In curatione vtendum
 est leui clystere, & non forti, vt,

R. quatuor remoll. & pariet. ana M. j. seminis lini,
 fœnug. ana ʒ. ss. caric. ping. N. x. (non pass. quia nocent
 vesicæ) quatuor seminum frig. maior. ana ʒ. iij. florum
 chamomel. p. j. fiat decoctio in qua diss. cass. extractæ,
 sacchari rubri ana ʒ. j. mell. viol. ʒ. ij. olei viol. & amygd.
 dulc. ana ʒ. j. ʒ. ss. fiat enema. Adde in decoctione sebestē
 ʒ. ss. capiat bis in hebdomada ante pastum. Lenit re-
 nes, & lubricando educit, quod in eis continetur, quod
 semper in affectu est obseruandum. Confert sequens fo-
 mentum supra renes spongiis madefactis, & expressis
 ex decoctione sequenti.

R. mal. bismal. cum toto ana M. j. ʒ. ss. seminis anisi,
 fœnic. ana ʒ. j. flor. chamom. melil. ana p. j. ʒ. ss. fiat deco-
 ctio de qua fiat fomentum pro renibus cum spongiis,
 aut filtro. Vtatur sequenti vnguento.

R. butyr. recentis sine sale, axung. gall. ol. amygdal.
 dulc. & viol. ana ʒ. ij. ol. de lilio. ʒ. ss. misce cum cera no-
 ua parum, fiat linimentum pro rene dolente, qui vnga-
 tur sæpius de nocte post fomentum. Verum quia multi
 flatus coniunguntur in hoc affectu ob cruditatem ven-
 triculi, & imbecillitatem concoctricis, post vsum præ-
 scripti clysteris iniiciatur sequens, qui etiam in colico
 dolore non parum confert.

R. ol. anethi, chamom. ana lb. ʒ. ss. ol. amygdal. dulc. ʒ.
 ij. misce, iniiciantur per anum, calidè. Postea vtendum est
 sequenti bolo.

R. cass. recens extr. ʒ. j. sacch. q. s. fiat bolus quem ca-

piat. Aut si malit in forma potabili, fiat sic

℞. vuarum pass. caricar. ping. ana Paria vj. iuiub. fe-
best. ana Paria x. capill. recentium quartam partem M.
j. trium flor. cord. ana p. j. quatuor seminum frig. ma-
ior. ana 3. j. fiat decoctio in 3. iij. dis. cass. recenter extr.
3. j. syr. viol. 3. ss. fiat potio, detur loco boli. Postea uta-
tur remediis calculo comminuendo, & foras educendo
accommodatis, vt

℞. confect. lirontripon ʒ. ij. sangu. hirci præp. ʒ. j.
syr. capil. 3. ss. cum aqua milij solis, aut cum iure ciecr.
rub. fiat potio. Vnguentum etiam fiat sic.

℞. ol. scorpion. compos. (Nam scorpius frigidus est,
& eius ol. simpl. imbecillius) ol. de lilio compos. ana 3.
j. ss. misce, vngatur regio dolentis renis calidè. Quod si
horum vsu non descendat lapis ex renibus ad vesicam,
admoueantur cucurbitulæ, primò paulum sub loco do-
loris, & descendendo sensim oblique secundum meatu
vrinariorum situm, & descensum in vesicam. In se sibus
præterea vtendum, quo remedio nullum efficacius est,
ad doloris mitigationem. Sis tamen prudens, quia vires
multum dissoluuntur ob longam moram in infessu ca-
lido, & crebrum ingressum. Viribus ergo constantibus,
si dolor superioribus remediis non cesserit, paretur in-
fessus ex rebus præscriptis in fomento, maiori tamen
quantitate, & dosi & æger in labrum tepidus demitten-
dus est, non multum calidum ob dictam causam. Opti-
mum ad diuersionem est simul, & excrementorum edu-
ctionem vti sequenti opiata.

℞. diaprun. simpl. cass. rec. extra ana 3. j. gran. ber-
ber. gr. vj. pass. mund. & pulpæ sebest. ana 3. ij. pul. gly.
3. ss. misce, & cum syr. capillar. reduc. in formam opia-
tæ. Dosis est 3. vel 3. vj. pro viribus ægrotantis, capiat
cum custodia.

Ad calculum comminuendum.

℞. seminis hyperici, quatuor sem. frig. maior. semi-
nis apij & petro. ana 3. iij. seminis rhamni & albæ spi-
næ ana 3. ij. saxifrag. & empetri ana 3. j. ciner. capitis
muris, & cineris scorpionum ana 3. iij. cum syrup. de
quinque radicibus fiat opiata, de qua capiat ante suos
pastus per duas horas, superbibendo aquæ cretæ ma-
rinæ

riaz ʒ. iij. vel iij. cum syrupo limonum.

R. seminis basiliconis, quat. semi. frig. maior. seminis apij, petro. ana ʒ. β. rad. fœnic. petro. asparagi, seminis pimpinellæ, ana ʒ. xv. saxifragiæ, rusci ana ʒ. vj. rhab. electi ʒ. iij. sacchar. diss. in aqua cretæ marinæ q. s. fiat electuarium in tabellis ponderis ʒ. ij.

R. aquæ parietariæ lb. j. vtatur cum dictis electuariis.

De Diabete.

CAP. XLII.

Diabete rara est affectio. quam Gal. semel tantum aut bis vidit, sed quia aliquando accidit, non est negligenda eius curatio. Ego ter vidi in filia & patre, quasi morbus esset hereditarius, vel potius, quia erant eiusdē temperamēti, scilicet, biliosi. Solet autē accidere biliosis ob seri tenuitatem, & renū caliditatem. Nihil enim aliud est diabete, quàm fluxus vrinæ, vt cum multum, & frequenter meiunt vrinam aquosam, & tenuem. Fit autem, vel quia habitus totius corporis nimia caliditate dissoluitur, vel cum renes supra modum calfacti nimium seri trahunt. Quare erit occurrendum intemperiei totius corporis, vel renum potissimum alimētis crassis, emplasticis, minimè calidis, incidentibus, vel aperientibus. Multum itaque laudatur ptisana, omnis sorbitio ex alica, pedes veruecini, aut vitulini aut suilli aut bubuli, semoula, panis lotus, amyllum si decoquatur in iure carnis, in quo semen papaueris decoctum sit, aut lactucæ. Super renes, si affectus sit in toto corpore, supra totam spinam vnguenta refrigerantia, & astringentia apponenda, qualia sunt paranda ad fluxum sanguinis & ad vlcera renum, vel ex ol. frig. & astringentibus, & ex succis herbarum, vt quod paratur, ex ol. myrrh. ros. omph. nenuph. aut de pap. Inungenda est tota spina, maximè ab vltimis costis ad os sacrum vsque. Nimis frigida & astringentia respirationi nocere possunt. Intus autem nec multum resistentia, nec aquea danda sunt. Sicca enim habitum solvunt, humida aquam mouent. Sed quæ crassa sunt & emplastica, deligenda sunt, vt consolida maior, gum. tragac. arab. mucilago psillij cyton. amyllum, albumen oui, terra sigillata, bolus armena, & melior forma erit in opiara sic.

R. carnis cydon. conf. conf. maior ana ʒ. j. mucilag.

gum. tragac. & seminis cydon. extractæ, cum aqua ros. ana ʒ. β. amyli ʒ. iij. boli arm. sang. drac. ana ʒ. j. misce, cum syr. de pap. & myrth. fiat opiata, de qua capiat bis in die, & semel noctu. Si diabete aut simile diabetæ post hydropem fiat, aut si habitus sit serosus, non statim curare oportet, vt illa feri redundantia euacuetur. Moderanda est, si vitium deiectionis sequatur. Qui hac affectione laborant, non debent mouere corpus, neque supra renes dormire, ne nimis incallescant.

De diabete ex prima distatione. CAP. XLIII.

Diabetica passio est inuolūtarius, & nimius lotij affluxus. Causa est vehemens renum calor, potentius attrahentium serum sanguinis. Qui hac laborant, vt plurimum hecticci moriuntur, ob eam, quæ renibus inest, trahendi vim à calore exuperanti. Ad huius curationem omnia fiant describenda in ardore vrinæ, exceptis mucilagionibus, syringationibus, & vnctionibus pestinis, & perinei. Nec virga est in lacte immergenda, vt in ardore vrinæ. Sed soli renes sunt refrigerandi per vnctiones & reliqua dicenda capite de ardore vrinæ sine vlcere.

De vesica calculo.

CAP. XLIIII.

Calculi in vesica reperiuntur, qui contractionē impediendo, vrinæ expulsionē impediūt, ob id causa distentionis, & distentio causa retentionis vrinæ à toto genere præter naturam dicitur. Fiunt calculi in vesica, maximè in pueris, & aliis ætatibus, vel alibi, vt in renibus, generatim in vesica retinentur, & inter se differunt. Nam qui fiunt in renibus, augentur ex arenulis pituita viscida simul coniunctis. Arenulæ autem à pituita etiam viscida renum calore cocta, & hi comminuuntur. Vesicæ autem calculi non sic fiunt ex multis arenulis, sed ex pituita multum viscida, & crassa, in vesica indurata augmentum recipiunt, & veluti cortex quidam supra lapidem generantur, ita vt videantur ex multis tunicis aut multis veluti ostrearum testis confecti. Od id difficillimè franguntur, vel medicamentis vel ferro. Qui autem primum generatus est in renibus calculus, & retentus in vesica, minus rotundus est, & in medio arenosus, in superiori parte veluti testa quadam conclusus. Quare si præcesserit

refferit nephritis, & calculus reiectus non fuerit, & præcefferint signa calculi renum, danda est opera, vt calculus ille ex vesica expellatur, quod fiet vrinam retinendo in pene. Nam vrina retenta viam dilatat, & præparat ad calculi euacuationem, & concutiendo corpus, & affatim cumque impetu reiciendo vrinam. Vel danda sunt medicamenta, quæ lapidem frangunt, prius prouocata vomitione, aut facta purgatione. Vomitus ad præcautionem est valde vtilis. Prohibet enim eius generatio- nem, aut incrementum. Pituitæ ventriculi & intestino- rum deterfio generationem & incrementum impediunt. Dantur igitur prius medicamenta leuiter detergentia, deinde detergentia, & aperientia simul permixta, pon- stremitè fortiter incidentia, & lapidem frangentia.

R. gly. raf. ʒ. ij. pass. sic. ana pa. x. anis. scenic. ana ʒ. ij. quatuor semi. frig. maio. ana ʒ. iij. milij. solis ʒ. ss. beth. M. ss. fiat decoct. In lb. j. diss. oxymel. simpl. ʒ. iij. capiat in tribus matutinis. Et post vsu huius syr. capiat pilulas de hiera, de rhab. an. ʒ. j. deinde vtatur hoc syrupo.

R. gly. raf. ʒ. ij. auriculæ lepor. beth. empetri (quod scenic. marinum vocant) ana M. ij. flor. hyperici & ge- nistæ ana p. j. seminis salyuri ʒ. j. scenic. apij. petro. asari ana ʒ. ss. fiat decoctio, in aqua fontis. In lb. ij. diss. syr. de limonibus, oxymel. diurenti ana ʒ. iij. sacch. par. fiat syr. mediæ decoctionis, capiat hora quarta matutina, & iterum post duas horas eandem quantitatem. Ante cœnam duabus horis capiat cyathum vnum, & hoc continuet, donec lapis fuerit reiectus. Hic syrupus la- pidem comminuit, si comminui potest, & parum ex ve- sica propellit. Quod si molestum fuerit ægrotanti tan- to tempore vti hoc syrupo, misceatur vino albo, & cum aliquantula quantitate cinamomi fiat vt vinum hippo- craticum. Nam propterea quod locus est valde remo- tus, medicamenta eò peruenire non possunt integris viribus, ob id frequenter assumenda sunt, & magna quantitate. Vel fiat opiata hoc modo.

R. confer. lyring. & pastinacæ agresti (quam bauciam vocant) capill. ana ʒ. ss. succi scenic. marini, hyperici por- tu. depuratorum, & exiccatorum, succi gly. ʒ. j. cineris a- stragali leporis, & capitis muris an. ʒ. j. lapidis iudaici ʒ.

ß. cinamomi, spicæ, rubriæ maio: ana 3. j. cum syr. deli-
monibus fiat opiata. Sed omnia arida tenuissimè pulu.
& capiat ad nucis quantitatem, aut castaneæ, superbi-
bendo cyathum vini albi, vel clari diluti cū aqua beth.
vel auric. lepor. vel decoctione herniariæ. Capiant fre-
quenter in die, vt de syr. dictum est. Fieri possunt lini-
menta, & fots supra regionem vesicæ ex relaxantibus,
& aperientibus, vt fiat hoc modo.

R. rab. bismal. graminis, asparag. fœnic. ana q. j. be-
to. fœnic. marini, pariet. pedis columbini, ana M. j. flor.
hyperici, genistæ, iuiubarum ana p. iij. fiat decoctio in
aqua & vino, quibus adde semin. fœnic. apij, petro. ana
3. ß. foueatur manè regio vesicæ, & perinei tepidè. Fieri
etiam possunt ex decoctione fots, inunctiones, & ex
oleis scorpionum, amygd. liliorum, & aliorum dilatan-
tium. In officinis parantur compositiones quædam, quæ
vim habent comminuendi lapidem, vt quæ inde nomen
accepit Litontripon. compositio Iustini. Sed quæ prius
parari iussimus, sunt efficacissima. Si vsu horum non
curetur, ad dissectionem veniendum est. Nam lapis est
fortior, quàm vt conteri possit.

De calculo contra Fernelij sententiam.

Lapidem in vesica generari contingit ex crudo suc-
co & limoso ac viscido cum vrina penetrato ad ve-
sicâ, in qua calore loci exarefactus sensim lapidescit, vt
in aquæ ductibus aqua aluminosa & argillosa, fieri con-
tingit. Fernelius dicit se non videre, quomodo crudus
ille succus possit tandui illic remorari, nisi fortè admo-
dum angusta, aut obstructa sit vesicæ ceruix, cum sangui-
neus grumus, pus & mucosa & lêta pituita, aliâque mul-
tò crassiora facillimè illuc cū vrina profluant. His argu-
mētis adductus aliam cœpit causam inuestigare, ac eâ-
dem competit, omnem calculum in vesica conclusum
à renibus rudimentum quoddam traxisse, è quibus per
nephriticum dolorem excidens, si grandiusculus est, in
vesica aliquamdiu hæret, ac sepè persistit, illicque aliarū
fordium adhæsu coagmentatur, dum verus, & coapta-
tus fiat lapis. Ita quidem neminem hactenus offendi,
inquit, in vesica calculum habere, qui nephriticis dolo-
ribus vexatus antè non fuerit, & quoscunque exemptos
vesica

vesica calculos offendit, in medio quasi nucleum reperi-
 rit, verum rudimentum à renibus exturbatum. Decipi- *Error Fer*
 tur verò in hoc, quòd putet, quod aliquando fit, & ali- *nelij.*
 quibus, semper & omnibus fieri, scilicet, lapidem vesicæ
 accepisse initium à renibus, quum post nephriticum do-
 lorem non reicitur, sed retinetur in vesica, in qua obdu-
 citur mucò quodam, quo pars interna vesicæ munita est,
 à crudo succo, qui cum vrina illuc peruenit. Verum id
 in omnibus non contingere experientia docet. Pueri in
 vesica sæpè calculum habent, qui nunquam nephritim
 passi sunt, nisi in vtero sint passi. Nam cum lapide natos
 multos vidi, qui à parentibus hæreditario iure accepe-
 runt. Ratione id posse fieri ostendo. Si lapis renum co-
 agmentationem accepit in vesica, vt cogitur fateri, ge-
 nerari potest. Nam ab iisdem causis generatur, & ac-
 crescit. Augescit ab eadem materia, ex qua fit, scilicet, à
 crudis, lentis, limosis succis, & à calore partis, tanquam
 ab efficiente causa. At talia recrementa retinentur ad
 coagmentationem: Ergo & ad generationem, non in
 omnibus, sed in his, qui crudis, lentis, & viscosis humo-
 ribus abundant, & quibus meatus strictiores sunt, & qui
 diutius urinam retinent, ob quam retentionem crassa
 in fundum descendunt, & subsident, quo tempore par-
 tes illæ in lapidem concresecunt. In vesica succus crudus
 citius concresecit, quàm in renibus ob minorem calo-
 rem. Minus enim calet vesica ipsis renibus. Sanguis e-
 nim crudis succis mixtus coalescit, & liquidiores succos
 reddit minus aptos, vt in lapidem vertantur. Erit calcu-
 lus in vesica & in renibus, vt grando in pulmonibus, &
 lapis in collo, vt refert Paulus libr. 3. Lapides hi inter se *Lapidis*
 differunt. Nam qui in renibus sunt, ex arenulis simul *differ.*
 coniunctis generantur, & figuram sumunt à renum sinu.
 Si enim in primo sinu retineantur, habent veluti acu-
 leos: qui verò per vretes redduntur, & figuram in vre-
 tere accipere videntur, quia oblongi sunt, & nucleis pi-
 nearum similes magna ex parte, si non franguntur. La-
 pides vesicæ calculis fluuiatilibus similes figura sunt, sci-
 licet, rotundi ferè, vel figura lentis, non ex arenulis,
 sed ex materia lenta, quæ veluti laminas cæparum facit
 leues, magna ex parte, qui in vesica initium sumunt:

Verum qui è renibus rudimentum acceperunt, in medio veluti nucleum habent, veluti ex multis arenulis compactum. Quod si continuo è renibus arenulæ descendant, asper efficitur ob arenam mucò permixtam alligatamque. Lapides pulmonum, quia à pituita reficata sunt, grando dicuntur, quia grandini assimilantur in duritie & substantia. Lapis è collo intestino reiectus vesicæ calculis similis est. Atqui ab abscessu redduntur, ossibus similes esse solent, colore fusco. Tales ab abscessu hepatis, matris doctissimi cuiusdam Nemausensis redditos vidimus, & abscessu intestinorum mulieris Môtisbani, quæ mulier post varios dolores tabida erat, hæcque menstrua nunquam passa fuerat, & tamè peperit duodecies. Liberorum multi adhuc superstites sunt.

De mictu sanguinis. CAP. XLV.

Sanguis reicitur vel ob assumptas cantharidas, quæ si potissimum efficiunt, vel propter colatorij rarefactionem, aut propter ruptionem aliquarum venarum vesicæ, aut renum. Si à cantharidibus assumptis, id sciatur ex relatu egri, aut assistentium. Vel si penem distentum habeat, & ad Venerem irritatus fuerit, vel coierit supra modum. Si propter rarefactionem venarum renum, vel colatorij, sanguis est multum serosus. Si propter venarum ruptionem, sanguis multus & crassus reicitur. *Curatio.* Curatur autem sanguinis missione in principio ad aduersionem, & repellentibus medicamentis & constringentibus, supra renes & vesicam appositis, vt sunt præscripta ad renum exulcerationem, vel ex magis constringentibus, vt,

℞. boli ar. vel terræ sigillatæ ʒ. ss. sang. dracon. cortic. mali gran. balauft. an. ʒ. ij. aluminis ʒ. j. ros. rub. seminis myrrh. an. ʒ. j. ss. puluerizentur subtilissimè & excipiantur albumine oui & aceto, applicentur supra partem. A parte inferiori dantur præscripta remedia ad redundantiam mensium. Retinent sanguinem bolus armena, carabe cum albumine oui fortiter agitata, & deuorata. Quod si concretus remanserit in vesica, tunc dissoluentia sanguinem danda erunt, aliquo tempore post, & non nisi vrgeat, retinendo urinam, aut aliud quid efficiendò. Verendum enim est, ne rursus aperiantur venæ & sanguis

guis prouocetur, nisi dentur illa quæ vtrunque præstent, vt carabe, quæ sanguinem dissoluit coagulatum, & fluentem retinet. Si propter vsum cantharidarum fluat sanguis, primum veneno occurrendum est, tanquam causæ, quæ nisi ablata, effectus curari non potest. Dandum igitur erit lac, quod & causæ & symptom. proffit, si calybeatum sit. Item ol. ros. cum albumine oui intus assumendum. Clysteres refrigerantes iniiciendi, demum ad remedia fluxui sanguinis opportuna veniendum est. Deligenda illa, quæ venenis etiam resistunt, vt est terra sigillata, bolus arm. corall. tragac. & alia, quæ superius enumerata sunt ad sanguinis reiectionem, vt succus bur-sæ pastoris, rasuræ seu pul. ossis sepiæ.

De Vesicæ inflammatione. CAP. XLVI.

Vesica multas venas habet, & prope magnas venas sita est. Quare non minus inflammationem patitur, quam aliæ partes internæ. Et inflammatio citissime veritur in gangrenam ob magnitudinem. Rarò fit, nisi præcedat magna quædam exasperatio, vel ob dolorem vehementem ab ulcere, vel à calculo, & post vsum medicamen. acrium Quare si sentiatur tumor supra pectinem, cum febre, & vrinæ retentione, & alui excrementorum, certum est inflammationem vesicæ esse. Ad hanc sequuntur vomitus biliosi, dolor circa illam partem, & deliria. Periculosissima est, & si superueniat vlceri, periculum est de lethargo aut delirio. Quare periculo præsigna, nunciato statim mittendus est sanguis, qui multus extrahatur, si plenitudo & vires permittant. Id fiet primum Missio ex basilica, deinde ex poplite, vel fiant scarificationes in interna parte coxarum. Sin paucus sanguis sit aut morbus magnus ex parte iam factus, è poplite tantum est trahendus sanguis, quæ auesio in omnibus inflammationibus factis, circa inferiorem partem ventris conuenit. Post missionem sanguinis emolliens & refrigerans clyster iniiciendus est. Partes circumvicinæ oxyrod. foven- Clyster. dæ, vt influxus inhibeatur. Quod si morbus sit in principio, frigida supra partem non multum formidanda, si refrigerent, & non multum constringant, qualia dicuntur postea. Paretur clyster ex infrigidantibus, & emollientibus excrementa, &c.

R. mal. viol. cucur. an. M. j. prunorum, sebest. an. N. xx. quatuor semin. frig. ma. ana ʒ. ʒ. anisi ʒ. j. semin. lini ʒ. j. fiat decoctio ad lb. j. In qua dis. mel viol. cas. receter extra. an. ʒ. ij. ol. vio. ʒ. iij. misce, cap. manè. Si dolor vrgeat, admisceatur albumen oui fortiter agitaturn, succus solani, vel plantag. vel fiat talis ad sedationem doloris.

R. lactis lb. j. ol. viol. ʒ. iij. succi solatri ʒ. ij. misce, iniiciatur frequenter.

R. seris lactis lb. ʒ. succi cucurb. vel viol. vel mal. ʒ. iij. albuminis ouorum fortiter agitati ʒ. ij. misce, iniiciatur tepide. In principio vngantur partes vnguento rosa. & viol. Et partes vicinæ oxyrth. vt renes, partes superiores ventris. Fiat tale caraplasma.

R. radic. bismal. lb. j. viol. M. ij. prunorum, dactyl. mund. ana N. xx. coquantur in aqua cisternæ, contundantur & transmittantur per setaceum, addendo de decoctione quantum poteris. Adde farinæ hordei & ol. ros. ana ʒ. ij. misce, fiat cataplasma, applicetur supra regionem vesicæ. Quod si morbus procedit, vel dolor maior fiat, calastica addenda sunt, vt

R. ol. amygd. dulc. viol. an. ʒ. ij. ol. chamo. & de semine lini ana ʒ. j. butyr. recent. & pingued. porci ana ʒ. iij. misce, fiat linimentum, vng. regio vesicæ. Item præstabit vnguentum resumptiuum lotum in aqua hordei. Meatus vrinæ detergendus, vt aliquid vrinæ reddatur, & id, quod à parte inflammata exudar. Sufficit iniicere serum lactis cum pauco sacchâ. vel decoctum hordei cum sacch. In declinatione danda sunt per os, quæ leuiter detergunt cum euulsione quatuor sem. frig. mai. quæ non sua acrimonia, sed aqua & tenui substantia vrinas mouent. Et vinum aquosum assumere possunt. Item cremorem hordei, & alia alimenta, quæ parum nutriunt, & refrigerant, vt lactuca, viol. mal. Fructus etiam qui vrinas acres, & ventrem leniunt, vt pruna, poma, sebesten. Pira verò & quæ astringunt, fugienda, & quæ multum detergunt, vt ficus, pass. Si euacuant ab inflammatione, vlcus curandum, & pars detergenda, vt proprio capite monstrabitur.

De inflammatione Vesicæ ex prima dictatione.

CAP. XLVII.

Huius

Huius curatio conuenit cum curatione inflammationis renum, sed minus astringentia & refrigerantia regioni vesicæ sunt ad mouenda, ne accidat ischuria, quæ symptoma est valde frequens per se, & maximè molestum. Magis verò vtendum relaxantibus, & dolorem lenientibus. Hic ergo præferuntur linimenta, epith. perfusiones, cataplasmatibus & emplastris: quoniam hæc suo pondere partem grauant, sic, vt ea multò difficilius dilatari queat, vnde fit, vt dolor affligat vehementius. Inclinate autem morbo, cum iam dolor & tensio remissa sunt, cataplasmatibus sine villo incommodo vti possumus. Topica in principio conueniunt refrigerantia sine magna astrictione, vt

R. succi viol. vel lactucæ, vel solani q. r. j. ol. ros. q. r. f. agitentur simul valide. Hoc imbuti panni frequenter admoveantur, vt

R. ol. ros. omph. ana ʒ. ij. ol. viol. ʒ. iij. aquæ ros. parum, sit vt supra.

Ad sedandum dolorem.

R. rad. mal. bismal. ana ʒ. iij. viol. M. ij flor. cham. melil. & viol. ana p. j. semin. papauer. albi ʒ. ss. misce, fiat decoctio, qua foveatur pars affecta. Efficacius erit medicamentum, si addas farinæ seminis lini & scæneg. ana ʒ. j. Post fctum fiat linimentum hoc.

R. muc. seminis psyl & cydon. ana ʒ. j. ol. chamo. lili. ana ʒ. ij. pingued. gallinæ, anser. butyr. recentis ana ʒ. j. farinæ hord. ʒ. iij. incorporentur simul, fiat linimentum pro parte affecta. Huius loco licet vti vnguento resumptiuo. Accedente statu miscenda sunt discutientia, vt farina fabarum, orobi & similia. Poterit etiam dari decoctum supra descriptum.

De Vesica & Ecce. CAP. XLVIII.

Exulceratur vesica, vel propter scabiem, vel propter vltum cantharidarum, aut propter calculum asperum, aut propter pituitam aliquā salsam, aut bilem lotio permixtam. Accidit cum inflammatione, & citra inflammationem. Si cum inflammatione. curatur iisdem remediis, quibus vlcus renum cum inflammatione, nisi quod maiorem quantitatem syr. aut aliorum remediorum sumere oportet: vt ad partem affectam peruenire possint.

Et possumus quatuor semin. frig. mal. addere. Nam alia prouocantia vrinam non sunt ponenda, nisi sint ex numero eorum, quæ astringendo id faciant & exsiccando, vt herniaria, lingua pass. cortex mali granati, & hoc maximè post totius corporis purgationem. Si sine inflammatione sit, curatur eodè modo, quo vlcus renū sine inflammatione, nisi quod magis oportet resiccare, ob partis intemperiem, quia medicamenta multum infarcta & debilitata ad partem perueniunt. Tentandum est etiam per fistulam æneam, aut syringam oblongam aliquid in vesicam iniicere, quod commodius sit, strager in dorsum decumbat, cruribus sursum elatis, & digitis propellendo vsque ad perinæum. Iniectiones autem sūt ex detergentibus sine morfu, vel ex decocto hord. decocto cort. cucub. & cortic. fabar. in minori proportionē, vt ex herbis leuiter de ergentibus cum paucō melle ros. Decoctum præscriptum etiam iniici potest, & decoctū gaiaci. Post deterfionem addi debēt, quæ magis resiccant, & cicatricem inducere possunt. Et ista sunt in vlcere simplici sine lapide. Nam vlcera cum lapide, non curantur nisi lapis auferatur, cuius extractio valde periculosa est propter vlcus. Cū enim distenditur vesicę collum, periculum est, ne distrumpatur. Si vlcus iam fuerit profundum, tūc satius est vti cura palatiua & vlceris, & lapidis, vten- do quibusdam emplasticis, & viscosis, vt lapidi inducatur quędam leuitas, quod fiet commodè vsu lactis cū paucō amylo, aut aliis viscosis manē assumptis. Nam si levis sit lapis, minus vexat ægrotum. Si vlcus à cantharidibus factum fuerit, & in principio neglectū, difficilius curatur. Si recenter assumptæ fuerint, & fluxū sanguinis faciant, earum acrimoniam & vim extinguere oportet multo lacte asinæ, aut alio. Deinde fluxū sanguinis sistere, & ad vlceris curationem venire. Curatur iisdem remediis, extincto veneno, quibus supra Peculiare autem remedium est, terram sigillatam, bolum armenā cum lacte amygd. aut cum earundem ol. vel cum lacte asinæ, vel capræ, vel vaccæ sumere. Expurgat enim venenum, & partem resiccat exulceratā sine morfu, & sanguinem constringit.

Curatio Vlcerae & scicæ.

℞. cass. recens extractæ ʒ. ij. cathol. ʒ. j. pulpæ pass. & sebesten

sebesten ana ʒ ʒ. medullæ sem. carth. ʒ. j. anisi ʒ. ij. fiat opiata cum syr. sequenti.

R. polypodij querni ʒ. iij. agar. trocif. in melle rosa. prius infusi ʒ. ʒ. anisi, fœniculi, an. ʒ. ij. semi. fœseli ʒ. iij. flor. saluæ p. j. pass. munda. ʒ. ij. ficuum dactyl. munda. an. p. v. fiat decoctio in aqua hordei ad lb. j. Cui adde syr. ros. laxa ʒ. iij mellis ros. collati ʒ. ij. Aromat. ʒ. ij. sandalli rub. & ʒ. j. ireos. Et vna parte huius syrupi ad perfectionem cocti formetur opiata. Residuum autē capiat cum aqua beto. semel in hebdomada, in aurora cum leui custodia.

R. conseruæ florum cicho. & capill. ven. an. ʒ. ʒ. conf. anthos & florum saluæ an. ʒ. iij pul. diatrag. frig. & diari. simp. ana. ʒ. j. diarrh. abb. ʒ. ʒ. diagal. ʒ. j. cineris pellicularū castorei loti in aqua ros. ʒ. ij. cineris priapi tauri loti in decoctione caudæ equinæ, & alchecangi ʒ. j. zinziberis viridis ʒ. ij. cum syr. capil ven. fiat opiata, de qua capiat singulis matutinis ad quantitatem auellanz, superbibendo parum aque betonicæ & caudæ equinæ.

R. hordei integri p. j. rad. ireos ʒ. ij. fiat decoctio in hydrom. vel in sero lactis caprini, fiat iniectio per syringam in vesicam. Augeatur vel minuatur quantitas mellis, prout videbitur. Iniectio autem manē fiat, & serò ante cibum.

R. rad. consol. maioris ʒ. iij caudæ equinæ, ceterach, agri beto. an. M j. ros p. j. flor. anthos p. ʒ. fiat decoctio in hydromelite dilutiori, quàm suprâ, & cum eadem decoctione fiat iniectio, qua vtatur, postquam vsus fuerit per vnâ hebdomadâ hydromelite. Decoctioni adde cort. cucur. ʒ. j. fabarum contus. ʒ. iij. & fiat iniectio, vt prius.

R. rad. cucurbitæ, ʒ. j. blattæ bizantiæ ʒ. ʒ. sem. alchecangi, bombacis, papa albi an. ʒ. ij. quatuor semin. frig. maio. & sem. maluz an. ʒ. iij. florum viol. & anth. an. p. j. fiat decoctio, ex qua fiat iniectio, idque pro sedatione doloris tantum. Si ex præcedentium vsu, vel alia causâ procatarctica excitatus fuerit.

R. auriculæ leporis herbæ ʒ. ij. ocreæ, lapidis iudaici an. ʒ. ʒ. cineris priapi tauri & vermium terrestrium, lotorum in vino albo an. ʒ. j. pul. glycirrh. & gummi prunogum & cerasorum an. ʒ. ij. spicæ celticæ, scœnanthi. an. ʒ.

j pul. diarrh. abb. & diamofci an. 3. j. ꝑ facch. ad pondus omnium, fiat puluis, quò vtatur manè, accipiendo cochlear vnum superbibendo parum aquæ beto. & hyſſ. vel incorporetur cum ſyrupo conſeruatiõis corticis citri, & fiat opiata, vel ſyrupo de acetofitate citri.

R. pil. de hiera 3. ij aga. trocif. 3. j. ꝑ. ſarcocollæ, maſtiches, zinziberis, galangæ, an. 3. ꝑ. ſalis gemmæ 3. j. cum terebinthina incorporentur ſimul. Fiant pilulæ, de quibus capiat ſemel in hebdomada, poſt primum ſomnum, & non incipiat vti, niſi poſt remiſſionem caloris. Interea vtatur opiata.

R. hord. integri ꝑ. j. ra. ireos & enulæ an. 3. ꝑ. rad. yrin. 3. j. herbæ auriculæ leporis 3. ij raſuræ ligni, ſpinæ albæ, & ſem. eiufdè an. 3. j. fiat decoctio in hydro, & cum prædicta decoct. fiat iniection. loco alterius iniectionis. Vtatur tandiu, quandiu reſidentia viſcoſa remanebit in vrina.

De ardore vrinae.

C A P. XLIX.

Ardorem vrinae aliqui vocant, & ſerè omnes, cum inter meiendum dolor ſentitur, qui multos morbos ſequitur, vt lapidem veſicæ, vlcus eiufdem & renum, vel illarum partium inflammationem. Propriè hæc inflammatio glandularum, ſeu adenum, paraſtararum, vel illarum partium exulceratio, & ob ſaniei acrimoniam dolorem ſentiunt in extremitate penis. Sequitur coſtus immodicos, vel equitationes longas, & celeres. Sed ob ſeminis potiſſimum, aut illius ſeroſæ ſubſtantia, quæ coitum præcedere ſolet, corruptionem, vel ꝑ. opter infectæ mulieris vitium quod contactu contrahitur, idque potiſſimum cum quis ſemen attractum retinet, & iam commotum. Quod ſi ab iſta cauſa proueniat, miſſio ſanguinis è poplite citiſſimè curat, & vſus repellentium, ſi in principio adhibentur, aut per clyſterem infunduntur. Intus autem iniicienda ſunt, quæ detergunt, cum quadam refrigeratione, cum decoctione hordei, & ſyr. viol. & ex aquis diſtillatis cum ſyr. roſ. laxatiuo.

R. aquæ plantag. ſolatri an. 3. iij. ſyr. roſ. lax 3. ꝑ. miſce, fiat iniection, quæ deterget ſemen illud corruptum & id quod à parte inflammata reſudat. Serū lactis id etiam præſtat, niſi quod minus refrigerat. Cõueniet in proceſſu ad deterſionem, cui addi poteſt facch. roſ. tab. vel ſyrup. roſ.

ros. de ros. siccis. Si autē dolor adsit, vel magna inflammatio, albumen oui fortiter agitatū, & dilutū aqua plantag. vel solatri iniiciendum, aut lac omne. Cum autem multa sanies reicitur, tunc adiungenda sunt detergentia magis, deinde veniendum ad ea, quæ detergunt, & exiccant, & eodem modo curantur, quo vlcera vesicæ. Inter alia, aqua distillationis corticis malorum granatorum, & aranciorum multum valet, aqua peculi ros. myrtill. & potissimum cum litharg. Coquantur in huiusmodi aquis. Post sanguinis missionem, vtatur cassia nouiter extracta cū semine herb. vel cath. vel diasebesten. Dantur syr. lenientes, leuiter detergentes, & refrigerantes, vt syr. vio. cū decocto hordei assumptus, lenit ventrem, syr. nenuph. refrigerat, syr. ros. laxatiuus, laxat & deterget. Optimum est illis, tertio vel quarto quoq; die dare talia medicamenta ad deriuationem: poma cocta, pruna & sebesten valent & ad ventrem mouendum, & ad humorum feruorem extinguendum. Mucilago seminis psyllij extracta cum aqua viol. vel cum decoctione prunorum, sebesten, & pauco saccharo, & gly. ventrem laxat, & ardorem minuit. Extrinsecus, fofus, vel vnguenta magis penetrant, quàm emplastra. Sed fofus, quia calidi apponuntur, periculosiores sunt, satius erit vnguentis ex refrigerantibus & resiccantibus paratis vt, vt

R. ros. vel myrrh. vel cydon. ʒ. iij. aceti ros. ʒ. j. vngantur renes & locus perinei, & totius pubis, vel addita cera fiat linimentum, vel ex metallicis, succis herbarum & aceto fiat ad formam nutriti, vt

R. litharg. ʒ. ʒ. cerusæ lotæ, tuthiæ an. ʒ. iij. aceti, & succi plantag. q. s. fiat ad formam nutriti, quibus si addatur caphura, citius penetrabit, & erit efficacius. Iniiciantur clysteres refrigerantes, vt in mictu sang. supradictum est, ex succis & decocto herbarū refrigerantium & constringentiū. Iniicienda autem parua quantitas, ne statim proritetur ad expulsionem, non nisi post excrementorū reiectionem. Quod si alius esset astricta ex decoctione mal. vio. tantum, prunorum, & quatuor sem. frigid. maiorum paranda esset decoctio, & in lb. j. col. cass. vel mel. viol. vel sacch. rub. vel cath. cum succo ciclæ, ol. viol. dissoluenda. Pul. præscriptus ad exiccationem vlcera cō-

uenit in fine, si assumatur cum aqua caudæ equinæ, & plantaginis, vel cum albumine oui fortiter agitato. Si ardor vrinæ propter præsentiam calculi contingat, tunc quæ dolorem mitigant, iniicienda erunt, vt lac, albumen oui. Si ob puris renibus aut aliunde descendentis acrimoniam, præsens remedium erit, ante vrinæ emissionem, iniicere albumen oui fortiter agitatum: post emissionem verò, lac. Et vtrunque obtundere sensum partis in vehementissimo dolore, vltimum erit. Nam, vt ex dissectione nouimus, sentiunt dolorem citra aliquem affectum in pene, à salsugine, aut puris acrimonia. Sed quia, quæ sensum obtundunt, frigiditate maxima meatum constringunt, optimum erit vel in decoctione relaxante, vel in oleo aliquo illa dissoluere, ne propter constrictionem pus retineatur, vel maiorem moram faciat in transitu, ex quo sequitur dolor vehementior. Eligantur relaxantia, quæ succum lentum habent, vt abducant viam, vt minus vrina, vel pus partem sensibilem tangat, vt

R. rad. bismal. aut cōsolidæ maioris ʒ. j. corti. mandr. ʒ. ss. misce, fiat iniection. Capita papaueris in eadem decoctione possunt decoqui, vel opium Eadem in ol. amygd. dulc. vel viol. dissolui possunt & iniici, vel ol. extractum ex sem. papaueris, vel ol. mandrag. misceantur lacti, vel decoctioni supra dictæ, vel mucilag. sem. lini, vel cydon. vel psilij. Sed dilui debent mucilagines multa aqua vio. vel plantag. quò facilius infundi possint. Id in vehementissimo dolore faciendum est, & magna necessitate. Pulvis requiei secundum nostram castigationem optimus est, in dolore vehementissimo. Ardor vrinæ frequenter fit propter vsum acrium & prouocantium vrinas, vt post cantharidas assumptas, vel propter empetri, aut laueris vsum, nasturtij, & aliorum, quæ assatim vrinam prouocant vt est potus nimis ceruicæ recentis, quæ nimis detergendo partes, quæ sunt veluti mucosæ abductæ, ardorem vrinæ prouocant. Illa sola assumptione albuminis oui, aut cibi viscosi, vt decocto pedum veruæcis. aut aliorum, facile curatur.

De Vrina ardore ex prima distatione. CAP. L.

Ardoris vrinæ curatio quatuor perficitur scopis. Primus est, bilis purgatio, eaque per leuiores cholagoga, ne

ga, ne ab acribus bilis acrimonia augeatur, qua ratione vitanda sunt etiam alimenta acria & vretica omnia etiā si frigida sint, vt quatuor sem. frig. maior. Secundus scopus est, bilis diuersio ad alias partes, quā vrinæ. Tertius est, alteratio hepatis & renum ad frigiditatem. Quartus topicis remediis bilis acrimoniā obtundere. Primus scopus perficitur medic. benedictorū, & lenientium vsu, vt
 ℞. syr. viol. ʒ. j. β. aquarum end. ʒ. ij. port. ʒ. j. misce pro vna dosi. Continuet per v. aut vj. dies. Si fuerit ingens ardor, sic fiat.

℞. syr. de port. ʒ. j. syr. de acetos. citri. ʒ. β. aquarum acetos. nenuph. & end. ana ʒ. j. misce pro vna dosi, vt supra. Si verò sit magna inflammatio, & acrimonia, pro syr. de port. pone syr. de pap. Postea purgetur sic.

℞. myrobal citrinorum ʒ. ij. infunde in aqua decoctionis pass. factæ in aquis end. & acetosæ per noctem, demum fiat expressio. Adde rhab. pul. ʒ. j. β. syr. ros. lax. ʒ. j. fiat potio, capiat manè. Poteris vt cassia recenter mundata, aut manna granata, pro tuo iudicio. In huiusmodi benignis medicamentis non est opus laxatiuo. Secundus scopus fit reuellendo per frictiones moderatas in partibus semper remotioribus, superioribus, præsertim brachiorum, manuum, colli, spatularum. Nam fortis frictio inflammat. Item si corpus aptum sit ad vomitionem prouocetur vomitus, sed per leuiora, vt aqua tepida, ol. communi, & similibus. Si possit prouocari sudor ex calore moderato, bene esset & plurimum diuerteret. Vtile etiam est vëtre lenire molli clystere, & refrigerante: etiam si lubrica sit aluus, bis in hebdomada. Potest etiam fieri per assumpta lenitio alui, vt

Assumpta

℞. cass. recenter extractæ ʒ. j. granorum berber. gr. v. cū sacch. fiat bolus, capiat manè semel in hebdomada. Si quis abhorreat talis cass. quantitatem, fiat sic.

℞. cass. recenter extractæ ʒ. iiij. diaprun. simp. ʒ. ij. cum sacch. fiat bolus, capiat loco præcedentis, aut in potione cum syr. ros. lax. Tertius scopus fit, alterando membra solito calidiora, vt hepar & renes ad frigidum, ne calfaciant vrinam. Id fiet tum per admota, tum per assumpta. Per admota sic.

Admota.

℞. aquarum en. ʒ. viij. ros. & nenuph. ʒ. iiij. sandal. albi

& rub. & vtriusq; corall. an. 3 j. ꝑ. sem. acetos. & port. an. ʒ. ij. Magna existente inflammatione, adde caphuræ gran. iij, spicæ nardi ʒ. ꝑ. aceri 3 j. fiat epith. pro hepate, quod tepidè applicetur, longè à cibo, manè & serò Quæ hepatis, cordi & principibus partibus admouentur, etiam si refrigerandi sit intentio. sunt tamen tepida actu admo- uenda. Ad idem fiat sacculus.

Sacculus.

R. ros. rub. flor. nymph. viol. an. ꝑ. j. ꝑ. end. quartam partem M. j. sandali albi, & rub. an. 3. ij. seminis port. en- di. acetos. an. 3. j. spicæ nardi ʒ. j. cum syndone rubra fiat sacculus in formam semilunæ. Irroretur cum aquis ros. & end. admoueaturs hepatis tepidè ante pastum, & cum coeperit refrigerari, auferatur, & iterum calfiat cum di- ctis aquis actu calidis, & iterum applicetur. Per vnguen- ta idem fieri potest sic,

Vnguentum.

R. cerati sandalini 3. iij. ol. ros. & nenuph. an. 3. ij. spi- cæ nardi ʒ. ꝑ. lauentur ceratum & ole. in qua end. fiat vnguentum, quo vngetur regio hepatis ante pran- dium. Cauendum, ne dum refrigerantia hepatis admo- uemus, septum transuersum refrigeremus, vt monet Galen. 7. meth. Ab iis enim respiratio offenditur, quam si lædi contingat, oportet ab iis refrigerantibus abstinere, & pro- noxa diaphragmati & pectori illata, calfacere, ne dum vi- ni consulimus, alteram offendamus, cauendum in his co- trariis indicationibus. Calfaciemus ergo diaphragma fo- tu calidorum temperaturum, vt decocto florum cham. & me- liloti. Aut si calidioribus opus sit, florum stech. organ. ca- lamenti & similium. Diaphragmate rectificato, rursus ad ea, quæ hepar refrigerant, si opus videatur, redeundum, à septo transuerso semper cauendo. Pro renibus refrigerandis.

Pro reni- bus refri- gerandis.

R. vnguenti Gal 3. ij. cerati sandal. 3. j. misce cum ol. cydon. & unge regionem renum frigidè actu, in introitu lecti. Per assumpta sic refrigeratur hepar.

R. sandali albi & rub. an. 3. j. sandali citrin. ʒ. ij. tro- de camph. 3. j. saccha. in aqua ros. diss. quantum sufficit. fiat elect in tab. ponderantes 3. ij. ꝑ. capiat vnā per tres horas ante pastum, manè superbibendo parum aquæ end. In forma verò opiatæ sic.

R. conf. ros. & nymphaeæ, conse. flor. cichor. an. 3. j. ꝑ. seminis acetos. port. end. an. 3. j. omnium sandal. 3. j. ꝑ.

tro.

tro. de caphura ꝑ. iij. cum syrup. viol. fiat opiata, capiat ad quantitatem castaneæ manè per tres horas ante cibum superbibendo parum aquæ end. Quartus scopus perficitur per ea, quæ acrimoniam in viis vrinæ relictam emendant. Utendum igitur medicamentis mucilaginosi frigidis, tum per os assumptis, tum per syringam in vesicam immisissis, vt minùs acris vrina reddatur. Lactuillum primum detur acetosum, extracto butyro ad ꝑ. iij. aut ꝑ. iij. quinque horis ante pastum, vel fiat sic.

℞. seminis mal. altheæ cydon. ana ꝑ. j. gummi tragac. ꝑ. iij. infundantur in decoctione radicis altheæ, seminis papaueris albi & alkeæ. fiat mucilago, de qua capiat ꝑ. j. s. cum ꝑ. iij. dictæ decoctionis, manè per octo aut decem dies. Post omnium præscriptorum vsum.

℞. aquæ albuminis oui diu agitatum cum ol. vio. quantum sufficit. fiat syringatio. Si sit magnus ardor, loco aquæ albuminis ouorum, ponatur mucilago psilij. Potest etiam emergi virga in vase lacte pleno.

℞. ol. nenuphar. viol. & rosarum ana ꝑ. j. s. misce, vn-gatur perineum inter testes & anum. Si perseveret ardor, fiat balneum ex foliis mal. viol. lact. floribus nenupharis. Vfus reuulsionis quatuor seminum frig. maiorum per syringationem laudatur, aut per os, addendo seminis papaueris albi parum.

De stranguria.

CAP. LI.

STranguria, dysuria, ischuria, symptomata sunt supradictarum affectionum. Distinguuntur autem ita, vt straguria vrinæ stillicidium dicatur, id est, cum vrina stillat guttatim, & est cum quadam irritatione ad meiedum frequenter. Fit autè cum meatus vrinæ constrictus est, & non potest simul vrinā reiicere. Constringitur autem cum vrinæ aut puris acrimoniam sentit. Tunc enim non solum hæc pars, sed & reliquæ concidunt in sese, & contrahuntur, & hoc, cum vlcus est in pene. Fit etiam stranguria ob vrinæ acrimoniam, quæ & si pauca sit in vesica, non potest quiescere, donec multa acruata sit. Acrimonia autè prouenit, vel à puris putredine, vel ob admistionē pituitæ falsæ, aut bilis. Has causas distinguere oportet, vt unicuique remedia cōueniāt. Si à pure sit, vel hepatis, vel renum, vel vesicæ est. Tunc detergentia

medicamenta iniicienda sunt, & assumenda. Detergunt serum lactis cum paucō sacch. ros. tab. decoctū hordei, & alia præscripta capite de vlcere vesicæ & renū. Optimum erit his admiscere syr. ros. vel de cucurb. maximè cū vlcus valde inflammātum est. Nam vrinam mouent, & acrimoniam extinguūt. Si ob vrinæ acrimoniam fiat, ea est tenuis, flaua, & corpus biliosus, tunc oportet serosa illa & biliosa euacuare recrementa, & ad ventrem deriuare medicamentis extinguentibus flauæ bilis acrimoniam, vt sebesten, tamarindis, prunis, syr. vio. ex multis infusionibus, & syr. ros. laxatiuo. Deinde potiones, vel syr. refrigerantes, & extinguentes flauæ bilis acrimoniam, damus, qualis est syr. viol. de nenuph. de cucurbita, end. simpl. decoctum lactucæ, portulacæ teneræ, plantag. solani. Abstinentum ab aperientibus, & nimis detergentibus. Dari potest in summa acrimonia syr. iuiubinus cum paucō syr. de pap. existente magno sensu in parte. Inunctiones refrigerantes prosunt supra renes, vt ex ol. viol. nenuph. Item clysteres molles & refrigerantes. Optimum est etiam albumen oui fortiter agitatum in collum vesicæ iniicere. Si autem a pituita salsa, purganda erit pituitosis medicamentis & decocto hordei, & aliis leniter detergentibus euacuanda. In illa causa tantum cōueniunt terebinthina lota in aqua. ros. assumpta cū syr. viol. & de gly. In aliis causis acrimoniam potius auget, quā minuat. Danda autem erit à 3. j. ad 3. ij.

De dysuria.

CAP. LII.

DYsuria similis est dysenterię. Nam difficulter vrinæ excernitur, & frequenter stimularur æger. Fit autem hæc affectio, vel propter vsum acrium medicamentorum, vt empetri, laueris, & aliorum multum diureticorum, quæ postquam mouerunt vrinæ, vrinæ difficultatem inducunt. Fit autem hæc affectio ob frigidam intemperiem vesicæ, aut colli eiusdem. Fit etiā ob crassos, & viscidos humores infarctos, aut adherentes ceruici vesicæ, vel vrinæ permixtos. Si nata fuerit ex vso acrium medicamentorum, vtilissimum erit decoctum hordei mundati cum paucō syr. viol. aut sacch. bibere ad extinguendā acrimoniam relictam in viis vrinæ, vel lac recens mulsum, aut lac amygd. paratum cum semine papaueris.

paueris. Si autem ob pituitam viscidam & crassam è toto corpore defluentem, pilulis mitioribus erit vacuanda primum, vt pilulis hieræ, aut elephanginis. Deinde dandi syr. attenuantes, & incidetes, detergentesque cum aquis vel decoctionibus similibus. Deinde fortioribus pilulis euacuanda est, vt cochiis, & aliis purgantibus pituitam citra aliquam astrictionem. In crastinum vtilissimum erit dare terebinthinam lotam cum vino albo ad 3. ij. Quòd si non facile excernatur vrina, tunc tutò dare possumus cientia vrinam cum leui deterfione, vt syr. supra enumeratos cum decoctione sceniculi, apij, asparagi, bet. & aliarum herbarum diureticarum. Si pituita in collo vesicæ detenta id faciat, iniicienda detergentia erunt. Si est sine vlcere, detergentia iniicienda, & attenuantia. Si vlcus ad sit, melicratum crudum, valdeq; dilutum, decoctum hordei, & gly. vel serum lactis cum pauco melle. Sufficiant hæc ad curationem. Quàdoque accidit dysuria propter hipposarcosim, quæ meatum claudit, & crassam pituitam retinet, tunc cathetere extrahenda est vrina, & via dilatanda, vel candela cerea, deinde carnositate extenuare oportet, & minuere medicamentis apposis in extremitate candelæ.

De ischuria.

CAP. LIII.

IN totum suppressa vrina ischuria dicitur. Detinetur autem, quia vesica distenta est, quæ ita claudit meatum, vt non possit in seipsam cõtrahi, vrinamq; propellere. Huic causæ sufficit catheter immissus in vesicam, per quem aliquid vrinæ excerni possit: deinde dilatato meatu facile redditur, quod reliquum est in vesica. Non est etiam inutilis fots aquæ calidæ, vel decocti maluarum cum apio, vel aliquo alio medicamento diuretico. Vesicam comprimere manè est etiam vtilissimū Retinetur, & à calculo paruo in meatu vrinæ contento, vel magno, & meatum occludente. Huic malo medendum est immissione fistulæ, qua in vesicâ protruditur calculus & vrina redditur. Si autè multum infra collū vesicæ non est, vtile erit digitis cõprimere penem, parte inferiore, & sensim adducere ad extremū vsq; pudendi. Aliquando ita est infarctus parti, vt neque intra, neq; extrà propelli possit. Tunc foribus dilatantibus fouere partem

oportet & succum raphani cum paucō aceto extracti
 syringa iniicere, vt frangatur, vel succum limonum, aut
 hyperic. Quod si hæc nō proficiant, nouacula partē dis-
 secare, & inde extrahere oportet. Si autē retineatur vri-
 na à crassis, & viscidis humoribus, eodem modo curan-
 da est, quo diximus in dysuria. Si à pure, curabitur de-
 tergētibus, vt suprà monstratum est. Si à sanguinis gru-
 mo, & sanguine concreto, dissoluentia sanguinem satius
 est per syringam iniicere, quàm per os assumere, & non
 nisi, (vt prius monstratum est) postquàm coaleuit vena.
 Carabe in retētiōe vrinæ à crassis humoribus, sangui-
 ne cōcreto, & à pure retento, aut à vesicæ imbecillitate,
 data cum vino, præsens est remedium. Cinis cancrorum
 marinorū, vel astacorū fluuiatilium multum prouocat
 vrinam; & dari potest etiam cū præsentiā vulneris, addi-
 to gūmi prunorum aut cerasorum. Fovere regionem ve-
 sicæ in omnibus his causis valde est vtile, aut catapla-
 smata apponere. Cōficiuntur autē ex relaxātibus, & in-
 cidētibus, vt ex radicibus aperientibus, scēni. apij petro.
 asparag. rub. maioris, asaro, seminibus calidis maior. ex
 aqua & vino. In sanguinis cōcretione, si sanguis non de-
 fluat à vesica, vtile est etiam eadem decoctione, fovere, vt
 si neque à renibus defluat. Cataplasmata fieri possunt ex
 residentia decoctionis, vel ex farinis lupinorū, orobi, fa-
 barum, cum ol. incidentibus, aperientibus, vt cum oleo
 amygd. ama. ol. scorp. irino, vel de spica. Si vrina retinea-
 tur ob vesicæ inflammationem, aut aliquarum partium
 vicinarum, curanda erit infl. mmatio sanguinis missio-
 ne, & aliis remediis propriis curandæ inflammationi, de
 quibus superius. Fieri potest cataplasma proprium sic.
 R. mal. viol. ana M. ij. rad. bis mal. ʒ. iij. sic. prunorum
 ana p. xx. Omnia simul decoquantur in aqua. Contusa
 in mortario per cribrum transmittantur, quibus adde
 ol. liliorum vel amygd. ʒ. iij. axung. porci, & cuniculi,
 gallinæ vel anatis ana ʒ. j. butyri ʒ. ij. misce, fiat cata-
 plasma, addendō parū farinæ hordei. Non retinetur vri-
 na, nisi inflammatio in magnum tumorem peruenerit,
 quo tempore medicamentis digerentibus est vtendum,
 aut sedantibus dolorem. Si inflammatione, & potius à
 tumore frigido fiat, magis calfacientia, & digerentia
 cum

cum emollientibus miscenda erunt, & linimenta simili modo conficienda, vt quod paratur ex bdellio vel ammoniaco cum multo oleo liliorum, vel amygd. terebin. & cera, vel sic.

℞. succi apij, & foenic. marin. recent. vel aceto conditi ʒ. j. ol. scorp. ʒ. iij. coquantur ad consumptionem succorum cum ʒ. j. pingue. cuniculi, vel cati, postea adde asari seminis petro. cymini. ameos, fefeli an. ʒ. j. spicæ celticæ, scen. ana ʒ. ij. tereb. abietis ʒ. j. ceræ q. s. fiat vnguentum. Tempore inunctionis adde vini, vel aquæ vitæ parum. Si ob carunculam retineatur vrina, eam minuere oportet cathetere, & alius immittere, vt dilatet meatum. Quandoque ob debilem sensum vesicę retinetur vrina, & tunc iniectiones acres ex vsu sunt, vt irritetur vesica ad excretionem. Sunt, qui pediculo: aut pulices in mentu vrinario ponant, vel pilos minutè concisos, sed mihi videtur satius immittere salem, vel ex melle immittere iniectionem, aut ex pauca hiera. Balnea in crassis viscidisque humoribus, & in calculo possunt conuenire. Dandæ sunt portiones diureticæ, quales præscripsimus cap. de calculo. Aquæ distillatæ, quia sunt magis tenuium partium, cū vino albo celerius prouocant. Si à crassis & viscidis humoribus, oxymel diureticum, & similia medicamenta conuenient.

De penis exulceratione. CAP. LIIII.

Penis varia vlcera patitur in diuersis partibus. Alia sunt interna, alia externa. Rursus externa, alia sunt in glande, alia in præputio, vel mentula. Interna, vel extremitate, vel in radice, vel in medio. Hæc facilitate, & difficultate curationis differunt, & medicamentorum formis, facultatibusque. Quæ in externa parte sunt putrida, phagedenica, & alia. Quare inuenta forma recurrendum est ad aliarum partium vlcera, hoc tantum addendo, quòd fortiter & sine morfu exsiccare debent hæc medicamenta. Illud genus horum vlcum est, quòd magna ex parte à lue venerea initium sumit. Quòd si communibus & propriis resistat remediis, ad vniuersalia remedia erit confugiendum in vnguentis, vel mercurium permiscendo. Si in interna parte præputij fuerit vlcus & citra inflammationem, iussiem remediis curandum erit.

Sin cum inflammatione, vel chymosi, medicamenta diluere oportet aquis, & syringa immittere. Quòd si denu-
dari possit, medicamentis fortiter exsiccantibus citò cu-
rabitur, vt vnguento pompholigos, & cortice mali gra-
nati, vel cerusa vsta & lota, vel aloë lota, vel atramento
scriptorum. Pars facillè fert talia medicamenta insigniter
resiccantia. Pannus detritus carminatus frequenter mu-
ratus, caua vlcera curat. Quòd si putridum sit, tunc auri-
pigmento in aqua ros. dissoluto. & plâtaginis pars curan-
da, ne ampliùs serpat, vel lixiuio cum pauco ægyptia. vel
apostol. deinde ad mitiora veniendum. Postquam pars à
putri carne mundata est, supradictis remediis curanda.
Vlcera interna, quia vrina frequenter irritata, tardius cu-
rantur, quia medicamenta partem minùs constringunt,
sine quo contactu curari non possunt. Sunt autem in in-
feriore penis parte, quando vrinam continere non pos-
sunt, & si retineant, multum in reddenda vrina postea
laborant. In aliquibus hæmorrhoides instantur, dolet
sphyncter ani per consensum. Intenditur penis, pus ma-
gis redditur cum vrina. quàm separatim. Si verò sit in
extremo penis, sponte fluit & cum digitis premitur, vel
cum cerea candela immittitur, & dolorem sentit. Tunc
considerandum, recensne sit vel antiquum. Si recens est
cum quadam calfactione, tunc leuiter oportet deterge-
re, & refrigerare, ob id iniiciuntur aquæ plantag. solari,
nenuph. myrtill. vel succi aut decoctione, vt decoctio
hord. cum syr. de ros. lax. serum lactis. Deinde adduntur
troci. albi rasis, vel alchermes. Iniiciatur decoctû lithar-
gyri, vel vnguentum pompholigos cum albumine oui. &
aqua hordei, vel sero lactis. Imponuntur renibus refri-
gerantia, vt vrinæ ardor minuatur, vt vnguentum album
Gal. sandal. nutritum album rasis, & quæ ex oleis frig. le-
uiterque astringentibus parantur. Si parùm hiband, & pa-
rùm meiant, citius curantur. Quare oportet frequenter
lenire ventrem, vt eò deriuetur materia.

R. cass. recenter extractæ ʒ. iij. tamarindorum sebe-
sten ana ʒ. ij. cath. ʒ. j. cum syr. ros. lax. fiat opiata, capiat
ʒ. j. in forma boli, vel cum decoctione hord. aut pruno-
rum. Idem præstat diasebest. cath. syr. ros. lax. frequente
assumpta. Poma cocta, pruna in prima mensa assumpta
sepia

sæpius ventrem leniunt, & humores temperant. Pro vino vtatur frigida, vel decoctione hord. mund. in principio, deinde integri. In illis diuturnis utilis est vñs decoct. gaiaci, promouendo sudorem. Euocat enim vrinam, & facit vt siccetur vlcus. Vomitus frequens non parum confert ad huius curationem. Troscisci alcheringi, cum aqua peculi ros. & hippur. profunt. Non facîle curantur hæc vlcera ad lotium acre, quod nimis detergendo vlcus exasperat. Quare frequenter iniicienda sunt medicamenta. Et si dolor vexet, sedetur iniectione albuminis oui, lactis, vel cremoris hordei. Vrantur succis, & parum humidis, vel acris, vel diureticis.

De Phymosi.

CAP. LV.

IN pene phymosis dicitur, cum glans à præputio denudari non potest, ob præputij strictionem. Sic os veteri, quando ita constringitur, vt virilem mentulam recipere non possit, phymosis dicitur, quæ duplex est. Vel enim est à naturali constitutione, quo minus aperta sit vulua, vt ego vidi vnam in Italia, Romæ, vel ob tumorem vel cicatricem contractam, quæ naturali constitutione minus est aperta, vel omnino clausa, nouacula aperire oportet. Quod si aperta sit, sed non satis, tentare oportet pessis & spongia ad formam pessis formata dilatate, vel radice gentianæ, quos pessos ligare oportet filo, & in dies crassiores immittere, & partem oleo relaxare, vel decoctione fouere, vt facilius dilatetur. Oleum amygd. liliorum, irinum conueniunt, decoctio ex radice bismal. vel cucumeris agrest. ficubus, semini lini, fenugræci, & sæpe fouere. Vnguentum hoc conficitur, quia in omnibus causis utile erit, siue in vitiosa constitutione, & a natura, siue a cicatrice, vt,

R. mucilag. sic. & fenug. ana ʒ. ij. styrac. myrrhæ, ammo. diss. in ol. irino ana ʒ. j. ceræ nouæ q. s. fiat vnguentum, vngatur pars. Pauperibus adipēs anser. gallinæ, vrsi, porci, butyrum, conueniunt. Vnguenta parata ad id profunt, vt de adipibus, pectorale, resumptium, diathea, celsypus humida, pestaria ex massa emplastri diachilonis conferunt. Quo minus adhæreant, vngatur prius oleo amygd. dulc. vel liliorum vel inuoluatur panno raro & ligetur. Si merferint sensim, coitu dilatatur satis, præter-

quam quòd voluptas dolorem tolerare facit, nisi mentula viri crassior, & foramen tam angustum sit, vt nullo modo caput mentulæ admittat.

De priapismo. CAP. LVI.

Priapismus morbus est mentulæ proprius. Fit autem teste Galeno, de locis affectis, & 13. meth. cum mentula erigitur sine desiderio coeundi, ad differentiam téniginis, quæ fit cum homo ad coitum stipulatur. Si palpitatio accidat, dicatur Satyrismus. Fit verò priapismus ob flatus neruum cauum distendentes, aut arterias calfactas, & orificia nimis dilatata. Fit interdum his, qui coitu incaluerunt, & tunc videtur lassitudo tensua. Fit frequentius ob penis vlcera, quæ cum calfactione sunt, tuncque distenditur, vel quia inflammatio est in glandulis parastatis, vel quia vlcus est in summo pudendo, ad quod curandum aliqua acris ponuntur. Idem accidit iis, qui venerem sopitam in muliere volunt excitare medicamentis, siue balneo appposito. Vlcera sanguinem arteriosum, & flatulétium trahunt, quibus distenditur penis. Quare si ob copiam spirituum sanguinis & seminis id videatur fieri, secetur vena popliis. Postea foveatur pars, & illi partes vicinæ, aqua frigida vel succo plantagin. nenupha. vel aliorum repellentium. Si propter medicamenta venerem irritantia, abluatur aqua tepida, & foveatur posca, cessabitque affectus. Si verò ob medicamenta acris, auferatur, repellaturque à parte illa sanguis attractus. Si ob vlcus internum, abluatur, & refrigeretur, iniecta aqua nenuph. myrthi, plantag. vel solatri. Bibant omnes aquam, parum comedant. Quòd si post immodicum coitum id accidat, ol. ros. vel oxyrrhod. foveatur, & obabulet per loca frigida, quod in omni eausa est utile, & aqua frigida abluere pedes, & refrigerare renes. His etiam partibus refrigeratis, nunquam penis distenditur, aut erigitur. Ob id vnguento albo Galeni refrigerantur renes, perinæum, & plantæ pedum vel vnguento populeonis, vel cerato sandalino, vel vnguento albo Ras. ex cerusa, vel fiat tale,

℞. ol. nenuph. 3. iij. cerusæ 3. iij. aceti 3. ij. misce, fiat vt nutritum, vel huic adde caphuræ ʒ. j. agni casti ʒ. ss. vngantur partes. Si perseveret morbus, clyster mollis & refri-

& refrigerans iniiciendus erit, in quo dissoluantur succi ciclae 3. ij. mel. viol. butyri 2n. 3. j. ol. viol. & nenuph. ana 3. j. ss. Si medicamento opus sit, detur cassia cum decoctione maluae, & semine agni casti. Intus non est inutile dare tabulam vnam diagal. superbibendo parum aquae endi. ad discutiendos flatus, & alia plura praescripta cap. de colica à flatibus, vel cap. de hydiope, tympanite, si ob flatus morbus fiat.

De Gonorrhea. CAP. LVII.

Gonorrhea seminis profluvium Latinis dici potest, sed id de eo, quod inuoluntariè & praeter naturam fluit, noctu potissimum, citra pudendi tentiginem aut erectionem, intelligendum venit. Fit potissimum ob vasorum imbecillitatem, & fluxum copiam, vel ob compressionem, vel tensionem, vel succussionem membrorum, ut in conuulsione & epilepsia. Profluit interdum ob seminis aquosi, & flatulenti copiam. Cum enim tenue multum est, à vasis contineri nequit, reiciturque. Communis est hic affectus, & viris, & mulieribus. Qui eo laborant, decolores fiunt, & imbecilles, sensim corpus contabescit, circa lumbos dolores sentiunt, curantur difficulter nisi causa cognoscatur. Ego noui quendam nobilem, qui ab abscessu frigido, renum diu hoc morbo laborauit, & multo semper habuit deterius, cum semen exstinguentibus frigidis, vel calidis vteretur. Institui contrariam victus rationem, iussique biberet vinum generosum, vescereturque alimentis optimis exsiccantibus, non flatulentis, & curatus est. Is partes illas imbecilles habebat ex coitu frequentiore. Et ob tumorem renū frigidum, multos humores crudos colligebat, à quibus flatus multi generabantur. Hi vero dilatabant meatus spermaticos, distendebant, & irritabant semen, quod ejaculabatur noctu, postquam eiæculationem, tam imbecillis erat, ut sese continere erectum non posset, aut ambulare, sed cogeretur in lecto decubere, vel in cathedra cruribus eleuatis. Talibus, qui ob flatus laborant, danda sunt discutientia, & siccantia, parum alentia, & quae non multos flatus gignant. Curabuntur ergo tales optima victus ratione, & medicamentis bonam concoctionem facientibus. Quare illa praescribentur, quae ad

inflationem, vel ventriculi cruditatem fuere instituta, vt pilulæ de arom. sabellinæ, ante cibum, de hiera. Ex his capiet 3. ℞. semel in hebdomada ante prandium. Vtatur etiam sequenti opiata.

℞. confect. aro. ros 3 j ciner intestinor gallinæ loto-
rum cum aqua absynt. 3. ℞. iridi flor. & semin. agni 3. ij.
cum syr. conferuat. corticis citri, fiat opiata. Vtantur &
pul post pastum.

℞. ciner. intestin. gallinæ vel pellicularum stomachi,
3 j. anisi 3 ij. galangæ 3. ij. corall. rub. vsti & loti 3. j. agni
casti 3. ℞. sacch. candi ad tertiam partem ponderis, capiat
cochlear vnum ante cœnam, vel post, non superbiben-
do. Manè exerceat corpus, non sero. Dormiat supra ma-
talitium factum ex lana ex foliis agni casti. Sobrie vi-
uat, vitet cruditatem. Vtatur vino generosoq; & alimen-
tis non flatulētis. Fricet manè brachia. Abstineat à col-
loquio, & lectione impudicæ. Occupet animum in re-
bus grauibus. Hæc sunt in omnibus causis facienda,
tum in his, qui ob seminis copiam id reiciunt, nisi quod
à generos. vino debent abstinere, & frequentius ieiuna-
re, vtiq; pilulis. Quod si sanguinis plethora adsit, non e-
rit inutilis phlebotomia è brachio, frictiones, exer-
citia, balnea calida, & quæcunque minuere possunt bo-
num habitum, quæq; seminis feruorem, & acrimoniam
extinguere possunt, vt flor. nymph. semelact cucur. por-
tul & olera, mal. acetos & aliz herbæ. Fructus frigidi, v-
uæ suspensæ poma. Vnguenta ex cerusa, & alia præscri-
pta cap. de priapif. hic conueniunt. Accidit etiam ex lō-
go decubitu, & vsu alimentorum euchymorum. Quare
his minuenda sunt alimenta, aut danda, quæ minus nu-
triant. Porro semen illud, quod reicitur, non contine-
tur in testibus, aut in vasis deferentibus, sed in illis ad-
ditamentis positis sub osse pubis, inter rectum intesti-
num & vesicam. In ea enim parte, vt ostendimus in ana-
tome, duo sunt vasa deferentia, quæ à dydimis semen
præparatum recipiunt. ipsūque perficiunt. Coeunt ve-
rò in adenibus, parastis, & ab illis pendent duæ vacuæ
appendices, quæ semen iam præparatum, & confectum
continent, vt tempore coitus in mentulam statim cōgre-
getur, & inde in vuluam eiaculetur. Id facit, vt qui alio
sunt

sunt ficciores, sunt libidinosiores, & hoc morbo magis obnoxij, facitq; vt si tales venere abstineant, etiā alui excremēta retineāt, & difficulter dura reiiciāt. Facit etiam, vt si glandulæ ipsæ, & partes laxentur, exonerentur: vel aliquid quantum, vel cum meditatur excretionem seminis ob mulierem præsentem, cogantur prius aluum exonerare, quam concumbant, facitque vesicæ tumor, vt hæ partes in meatum vrinarium non possint mittere semen, cōprimunt enim à superiore parte meatum. Ob id, vt vis medicamenti ad eas partes penetrare possit per sedem reiectis prius excrementis, syringa in anum iniicienda talis decoctio in parua quantitate, supra ventrē incumbente ægro.

R. rad. ireos ʒ. j. myrtil. fol. lentisci, & cupressi ana ʒ. ij. ros. rub. & sal. ana ʒ. j. seminis agni casti ʒ. ʒ. seminis rutæ ʒ. ij. fiat decoctio in vino, iniiciatur ʒ. ʒ. pro vice, reiectis priuscrementis. Foveri potest regio pubis & perinei prædicta decoctione, vel vng. parari sic.

R. ol. myrtil. mastic. irini an. ʒ. ij. nucis cupressi, myrtil. an. ʒ. iij. macis, garioph. agni an. ʒ. ij. ceræ q. s. fiat vnguentum. Tempore inunctionis, adde aceti albi parum, ad penetrationem & contractionem partis. Quod si accidat ob compressionem, auferatur quod comprimit, vt non retineatur vrina, vel stercus. Quod si alio tumore, curetur propriis remediis. Si mulieri accidat hæc affectio, eadem remedia erunt instituenda, sed topica supra ventrem, vel circa renes, & maximè ad latera eo in loco in quo testes mulieris siti sunt. Medici & ægroti gonorrhæam etiam vocant, quando ob inflammationem illarum partium, reiicitur cum dolore aliquid seminis boni, vel corrupti, quod expurgatur. Sed id potius referri debet ad caput de ardore vrinæ, in quo de inflammatione illarum glandularum etiam tractauimus.

De coeundi impotentia.

CAP. LVIII.

Impotentia coeundi aliquibus accidit ob membrorum generationis imbecillitatem, quæ ab intemperie, vel à conformatione dependet. Nam qui membra frigida habent, non possunt alimentum sufficiens attrahere, & in semen cōuertere, vel ob penis breuitatem intromittere semen. Vitia, quæ in conformatione sunt, ægrè curantur potissimum, quæ in defectu sunt sita. Quare qui instru-

menta vitiata, vel mutilata non habent, curandi sunt ablata causa. Alij hoc morbi genere detinentur, propterea quod parçè comedunt, aut sufficit alimentum ad corporis nutritionem, & ad generationem. Vel si multum comedant, alimenta sunt parvi nutrimenti, vt olea, fructus, &c. Quare his, qui parum comedunt, impendendus est cibus largior in prandio, isque sit multum nutriendus, & semen generans, vt succus carnis, testes gallorum, vel vulpis, vel carne leutrarum, castorei, polypis, ostreis, & pinearum nucleis, in lacte maceratis, dulcibus, & iis quæ cum lacte vel melle, vel saccharo parantur. In cœna parcius comedant, & bibant. Nam qui vino sese ingurgitant, parum ad venerem impelluntur, sed dormiunt solum. Qui alimentis parum alentibus aluntur, immutent victus rationem, in eam, quam nuper diximus. Si animi pathemata, sollicitudines, & curæ hominem vexent, si alicuius rei desiderium vel studium, minus potens ad venerem erit. Si partium frigiditas in causa sit, sequenti vnguento incalescant.

℞. olei castorei, & de nuce indica ana ℥. j. olei muscatelini ℥. ℞. castor. euphorbij ana ℥. ℞. mosci ℥. j. aliptæ moscatæ ℥. j. ℞. ceræ parum, fiat vnguentum, vngantur manè plantæ pedum, & regio renum, pubis & perinei. Assument alimenta supra enumerata, & castaneas, dactylos, sinapi, erucam, bulbos, vel fiat opiata.

℞. testiculorum vulpis decoctorum in hydromelite ℥. j. contusis adde pinearum & auellanarum infusarum in paucò lacte & melle ana ℥. ℞. carnis leutræ, ftercoris muris, mosci ana ℥. ℞. cum syr. conf. cortic. citri fiat opiata, vel

℞. cortic. citri, zinzib viridis ana ℥. j. conf. ering. ℥. ℞. carnis leutræ & testic. vulpis, priapi tauri, vel cerui an. ℥. iij. pul. diamosci dul. & diambæ an. ℥. j. cum melle, in quo ℥. j. cantharid. integrarum, prius maceratarum in lacte dissoluantur, fiat opiata, capiat ad quantitatem auellanæ superbibendo parum vini maluatici, duas horas ante cœnam, quæ pauca sit. Ad hanc rem valent radix eringiorum, pastinacæ sylvestris, vel satirionis, vel orchis in melle condita. Renes stynchorum ad id valent, vel stynchi veri nō adferuntur ad nos, neque qui Venetiis vulgò ven-

venduntur, veri sunt. Nostri verò, quos Pharmacoposæ habent, sunt àquatici. At veri, sunt terrestres crocodili. Ego semel vnicum vidi duorum cubitorum.

De Mensum fluxu immodico. CAP. LIX.

Vterus multas & varias affectiones habet. Aliæ sunt communes, inflammatio, scyrrhus, cancer, intemperies. Aliæ sunt propriæ, vt suffocatio, sterilitas, præcipitatio, fluor muliebris. Primùm agendum est de fluxu immodico, retentione mensium, quia isti affectus sunt causæ multarum affectionum. Menses dicuntur redundantes quando purgatio naturalem modum excedit, & euacuatur multus & optimus sanguis, vel post abortum, vel post partum naturalem, vel post vsum medicamentorum aperientium orificia venarum, & post pessaria acria, & corrodentia, & alias causas, quæ sanguinem mouere possunt. Fluit sanguis e venis, vt ait Gal. vel ob earum corrosionem, vel propter osculorum apertionem, aut per resudationem, *diapedem* vocant. Arroasio venæ fit per pessaria acria, vel alia medicamenta caustica, & acria, quæ vlcerationem, aut excoriationem excitauerant, quod deprehenderetur, si antea vsæ fuerint accerrimis medicamentis. Fit aliquando arroasio à causâ interna, vt à bile, aut sanguine acri aut pituita salsa. Quare habitus corporis inspiciendus est, &crementa reiecta. Nam si bilem & humores acres redundantes contineant, oportet primùm symptomati occurrere, deinde ad erosionem, & eius causam venire, vt sanguinis missionem, ad reuulsionem, & sanguinis distensionem cucurbitis, ligaturis, & astringentibus supra partem impositis. Mittatur sanguis e brachio, & apertio venæ fit admodum exigua, vt longiori tempore & minori quantitate sanguis expurgetur. Nam quibus ob eam causam fluit sanguis, tenuis est & paucus, qua de causâ non oportet multum extrahere. Cucurbitulæ frequenter apponendæ regioni hepatis & splenis, digiti ligandi sunt. Renes & venter sequenti vnguento refrigerandi.

R. ol. myrt. nenup. cydon. an. ʒ. iiij. succi plantag. vel lingux pass. vel semperuiui ʒ. ij. coquantur ad consumptionem succorum, quibus adde corall. rub. seminis plantag. myrtill. seminis berber. cerusæ, & boli arme. an. ʒ. ij.

ceræ q. ſ. fiat vnguentum, quo vngatur addito aceto roſ.
 Intus ſumenda debent eſſe in craſſantia, & acrimoniam
 ſanguinis obtundentia, vt album oui fortiter agitatũ,
 & calfactum, tantum per ſe aſſumptum vel cum gum.
 traga. aut arab. Item mucilago cydoni. diſſoluta in a.
 qua peculi roſ. vel plantag. Syr. de pap. iuiub. cum pau.
 ca quantitate ſyr. de roſ. ſiccis. Nam ſanguinis acrimo.
 niam extinguit, & fluentem retinet. Succus buſæ paſto.
 ris impetum ſanguinis retinet, à quacũque cauſſa. Pars
 affecta leuiter detergenda eſt, deinde emplaſtica frigi.
 da, quibuſdam frigidis aſtringentibus admixta, ſunt ad.
 hibenda, vt bol. arm. rubrica fabrilis, terra ſigillata. Al.
 bumine oui excipiuntur, & ſupra partem apponuntur.
 Succu herbarum aſtringentium & refrigerantium exce.
 pti farina tritici, vel amylo, inſpiſſatũque, & parti appoſi.
 ti, fluxum ſanguinis retiaent, quibus ſi adiungantur a.
 ſtringentia, fortius repellunt, & ſanguinis impetum ſi.
 ſtunt. Hæc ſi non proſunt, ſtercus porci uſurpandum. re.
 ductum ad formam cataplaſmatis, addendo pul. roſ. vt
 fætor minuatur. Cinis teſtæ ouorum tenuiſſimè trita,
 ſiccando, ſanguinis fluxum impedit, à quacũque cauſ.
 ſa. Purgandi ſunt humores medicamentis poſt impetum
 ſanguinis retentum rhab. myrob. vel tamarindis, ſebeſt.
 & ſyru. roſ. lax. vel cath. Si per diapedeſim fluat ſanguis
 ob eius tenuitatem, & ſeri copiam, oportet iſdem medi.
 camentis euacuare, quibuſdam additis aquas vacuanti.
 bus, vt braſſ. marina, ſenæ orient. decocto ſumaræ, ſuc.
 co roſ. & aliis purgantibus ſine magna calfactione. Vi.
 ctus ratio in craſſans & inſpiſſans ſit, pedibus animalium
 vtatur, alica. vel amylo, iuſculis coctis, omnia quæ ex fa.
 rina non fermentata parantur, ſunt in hoc caſu ex uſu. Si
 autem ob venarum raritatem id fiat, tunc aſtringentia
 & condenſantia conuenient, qualiã ſunt, quæ ex aquis
 myrtil. peculi roſ. parantur, & aliis aſtringentibus, vt
 bolo arm. alumine, radic. biſſortæ, ſpongia bedeg. & ſi.
 milibus. Infuſiones facimus, cùm vena intus latitet. Si
 commodè remedia poſſint extrã adhiberi, pulueres in.
 ſpiſſati albumine, ſupra partem affectam apponantur.
 Eadem etiam curant anatoſiſm. Pul. off. ſepiæ cum
 vino datus fluxum ſanguinis retinet. Item carabe tro.
 corum,

*Viſus
 ratio.*

eorum, tro. de spodio, sang. drac. appositus aut assumptus sanguinem erumpentem à quacunque parte retinet. Sanguis exsiccatus, supra partem appositus idem præstat. Flores salicis, & omnium florum papi, telæque araneorum, extrinsecus adhibita sanguinem retinent, & coagulant. Conseruæ ros. symph. cydon. caro aliorum fructuum astringentium conditorum ad id vsurpantur, fiuntque ex his opiata vel condita.

R. conser. ros. antiquæ 3. ss. conser. symph. 3. j. tro. de carabe, aut de terra sigil. 3. j. boliar. 3. ij. sangui. drac. 3. ss. syr. de ros. siccis vel myrtill. q. s. fiat opiata, sic,

R. symphiti & carnis cydon. conditorum sacch. an. 3. j. conser. ros. antiq 3. ss. pul. off. sep. 3. iij. tro. de spodio & de terra sigill. an. 3. j. pul. diamarg. frig. & diapa. albi an. 3. j. syr. cydon. q. s. fiat opiata, capiat ad quantitatem auellana: superbibendo aquam bursi pastor. aut decoctionem eiusdem. Condita parantur sine fyru. & ex maiori quantitate conf. & sacchar. & pauca quantitate medicamentorum præditorum aliqua insigni qualitate, vel odore, vel sapore, quia iis utimur ex aqua bullita tempore sitis, ut,

R. conser. ros. 3. ij. pul. corall. rub. 3. ij. pul. marg. 3. ij. cum sacch. ros. tab. fiat conditum. Solent aliqui diamarg. & triasand. & alios pul. admiscere, sed sunt prædita nimis insigni qualitate quam ut conueniant hic. Si à parte ulcerata sanguis fluat, sitque à parte aliquid corroendum sandaraca, auripig. calcytis, & alia caustica cum albumine oui adhibita sanguinem retinent, & carnem putridam minuunt crustam generando. Si quis plura remedia velit, quærat caput de vnguentis, & de pul. in nostro lib. de formis remediorum.

De muliebri purgatione.

CAP. LX.

Mulieres reddunt per vterum quædam excrementa serosa. quam purgationem muliebrem appellant, quod illis sit peculiaris & propria. In quibusdam quotidie, in aliis post mensium purgationem, nonnullis euenit inter duas purgationes tantum. Aliquibus hoc vitium à toto corpore depêdet, in reliquis vero ab affectibus vteri. Hæc cum ulcere vteri conuenit, ob id distinguenda est. Distinguntur autem ex consistentia recrementorum red-

ditorum. Nam quas vlcus infestat, pus reddunt crassius, foetidius, & albius. Purgatio autem muliebris est velut ichor, aut serum. Differt etiam, quod mulieres quæ vlcus in vtero habet, maximè si in collo fuerit, congressum viri non patiuntur, aut si patiuntur, irritatur vlcus. Quæ verò menses tales patiuntur, nullam sentiunt in coitu molestiam. Quantitate etiam differunt. Maior enim copia serosæ substantiæ emittitur, quàm puris. Purgatio itaq; mulieris serosa est, quandoq; bilis serum aut ichor, quandoque pituita, & frequentius quàm sanguinis. Rarò fit à melanch. aut si fiat, tandem cancer excitatur in vtero. Cognoscitur autem cuius fit humoris ichor aut serum, à colore, qualitate, & totius corporis cacoh. Nam si à bile fit, calor est subflauus, & pallidus, humor acris, quam acrimoniam mulieres potissimùm sentiunt in parte proxima externæ, & in pterigiis. Et color totus bile redundare videtur, maximè quando per consensum totius corporis fit, quod etiam ex moribus, & victus ratione deprehenditur. Nam quæ acribus vescuntur alimentis, & quæ natura sunt negotiosæ, hanc affectionem patiuntur. Sin à pituita, color totius corporis albidus est, & magna quantitas defluit, sed minus acris. Sunt autè otiosæ & desidæ, quæ hunc affectum patiuntur. A sanguine fiunt tales purgationes, sed tantùm cum mulieres vtero gerunt, vel quando suppressi sunt menses. Tunc aliquando natura locum serosum excretum reddit, quodvtrunque rubescit, & tale est, qualis esset aqua paucò sanguine tincta. Si corpus sit plenum sanguine atro, erit purgatio fusca, vel si cancer iam factus sit, purgatio illa non multùm differt à sanguinea, nisi quod magis fusca est. Prouenit aliquando purgatio vitio vteri tantùm, sed rarò. Cognoscitur autem fieri vitio vteri, si reliquæ partes bene habeant, & præcessit retentio mensium, vel immodica purgatio, vel alia vteri affectio. Hæ affectiones difficillimè curantur, quia pars illa promptè recipit aliarum partium recremèta, tum ob situm inferiorem, tum ob multitudinem venarum eò pertingentium, tum etiam propter consuetam illam naturalem purgationem. Post tales purgationes solèt fieri vlcera in vtero, & ab vlceribus fluxus immodicus sanguinis. Si vlcera fiant, arrodentia, vel virulentia à biliosa, si putri-

si putrida & sordida, à pituitosa: carchinomata, à melanco. materia erunt. Curantur autem, si fiant per consensum totius corporis, aut alicuius partis. Si habitus corporis vitiosus sit, castigetur, & in suam naturalem cōstitutionem reducat. Curato corpore ad vterum veniendum. Nam quemadmodum oculorum affectus nō perfectē curatur, nisi corpus vniuersum curatum fuerit, sic neque vterus. Igitur si purgatio muliebris à bile fiat, dāda est opera, vt medicamentis biliosis astringentibus (vt rhab. myrob. succo ros. & earum syr.) & quæ bilis acrimoniam frangunt, quæque aquam purgāt, purgētur, vt, supra dictum est, de immodica purgatione, & venarum arrosione. Abstinere oportet ab omnibus aperientibus, nisi in declinatione, aut curato corpore, cum volumus ad vrinas eos humores deriuare, fiat tale apozema.

℞. cichor. end. scariol. lupuli, fumar. ciclae, merc. lact. borrag. ana M. j. fol. brass. mar. M. β. pass. prunorum, sebesten, ana pa. xx. senæ orient. & medullæ carth. ana ʒ. ij. flor. cord p. j. anisi ʒ. j. quatuor semin. frigid. mai. ana ʒ. ij. tamar. ʒ. j. fiat decoctio in fero caprino vel in aqua. In lb. j. β. diss. succi ros. syrup. end. simp. ana ʒ. iij. sacch. parum, fiat apoz. mediæ decoctionis. Capiat in quatuor matutinis. Si mulier morosa fuerit aut delicata, atq. cum sand. rub. Finitis syr. capiat portionem sequentem.

℞. gly. ras. ʒ. β. polypod. ʒ. j. myrobal. citrinorum ʒ. ij. coquantur leuiter in vna parte apoz. In quartario vno colaturæ diss. cath. ʒ. j. syr. ros. lax. ʒ. ij. misce, fiat potio. Si diuor fuerit, adde infusionem ʒ. ij. rhab. auferendo cath. aut eius dimidiam partem. Si maluerint in forma pilularum, fiant ex rhab. & syr. ros. lax. Nam pilulæ quæ paratæ habentur in officinis, calidiores sunt, quam vt in hac causā cōueniant. Triphera per siea magis cōuenit rhab. syr. ros. lax. cath. diase est. In crastinū dare oportet decoctū hordei cum syr. vio. Oportet frequenter hāc purgationem iterare, vel syr. supra scriptū pro medicamento decoquere vsque ad perfectionē, & addere inter clarif. si diues sit, rhab. ʒ. β. Si verò pauper, augere quantitatem succi ros. vel apponere syr. ros. lax. In principio minus astringentibus est vtendum, vt corpus exactius purgetur. In processu purgationis, quæ purgāt & astringunt

magis conueniunt, quia minus deducunt recremēta ad partem affectam & partē magis corroborant & siccant. Quamobrem vsus pilul. & rhab. & myrobal frequenter macerat. in succo ros. plurimum valent, misceantur sic.

℞. rhab. electi frequentissimē irrorati succo ros. 3. ij. myrobal. citrinorū, chebul. & indo infusorum in succo ros. ana 3. j. mastic. ʒ. j. spicæ ʒ. ʒ. cum syr. ros. lax. fiant pilulæ, de quibus capiat bis in hebdomada in lecti exitu, capiēdo duas vel tres vel quatuor. In pilulis addi possunt & tamarindi, myrrha, crocus, cinamomum & alia quæ misceri solent, prætermittenda sunt. Spica autem ponitur, quia leuiter astringit, & exiccat, & sua tenuitate partium alia medicamenta deducit. Post has euacuationes vterum abluere oportet decocto hordei, aut lentium cum paucō sacch. vel melle, & per dies aliquot continuare. Deinde supra ventrem & renes ponenda sunt emplastra constringentia, vel remedia illa quæ ex bolo arm. sistētibus sanguinem, & resiccantibus componēbantur. Et ne vterus recipiat faciliē huiusmodi recremēta, iniectioni addere oportet ros sicc. vel syr. ros. de ros. siccis. Ad detersionem syr. ros. lax. plurimum confert, sicut & serum. Non erit etiam inutile opiātam imperare ex frigidis & constringentibus, vt,

℞. conf. ros. antiquæ 3. ij. conf. flor cichor. 3. j. pul. trifan. 3. ij. corall. rub. vlti & loti 3. j. ʒ. cum syr. conseruationis cotoneorum & conditorum fiat opiāta, capiat sero & manē. Si pituita sit & fluxus muliebris aquosus, purganda erit medicamentis pituitam purgantibus, vt ag. carth. elect. de citro sol. aur. diacarth. Et materia concoquenda detergentibus & modicē calidis, vt melle ros. syru. de arthem. Post primam euacuationem syrupo de absynthio vti possumus, quēadmodum leuiter astring. quibusdam. Fiat ergo in hunc modum.

℞. pil. de hiera vel de aro. 3. j. ag. tro. 3. ij. ʒ. cum melle ros. fiant pilulæ, de quibus capiat tercio quoque die in exitu lecti, primā vice sex vel septem, deinde tres vel quatuor tantum. Item

℞. mell. ros. col. 3. ij. syr. de stechad. & de arthem. ana 3. j. aquarum beto. hyss. absynth. ana q. j. misce, aro. cum 3. j. diarrh. abb. Finitis syr. capiat pil. sequentes.

℞. pil.

R. pil. agreg. foetidarum & cochiarum ana ʒ. j. cum aqua arthem. fiant pil. capiat à primo somno.

R. decoct. hord. ʒ. iiij. mell. ros. col. ʒ. j. capiat in crast.

R. theriac. med. ætatis, vel mithrid. ʒ. j. capiat v. horis ante prandium, deinde vtatur opiata.

R. conf. anth. stechad. ana ʒ. ij. conf. acori vulgar. colatæ ʒ. j. pul. diarrh. abb. aro. ros. vel diag. ʒ. ij. cornu cerui, corall. rub. vsti ana ʒ. iiij. conch. marinarum vstarum & lotarum in vino ʒ. vj. cum. syr. conf. cortic. citri fiat opiata, capiat manè & serò. Item

R. cineris spongiæ prius diligentis. lotæ & post vstionem similiter lotæ in aqua pec ros. ʒ. ij. f. as. eb. & cornu cerui ana ʒ. ij. ros. rub. cortic. citri sicci ana ʒ. j. gal. cyperi ana ʒ. ʒ. sacch. ros. tab. ʒ. ij. misce fiat pul. capiat loco opiatæ ante prandium vel coenam. In hac causa quæ magis siccant sunt vtiliora, quam in fluore biliosa. Et quia hoc vitium ortum habet primum à ventric. eius habenda est ratio, iuuando concoctionem vnguentis modicè calidis, astringentibusque, hoc modo.

R. ol. cydo. & de absynthio, & nardini ana ʒ. ij. cyperi, galang. caryoph. an. ʒ. j. corticis & citri & comæ absynth. & mētæ siccæ an. ʒ. iiij. ceræ q. s. fiat vnguentum, quo vng. ventric. serò & manè. Possunt fieri facculi & emplastra ad eandem intensionem, & eadem ratione. Invalde obesis & frigidioribus, cerat. stomachicum Gal. conuenit. Vterus prædictis iniectionibus detergentibus abluendus est, in quibus mell. quãtitate augere oportet, & post exactam deterfionem erit vtendum fumigio præscribendo ad imprægnationem. Supra renes & ventrè topica remedia præscripta erunt ex vsu, quibus addere possumus aquam calidã, vt si in temperies frigida & humida sit, emédetur emplastro pro matrìce, & de pelle arietina. Vtile ex his vti stuphis, & frequenter sudorẽ prouocare. Euocat enim humiditatem, trahendo ad cutim. Vomitus à cibo, vel ante cibum plurimum prodest, & multò magis quàm alia euacuantia, & sit auersio in contrariam partem. Materia melancholica si aliquã habet acrimoniam, velut biliosa curanda est, nisi quòd in euacuationibus vti oportet purgantibus melanc. vt epith. cuscuta, thymo, folliculis fenæ, decocto mercur. & aliis purgantibus melanch. vt syr.

fumar. cum syr. de end. qui magis conueniunt. Nam syr. alij melācholiā cōcoquentes calidiores sunt, quā vt hīc conueniāt. Supra partē addi possunt metallica, quibus in carchinomate palliando vti possumus, vt vnguento ex pomph. cerusa, iuthia, antimonio, litharg. nutrito & similibus, ex his conficienda vnguenta vel emplastra cum ol. myrrh. & aceto. Si nulla sentiatur acrimonia, vsurpari possunt remedia ad pituitam præscripta, i. quæ calfaciūt & exiccant. In omnibus causis pilulæ de bdellio conueniunt, sed quia multæ sunt descriptiones, accipienda est ea, quæ conchas venereas recipit. Hæ pilulæ exiccant omnia vlcera interna, neque laxant, sed potius constringunt. Vinæ decoctum ad fouēdas partes multum conuenit, & in pituitoso lixiuium in principio. In processu lixiuium cum paucō alumine magis prodest. Balnea omnia naturalia ad id sūt vtilia, vel quæ arte parantur ex alumine, sale, vel calchitide, vel ex lixiuiō, & decoctō herbarum radic. & florum resiccantium, vt,

℞. lixiuij parati ex cineribus ilicis, vel quercus vel ficus, vel cannarum quantum sufficit ad encathisma conficiendum, in quo decoque radic. bistorti, & lapati acuti ana ℥.ij. corticis maligra. gallarum, suberis ana ℥.j. ros. rub. p. ij. fiat decoctio in qua diss. salis communis ℥.ij. aluminis ℥.j. calcyt. ℥.ss. fiat encathisma quod & valebit ad procidentia ani & vteri. Vtantur potius encath. quā balneo, quando cōstringendum est. Balneo autē, quādo sudor prouocandus. Et post omnia alia remedia vtatur hoc encathismate, longē à mensium purgatione, ne retineantur. Idem encathisma valet in fluxu sanguinis seroso, vel immoderato fluore & raritate venarum per diapedesim. Sit tepidum tantum, & diutius sedeat in eo, reiectis recrementis alui & vesicæ. Potest etiam fieri lixiuium ex cineribus concharum vstarum, vel fermentis, vel piro siluestri, vel aliis arboribus astringentibus, vt sorbo, corno, & similibus. Vtantur optima victus ratione. Abstineant ab humidis, vt iusculis, & multo potu, & ab iis quæ humorem aut serum generant. Vsus feri cum succo ros. & infusione, aut leui decoctione brassicae plurimum prodest in bilioso fluore: vt vsus pilularū supra scriptarum de aromatibus vel de hiera cum pau-

co agarico, vel assaieret, vel quæ conficiuntur ex myrobal. & agarico in pituitoso. Siccant enim & astringunt.

Ad menstrua alba.

℞. folior. clemat. diaphnoidis, ana M. j. herbarum vaticrici & hederæ ana M. β. fabar. integr. N. x. hord. integri leuiter torrefacti p. j. ros. rub. p. β. fiat decoct. in aqua arthem. vino rub. & aqua cister. ad ℥. ij. misce, foueatur locus, vel fiat iniectio ad vuluam, & hoc remedio sistentur menstrua alba. Proderit tamen vti suffumigio sequenti, post forum vel iniectionem.

℞. gallæ mosca. & alyptæ mosca. ana z. ij. ladani, hypocist. ana z. styracis, beniouin, ligni aloës, santalorum omnium ana z. j. nucis mosc. macis, garyophil. ana ℥. j. mucaginis gummi tracaganthi q. s. fiant trocisci addendo modicum carbonis salicis, & post exsiccationem inungantur oleo muscatelino, vel nardi. & recipiat fumum per embotum post exactam purgationem menstruam. Deinde apponatur emplastrum sequens.

℞. emplastr. pro matrice ℥. iij. radi. bisto. musci quer. ana ℥. iij. fiat emplastr. rotundum, applicetur regioni vteri, post exactam purgationem menstruorum, vsque ad aliud tempus purgationis, quod tunc auferatur.

De mensibus retentis. CAP. LXI.

Menses statim tempore incipiunt & desinunt secundum naturam. In aliis citius erumpunt, vt 13. anno, aliis 14. aliis non ante 20. aliquibus nunquam, vt Aristot. meminit de quadam muliere. Desinunt anno 40. in aliquibus. In aliis non ante 60. & hoc propter copiam vel defectum sanguinis. Quæ enim multo sanguine & calido abundant, citius, frequentius, & diutius purgantur. Quæ verò crassum vel lentum, vel paucum habent sanguinem, tardius & parcius purgantur. Hæc enim purgatio non fit, quod sanguis vitiatum sit, sed ob copiam, vt Hippocr. & alij existimarunt. Galen. de atra bile scribit cum sanguinem non solum quantitate, sed & qualitate inutilem superfluumque esse. Quamquam Arist. & quidam Medici in contraria sint opinione, propterea quod sanguis per menses reiectus corruptus & putrefactus, aliquos affectus malos facit, ob id illi tribuunt veneni vim. Sed hoc euenit sanguini, vt sem. propter aëris alterationem

*An vitia-
tus san-
guis men-
struus.*

Facile enim extra vasa putrescit, & naturam venenosam induit. Nam eo sanguine menstruato augetur foetus, nutritur nouem mensibus, & post natiuitatem nutritur lacte, quod ex menstruo fit sanguine. Argumento est, quod mulieribus lactantibus supprimuntur menses, citra noxam aliquam. In aliquibus propter copiam sanguinis, & dum vterum gerunt, aliquam mensium purgationem habent. Quod si sanguis vitiatum esset, sequeretur foetus vitiatum sanguine conformatum, & nutritum lac ex vitiatum sanguine fieri, quare & ipsum vitiatum esset. Mulieres laderentur tempore imprægnationis, & lactationis, ob vitium sanguinis retentionem, quemadmodum iis, in quibus præter naturam retinentur menses, euenit. Ex his sequitur in vanum laborare, qui ante vel post tempus purgationis menses volunt prouocare. Sicut etiam in his, qui parum habent sanguinis ob cachexiam, quæ verâ & perfectam sanguinis generationem impedit. Frustra etiam mulieres cruciant, post longam sanguinis euacuationem factam per nares aut alias regiones, qui menses prouocare volunt, aut post diuturnum longumque morbum, ad quæ sequuta est atrophia. In his omnibus causis oportet alia ratione menses prouocare, hoc est, in cachexia malum illum habitum corrigendo, vt multus sanguis postea generetur. Sic & in atrophia, & sanguinis penuria alimentis, quæ multum sanguinis generant, danda sunt. Neque medicamentis sunt exiccandæ, neque sanguinis missione è poplite, vel è talo euacuandæ. Quare si multus sit sanguis in corpore, aut lentus, aut suppressus ob venarum obstructionem, aut vteri desolationem, obstructionemque adhibenda sunt remedia, vt quibus non fluunt menses, propterea quod multus sanguis in partes superiores fluit, & per nares vel sputum sanguinis reicitur. Tunc vtile erit frequenti cucurbitularum appositione supra emuntoria sanguinem circa vterum trahere. Apponuntur sine scarificatione his, quibus non est nimius sanguis. In quibus autem multus est, scarificatio facienda est. Nam cum sanguini patet exitus, facilius ad illam partem fluit, sed multus non est trahendus. Nam euacuatio sanguinis copiosa, aliam euacuationem impedit. Aufertur enim copia propter quam facultas expultrix illum sanguinem expellit,

Quando frustra prouocantur menses.

Quibus causis prouocantur.

Cucurbitularum.

expellit, vt suprà monſtratum eſt. Sanguinis quoq; miſſio ex talo, vel poplite faciendâ eſt eadem cautione. *Vti Fotus.* Iſte eſt partes illas prius fouere aqua tepida, vel decocto mal. vel lilior. vt partes illæ relaxentur, ob quod ſanguis ille facilius deſcendit. Doloriferæ ligaturæ in coxis factæ, vel frictiones ſanguinem ad partem trahunt. Sed iſta non ſunt faciendâ, niſi quo tempore ſolebât menſes fluere, aut in quibus nunquam fluxerunt ad finem menſis. In qua parte humores liquefacti aut rarefacti videntur auſti, linimenta ex modicè caſſacientibus & relaxantibus ſunt ex vſu. Nā quæ fortiter ſiccant, aut caſſaciant, quomodocunque adminiſtrata, ſanguinem detergendo, materiam abluunt. Relaxantur partes hoc modo.

R. axung. gallinæ, anſeris, & anatis ana 3. j. ol. amygd. *Vnguentum.* amar. cham. lil. an. 3. j. ariſtol. vtriuſque, rad. irid. & alari ana 3. j. ceræ nouæ quantum ſufficit, fiat vnguen. Vngantur partes ventris inferioris, inguinum, & renum poſt fortum. Poſtquam partes inferiores hoc modo præparatæ ſunt, optimum eſt illis imperare vſum pilul. de hiera & *Pilula.* aromatib. quæ ventriculum & inteſtina purgant, humores attenuât, & præparant corpus ad aſſumptionem ſyr. aperientiu, aut acrium medicamentorum. Duabus autem tribuſque horis ante paſtum dandæ ſunt, vt in exitu leſti. Deinde ſyrupi incidentes, & attenuantes craſſitiem *Syrup.* ſanguinis, aut humorum mixtorum in ſanguine dandi ſunt, vt ſyrup. de radicib. de arthem. & ſimiles. Dantur autem cum decoctione eringiorum, aut quinq; radicum aperientium vel cum decocto ſabinæ, aut arthem. aut leucoij. Si multa pituita in corpore collecta fuerit, euacuandâ eſt, multum ante tempus purgationis menſium, & leuiter euacuandâ eſt, ne redundancia humorum auferatur Sed ſufficit dare pilulas ſuprà dictas, addito agarico vel alaro aut carthamo, vel pilul. benediſtas. Cum tempus menſium inſtare videtur, vtile eſt peſſaria nuptis imponere, in virginibus maſcalia, id eſt, puluerem bombacæ exceptum, quia illæ peſſi naturam abhorrent. Conſciuntur autem ex attrahentibus, & oriſicia venarum aperientibus. Trahunt autem & quæ calida ſunt, & tenuium partium, & quæ ſuapte natura laxant, vt agaricum, aſarum, colocynthis, ſcammo. ſuccus mercu. ſag-

cus irid. succus cucum. agrestis. Calida autem, vt piper, zinziber, cinamomum, cardamomum. Fiunt sic.

R. pul. benedictæ aut hieræ ʒ. j. cum melle decocto fiat pessarium ad formam suppositorij, & ligatum apponatur. Vel arida præscribuntur, & cum succo mercu. incorporata, panno raro inuoluta immittuntur, vel in forma vnguenti digito intra vuluam ponuntur, vt quæ conficiuntur ex fellibus & attrahentibus medicamentis.

R. fellis hirci vel vaccæ ʒ. j. asari, agar. cinam. ana ʒ. j. suc. merc. ʒ. j. coquatur succus cū pauco melle, & simul incorporata reducantur in formam vnguenti. Fortius redditur, si semen nigellæ apponatur. Fortiter enim trahit, & menses mouet. Diutius non debent hæc manere, ne vlcus excitent, & ne diutius hæreant. Abluendus est locus vino calido, in quo decoctum sit pulegium, aut matricaria. Eo tempore bene nutriantur, alimentis multum nutrientibus, & attenuantibus. Præstantissimum ad id remedium est suc. ering. cum vino albo dare. Non, vt aliqui faciunt, prouocâdus est sudor post assumptionem horum remediorum. Nam sudor auertit & impedit mensium purgationem, aliò deriuando materiam. Quare neque balnea, neque stuphæ conueniunt, nisi cū sanguis crassus est, aut lentus, vt humores fundantur, sed id fieri debet citra magnam sudoris prouocationem. Neq; etiâ opiatæ multum aperientes conueniunt, quia plus resiccant, quàm iuuant. Sed in forma liquida danda sunt remedia. Talia enim facilius distribuuntur, & ad partem valde remotam perueniunt. Vinum hippocraticum ex vino albo, vel fuluo, & parte tenuissima cinamomi paratum adaucta dosi cinamo. est vtilissimum & iucundissimum medicamentum. Diluitur autem aqua graminis, vel asparagi, vel apij, vel petro. aut decocto eringiorum. Quo tempore vitur topicis istis remediis, caueat à frigore, & nimia exercitatione, aut cibi repletionem.

De sterilitate. C A P. LXII.

EAdem ratione curandæ sunt mulieres, quas ad conceptum facilitate volumus, euacuando medicamentis leuiter laxantibus, abstinendo ab opiatis resiccantibus multum, & semen absumentibus. Sunt autem nutriendæ alimentis viderem excitantibus, quæ tardiores sunt.

Hoc

Hoc tantum remediis addere oportet, quod eis pessaria alia conficienda sunt, post exactam vteri purgationem, os vteri interius dilatando, exterius constringendo. Dilatatur autem vterus vnguento ex adipibus supra scripto aucta dosi rad. iridis. & additis 3. ij. styra. 3. j. tereb. abietis. Post usum illius vnguenti, vtatur nascali ex feliibus hirci, vel lupi cum mosco, castoreo, & ciuetà. Hæc enim omnia laxant, & vterum deorsum trahunt, calfaciuntque, venerem stimulant, vt & sterco murium. Exterior pars constringitur foru parato ex radicibus, herbis, floribus, & aliis constringentibus odoratis, vt

R. rad. bistor. quinq; fol. & cype. an. q. j. ros. rub. cum calcib. cortic. mali grana. & balaust. ana 3. j. suberis 3. ss. hederæ M. j. fiat decoctio in aqua, & paucio vino astringente. Foueatur pars in introitu lecti. Post mensium purgationem, & usum aliorum remediorum paulò antequàm congressura sit cum viro, quia magna ex parte mulieres non concipiunt, quia semen non trahunt, aut tractum non retinent, emplastra supra vterum & renes ponenda erunt, quo tempore congressura est. His quæ non trahunt semen, emplastr. ceroneum, & alia quæ ex gummi, aliisque attrahentibus conficiuntur, erunt ex usu. His verò quæ non retinent, emplastra constringentia utcunque calida, quale est comitissæ, pro matrice, de pelle arietina, de mastiche, additis radicibus bistor. 3. ij. ladani hypocisti. an. 3. j. misce, fiat emplastr. quod gestent, donec appetat tempus alterius purgationis. Eo enim tempore admouenda sunt emplastra astringentia, ne menses retineant, nisi in quibus maior sanguinis copia fluit, quàm pro corporis habitu conueniat. Si mulier non concipiat ob salacitatem, & nimiam ad venerem propensionem, quod ob acrimoniam seminis & caliditatem fit, alenda est crassis alimentis, quæ sanguinem inspissent, & semen crassius reddant. Vfus fructuum est utilis, vt pyrorum, pomorum, castanearum, quæ crassos humores, & crassos gignunt flatus, imperumque illum retardant. Stuphis vtuntur mulieres humidiores, balneis verò durum habentes vterum, aut frigidum, sed his vtendum paulò antequàm fluant menses. Si mulieres sint valde obesæ, exequandæ sunt usu medicamentorum calidorum, & inci-

dentium, & aperientium, & tenui victu diu antequam v-
tantur remediis supradictis. Postea illas optimis cibis,
multumque sanguine generantibus, oportet rursus nutri-
re, & imperare frictions, cucurbitas, aliaque remedia,
quibus vsi sumus ad sanguinem deorsum trahendum. In
illis costringitur os vteri, si credimus Hippo. ab epiploo,
quod ad os vsque pubis descendit. In frigidioribus ergo
& humidioribus mulieribus vtile erit vti hac opiata, si-
ue humiditas sit in toto corpore, siue in vtero tantum.

℞. conf. yring. & cort. citriana ʒ. j. conf. anth. & zin-
zib. conditiana ʒ. j. ʒ. cineris priapi tauri, & cineris vteri
leporis ana ʒ. ʒ. pul. diagal. diamosci dulc. vel diambrae
an. 3 ij pinearum & auellandarum an. 3. iij. sacch. parum,
cum syr. conseruationis cortic. citri fiat opiata, de qua
capiat ad quantitatem auellanae longè à pastu, cum ibit
dormitum. Hæc opiata magis conuenit frigidis & hu-
midis toto corpore. Nam si vterus tantum frigidus &
humidus esset, & totum corpus calidum & siccum, la-
tius esset fumigio per embotum recepto exsiccare. Fu-
migium autem conficitur ex odoratis resiccantibus, &
leuiter astringentibus.

℞. nucis moscatae, macis, beniouini, styra. an. 3. ij. ca-
stor. 3. ʒ. aliptæ moscatae, vel gallæ moscatae 3 ij. gariop.
ladani puri an. 3. j. zinzib. cinamomi, folij, spicæ nardi
an. 3. ij. excipiantur omnia terebinthina, & fiant trocisci,
quibus fumigetur manè & serò post mensium purgatio-
nem Illis opiata vtilis erit, si augeatur dosis pinearum, &
auellandarum in lacte simul, & pauco melle mixtis, subinde
remouendo lac, ne ace scat, & recens infundendo. Talis
reficiet corpus exsiccatum, & copiam seminis genera-
bit. In istis opiatis adduntur multa alia exsiccantia, quæ
si per se sicca assumerentur, potius impedirent, quàm iu-
uarent. Sed quia permiscuntur syrupis & rebus dulcibus
temperantur, conueniunt, vt rasura eboris, & cornu ca-
præ, semen fœli, medulla seminis fraxini (linguam trais
vocant) addentur & passerum cerebella, sed illa magis in
cibo sunt assumenda, quàm permixtis misceantur. Nam
iuuant, quod multum seminis generent, quod non possunt
facere si in pauca quantitate assumantur. Satius erit cere-
bellum porcelli, & porci diligenter coctum cum pauco
origa-

origano, & postea frixum in sartagine edere. Multum enim nutrit, & semen auget. Opiata ad mulieres salaciores confici debet ex leuiter astringentibus, & copiam feminis generantibus parum calidis, vt

R. myrob. conditorum, embl. & cheb. an. N. ij. cortic. citri conditi cum saccharo (in aliis cum melle) 3. j. pinearum infusarum in lacte, seminis fraxini eodem modo infusi an. 3. ss. cum syr. de pomis redolentibus fiat opiata, additis ras. eboris & cornu capræ an. 3. ij. capiat ad quantitatem auellanz. Quæ minus propensæ sunt ad venerem, gestent ambram vel moscum, vel chirothecas odoratas & maximè noctu habeant sub puluinaris, nisi obnoxie sunt suffocationi vteri, Tunc enim melius esset illa odorata coxis alligata habere.

De fetus retentione.

CAP. LXIII.

Mulieres quædam facillimè concipiunt, & frequenter, sed fœtum retinere nō possunt, cuius rei multæ sunt causæ. Aliæ enim os vteri minùs claudunt, & cōstringunt, & ob nimiam humiditatem relaxantur, Aliæ ob sanguinis feruorem aut copiam menses patiuntur, & fœtui adimitur alimentum. Aliæ vterum habent minùs amplum, aut quia non potest dilatari vterus pro incremento pueri, vnde reiciunt fœtum, alię tertio, alię quarto, aliæ quinto mēse. His pro causarum varietate remedia sunt inuenienda. Quibusdam ante conceptum, aliis post. Mulieres, quæ ob nimiam humiditatem fœtum retinere nō possunt, frequenter euacuare oportet ante cōceptum pilulis ex hiera picra, de benedicta, de aromatis, addito zinzib. & sale gemmæ. Et post mēsum purgationē, pessariis trahentibus pituitam vterum purgare, qualia sunt pessaria suprascripta. & quæ recipiunt agaricum, colocynthi & alia pituitosa medicamenta. Deinde fumigio suprascripto exiccandum os vteri. Pars etiam interna fouenda fotu præscripto, addita 3. j. aluminis. Applicetur emplastra suprascripta. Vtatur pul. sequenti.

R. cineris priapi tauri 3. j. ras. ebor. cortic. citri sicci an. 3. iij. coral. rub. vsti & loti in aqua absynthij 3. iij. saccha. parum, misce fiat pul. de quo capiat 3. j. cum pauco vino diluta aqua arthē. Aut si mauis, ex iis fac opiatam, additis myrob. exceptis syr. conseru. myrob. aut cortic.

cum citri. Utatur victu non attenuante, nec aperiente, sed exsiccante: Si verò foetus reiiciat, ob sanguinis acrimoniam, purgetur ante conceptum rha. myr. syr. ros. Utatur victus ratione incrassante sanguinem, & obrundente acrimoniam. Post conceptum inungat partem renum vnguento sequenti.

R. ol. ros. ompha. & cydon. ana ʒ. iij. cerus. lotæ in aqua ros. ʒ. ʒ. radi. bistortæ & coral. rub. an. ʒ. ij. seminis berb ʒ. j. ceræ albæ q. s. fiat vnguentum pro renibus. Emplastra minus conueniunt, quia magis calfaciunt, minusque refrigerant. Quæ nimio sanguine abundant, abortum patiuntur, quia natura gravata quantitate, aperit orificia venarum, & multum sanguinis reiicit. Deinde foetus ob penuriam alimenti vel moritur, vel reiicitur. His ergo, quæ propter hanc causam solent abortire, utilissimum est sanguinem trahere ex vena cubiti interna, & ut minus plena victus ratione utantur, præscribere. Vngantur renes & regio vteri vnguento præscripto ad sanguinis feruorem, ut partes refrigerentur, quæ ob nimium sanguinem incalescunt. Sanguinis etiam missio in eius feruore, & acrimonia fieri potest, sed minori quantitate pro ratione habitudinis & sanguinis. Si mulier multum sanguinis reiicere consueverit tempore mensium, plus sanguinis trahere oportet. Quod si multus sanguis trahendus sit, id vna vice non est faciendum, sed interpositis 10. aut 15. diebus, aut mense vno vel duobus. Et id facere oportet potissimum 4. 5. 6. & 7. mense, quamvis Hippoc. a quarto mense usque ad septimum vtero gerentes purgari posse scribat, quod in morbis acutis faciendum dixit. Neque etiam formidandum, quod inquit Hipp. mulierem abortire ob sanguinis missionem, quod est intelligendum de mulieribus habentibus parum sanguinis, aut imbecillioribus. Nam experientia constat mulieres, quæ sunt frequenter passæ abortum, hoc remedio retinuisse foetus. Non solum autem ad retentionem foetus, sed etiam in his, quæ difficile pariunt, sanguinem misi cum summa utilitate. Nam cum foetus abundat multo sanguine, in magnam molem crescit, maximè his, quæ amplum vterum habet, & postea ob magnitudinem exire non potest. Sed
de

de difficili partu plura suo loco. Mulieribus, quæ vterum paruum habent, aut densum & constrictum, & in quibus vterus non facile dilatatur, vtilissimum erit ante cōceptum balnea relaxantia, fots, & linimenta præscribere, vt vterus colore balnei dilatetur, & relaxetur. Sed cum iam vtero gestat, summa cum animaduersione, his remediis est vtendum. Nam talia laxando abortum faciunt, sed hac cautione erit vtendum. Octauo quoq; die vtatur fotu per duos dies, vel oleis, vel vnguentis, vt in hepatis affectibus facere solemus, addendo quædā leuiter astringentia. Et pessariis astringentibus os interius etiam constringemus. Fots fient hoc modo.

R. rad. alth. & liliorum an. lb. ss. flor. cham. & ros. ana ℥. j. fiat decoctio in aqua, tepidè foveatur pars, quæ est inter vmbilicum & os pubis. Vel fiat fots ex oleis relaxantibus, & rarefacientibus, quæ sine tanto calore actuali, supra partem adhiberi possunt, quale est oleum lil. irinum, amygd. sesami. anethinum & similia. Axungie etiam id præstant, vt axungia porci non salita, gallinæ, anseris, anatis. Supradictis oleis & axungiis addere oportet parum olei mastic. vel lentiscini, quia emollit & leuiter constringit; aut parum styrac. cal. aut ladani. Manè & serò foveantur, reiectis recrementis vesicæ & intestinorum. Imperanda est quies in his omnibus causis, maximè ante tempus illud, quo abortire solent. Abstinere etiam illas oportet à coitu, qui solet facere abortum, ob agitationem & dilationem oris vteri. Nam dum vterus mouetur, ad noui seminis receptionem, fœtum recentem & parum confirmatum extra propellit.

De partus difficultate. CAP. LXIIII.

Mulieres difficillimè pariunt, aut ob aëris constitutionem præcedentem, vel præsentem, vt ob constitutionem aquiloniam, vt Hipp. docuit, vel ob magnitudinem fœtus, vel ob vteri constrictionem, vel virium imbecillitatem, vel quia fœtus non egreditur consueta forma, sed reduplicatur, ventrem primum vel dorsum, vel alteram tantum manum, aut tibiam foras mittendo. Causa diligenter inuestiganda erit, & pro ratione causæ remedia instituenda. Si mulier ob virium imbecillitatem parere non possit, reparanda est imbecillitas illa

ante tempus partus, aut si imbecillior facta fuerit, propter morbum præcedentem, aut aliquam euacuationem, aut dissolutionem spirituum, aut propter aliam causam, agenda est euechymis, & multum nutrientibus, vt vino, succo carnis, testiculis galli, & similibus. Si autem ea imbecillitas proueniat ob longam defatigationem in ipso partu, citra insignem sanguinis euacuationem, bonum erit dare potionem cordialem ex confectioe alkermes cum vino vel cum iusculo, vel parare potionem ex aliis pulueribus cordialibus, vt

R. diamb. vel diamosci ꝑ. j. pul. diagal. & diarrh. abb. ana ꝑ. ss. vini albi ꝑ. ij. aquæ bet. & melissæ, buglossæ ana ꝑ. ij. misce, fiat potus, capiat ventriculo vacuo, & per duas horas nihil accipiat. Si ob constitutionem aquiloniam & borealem, mittenda est in balneum relaxans, cum appetit tempus partus. Partes inferiores pudendorum relaxandæ sunt, vel fotu, vel vnguento, vel oleis relaxantibus. Ego hoc fotu vti soleo.

R. arist. rotundæ, vel longæ, vel clemat. vel pistolochiæ lb. j. aut qr. j. rad. liliorum, bismal. an. qr. ss. seminis lini, scœnug. an. ꝑ. j. fiat decoctio in aqua & ol. vel brodio pingui, adde vini albi lb. ss. foueatur pars. Post fotum vngantur partes prædictæ.

R. ol. amygd. dulc. vel liliorum qr. j. ping. gal. anser. anat. ana ꝑ. j. styrac aristoloch. rad. irid. cinamo. spicæ celticæ an. ꝑ. j. ceræ nouæ, citrinæ, & propoleos an. partes æquales, fiat vnguentum. Hic fotus, & hæc vnctio in omnibus causis vtilia sunt. Relaxant enim partes inferiores, & illas magis obsequentes faciunt. Sunt autem inungendæ partes perinei & caudæ. Nam eas dilatari ad meatus amplificationem oportet, non autem os pubis, quod firmiter per cartilaginem ligatum est, & per ligamentum transuersum parte inferiore positum. Sed cauda cum osse sacro articulata est, vt extra moueri possit, ad ani & vteri amplificationem. Quam ob causam mulieres non debent inniti illa parte, sed lumbis, vel cœxis, vel debent sustentari viris fortioribus per brachia. Nam cum sedent vel decumbunt, illius ossis amplificatio impeditur. Vtilissimum est etiam rectum intestinum vacuum esse omnibus recrementis. Quare si mulier non
exone-

exonerarit aluum, balanis sollicitanda est potius, quam clystere, quia vterū astringere possiet. Sed balani acrimonia facultatem expultricem mouet, & stercus, & fœtum aliquando propellit. Si autem ob reduplicationem, oleo amygd. illita manu molliter infantem in vuluam reducere oportet muliere decumbente in dorsum, & reuoluendus est, ut in caput nascatur. Si altera tibia omissa fuerit, altera manu fœtum intra vterum oportet trudere, altera verò tibiam alteram apprehendere. Possunt etiam in pedes nasci, sine magna difficultate. Dum laborant in partu, caueant ab aëre frigido, neque siccantur nimium pannis multum calidis. Quod si vterus siccus fuerit, utilissimum est vel ol. vel mucilag. fœnug. aut lini partem lubricam reddere, quò facilius partus descendat. Si ob magnitudinem fœtus difficile pariat, relaxandæ sunt partes. Quod si non sufficiat amplificatio illa, vnguibus aut vno assè scissuram in inferiori parte facere oportet. Sed si fieri potest citra sphincteris lacerationem, satius est. Imperitæ enim mulieres disrumpunt sine necessitate. Sed præstaret tenui victu & missione sanguinis 7. aut 6. mense extenuare fœtum & minuire, potissimum si mulier sit puellam paritura. Sunt enim semper obesiores fœminæ, cum nascuntur quàm mares.

De partu difficultate caput alterum.

Mulier ob multas causas parit difficulter. Causæ verò referuntur vel ad fœtum, vel ad vterum, vel ad tempus, vel ad situm mulieris, vel aliqua accidentia, vel ad intestinorum & vesicæ plenitudinem, vel ad mulieris imbecillitatem, ac spirandi difficultatem. Rursus fœtus maior crassiorque partus difficultatem facit, & multò magis, si duplicatus egrediatur, si pedem vnum proferat altero replicato, vel si in brachium exeat. Hæc enim difficillimum partum faciūt. Præterea vteri & mulieris cōstitutio, vel aliarum vicinarum partium, ut vteri magna distentio, oris structura, colli vteri longitudo. Hæc enim facit, saltem, ut longiori tempore exeat fœtus. Item nimia omenti & vicinarum partium spissitudo, & obesitas. Nam Hippocr. scripsit omenti magnitudinem impedire conceptum, os vteri comprimendo. Sic & facile partum molestat. In quibusdam enim omentum de-

scendit inter vesicam & vterum, ibiq; spissior fit. Stercus
 induratum in intestinis retentum, idem facit, tum et-
 iam vrina, sed minus. Aëris præsens constitutio etiam
 obest, vel conducit parui, si quidem aquilonia difficilem
 facit, austrina facilem. Sicca, foetum & mulieris cor-
 pus exiccando, difficilem facit partum. Nimis calida, vi-
 res resoluendo: frigida, partes contrahendo. Humida
 omnium aptissima est. Quæ modicè calida est, vt Veris
 (quod cum Autumno faciliores partus concedat) lauda-
 tur. Ob id videndum, ne cubiculi aër frigidus aut
 plus æquo calidus sit. Multum autem referre didicimus
 experientia, quo situ donetur paritura. Nam si sede-
 at, impeditur dilatatio caudæ. Cum enim mulier parere
 vult, necesse est ampliatur vuluæ foramen non à parte an-
 teriore (vt aliqui falsò existimant, putantes ossa pubis,
 quæ cartilagine media iunguntur, & transuersum liga-
 mentum acceperunt, aperire) sed ad ossis sacri cum cau-
 da articulationem. Nam cum os sacrum in caudam de-
 sinat, ita cum eo articulantur sua ipsius ossa inter se, vt
 reflecti possit cauda in partem anteriorem, & foramen sic
 reddetur latius multò. Facta est autem cauda (vt id obi-
 ter annotemus) potissimum ad sustentandum rectum
 intestinum, & musculos ani firmandos, quibus vtitur
 ad dura alui excrementa vi extrà pellenda. Hæc cauda
 ita erigitur in exteriora, vt visu id discerni possit, si quæ
 parturit mulier, emaciata sit. Itaque si natibus innitan-
 tur, cum non possit retrocedere cauda, partus impedi-
 tur: si stent, non satis viribus pollent, quanquam is situ
 convenientior sit, modò in anteriora se flectant. Quare
 manibus contra lectum, aut mēsam, aut aliud innitatur,
 ita vt sit sufficiens spatium pro obstetrice susceptura pue-
 rum, & sustineatur à viris fortibus: Sin minus, decum-
 bat, sed dorso tantum innitatur. Imbecillitas verò, quæ
 ab ætate iuuenili, vel ratione morbi est, parum facit dif-
 ficilem, quia robore opus est ad foetum deiciendum.
 Morbus pectoris, aut eius mala conformatio, quæ facit,
 vt diutius spiritum continere non possint, hinc maximè
 nocet: quoniam omnis expulsio fit, retento spiritu. At
 Asthmatici ex diu retento spiritu suffocantur. Pectus
 depressum non multum aëris recipit, qui necessarius est, vt
 tendatur

tendatur diaphragma. Ipsum enim sua tensione ventriculū & partes vicinas sibi comprimit, & consequutione quadam inferiores ad expellēda excrementa & foetus cum musculis ventris. Hæ sunt causæ, quas in parituris contemplari oportet. In aliis quippe obesitas nocet, in aliis membrorū durities, siccitasq; vt in mulieribus, quæ iam senescentes incipiunt parere. Tales enim difficile pariunt, quia iam obdormit, & quasi in asperam arteriam rugatum est collum vteri. Causarum aliæ sunt in nostra potestate, aliæ non. In nobis non est, vt quæ parit, Autumno, aut Vere, aut flāte austro, pariat: sed quòd nulla sint excrementa in intestinis aut vesica retenta, quòd corpus sit crassum, infans minus obesus, vterus sit humidus, cum puer descendit, & cauda libera sine cōpressionē aliqua, & alia multa, Medicus prudens, & in rerum cognitione versatus exequi poterit, si mulier sit audiens dicto, qui cum causis, causas poterit inuenire cōtrarias. Incipiamus itaq; à foetus magnitudine. Ea à multis causis prouenit, scilicet, à magnitudine parentū, vel à copia feminis, & vteri amplitudine. Nam quæ mulier parua est vtero, parum feminis accipit, & aliquando non generabit ob paruitatem, & quòd facile non dilatatur vterus, cū crescit infans, cogetur abortire. Sed quæ amplo sunt vtero, & facile dilatabili, magnos infantes procreāt, si sanæ sint. Magnum vterū habent, vt plurimum, quæ magnæ sunt & quæ iam frequenter pepererunt, vel quibus à partu venter non fuit cōstrictus fasciis. In talibus impediatur foetus augmentum tempore imprægnationis, post quartū mensem. Si plethora adsit, per epicrasim, & ex interuallis mittatur sanguis, parum trahendo, & cibi copiam minuendo, vel dando imbecilliora alimenta, quæ satiant & parum nutriunt, qualia sunt olera, & potissimum spinachia, borrago, lactuca, acetosa, beta. Item poma, pruna cocta, caro salita, aut multum assa. Abstineant à iusculis, si fieri potest: sin minus, vtātur ex semicoctis carnibus. Abstineant à multum alentibus, vt dulcibus, carne parum assa, caseo, lacte. Edant pisces, parum dormiant, sed ita, vt seruētur vires. Cum appetit partus, assumant prima mensa, quæ laxant, fructus & olera, quæ si nō sufficiāt, glans supponatur ex melle aut lardo, aut

alia re salita. Regantur hoc modo. Quiescant in lecto, donec certissimum erit infantē in lucem prodire. Duo enim commoda hinc sequuntur. Primo vires conseruantur, pro tempore emissionis: secundo ab aëre vel frigido, vel sicco partes non constringuntur. Interea fiunt fœtus super os pubis & partes ani ex oleo amygdalarum dulc. vel liliorum, vel decocto sequenti.

℞. mal. bismal. ana M. j. seminis lini ꝑ. iiij. aristol. ꝑ. j. fiat decoctio, in aqua & ol. viol. & amygdal. de qua fiat fœtus cum filtro. Post fœtum vngatur sequenti vnguento.

℞. mucilaginis seminis fœnug. & lini ana ꝑ. ij. extrahatur cū vino albo dulci, cui adde pistoloch. aristoloc. longæ, rotundæ, & clemat. ana ꝑ. j. styrac. rub. myrrhæ, stactæ, id est, styrac. liquidæ ana ꝑ. ss. propoleos ꝑ. ij. ol. amygd. lilio. ana ꝑ. ij. reducantur ad formam vnguenti. Viribus prospiciatur, vt conseruentur. Si in prandio vel cœna bene comederit, nihil detur, donec concoxerit. Quod si speretur fœtus emissio illico, abstineat omnino à cibo, assumat tantum parum vini diluti aqua arthemisiæ, vel parum panis intincti in vino hippocratico. Et sic cõtineatur & non vexetur. Sed cū puer incipit apparere, tunc retento spiritu conetur expellere, & innitatur capite & manibus. cruribus diductis, & adiuet pueri motum. Puero emissio, obstetrix ourachum teneat, & si potest, eodem spiritu & conatu secundinam deiciat. Vel vngatur interea vulua vnguento præscripto, & si nant eam quiescere paululū, si imbecillior sit, & postea conetur eiicere. Quod si non possit, detur hæc potio.

℞. arist. myrt. piper. ana ꝑ. ss. cum vino hippocratico bibat, & citissime eiiciet. Sed de iis plura sequenti capite, nunc alias causas perquiramus. In omnibus hæc vilia sunt scilicet, quod præter naturam est, auferatur. Si ob vires imbecillas futurū partum timeas difficilem, vires non subito, sed ante tempus oportet reparare remediis supra dictis. iusculis, vino generoso, vitellis ouorum, succo carnis, ptisana parata cum vino, & aliis multum nutrientibus, & vires reficientibus. Partibus autem topica adhibenda, quæ in omni causa conueniunt. Relaxandæ siquidem, humectandæ & emolliendæ sunt par-

tes. Si in difficultate anhelitus hoc faciendum sit, scilicet, relaxare partes, & topicis medicamentis facilitare respirationem, curare oportet, ne flatûs aut pituita retenta illam molestat, & ne ventriculus multo cibo distendatur, nec adsit cruditas aliqua.

De secundinarum retentione. CAP. LXV.

FOETUS aliquando mortuus, vel secundina post partum retinetur. Si foetus in utero mortuus fuerit, extrahendus est, & partes relaxandæ, curandæque sunt, ut prius monstratum est, & comprimendo partes superiores ventris, & deorsum trahendo, foetus reiicitur. Vel instrumentis chirurgicis aliquando necesse est partem illam, quæ foetum retinet, dissecare, quò facilius emittatur. Danda sunt ea medicamenta, quæ proprietate occulta foetus deiiciunt, qualia sunt à Diosc. & Gal. & aliis præscripta multa. Eadem foetus mortuos & secundinas corpore expellunt, ut decoctû sabinæ, cinamomi, borax, tro. de myrrha, & alia multa. Si foetus suo tempore natus est, vel quinto, vel sexto, vel septimo, vel octavo mense, & secundinæ retinentur, danda sunt ista medicamenta, ut expellantur. Quòd si non reiiciatur, verèdum est ne secundina sit adhuc utero alligata. Id deprehèdetur his coniecturis, quod neq; medicamentis, neq; vehementissimis illis conatibus mulieris sit reiecta: & quòd ante tempus puer emissus fuerit, idq; sine doloribus magnis præcedentibus. Dolores enim, quæ præcedunt partum, fiunt, dum disrumpuntur venæ & arteriæ cotyledonibus uteri alligatæ. Itaque si dolor non præcesserit, fracta est tantum secundina, & utero adhæret, ideo manu comprehendenda, aut vngulo, & leuiter trahenda, ne disrumpatur in partes, maximè cum diutius retenta fuerit. Quòd si ita adhæreat, ut vnguibus non possit extrahi, immittantur medicamenta suppurantia, ut illam putrefaciant, & sensim expellatur à natura. Fieri enim potest, ut in ea parte putrescat, ut & vidimus puerum putrefactum, & frustularim reiectum, relictis magnis ossibus in utero per longum tēpus, quæ post in utero matris mortuæ reperta sunt. Vxor fuit chirurgi Mospeliensis, vocari (Aufme) qui post mortē, ut causam alicuius affectus interni cognosceret, passus est illam dissecari. Quia ve-

ro odoris grauitate caput replet, stomachum putrefacta euertit, & alia inducit sæpissimè symptomata grauissima, & sæuissima, ob id necesse est per interualla iniicere ea, quæ vim habent detergendi, quod putrefactum est. Ad id valebit vnguentum basilic. in multo oleo lil. vel amygd. dissolutum, vel in decoctione sequenti.

R. radic. mal. viol. ana ʒ. ij. radic. arist. longæ vel rotundæ ʒ. j. seminis lini, fœnugr. ana ʒ. flor. chama. & centaurij minoris ana P. j. frum. P. ij. fiat decoct. in aqua & ol. & in eadem dissoluatur vnguentum basilic. vng. ægyptiacum ad deterfionem etiam iniici potest. Arrodit enim, & potentissimè abstergit, & sua acrimonia facultatem expultricem mouet. Periclitatur mulieres si adhæreat, & contineatur, & moriuntur, vel ob vsum medicamentorum acrium vlcus in vtero fit. Quamobrem optimum erit, antequam adhibeantur remedia, id prædicere, ad vitandam calumniam. Potio sequens sæpe danda est.

R. sabinæ, arthemisiæ ana M. j. fiat decoctio in aqua. In tb. β. decoctionis adde vini albi, vel clari tb. j. arom. ʒ. j. cinamomi, & detur frequenter, si sine febre est, vel,

R. boracis ʒ. j. capiat cum ʒ. iij. vel iij. prædictæ decoctionis, aut cum vino albo, aut detur tantundem tro. de myrrha, vel ʒ. j. carabæ, maximè si cum magno fluxu sanguinis sit. Nam vrinas mouet, secundinas deiicit, & sanguinem fluentem retinet. Decoctum vel aqua fabarum distillata, vt & aqua florum croci deterget, secundinas pellit, & dolores illos sedat. Quare non est omitrenda in hoc negotio.

De steraphymosi.

C A P. LXVI.

IN pene phymosis dicitur, quando glans denudari non potest ob structuram præputij, de qua cum prius à nobis dictum sit, cum de affectibus penis loqueremur, ex eo loco repetere poteris, cap. 55.

De mola.

C A P. LXVII.

Molam alij aliter definiuerunt. Gal. 14. meth. masam carnis informem, Aetius & Paulus tumorem durum in ostio, aut alia parte vteri natum existimarunt. Ego puto vtcunq; esse, fierique primum ex semine veluti duram tunicam, & è sanguine crasso spissoque calore concreto;

creto, quæ nullam formam habet, & veluti parenchyma quoddam vtero alligatur, & sic tumor apparet, ob involucri duritiem, ideo durum tumorem dixerunt. In formem autem, quia nullius animalis figuram habet. Fit autem à semine & à sanguine multo crasso, spisso & concreto, quem immodicus calor cogit, & in carnis formam transfert. Nam id euenit, quando plus sanguinis menstrui influit, quàm sit necessum pro foetus formatione. Spiritus autem genitiuus, aut qui opificis vires gerit, vt ait Galenus, non potest tantum materiæ elaborare, & ex ea foetum formare. Nam ad foetum vtrumque semen sufficit. Sanguis verò menstruus ad nutrienda illa semina, vel augenda trahitur. Deprehenditur autem grauitate vteri, & tentione maiore, quàm in vera imprægnatione. Sequitur mensium suppressio, decoloratio, apperentiæ deiectio, mammarum inflatio, & vt breuiter dicam, omnia quæ in vera imprægnatione solent accidere, nisi quòd grauitas corporis, decoloratio, & appetitus deiectio diutius durant. Curatio vera est sanguinem mittere, si vires mulieris ferre possint, vt adimatur alimentum. Deinde partes internæ relaxentur, & externæ etiam fotibus & vnguentis descriptis capite de foetus difficultate: & omnia agant his contraria, quæ scripta sunt de retinendo partu, id est, fortiter corpus moueant, saltando. Vtantur aperientibus, & foetus mortuos, aut secundinas reicientibus, de quibus multa propriis capitibus. Fiant pilulæ sequentes, de quibus frequenter vtantur manè.

R. boracis 3. j. carabæ, asari, cinamomi, nigellæ rom. & vulgaris, sabina ana 3. j. galbani, assæ foetidæ, opop. bdellij ana ʒ. ij. cum melle syl. fiant pilulæ, de quibus capiat 3. j. duabus primis vicibus, deinde 3. ss. Postea bibat parum vini hippocratici, aut syrup. præscripti capitibus de suppressis mensibus. Vtatur frequenter in cibis apio, aliisque herbis aperientibus, & incidentibus, vt sanguis concretus dissoluatur, eiciaturque. Non esset inutile cutim, si in orificio appareat, nouacula, aut alio instrumento dissiccare, deinde ratione curare, quæ vti sumus in secundina adhærente, ex putrefacientibus, vel arrodentibus.

De vteri inflatione. CAP. LXVIII.

Inflatio vteri mulieribus euenit, & post partū, aut post
vsum balnei, aut stuphæ, aut mensium purgationem,
aut quia flatus in toto corpore collecti sunt ob calorem
imbecillem. Post partum autem, si emissio partu ventrem
non comprimant, nec ab aere se tueantur. Ob id mulie-
res nostræ fasciis se constringunt, vt vterus in sese confi-
dat, nec recipiat aerem. Post balneum si sese aeri frigido
exponant, aut post stupham, inflatio vteri satis manifesta
apparet, & tactu deprehenditur. Aliquando motus est, a-
liquādo quies. Et cum mouetur huc & illuc, potissimum
sursum, suffocationem vteri facit, aliquando dolores. Ali-
quando si à balneo, vel stupha id accadat, sterilitatem ad-
fert, propterea quod partes relaxatas & cal factas aer fri-
gidus condensat, & internam vteri regionem, & ora clau-
dit, per quæ semen à testiculis descendit in vterum, per
eius cornua. Illi autem flatus, qui ob cruditatem sensim
gignuntur in vtero, vel toto corpore, minus molestare
solent. Curatur autem illa species euacuando pituitam,
aut succos frigidos, & à quibus eleuantur flatus, & corro-
borando calorem naturalem ventriculi, & omnium par-
tium naturalium, discutiendo deinde flatus genitos & col-
lectos. Purgandæ autem erunt hoc modo.

℞. mel. ros. col. syr. de stech. an. ʒ. j. syr. de arthem. ʒ. iij.
aquæ absynth. arthem. apij, petro. ana q. j. fiat syru. cum
ʒ. j. diagal. Finitis syrupis

℞. pil. agreg. & cochiarum an. ʒ. j. ag. tro. ʒ. ss. formen-
tar pilu. cum syru. de bizañ. capiat post mediam noctem
cum custodia. Et quia fieri nō potest, vt hac euacuatione
omnes humiditates euacuentur, illis imperare optimum
erit, vt octauo quoque die ʒ. j. pil. sequentium capiant si-
ne custodia.

Alias de benedict. loco de bdellio. ℞. pil. de arom. de bdell. ana ʒ. j. ag. trocif ʒ. ij. castorei
ʒ. ss. misce, fiant pilulæ vj. pro ʒ. capiat ʒ. ss. In tempera-
turis calidis aut tempore magis calido, oportet aufer-
re castoreum. In crastinum medicamenti capiat ʒ. j. my-
thridat. antiqui, vel theriaçæ antiquæ, vel de opiata se-
quenti.

℞. cortic. citri conditi, sacch. & conf rad. ering. an. ʒ. j.
confect. aro. ros. ʒ. j. ss. pul. diagal. ʒ. iij. diacym. ʒ. ss. cum
syr.

Syr. conf. cort. citri fiat opiata, de qua capiat ad quantitatem auellanzæ, superbibendo parum aquæ absynthij, mentæ, hyss. vel beth. Partes gutturis etiam, & tota ventris regio & vteri vngatur vnguento sequenti.

R. ol. nardi aneth. & rutacei ana ʒ. ij. garyoph. macis, galang. pip. spicæ vtriusque, scen. ana ʒ. j. cyper. ros. ana ʒ. ʒ. ceræ vel terebin. q. s. fiat vnguentum. Possunt etiam inungi cerato stom. Gal. aut apponi emplastr. ū de baccis lauri supra vterum & ventrem. Olea sola etiā si calfaciant, & constringant, minus conueiunt, quia ventrem laxant ob lentorem. Quare optimum erit vel acetum, vel vinum maluat. illis adiungere, vt magis profit. *Aceti vñ*

R. ol. de absynthio & rutæ ana ʒ. iij. aceti, vel vini ʒ. j. vngatur tota regio ventris. Acetum supra ventrem minus conuenit, ob id vinum tenue erit ex vsu, veluti clarum, aut album, vel aqua vitæ. Sacculi ex milio & fale torrefacti flatus absument, & discutiant. Sacculi etiam, quibus admiscetur sem. cal. maiora & minora. Si autem à partu id fiat, non opus est purgatione per pilulas, aut alia medicamenta, quia sufficit purgatio illa naturalis, quæ fit per vterum, quæ si non fuerit, est prouocanda, & iuuanda pessariis atrahentibus, & cucurbitulis apposis in coxis, aut aliis remediis, præscriptis cap. de mensibus retentis. Pessaria ex benedicta & aliis flatus discutientibus sunt valde ex vsu, & constrictio ventris per fascias. Cataplasma, emplastra, & inunctiones præscriptæ sunt ex vsu, supra ventrem inferiorem apposita. Fiant autem cataplasmata efficacissima ex stercore ouis, vel vaccæ, vel capræ, additis quibusdam flatus discutientibus, vt,

R. stercore vaccæ lb. j. cymini ʒ. ij. seminis apij, petro. an. ʒ. iij. mell. cocti parum, vini mal. q. s. misce, fiat cataplas. applicetur supra partem inferiorem ventris. Quod si suffocationem vteri faciat, succurrendum erit remediis

præscriptis cap. sequenti. Absoluta mensium purgatione optimum erit iniicere clysteres, qui fiebant ad sedationem doloris colici, ex vino hippocr. vel maluat. & oleis discutientibus flatus, vt ex decocto seminũ cal. ma. Erit etiam vtilissimum dare parum de confectiõne aro. ros. vel de confect. cinamo. vel tabulam vnã confect. diagal. & decoquere pip. in eius iusculis, & alia, quæ dicta sunt, in colico dolore à flatibus. Si fiat à balneo, eodem modo curare oportet discutiendo flatus topicis remediis præscript. Quod si opus esset aliqua euacuatione ob cacochymiam, vel cruditatem ventriculi, dentur pil. de aro. vel de hiera simpl. In omnibus his causis maximè conferunt pulueres flatus discutientes, & resiccantes, si post earum assumptionem, parum vini maluat. bibatur. Sumendi autem ante pastum potius, quàm post. Idem cucurbitula magna cum multo igne (facta prius euacuatione recrementorum alui per clysterem aut pil. aut aliter) si non adsit suffocatio vteri, supra umbilicum adhibita plurimùm prodest. Quod si suffocatio adesset, admoveatur inguinibus cum multo igne, vt & reuocetur, & flatus absumentur.

De vteri suffocatione. CAP. LXIX.

Vteri suffocatio fit ob eius dilatationẽ, aut inflationem, quæ intestina & ventriculum comprimendo, septum transuersum cõprimit, & sic coarctat, vt dilatari non possit. Est enim præcipuum liberæ respirationis instrumentum. Ob id mulieres, quæ vteri suffocationem patiuntur, quasi semimortuæ, audiunt quidem & vident aliquæ, sed nõ possunt loqui, quia videlicet materia non trahitur, aut extrã mittitur sufficiens, vocem, aer, qui trahitur inspiratione, & reiicitur expiratione ob dilatationem & compressionem thoracis. Hæc affectio magnam affinitatem habet cum syncope, catalepsi, apoplexia, & epilepsia, ita vt quandoq; epilepsiam faciat. Conuenit cum his affectibus, quod repente obrumescant, & cadant, aut non possint consistere. Dissidet à syncope, pulsu. Nam in syncope & animi defectu pulsus cessat: in suffocatione vteri, pulsus remanet, sed exiguus, rarus, & languidus. In syncope sudor apparet frigidus, & color pallidus admodum est similis colori mortui: in suffocatione

rione pallidæ redduntur, sed minus. Differunt etiã pro-
 pter causas antegressas, & antecedentes. Soler enim suf-
 focatio vteri prouenire, post largam mensiũ euacuatio-
 nẽ, quia aere repletur vter⁹, vel ob seminis putrefactio-
 nẽ, & retentionem in vtero. quia cum putrescit, eleuan-
 tur multi fumi, qui postea distendunt vterum. In vtero
 dixi semen putrescere. Nam in vasis spermaticis nõ pu-
 trescit, sed conseruatur, vel absimitur ad nutritionem
 vasorum, vel quando est in maiori quantitate, facultas
 expultrix in vterũ reicit inter somniãdum. Neque valet
 eorum ratio, qui dicunt sanguinem putrescere in venis,
 ergo & semẽ putrescere posse in vasis spermaticis. Non
 enim similia sunt. Sanguis enim putret, quia minus co-
 ctus est, & plus habet humiditatis excrementosæ & re-
 crementorum. Semen autem coctum est perfectẽ & assi-
 milatum, & ab excrementis repurgatum ac redundans,
 benignũ dicitur ob quantitatem, non qualitatem. Quod
 autem non permisceatur semini virili, & à vulua non al-
 teretur ad conceptum, putrescit, cum etiam ob alia re-
 crementa in vtero collecta. Ergo quibus semen defluxit
 in vteri cavitatẽ, & in ea retinetur, vt viduis, quæ defe-
 ctu coitus os interius vteri clausum habent, frequenter
 fit suffocatio vteri. Argumento est, quod viduæ difficul-
 ter curentur ab accessione, & iis recurrit frequenter, nisi
 pello, aut alia ratione, aut medicamento alio, reiciatur
 semen putrefactum. Fit etiam suffocatio ob gratos odo-
 res naribus attractos, ad quos vterus natura mouetur.
 Et in hoc differt à syncope, quod odores grati syncopẽ
 potius sedent recreando spiritus. His suffocantur mu-
 lieres, nisi parte inferiore adhibeantur. Differt a catale-
 psi, quod qui catalepsi siue comprehensionem patiun-
 tur, quasi rigidi & refrigerati remaneant, oculis apertis,
 non audiunt, neque vident. Differũt ab apoplexia quod
 partes resolutas non habeant, neque sensum amiserunt,
 quamuis obtusum habeant. Nam cum pili extrahuntur
 vel punguntur, sentiunt, & manu adhibita circa collum
 indicat se suffocari, quod in apoplexia non fit. Cum epi-
 lepsia conuenit, sed etiam differt quod nõ conuellantur
 partes, nisi quando suffocatio vteri epilepsiã facit. Tunc
 enim conuelluntur, & quandoque post accessionẽ insa-

*Suffoc. à
 gratis odo-
 ribus.*

Differẽtia

niunt, & aliena loquuntur, nec ad interrogata respondent, & tunc videtur potius mania per consensum vteri aut melancholia. Nam melancholia fit epilepsia, & contra: & melancholia fieri potest per consensum, ut mesenterij, splenis, & aliarum partium: unde hypochondriaca est dicta. Communis ratio curandę suffocationis vteri est, ut ad id quod magis urget, nempe ad suffocationem nos totos conuertamus, neglecta ad tempus causa. Statim itaque odores illos ingratos obiciemus, ne suffocentur nimia illa compressione pulmonum. Deinde pessaria & alia, quę causam materiale[m] auferunt prescribemus. Omnia foetida sunt efficacissima, olfacta, aut naribus admota, ut galbanum, assa foetida, opoponax, bitumen, petroleum, oleum ex gagate (quod non differt multum a petroleo. Nam & petroleum & gagate bitumin. concreti species sunt, quare stultum est emere, quod non magis efficax est vilior) odor lucernarum extinctarum, aut fumus foetidus, qualis eleuatur ex plumis vstis, aut corio. Item herbae foetidae, odore suo ingrato, vterum deorsum pellunt, ut ruta & similes. Fumus est face, quia multus eleuatur, etiam mulieres suffocatas reuocat. Et quemadmodum foetida sursum apposita, vterum deorsum propellunt, sic odorata vtero vel coxis alligata, deorsum trahunt. Ligaturę dolorificę in inferioribus partibus, cucurbitulae inguinibus affixae, vterum deorsum trahunt ob ligamenta in illis partibus affixa. Ob id non leuiter errant, qui supra vmbilicum cucurbitulas affigunt. Nam hoc est vterum sursum trahere, vel sursum elatum retinere. Postquam incipiunt loqui, & melius respirare, in vterum sunt mittenda pessaria trahentia, ut si semen aliquod corruptum sit, ex ea parte trahatur & euacuetur. Aut si aer vel spiritus quidam sit in ea parte conceptus, aut conclusus, is absumatur. Potissimum autem ex discutientibus flatus parantur, ut ex benedicta, hiera, cymino, semine rutae, & similibus. Tunc cucurbitula supra regionem vteri id est, inter os pubis & vmbilicum magna, & cum multo igne est apponenda. Postea emplastrum ceroneum supra eandem partem apponere oportet, non autem illud, quod pro matrice dicitur. Nam illud astringit, & materiam retinet. Ceroneum vero, quia fit ex lachrymis, dgerit, calfacit, & materiam absumit. Conficiendum est

Curatio.

Ab ingratis suffocantibus eleuatur.

Similitudo.

est emplastrū ad formā scuti, & in parte illa acuta apponenda sunt grana aliquot mosci. Nā pars illa acuta dum apponitur parti inferiori gratum odorē inspirat intra ipsum vterum, & vterū retrahit, aut retractū retinet. Conficiuntur etiam emplastra ex solo galbano & assā foetida. Si autem ob flatus multos in vtero collectos fiat suffocatio vteri, id apparebit ex inflatione ventris, & curādā erit eadē ratione, qua curari diximus inflationē vteri capite hoc præcedente, aut eadem methodo, & pharmacia, qua curauimus inflationem ventris, de qua proprio capite

De vteri procidentia.

C A P. LXX.

Vterus ligatur parte inferiore duobus fortissimis ligamentis, quæ illum retinent, ne superiores partes comprimat, & ne in dextram aut sinistram contorqueatur, meatum vel cornu, vel os interius dilatans. Quod si alterum ligamentorū relaxetur, aut contrahatur, trahitur ad partem dextram aut sinistram. Parte superiore vterus firmatur & ligatur vasis spermaticis, & venis in superiorem vteri partē peruenientibus. Et quia venæ & arteriæ faciliè rumperentur, nisi firmarentur firmissimo aliquo vinculo, natura peritoneo munivit, & venas & arterias, & totū vterum. Si peritoneum relaxetur, deuoluitur & decidit in partem inferiorem aliquibus magis, aliis minus. Nam quibusdam extrā apparere, aliis in collo sentitur. Quare quærendæ erunt causæ. Nam si prociderit ob relaxationem, quæ ab humiditate fit, curatur resiccantibus & astringentibus. Quod si multum procidit ob difficilem partum, aut propter petitonei rupturā, nō curatur. Procidit etiā ob relaxationē factam ex frequenti & diuturna mora in aquis. Noui pagum in Prouincia, in quo omnes ferè mulieres, vteri procidentia laborant, & tamen concipiunt. Erunt igitur curādæ eo ferè modo, quo & ani procidentia. Si ob humiditatem nimiam relaxatio fiat, exsiccandus est habitus corporis pil. & medicamentis, quæ faciliè aluum deiciunt & sine conatu. Nā dum magna contentione reddunt alui excrementa, procidit etiam vterus. Quare vomitio frequens multò esset ytilior, quia nō solum pituitam euacuaret, sed & vterum sursum attraheret. Nam siccat. Vterus in coitu deorsum mouetur, vt semen tanquam manu recipiat, sic pars ven-

Historia.

triculi inferior ad superiorem contrahitur, & mouetur, vt id quod in fundo est, expellat. Et dum ventriculus se se contrahit, & peritoneum distenditur, vterus, & quaecunque illi alligata sunt, quadam consecutione retrahuntur, sed antequam retrahatur, oportet intestina vacua esse recrementis, item vesicam partemque extra propendentem fouere decoctione sequenti.

℞. cortic. pini ʒ. ij. cortic. thur. ʒ. β. cortic. querc. ʒ. iiij. beto. hederæ. absyn. an. M. j. ros. rub. balauft. flo. stech. an. p. j. fiat decoctio in aqua ferrata, & vino astringente. Cū decoctione foueatur pars, si appareat: vel immittatur syringa, vel alio instrumēto in partem interiorem vteri. Deinde pessario aut baculo pannis inuoluto, leuiter & suauiter suo loco reponatur. Quod si odores foetidos in summitate pessī aut baculi inuoluti posueris, & odorata naribus, mouebitur facilius, & retrahetur in partem interiorem. Retractione facta vtēdum est fumigio, quod partem resiccabit, & ad superiora eleuabit sic.

℞. musci arborum, siue vsnæ in clibano exsiccatae, & collectae in quercu, vel ilice M. ij. absynth. ʒ. iiij. ros. rub. ʒ. j. cortic. thur. cortic. pini an. ʒ. j. β. garyoph. ladani puri & hypocist. an. ʒ. j. c. rripig. rub. & galbani, assæ foetidae an. ʒ. ij. excipiantur terebinth. & fiant tro. magni, & per embotum magnum fumum recipiat, vel canali in vterum deducatur, ipsa in lectum decumbente. Nam postquam vterus repositus est suo loco, quiescendum est, in dorsumque recumbendum partibus pudendis altius collocatis. Emplastra, cataplasmata, constringentia & resiccantia multum supra regionem vteri, & renes ponenda, vt

℞. vsnæ M. ij. foliorum myrth. vel lentisci, vel summitatum rubi, vel quercus, vel pyri agrestis M. j. cortic. quercus mali grana. an. ʒ. iiij. gallarum, spongiæ bedegaris, bistortæ & quinque folij an. ʒ. iiij. centaurij minoris, ros. rub. flor. anth. & stech. saluæ an. p. j. fiat decoctio in aqua cisternæ, & aceto, qua foueatur pars cum spongiis nouis serò & manè, addendo die quinto vel sexto fomentationis, salis aluminis, & vitrioli an. ʒ. j. Cū cessabis à foru, accipe residentiam decoctionis & pone in sacco, & applica supra renes & ventrem, quibus addere oportet poli-

poligoni & herniarie an. M. ij. Hunc fotum continuare oportet ad 40. dies. postea emplastra ex astringentibus continuè gestare. Emplastra erunt hæc pro matrice, de pelle arietina, & de mastice, addendo spongiæ bedegaris, & rad. bistortæ, & pulueris herniarie an. 3. j. in 3. iij. emplastri. Et frequenter pars est fouenda vteri interior foto prædicto. Aliquando pars vna vteri relaxatur, quæ dicitur mitra, vulvò (*la landie*) & extra vterum procidit quod semel vidi, & sic curatum fuit malum.

℞. radic. bistortæ & narcisci an. ℥b. j. fol. hederæ M. iij. summitatum myrthi, consolidi, absynthij, plantag. costi, ladani, poligoni, herniarie an. M. ij. ros. siccarum, flor. anth. & stech. an. p. ij. matric. & arthem. an. M. j. fiat decoctio pro balneo. In ultimo adde aluminis ℥b. j. salis communis ℥b. ℥. Radices contundantur, postea ad formā cataplasmati reducantur & applicentur parti affectæ. Quod si ob tensionem ligamentorum inferiorum decidat vterus, non erit inutile, inguinibus apponere vnguenta relaxantia, quale est vnguentum de apidibus vel resumpt. vel dialth. dissoluta portiuncula galbani in his & assæ foetidæ, vt partes relaxentur, & foetore vnguenti vterus sursum retineatur. Dum hæc peraguntur, decumbendum est & sobriè edendum. Abstinentum à iusculis, nisi cum aliis proritanda erit, quia & propter decubitū, & vsum astringentium constringitur. Quare huic symptomati erit occurrendum cassia vel prunis, vel clystere detergente, & proritante leuiter facultatem. Neque sunt apponendæ malux, aut aliæ emollientes herbe, ne pars relaxetur. Sufficit herbam merc. & ciclæ in decoctione ponere betonicam vel arthem. vel absynth. Neq; oleum ponendum est. Nam si astringat, actionem clysteris impedit: si emolliat, partem lædet. Quæ mobrem satius erit citra oleū parare. Vtatur aqua cisternæ, vel ferrata cum vino. Nos sic imperamus tenuem victum, ne multa recrementa in intestinis colligant. Post curationem, abstinant à nimio coitu, saltatione, clamore. Quod si his remediis non curabitur, non est curabilis.

De vteri scissuris & condylomatibus. CAP. LXXI.

Fluir in vtero ragadæ, & condylomata, & hæc aliquando simul, aliquando seorsim. Ragades propriè

sunt fissuræ quæ fiunt in collo vteri, recto intestino, & labiis. Fiunt autem scissuræ ob ariditatem, vel ob condylomatum inflationem, & inflammationem. Condylomata sunt velut hypofarcoses, quæ in illis partibus fiunt post aliquam exulcerationem, & videntur esse reduplicatæ & complicatæ. Curatur verò primum condylomata, deinde scissuræ, si simul fiant, vt fiunt magna ex parte, & quia condyloma est hypofarcosis, siue carnis additio, ablationem sui indicat, tanquam aliquid redundans à toto genere præter naturam. Sed quia condylomata sunt in vna tantum parte, veluti verrucæ pendentes, filo ligantur, & sic alimento destitutæ decidunt, vel abscinduntur nouacula. Sanguis sinendus est aliqua ex parte fluere, vt pars leuetur sanguine crasso, attracto, ex quo fiunt condylomata. Cum autem fiunt condylomata in circuitu anitotius, eminentiora & maiora sunt auferenda chirurgia: minora verò, si ferre possunt, medicamentis faciliè resiccantibus, cum quadâ astringitione. Vel si hæc non proficiant, arrodentibus sunt auferenda. Vnguenta huic rei opportuna erunt, ægyptiacum apostolorumque, quia arroduunt, detergentque. Emplastrum etiam diacalcitidos dissolutum in ol. ros. reduplicata quantitate calcitidis. Pulueres autem videntur magis conuenire ad exiccationem, qui parantur ex resiccantibus, arrodentibus & constringentibus: quia hoc caro flaccida exiccanda & constringenda est. Quod si dura esset, & ad naturam durarum verrucarum accederet, abscissione est potius curanda, vel emollientibus & postea detergentibus exiccanda. vt facere solemus in scirrho. Magna ex parte caro illa est fungosa, & vrticis marinis similis hæc affectio. Ob eam causam pulueres actu sicci, & facultate meliores sunt, vt

℞. sabinae exiccatae & tenuissimè pul. ʒ. j. hermodactylorum & myrtill. vstorum an. ʒ. iij. calchit. aluminis ana ij. auripig. rub. ʒ. j. reducantur in tenuissimum puluerem, qui supra partem adhibeantur. His pulueribus non minus quam vtile est, vt in colyriis admiscere parum rad. mandragoræ, aut opij, ob sensum partis, quæ medicamenta exiccantia cum morsu, aut arrodentia difficilè fert. Pul. mercurij præcipitati idem præstare poterit, vel sublimatum in aqua rosarum, & plantaginis decoctum. Infundendo

do elichnia, & pānum lineum in ea decoctione, & supra partem adhibendo. Non esset inutile (si magna sanguinis copia appareat) prius mittere sanguinem è brachio, deinde è poplite, aut cucurbitulas in coxis, vel in natibus applicare, cum profunda scarificatione in natibus, & leui in coxis ad sanguinis deriuationem, in ea parte redundantis. Vomitus etiam conuenientissimus est, & purgatio leuis, aut lenitio ventris. Si autem rhagadiæ, quæ sunt ob nimiam vteri siccitatem, aut propter humores acres, curandæ sunt aliis medicamentis opportunis, vt si fiant ab humoribus acerbis, purgandæ sunt medicamentis præscriptis cap. de fluore muliebri à bile, & optima victus ratione acrimoniam temperare, & illas humectare cibo & potu, & illos fructus edere, qui acrimoniam humorum frangunt, vt pyra, poma, iuscula cum lactucis & plantagine. Supra partem vnguentum rescicans, vt in vlceribus applicandum, quale hoc.

R. vnguenti pompholig. ʒ. j. aluminis ʒ. j. misce, vtatur, vel sic.

R. ol. myrt. & ros. ana ʒ. iij. succi plantag. & consolidæ ana ʒ. ij. litharg. ʒ. j. cerus lotæ ʒ. ʒ. plumbi vsti & antimon. boli armeni ana ʒ. j. triturentur subtilissimè, & reducantur ad formam nutriti. Vel decoquantur succi in oleis ad succorum consumptionem, postea adde ceræ q. f. & pulueres, & fiat vnguentum. Emplastrum diuinum dissolutum in ol. ros. efficacissimum est. Item vnguentum cydonium, addendo alcës, myrrhæ, thur, mastich. ana ʒ. ij. balaustiorum ʒ. ʒ. ol. q. f. ducantur diu in mortario plumbeo, vtantur donec integrè curatæ sint. Rhagadiæ facilius curantur, quàm condylomata, si multa fuerint: si pauca, abscissione facilius curantur, quàm rhagadiæ. Dum curantur, abstineant à coitu, & pars diligentissimè obtegatur, ne ab aëre frigido lædatur. Eadem ratione curantur, quæ fiunt in ano, nisi quòd abscissio magis est periculosa, ob venas hæmorrhoidas, quæ eo etiam tempore distenduntur, & inflantur, & ferè semper comitantur hæmorrhoidas.

De Vteri inflammatione. CAP. LXXII.

MUltum inflammationibus obnoxius est vterus. Fit autem, cum multus sanguis fluit ad mensiū purga-

tiones, vel post partum, retentus parit inflammationem. Retinetur autem propter aëris circumstantis frigus, aut propter frequentem cucurbitularum appositionem supra vterum. Hanc inflammationē sequitur febris, vt in aliis inflammationibus internis, propter maximum consensum cum corde per arterias. Dolor in inguinibus & coxis sentitur, nonnunquam in lateribus, & costis, quandoque ad clauiculā vsq; protenditur. Et quia ob septi transuersi compressionem, si magna est, sequitur vteri suffocatio: si minor, magna difficultas respirandi, minus exercitati Medici pleuritidem existimāt, ignorātes consensum vteri cum septo trāsuerso, & cum clauicula. Integitur enim peritoneo, & eo solo firmatur, ac retinetur à parte superiore. Quare si distēdatur affatim, & in maiorem molem accrescat, distēditur peritoneum, & hypoficota, ob illam vñionem, quæ fit in septo transuerso ex peritoneo & hypoficota. Capitis dolor potissimū in parte capitis posteriore cernitur, retinentur excrementa alui, & vesicæ. Curatur autē sanguinis missione & topicis remediis Sanguis mittendus ē brachio, deinde ē vena poplitis, vel cucurbitæ cum scarificatione in coxis adhibendæ. Cataplasmata vel inunctiones in principio repellentes, & iniectiones. Quia iniectiones citius parantur, quàm cataplasmata, primū ex oleo rosarum & myrthi, & pauco aceto parandæ sunt. Quod si succum aliquem repellentem his addere volueris, erit efficacius medicamentum, vt succum plantaginis, summitatum vitis, semperuiui, aut aliarum herbarum frigidarum & astringentium. Aquæ loco faccorum, vel cum succis vsurpantur. Vel fiat cataplasma, quod à Galeno imperatum est libro secundo ad Glauconem ad inflammationem, quod paratur ex succo semperuiui, sappa, vino auitero, farina hordei, & balauistiis, vel ex cortice mali granati. Vnguentum post illa repellentia apponēdum, quia & repellit & digerit: aut fiat tale cataplasma, quod dolorem sedabit & digeret.

℞. radic. alch. mal. violatum ana M. j. flor. viol. chamomil. melil. an. p. j. fiat decoctio, contundantur herbæ, & per cribrum transmittantur, semper aliquid decoctionis addendo his, adde farinæ hordei q. j. seminis lini q. s. ol. ros. q. j. misce, fiat cataplasma. Fit etiam cataplasma,

ma, ex mica panis cum lacte cocti, & ol. chamo. In partem internā iniiciuntur primò quædam leuiter repellētia, vt aqua plantaginis, solatri, deinde quia aliquid resudat à parte inflammata, his admiscetur decoctum hordei vel parū sacch. ros. tab. & infundūtur per metēchytam. Sic & serum lactis ad deterfionē, lac recens mulsū ad doloris sedationem. Postquam constiterit defluxio, & dolor vtcunque remissus, quæ potentius digerunt, supra partem adhibeantur, vt cataplasmati præscripto, addatur farina fabarum, vel fiat ex herbis vtero destinatis.

R. rad. liliorum & bismal. ana q. j. mal. M. j. arthem. vel matric. M. β. florum. cham. melil. anet. ana p. j. fiat decoctio, & vt supra dictum est, contundantur, quibus postea adde farinæ fabarum & hordei ana q. j. pingue. porci 3. iij. butyr. recentis 3. ij. ol. chamo. & liliorum ana 3. j. β. misce, fiat cataplasma. Tunc magis detergentia admisceantur, quia id quod resudat à parte affecta si retineatur, maiorem inflammationem excitat. Et quia hæc pars faciliè scirrhum patitur (quod caro eius densa sit, & defluxiones acceptas pertinacissimè seruet) diutius non est vtendum repellētibus, ne ob cōgelationem scirrhus fiat: & in declinatione malactica addenda sunt, vt emolliatur, & crassum discutiatur, & euacuetur. Post hæc remedia, emplastra digerentia ex lachrymis, multum laudanda sunt, vt quicquid est in parte, discutiant, & euacuent. Si aliud retineatur, erit molliēda clysteribus. Medicamenta laxantia, quæ attrahuntur, danda nō sunt, vt quæ ad partem affectam magis trahant. Sed syr. viol. ex multis infusionibus, cass. manna, & alia aluum leniētia citra vllam attractionem multum profunt.

De Scirri scirrho. CAP. LXXIII.

Scirrus inflammationes malè curatas sequitur, vel sintempestiuum repellentium vsus, vel constringentium in principio, vel in fine fortioribus remediis discutiēdo, quod tenue est, & quod crassum siccādo. Curādus erit scirrhus præscriptis medicamētis pro declinatione inflammationis vteri. Et quia scirrhus fit sine febre, possumus vti fortioribus ad partem emolliendam, vt,
R. rad. liliorum, bismal. & cucum. agrestis ana q. j. mal. M. j. arthem. vel neptæ tertiam partem M. j. sic. p.

xx. seminis lini foenug. an. ʒ. ij. flor. chamo. melil. ana p. j. fiat decoctio in aqua & ol. dulci, & decoctione foueatur regio vteri. Ex residentia pista & transmissa fiat catapl. quod applicetur supra partem post folum, deinde vtatur sequenti vnguento.

R. butyr. recent. axung. porci an. ʒ. ij. ping. galli. anatis & anseris an. ʒ. j. ʒ. ol. amygd. dul. & ol. lilior. an. ʒ. iij. mucil. seminis foenug. extractæ cum vino albo ʒ. j. terebin. & ceræ q. s. fiat linimentum, quo vtatur post vsum folum. Et post vsum istius vnguenti rursus redeat ad folum, & iterum ad vnguentum, vel fiat sequens.

R. opop. bdell. ammon. an. ʒ. j. styrac. myrrhæ an. ʒ. ʒ. propoleos vēræ ʒ. j. radi. irid. ʒ. j. croci ʒ. ʒ. dis. lachrymæ in ol. lilior. & amygd. & vino mal. & depprentur, quibus adde parum terebin. & ceræ, fiat vnguentum. Emplastrum diachylon, ex gummi & ireatum partem illam induratum emolliunt. Huius partis emolliuionem plurimum iuuat folum ex eadem decoctione, vel oleorum de lilio, amygd. de myrrha, de styrace. Hæc enim partem contingunt. Vtilissimum etiam est illis encathismate vti, ex decocto folum præscripti, & diutius in illo sedere. Iniectione etiam clysterum emollientium & relaxantium ex ol. plurimum conferet. In declinatione herbæ digerentes poni debent in encathismate maiore quantitate, quales sunt nepetæ, pulegium vtrumque, arthem. calament. flor. anth. stech. sambuci, quia hæ herbæ decoctæ in multa aqua minus siccant, & digerunt sufficienter. Radices cucum. agrest. & brion. in eodem encathis. addi possunt. Scirrhus enim fit à materia congelata, quam ob causam medicamenta calida, & dissoluentia sunt ex vso permixtis quibusdam humidis, & malactis, ne id, quod tenue est, discutatur, & crassum remaneat. Radix mandrag. in vino & oleo amygdal. & axungia porci decocta & contusa partes induratas emolliat, maxime si pauca quantitas opop. cum ea misceatur.

De Steri canero. CAP. LXXIIII.

IN partibus, quæ scirrhum patiuntur, si materia vritur, in cancrum vertitur scirrhus ob materiæ similitudinem. Fiunt enim isti duo affectus à materia melancholica, cancer ab adusta, scirrhus à crassa frigida nondum

dum adusta, & à pituita crassa. Cognoscimus scirrhum mutatum in cancerum, si cum prius esset sine dolore, ob materię frigiditatem siccitatēque, dolorem sentiat ob caliditatē, & humoris acrimoniam facientis cācrum. Sentitur durities in vtero, qualis erit in scirrho & citra magnam vteri molem. Cancer autem duplex est, vlceratus & non vlceratus. Non vlceratus magna ex parte fit in corpore vteri: Vlceratus in collo, vel in orificio interiori. Vterque incurabilis est, quia abscindi non potest. Cum incipit, negligitur, quia magnam molestiam non adfert, quo tempore posset prohiberi incrementum medicamentis & optimavictus ratione. Satis à nobis fit, si prohibeamus non vlcerati exulcerationem, & vlcerati incrementum. Prohibemus canceri generationem sanguinis missione è brachio, vel ex poplite, apertione hæmorrhoidarum, vt auertamus in partē proximiorē melancholicum sanguinem: frequenti purgatione, quæ non multum calfaciat, & euacuet atram bilem, aut crassam pituitam, medicamenta, quæ capite de fluore muliebri à melancholia dicta sunt, erunt valde opportuna. Extrinsecus & intrinsecus frigidis medicamentis & astringentibus eius incrementum prohiberi potest, vt ol. ros. omph. myrrh. vel succis solatri, & plantag. cum pauco aceto. Permiscentur succi cum oleis, & fiunt embrocationes, vel vnguenta, vel excipiuntur farina, & applicantur supra partem vnguēti modo. Aquæ vel succi herbarum prædictarum iniiciuntur. Si autē exulceratio fuerit, metallicis est vtendum, & vnguento diapompholigos, emplastro de cerusa, emplastro nigro, & quæcūq; parata sunt ex antimonio, plumbo, cerusa, tuthia vel pompholige: & vt breuiter dicam, quæcūque citra morsum refrigerant, & exsiccant. Quare neque lachrymæ, neque alia medicamenta aut attrahētia, aut digerentia, admiscēda sunt, vt thus, myrrha, galbanum, assa fœtida, cinamomum, spica & huiusmodi. Sunt diligenter leuiganda, vt collyria, deinde abluenda diligentissimè, & ex illis vnguenta paranda cum succis, ol. & cera alba, vel Ieuo hirci. Nam aliæ axungię putrefaciunt. Oleum ouorum frequenter ductum & agitatum in mortario plumbeo, donec spissius reddatur, & plumbi colorem contra-

xerit, efficacissimum est medicamentum. Cinis cancrorum fluuiatilium locus in aqua solani permixta pul. ex plumbo, vel antimonio, vlcera tum cancrum curare dicitur, & creditur. Quod si non curat, saltem mitigat, exsiccat, & depascētem cohibet. Nam difficillimum est partem iam indurata[m] emollire, & pristinae sanitati restituere. Sed metallica omnia partim repellēdo, partim digerendo citra morsum morbum leniunt. Hæc est cura, quam vocant palliatuam.

De Vteri Vlcerebus.

C A P. LXXV.

Vlcera in vtero sunt post alios morbos, vt post inflammationem, vel abscessum, vel post fluxus muliebres acres, vt post medicamenta apposita acria, vt sabina[m], semen nigellæ, & alia fortiora. Fiunt & vlcera ob contagionem morbi Italici, aut propter recrementa retenta, & putrefacta circa pterygia vteri. Deprehēduntur facile à dolore, recrementis, & pure reiecto. Curantur ægrè, quia pars illa multa recrementa colligit, quæ vlceris consolidationem retardant. Prius distinguere oportet vlceris naturam, quàm deprehendere poterimus ex causis, quæ præcesserunt: ex victus ratione, & totius corporis natura, num etiam à morbo Italico factum fuerit. Quæ post abscessus frigidos fiunt, solida esse solent: quæ post inflammationem à sanguine, & quæ post erysipelas, virulenta & depascentia fiunt, si post scirrhum, gangrenosa: quæ post morbum Italicum, disepulorica, & chyronia. Curantur autem hæc vlcera corpus euacuando, detergendo, iniectionibus, exsiccando vnguentis, vel fumigiis. Multum autem resiccare oportet, tã ob partis naturam siccam, quàm ob recrementa, quibus pars illa abundat. Medicamenta detergentia vlcera in quibus acrimonia, puncturæque sentiuntur, sine morfu esse debent. Optimum est in illis serũ lactis iniicere cū pauco sacch. vel melle ros. vel decocto hordei & ros. cū melle ros. vel cum syr. de ros. siccis, vel decoctum lentium, vel plātag. foliorum myrrh. oleæ vel oleastri, ceterach, agrimoniz, aut aliarum herbarum amararũ, sine magna calfactione. Quare absynth. & similes herbæ calfacientes, hac in causa conuenire non possunt. In vlcerebus autem fordidis & pituitosis, iniectiones fieri possunt ex decoctione

Etione apij, absynthij, centaurij minoris, fabarum, lupinorum, orobi, quæ magis detergent. In his parum ægyptiaci dissoluimus, vel vnguenti apost. in principio, cum vlcus obductum est multo pure & carne putrida. Sed posteaquam illa castigata, vel ablata sunt, mitioribus medicamentis agendum est ob sensum partis. Vlcere sufficienter deterso prædictis iniectionibus dissoluimus myrrham, aloem, iridem, & alia sarcotica, tro. albos Rasis, deum ad vnguenta partem siccantia est veniendum, vt ad vnguentum pompholig. de cerusa, de plumbo, & aliis metallicis insigniter resiccantibus. Si medicamentis non possunt euinci, tentandum erit fumigio partem resicare. Faciendum autem, id est, ex sarcoticis, & fuliginem generantibus, vt lachrymis, resinisque, aliis quibusdam permixtis, vt sandaraca, auripig. cortice thuris, ladano, hypocistide, vt

R. thur. mastic. ladani puri, myrrhæ styrac. rub. ana 3. iij. marchaf. & lapidis piritis, auripig. rub. ana 3. iij. excipiantur terebint. & fiat fumigium. Si vlcus post morbum Italicum fuerit factum, vel à morbo Italico dependeat, addenda erit 3. j. cinabrij, & per embolū fumus recipiendus. Quod si mulier fetorem ferre non possit, optimum erit parare aliud magis odoratum hoc modo.

R. aliptæ mos. & gallæ mosca. ana 3. j. beniouin. styrac. ladani puri ana 3. iij. mastic. thur. & cort. eiusdem, an. 3. β. cum musc. gum. trag. fiant troc. quibus vtatur, vt dictum est. Si autem à morbo Italico facta fuerint vlcera, vtile erit malam illam morbi qualitatē, in toto corpore euincere & auferre prouocando sudorem, vel stuphis, vel iniectionibus, vel vsu gaiaci, vel similibus, & vnguentis prædictis argentum viuum addere, & fumigio parato excinabari vii. In omnibus his vlcerebus vsus stupharum est vtilissimus, quia corpus vniuersum exiccat.

De contusione testium. CAP. LXXVI.

Ex contusione sæpè testes intumescunt. Hi autem contusi subinde exsiccantur, oxycrato, vel oxyrihodo profundantur. Si verò adsit tumor cum dolore, & sine inflammatione, sufficiet cataplasma ex farina fab. & lacte confect. ad doloris sedationem & discussionem. Si autem dolore sedato, tumor remanserit, parandum est

cataplasma ex farina fabarum & fœnug. decoctis in oxy-
mel. Si verò ex contusione inflammatio oboriatur, cure-
tur, vt supra monstratum est.

De inflammatione testium & scroti. CAP. LXXVII.

Inflammatio testium subito fit ob frequētes venas ibi-
dem existentes, & ob situm in parte inferiore. Fit autē
ab ictu vel vlcere, vel ob medicamenta acria ad curatio-
nem frigidi affectus adhibita, vel ob immissam fistulam,
vel ob aliud quoduis instrumentum. Itaque huic inflam-
mationi confert missio sanguinis. Quare sanguis detra-
hendus est ē brachio maiori copia, si vires ferant. Sequē-
ti die affigendæ sunt cucurbitulæ coxis cum scarificatio-
ne ad deriuationem. Si verò defluxio non constiterit, re-
pellentibus est vtendum, vt quæ ex succis herbarum fri-
gidarum, & astringentibus, vel earundem aquis paran-
tur, addito aceti modico, vicinis partibus admonenda
sunt. Iis autem addere possumus repellentia crassa, vt
bolum arm. cortic. mali gran. & similia, vt melius fluxio
inhibeatur, postea cataplasmatibus ex repellentibus & dis-
cutientibus confectis vtī, quæ parantur ex succis semper-
uiui, vel plantaginis, vel solani, & farina hordei, cortice
mali gran. rosæ, & huiusmodi. Fiat igitur cataplasma in
sequenti modo.

R. suc. plant. vel solani ℥. j. farin. hord. ℥. β. ros. rub.
cort. maligra. an. ℥. j. ol. ros. ℥. iij. fiat catapl. Solanum &
plantago, quia ob frigiditatem repellunt, & quodammo-
do siccant, magis conueniunt. Lithargyrum nutritum in
ol. ros. & aceto vel suc. plantag. digerit, & refrigerat. Si do-
lor oboriatur, mitigandus est iis quæ maiorem vim rela-
xandi non habent. Pars enim ob copiam humoris, vel
recrementorum facile putrescit. Fiat igitur sic.

R. mal. viol. solani ana M. j. surf. p. ij. decoq. in sapa,
& parti applicentur. Si verò mitigandus est dolor inflam-
mationis vergentis ad suppurationem, humidioribus vt-
tendum.

R. mal. rad. bismal. ana M. j. farin. frum. q. j. farinæ fœ-
nug. & semi. lini an. ℥. ij. olei viol. ping. porci an. q. j. de-
coq. & contusa per cribrum transmittantur, & fiat cata-
plaf. Si hisce remediis parū profeceris, cataplas. ex fo-
liis hiosquiami vtendum erit. Decoquantur ergo folia
hios-

hiosquiami sub cinerib. & contusa excipiantur axungia porci reducanturque ad formam cataplas. Dolorem sedat, & inflammationem maturat. Fit autem cataplasma sedans dolorem ex farina hord. & lacte. Si tumor resolvatur, quod cognoscitur cum minuitur, fiat cataplas. ex farina orizæ, vel cinerum, vel orobi cu oxymel. vel sapa vel vino, & applicetur, vel emplastrum ex chalcit. reductum in formam cerati cum ol. antiquo vel aneth. vel rutac. vel irino. Si vero discuti non possit, sed suppuretur, ubi suppuratus fuerit tunc cuti ferro discissa, pus excernatur, vlcerique, vt in omnibus aliis sordidis moris est, medeatur. Quod si durities adsit, ea quoque est emollienda sensim malacticis. Difficile emolliuntur scirrhi testium, & carnosæ hernia. Pars enim interna laxa est, ob id facile recipit excrementa & recepta retinet inuolucris illis, quibus teste integuntur. Ea autem materia congelatione indurata maximo cum negotio emolliiri potest, & euacuari. Emolliunt fetus ex oleis amygd. dul. lil. olei dulci decoctis, vel in sapa, butyro recenti, vel axung. porci non antiqua exceptis. Post emollientium vsum digerentibus vti conuenit. Digerunt ol. amygd. amar. irin. antiq. dulce, rutac. aneth. Possumus adiuuere in eundem vsum emplastrum ceroneum, emplastrum filij Zachariæ Vnguenta dialtheæ, & martiatum, si cum oleo amygdal. & viol. applicentur, conuenire poterunt. Quod si horum omnium vstu longo tumor induratus emolliiri nō possit, tentandū est sequens cataplasma mirabile.

Rad. mandrag. recentis lb. ss. hiosquiami & alchec. ana M. j. decoq. in sapa, & per cribrum simul contusa mittantur, quibus adde rad. panac. ʒ. ij. Opoponacis loco rad. panac. quem in decoctione macerare, liqua e, deinde miscere oportet, & fiat ad formam emplastri, addendo ceræ parum, vel ad formam cataplas. addēdo ltyrac. ʒ. ss. Si post huius cataplas. vsum durus tumor permanferit, de eius cura desperandum, nisi per abscissionem, vel castrationem testis auferatur.

De hermis. CAP. LXXVIII.

Hernia seu rames Latinis, cele Græcis, rupturæ & crepatura à Barbaris dicitur; cele nomen est commune

inflammationibus arteriæ, vmbilici, scroti, & inguinis, sed varias propter affectiones materiæ, siue partis accipit appellationes. Si enim in aspera arteria fiat tumor, vt plerisque accidit ex potu aquæ ex liquefactis niuibz, quæ Alpinis & aliis montanis in vsu est, *Gruncocoele* Græcis, gutturis hernia Gallis dicitur. Quando verò vmbilici ligatura laxatur, *homphacoele* Græcis dicitur. Quòd si intestinum supra inguina exeat, *Bubonocoelem* Græci, *Ramicem* inguinis Latini appellant. Mulieribus sæpè accidit cùm laxatur foramen illud, per quod ligamentū vteri ad internam inguinis partē descendit, aut dirumpitur peritoneum, propter fœtus magnitudinē, aut multitudinem, vt in his, quæ duos aut tres pariunt, accidit aliquando. Cùm verò intestinum in scrotum infrà delapsū est, intestini ramex, Græcè, *entorocoele*, dicitur. Proinde si rupto peritoneo, omentum duntaxat in scrotū descēderit, *epiplocele* Græcis, omēti ramex Latinis dicitur. Si verò flatus, vel aqua huius affectus sunt causæ, ab his nomen accipit hernia, vt si aquosus humor in parte aliqua corporis implicatus in scrotum colligitur, *hydrocele*, hernia aquosa dicitur. Talis hydropicis circa hydroceolim apparet. Quòd si flatus hunc affectum gignit, *pneumatocoele*, id est, hernia ventri, vel flatulenta vocatur. Sunt & aliæ duæ species, quarum vna *sarcocoele* Græcis, carnosæ hernia dicitur: Altera *kerfocoele*, id est, varicosa dicitur. Aliquando etiam complicantur hi affectus, vt aqua cum spiritu descendit, aut simul cum omento intestinum delabitur, & Græcis nomine composito dicitur *epiplocele*. Idē de aliis est iudicium, vtriusque appellationis nomina coniungentes. Distinguntur à ruptionibus relaxationes. Rupturæ enim in lateribus ilij fiunt post ictum, aut saltum vehementem corpus contorquendo, nec in his apparet magnus tumor in principio, sed progressu temporis. Magis enim ac magis peritoneum dirumpitur, & tumor immensæ magnitudinis, & in summa cute eminet, quòd, scilicet, intestina extra peritoneum dilabantur, & à sola cute sustineantur. Has consequitur dolor pungens, & quasi lacerans. Relaxationes autem tantum eueniunt circa foramen, per quod vasa, & muscoli cremasteres ad testes descendunt. Præterea distinguntur

tur ab inuicem relaxationes. In aliquibus magnus & inæqualis tumor: in aliquibus crescens & decrescens citra dolorem apparet. *Epiptocoele* dignoscitur à tumore paruo, qui magis in osse pubis fit, quàm in scroto. Tumor autem permanens est, nec minuitur, sed semper perseverat, siue ieiunet, siue huc & illuc corpus moueatur, aut quouis modo collocetur. Si verò retineatur spiritus non adeo increscit, tactu inæqualis, mollis & lubricus sentitur, *enterocoele* augetur vel minuitur ratione materiæ collectæ. Intestinum, ægro quiescente, aut resupinato, rursus retrahitur & in loco permanet, aliquando pars altera in scroto residet. Tumore, vel cibi satietate crescit, frigore contrahitur. Intestinum clamore relaxatur, scrotum relucet, & multum distentum apparet, & magis in vna, quàm in altera parte. Aliquando tantum discernuntur excrementa indurata. Cum autem remouetur intestinum, & ad inguen retruditur, sentitur flatulentum murmur. Species hæc est omnium periculosissima, potissimum si reduci non possit intestinum, & excrementa adeo sint indurata, vt excerni nequeant. Tunc enim per os redduntur, vt in iliaca passione. Ad horum autem euacuationem clysteres iniciendi non sunt. Nam distendunt, & grauant scrotum, & sæpissime reddi non possunt. *Sarcocoele* deprehenditur à tumore rotundo, oblongo, duro, formam testiculi referente, & qui longo tempore pedetentim increuit. Inter autem hanc speciem, & herniam, *entrocele* dictam, hoc discrimen intercedit, quod in *entrocele* tumor mollior & repete oboritur. *hydrocele* autem distinguitur, si vitium est, inter membranam erythroidem, & dactroidem, vel extrà. Quibus erythroides tunica humore distenta est testiculus rotundus apparet, & tensus ob aquosum humorem ibi collectum. Aut si humor in scroto sit coaceruatus, intumescit scrotum, nec vllæ rugæ apparêt, & splendet, vesicæ inflatæ quodammodo similis. Est enim tumor cum grauitate & cachexia, & iis notis à *pneumatocoele* distinguitur. In vtroque enim scrotum distenditur, & leuis est, in aquosa autem contrà.

Cæterum herniæ aliæ curantur, aliæ autem difficulter, aliæ verò nullam admittunt curationem, vt carnosa,

quæ si sit insignis, nullomodo potest curari, sed castratione testis auferendus est. *Kerſce* curationem item non admittit, verum non est moleſta, vt *epiplocele*. Omēti ramex difficile curari poteſt. Vix enim reperiri poteſt ob tenuitatem, & molliem omentum, & cedit impellenti, ſi reducatur. Conſtringenda erit pars laxa frigidis & conſtringentibus, quibus etiam vtimur in inteſtinorum ramice. In vtraque ſpecie imperanda eſt inedia, ſi multitudo recrementorum impediat, quò minus reponi poſſit aut omentum, aut inteſtinum. Quòd ſi vacuanda ſint recrementa in ramice omenti, inſiciatur clyſter. In inteſtinorū verò ramice alius blandè ſollicitetur. Si verò flatus, & tormina adſint, inunctiones ex ol. rutaceo circa vmbilicum factæ erunt ex vſu, & harum loco apponendus erit ſacculus ex millio, cumino, & ſole conſectus. Quòd ſi ob flatus reductioni minimè obtemperet inteſtinum, ſotu magis relaxante vtendum erit. Cruribus itaque elatis & diductis inteſtinum ſenſim reducatur, atque reductum ſtatim idoneis ligamentis, vel ſubligaculo retineatur, & ſuper ſubligaculum deterſa prius parte à fomentatione relaxante foueatur pars decoctio ſequēte cum ſpongia noua, calidiſſimè & frequenter, potiſſimum poſt inteſtini reductionem, donec pars quodammodo contrahi videatur. Huic autem decoctioni, ſi flatus ventrem, & alias partes diſtendant, addantur flatus diſcutientia ſine relaxatione. Paretur decoctio ſic.

R. rad. biſſort. & rad. pentaph. rubiæ ma. & chelidon. ma. an. q. ſ. rad. narcif. q. j. herniar. polig. & hippur an. M. j. cumini, naſturt. torrefacti ana ʒ. j. flor. ſtech. & anthosana p. j. flor. roriſ cētaurij min. an. p. ij. fiat decoctio in aqua & vino aſtringente, vel lixiuio, qua foueatur pars, & in principio calidiſſimè.

Post eius autem vſum admouenda ſunt contra rupturam emplaſtra, ſiue de pelle arietina, vel fiat tale.

R. maſſ. emplaſtra diaca. vel pro matric. vel comitiſſæ ʒ. ij. radic. biſſort. & narcifſiana ʒ. ſ. blattæ bizant. ſang. drac. ſarcocol. alumi. ana ʒ. iij. malaxentur omnia ſimul oleo cydo. & fiat emplaſtrum, quod in pelle arietis impoſitum admoveatur. Vel ſic.

R. maſſiſch. ſarcoco. ſang. drac. blattæ bizant. cortic. thur.

rhuraloes, boli arm. gypsi, galla. p. sid. an. 3. ij. Istiocol. & taurocollæ, diff. in aceto an. 3. ij. malaxentur & fiat emplastrum. Vel addendo picis deraſæ à nauibus 3. ij. colophonix 3. j. malaxentur cum ol. cydon. & reducantur ad formam cerati. Vel excipiantur decocto pellis arietinæ, vel bullitæ. Vel fiat decoctio ex fragmentis pellium prædictarum vel pergameni. Colæ enim satis reddunt, & eorum decoctû prædicto magis siccat. Sunt qui magnetem his vnguentis admiscunt, & limaturam calybis deuoranda dant, vt sic à magnete calybis trahatur, & per consequens intestina. Verùm illa mihi parum prodesse videntur, nec iuuare possunt, nisi siccando, si assumatur, vel premendo partem ob pondus, si ad moueantur Sic enim parte depressa intestinum descendens, nec in altum nec foras erumpere potest. Lithargyrum, scoria ferri, corallum, & alia grauià eadem ratione prodesse possunt. Quare his etiam vti poterimus. Dantur & potiones resiccantes & constringentes ad eundem affectum. Sed hæc parum meo iudicio profunt, nisi quia vniuersum corporis habitum siccant. In relaxatione autem constringentia: in fractura verò, desiccantia, constringentia & nervos consolidantia vsurpanda. Verùm quia peritoneum est in perpetuo motu, ob epigastrii & musculorum motionem, & adeo tenue est, vt ruptum adduci non possit. Vulneris autem labra nisi adducantur, nunquam coalescere potest vulnus. Quare hæc curatio videtur difficilis. Si quis tamen hanc tentare velit, vtatur sequentibus.

℞. radic. bistort. narcissi an. 3. j. radic. consol. ma. & mino. quinq. folij, & rub. ma. ana 3. ℞. hippuri. polyg. an M. j. ℞. sebesten N. x. dacty. pa. iij. myrob. cheb. indor. cirrinorum an. 3. j. seminis anisi & nasturt. ana 3. ij. flor. ros. anth. & cyper. an. p. j. fiat decoctio in vino & aqua, & in lb. ij. dissol. mell. ros. & sacch. an. partes æquales, fiat syrup. aromati. cum 3. ij. diagal. capiat manè reiectis recrementis quinque horis ante pastum, 3. iij. Ad idem pilulæ illæ de bdellio valēt, & ex conchiliis veneris, vel fiat opiata sequens.

℞. conf. ros. antiquæ, & symphitiana 3. j. conferuæ flor. saluie & acori vulgaris colatæ an. 3. ℞. tro. de carabe vel de spodio, vel de bolo 3. iij. blattæ bizantiæ vstæ &

lotæ in aqua caudæ equinæ ʒ. ij. cum syr. cydon. fiat opiata, capiat ad quantitatem nucis, superbibendo parum vini rubri. Pulueres rescicantes ex corall. rub. vsto priapo tauri vel cerui præscripti cap. de paralyfi sunt efficacissimi. Interea æger vtatur alimentis crassis viscosis, vel constringentibus.

Ad Aquosum ramicem, qui hydrocele dicitur.

CAP. LXXIX.

Hydrocele vel est aquæ intercutis symptoma, vel est affectus scroti. Si sit cum ventris tumore, danda est opera, vt aqua, quæ in peritoneo continetur, frequentibus euacuationibus absorbi possit. Frustra enim aquam in scroto contentam topicis remediis absorbere tentamus, non euacuato prius peritoneo. Quod si aqua in scroto collecta sit, facile ex totius scroti tumore & magnitudine dignosci poterit. Si in altero testiu, vel utroque tumor appareat, ab humore inter datatō & erytroidem collecto alter testium aut ambo tumeant. Ad eius autem humoris euacuationem fiat fons sequens.

R. lixiuij barbitonsoris lb. iij. in quibus decoque cumini ʒ. ij. ceterach, vel petroselini, apij an. ʒ. ss. salis lb. j. foueatur pars. Si imbecilliora videantur, adde sulphuris ʒ. ss. foueatur manè & sero, postea admoueatur sequens cataplasma.

R. sterco. capræ ʒ. iij. cochlearum contusarum cum testis ʒ. ij. sulphuris ʒ. j. misce, fiat cataplasma, applicetur, & sæpe remoueatur. Cæterum vti poteris remediis præscriptis cap. de ascite ad hepatis corroborationem, & aquarum consumptionem. Proderit etiam vsus pul. confecti cineribus, quem cap. de paralyfi, & multis alijs locis præscripsimus. Porro si hæc parum prodesse videantur, pungatur tumor.

De Ventosorum amice.

CAP. LXXX.

Ventosus raux cum hydropo & citra hydropem accidit. Si cum hydropo fiat, curetur hydrops, & ventosus raux curabitur. Si sine hydropo eueniat, vtatur topicis remediis, & euacuato corpore à pituitosis humoribus, & corroborantibus facultatem ventriculi constricticem, quod fiet remediis scriptis ad ventriculi & vteri inflationem, & ad ascitem. Poterit etiam vti fons

præ-

præscripto in aquoso ramice. Aquam enim absumit, & flatus discutit. Fit autem accommodatior, si paratur ex lixiuio, vel vino, & aceto, vel vino astringente, adiectis feminibus flatus discutientibus, vt

R. cumini, baccarum lauri, fefeli, rutæ an. ʒ. j. fiat decoctio in vino leuiter astringente, & lixiuio, foveatur pars, vel fiat sequens cataplasma.

R. stercor. vaccæ lb. ij. sulphur. & cumini an. ʒ. ij. misce, & addito pauco melle fiat cataplasma, applicetur scroto, vel fiat ex farinis sic.

R. farinæ fabarum lb. j. decoquito in vino, addendo cumini, apij, petro. an. ʒ. iij. fiat cataplasma, applicetur parti affectæ. Emplastrum de baccis lauri, vel de melilotto idem præstare poterit.

De articulorum affectibus, & primum de arthritide.

C A P. LXXXI.

A Rthritis, articularis morbus ab articulis dicitur, à Barbaris gutta, quòd existiment esse defluxionem guttatim factam. Sed cùm dicimus articulare morbum, intelligimus articulorū dolorem, vt differat ab eluxatione, quæ est etiam articulorum morbus, in quo quanquam grauis sit dolor, non propriè articulorum dolor, sed arthritidis dicitur. Quòd si ab ictu, vel eluxatione fiat defluxio, tunc articulorū dolores huic morbo superuenisse dicemus, eritque hic prius tollendus, postea ad eluxationem veniendum. Est enim eluxatio morbus articulorum, sed in situ. Et quia proprium nomen non habet, vtetur hîc nomine generis, nisi in articulorum doloribus. Sed cùm articulus sit ossium connexio per ligamenta, non in omni coniunctione articulorum est dolor, vt in ea, quæ per symphysim fit, sed tantum in ea quæ per diarthrosim, aut synarthrosim. Verùm in hac raro fit: fit tamen in pedio, in illa carpi aut metacarpi de articulatione, quæ est per synarthrosim. Cùm enim in istis fit, magis fit per decubitū, quàm defluxum & cum tumore, vt etiam chiragram vocauerunt œdematosum illum tumorem metacarpi, per abusum etiam tumores & dolores, qui per defluxum fiunt. Dolores articulorū fiunt à recrementis partium sensim defluxis. Qui à recrementis sensim collectis fit, magis per morbum Italicum quàm

Eluxatio quid.

Articulus quid.

alió modo fieri experti sumus. Altera per defluxionem excrementorum fit, & illam naturalem vocát, quasi quòd naturalis fit, vel ob victus rationem prauam contractam à parentibus, vel quòd non fit contracta, neque à morbo Italico relictá. Articulorum dolor, qui per defluxionem fit, cum maiore tumore fit. Altera & maximè si à morbo Italico fit, fit sine tumore, sed cū dolore rotius perioftij. Dolor capitis vel præsens est, vel omoplatarum, vel sterni, etiam si nulla exulceratio intra vel extra cutim excitata fuerit, quod nonnullos decipit. Fiunt tales in pituitosis incipièdo, vel in aliis post bubones venereos percussos, vel intra versos, vel post intempestiuum remediorum vsum, & vini, statim post sudationé. Leuantur multum exiccantibus. Excitatur noctu & mutatione temporum, & maximè in austrina constitutione, & modico lecti calore. Quæ fit per defluxionem, vel à parentibus, vel à victus ratione inordinata, & ferè semper ob crapulam. A parentibus enim tantum accipitur dispositio, cui si non accedat mala victus ratio ad materiam multam producendam, non fit. At frequens crapula cruditates multas & excrementorum redundantiam facit. Et per motus inordinatos statim à cibo in articulos decubunt, vel attrahuntur. Demittuntur autè, cum facultas expultrix grauata vel qualitate, vel quantitate irritatur. Tunc enim à partibus interni ad membra ignobiliora demittit per defluxionem. Est autem veluti fluuiorum inundatio extra alueum, cum ob frequentes pluuias non potest excipere copiam aquæ quæ inundat & partes vicinas occupat, sic defluxiones fiunt. Sed illæ defluxiones aliquando per hyposcymata fiunt in morbis, & natura per illos abscessus morbos facit, & in coxendice, vel aliis articulis imbecillioribus firmatur morbus. Defluit aliquando materia ab vna parte, aliquando ab alia, vt in alia recipiatur, & postea in aliam defluit per venas. Sed aliquando intra tunicas tendonũ à capite per foramen nucæ effluit pituita, quæ per coanam, vel nares, vel per palatũ expurgari debuerat. Defluxionem talem præcedit capitis grauitas & ceruicis, aliquando frigus, vel horrorem paruum facit. Cum incipit fluere illa pituitosa materia: etiã si pituitosa appareat, levis tamen rubor in superficie

ficie apparet, & huiusmodi materia in membris laxis recipitur, & distendens dolores internos, sed non multum vehementes facit. Pars œdemate laborare videtur, post doloris mitigationem, ante verò, œdemate erysipelatoso. Fit à venis magnis & ab hepate, quâdo copia gravatur magnæ venæ, quæque continere non possunt, neque capere, ad partes externas mittunt, & per emunctoria ad partes perveniunt, neque dolorê faciunt, neq; in musculis ob eorum laxitatem, sed in articulis ob partis astrictionem, & constrictionem retinetur, partes sensiles distendunt, & ligamenta, unde dolor excitatur.

Ligamentorum duo genera.

Ligamenta duplicia sunt. Alia enim sensu prædita *Discrimē* sunt manifesto: alia verò nullum omnino sensum habent. *ligamentorum.* Quæ à media ossis parte oriuntur, insensibilia sunt, ut quæ tibiæ cum coxa coniungunt, & femur cum coxendice. Talia cum ossis cartilagine nascantur, & à cartilagine, *condrosyndesmi* appellantur, insensibilia esse oportet, de quibus nolo intelligere. Alia sunt, quæ à perioestio membrana fiunt, & membranosa sunt, talia sentiunt. Nam si perioestium sensibile sit, cur insensibilis erit illa membrana, quæ duo ossium extrema retinet? In illis gravis est dolor. Tendones etiam dolent, ut per anatomen cognovimus eorum, qui hoc morbo sunt conflictati. Inter tendonem & ligamentum, quod tendonem integrit, colligitur materia, quæ sic indurata est, ut planè appareat crustacea illa, quæ à parietibus vel pellib; abraditur. Talis materia ob asperitatem non nisi cum maiorem dolorem excitat, & illa ligamenta sentiunt, quæ à perioestio nascuntur, resoluî à parte tenui exiccatur, & in gypseam materiam vertitur. Nō sunt audiendi, qui putant omnem articulare morbum fieri per defluxionem à capite, vel per spinalem medullam. Nam *Sententia* illa, quæ est in capite collecta videtur esse illa, quæ in *resicitur.* cerebri ventriculis colligitur, & per infundibulum expurgatur, vel per os vertebrarum, vel per mediam substantiam spinalis medullæ. Talis defluxio intra venas non fit. Non potest enim illa materia, quæ à venis in partes externas descendit, rursus subire venas, & ingredi, nisi illa, quæ in ventriculum defluerit, quæ per intestina

descendit, & venis melsaraicis trahitur. Sed illa si trahitur, rursus coquitur, vel per ventrem effluens, facit fluxum cerebralem. Quare manifestum est talem per venas defluere. Sed cum talis materia effugiat coctionem, defluit etiam ante magnū dolorem in parte excitatum, & si excitauerit, venæ tumidiore apparent, & ex illo tumore præsentunt & prædicunt dolorem futurum. Quare illa falsa est & noua opinio. Non nego etiam talem fieri aliquando, sed non semper. Neq; etiam nego illam cerebralem ob dolorem magnum defluxionem per venas à partibus concitare, quando dolor iam maior est, & ferè omnis dolor articulorum est cum rubore, quod certissimum argumentū est defluxionem fieri, vt in inflammatione à sanguine per venas, vel materia sanguini permixta. Nullus alius humor in corpore rubens est, à capite in articulos talis nō defluit. Quare verior est eorum opinio, quod à plenitudine & redundantia venarum fiant defluxiones in articulos, vel recremētis aliarum partiū, vt cerebri. Quomodo febres continuæ soluerētur in articulorum dolores, si materia non esset intra venas? Talibus & febres continuæ soluuntur hoc modo. Quare per venas defluxio fit. Hæc necessaria sunt, quia in morbis, qui fiunt per defluxionem, habenda est ratio partis mittentis, & partis recipientis, & eius quod mittitur, vt si à capite defluant omnes morbi articulares, in omnibus caput euacuandum, corroborandum, & siccandum pituitam euacuando, quæ maximè redundat in capite, quæ omnia in ea, quæ fit à sanguinea materia vel biliosa, conuenire non possunt, & vt huic malo verè occurramus, distinguere oportet, primum si à capite fluat, quod ex signis prius traditis cognoscitur: Vel si à venis magnis internis, quod cognoscitur, si citra dolorē capitis, vel grauitatem, dolor aliquam partem occupat, sed cum febricula, vel aliqua inæqualitate fit, & pars citò intumescit, rubet, dolet, ab vna parte in aliam mouetur. Si biliosa, citius ab vna parte in aliam mutatur. Est cum maiore ardore partis, & dolor acutior est, citra magnum tumorem. In principio color à rubeo flauet, & omnia, quæ in erysipellate esse solent, insunt. Si à sanguine, maior tumor & rubor, & extenditur vsque ad partem carnosam vicinam.

*Signa à
magnis
venis.*

Si pi-

Si pituitosa sit materia, œdematis naturam habet, nisi quod non magnus dolor adest, sed tumor & impotentia diutius partem occupat. Sed tales defluxiones syncerae non sunt, quæ per defluxionem, vt illæ, quæ per decubitus. In causa est, quod à venis subito defluit materia, in quibus omnes humores sunt permixti. Quare præsentem materiam & prædominantem inspicere oportet, & ab ea remedia colligenda. Curari debet, vt aliarum partium inflammationes & tumores. Quod si ægrotantes paterentur, vel Medici tentarent, citius à morbo ægri liberarentur, & nõ modò à præsentis occasione, sed ab aliis seruarietur. Verum toti sunt in doloris mitigatione, qui dolor symptoma est, non morbus, & bene se curatos putant, si dolor mitigetur, cum tamen remaneat intemperies, & partis relaxatio. Nos ob id partiemur huius morbi curam in præcautionem, & curationem. Præcautio debetur futuro morbo, & principio morbi, ad inerendum inhibendum, quæ est tota in abscissione causarum, quæ possunt morbum facere, vt in ablatione plethoræ, cacochymia, in corroboratione partium, obstructione viarum, per quas fit defluxio. In plethora, sanguinis missio facienda, quæ breui morbum factura est. Quod si magna nõ sit, neque tempus instet paroxysmi, tunc dièra tenui, frictionibus aliisque paruis euacuationibus auferetur sensim plethora. Euacuationes istæ debent fieri cū auersione ab illa parte, quæ frequentius & primum illo morbo occupatur, vt si pedes, è brachio, si brachia è poplite. Si à cacochymia purgationum optima est vomitio, & maxime si à pituita fiat, siue per defluxionem, siue per decubitus. Frictio in opposita parte fieri debet, & non in laborante. Purgatio medicamento conuenienti, quod sit humoribus purgandis determinatum, & quod non exagitet multum humores, qualia sunt illa, quæ neq; calida, neque multum tenuia sunt, sed quæ astrictionem aliquam in partibus relinquunt, ne materia fluat, qualia sunt inter simplicia, rhab myrobal. pil. de agarico sine gummi, vel cum myrob. & quæ ex turbith. cum myrob. componuntur. Cum volumus præcauere, non est vtendum (vt faciunt neoterici Medici) fortiter attrahentibus materiam in venis contentam, non in articulis. Quare illa

*Curatio**Curatio
plethoræ**Curatio
cacochy-
mia*

sufficiūt, quæ sunt enumerata, & dando illas pilulas quæ myrob. recipiunt ab Arabibus paratas, & illas vituperare, quæ lachrymas, & semina aperitiæ multa recipiunt. Talia enim dari debent, cum partes obsessæ sunt illis humoribus, cum constitit de fluxio. Alio tempore concitant & mouent, quo fit vt frequentissimè videantur post vsū horum medicamentorum in dolorem incidere, qui vtantur pilulis aromaticis maioribus & minoribus. Purgandi sunt hoc primū ecprocotico medicamento, vt qui calido morbo corripī solent, cath. cass. syr. ros. lax ad 3. j. Deinde concoquenda est materia vel maturanda determinatis, vt quæ non extenuant, calfaciūt, & aperiunt, sed tenuitatem & acrimoniam minuunt sua moderata frigiditate, si morbus calidus est, vt si biliosus æger, biliosa corripīatur. Syr. viol. cum decoctione sebesten vtilissimus erit. Temperabit enim sanguis acrimoniam, & leniet ventrem. Quod si placet decoctionem parare ad syrupum diluendum, paretur vt vidimus in libro de remediorum formulis ex cichor. end. lact. & aliis frigidis, vel ex multis istarum herbarum, vt,

R. cichor. scariol. cucurb. lact. ana M. j. fiat decoctio in lb. j. ʒ. dissol. syr. viol. 3. vj. misce pro tribus dosibus, vel ex syr. de succo end. simplic. Si verò apozema, quod leniat & alteret, fiat hoc modo ex supra dictis herbis, & fructibus bilis acrimoniam extinguentibus, vt,

R. cichor. end. lact. scariol. boirag. ana M. j. prunorum, sebest. tamarindorum ana 3. j. anisi 3. ʒ. fiat decoctio. In lb. j. ʒ. diss. syr. vio. & rosarum lax. ana 3. iij. misce pro tribus dosibus. Finitis syr. detur potio sequens,

R. rhab. infusi, & fortiter expressi 3. ij. syr. ros. lax. 3. ij. cath. 3. misce, si velit in forma boli, fiat sic.

R. cath. & triphera perficæ ana 3. ʒ. rhab. pul. & irrorati 3. j. capiat manè. In hac causa in forma pilularum minus conueniunt. Quod si morsus sit æger, fiat sic.

R. elect. de succo ros. solut. rhab. an 3. ʒ. cum syr. ros. solut. fiant pilulæ, capiat post mediam noctem cum custodia. Si vna euacuatione non sit sufficienter euacuatus, reiteretur, priusquam veniat tempus accessionis. Nam accessionis tempore non est mouendum corpus euacuatione narrata nisi leuissima, vel fortissima videndum, quia humorum

*Curatio
arthritis. a
calido
morbo.*

humorum redundantiā affatim euacuat, & defluxiones consistere facit. Oportet necessariò vel leuissimo medicamento ad constringendum dato, vel triphera persica, quæ leuissimè euacuat, citra agitationem humorum vti. Quare non irritatur defluxio. Si materia sanguinea sit, *Curatio à materia sanguinea* sanguinis missio à parte opposita facienda ad diuersionem, & multus sanguis trahendus, si vires, ætas, tempus, magnitudo morbi suadeant. Cùm incipit aliquem occupare, sanguinis missione morbus curandus. Sanguis inflāmur & in bilem vertitur, & serū acrius redditur. Poterunt quæ serosa purgant & bilem præscribi, vt syr. ad arcendam putredinem humorum, vel incendium accommodari. Quare quæ superius dicta sunt, dabuntur eodem modo & ordine. Cōueniunt & in vniuersalibus, & in particularibus remedia magna ex parte. Quare de illis nō agemus. Dolor à materia calida semper defluit, siue fiat incipiendo, siue post dolores à materia frigida similiter. Quare semper repellendū à principio, nisi cū sit post morbum per crism. Fit enim aliquando & liberat, modò non sint acerbissimi dolores, qui ægrotatē iugularent ob virium resolutionem. Repellentia verò supra partē tumidam adhiberi non debent, sed mitigantia & refrigerantia, vt vocant. Nam in ea parte humor *Topica* fluēs dolorem facit, qui in medio musculi inter descendēdum non faciebat, ob partium structuram, & sensum: vasa sunt magis constricta, neque tā liberè partes ob dolorem dilatarī possunt. At astringētia illa dilatationem impedirent, & constrictionem augerent. Quare ab illis est abstinendum, nisi tempore sanitatis, quia illa partem corroborare possunt, & laxitatē castigare. Verū pau-
 lo altius versus emunctorium, & in parte interna magis quàm externa. In eo enim loco sunt plura vasa, maiora & magis denudata. Illa enim materiæ transitum prohibent. Quare si multa esset plethora, prius inanita esse vasa oportet, ne corpus lædatur, vel statim euacuare redundantiam. Illa enim esse possunt communia, quæ ex circuitu partium inflammatarum, vel in fluxu sanguinis apponuntur, vt pulvis constrictiuus aceto exceptus, vel albumine ouorum fortiter agitatorum, vel aquæ astringentes, addito pauco aceto, vt sunt prunellorum,

peculi rosarum myrtil. Vel cataplasmata ex fructibus acerbis, vel ex palmulis immaturis, ex oliuis immaturis, cotoneis, piris agrestibus, sorbis, carnis decoctis in aceto, & contusis, quibus adde aliquid panis albi, vel farinæ lentium ad maiorem adhærentiam sic.

℞. palmularum vel prunorum agrestium, vel cotoneorum N. xx. medullæ panis fß. j. decoquantur in aceto, & contundantur, & per cribrum mittantur, fiat cataplasma, cui aliquando, ne arescat citius, adde olei ros. omphac. ʒ. iij. vel aliud ol. ex astringentibus applicetur. Nihil prohibet puluerem astringentium addere, vt ros. balauftiorum, vel gal. vel bistortæ ad ʒ. iij. Alia commodissimè supra partem adhibenda sunt ante hæc mitiora, vel quæ ex rebus frigidis multum ponderantibus, quæ non tam ob frigiditatem & astrictionē, sed & pondere suo concidere faciunt vasa, & ligatura intercipiūt, materiæ descensum. Quare bolus armen. cum litharg. aut cerusa conueniunt, fiatque hoc modo.

℞. litharg. auri ʒ. iij. cum succo cydo. vel alterius fructus, vel plantæ & aceto, fiat vt nutritum, applicetur supra dictas partes, addendo parum ol. ros. Ex vnguentis pauca in officinis parata habemus, quæ id per se præstare possint, ob oleorum & pinguedinū copiam. Vnguentum ros. populeonis parū astrictionis habet, vt refrigerationis ob ol. viol. quod recipit, & axungiam porci. Ob id melius illa ponere super partē affectam. Sandalinum lotū in aceto, & succo astringente magis conuenit. Sunt tamen multa, quæ parū conueniunt, vt spica & alia, quæ hepati determinata sunt. Si quis eo vti voluerit, augeat boli quantitatem, addat lithargyrum. Vnguentum pompholigos, quia graue & frigidum, non satis astringens. Quare bolum, vel gallas, vel radicem bistortæ addere oportet. Verū bolus armenia id præstare potest, & minimo emitur pretio. Hæc apponenda est, donec constiterit defluxio. Hec enim in illa parte maximè duo commoda præstat, influentem humorem inhibendo, & quod in parte est, per partem euacuat digerendo, & exiccando, & nō retrocedit, vt dolorem in illa parte exciret. est enim vtile his, in quibus morbus articulorum sic notabilis vnā partem relinquit, vt alteram accipiat.

In quibus neque mouetur, neque per defluxionem fit, inutile est vti repellentibus. Supra partem dolentem refrenantia dicta, vel sedantia dolorem cum quadam refrigeratione parua, vel cum relaxatione moderata imponenda. Parantur aliqua ex lacte, alia ex oleis & succis, vel aquis stillatis. & cataplasmatibus, vt,

R. ol. ros. ſymph. & aquæ viol. vel ſolani ana. ℥. ij. agitentur, & panni intingantur, & ſepè mutantur, vel ſic,

R. ol. viola ℥. iiij. decoctionis mal. & viol. ana ℥. ij. agitentur. Verùm poſſunt parari ex ſtillatitiis & mucilaginibus, vt ſic

R. mucilag. ſeminis pſilij, conſectæ cum aqua plâtag. vt ſolani, vel ſucci ſemperuiui q. ſ. applicetur. Diluere oportet, ne ob emplaſticam vim perſpiratione impediatur. Alij tantùm ſuccos herbarum cum aqua ponunt. Nam quæ ſpiſſa ſunt vel graua, vel emplaſtica, ſæpè dolorem augent, prohibendo perſpiratum, vt

R. ſucci ſemperuiui, & lyſimach. ana ℥. iiij. aquæ end. mal. lact. ana ℥. iiij. panni temperentur & admoucantur in vehementi dolore. Ex medulla caſſ. fiſtulæ diſſol. in aqua viol. & oleo vio. fiat linimentum, vel cataplaſma micæ panis ſic,

R. micæ panis medi j lb. j. temperetur in lacte ouillo, vel bubulo, & contundantur & reducâtur in formam cataplaſm. Vel vt vulgus Medicorum facit, decoquantur, & fit cataplaſma, addendo vitella ouorum N. ij. croci parũ. Verùm crocus poni non debet, niſi quando opium, vel hioſquiamus, vel mãdragora in medicamentis ponitur. Et quanquam astringens ſit, calorem tamen habet maiorem, quàm pepticum ſit. Lac coſtum minùs refrigerat, & magis acre eſt. Lac igitur vaccinum vel ouillum, quia plus habet butyri, eò magis dolorem ſedat: quò plus habent ſeri, minùs. Ex herbis contuſis & farina, cū hoc non profecerit, & craſſior materia remaſerit, concoquenda & digerenda.

R. radic. mal. altheæ ana q. j. ſol. viol. & mal. ana M. flor. cichor viol. melil. ana ℥. iiij. fiat decoctio in iure inſteſtinorum, & contundâtur, quibus adde vitella ouorum N. iiij. farine lini, ſœnug. ana ℥. iiij. axung. porci lb. ſ. ol. cham, melil. an. iiij. fiat cataplaſ. applicetur, & frequenter

admoueatur, & mutantur remedia. Post remedium calidum, frigidum, vel minus calidum applicentur, & sic vicissim mutantur. Illa calida videntur fluxionem concitare, ob id moderatè adhibenda erunt, qualia sunt olea digerentia, vel cataplasmata. Oleum amygd. amar chamio. item axung. calidæ anatis, anseris, vris. Fit cataplasma ex farinis, vt

R. farinæ fab. & fœnug ana ʒ. iij. aquæ mal. vel decoctionis mal. q. s. fiat decoctio. quibus adde ol anethi & arini an. ʒ. ij. axung. gallinæ & anatis an. ʒ. iij. fiat cataplasma, vel decoquantur in oxymel. & non remoueatur, donec exiccatum fuerit.

R. farinæ fœnug. lb. j. decoquantur in oxymel. & fiat cataplasma. Emplastra inſcerati consistentia applicentur post ferociam, & doloris vehememiam, & non prius. Emplastra sunt diachil. & diachalcit. dissol. in oleo lilio. vel amygd. vt chamo. vel aneth. vel rutæ. & applicentur. Hæc sufficiunt pro materia calida, sed si huic permixta sit pituita, remedia posteriora citius erunt adhibenda, & resiccantia esse magis oportet, & minus laxantia. Quare

Signa materia frigida.

emplastrum diachalcit. magis conuenit. Item diuinum & oxycroceum emplastrum, & quæcunque in sequentibus dicentur. Si dolor sit à materia frigida non subito nec affatim fit, neque vehementes sunt dolores, tumores laxi sunt, & diutius durant in vna parte, nec sic de vna parte in partem mouentur, sed illam partem, quam occuparunt, diutius obsident, & illius partis robur deiciunt, & actionem impediunt. Quia etiam si dolor fedatus sit, pars illa, cui impacta est, minor facta inflammatos tendones vel compressos adhuc retinet aliqua in parte, sic vt dolorem faciat in motu, & membra ob tumorem flecti non possint, & cum tentant mouere, dolorem sentiunt. Fit hoc in senibus magis, quam in iuuenibus, & post neglectam prioris materię resolutionem,

Qui sunt huius morbo obnoxij.

Pars reddita imbecillior excrementa non repellit, quæ non bene concoxit. Et sic morbus calidus compositus fit ex calido & frigido. Fit in iuuenibus crapulosus, qui passi sunt morbum Italicum, vel qui ob natationem in aqua frigida, partes plus iusto refrigerarunt. Fit in mulieribus post amissam mensium purgationem ante tem-

pus. Fit maximè post membrorum defatigationem, vel humectationem, & potissimum qui à morbo Italico id morbi genus contraxerunt. Quare eos à pedum ablu-
tione, nisi in lix uio arcere oportet à natatione & cursu. Vomere debent frequenter, vt pituita ventriculi purge-
tur: humectantibus & pituitosis abstineant. Frequentius
verò in principio euacuari debent. Ego multos ab hoc morbo vindicaui, vel potione aquæ, in quibus per de-
fluxionem fiebat, & frequenti vomitu, vel purgatione
per aluum. Debent illi capere pilulas de h. era, & agarico
vel elephang cum agarico vel asiaeret, ad vnam singu-
lis matutinis, vel duas in hebdomada, vel tres semel. Hac
ratione prouocabitur bona actio, impeditur recremen-
torum prouentus, & diuertit defluxionem in articulos.
Quod si facilius ista operentur, nos euacuare bis vel ter
vniuersali euacuatione oportet. Nam istæ paræ eua-
cuationes in magna copia excrementorum non suffi-
ciunt. Fiat ergo sic.

R. mass. pilul. de hiera simpl. 3. j. cap. manè. Deinde
viatur sæpe sequentibus.

R. mel. ros col. 3. iiij. syr de stec. 3. iiij. decoctionis bero.
vel anthos. vel gaiaci lb. j. fiat syr aro. cum 3. ij diarrh.
abb cap. quatuor matutinis quibus finitis capiat 3. iiij.
elect. diacarrh. vel de citro sol cum 3. j. elect. de succo ro-
særum. Vel fiat potus cum 3. iiij. indi maior. & 3. j. syr. ros.
lax. cum aqua betonica, vel decoctionis polyp. Vel cap.
3. iiij. pilul. imperialium vel 3. j. foetidarum, vel 3. j. sine
quibus, vel arthriticarum. In crastinum cap. 3. j. ther. re-
centis. Quod si velit corpus humidius resiccare, cap 3. j.
singulis matutinis pul. sequentis.

R. cineris priapi tauri, & cranij hominis ana 3. iiij. ga-
langæ 3. j. sacchari candi 3. iiij. misce, cap. manè. Deinde
reuertatur ad vsum pilularum præscriptarum, vel capiat
3. lb sequentium.

R. aga. tro. & rhab. ana 3. j. rad aristoloch. & quinque
fol an 3. j. galang. garyophil. spicæ nardi, scenanth ana
3. lb. malaxentur cum succo bras. vel ros fiant pil de qui-
bus cap. semel in hebdomada 3. lb. vel singulis diebus
pilulas duas. Si accessionis tempus instet, abstineat ab o-
mnibus medicamentis, sobrie viuat, corpus non agitet.

Si per defluxionem fiat, ne humores conturbentur & moueantur, defensiuo vti oportet, fin minus vtatur, priusquam tempus accedat, lixiuio cum sale, vel sulphure, quod potest abscindere parua humorum quantitatem, præmissa purgatione, & victus ratione. Si ergo sit mixta materia in principio, ne dolor humores concitet ad defluxionem, defensiuum paratum paulò supra partem affectam adhibeatur, & supra partem, quæ dolorem mitigare possunt. Deinde ad materiam frigidam coquendam & ad digerendam veniendum, ad quod præstandum, quæ in declinatione morbi calidi sunt dicta, vsurpari possunt, & quæ sequuntur in materia frigida, & flatulenta, vt,

R. sterc. vaccæ lb. ij. mell. communis ℥. ij. fiat catapl. Si ferre potest, ad maiorem discussionem adde cumini parum, vel fiat sic,

R. sterc. vaccæ lb. j. far. fab. furfur. ana qr. j. cumini & seminis fœnugræ. ana ℥. j. excipiant oxymel. & applicentur supra partes intumescences. Vel excipiantur ad dolores magis sedandos. Si dolor sit à materia frigida, fiat tale quod sequitur.

R. farinæ fab. ℥. iiij. decoquantur in decoctione ranarum in oleo facta & vino, & reduc. ad formam cataplas. Si dolor non infestet, adde salis p. ij ad consumptionem, vel fiat cum stercore capræ. Vel si à materia frigida spissa, quæ durum tumorem nõ laxum facit, tunc ad oleum & vnguenta veniendum.

R. vnguenti mart. dialth. an. ℥. ij. butyr. recent. tereb. an. ℥. j. ol. lil. amyg. & lumbr. an. ℥. j. fiat vnguentũ, vel sic,

R. mucilag. semin. alth. semin. lini, & fœnug. ana ℥. j. ol. lini, & cherini, axungie porci, taxi, vel vrsi ana ℥. ij. croci ℥. ℥. fiat vnguentum, vel sic,

R. ol. lumbricorum, liliorum, aneth & rutæ ana ℥. iiij. vini albi, & spæ ana ℥. iiij. ranarum communium N. 30. salis ℥. j. decoquantur ad ossium separationem, & vini consumptionem, facta forti expresseione, adde tereb. croci parum, fiat linimentum quo vngantur partes rigide & tense. Ad idem.

R. asellorum & vermium ana lb. ℥. ℥. decoquantur in sapa ad dissolutionem, quibus adde axung. hirci & veruecis an. ℥. iiij. vel decoquito simul, & reducantur ad formam

nam lini, quo vngantur partes. Oleum hepatis ranarū, & gallinarum idē præstat. Et ad dolores sedentes oleum, in quo decoquitur torpedo, dolorem mitigat. Quod si aliis adiungatur, efficacius erit. Ex herbarum succis sic, ℞. succi ebuli ℥b. j. succi hederæ ℥. ij. ol. antiquissimi vel rutac. ℥b. j. decoquantur, quibus adde styrac. castor. an. 3. iij. opopa. ammo. an. 3. ℥. dissoluantur in ol. & misceantur addendo parum ceræ, fiat linimentum, quo vngantur partes. Deinde applicentur emplastra diachil. cum 3. j. sulphur pro ℥b. vel diachalc. aucta dosi chalcitidis. Emplastrum diuinum additur cum sale, malaxetur cum oleo turac. vel irino, vel laurino, vel multum digerentibus. In his qui ob morbum Italicum patiuntur tales dolores, emplastrum de ranis, aucta dosi euphorbij, & mercur. magis conuenit, vt emplastrum ex sulphure vel sulphur. addendo emplastrum diachalcitis vel diachilon. Et si sic bis aut ter tractentur, curantur & morbum euadunt, & possunt conseruari, si lixiuio sequenti vtantur post paroxysmum.

℞. cineris cruris equi, vel cerui, vel asini ℥b. j. aquæ fabrorum ℥b. iij. fiat lixiuium, abluat pedes & manus bis in hebdomada. Firmat pedes, & absumit excrementa, & vt fortius faciat. adde salis communis q. j. vel in lixiuio communi ℥b. ℥. salis. Paretur ex cineribus quercus vel hermodactyl. Vtilis est frequens vsus theriacæ post vomitionem, vel vacationem leuem post pilulas factam, vel decoctionem polypodij. Eos, qui per defluxionem morbo corripiuntur, iuuat: Antiquæ verò vsus, si à morbo Italico, & citra defluxionem fiat, superbibendo parum vini diluti aqua betonica, vel arthemif. Si à morbo Italico & citra defluxionem fiat, curetur, vt dicitur de morbo Italico. Qui gonagra laborant adhibito caustico parti internæ poplitis vindicantur, defluxione acris, vesicatorio adhibito super partem, euacuatur materia acris, qua euacuata dolor sedatur. Aliqui cum inceperunt hoc morbo laborare, frequenter in aqua frigida natauerunt, & sic euaserunt morbum, roboratis partibus, & vasis constrictis & repulsis humoribus ad partes internas. Si ob laxitatem & humorum tenuitatem fiat, prodest in principio. Quod si morbus tantum accreue-

rit, vt partes imbecilliores reddiderit, inutilia sunt remedia hæc vniuersalia, sola mitigātia dolorem, sunt ex vsu.

Nonnulla ad huius morbi curationem & præcautionem experta in medicina faciendā.

AD præcautionem morbi articularis & nephritici doloris fugere cruditatem necesse est, & si fiat, castigetur frequenti vomitione. Nam sola vomitio hos duos morbos maximè præcauet. Prouocetur ergo vomitio manè, si facile vomat: sin minùs, post longam commestationem à prandio. In crastinum capiat pilulas duas ante cibum ex pilulis sequentibus.

℞. rhab. & agarici tro. an. 3. ij. cinamomi, spicæ nardi & celticæ asari, mastich. myrrhæ, an. 3. ss. aloes 3. ss. terebinthinæ 3. iiij. incorporentur terebinthina & formentur pilul. vj. pro 3. capiat in crastinum vomitionis, vel etiam sine vomitione, tempore non supra modum calido, semel in hebdomada post primum somnum capiat 3. j. Alio verò tempore calido loco pilularum vtatur opiata sequenti.

℞. cass. 3. ij. cath. 3. j. tartari 3. ss. senæ oriental. 3. iiij. zinzib. & rad. penthab an. 3. j. anisi 3. ij. seminis rutæ 3. j. cum syr. ros. lax fiat opiata, capiat semel in hebdomada ad quantitatem nucis horis duabus ante cibum. In crastinum opiata capiat 3. ss. theriacæ cum 3. j. terebint. abietis 3. horis ante cibum.

℞. ocymiseminis, alkecangi rutæ, fefeli, asari, herniar. siccæ, corall. rub. lapidis iudaici an. 3. j. cineris capitis muris, & astragali leporis an. 3. iiij. radic. pentap. & rub. maior. ab 3. j. spicæ celticæ 3. ss. excipiantur terebinthina, & fiant pil. 5. pro 3. Capiat in declinatione morbi articularis, ac etiam in declinatione morbi nephritici, & post purgationem corporis per tres dies capiendo prima die 6. in secunda 4. in tertia 2. & superbibat aquæ betton 3. iiij cum pauco vino albo.

*Pro fortissimo dolore nephritico & articulari
fit remedium. Et sequitur.*

℞. pul. suprā dictarum pilularum & 3. iiij. castor. croci ana 3. j. opij scrupul. ss. incorporentur cum syrup. de flechade, & fiat ad formam opiatae spissæ, de qua capiat

piat ad quantitatem parvæ fabæ longè à pastu.

Si morbus articularis ob largam sanguinis missio-
nem à qua corpus alioquin pituitosum¹, frigidum reddi-
tum est, curandus est optima victus ratione, & medica-
mentis laxantibus imbecillioribus & acopis. Quòd si
quid à Medico prætermisum sit, id erit faciendum. Vta-
tur ergo pilulis sequentibus.

℞. acaciæ q. j. spong. bedeg. ʒ. iij. peculi ros. cuspid.
glandium: pediculorum, vuarum, quas vulgò vocant
(*grappes de raisins*) ʒ. ij. seminis vuarum, ros. rub. boli arm.
ana ʒ. iij. incorporentur cum omph. & pauco aceto, ad-
dendo albuminis ovorum fortiter agitatorum q. s. ad
excipiendum, misce. Applicet in emunctorio partis do-
lentis, dum sentiet humorem ad partem irruere. Serò
aut manè capiet vnam aut 2. aut 3. pilul. ex sequentibus,
quæ non laxant, sed solum fluxionem cohibent.

℞. boli arm. terræ sigillatæ an. ʒ. ij. ros. mastich. cor-
tic. thur. bedeg. ras. dentis apri. an. ʒ. ii. opij. ʒ. j. styrac.
myrrhæ an. ʒ. ʒ. cum syrup. de pap. fiant pilulæ vij. pro 3.
capiat, vt dictum est. Semel in mense capiat ʒ. j. pilula-
rum sequentium, quæ impediunt multam humoris col-
lectionem in corpore, ob quorum copiam & tenuita-
tem oritur hic morbus.

℞. agar ʒ. ij. rhab. ʒ. j. ʒ. myro. chebul. cydoni. an. ʒ. ʒ.
mastich. ʒ. spicæ nardi. & radi. pentaph. an. ʒ. j. cum syr.
ros. lax. fiant pilulæ vj. pro 3. capiat longè à paroxysmo.
Et si multum non mouerunt ventrem, viles tamen e-
runt alia ratione. Frequentissimè tamen illis vtatur. De-
inde syr. & aliis infra scriptis. Sed approbarem frequen-
tem vomitionem à cibo & corporis quietem. Nam do-
lentibus, dolorem inducere non debemus, sed eum po-
tius acopis sedare. Verum vbi corpus fuerit purgatum
& lassitudo curata, tum exercitio leui & frictione par-
tes erunt corroborandæ.

℞. rhab. myro. citrin. chebul. an. ʒ. ʒ. ag. tro. ʒ. ij. myr-
rhæ. mastich. an. ʒ. j. spicæ nardi, cubeb. an. ʒ. ʒ. cum re-
reb. fiant pilulæ, quibus vtatur duabus aut tribus horis
ante prandium, post vsum vomitionis. Quòd si ad vo-
mitum non sit propensior, assu- scat, assumpto cibo ad
aetietatem, pinguibus vel butyro rācido vii. & inunctio-

ne facta ex oleo amygd. & lilio. supra ventriculum, alimēta reicere. Vel loco harum pilularum capiat 3. j. pil. de hiera simpl. Deinde vtatur syr. sequentibus bis vel ter in anno.

R. mel. ros. col. 3. iij. syr. de stech. 3. j. decoctionis arthetice & beton. lb. j. fiat syr. ar. 3. ij. diagal. Et finitis syr. capiat pilulas sequentes.

R. mass. pill. sine quibus, & imper. ana 3. lb. cum syr. de stechade, fiant pilulæ.

R. pyretri contusi 3. iij. decoq. in oxymel. & vtantur manē masticando 3. j. per tres dies, 4. aut 5. priusquam vtatur theriaca singulis matutinis spuendo. Deinde aqua frigida & modico aceto rosato os abluant, vbi cessare voluerint à masticando. Post quatuor dies accipiet manē theriacēs nostræ mediæ ætatis 3. j. addendō cineris astragalali leporis 3. lb.

R. conf. acori vulg. 3. ij. conf. anth. stechad. ana 3. lb. zinzib. conditi 3. iij. confectio. ar. ros. diagal. an. 3. lb. corall. rub. vsti & loti, crani j hominis vsti & loti an. 3. ij. cum syr. conser. cort. citri fiat opiata, de qua capiat singulis matutinis superbibendo parum aquæ absynthij.

R. cineris erur. cerui 3. ij. astrag. lepor. 3. j. anisi 3. j. pul. diagal. 3. ij. sacch. candi 3. iij. fiat pul. capiat post pastum nihil superbibendo. Si dolores sint citra defluxionem, vngantur partes sequenti linimento.

R. ol. scorpionum, ol. lumbric. an. 3. iij. axun anat. anser. butyr. an. 3. ij. terebinth. lotæ in aqua vitæ 3. j. lb. ceræ parum, fiat linimentum, vngatur.

R. terebinth. 3. iij. ol. vulpini & hircini an. 3. ij. croci, myrrhæ, & masticis ana 3. iij. ceræ nouæ, mucilag. seminis foenug. ana 3. ij. Lique scat cera cum oleis: deinde misceatur turbit. Tertio loco odorata: vlumo, mucilago, & reducantur ad formam linimenti.

Si morbus per defluxionem fiat in articulos, in principio multis medicamentis laxantibus ægrum mouere non oportet, sed quietem imperare, & statim dare oportet theriacæ recentis 3. j. cum paucō bolo armena puluerisato. Prope emunctoria, per quæ fluxio fit, sequens medicamentum ad repellendum imponendum.

R. radic. bistortæ 3. ij. gall. nucis cupress. an. 3. j. ros. 3. lb. bo-

℞. boli arm. ʒ. ij. fiat pul. excipiantur aceto & albumine ouorū, applicetur, vt dictum est. Leviter astringatur pars interna coxæ, addito scilicet, asplenio: supra partem, quæ incipit dolere, apponant oleum ros. perfectum. Quod si nō possit inhiberi fluor, & dolor augeatur omni tempore, dolori sedando erit incumbendū, deinde quod remanet, in parte, emplastris erit discutiendum. Ad sedationem doloris, vtile erit cataplasma paratum ex pane syncomisto macerato in lacte ouillo, & nō decocto, quibus adiungi poterunt vitelli ouorum fortiter agitatorum, pariter cas nouiter extracta cum fumo decoctionis mal. & olei chamomill. apponatur ad formam linimenti. Si materia pituitosa appareat, vel in declinatione, applicetur supra partem panni intincti in sequenti lacte.

℞. lactis vaccæ ℥. ij. sulph. ʒ. ij. misce, vtatur, deinde applicetur supra partem, & non remoueat, donec discussum fuerit, quod in parte collectum est.

℞. fœnug. contus. ℥. ss. decoq. in oxymel. & apponatur parti. Post curationem ad partium corroboracionē, & maiorem discursionem, ponatur supra partem affectam emplastrum sequens, quod diu gestet.

℞. mass. emplastri diachillonis ℥. j. sulph. irid. aristol. an. ʒ. j. ss. calcitis ʒ. ss. malaxentur cum oleo rutac. & reducantur ad formam cerati.

De Coxendico dolore.

CAP. LXXXII.

COxendicus dolor morbus est articularis, à coxendice nomē accepit. Est ab articularum dolore aliqua ex parte diuersus, tum quia particula non apparet ob profunditatem situs doloris, qui intus est, tum quia fit in aliquibus, qui nunquam articularum dolores passi sunt. Alios noui articularum dolore vexatos, qui coxendicis dolore postea vel ante vexabātur. Quare puto dolorem illum verē coxendicū esse à recrementis illius partis coaceruatis, vel in eam tantū partem defluxis, & sentitur in parte tantū coxæ profunda, & cū mouentur, non autem si quiescant, dolēt. Fit autem ob eluxationem, dissectionem ligamenti, quod à periostio nascitur, non in cōdrosyndesmo, quod à capite femoris insensibili nascitur. Sunt, qui in equitatione, alij in ascensu magnorū equorum, vel ob ephippij longitudinem, dolorē sentiunt, dis-

tenduntur enim. Ergo talem dolorem frequenter sentiunt, sed descēsu curantur, & alio situ. Mulieres à partu, & cum vtero gerūt, solent dolorem in parte interna inguinis sentire, quem mulieres, vt vulgus Medicorum coxendicum putant esse, ob anatomes imperitiā. Nō noverunt ligamenta vteri ad internam partem descēdere, quæ si à flatu, vel ob vteri retractionē in alteram partē, vel superiorem distendatur, dolor sentitur. Sed hac nota solent distingui, quod mulieres hæ in anteriore parte magis, quàm in posteriore dolorē sentiunt, & ferè semper dolent, etiam si crus non moueatur. Adde quod mulieribus accidit post refrigerationem à partu, vel ob contortionē vteri, aut flatus, aut alios affectus, qui fiunt sine mulieris perturbatione. Nam mulieres, quæ vteri suffocatione laborant, hanc tentionē non sentiunt, quia mens occupata est, & in illis non est sensus, vel quia diu ea non durat. De curatione eius dictum est. Curatur enim, vt inflatio vteri. Redeamus ad coxendicum vterum. Est enim alius, qui fit à materia calida, alius à frigida & sæpius. Calida vehemētiore dolores facit, frigida verò diuturniores. A calida, celerius, interdum magis, quàm noctu fiunt, A frigida verò minus vehemētes, sed diuturniores morbi. Fit in pituitosis constitutionibus post multas equitationes à cibo, & inordinatos motus, & post saltus. Aliquando morbus Italicus in ea parte firmatur. Amittitur hic morbus frequenti vomitione. Aliquando à cibo vomere est utile, aut manē, si facile vomat. Aliquando à cibo amitteretur potione aquæ, vsu clysterum, & tenuissimis euacuationibus per clysteres factis, vel per medicamenta non multum cōturbantia, maximè si à bile vel defluxione fit. Curatur autem vomitione imprimis, euacuatione, digestionem humoris collecti. vomitio excitatur multis remediis, vt aqua tepida, decoctione raphani, seminis atriplicis, & aliis, verum commodius decocto seminis, vel radicis asari. Nam præterquam quod excitat vomitum, dolorem coxendicum curat, quod ego in multis foelicissimo cum successu sum expertus Et quia hellebori modo purgat, præparanda sunt corpora & eligenda, quæ ad vomitum sunt apta. Nam quibus fluit sanguis à pulmone, qui difficilè respirant, qui pulmones vel

pectus

pectus strictum habent, tales omnes à vomitione abstinere debent. Clysteribus alui excrementa euacuanda sunt. Verum qui nullo negotio, vel citra periculum vomere possunt, oportet seminis vel radicis asari decoctum sumere tepidum ad ℥. iiij. post cibos pingues & liquidos, eosque diuersos. Quod faciendum duobus vel tribus diebus. deinde intestina abluenda sequenti clystere ad materię euacuationem, & doloris omnis mitigationem.

℞. mal. bismal. cum rad. betę, mercur. ana M. j. caul. & chamepyt. ana M. ℥. seminis lini ℥. ij. seminis anisi, & rutę ana ℥. ℥. fiat decoctio. In col. th. j. diss. benedictę ℥. j. mel. ros. ℥. iiij. ol. chamo. & lil. ana ℥. ij. fiat clyster. Hic in principio siue à materia frigida, siue calida sit, clysteribus vtendum erit. Nam clysteres ad euacuationem materię communis vel coniunctę parantur, hoc tamen obseruato, quod calidioribus in frigida, frigidioribus in calida vtendum sit. Clystere reddito, si dolor sit à materia calida, vel si sit vehementissimus, vel corpus plus æquo plenum videatur, fiat missio sanguinis è brachio ad diuersionem, deinde à poplite ad deriuationem. Quare si ad deriuationem tantum fiat, sufficit parum sanguinis attrahere, ne ad partem affectam humores superiorum partium deturbentur, vel trahentur cum morsu, & inaniuntur venę partium vicinarum, quę cum multo abundant sanguine, non trahunt. Quod si maior copia trahatur, venęque superiorum partium multo sanguine abundant, affectus ad partes afflouit. Quod si non consistat defluxio, tunc à poplite est sanguis detrahendus. Quod si missus fuerit à brachio, cucurbita internę parti coxę affixa cum scarificatione, sed in vehementissimo dolore dixi quod multo præstantius est remedium dolorum, qui fiunt à defluxione humorum, quàm sanguinis larga missio, quam Gal. dixit ad syncopem, quod periculosum est. Supra partem digerentia & relaxantia sunt apponenda, nunquam repellentia, nisi ad vasa per quę fit defluxio, apponantur, alioqui non præstāt vtilitatem. Quare cum defluxio per internam partem iuncturę fiat, tunc eadem ratione relaxantia non nocent, quia apposita supra partes carnosas non relaxantia vasa, vnde maior fluxio fit, sed partes vicinę relaxandę sunt, vt inguina, ne ma-

teria ad habitum corporis trahatur, quia ad illas partes attracta, emplastris aut vnguentis discutitur ac euincitur. Et ob id metasyncritica, quæ ab alio trahunt, poni debent quæ potenter discutiant digeruntq; In materia calida sufficiet addere relaxantia moderata, vt ol. chamo. amyg. amar. aneth. vnguentũ resumptiuum, de axungia & dialthea. Quod si diuturnior sit, ad materiam frigidam præscribuntur. Addenda erunt in declinatione medicamenta laxantia, vt electuarium de succo ros. cum citro sol. diaph. in forma boli, vel in decoctione prunorum vel dactyl. vel ramarindorum, vel polypo. quercini sic.

R. cath. ʒ. j. diaph. ʒ. j. misce, fiat bolus cum pauco sacch. capiat manè pro minoratiuo. Additur diaphenicum, si sanguis missus non fuerit, vel elect. de succo ros. ad irritandam facultatem excrettricem, ne fiat agitatio, sine euacuatione, vel dissol. in aqua end. Et loco harum confectioinum diagrediararum, adde syr. ros. lax. ʒ. j. Deinde dentur syr. ad alterationem vel maturationem. Possumus vti maturantibus post factam minorationem per missionem sanguinis, vel purgationem. Quia omnis materia, quæ facit dolorem, vel defluit, vel turget, quam vacuare licet in principio, & quia tota vacuari non potest, maturatur, vel mitior redditur, vel crassior, ne tam facile defluat ad partem affectam. Vel si ob acrimoniam dolorem inferat, minuetur caliditate illa minuta vel acrimonia. Sed illi syr. deligendi sunt, vt diximus, qui refrigerant sine apertione, vt syr. end. simpl. viol. & decoctiones ex herbis similibus.

R. syr. viol. de iuiubisana ʒ. iij. decoctionis end. lb. j. misce pro tribus dosibus. Si dolor vehementissimus esset, non erit præter rationem, & ad materię castigationem, & doloris mitigationem noctu dare syr. de papa. ad ʒ. j. cum decocto viol. & lact. Si materia magis ob tenuitatem, quàm ob acrimoniam dolorem inferat, syrup. de ros. siccis, myrtill. cum decoctione end. cichor. conueniunt, quia exiccant & defluxionem retinent. Vel fiat talis decoctio, vt sequitur.

R. lactucæ, end. cichor. viol. ana M. j. prunorum, iubarum. sebest. ana N. x seminis mal. pap. albi ana ʒ. ij. flor. nenuph. ros. viol. an. p. j. fiat decoctio. In lb. j. ss. diss. sacch.

facch. q. l. fiat syr. aro. cum 3. j. sandali albi. Tertio quoque die detur clyster prescriptus. Quod si corpus abundet recrementis, nec defluat materia, semper iniectione precedenti clystere detur medicamentum laxans in tali forma, quam volent.

R. rhab. electi 3. ij. infunde in aqua end. vel arthetice & paucovino albo, exprimatur fortiter, expressioni adde syr. ros. lax. 3. ij. fiat potus. Si pilulas maluerit, dentur aggreg. sine quibus, vel e quinque generibus myrob. Abstineat ab aureis, de hermodactyl. & aliis quæ recipiunt lachrymas. Post euacuationem absolutam, dentur cochlearia tria syrup. de papauere ad sistendam humorum agitationem, quibus in fine adde calidiora, ut trahant ad ambitum. In clysteribus adde iberidem, siue nasturtium sylvestre, & in cataplasmatibus. Nam vna aut altera applicatione dolorem coxendicum soluit.

Si à materia frigida fiat, abstinendum à sanguinis missione è brachio: in poplite tamen, si dolor sit vehementissimus. Nam dolor vehemens sanguinem & humores facit fluere. Quare permittitur ad eorum humorum derivationem sanguinis missio è poplite, vel talo, vel cucurbitarum applicatio. Vomitus frequenter irritandus, quia pituitosa facilius vomitus ob pituitæ copiam. Manè igitur detur decoctum asari, vel florum genistæ, vel seminis eiusdem. Detur clyster prescriptus, cui adde decoctionis ag. & asari ana 3. iij. cum decoctione polypodij, pass. vel yuæ arthetice. Vel detur pilule de cucurbita, de turbith, & cochia, de ag. Hec dentur in vehementissimo dolore. Quod si mitior sit defluxio, purgetur & materia concoquatur syr. detergentibus, & non multum attenuantibus, vel aperientibus, de quibus dictum est de morbo articuli. Mel. syr. ros. de gly. de stechad. in pauca quantitate, syr. cōser corti. citri, mel. anthos. conuenit. Deinde purgetur pilulis scetidis, de sagap. & hermodact. & aliis paratis ex lachrymis, & colocynth. turbith, & aliis fortioribus medicamentis pituitosis. Sunt olea calida, ut aneth. rutac. de costo, vulpinum, lumbricorum, de tereb. in aqua vitæ. Unguenta calida, ut martiatum, aragon. de althea & cœsypus humida, ut axigie serpentis, vbi gallinarum, anatis, vulpis, liquefactarum in vino maluatico, tem-

pore inunctionis adde aquam vitæ. Item sinapismi, vesicatoria. emplastra digerentia, vt de meliloto oxycroceû. Vesicatoria in fine, si alia non profunt. Item cauteria super partem antiqui adhibebant. Cataplasma, quod ex iberide vel nasturtio factum est. & multum prodest, vt, R. iberidis, vel cardamiæ, vel nasturtij terrestris, vel aquatici. ʒ. ij. decoquantur in vino, cui adde farinæ lupinorum, & lolij ana ʒ. ij. iridi, costi ana ʒ. j. flor. chama. melil. ana M. j. axungia porci abluta & liquata in vino decies lb. j. ol. de vermibus, & vulpini ana ʒ. iiij. misce, fiat cataplasma, applicetur supra nates, & vtatur etiam supra emunctoria.

R. rad. bismal. cucum. brion irid. ana q. j. enulæ campan. & hermodactyl. ana q. ʒ. incidantur & decoq. cum iberidis & nasturtij vel rutæ ana M. ij. ʒ. rutæ agrestis ʒ. j. florum, anth. stechad. saluæ ana p. j. sum. thymi ʒ. iiij. decoquantur, vt artis est, & contundantur, quibus adde axungia serpentis, & gallinæ ana q. j. ol. tereb. ʒ. iiij. ol. de spica ʒ. ij. farinæ lupinorû, fœn & lini ana ʒ. iiij. misce, fiat cataplasma, adde de decoctione quantum sufficit, vel,

R. vnguenti martiat. & arago. ana ʒ. iiij. succi enulæ camp. & iberidis ana ʒ. ij. euphorb. castorei ana ʒ. ʒ. ol. lumbricorum, nucum, rutæ ana ʒ. iiij. misce, fiat linimentum, quo vngantur partes inguinum, sedis, & ossis sacri. Inunctio ex oleo de thymo, vel de sabina, & quæ paruo precio emi possunt, vel oleo de spica, quod non minus efficax est ob tenuem substantiâ, & tenuem præparationem, vel extractione, quam recipit. Emplastra enumerata efficaciora redduntur, si in istis olea malaxetur, vel de sulphure apponimus, sed cantharides id subito præstant, sicubus exceptæ & reductæ in formam cataplasmatiss. In hac affectione topica remedia debent non solum apponi in sede, & in emunctorio, vt facilius per eam partem vis medicamenti penetraret ad partes affectas. Clysteres detergentes multum profunt ob consensum, quem habet intestinum rectum cum peristolio, venis, nervis, & illius iuncturæ ligamentis. Ego vno clystere curzui dolorem coxendicum brevissimo tempore, qui sic habet.

R. mal. radic. & bismal. cardamiæ vel nasturt. vel erysomi ana M. j. seminis lini, fœn. ana ʒ. j. seminis fœli,

rutæ

rutæ agrestis ana ʒ. ʒ. flor. chamæ. centaurij minoris, stechad. aneth. ana p. j. ag. asari ana ʒ. ʒ. fiat decoctio, ad ʒb. ij. diss. tereb. abietis ʒ. j. ol. rutacei, anet. an. ʒ. ij. vin. mal. ʒ. ij. misce, fiat clyster. Si alius sit astricta, adde quæ laxat vt hieram, benedictam & similes cõpositiones. Residencia contrudatur & reducatur ad formã cataplasmatidis Adde axungie porci antiquæ, mellis cõmunis an. ʒb. j. applicetur supra partẽ in vehemētissimo dolore. Theriacã recentem, vel mithrydatum, vel compositionem Philonij dare ad ʒ. j. cum vino est vtile, vt alyncritã, vel similes compositiones siccantes & obtundentes sensum sistendo de fluxionem iuuant, sedando dolorem, qui fluxiones excitat & auget. Hæc satis de coxendico dolore.

De dolore omoplata. CAP. LXXXIII.

Dolor omoplatae, qui diu durat, si non est à morbo Italico, curatur iisdem topicis remediis. Quod si dolor ortum habeat à lue Italica, morbi curationem adhibere oportet, sed primùm, vt citiùs mitigetur, purgato corpore inunctione instituere oportet, quæ humorem auertit à parte sudando. Et ne hoc remediũ dolorem adferat, pro remedio primùm inungere oportet partes lōginq̃uas, vt brachia & alterã tibiam tantùm, deinde spinam cum prædictis. Post tertiam inunctionem ad partẽ affectam veniemus vngendo partem. Et quia post alias partes eam inungemus diutius, vt quicquid in parte est, discutatur, vel emplastrum sequens post corporis deffersionem applicemus.

R. massæ emplastri de ranis ʒb. ʒ. arg. viui ʒ. ij. euph. castor. iridis ana ʒ. ʒ. malaxentur cum ol. de spica & applicentur supra coxendicem, vel omoplatam. Si doleat illa interna, vtatur decoctione chinæ, vel gaiaci, vt suo loco dicemus. Si dolor fiat ob eluxationẽ, reponatur, si fieri possunt, & curetur, vt eluxatio, & postea apponatur remedium ad confirmationem partis. Ferant sandalum altius in pede, vt sensim extendatur crus breuius.

De Exanthematis. CAP. LXXXIIII.

Exanthemata hîc appellamus, quod Plinius Pabulas, nostri variolas vocant, cum morbillis magna cognatione coniuncta, quæ *in d'ingra* vocantur. Quo nomine puto etiam variolas dici, vt apud Hipp. ij. epid. Magna

exanthemata euenisse, quem locum Gal. exponens, dicit tu-
 mores in cute sponte efflorescentes à crassis humoribus
 genitis. Addit, quòd tenues humores potius exulcerât,
 quàm tumorem faciant. Crassi cutim in tumorem at-
 tollût. Morbilli verò è tenui sanguine fiunt. Non me la-
 ter exanthemata dici aliquas maculas rubras in febribus
 synochis, & pestilentibus apparentes. Quare nomen va-
 gum necesse est esse. Quare ad horû distinctionem ex-
 anthema pustula dicitur ad differētiam macularum. Fiunt
 autē à sanguine pituitoso, ob id difficilè erumpunt. Pue-
 ris accidunt tumores albi apparentes cum rubore in cir-
 cuitu. Quare pituitæ eruptiones recte Plinius papulas
 appellauit. Nec id impedit, quòd aliqui dicunt à sangui-
 ne menstruo fieri, vel semine. Verùm cū semen melius
 elaboratum sit, melius dicemus à sanguine menstruo fie-
 ri, qui pituitosus est, & puerorum aptum alimētum. Au-
 get suspiciōē, quòd fiant à sanguine mēstruo, quòd se-
 mel tantum accidāt Duplex genus cōstituitur, quædam
 lata, quæ non admodū pruriunt, quæ à crassiore materia,
 & minùs acri, variolæ à Barbaris dicuntur (nostri, *perste*
Serolle.) Alterū à tenuiori materia, ob id altius eleuatur.
 Ob id sublimia appellantur, à Barbaris morbilli, quasi
 parui morbi Epidemius est morb. & contagiosus, qui à
 Rasi pestis dicitur morbus epidemicus contagiosus, &
 maximè exitialis, idq; non semper, sed aliquādo pestem
 præcedit, vel sequitur. Et potissimùm in aëris constitu-
 tione humida & calida, in qua si diu perseueret, solet fie-
 ri pestis. Hæc lues pauca est, ob id non nisi post aliquot
 annos erumpere solet, sed intus latet, donec externa illa
 aëris caliditas hanc materiam ad cutim attraxerit, & ali-
 quē putrefactionis gradū generauerit, & ebullitionem,
 ob quam febris accenditur, à facultate expultrice foras
 propulsarit, in qua tumores parui efflorescunt, dicti,
 quòd turgentium gemmarum modo ad florem in plan-
 tis tumeāt. Hic morbus in cute fit externarū & interna-
 rum partium. Tanguntur, vt in aurium interna parte, &
 trachię arteriæ, ob quæ rauci & aphoni fiunt, dum labo-
 rant, & tūc grauior est, sed illis accidit, qui calidiore aë-
 re nō cōtinentur. Aër enim impedit quo minus humor
 ille attenuetur, discutatur, & in fumum abeat. Tum in
 aliis

aliis partibus internis, in quibus fieret, nisi natura discerneret, etiam si in loco calido continerentur, ut aduenire videmus in his, qui bene reguntur. Quod si à crassis humoribus cuti (ut quidam scripsit) impactis fierent, non in aliis partibus à cute euenirent, & statim apparerent, non post iij. vel v. vel vij. diem. Neque in tali morbo sequeretur ventris fluxio, ut in quibus accidit, nec corrumpentur membra, ut videmus euenisse 1557. Monspeßuli in filio hospitis (*d. s. generaux*) in quo morbus corripit ligamenta iuncturarum, & extremitatem ossium. Fit ergo à sanguine menstruo, qui à constitutione temporis malignitiam accepit. Fit per excretionem, & quia natura conatur coquere, separare, depelleréque quod molestat, nō prima die, sed post quartum diem. Et quia tota materia non expellitur, non cessat febris, ut neque in aliis terminationibus morborum, qui iudicantur per abscessus: quia materia cōclusa in abscessibus putrescit, & effumat, febrem accēsam retinet. Satis de eius cāssa & generatione. Nūc de signis & curatione. Cognoscitur ex cōstitutione, quæ *Signa* præcessit, austruina calida & humida, multos simul inuadit pueros. Primum febricitant cum dolore dorsi & capitis, pandiculationes & oscitationes crebre ob conatum expellentis facultatis. Spirandi difficultas ob venæ magnæ tumorem ad infra, tussis inanis, item punctiones & lassitudines toto corpore, facies rubra, & tumida, in qua incipiunt maculæ rubræ vel pustulæ, in aliquibus tam densæ, ut sese contangāt. In aliis paucæ, quia meliori sanguine præditi sunt, & minus pleni. Fiunt albæ & rumpuntur, & sanies vel pus fluit, & crusta fit & coalescit. In aliquibus herpetis modo cuticulam summam tantum occupat, & in aliis nullum vestigium remanet. Talia ex tenuiori materia fiunt. In aliis vestigia & cicatricæ manifeste apparet, unde faciei defœdatio accidit. In aliis fit, quia non aperiuntur, & sanies illa crassior corrodit cutem subiectam, facit vestigium, quia pueri frangunt vnguibus ante maturationem, & sic faciunt, ut cutis defœdetur ob violentam tractationem. Quare nec nimium retardare, nec nimium festinare oportet in eorum apertione.

CVRATIO.

Curatur clementer purgātibus medicamentis, ut cass,

cath. syr. ros. lax. Deinde si hic morbus fiat in iuuenibus, in quibus ob virium robur & ætatem licet mittere sanguinem, à missione sanguinis incipiūt, sed hoc in primo vel secundo die tantum, non à basilica, sed potius à vena extremarum partium, vt à saluatella, vt euacuando iuuenimus naturam & euacuemus à partibus, in quibus magis redundat humor noxius. Si non liceat, mittere sanguinem, vtilissimum est paruas cucurbit. supra externas carnosas apponere cum leui scarificatione, deinde si quis vnguento resumpt. vel. ol. amygd. dulc. corpus inungat ad ignem, multum iuuabit, vel aqua calida sola, vel in qua flores cham. & melil. vel mal. decoxerint, præstātissimū. Hoc didici ex Hipp. verbis 7. Epid. partic. 2. Aph. 13. vbi ita scripsit: Pustulæ latæ non admodum pruriginosæ, quales Simo habebat, in hyeme, qui dum ad ignem vngeretur, vel calida lauaretur, iuuabatur. Vomitus nō proderant, quod si calidis fouisset, illi profuisset. Ex hoc aph. discimus curationem præcipuam esse euacuationē per cutem. Quia quò natura vergit, per loca conferentia. Quod in com. Gal. his verbis docet, Humores ad cutim procumbentes per illam essent euacuandi, quandoquidem longa minus via est. horum rursus ad interna reuulsio, vt per vomitum vel per aluum materia vacuetur, & sic quod de medicamentis supra scripsimus, istis pugnare existimetur, quæ sequuntur Gal. verba subiiciam, quibus docet aliquando esse purgandum. Putabis inquit, forsā me asserere nūquam in talibus purgationem esse ex vso, quæ per aluum fit. Ego verò non id dico. Nam in curatoris lib. edoctus es. iis purgationes esse opportunas, in quibus multa sit humorum affluentia. Etenim nisi quod prius in ipsis redundat, aut sang. missione. aut purgatione detraxerit quispiam, voluerit solum fouere, & vso calidorum medicamentorum discutere, plus sanè attrahet, quàm per cutim euacuetur. Veruntamen humorum cuti impactorum curatio prorsus foru calidorum medicamentorum perficitur. Nam indicio sunt humores, quibus illæ constant, satis crassi & frigidi. Sufficiunt ad præparationem, quæ à nobis sunt instituta, quia hoc facimus, priusquam erumpant, quo tempore maxime febris vrget, quanquam Galenus interpretatur *ἐκ τῆς πυρετοῦ*

vehementi aliquo calido fouere *ἐξ ὑπερμεν*, vehementer calfacientia. Hoc non esse faciendum, quia hoc non hyeme, in Simone ob cutis densitatem, & temporis frigiditatem, spissitudinemque, & humorum delitescentium copiam faciebat. Quare in calido contineatur, & in cubiculo clauso calido, inuoluatur pannis rubris aut integatur. Hoc enim mouet sanguinem, & Gal in lib. defiguratione empyrica docuit. Et quò facilius humor erumpat, iuuanda est natura assumptis portionibus, quæ ad cutim moueant, & humorem attenuent: tale est vñ receptum, quod ex radicibus aperientibus, & sicibus paratur, quæ ad cutim pellunt, vt

℞. radic. gram. aspar. fœnic. ana ʒ. iiii. j. liquir. ras ʒ. ss. fol. acetos. M. j. fic. N. xx flor. cor. p. j. fiat decoctio. In lb. j. dissol. syrup. acetos. simpl. vel limon. ʒ. iiii. sacch. parum, fiat syr. aro. & capiat serò & manè ʒ. iiii. donec tota facta sit expulsio.

Quibus partes muniantur.

Verùm priusquam ista fiant, oportet repellentibus aliquas partes munire, ne illis fluant. Nam solent partes illas corrumpere, vt oculos, vnde accidit multos cæcos fieri ob talem morbum. Quare croco in aqua ros. diss. palpebras illinunt semel practici. Verùm id frequenter faciendum, & in oculum mittendo palpebræ nihil mali patiuntur, verùm internæ partes. Quare in oculum mitte e oportet, illud magis conuenit, quod digerat & repellat. Si enim solum repellens apponatur materia, iam defluxit, firmatur, tota retinetur, & oculum corrumpit. Os quoque & asperam arteriam præseruare oportet gargarismate leuiter repellente, & detergente, fiat hoc modo.

℞. aquæ ros. & peculi an. ʒ. iiii. hord. mund ʒ. j. gly. ʒ. ss. fiat decoctio in aqua diss. vini mali gran. ʒ. iij. abluat frequenter os, & gargariser. Teneat in ore sacch. ros. in aqua frig. immissum, donec facta sit expulsio, qua facta ad tumores curam conuertere oportet. Possumus eorum maturationem iuuare leuiter inungendo pingued. porci liquefacta, penna inungendo faciem, & cum ad maturationem peruenerunt, acu pungendi Nihil refert siue si aurum, siue ferrum, modò acu ex ære non pungantur. Post crustarum casum corio porci salito fricare cutim,

oportet. Quòd si inæqualis sit cutis, in parte etiam illa inæqualis durat. Vel frequenter faciè lauare decoctione hord. integri, & mal. deinde nouacula radere, quasi barbam, deinde vngüeto albo Ras. totam facièm inungere, vel vnguento citri. Faciunt ista vngüeta, vt minùs appareant maculæ, quod efficacius præstat inunctio ex pinguedine asini. Minùs volunt foueri calidiss, quia materia calidior, & acrior, sed citius aperiendi, nè cutim arro-dant. Ablatio illa ex decoctione hord. facièda, & illi-nitio ex cerusa, litharg. apponenda post deterfionem. Hec pro cognitione & curatione latorum exanthematum.

De scissuris. CAP. LXXXV.

Scissuræ fiunt cum cutis aut externa pars carnosà diuiditur, & finditur, vt cutis vètris in vtero gerentibus & in hydropicis quibusdam, in vola manus & planta pedis, in diuisione digitorum, in palpebris, & labiis, præputio & ano ac sede prouenientibus fiunt scissuræ ob cutis tensionem à plenitudine, vt in vtero gerètibz & hydropicis in manu ac pedum vola à morbo Ital. ob retétionem seri biliosi retenti sub tendine. Ab eadem causa in diuisione & radice digitorum inter digitos in palpebris à siccitate in frigida & sicca constitutione, in his qui frigidiorè & aridiorè sunt temperatura, in minoribus ob frigus constringens. In præputio ob biliosum serum.

R. ouorum vitellos N. ij. frigrantur in sartagine cum seuo hirc. donec diss. deinde in mortario conieratur, adde ol. ros. vel myrtil. parùm sarcocol vel mastic. vel gummi torrefacti tenuissimè puluerisando & miscendo, fiat vnguentum, vngantur labra. Idem faciendum in podice & ano. Verùm quandoque sunt carnis excrefcentiæ. Quæ causticis sunt minuendæ, carnem deinde, siccantibus & astringentibus siccandæ, & ad cicatricem ducendæ. Quomodo minuenda sit caro illa podicis, dictum est cap. de ragadiis ani Si à morbo Italico sit, curare oportet tot remediis ad mor. Ital. determinatis, & fortiter exiccantibus, vt illa tota materia absumatur, curationem ex libro nostro de morbo Italico quære. Fiunt etiam post sudationem imperfectam, & ante, & nōnunquam sine morbo Italico, vt nec parallela. Præcauentur, mitigantur & curantur prohibendo, ne causa effectum suum admit-

tat, vt si à frigore & siccitate fiat in labiis, pomata, & quæ partes calfaciet. & humectabit, curabit & prohibebit. Si à caliditate & siccitate, mucago gummi tragac. vel cydoni. extracta cum aqua viol. vel mal. curare oportet. Si ob astrictionem, laxando cutim ol. amyg. vel lilio. vel butyr. vel xung. galli anser. anatis porci. Factæ istæ scissuræ ad curationem siccari desiderant, quia est solutio vnitatis, & vlcus leue. Verum, quæ in palpebris vel in præputio, vel in auribus, siccari magis desiderant, tum ob solutionem vnitatis, tum ob temperaturæ conseruationem. Ergo in illis partibus vnguenta ex malacticis, vel ex pompholige, ex lithargyro, xungia, addito seuo arietinis, vel hirci. Si verò in labiis fiat, vel in ano, vel in podice, seuum dissolutum cum ol. ros. & cera sufficiet, mastich. addita vel terebinth. Vel parerur vnguentum ex vitello oui indurato, & oleo.

De scabie qua psora Græcis dicitur. CAP. LXXXVI.

Scabies Latinis, Græcè *ψώρα* dicitur, quæ non multum ab Alopecia Græcorum differt. Scabiei multæ sunt differentię, vt vulgus vocat. Est pruriginosa scabies, in qua pustulæ paruæ sunt, sed materia falsa & acris est. Alia est, in qua pustulæ maiores & albæ, & ad suppurationem veniunt, sed illa serosa est, & pituitosa, ob id minus pruriunt. Est alia differentia, quæ latas pustulas habet, & in circuitu rubescunt, & sunt veluti paruæ inflammationes cuticulæ, ad differentiam furunculorum, qui in carne fiunt, & ex sanguine crasso. Est quarta species, quæ malum mortuum dicitur. Est scabies à sanguine melancholico à crusta multa, quæ fit in tibiis, & difficilius curatur, curata recrudescit. Vnicuique instituenda sunt remedia vniuersalia & topica. Vniuersalia ad materiæ antecedentis euacuationem serosæ substantiæ, pituitosæ, vel melancholicæ aut sanguinæ præscribi debent. Si enim sint serosi humores à bile, pruritum faciunt & veluti pustulas aquosas, quales fieri solent in herpete miliari. Sunt autem remedia ad illa serosa recrementa, syru. ros. laxatiuus, syr. de fumar. simpl. serum lactis, vel apozema ex serosa purgantibus vel alterantibus humorem & mundificantibus serosa recrementa, vt

R. cass. nouiter extractæ ʒ. j cum saccharo fiat bolus.

Ad idem valet diaprun. simpl. vel diasebest. ad 3. j. vel syr. rosarum laxat. ab 3. j. ad 3. ij. cum decoctione lapati acuti, vel acetos. vel cum sero lactis. Si frequenter his vtamur, poterit purgari: si verò vno tantum apozemate, diutius erit vtendum. Nam cum materia sit in venis magnis & paruis, oportet sæpius & diutius purgare, vt non solum, quod in primis venis est, vacuetur, sed quod sanguine permixtum est.

R. rad. lapa. ac. 3. ℥. cichor. end. borrag. bugloss. cicla. merc. scab. fumar. an. M. j. prun sebest. an. N. 20 tamar. 3. j. sen. orien. 3. iij. flor. cord. an. p. j. fiat decoctio in aqua end. fumar. & aqua fontis, vel in sero capri. & in ℥b. ij. col. diss. syr. de fum. compos. 3. iij. sacch. parum, fiat syr. medice coctionis, vtatur quinque dosib. Vltima dosi adde robustis gr. vj. diagrid. nobilioribus infusionem 3. ij. rhab. Aliis robustiorib. 3. ij. de succo ros. vel confect. hamech. Vtatur optima victus ratione, quæ cacochymiam bilis emendet. Si videatur non satis corpus purgatum, rursus purgetur modo præcedenti, interpositis tamen paucis diebus, deinde vtatur balneo sequenti.

R. rad. elenij & lapa. acu. ℥b. j. cicla. parietar. & saponariæ ana M. ij. flor. anth. chamom. an. p. j. fiat decoctio pro bal. cui adde salis ℥b. iij. natet. & si non curetur, vtatur sequenti vnguento.

R. vnguenti enulati 3. iij. litharg. 3. j. cerus. lotæ 3. ℥. chalcit. 3. ij. arg. viui extincti in suc. limonum 3. ij. misce, vngantur volæ manuum, Vel sic.

R. resina 3. iij. terebint. lotæ in aqua ros. 3. ij. cerus. lotæ in aqua fumi 3. j. litharg. loti in aceto 3. ℥. arg. viui 3. iij. succi limonum, vel aranc. 3. ij. misce ad formam nutriti, fiat vnguentum.

Si pituita salsa morbum faciat in senibus, purganda erit pituita hoc modo.

R. syrup ros. 3. ij. mellis ros. 3. ℥. aque bugloss. & capil. ven. an. 3. j. beth 3. iij. misce.

R. radic. elen. & liquir. ras. ana 3. ij. beton. bugloss. borrag. merc. herbarum capil. an. M. j. fumar. cicla. fol. brass. marinæ ana M. ℥ seminis earth. 3. iij. flor. anth. & bugloss. an. p. j. hordei & cicer. rub. an. p. ℥. fiat decoctio in duabus partibus aquæ fontis, & vna absynth. ad ℥b. ij.

℞. ij. quibus diss. mellis rosati 3. iij. syr. ros. lax. 3. v. sacchari quantum sufficit, fiat syru. coll. & arom. 3. j. diarrh. abb. cap. quinque matutinis. Finitis syrupis dentur 3. iij. diacarthami vel de citro solutiui, & dissolue in vna parte decoctionis, vel detur 3. β. in decoctione mercurialis, & 3. ij. syrupi rosati laxatiui. Fortiora vsurpare oportet in omnibus affectibus, qui sunt in habitu corporis, vel mitioribus frequenter vtendum est, postea vngantur partes affectæ sequenti vnguento.

℞. vnguenti enulati 3. iij. terebint. 3. ij. arg. viui 3. j. syr. ij. misce, vngantur manus sero, cum ibit dormitum. Si à materia melancholica vel ex assatis humoribus fiat, purgetur sic.

℞. cath. 3. ij. diaphe. 3. j. dissol. in decoctione mer. & 3. j. syr. ros. laxatiui.

*℞. bugl & liquir. an 3. j. radic. enulæ 3. β. pass. mundatarum & prunorum, sebest. an. N. xx. anisi 3. iij. polypodij quer. 3. iij. seminis carth. senæ orientalis, summatatum thymi an. 3. ij. chamom. bugloss. & borrag. an. p. j. tamarind. elect. 3. ij. fiat decoctio. *℞. ij. col. diss. syr. viol. & ros. laxatiui an. 3. iij. syr. de fumo 3. vj. misce, arom. cum 3. ij. diarrh. abb. capiat quinque matutinis.**

℞. confect. hamech. 3. ij. diaph. 3. ij. diss. in vna parte decoctionis vel in decoctione merc. cum 3. j. syr. ros. lax. fiat potio. In crastinum medicamenti cap. 3. j. theriacæ electæ.

℞. vng. nutriti 3. ij. litharg 3. j. cerus. lotæ in aqua 3. j. β. arg. viui 3. iij. terebint. 3. j. β. ol. ros. 3. iij. succi lap. acu. & succi limonum an. 3. ij. misce, vngantur partes.

℞. cerus. lotæ lithar. an. 3. ij. plumbi vsti & loti, antimonij an. 3. ij. calchitis 3. iij. vnguenti pompholig. 3. iij. arg. viui 3. iij. ol. ros. & irini an. 3. ij. succi plantag. lap. ac. & limonum an. 3. j. incorp. argentum viuum cum 3. iij. axung. porci, deinde misceatur aliis. Si ad lepram venerit, vratur vnguento nostro libra de formis composito ex ol. nucum & tartaro, quod in fine apponemus. Hoc vnguentum, quod manè apponemus, est commune omnibus, & simplicissimum. Fit autem sic.

℞. olei ros. 3. iij. sulphur. viui 3. j. succi limonum 3. ij. resinæ pini 3. iij. misce, vngatur vltima manu.

*Vnguentum extractum ex Formis remediorum ad psoram,
lychenes & huiusmodi vitia.*

R. ol. de iunipero 3 ij. ol. nuc. 3 j. tartari vini alb. 3. j. vitrioli. salis communis, sulphur. an. 3. iij. terebinth. lotæ in succo limonū 3 j. lithar. 3. j. β ceræ parum, fiat vnguentū. Si morbus fuerit contumax, adde arg. viu. 3. ij. sublimati 3. ij. & erit efficacius. Applicetur post purgationem & balnei vsum, vt mollescant crustæ, & citius penetrer, vel
R. ol. de iunipero 3 iij. ol. lucernarum & nucum an. 3. ij. tartari vini albi nouiss. pul. 3. j. β. vitrioli, salis communis an. 3. iij. litharg. auri 3. iij. incorpor. simul, quibus adde succi plantag & limonum ana 3. iij. aceti squill. 3. j. incorp. simul & fiat nutritum.

De Elephantiasi. C A P. LXXXVII.

MOrbus hic si extra dispositionem sit, non curatur. Nam vt cancer particularis non curatur, sic nec elephas, qui vniuersalis cancer dictus est ab antiquis. Cur nō curetur, in causā sunt permulta. Primū qui hoc morbo laborant, vel nō conuenientibus, vel nō opportunis & suo tēpore remediis vtuntur. Solent enim Medicos cōsultare, cū iam morbus à dispositione ad habitum transit, quo tēpore partiū substantia læsa est & absumpta. Tunc certē morbus incurabilis est tum quia materia in partes remotas recepta est, & ita inueterata & incuneata, vt sibi reddiderit carnem similem, quæ materia medicamentis laxantibus euacuari amplius nō potest: tū quia digerentibus & aliis propriis remediis propter crassitiē & distantia non potest discuti. Adde quod intēperies illa sicca emēdari nō potest vt in aliis à siccitate morbis. Hoc autem ob humidiorū remediorum imbecillem agendi vim, tum ob magnam partium siccatarum resistentiā. Adde quod calor imbecillus est, qui actionē digerit, & partes sicciores redditæ, dēiores factæ sunt, quam ob causam vis medicamentorū penetrare nō potest. sine qua morbus educi non potest. Curatur, cū est in dispositione. victus ratione, & medicamentis. *V*ictus ratio debet esse euchyma & humida semper. aliquādo frigida, vt cum ab adustione bilis fiat: Minus autem, si ab atra bile, vel pituita affata. Commendant, quæ sanguinem temperant, quæ crassitiē dissipent, & dilutiorem reddant. Laudantur pisces aliqui

Curatio.

Victus ratio.

saxatiles, & qui carne sunt media, qui crassa carne & nitrosa, mali, vt polypus, sepiæ, loligines. Ex crustaceis locustæ, astachi, & cõchilia, ostrea, scabulæ dulces laudantur. Permittuntur pectines & petunculi, quia dulces & succum faciunt minimè nitrosum aut falsum. Olera etiam, quæ sunt humida, vt lact. borrago, spinachia, intybus domesticus commendantur. Vituperantur caules & beta, & aliæ herbe odoratæ. Fructus humidus, vt pepones, cucumeres, cucurbitæ, nõ sunt reiciendi. Legumina omnia & salita & acuta, omnino fugienda, falsamenta etiam, quæ linguam pungunt. Instituta bona victus ratione humectante imperantur otium, quies, & somnus, & quæcunque humectare & saginare corpus solent. Nimia corporis motio, & frequens vsus fructuum, balneorumq; morbum citius producere faciunt. Quare omnia hæc moderatè facere oportet. Purgetur leuiter medicamentis eprocoticis, vt cassia, cath. diasebesten, diapruno, syr. ros. lax. In crastinum, si ætas permittat, trahatur sanguis, primùm ex duabus tibiis, deinde ex brachio. Quod si sanguis crassus & ater, trahatur ad vires diuersis horis. Quod si tenuis, sistendus. Item si membra incipiant lædi, non inutile erit è venis, quæ sunt inter annularem & paruum digitum. Item è venis frontis, sed hoc est faciendum post corporis purgationem, vt sanguis ater euacuetur, qui immediatè morbum facit & fouet. Sanguis enim in habitu corporis per harum venarum extremitatem euacuatur, vt in quartana venam aperire, quæ est inter annularem & paruum digitum, oportet sæpe in processu febris, quia quasi materiam coniunctam euacuant, sic certè in his. Quare & cucurbitulas, & sanguisugas laudo post internarum partium rectificationem, & humorum euacuationem. Dato igitur minoratio mittatur sanguis è venis maioribus, deinde coquatur humor syr. sequenti, & postea euacuentur excrementa.

℞. radic. bugl. borrag. an. ʒ. ij. radic. glycy. ʒ. j. radi. graminis, aspar. cortic. radic. capp. & tamarisci, populi, si obstructio, vel tumor in splene appareat, vel à melancholia crassa fiat. Si à sanguine vel bilis afflacione fiat, prætermittatur: sed adde herbarum capill. bugloss. borrag. viol. lentic. aquæ cichor. endi. lactucæ ana M. j.

pass. mundatarum 3.ij. qua. semi. frigid. maiorum ana 3.ij. anisi 3.j. fiat decoctio in aqua hordei ad lb. ij. in quib. diss. syr. viol. de fumo. simplic. vel de cucurbita lb. j. fiat syr. aromat. cum 3.ij. triasand. capiat in sex dosibus. Interea tertio quoque die iniiciatur clyster sequens.

R. merc. borrag. ciclae an. M. j. anisi 3. lb. seminis melon. cucurb. ana 3.ij. florum cham viol. borrag. ana p. j. fiat decoctio ad lb. j. lb. diss. mell. viol. lohot de cass. an. 3.ij. succi mere. 3.j. lb. ol. viol. 3.ij. misce, fiat clyster. Curandum est, vt die præcedente medicamentum, clyster iniiciatur, quò medicamentum facilius & citius ad intestina descendat, & à corpore egrediatur. Medicamentum purgans in forma humida minùs siccatur, deinde in forma boli. Quòd si non licet facere aliter, in forma pul. vel pilularum quæ siccant. In for. liquida parabitur sic.

R. radic. bugloss. gly. ras. ana 3. j. polypod. querc. recentis 3.ij. pass. xxx. prunorum, sebest. an. nu. xx. senæ orientalis 3. iij. summit. thymi epith. cuscute an. ij. anisi 3. lb. florum cord. an. p. j. fiat decoctio & in qr. j. col. diss. confect. hamech. 3. iij. syr. ros. lax. 3.ij. misce, fiat potio, capiat manè. In crastinum rursus capiat de eadem decoctione in syr. redacta perfecte coctum cum decoctione borrag. & mercurialis.

R. decoctionis præcedentis lib. i. sacch. q. s. fiant syr. addendo syru ros. lax. de fumo terræ an. 3. vj. capiat, in crastinum medicamenti 3. iij. vt diximus, cum decoctione mercu. & borrag. Et hoc debet esse còmunè præceptũ in omnibus morbis, qui fiunt à melancholia, vel quorum materia est in habitu, vt duobus vel tribus diebus continuis euacuetur. Primum medicamentum excrementa ventriculi & intestinorum deterget: secundum materiam trahit & euacuat: tertium retentum euacuat & morbum eradicat. Habenda erit ratio materiæ, vt si à sanguine assato, vel à pituita, vel à bile, addenda erunt medicamenta, quæ materiam euacuant antè dictam, siue dentur pilulæ, siue pulueres, siue syr. Si bolum æger desiderat, paretur ex confectioe hamech, vel diaph. vel indo maiore, addendo pul. diasenæ solutiui, vt

R. diaph. 3. ij. confect. hamech. 3. iij. cum 3. j. pul. diasenæ & sacch. fiat bolus.



GVLIELMI RONDE-
LETII DOCTORIS MEDICI,
ET MEDICINÆ IN SCHOLA

MONSPELLIENSI PROFESSORIS

*Regij & Cancellarij. ad citò & facile
omnes morbos cognoscendos optimo
ordine descripta Methodus.*

P R Æ F A T I O.



OTA medici cognitio in his duobus sita est, scilicet in corporum cognitione, & remediorum. Corpora vel sana sunt, vel ægra, vel neutra. Necessariò enim tertia constitutio ponenda est ei, qui vult rectè corporis affectibus occurrere. Nam qui neutram habent dispositionem, inculpati sanè non sunt, neq; læsas habent manifestè actiones, quod est de morbi essentia. Quare cum neque ægra neque sana sunt, ideo neutra sunt & dicuntur. Illa sunt, quæ parata sunt ad morbos, & iamiam à sanitate labi incipiunt. Nunquam enim aliquis transit ab exacta sanitate in morbum, nisi per mediam constitutionem, quæ neutralitas decidentis in scholis dicitur. Nec contrà à morbo ad perfectam sanitatem deuenit aliquis immediatè. A crisi laudata febris sanè cessat, nondum tamen verè sanus euadit æger. Nam ad vitam necessariis muniis nondum fungi potest, non tamen æger dicendus est, cum materia morbi victa sit, & còcta per aliquam excretionem vacuata. Is cui materia à parte in partem delabitur, neque euacuatus, neque à morbo liberatus, neque sanus: at ille cui per conuenientem regionem materia euacuata fuit, à morbo liberatus censetur. Hæc vltima constitutio in scholis neutralitas conualescentis dicitur. Hæc autem medicus confide-

rat, vt sana conseruet, ægra curet, in neutra verò decidentiz, futurum morbum prouidentia præcaueat: in neutra conualescentiz dispositione, vires *διαληπτικῇ* reficiat, atque foueat.

CAPVT I.

Corpora sana faciliè dignoscuntur ex constitutione secundum naturam ad faciendas actiones idonea, neutra nõ tam faciliè, ægra facillimè, cum statim ac muniis ad vitam necessariis fungi nequeat aliquis, ægrum dicimus. Laborant autem vel partes aliquæ, vel omnes simul partes similes in temperatura, nulla existente in instrumentis morbi specie: vel instrumentis morbi accidunt, sine manifesta intemperie, vt & solutio continui, vel contigui sine intemperie manifesta, non tamen absque vitio figuræ. Hæc autem sunt in morbis cognoscenda.

Quid in medicamentis aduertendum. CAP. II.

*Alimenta
remedia
sunt.*

Altera medici consideratio est circa remedia quæ sunt alimenta & medicamenta: Medicamenta vt ferrum, ignis. Alimenta enim remedia extenso vocabulo dicuntur, quòd & sanis resarciant deperditam substantiam, & quòd vim immutandi corpus habeant aliquam in principio, quòdque à calore vincantur, ob id dici possunt & contraria, & conferentia. Horum cognitio valde necessaria est: Nam nisi quis dextrè vtatur, non sunt remedia, sed lædunt & non conferunt. At nemo his dextrè vti potest ignotis viribus, id est quantitate, vsu, occasione, forma: de quibus omnibus abundè alio loco diximus. Quare de corporum morbis, & causarum cognitione hoc loco tantum agemus.

*Alimento
rum cogni-
tio neces-
saria est.*

Quòd Medico non sufficiat illa &niuersalis cognitio corporum sanorum, ægrorum, & neutrorum.

CAP. III.

Idiotæ perfectè sanos & manifestè ægros rudi quadam cognitione etiam agnoscunt, quæ medico necessaria quidè est, vt sit inuestigationis velut carcer, ad exactam & singularem morborum cognitionem. At non sufficit ob singularem ægri, & peculiarem naturam *ιδιοπαθῶν* morborum. Non enim curatur morbus, sed hic morbus non curatur in homine, sed in Callia & Socrate

ob subiectum particulare, quod indiuiduum quadam proprietate dotatum est. Morbus alius est non in specie, sed in magnitudine, vehementia, paruitate, ac remissione, aut in magis, aut minus periclitando. Ob hoc non solum in curandis morbis contrarietatem remediorum inuenire oportet, sed & iustam quantitatem, quæ à morbi magnitudine, tempore, loco, & consuetudine indicatur. Quemadmodum enim non sufficit communem phlegmones curationem, ex morbi essentia cognouisse, sed ex varietate partium, insita facultate, & sensu (Nam & ob partium temperamentum & situm, medicamentorum copia augetur aut minuitur, indicationes secundas sumere oportet ad perfectam morbi curationem:) sic ad perfectam morbi cognitionem necessaria est morbi cuiusque particularis proprietas, ut ea cognita iustam quantitatem, & conferentis remedij speciem inueniamus: quod non solum contrarium esse debet, sed est parti affectæ accommodatum, secundum indicationes particulares, quas suprà enumerauimus.

*Morbus
alius non
in specie,*

*Quod sit facilius in principio morbum curare quàm autem
aut perfectè factum.* CAP. IIII.

Morbi cum futuri sunt vel incipiunt, in dispositione quadam tantum sunt. Qui verò facti sunt, in habitu sunt: At qui augentur, mediam naturam obtinent. Ergo minori negotio futuros morbos inhibebimus, & inchoatos curabimus, quàm qui in *scilicet*. Dispositio enim est quæ faciliè aufertur, habitus verò qui difficilè. Possumus enim præscribere medicamenta leuia, quibus assumptis non solum futurus præcauebitur, sed etiam inceptus destinetur, quod non faciliè fit in factis. Sic nonnunquam aliquis medicinæ peritus poterit hecticam incipientem balneis curare, vel epithematis superpectus appositis, vel alimentis refrigerantibus, & humectantibus: Marasimum verò quia est morbus iam confectus, nunquam possemus, alioqui hominem reddere immortalè, vel in plures annos vitam producere. Quæso quis non posset ophthalmiam incipientem sanguine misso, & usu repellentium & astringentium (si plethoricum non sit corpus vniuersum, neque cerebrum) vno vel altero die curare, ut fecit Gal. Quod si iam iam mul-

*Cassa
morbi, &
morbus
cognos-
cendus.*

ta decubuerit materia, hæc non possunt sufficere, sed per partem, quicquid influxit, vacuare oportet, quod statim fieri non potest, nisi natura concoxerit, quæ non nisi tēpore concoquit. Vt ergo id possimus facere, oportet non solum morbo factos, sed futuros quoque præcendere, atque incipientes, & maxime acutos, vel peracutos intercipere, in quibus eadem die medicari oportet, saltem intra diem tertium, aut primo, si fieri potest, aut etiam eadem hora, quia ex Hipp. tardare periculosum est, neque expectanda concoctio, quia sæpè nulla fit, aut antequam fiat æger moritur: quod fieri non potest, si neque causam, neque morbū statim agnoscas. His autē ignoratis, neque victus rationem, neque medicamenta morbo congrua præscribere poteris, quæ recta ratione præscripta morbos in dispositione curare solent. Solent enim peracuti esse, quia inflammatio est in interna, vel putredo magna est in magnis vasīs. Ad inflammationem curandam non sufficit euacuatio à quauis parte, sed per cōuenientem regionem, & *ubi* *et* *quādo* facere oportet, & id in principio, quia reuulsio in principio tantum fieri debet. Quod si non agnoscat incipientē morbum, id non poterit exequi medicus, tūm quod si medicamentum phlebotomiæ loco præscribat, non leuiter peccabit. Est etiam facilius morbis futuris occurrere, quam inceptos, vel factos, aut incrementos curare. Nam facilius est causas illas auferre e corpore, cū adhuc validus est æger, quā iam fractis viribus. Quis non videt sanā corpora esse fortiora, & vim medicamenti vehementioris perferre facilius? Quare facilius erit illos noxios humores, quia pauciores & minūs sunt permixti, euacuare, quā post longum tempus ob dictam causam. His accedit quod remedia, quæ causis auferendis apta sunt, morbos frequenter augent, vt ferè omnia cathartica, quæ data ad pituitæ euacuationem in febribus pituitosis, febris calorem augent, vt cholagoga in biliōsis. Primò nocent, quamuis secundò vtilitatem expēriamur. Quæ astringendo repellunt in inflammationibus, iuuāt initio: sed vbi dolor est ingens, illum intendunt, neque illis vti est bonum. Erit ergo præstantius & vtilius, vt repellentibus, & alijs medicinis vtamur in neutralitate

trahente decidentia, aut saltem primo morbi insultu. Est enim præstantius & vtilius morbos incipientes novisse, quam iam factos. Nam quid proderit marasimum novisse, aut elephantiā factā, aut Cancrum exulceratum, aut scirrhum exquisitum (id etiam plebei norunt) neque iam curationem recipiunt, quod ut prædicemus cognitu est necessarium, vel ne Empyricorum more tales curandos suspiciamus, & sanitatem polliceamur.

Quod non sit facile morbos cognoscere, & quæ eorum cognitionem obscurant. CAP. V.

Prestantius quidem est futuros prævidere morbos quam factos cognoscere: verum id cuius non licet: quia morbi cum inchoantur, herbis nascentibus similes sunt, quæ non nisi ab exercitatissimis discernuntur. Pauci enim Lactucas à Betis primò distinguunt, sic certè morbi aliqui adeò inter se sunt similes, ut sit difficillimum illos ab invicem distinguere. Pauci febrem spuriam duplicem, à quotidiana distinguunt: inflammationem lateris à Peripneumonia, & iis maxime qui pulmones costis alligatos habent: aut hepatis inflammationem à pleuritide partis dextræ item febres continuas vix à se invicem distinguunt. Huius rei causa est materiæ similitudo, affectiones eadem vel similia accidentia, partium vicinitas, aut continuïtas, vel situs, vel consensus, vel morborum multorum concursus, & symptomatum vehemètia, quæ morbos occultat. Morbi enim cum ab eadem materia antecedere fiunt, hoc nos solet decipere, ut in febre, synoco non putri, & putri videre est. Sunt enim difficiles cognitu, ut exactè distinguantur, eandem habentes materiam, quæ in venis iisdem consistit, accidentia ferè eadem, & exitus idem: ob id valde exercitatum in morbis cognoscendis oportet esse medicum, qui duas has febres distinguere voluerit, quæ sola acrimonia caloris à putredine nata distinguuntur, ut postea monstrabimus. Febris tertianæ & ardētis eadem est materia: ob id in utraque tertio quoque die fiunt exacerbationes: situ tamen differunt, quòd ardentis materia putrescat in venis cordi & ventriculo proximis: quò fit ut præter alia accidentia, quæ solent comitari febres biliosas, sitis inextinguibilis, linguæ nigredo, & ariditas eis accadat, quæ

Similitudo opposita.

Quibus duæ distinguuntur feb. putris à non putris synocha.

*Ardentis
à tertiana
distinctio.*

ardente laborant, & illis notis à tertiana continua differt. Tussis, difficilis respiratio in pulmonum affectibus, & aliis quæ thoracem infestant, huiusmodi affectionum confusionem faciunt. Vicinitas renum & coli inuolutio nephriticum dolorem cum colico confundit: continuitas extremitatis penis cum vesica horum affectus confundit. Parùm cauti medici morbum esse in ea parte, ex

*Distinctio
affectionis
vesicæ,
penis.*

doloris sensu colligunt, decepti quòd sensus maior sit in vesicæ extremo, quàm in reliqua parte: quia partes extremæ magis sentiunt quàm internæ: quod probatur exemplo morborum, qui in extremitatibus sunt, vel hac ratione, quia nerui in extremitatibus coniunguntur, virtus autem coniuncta, fortior est seipsa dispersa. At huiusmodi affectus distinguuntur partis reiectione. Nam extrema parte exulcerata pus euicitur sine lotio: quòd si interna sit affecta, semper cum lotio exit. Dolor qui ad claviculam ascendit, multos decepit quotidie in hepatis inflammatione, & dextræ partis pleuritide distinguenda. Morborum diuersæ & variæ species cognitionem nostram impediunt, & maxime qui inter se similes multum sunt. Quamobrem operosa est omnino nostra cognitio: diuersitas enim parit confusionem. Si vnicus esset morbus, ab omnibus facile & breui cognosci posset, si duo, nõdum esset difficile: cum plures sunt, iam promptum non est: verum in tanta morborum & symptomatum confusione & varietate, quis potest negare vnum exactè cognosci morbum? Solet & symptomatum vehementium concursus, morbi cognitionem obtenebrare: eorum quippe magnitudo obscurat, vt maius lumen officit minori.

Quòd cerò cognoscere poterit, & futurum prauidere morbum prudens medicus. CAP. VI.

FVtutorum morborum duæ sunt species: Alij enim paulò post, alij post lògum tempus fieri solent. Horum aliqui cognoscuntur, alij nullo modo cognoscuntur. Non enim cognoscuntur qui causas aliquas habent fortuitas, non necessarias, vel communes multis, multas & tardas, quæ interuenientibus multis medijs suum effectum producere solent, & hi à prudētibus, & causis cognoscentibus prænoscuntur. Qui paulò post euenire

nire solent, dispositiones euidentēs, & occasiones manifestas habent, & necessarias vnius effectus causas: quare non est difficilis eorum cognitio: omnia enim futura ex causarum præcognitioneprehenduntur. At causæ morborum aliæ sunt internæ, aliæ externæ. Causæ externa non necessariò effectum producit, nisi interna moueat in morbis materialibus: interna autem multò certius. Calor enim solis, vel cursus, vel calidum alimētum, non semper febrem accedit, nisi accedat corporis dispositio, quæ facit vt leuis causa multum possit, vt qui obstructionem habent, & cacochymia laborant, facillimè in febres à causa externa incidunt. Id autè ratione etiam physica colligimus. Nam causæ omnes suum effectum producant, si dispositio corporis, & mora sufficiens concurrant. Causæ verò internæ præsertim statim morbum suscitare solent: vt si putredo in humoribus facta sit, febrem dicere possumus: si humorū crudorum copia, obstructionem: & obstructionibus putredinem, febrem, icterum, & alia ad has cōsequentia. Dent igitur operam studiosi, qui volunt futuros præcognoscere morbos, & illis occurrere, vt causas cum externas, tū internas. quæ corpus nostrum immutare solent, calleant. Item dispositio-
 nes, & quam vim efficientes causæ habeant, quæ in hoc vel in illo corpore efficere, vel quantum vires consistere possint. Hac ratione cum penuriam tritici, & bonorum alimentorum, corruptorum verò copiam præuidemus, & morbos ex corruptione humorum & pestem prædicimus, iuxta illud Græcorum, *μὲν λίμονόχοιμα*: facit enim vt diu assersata corruptaque alimenta edantur, legumina, & herbar, & alia quæ laudata non sunt, unde oritur cacochymia, quæ malorum mater est, hinc pestis oritur. Ex insignibus temporum mutationibus, & victus ratione multum immutata, morbos præfagire possumus. Magnæ item & incompertæ & intempestiue corporum mutationes morbos excitant, & ciborum vsus incommodus. Ob id à carni priuio statim morbi fieri incipiunt, tum ob saltationes, tum ob frequenter factas comestationes, & à pascate ob piscium, leguminum, & herbarum vsus, morbos expectamus futuros, ad quorum præcautionem iam dictis cibis quadragesimilibus addimus

*Causarum
morb. duo
genera.*

*Dispositio-
nes.*

piperum specierum genera, & quæcunque vim aromaticam calfacientem, concoquentem & discutientem habent. Legumina enim, pisces, & similia, stus & creditates gignunt, ventremque distendunt, & ad articulos prolapsa, articulares inferunt morbos. Quamobrem non incommodè, ut lepidè dicebat, qui Aphor. Hipp. cuius initium est, Mutationes temporum pariunt morbos, & constitutiones, addere censebat, vulgi nimium tempore observato & abusu, quod Martinalia, Regalia, & huiusmodi Bacchanalia præter carni prinium solet celebrare. Item annus fertilis multis fructibus hortariis abundans, multos excitat morbos, aut quia annus fertilis esse solet, quum præcedens fuit humidus, vel etiam præsens constitutio humida est & pluviosa. Ob frequentes verò pluvias humidius redditur corpus, & catarrhis aptum, & morbis qui ex putredine oriuntur. Talis fuit annus 1556. cum hæc scriberem. Hoc quidam referunt ad fructuum multitudinem, ex quibus febres, putredines, & fluxus ventris fiunt, verum hic annus fuit multum insalubris, ante fructuum aduentum. Quare potius ad constitutionem humidam, quæ præcessit, hæc sunt referenda. Ex fructibus fiunt morbi circa autumnum: at eo anno morbi initio æstatis grassati sunt. Annus siccus magna ex parte salubrior est, quod pauciores pariat morbos. Verum qui eo tempore fiunt, breviores & acutiores sunt. Quo anno frequentiora sunt pyra, cotonea, mespila, nuces & atringentia alia, fiunt dysenteriarum multæ, & alij fluxus ventris, & febres, quod à me frequenter est observatum. Huius rei ratio est, quod qui talibus sæpè utuntur, aliis est astricta, & meatus interni, quibus excrementa ad intestina solent expurgari, obstructi sunt, tuncq. excrementa per aliquod tempus retinentur in corpore, multaque asseruantur, & acrimoniâ acquirunt, vel putrescunt, quæ postea magno imperu fluentem diarrhæam, & dysenteriam efficiunt: cum putrescunt, varias & difficiles febres excitant. Ex causis internis præsentibus affectum futurum præcognoscere possumus, ut si plethora ad vasa sit, vel ruptionem, si saltatio aut cursus, aut elamor, aut exsufflatio magna fiat, vel febres ex inflammato sanguine, vel in aliqua parte inflammatio gignitur, & in ea parte quæ

imbe-

imbecillior erit, morbus firmabitur, aut si alioqui ad hanc confluant humores, ut apoplexiam prædiximus iis, qui meracioris vini usu caput replent. Ex plethora ad vires, febres, ex putredine sanguinis, vel internæ inflammationes, quibus ad summam est repletio, contingunt. Ex cacochymia bilis biliotas febres, tumores ex bile, pruritus, flatus ventris prædiximus. Febres quidem, si cutis densetur, & nimis corpus moueatur. Si crassior est humor, scabies tumoresque sunt, potissimum verò iis qui stuphis, balneis calidis & astringentibus, id est exiccantibus, & immodicis exercitationibus usi, humorem ad cutem traxerunt, & non euacuauerunt. Ad horum cognitionem plurimum victus præcedentis rationem agnouisse iuvat. Ex colore item & sensu exacto vel hebeti prænoscere possumus, an in cute futuri sint morbi ex humoris corruptione. Tales enim sunt succi in nobis, qualia fuerint alimenta & tales morbos gignere solent, ut si bilis, bilio si sunt: si pituita pituitosi: *videlicet* in toto corpore hydrops hydrocele, ascites ex recrementis serosi sunt, ut & fluxus sanguinis. In hydropicis color indicat humoris dominium, nisi intro confugerint humores. Et ex his, quæ sponte reijciuntur, humores in corpore redundantes colligere oportet: plus enim eius humoris solet euacuari, cuius maior est copia in nobis. Ex sensu verò sic colligimus, si vlcerosa lassitudo, si pruritus præsentitur, biliosum vel salsum esse humorem significat. Si refrigeratio aut stupor, pituita: si palpitatio, flatum prædominantem indicant. Si cutis inæqualitas, ariditas cum obscuritate, quæ non ex adustione solis facta sit, melancholiam. Et quia permulti morbi, & multa symptomata, ut ex cruditatibus, sic ex aliis morbis & symptomatibus præcedentibus fiunt, ad eorum præcognitionem scire oportet quæ symptomata mutuò sese consequuntur, & quæ symptomata aliquas partes affectas consequi solent. Nam ex his partes affectas licet deprehendere: ut tussis sequitur omnes thoracis affectus: atrophia, affectus partium nutritioni dicatarum, vel affectus partium principum, aut principibus subseruientium, ut pulmonum. Ad vlcera pulmonum sequitur hydrops, ut ad hepatis quoque, lienis, & mesenterij affectus. Ad calidas cerebri

affectiones, sequitur motio inordinata totius corporis: ut ad frigidas, quies, & ad humiditas, somnus, & ad siccas vigilie superperfluæ.

Ad scotomiam sequitur epilepsia, vel apoplexia, si multo sanguine plenum sit corpus. A longo aurium tintu, sequitur surditas. A lachrymis frequentibus, sequitur ægylops, & alij oculorum affectus.

A sanguinis sputo, phthisis. A fluxu ventris in phthisi & marasmo, mors. A febre erratica, quartana. A diarrhæa biliosa, dysenteria, quia intestina redundant pituita ad sui conseruationem, ne excrementa attingant partes internas. Diarrhæa biliosa superueniens pituitam colligat, & internam substantiam ardit, vlcusque infert. A dysenteria, tenasmus. Ab hepatica dysenteria, hydrops. A fluxu ventris in hydrope, mors. A pleuritide non purgata, peripneumonia, empyeuma. A Peripneumonia quæ pleuritidè sequitur, mors. A pleuritide & peripneumonia habitis, fluxus ventris superueniens lethalis, nisi prius diebus accidat, & vacuetur materia quæ solebat morbum facere. Ab empyeumate non purgato intra 40. dies, phthisis. A punctura neruorum & tendinum, spasmus. Ad mensium suppressionem, & hæmorrhoidū retentionem, aut earum immodicum fluxum, cachexia & hydrops superuenire solent. Itè sputum sanguinis in naturis biliosis maximè quotiescūq; pleuritis fit in partibus inferioribus, & in costis infimis, facilius curatur & melius, & sæpissimè fluxu ventris, sputū sanguinis a doli grauitate præsignificatur in eo, qui per interualla cum solet reicere, maximè si tussi arida, vel vehementi infestetur. Ex mœrore & tristitia si diu perseuerent, etiam si sit à causa manifesta, melancholia tandem inducitur. Sanguinis verò sputum sanari vult Gal. sanguinis missione e vena basilica, cui aduersatur ratio optima. Incisa enim brachij vena, sanguinis maior copia attrahitur ad partem affectam. Quare melius est venam malleoli ruderè. Nam sic fit paulatim humorū reuocatio à parte affecta, neque maior fit euacuatio, quàm necesse. A frequentibus crapulis & ebrietatibus capitis morbos, neruorū cōuulsiones & resolutiones colligimus. Ex cruditatib. & motionibus à cibo, obstructions prædicuntur, in corporis habitu,

*Curatio
sputi sang.*

habitu, palpitationes. Ex pruritu scabies futura, quando materia pauca est. Ex frequenti argenti viui atrectatione tremor. Ex plumbi frequenti fusione, aphonia. Ex assiduitate circa fornaces præcipuè alchymistarum, rubedo oculorum. Ex Scirrho hepatis, aut alterius visceris, hydrops. A longo fluxu muliebri, vlcus in vtero. Ab vlcere penis malè curato, *ὡς ποσάκων*. Sunt aliæ morborum prædictiones quæ ex multis Hipp aphorif. colligi possunt. Pleuritis post longam febr. aut cacochymia superveniens, magna ex parte lethalis. Erit ergo facillè studioso, qui accidentia partes affectas consequentia tenet, & morbos sese mutuò cõsequentes, & ex causis moribificis præsentibus, futuros præcognoscere, & de euentu prædicere, & illis occurrere, eorum generationem impedire, eorum incrementum retardare, *ἀγνοῦν δὲ τὸν χρόνον* temperare, & exitum, qualis futurus est, præsignificare.

Methodus cognoscendi morbum incipientem, & quàm sit difficile. CAP. VII.

MORBI cùm inchoantur, & vt plantæ nunc nascentes, vix cognoscuntur, nec nisi ab exercitato, peritòque medico, vt superius admonuimus, admodum difficile sanè est morbum iam iam incipientem deprehendere. Nam morbi solent dignosci ex suis pathognomonicis signis, & assidētibus: at illæ obscura sunt ob eorum paruitatem, vt ipse morbus. Quare eorū beneficio vix morbum deprehendas. Quomodo enim id nobis ali- quid indicare potest, quod adhuc non sentitur? Quare non est mirum si non deprehèdatur, cùm sint, vel Hipp. *Apho. 30. lib. 2.* teste, omnia circa principium imbecilliora, in statu verò vehementiora: si imbecilliora, minùs etiam sentiuntur. Verùm alteram subesse causam existimo, cur statim & facillè non dignoscantur, quia morbi quorum materia est furiosa, multi fiunt, & nondum firmati sunt, sed nunc hanc, nunc illam partem impetunt. Quare nos aliquando pleuritidem, ob illam à parte in partem mutationem fieri videmus, aliquando peripneumoniam, si rubent genæ, talesque morbi per aposthyt. fieri dicuntur. Ob id est difficile nondum firmatum morbum deprehendere ob mobilitatem, vt Gal. 2. ad Glaucl. voluit, sicque multi medici decipiuntur in morborum distinctione, qui sunt

per defluxiones, & præcipuè quando materia iam breui concoquitur. Sed quia materia quæ fluit ab vna parte in aliam, & diu asseruata est in aliqua parte, iam ferè concocta, & ferè putrida est, ob id citius putrescit, quando fluit in vnam vel alteram partem. Accidit autem aliquando vt morbus non deprehendatur, propter alterius morbi admistionem. Etenim qui biliosus primò apparet, tandem pituitosus euadit, euicta scilicet bile, aut euacuata, permanente pituita, vt in articulari morbo frequèter euenire videmus, & febribus spuriiis. Quamobrem haud ineptè herbis nascentibus assimilantur. Sunt enim ex plantis quæ alia folia habent cum erumpunt, alia cum caules emiserunt, vt phu nascens lata habet folia perinde ac Elaphoboscus: deinde ita inciduntur, vt folia Smyrni imitentur. Coriandrum perinde lato per initium est folio, vt apium, demum finditur, vt fœniculus. Multæ febres à sanguine mediocri excitatæ, in febres biliosas vertuntur, ob id morosa est omnino ac difficilis morborum exacta cognitio. Et danda est opera, vt omnia etiam minima attentè perpendamus, colligamusque, & reuocemus in memoriam quæ præteriere, vt tanquam ex vnguibus leonem coniectemus. Dignoscuntur autem eadem ratione, qua futuros dicimus præcognosci. Quare in memoriam reuocare oportet quæ dicta sunt, scilicet causas internas, & externas, quæ præcesserunt, & morbos excitare natæ sunt, vt præcedentem, tum præsentem, vitæ ægrotantis institutum, si xum, morbos in eo tempore, vel in eo loco grassantes, vel qui grassati sunt. Item est æger rogandus, vel astantes de omnibus quæ præcesserunt, tum ex hisce quæ aliqua ex parte apparent, tu ipse tacitus considerare debes, vt ex illis omnibus aliquam morbi occasionem inuenias, vel aliquod accidens, ex quo possis colligere, vnde inuestigationis initium sumere valeas. Quod si fortè inter narrandum, aut alio modo aliquam causam ex morhificis te inuenire contingat, quid possit ipsa & quos morbos parere, considerandum tibi erit. Quod si morbi alicuius suspicio nasci videatur, ex eius causæ contemplatione, oportet quod factum est, referre ad illam causam, & diligenter videre, si illius causæ effectus esse hic possit per

*Methodus
cognos-
cendi
morbos.*

resolutionem inuestigatione facta: vel si symptoma ali-
 quod reluceat, etiam videndum est cuius morbi, aut par-
 tis esse soleat symptoma. Id verò per resolutionem qua-
 ritur à symptomate ad omnes suas causas, quæ vel erunt
 morbi, vel alia symptomata. Illius verò symptomatis
 causam querere immediatam non cessabimus, quoad
 in morbi vel partis affectæ cognitionem hoc veluti ma-
 nu ducente deueniamus. Neq; erit statim inclamandum
heureka heureka, sed illius affectus notas omnes compre-
 hensas æstimare oportet, an huic morbo incipienti con-
 ueniant. Quòd si talia pathognomonica sint, quantum-
 uis debilia, bene sperare debemus, & quo certiores si-
 mus, oportet illam cognitionem ab oculis nostris sepo-
 nere, & alium morbum huic similem, vel qui à cõmuni
 causa fieri poterat, nobis proponere, & eadem ratione
 examinare, si ea quæ apparent, vel quæ à nobis concepta
 sunt, simili huic morbo conueniant, vel cui plus, cuique
 melius conueniant. Quòd si primum melius repræsen-
 tant, primum esse purabimus, si secundum, secundum:
 hoc modo certi erimus in nostra cognitione. Neque nos
 pudere debet nostræ tarditatis: Nam sat citò, si sat benè.
 Inuenta enim morbi essentia, vel parte affecta, tutò exe-
 quitur, citòque omnia peragenda. Si in principio hæc
 omnia fecerimus, per totum morbi decursum certi eri-
 mus: si à principio erraueris, nihil rectè perficies. Grauis
 quippe error fit tandem, qui primum leuissimus erat. Si
 qui pecuniam dant, recipiuntque, bis aut ter numerum
 suum referunt ad calculum, ne quis error contingat,
 quantò magis id pro vita hominis cunctantiùs facere
 debet Medicus? Præcedentis regulæ exercitationem de-
 mus. Fingamus nos ab aliquo vocatos ægroto. Primum *Qua me-*
 à quo tempore ægrotare cœperit, querere oportet, ut eo *thodo Græ-*
 gnoscamus num sit incipiēs nunc primum, vel iam non *dum mor-*
 nihil præcesserit. Si præcesserit, iam symptomata aliqua *bo inuesti-*
 apparuerunt quæ in morbi cognitionem nos ducent. Sigando.
 dicat eodem die incepisse morbum, quid fecerit eadem
 die, vel quæ præcesserint, interrogare oportet, num ex-
 ercuerit supra modum corpus, aut comestatus sit, aut in
 victus ratione fecerit aliquam mutationem. Quòd si di-
 cat exercuisse corpus in sole, potasse merum, alimenta

calefacientia, aut bilem generantia comederit, & constitutio aeris præcedentis calida & sicca fuerit, vel ipse calidus sit, calidum statim esse morbum putamus, cum id singula præcedentia polliceantur. Corpus enim calfacere nata sunt. Quod si ea parte anni, vel tertianæ intermittentes, vel continuæ grassentur, certè talem suspicabimur morbum: hæc enim non solum morbum esse significant, sed & morbi generationem, vnde morbi biliosi ideam animo concipimus. Quare si calidus sit valde ad nostrum contactum, si amarorem sentiat, si bilis aliquid euomuerit, aut deiecerit, si capite doleat, atque an omnia hæc, vel plurima adsint, inspiciendum est. Biliosæ enim febris suspicionem facile præbent. Quamobrem si biliosam febrem semel esse coniecerimus, sic deinceps procedemus, considerantes exercitationem quæ præcessit, si vehementior & in sole fuerit, si error, qui commissus fuit in victus ratione bilem generare, vel genitam accendere potuerit. Quod si causæ illæ valentes fuerint, corpus biliosum, rarum, & ad febrem dispositum, hoc potuisse gigni facilius credemus. Verum quia vel continuam, vel intermittentem febrem producere possunt, notas intermittētis & continuæ, huic morbo incipienti, nobisque incognito comparabimus. Primum si cum rigore inceperit, rogabimus, quandiu durauerit prima accessio. Quod si vel quinque, vel octo, vel duodecim horas durasse referunt, atque postea sudasse, & febrem ex eo in infebricitationem desisse, tertianā intermittentem pronuntiabimus. Si non desierit post 24 horas, etiam si sudauerit, nec aliquam remissionem senserit, continuam esse dices, etiam si cum rigore inceperit. Solent nonnunquam aliquæ febres cum quadam inæqualitate & rigore, quamvis sint continuæ, incipere, quam ab Hip. dictum sit, Quibus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur. Quod sanè verum est si desigant rigore, qui verus est rigor, dictum intelligatur. Ad nouam percunctationem redire oportet, vt cognoscamus ex quo genere febris continuæ sit. Nam synochos vel *synecis*, id est, cōtinua vel continens. Fiunt enim à sanguine, & aliis humoribus in venis putrescentibus febres continuæ. Quod si continua sit à sanguine, verè continua

*Tertiana
intermittē
tis indicia*

*Aphor.
63. lib. 4.
Nova percunctatio.
Continua
febris si-
gna.*

nua illa est semper sui similis, & æqualis. Nam vel semper crescendo procedit, vel in eodem esse videtur, vel semper decrescit. Quod si æger vel astantes fateantur, ut adhuc simus certiorem, notas redundantis sanguinis inquirimus, ut si sit in vere & plethora appareat, si multum dormiat, si victus ratione multum nutriente usus fuerit, sanguineam esse febrem colliges. Neque verò hic est insistendum. Nam cum duplex sit febris à sanguine, alia ex putrefacto, alia ex inflammato, has distinguere oportet, quod potissimum hæc signa docebunt. Vel fit somnus à sanguine irrigante cerebri substantiam. Quare somnus longus magnam irrigationem indicat, quæ fit à multo sanguine. Si calor mitis fuerit, & plethora magis ad vasa, quam ad vires, febrem ab inflammato sanguine certo affirmabimus. Quod si calor acris fuerit, & plethora magis ad vires, quam ad vasa, & minus dormiant, plus sitiant, putrefactum esse sanguinem, qui febrem excitauit, coniciemus, prædicemusque delirium maius, & ad septimum vel ultra se extenduram. Si verò à sanguine inflammato excitetur, quarto vel quinto, vel ad summum septimo die soluetur, nisi in aliam transeat. Quod si non ex sanguine fieri ex notis cognouerimus, ex continentibus esse coniciemus, scilicet quotidianam, tertianam, vel quartanam continentes, quia fumi, qui eleuantur in cerebro ab humore putrido acriores sunt, & ideo vigilias inducunt, quas febres eadem methodo, eadem die cognoscas, si consideres an multum bile abundet corpus, an sit æstus, an tertio quoque die exacerbationem sentiat, calor acris & mordax sit, cum quadam cutis ariditate, urina valde flauæ. Sed quia à bile duæ febres continuæ fiunt, considerare oportet, num ardens sit, vel tertiana tantum continua. Sitis in exhausta, linguæ nigredo, & ariditas maximus circa ventriculum æstus, separat continuam ab ardente. Distinguntur enim febres & materia & loco, ex quo pedit mali origo. Quare si hæc appareant, ardentem febrem, non continuam esse tertianam dicemus. Adde quod hæc febres sunt frequentiores quam vel quotidianæ, vel quartanæ continuæ. Quartana enim continua rarissime fit, ob materiæ penuriâ, nec nisi post intermittentes malè cu-

*Sanguis
nis redun-
dantis si-*

*Signa cor-
rupti san-
guinis.*

*Qua nota
separent
contin. ab
ardente.*

ratas, irritatas, aut exacerbatas, vel in pestilenti statu ob-
carbunculos venenatos grassantes. Quare optimè con-
ficiemus, si non sit tertiana, vel ardens, quotidianam, vel
quartanam esse continentē, & illam potius quàm hanc
quia frequentior esse solet. Id etiam ex accessionibus
quotidianis circa noctem fieri solitis, & calore febrili
minùs acri, & siti (nisi fuerit à pituita salsa) coniectabi-
mus. Nam hîc maior est sitis, quàm in alia. Et ea est,
quam Hipp. lib. 4. acutorum, ardentem appellauit, ex
pituita salsam genitam, siti minùs vrgente à quotidia-
na continua significabitur. Iam vide quomodo ex caus-
sarum caloricarum cognitione calorem in ægotan-
te præter naturam deprehendemus: quod fuit initium
nostræ cognitionis dicendum. Nam bilem ex his caus-

*Accidenti-
bus partes
affectus
cognosci-
mus.* sis colligimus ex bile morbum biliosum. Et ex propriis
eiusque morbi biliosi notis speciem specialissimam fe-
bris. Ex accidentibus partium propriis brevius & ci-
tius ad affectarum partium cognitionem, & morbi di-
gnationē peruenimus. Vt si æger de *anorexia* queratur,

*Exemplū
singulorū.* oris vetriculi affectum esse dicimus, cū illi proprium
symptoma sit, vt pulmonibus inflammatis, maxillarum
rubedo, fluxus sanguinis tenuis, & aquosi, similis lotu-
ræ carniū hepatis imbecillitatem significet. Vt cer-
tior fiat coniectura in ægotis, alia quædam inuestiga-
mus quæ faciunt ne decipiamur. Quare diligēter in-
quirimus num ea, quæ has coniecturas minùs certas fa-
cere possunt, fiant, vt si difficillimè respiret, aut si febris
per fluxum sanguinis narium debet terminari, priusquā
sanguis effluat, tota facies rubet, vnde ex eo signo pul-
mones laborare non est colligendū, sed quotus sit dies,
obseruandum, vt cognoscamus an instet crisis, an paulo
post futura sit: vel si ægri sanitatis tempore facies sit ru-
bicunda. Quòd si hæc non adsint, certissima erit nostra
coniectura, & rubedo faciei Peripneumoniam indica-
bit, non hæmorrhagiam præsignificabit, si cum ea ru-
bedine æger vix respiret, expuatque spumosa, pituitosa
vel colorata ex bile, dolorem grauem in pectore sentiat

*Signa pe-
ripneumo-
nia.* vel puncturam in altero latere. Solent enim, qui etiam
peripneumonia laborant (vt per dissectionem nouimus)
sentire punctoriū dolorem per consensum membranæ

succin-

succingentis costas, vel in quibus hominibus pulmones
 membranis alligati sunt. Nam alias liberi videntur. Flu-
 xus ille sanguinis diluti signum erit imbecillitatis he-
 patis, ut prædiximus, nisi fortè ab hæmorrhoidibus flu-
 xerit. Nam corpora eachexia laborantia, sanguine a-
 quoso abundant, quem per hæmorrhoidas reiiciunt. *Signa im-
becillita-
tis hepa-
tis.*
 Quare diligenter erit distinguendum, num ab hepate,
 vel ab hæmorrhoidibus fluat. Id facillimum erit factu,
 si quis sedem inspiciat, vel balneum immittat, ut explo-
 ret an venæ sedis turgcant, non enim illinc alioqui fluit
 sanguis. Tumor & grauitas hepatis & color faciei non
 omnino illaudatus ab affectu hepatis esse fluxum il-
 lum sanguinis ostendit. Appetentia deiecta ob pituitæ *Indicia
fluxus
sang. ab
hepate.*
 dulcis redundantiam apparet, vel quia in principio pa-
 stus vinum meracius æger assumpsit, quod famem sol-
 uere solet, vel iusculis pinguibus, dulcibusque est usus. *Appeten-
tia deie-
cta.*
 Quod si hæc non affuerint, vitio oris ventriculi deie-
 cta erit appetentia, vel calidæ intemperaturæ. Ergo si *Ita. Cau-
sa inappe-
tentia.*
 æger tussiat, à tussi inuestigationis initium sumemus,
 inuestigabimûsque, ratione cuius affectus, vel partis *A tussi
morbi in-
uestigatio.*
 hoc fiat. Agnoscitur autem ex aliis accidentibus adiun-
 ctis, ut si tussiat & febricitet, & respirationis difficulta-
 tem sentiat, & patiat, sputum reddat coloratum, si do-
 lorem pectorum habeat, latus pati inflammationem *Pleuritid.*
 dicemus: Peripneumoniam verò si rubeant maxillæ, *signa et
peripneu-
monia.*
 vel difficiliter respiret. Ex vno symptomate aliud co-
 gnoscimus, & ex vno in aliud deuenimus, ut ex vno *Atrophia*
 morbo in alium, ut si Atrophiam videamus corporis,
 illius symptomatis causam inuestigamus, distributio-
 nemque alimenti impeditam, vel alimentorum prauam
 confectionem ex eo arguimus. Impeditæ distributio-
 nis causa potest esse gibbæ hepatis obstructio, quam ex
 hepatis grauitate post secundâ cōcoctionem, seu in trā-
 situ alimentorū notabis: Vel intemperies in signis cor-
 dis, vel aliarum partium, quæ nutritioni sunt destinatæ,
 ut ventriculi huiusce rei causā. Hinc manifestissimum
 est ex vno symptomate vel ex vna occasione nos resol-
 uēdo, posse inuenire partē affectam, & morbum ipsum,
 & hāc rationē in omnibus affectionibus seruare oportet
 ut citò & certò morbū morbiq̃ue causas cognoscamus,

Nunc verò inuestigare oportet quomodo à genere communi ad speciem specialissimam venire possimus. Est enim facile febrem cognoscere, difficillimum hanc ab illa dignoscere. Tamen hoc primum curare debemus, vt ad certum genus affectionum referamus.

Quomodo genus morbi inueniri queat. CAP. VIII.

Similitudo.

Affectuum multitudo vna est ex causis difficultatis cognoscendorum morborum. Facit enim confusione multitudo, vt superius demonstratum fuit. Quare imprimis illa est auferenda aliqua ratione, vt facilius sit generis inuestigatio. Nam quemadmodum grana milij, vel papaueris nigri non facile dignoscuntur in magno aceruo ex fabis, tritico, eruis, ciceribus, & reliquis simul confusis (occultantur quippe à multitudine aliorum.) Sic sane multi morbi ob aliorum mixtionem, & plurimorum symptomatum concursum, & confunduntur, & occultantur. Quare si quis velit parua illa semina inuenire, primum auferat fabas, cicera, triticum, & alia maiora, quibus ablatis minima promptius deprehenduntur, ex eorum figura, magnitudine, colore, & cæteris. Eadem viâ parui morbi, aliorum multitudine semotâ, facilius deprehenduntur. Ob id illum quasi infinitum morborum & symptomatum numerum redigere oportet ad summa quædam genera, quæ, quò magis vniuersalia sunt, eò nobis facilius occurrunt, & ab his descendendo ad vltimam speciem per differentias deuenimus. Sit igitur genus generalissimum affectus præter naturam: in quo genere & causæ, & morbi, & symptomata comprehenduntur, & veluti tabella quadam picta habere oportet, quòd quicquid præter naturam accidit in corpore, vel est intemperies, mala conformatio, aut solutio continuitatis. Qualitas mutata retentum aliquod, reiectum, dolor, tumor, functio læsa, adnatum & vitium cutis. Nos paucioribus contenti esse possemus. Nam dolorem ad actionem læsam referendam esse dicere possumus, vel plura addere. Verùm ne ad paucitatem methodus esset difficilior, vel ob confusam multitudinem obscurior, his tantum contenti esse voluimus. Et quòd symptomata complexi sumus, id factum est de industria, quia multi morbi, nomine symptomatum significantur.

Affectus præter naturam genus summum.

ficantur. Illa rationem causæ habent, alia symptoma-
 ta producendo. Huius methodi vsus talis erit sic ratio- *Methodus*
 cinando. Laborat aliquis: ergo affectus vnus est, ex iis *vsus.*
 quæ præter naturam dicti sunt, ratione cuius malè affi-
 citur. Affectus verò hic, non vt in Philosophia, affe-
 ctio Aristoteli, sed generalius pro dispositione, functio-
 ne læsa, morbo incipiente, vel qualitate, & pro omnibus
 rebus quæ nostri corpori accidere possunt, sumitur. O-
 portet nos ad aliquem horum affectuum reducere mor-
 bum, id facere nequimus, nisi subtractione aliorum ge-
 nerum. Quare si omnia vno excepto, ablata sint, quod
 reliquum est oportet hunc esse affectum de quo æger
 conqueritur. Subtractio verò sic fiet interrogando æ-
 grum vel astantes, si præsentés fuerint, vel eum, qui nos
 consulit: & debemus ab eo affectu incipere, qui mani-
 festior est, vel ægro, vel astantibus, vt num dolore ali-
 quo afficiatur æger. Nam si mente constet, non potest
 hunc ignorare. Quod si neget, adesse dolorem creden-
 dum est, & ad aliud magis manifestum genus venien-
 dum est. Si dicat se dolere, eo modo progredi oportet,
 donec ad imam speciem doloris, & partem affectam ve-
 nerimus. Hoc verò docebimus cap. seq. Rursum inter-
 rogandum si aliquid immodicè excernat, ei assentiendi
 credendum, & quod reiectum est, considerandum, vt af-
 fectus speciem inueniamus: id etiam suo loco docebi-
 tur. De huius contrario statim quæremus, nunquid sit
 reterentum, quod solebat effluere. Si annuat, quale sit,
 inuestigamus. Nam id sæpius morborum est causa. Tu-
 mor quia facilè sensu deprehenditur, de hoc nobis fa-
 cilè constabit interrogantibus, potissimùm cum externus
 fuerit: At internum vulgus latet. Ob id rursus erit inter-
 rogandum an grauitatem, vel duritiam sentiant. Illis e-
 nim duabus notis tumores, qui ad insignem magnitu-
 dinem non peruenerunt, deprehendi possunt. Sed de eo-
 rum cognitione postea. Quod si aliquis ex his reperiatur,
 in hoc sistendum, nec erit opus aliorum tumorum inquisitio-
 ne. Post tumorem, de adnatis percūstabimur, deinde ad
 solutionem continuitatis deueniemus, quia & ipsa eui-
 dens est. Deinceps cutis vitia considerabimus, quæ sanè
 visui conspicua erunt, vt si fuerit Scabies, Vitiligo, &c.

De intemperie deinceps roganus erit, num sentiat caliditatem, vel frigus in aliqua parte, aut toto corpore. Quod si negat, ad aliud genus est descendendum, quod adhuc in qualitate sit, ut ad colorem, oris, sapor, & alia quæ secundæ qualitates dicuntur. Quod si nullum ex iis, necesse est malam esse confirmationem, aut actionem læsam. Hæc enim duo sunt reliqua: functio læsa dicitur, si malè videat, audiat, sentiat, gustet, ratiocinetur, concoquat, & alia vitæ munia perperam exercent, quæ

*Functio
læsa.*

Conformatio mala. ab ægroto facile resciamus. Quædam etiam ariolabimur. Si mala est conformatio, erit inuestiganda illius species, ut si fuerit vitiata figura, magnitudo, numerus aut conjunctio. Id erit faciendum quando neque ex urina, neque ex alia occasione, aliquod initium inuestigationis possumus habere. Nam si morbus aliquis grassetur, ab eo inuestigationem inchoabimus, aut saltem ab eo aliquam suspicionem habebimus.

De doloris specie inveniendæ in parte affecta.

C A P. IX.

Quia dolor tristis sensus ab ægrotis facile sentitur, nisi mens laboret, optimum erit è dolore inuestigationis initium sumere. Sed ut partem affectam methodo inueniamus, prudenter interrogare ægrotum oportet, vel eum, qui nos adit consultandi gratia, num doluerit, quia fieri potest, ut cessarit post excitatam inflammationem, vel quia lassitudo spontanea morbos præcedere solet, vel dolor in aliqua parte sentiebatur, postea non sentitur, ut in Pleuritide, cum in Peripneumoniam mutatur, aut cum superuenit Phrenitis aut Paraphrenitis. Si respondeat toto corpore dolere, aut doluisse, corporis lassitudinem, seu corporis defatigationem indicat. Sed ut certiores simus, num sit lassitudo spontanea, & lassitudinis speciem cognoscamus, rursus illum interrogare oportet, si præcesserit cursus, aut saltus, vel motio aliqua immodica, quæ sufficiat ad faciendum lassitudinem seu corporis defatigationem. Ex iis ubi præcesserint, colligimus non spontaneam esse lassitudinem. Et quia lassitudinum spontanearum tres sunt species, ut quæ infestat inueniamus, interrogare oportet num sentiat membra fracta, vel caesa verber-

*Lassitudo
num tres
species.*

bus. Quòd si annuat, tensiuam lassitudinem esse oportet: si neget, sciendum est an puncturam in cute sentiat. Nam exulceratoriz indicium est, aut conuulneratoriz. Quòd si utrunque sentiat cum tensione & calore, inflammatoriam esse dicemus. Quare talem affectionem esse noscimus, & futuram prænuñciabimus, & materiz antecedentis naturam. Tensiuam enim morbos à plenitudine indicat: Vulneratoria, à cacoehymia. Iam si quis iis indiciis adiungat aeris constitutionem præsentem, & quæ præcessit, & quæ futura est, particularem naturam ægrotantis (qui biliosus est, potius corripietur lassitudine vlceratoria, quàm tensiuam, aut phlegmonode) morbos peculiariter grassantes, & notas illorum morborum, de quibus suspicionem habemus, morbum præsentem, vel futurum certò præcognoscemus. Quòd si æger in toto corpore, sed magis circa omoplatas, pectus, circa tempora, & aures, vel artuum iuncturas sine tumore sentiat dolorem, de morbo Italico suspicandum est, quia hæ partes in eo morbo sæpius dolent. Quòd si huius morbi materia frigida sit, & hæ partes, quia frigida, à frigido facile læduntur, neque tamen statim ferenda est sententia, quàm prius intellexeris, rem habuisse cum muliere immunda, & alia signa adiunxeris. Si verò æger respondeat se non dolere toto corpore, particulatim quærat an caput doleat, an ventriculus, an latus, renes, omoplatæ vel aliæ quædam partes. Frequentius enim dolent capite & ventriculo, quia in multis morbis hi dolores fiunt. Quòd si respondeat, caput, vel aliam partem dolere, iam sciendum est, num per consensum an primariò id accidat: ut si caput doleat per consensum ventriculi, vteri, aut aliarum partium. Si in clauicula dolorem sentiant morbo in latere existente, aut hepate, aut liene, aut alio viscere. Scimus autem dolorem fieri secundariò & per consensum, cum morbi alicuius notæ in aliqua parte affecta apparuerint, ut si primùm dolere cœperit stomachus, si nausea præcesserit, acidus ructus, vel nidorulentus, &c. per consensum ventriculi hunc esse affectum credimus ob cruditatem. Quòd si vomat, & à vomitu dolor remittatur, vel à cibo per consensum ventriculi,

*Morbi
gallici
dicia*

*Morbus
per con-
sensum
ventric.
quòd dis-
cernitur.*

hæc fieri credemus. A cibo, qui fit dolor à causa calida, vel morbo Italico, remittitur, non tamen qui fit ab hac lue, fit per consensum ventriculi, sed ob distentionem membranarum cerebri, aut pericranij. Per consensum semper aliqua pars laborat, quæ alicuius alterius partis sequitur affectum, quem ex iis quæ præcesserunt, &

Quæ partes dicuntur per consensum laborare.

notis cuiusque partis deprehendemus. Et illæ peculiari-ter solent per consensum laborare partes, quæ cum primario laborantibus natura consensum particulare habent, ut uterus cum posteriore parte capitis, ventriculus cum capite, uterus cum inguinibus, & mammis, iecur autem cum clavicula & dorso, & costis mendosis, circa partem dextram: Nam ipsum est in dextris, idque per membranam succingentem costas, quæ & diaphragma constituit, & cum peritoneo iungitur, quibus duabus tunicis omnia inuestiuntur viscera. Extremum mentule cum vesica habet consortium, & intestina cum ventriculo, nervi omnes cum cerebro, rectum intestinum cum utero, & collo vesicæ, & contra. Quæcunque enim similem substantiam habent vel continuitate, vel venis, arteriis, & nervis simul iunguntur, ea particularem con-

An dolor internus vel externus.

sensum, vel consortium habere dicuntur. Cum inuestigando iam inuenerimus ægrotum aliqua parte laborare, interrogare oportet an interna, an externa magis doleant. Præterea dolore punctorio an tensivo, an graui, vel pulsatorio. Et quia ægri hæc non intelligunt, sunt interrogandi per periphrasim, quæ doloris proprietatem exprimit, ut si suspicemur dolorem esse punctorium, ut in doloribus capitis, & laterum fieri solet, quæremus nū sentiant se veluti acu, aut stylo pungi, si annuat, doloris speciem habes, & partem affectam. Est enim membranarum dolor talis. Si dolorem tensivum esse putamus, quærimus an velut distentionem quasi pars foret rum-

Gravitas cum tēfione quid, aut lenitas.

penda, sentiat, idque cum gravitate fit, vel levitate. Illud verò repletionem humoris, & ab ea distentionem significat: hoc est flatibus aut spirituosa substantia fieri ostēdit. Si dolor sit pulsatorius, sentiat arterias circa illā partem multum pulsantes, quia comprimuntur. Quod si pars comprimatur, dolorem leuari ex molli cōpressionē sentiunt. Gravem dolorem patiuntur cum veluti pōdus

sentiunt: Pars etiam quæ laborat, speciem doloris indi-
 cat. Nam si pars exacte non sentit, ut sola ambiente tu-
 nica, huic gravis est dolor, si membrana doleat, puncto-
 rius. Si locus arteriis compositus, & pauca carne, multis
 constitutis membranis, quæ spatio angustiori coercen-
 tur, ut in temporibus videre est, pulsatorius ferè fit do-
 lor omnis, idque potissimum accidit, partibus exterius
 laborantibus. Quod si externam partem laborare dicat
 æger, ea erit tangenda, ut tumorem deprehendamus, si
 quis sit, calorem etiam & frigus. Quod si tumor appa-
 reat, videndum est num rubeat, caleat, pulset, quæ phle-
 gmones notæ sunt. Si plus caleat, minus tumeat, minuf-
 que rubeat, erysipelas censendus tumor talis. Sin mul-
 tum intumescat, nihil aut parum doleat, tumor fit la-
 xus, albusque œdema est. Si durus & sine dolore, scir-
 rhus. Si durus & cum dolore punctorio, cancer. Sed hæc
 omnia exactius in tumorum distinctione docebuntur.
 Si dolor fuerit cum calore, aut frigore partis, sed sine tu-
 more, intemperiem quandam, eamque ingentem, ad-
 modum esse dicimus, atque is dolor si diu perseveret, in-
 flammationem aut abscessum expectare oportet. Si in-
 ternam partem dolere dicat æger, ut sciamus num sit
 cum inflammatione, aut sine inflammatione, interro-
 gandus est num sitiat, & caleat toto corpore. Siccitas ta-
 men non potest vehementes inferre dolores (neq. enim
 affatim fit, quod requiritur in dolore excitando vehe-
 menti) humiditas etiam non nisi ob copiam. Quare pro-
 pria caliditas aut frigiditas habent dolorem. Id si fatea-
 tur, febrem adesse oportet, & ex consequenti inflamma-
 tionem: siquidem materia à longinquo trahitur. Nam si
 à proxima parte, fit abscessus, & omnem tumorem ca-
 lidum significat. Quare statim notas illius affectus pro-
 ponere oportet: ut probemus nostram coniecturam, ut
 si in latere supra vel infra costas mendosas sit is dolor,
 tunc querenda erit doloris species. Si sit punctorius,
 pleuritidem significat: si gravis, hepatis, vel lienis in-
 flammationem, quum febris adest: sine febre scirrhum
 esse ostendit. Id verò est cum dolor infra costas sentitur.
 Cū supra mendosas, & difficillima est respiratio, & tussis
 adest, sciendū rursus an gravis dolor est, an punctorius. is

Philo. 4.
 meteoron.

enim certò pleuritidem, ille peripneumoniam mōstrat. Grauis dolor cum situ partis, sedem affectam, & morbi genus perpetuò indicat, vt si fuerit circa renes grauitas cum febre, in renibus inflammationem esse conicimus. Si circa dexteram partem, & cum tussicula inani, & aliquantula respirationis difficultate: iecinoris affectum declarat. Si in sinistra hoc sentiat, frè ad renum regionem, & ad inferiorem partem ventriculi splenis morbus erit. Si circa regionem vesicę, cum aliqua retentione

Inflā- vrinę, vesicę inflammationem. Si circa vmbilicum cum
tionis in- vomitu foetido, & alui astrictione, gracilium intestino-
testinorum rum inflammationem significat. Id enim accidit collo-
gracilium yteri inflammato, sed absque grauitate. Si inter vmbili-
signa. cum & thoracem, quasi ad partem posteriorem vergens

Ventric. cum vomitione, & nausea, vel cardiogmo, vel syncope,
oris supe- oris ventriculi superioris inflammatio est. Quòd si dolor
rioris in- in anteriore quoque parte sit, ventriculi ipsius. Si dolor
flāmatio. à parte posteriore, & renum regione ad partem antero-
rem vergens, fuerit acutus, & vehemens, calculus in vte-
ribus est impactus, vel delabitur, vel etiam pituita vis-
cosa, vel pus affatim tenditur. Si à sinistro ad dextrum
per superiorem partem ventris dolor moueatur, colicus

De dist n- est indicandus. Si dolor in capite sit, & febris ad sit, inter-
atione do- rogare oportet, si cum febre incēperit, vel paulò post: si
loris capi- incēperit & perduret vsque ad statum, aliquam inter-
tiu. nam partem affici significat, & futurum delirium ostendit. Si non durauerit, aut fortior tandem sit factus, vel incēperit post tertium aut quartum diem, eorum dierum numerum scire oportet. Nam si morbus ut acutus, æger iuuenis, facies rubicunda, fluxum sanguinis narium significat, vtilem quidem si præcesserint signa concoctionis, neque peripneumonia sit vel lethargus. Quòd si sit peripneumonia pituitosa, & non præcesserint signa concoctionis, malum erit, quippe experientia est obseruatum in lethargo & peripneumonia pituitosa esse noxiam hæmorrhagiam è naribus, vt Galenus 3. Cris. annotauit.

Quibus Quia non purgatur hac euacuatione materia efficiens
noxia hæ- peripneumoniam pituitosam, vel lethargum, sed vires
morbo- tantum deiciuntur. Si caput doleat, & facies non ru-
gia. beat, nec venę turgeant circa collum, frontem & fa-

ciem, sed tremat labrum inferius, & erosio circa ventriculum sentiatur, aut tensio, aut inflammatio, crism per vomitum præsignificat. Si hæc, die crism præcedente, *omittas indicia.* appareant, vt si quando caput laboret, totum corpus commouetur & labrum inferius, expectanda est crisis per fluxum sanguinis narium, si tunc materia in capite cōtineatur. Si doleat caput sine febre, interrogare oportet an totum corpus, an pars tantum laboret. Si vna duntaxat, an sit dextra, vel sinistra, & superior vel inferior, atque interna an externa, item an continuò infestet, an identidem repetat. Si frequenter accidat siue cum vomitu, siue absque vomitu, cum hoc fiat statim temporibus, hemicranus dolor appellatur. Si anterior pars capitis doleat, cephalalgea dicitur libr. de Locis affectis. *Hemieria. Cephal.* Cum est à multo tempore dolor, cephalgia dicitur. *signa.* Doloris causam ex iis quæ diximus, facile erit inuenire, *Causas* vt si tensius fuerit absque grauitate, ex vaporibus est: *doloris causa* siue hemens & punctorius, ab humorum acrimonia est, *pitu inueniendi ratio.* vt sit in collo vesicæ, quod exactè sentit, non verò in vesica, licet membranosa sit, quia minùs sentit. Si cum grauitate & pulsatione est plenitudo, quo tempore solet potissimū infestare, scire oportet. Nam si noctu doleat, & cum insigni refrigeratione partium externarum, si magis circa tempora, & aures cum frequenti spuidione, cum dolore starni & omoplatrum, certissimum est morbi Ital. dolorē esse. Quare interrogare oportet, nū aliquando sit passus hunc morbum, vt sciamus nū morbus sit *Morbi Italici certissima signa.* incipiens, vel recidius tantum. Quod si fateatur, morbi cognitionem habemus. Si constanter neget, aut quia ignorat, aut quia celare vult, occasionem morbi, aut ea quæ præcesserunt inuestigare oportet, vt si tumores veneri præcesserint, vel parastatarum inflammatio, quæ vulgò dicitur *pissechanæ* fiatque à femine acii accumulato & putrescente in Parastatis, vadē ægri purulenta deiciunt, dolo em Hispanicum esse certissimum est. *Hispanic. morbus.* Aut si post humectationem pedum, capitis dolor reuerduerit cum aliis prædictis signis, recidui morbi notæ sunt. Quod si morbus antiquatus sit, inspicere oportet, si circa caput tumores appareant, qui aliquando sua sponte discutiuntur, aliquando perseverant. Possunt enim

sine tumore dolores caput tentare, sicut articulos, quod huius morbi maximum est signum. Fiunt enim dolores in aliis morbis in ipsis articulis, sed non sine tumore. Si sentiat hircitatem, & quasi erectionem pilorum, morbum iam firmatum esse certum est. Quod si tumores in tibiis, vel in sterno, vel fronte, vel brachio, cubito, femore, vel sint tumores scirrhusi, inueteratum morbum esse

Colici morbi & nephritici signa. ostendant. Si remediis conuenientibus adhibitis, hæc non curentur, etiam si negent, morbus tamen est Hispanicus, cum ea certissima sint indicia. Si doleant vêtre sine retentione aut immutatione vrine, & alui excrementorum præcesserit cohibitio, ex his colicus dolor significabitur. Quod si contra immutetur, aut retineatur vrina, fluentibus alui fecibus, & dolor in hypochondria dextro vel sinistro ad illa magis sentiat, aut etiam à parte posteriore ad anteriorem vergat, nephriticus est. Si doleat mulier circa coxam, aut inguina, interroganda est num enixa fuerit, aut passa abortum, aut immodicè fluxerint menses, vel recenti sint. Ex his arguimus non

Vitium ligament. vteri.

esse coxendicum dolorem, sed in vteri ligamentis vitium consistere. Quod si hæc non præcesserint, si quæ dolor magis in interna parte quam in externa, & antica magis, quam in postica, dolor coxendicus esse potest. Articulorum dolores partem affectam, & ipsum affectum indicant, sed cum sint aliqui per defluxionem facti, alij tantum per decubitus humorum, scire oportet num per defluxionem, vel per decubitus fiant. Qui sensim fit sine magno tumore ab insigni frigiditate, & à recrementis sensim in parte imbecilla collectis qualis est qui fit à morbo Ital. per decubitus fit. Qui cum magno tumore

Doloris per decubitus vel per defluxionem facti signa.

& affatim, per defluxionem bilis, vel pituitæ tenuis, vel amborum permixtorum, vel sanguinis, vel melancholicæ, si Paulo Aeginetæ credimus. A sanguine quidem fieri potest, sed à melancholia rarissime. Nam quemadmodum pleuritis non fit nisi raro à melancholia (vt docet Hipp.) Qui acium eructant, raro pleuritide corripiuntur: sic neque articularis morbus. Est enim humor crassior, quam possit affatim defluere, aut in tam densis partibus recipi. Adde quod melancholicus succus sine dolore tumorem facit, & aliquando sine sensu, vt in scirrhis

rhis apparet, idque vel quia stuporem inducit sua frigiditate, vel sua siccitate, *Arterias* partis aufert, vel sua crassitie obstructionem partis facit. Quare non videtur Pauli sententia satis certa & evidens. Dignoscitur autem doloris materia à tumoris magnitudine, & doloris proprietate, necnon à victus ratione, quæ præcessit. A bile fit subito, & subito dissolvitur sine magno tumore, & cum maxima caloris acrimonia, & vt breuiter dicam, quæ in erysipelate apparent, omnia spectantur hic. Iuuenibus magis quàm senibus, viris magis quàm mulieribus accidere solet, eumque frequenter natatione in aqua frigida, & aquæ potu curauit. A pituita verò fieri certissimum est, sed non sola: facit enim tumores indolentes, & laxos, qualis non est Articularis morbus. Sed si quando à pituita fit, intellige fieri permixta bile, vel fece, vel spiritu, à quibus dolores fiunt in parte sensili. Quare non cedematì simplici, qui laxus est, & indolens, sed erysipelati, argumento est, quod vbi ea quæ præter pituitam sunt, ob suam tenuitatem discussa fuerint, rubor & dolor abeunt, remanente tumore laxo in dolente, cum impotentia membri. & tandem pituita, quæ remansit, crassescens, tophi fiunt, siue nodi. Tumores articulis facti ab humorum crassiori parte, à calculis loco differunt, vnde nephritici sæpè euadunt podagrici, & contrà. Qui laborant colico dolore à causâ frigida, sitiunt aliquando propter clamationes. Quare querendum, num sentiant caliditatem in toto corpore: quod si fateantur, huic dolori interno coniungitur febris. Costæ omnes habent duas membranas, vnâ propriam Præcostum vocant, alteram communem, qua costæ omnes integuntur. Si igitur patitur æger inflammationem in ea communi, non potest decumbere in latus affectum, quia humor impactus facit distentionem, & inde dolorem excitat: Quod si inflammetur membrana propria, idem non accidit, neque dolet æger in latus affectum decumbens. Dolor punctorius proprius, quidem est membranis affectus, non tamen omnibus, sed his quæ alligantur ossibus, aut ea inuoluunt. Si enim ossibus non alligetur, vt videre est in membrana inuoluente recur, pulmones, cor, & vesicam, &c. hoc punctorio dolore non vexantur.

*Tumoris à
bile indi-
cium.*

*Costarum
duplex
membrana.*

De tumorum cognitione, & specierum inuestigatione.

CAPVT. X.

Post dolores, hinc de tumore nobis agendum est, non quod oporteat in inuestigatione morbi necessario hunc ordinem sequi, nisi quando nullius alterius generis suspicionem habemus. Nam si de intemperie suspicemur, de hac scito quod non est dolor. Id enim est primum quod querendum statim sciscitamus, & reliquis omissis, ipsius causam & speciem perquirimus. Eadem ratione de soluta unitate, retento, reiecto & aliis, semper ab eo exorfi, de quo suspicio est. Sed tumorem dolori subiunximus in tractatione; quia dolorum comites esse solent, imò necessario sequuntur, si hic diuturni fuerint. Et quia sensus, tumores eos, qui externi sunt, statim deprehendit, cum nihil aliud quidquam sint, quam quod apparet, de tumore externo nemo dubitabit. Quare de hoc tantum, si quid rogemus, speciem querimus. De interno verò querimus an sit, quid sit. & ægroto non credimus perinde ac in externo. Non enim possunt ægroti semper internum deprehendere, sed præstantis est medici eum cum tægmyriis & propriis notis dignoscere posse. Quare si æger dolorem passus sit, aut patiatur, vel ex alto ceciderit, vel fuisse percussus fuerit, tunc num tumor externus aliquis inde factus sit, non immerito rogabimus: neganti vel asseueranti credendum est. Nos tamen ex causarum natura etiam futurum prædicere possumus. Si est tumor, de magnitudine & paruitate querendum. Item si ne vnus an plures, tum dolore vel sine dolore, affatim ac sensim magnus euaserit, durus vel mollis, tensus seu renitens, an tactui cedens cum pulsatione, vel sine pulsu. Iam si magnum esse respondeat & vnicum, affatimque factum dolorificumque; inflammationem esse colligere possumus, cuius rei ut certiores fiamus, an rubeat, caleat, renitatur, & pulset, deinceps inquirimus. Nam sic verè & certò inflammatio dici debet, faciet etiam ad ampliorem cognitionem, partis affectæ dignotio. Nam in omni parte iam dicta omnia euenire nequeunt, vnde loci natura affectus quoque nomē indicabit, ut si in occulto adsint rubor, dolorque, Ophthalmiā esse dicemus. Neque enim pulsatur aut renititur. Si tumor in toto capite appareat, sique carnosus

*Tumores
interni.*

*Ratio in-
uestigandi
tumores.*

*Locina-
tura nomē
affectus
indicas.*

fus, mollis & laxus, Hydrocephalea dicitur, & videtur esse *Hydrocephalus*.
 se affectus illius partis capitis, quæ pilis integitur. Mor-
 bus est peculiaris pueris & mulieribus propter humidi-
 tatem. Fiunt alij tumores in capite, qui Talpæ dicun-
 tur, quia ad instar aggerum, quos faciunt Talpæ, appa-
 rent. Tumores multi per morbum Italicum accidunt ob
 ossis corruptionem in morbo antiquato. In minùs anti-
 quato fiunt etiam, sed sine aliqua ossis labe, quippe à va-
 poribus frigidissimis, & humidissimis, isque frequenter
 locum mutant. qui fiunt à pituita, aut flatibus. Aliquan-
 do à pituita parti infixi vehementissimi dolores excitā-
 tur, qui noctu magis infestant, & calidissimis iuuantur.
 Ob id ad ignem semper habere caput cupiunt. Nam ve-
 hemēs tum caliditas, tum siccitas eos dolores leuat, me-
 diocris excitat. Si faciem dicat tumere, de colore opor-
 tet interrogare. Si enim rubea sit, & sine magno tumore, *Tumorum faciei dis-*
 & cum feruore, Erysipelas affectus est. Nam solet fre- *stinctio,*
 quenter huic parti accidere. Si magnus fuerit tumor, & *Erysipelas*
 sine rubore, Catarrhū vocāt. Ob id num dens doluerit, *Catar-*
 interrogare oportet. Si enim talis dolor præcesserit, pi- *rhus &*
 tuitæ defluxio est, & tumor Oedematodes potius cēsen- *eum co-*
 dus est. Si tota facies multum tumeat, & rubicunda sit, *gnoscenti*
 vera inflammatio est. Si huic accedat obscuritas, & vesi- *modus.*
 culæ fient Phligtenis similes, Carbūculum esse dicimus. *Inflāma-*
 Si in collo tumor fuerit vnicus, anginam esse certum est. *tio.*
 Si plures sint tumores duriq; , Strophulas esse putamus. *Carbun-*
 Si post morbum acutum protractum, tumor circa aures *culus.*
 appareat, dicitur Parotis affectio. Si in mento & alijs par- *Angina.*
 tibus circumuicinis sine inflāmatione & dūritie tumor *Strophula.*
 videatur, si in locis degat æger montuosis, & niuosis, vbi *Parotis.*
 fieri solent Broncochellæ, talem affectum esse dicimus. *Bronco-*
 Si in alis tumor est post morbum acutū, neque grassetur *chella.*
 pestis, bubo est criticus. Si in eadem parte duri appareant *Bubo cri-*
 tumores etiā Strumæ dicuntur. Hoc enim medicis omni- *ticus.*
 bus nondū vulgò receptum est vt omniū quauis in parte *Tumores*
 glandularum Scirrhus Strumarum nomine significet, vt *pectoris,*
 inflammationes communi bubonis appellatione expli- *Morbi &*
 caat. Si in pectore tumores fiant, vel in sterno, vel supra *licet.*
 costas multas, vel vnā tantū, sic erit distinguendū. Cūm
 supra sternum aut vnā costā fiunt, atque sensim accidunt,

de morbo Italico suspicandū est. Quare ad alia signa recurrere oportet, quò certiores fiamus multis conuenientibus. Vni quippe tantum confidere non est tutum. Rarò autem sic fiunt tumores sine morbo Italico, nisi ex fractura aut laxatis sterni vinculis, vnde gibbositas anterior accidit. Sunt ferè hi tumores absque dolore. Si supra nothas costa fiat tumor, Pleuritis externa, vel abscessus, vel Rupia dicendus affectus est. Quare si fiat repente, Pleuritis externa est: si sensim & sine magno dolore, & quadam circumscriptione, Lupia erit. Si cum dolore, abscessus. Mammis tumore affectis debemus interrogare an sit magnus, an paruus, ruber calidusne: nā sic erit inflammatio partis. Quòd si tumor non fuerit magnus, iterum quærendum est an cum duritie, vel sine duritie: si durities sensim facta sit, & post mensium retentionē, & cum dolore punctorio liuescat, aut obscurior sit pars, de Cancro suspicio habenda est. Quòd si lactati tumor durus factus sit, Scirrhum glandularum, vel caseationē esse conicere oportet. Sed in Scirrho nullus est dolor: in caseatione dolor est similis inflammatione. Circa ventrem tumores fiunt, vel in toto vêtre & erit Hydrops: vel in aliqua parte, vt inter vmbilicum & Xiphoidē, in quo frequentissimè decipiuntur medici. Nam ventriculi tumorem, potissimum oris ventriculi esse credunt: verum fitus, durities, grauitas, & quæ consequuntur hepatis affectionem, vt cachexia, iecinoris tumorem indicat. Quòd si cum febre & dolore est inflammatio, si durities est simul cum febre, & dolore, Scirrhosam inflammationem denotat, potissimum si ante febrem Scirrhus persenserint. Tumores autē vetriculi magis paulò supra vmbilicum, & cum inflatione, ac tensione potius, quàm cum duritie esse solent. Splenis tumor in parte sinistra multum infra costas sentitur, si fuerit maximus: si minor est, sub costis mendosis & inferioribus percipitur. Fiunt tumores in musculis epigastrii, qui hoc nomine discernuntur, quod musculi figuram quandam retineant, cui insunt. Sunt magna ex parte abscessus, vel Scirrhi, & magis sub vmbilico, quàm, superiori parte, vel quia humores facilius decumbunt in inferiorē, vel quia venę inferioris partis oriuntur è venis ortis à ramis venarum, ex quibus venę colli vteri oriun-

*Pleuritis
externa.*

*Lupia ab-
scessus.*

*Cancer.
Mamm.*

*Scirrhus ca-
sa.*

*Tumor
iecinor.*

*Tumor
Ventricis.*

*Splenis
tumor.*

*Epiga-
strii.*

oriuntur, quæ crassiores & magis melancholicum sanguinem continent. Ob id virginibus, & viduis isti tumores frequentiores sunt, & magis sunt in medio ventre, scirrhi verò supra aponeuroses musculorum, abscessus verò magis ad latera vergunt, & inter musculos obliquos, vel inter transversum & obliquum ascendentem. Si tumor in umbilico appareat, omphacocoele dicitur. Si verò in alia parte ventris inferioris, vel superioris non durus tumor fiat, aliquando apparens, aliquando latitans, peritonei ruptura est, atq; si in ventre virorum inferiori talis appareat, etiam relaxatio peritonei esse poterit citra rptionem, circa foramen, per quod in scrotum descendunt vasa spermatica, elongatio in modum crumenæ cum suis contentis epiploo, scilicet, vel intestinis, vel vtrisque. Et si inferius prorumpat, secundum quod magis vel minus fiet lapsus, diuersam sedem constituet. Vbi enim ad pubem tantum perueniat, Bubonocolem facit: quiescentibus ægris vix apparet, post saltum autem & deambulationem conspicua est. Nec est prætermittendum talem etiam à rupto aliquo epigastrii musculo fieri aliquando posse: verum si supra dicta elongatio, ad scrotum vsque producat, enterocoele appellabitur, quæ omnes etiam à ruptione contingere possunt. Discernuntur autem secundum causas, vt si à ruptione sint ea, quæ tumorem faciunt, nulla in scroto propius tactui occurrunt: Si ab elongatione cum maiore renitentia, & tanquam in secundo vase sentiuntur, quæ vbi in ventrem recipiuntur, tumor cessat, hæcque nota discernuntur hæ duæ herniarum species à reliquis, quæ in scroto conspiciuntur, quæ etiam à talibus causis originem non habent, suntque hæ pneumocoele, hydrocele, sarcocoele, & circocoele. Pneumocoele leuitate perspicuitatq; ab hydrocele distinguitur. Sarcocoele tumore & duritie testis dignoscitur. Circocoele tumorum diuersitate & paruitate in epididymo & vasis spermaticis ab aliis herniis distinguitur, nec non in scroto inflammatio esse potest. Discernuntur autem omnes alij tumores ab inflammatione, quod huic propria sit rubedo, calor, pulsus, renixus, &c. Fiunt & multi tumores scirrhusi, qui, vt supra dictum est, cheradum nomine, cum multi fuerint, explicari possunt. Fit etiam

Periton.

ruptura

an rela-

xatio.

Discrimē

à causis.

De her-

niis.

Priapismus.

Phyma, Phigerthlon & aliæ glandularum inflammatio-
nes circa eam partem. Tumor peculiaris mentulæ est
Priapismus: est autem tensio mentulæ continua. Solet
iis acciderè, quibus sunt vlcera in extremo penis, vel pro-
pter tensuam lassitudinem illius partis, & frequentem
coitum cum virginibus. Fiunt quoque tumores ob vl-
cera tibix, vel pedis circa inguina, sed qui ob vlcera pe-

Bubones.

dis dolentia fiunt tantum, communi nomine Bubones
dicuntur, qui verò ex coitu accidunt, veneri peculiari-
ter nominantur, & hi solent esse prænunciij morbi Itali-
ci. Fiunt verò per statum pestilentem tumores in ingui-
nibus, & aliis emunctoriis ob carbunculos partium exter-
narum: rarò aut nunquam sine carbunculo. Aliquando
prius accidit carbunculus, quàm manifestè Bubo appa-
reat. Fiunt tumores circa perineum iis, qui vlcera patiun-
tur in parte interna, & magna ex parte in abscessum
vertuntur, vel in scirrhum. Fit etiam tumor durus in pe-
nis superiore parte. In coxa tumores quoq; fiunt & scir-
rhi in morbo Italico. Circa genu dolor est articulorum,
cum inflammatione, vel Erysipelate, Oedemate, aut Scir-
rho. Sed plurimum in genu magna Oedemata, & tumo-
res aquosi fiunt vel flatusi. Sub genu fit frequentius A-

Aneurisma.

neurisma, quàm alia parte, ob arteriæ tensionem ruptio-
ne facta, & sanguine illo arterioso partes illas laxas re-
plète, sine coloris immutatione. Cognoscitur autè, quia
primo statim die pulsar, quod nulli alteri tumori accide-
re potest. Quare dolor maximus pulsatorius huic erit
peculiaris, si abortu insit, pars etiam renitatur in dicto
iam loco Et brachiis etiam, & vlnis fit tumor Peponi si-
milis sine pulsu, & sine calore, & caloris mutatione: qui
tumor nullum obtinuit nomè, sed similitudine quadam
venæ Aneurisma, vel scissura dici potest, nonnulli carci-
nomata vocant, si aperiantur, fluxu sanguinis moriuntur.
Qui primò erupit, concretus apparet & tætidus: reliquus
autem fisti non potest tam magnà apertione facta. Circa
genu aut infra, aut supra solent tumores venarum appa-
rere. Qui varicosi dicuntur, illi facile dignoscuntur colo-
re ob flatuū copiā, & tumorū mollietiem. Apparent enim
veluti oliuæ in quibusdam locis venarum. In aliis etiam
partibus fiunt varices, sed in his frequentius. In tota tibia

Varices.

fiunt

Eunt duo genera tumorum valde similia, quorum alterum Oedematodes est, & accidit iis, qui aqua intercute laborant. Pars enim tumet & pallet, si digito comprimatur, cedit, & impressi digiti vestigium retinet. Tales apparent in Hydropicis & Phthisicis ad finē, atque omnibus cachexia laborantibus. Alter verò est tumor carnosus, & hic propriè est hydropis species, quæ Anasarca dicitur. Quare author introductorij, hydropis quatuor species constituit. Differt enim Hypofarca seu Anasarca à Leucophlegmatia, quòd in hac Oedematosi tumores fiāt: in illa verò non est admodum mollis tumor sine coloris naturalis immutatione. ut in polysarchia, nisi quòd paulò durior est. Solet esse sine dolore & sine rubore aut inflāmatione. Accidit mulierib. iunioribus post mēsiū suppressionē, & sanguinis missione atque inedia potius curantur, quàm aliis remediis. Accidit & iuuenibus nonnunquā, sed in quibusdam magis ad Oedematis tumorem accidit, quādo corpus pituitosum est, in aliis verò ad scirrhi naturam. ut in melancholicis, in bene temperatis Polysarchia peculiaris esse videtur. Quibusdam morbus hæreditarius est. Quidā Elephātiasim Arabum esse crediderunt: in illis tandem fiunt exulcerationes, vel accidunt iis, qui vlcera pedum patiuntur. Circa pedes fit Podagra, & hoc nomine tantum differt à communi articulorum dolore, quòd magis à materia crassa fieri credatur: quanquam nominis ratio videatur significare omnem articulare morbum, qui pedibus accidit ex quavis materia, verum impropriè Podagra dicitur, & sine magno dolore, & diutissimè partem occupat: quia ex crasso humore est. Fiunt tumores præter naturam in mediis ossibus digitorū, propter quos ossa putrent, & decidunt. Accidit pueris & puellis frequētissimè, aliquando & à morbo Italico. vel ob quādam cacoetheian sanguinis. Hūc tumore aliqui appellātur nomine Cheradū, sed id absurdum est. Cherados enim affectus sunt & scirrhi glandularum: potius est Melicheris, quia saniem mellis similem reddūt vnde nomen habent. Omnibus partibus accidunt tumores præter naturam, quos magnitudine, & paruitate, calore, colore, mollitie, & generationis modo distinguimus. Nam si in aliqua parte, & corpore pletho-

De Oedemate.

De Anasarca & aliis speciebus.

De articuli morbo.

De infl. rico tumor affatim fiat, cum vehementi dolore, tenfio-
matione. ne, rubore, & calore, inflammationem effe dicimus. Si o-
Carbun- mnia hæc appareant, nifi quod liuidus fit color, & Phli-
cūlus. gtenis fimiles pustulæ aliquot fint, & crusta cineritia, &
nigricans, Carbūculi affectio est. Quod si in emunctorio,
illius partis tumor fequatur, fitq; status pestilens, Antrax
est, qui vulgò appellatur Antrax epidemicus, vel Carbo,
feu pestis, & si potiùs fit symptoma, quàm morbus pestē
indicans in eo loco. Si autem tumor fuerit minor, in cu-
te magis quàm in carne, & cū maximo feruore, & flam-
meo colore, vel ex flauo rubefcente, qui tactus albescit,
refugiente sanguine, & statim recurrente, verum erit. E-
Erysipelas
Oedema. rysipelas phlegmonosum. Si tumor magnus, laxus, sine
dolore, & rubore, & punctione fiat, Oedema dicitur sim-
plex & exquisitum. Nam si rubeat modicè, & non nihil
doleat, Oedema phlegmonodes, aut phlegmone Oede-
marodes censendus est affectus, ab eo nomine sumpto,
quod in morbi cōplicatione superius est. cognomine ve-
rò seu epitheto, ab eo quod est minus. Si à pituita nō na-
turali fiat tumor, pro humoris diuerfitate, diuerfi quoq;
tumores erunt. Aquosior tumorem facit hidatodem. Si
magis spumosa fit, & flatulentia inflationē facit, quæ ra-
rò est sine aqua. Si crassior fit & viscidior, scirrhum (vt
vocant) album facit. Si magis reficcata fuerit, & ossibus
hæreat, Exostosis dicitur. Quod si æqualis fuerit duo-
rum humorum defluxio, Erysipelas phlegmonodes aut
Scirrhus Oedema, & sic de aliis à Gal. dicitur, lib. 2. ad
Glauc. quod nullibi tam exactè distinxerat. Possunt ve-
rò omnes tumores ex naturalibus facti humoribus in-
uicem cōmisceri, vnde & scirrhus cum aliis tumoribus,
non tātum renitens, vt in simplici inflammatione fieri so-
let. Si syncerus fuerit, cum duritie & sine dolore est: si ex
quisitus, sine sensu. Et hac nota Canceri à Scirrhis distin-
guitur. Nam Canceri dolēt & sentiunt. Est verò aliud sen-
tire, & aliud dolere. Sentit Oedema, si rangas, nō tamen
dolet. At ex atro humore factus, aut pituita exactè indu-
rata, neq; sentit neq; dolet. Hoc enim necesse est, ne do-
lere quidē, si non sentiat. Sentire verò potest, & dolorem
non pati. Cancer igitur ob feruorem sentiet. Non dolet
tamen Oedema ob frigiditatem, quia stuporem inducit
adju-

adiuvante nimia humiditate partem laxante. Scirrhus autem & præfrigiditate, & præsiccate sensum partis aufert. Omnes ferè tumores à melancholia, sunt rotundi, & cum glandulis accidunt inæquales, & longo temporis tracti fiunt. Cancer est semper minor scirrhus circa principium, sed tandem maximus euadit, vt scirrhus quoque si hoc patiat membrum molliet Venæ distēte & varicosæ magna ex parte hos affectus commutāt nec minùs Scirrhum, quàm Cancrum. De his igitur singulis est cautè interrogandum, & obseruatione diligenti est inquirendum. Tumor quidem durus, sed paruus fit in partib. carne denudatis, vt circa pedes & manus, & in genere neruoso, ganglion vocant eum tumorem, nostri nodum à nodis cordarum, facta similitudine. Huiusce *Nodus cū differētus.* tumoris duas annotaui differentias: altera est cum dolore, altera doloris expertus & supra tēdonem fit, vel ligamentum: illa verò supra neruum, qui ne vel leuissimum cōtactum ferre potest, neq; frigus sentire sine molestia. Vnde fit, vt is dolor vehementissimus sentiatur. Huiusmodi tumorem præter naturā vidi in vxore D. Bocheris nostræ reip. à secretis. Is tumor erat in eo neruo, qui *Abcessus.* ad pedem descendit. Fiunt & alij tumores, qui verò abscessus sunt, vt partibus carnosissimis minùs duri, quorum *Steatomata.* materia seu concreto similis est, appellātur verò Steatomata. Alij sunt parui & molles, vt Puls, & Ateromata *Ateromata.* dicuntur. Hi omnes facta apertione & facilius & distinctius cognoscūtur, aliàs non nisi à diuturnitate & paruitate & maiore & minore mollietie, tales esse cōiciemus. Quòd si maiores sint, & duritiem illam, quæ in musculis sentitur, habuerint, Admata vel Lupia dicūtur. Minores *Lupia.* tumores sunt, qui ab humoribus non naturalibus excitari solēt, si Carbunculū excipias, qui non à propria circumscriptiōe, sed à partis natura, quam afficit, excitato ingenti dolore, magnitudinē habet. Fit maximè mollis. Discernitur is ab inflammatione, vt superiùs quoque dictum est, colore liuido, Phlegtenis, crusta, cutis vitione aliqua in parte. Pestilens Carbo ab alio differt, quod *Carbo pestilens.* pestilēs habeat magna ex parte, imò ferè semper (nisi mors præoccupet) in emunctoriis tumore, è directo partis affectu Carbone. Differt etiā symptomatum vehementia,

*Carbo non
pestil. &
quib. acci-
dit.*

& malitia: ob id peracutus morbus est. Habet magna ex parte cordis iactitationem, & lypothimiam ob materiæ venenositatem, & est contagiosus: non epidemius autem, contagiosus non est. Magna ex parte à causa procatartica excitatur iis, qui pelles tractant, ut laniis, & coriariis, & qui morticina tractant. Fit in facie illis frequētius, quam aliis partibus: quia manibus sæpius illam partem attingunt, quod indicat manum minus aptam esse ad patiendum omnibus aliis partibus corporis. Nam quancūque att gerint sic infectæ manus, ipsæ illæsa virus dāt, & cōmunicant, faciēsque ut plurimum hoc patiatur, tum præ mollietate, tum quod magis ad manū sit. Ex his manifestum sit, interrogandum est de vitæ instituto, & de morbis populariter grassantibus. Hac enim ratione epidemicū à nō epidemico poterimus discernere. iisque quoque addemus regionū differentias. Nam ex hac morbi quoque species innotescit, ut olim, si Plinio credimus, Galliæ Narbonensi familiaris erat, quemadmodum hodie montanis regionibus Cancer, aut Elephas, potissimum in quibus montuosis regionibus solēt homines vesci leguminibus salitis & ad fumū exiccatis carnibus, tum piscibus, & vino generoso aliunde allato, alliis, cæpis, porris, sinapi, &c. Venatores quoque facili iis plectuntur morbis, qui carne ceruina, & aliis huiusmodi ferè nutriuntur. Solēt enim hi morbi regionales (Topicos forte rectè dicemus) ob alimenta gigni, ut qui frequenter

*Qui mor-
bi quā al-
imenta se-
quuntur.*

vescuntur fungis, aut cerasis, Angina infestari solent: qui per ficis, lippitudine: qui ficibus, scabie & Phthiriasi & viscerum tumore: qui nucibus, amygdalis, auellanis & pineis, Cephalalgea & vetriculi dolore, & subuersione: qui caseo, & lacte vel pane azymo, Nephritide. Qui aquā bibūt per argillam fluentem, omni obstructione & frequentissime calculo infestantur: qui aquam lutosam, iisdem quoque malis infestantur: qui aquis salis & nitrosis, Dysenteria: qui aqua ex puteo profundissimo, colico infestari solent: qui aqua niuosa, Broncocele: qui cister- narum aqua utuntur, obstructioni & alui constipationi obnoxij sunt, ob astringendi vim, quam acquirunt à rubrica fabrilī, ex qua magna ex parte picatæ sunt, idque potissimum si recens factæ sint. In veteribus autem ob frequen-

frequentem ablutionem minus inest periculi. Idem patiuntur, qui aquam bibunt per canales fictiles fluentem. Sed quæ per plumbeos fluit, iuxta Gal. opinionem, obcerulam, quæ in ipsis generatur, Dysenteriam inducit, quod tamen experientia falsum comperi. Monspeffuli enim frequentes sunt cisternæ in quas per plumbeos tubos aqua influit, quo in loco minus solent grassari Dysenterix, quàm alibi totius Gallix Narbonensis, etiam ubi nullæ sunt cisternæ, præterquàm quòd Cerusa, nisi acetum adsit, possit generari: Obstructioni verò & alui constipationi obnoxij, qui aquam canales fictiles verrentem bibunt, idque potissimum si non ita dudum extructa fuerit cisterna. Qui ceruisia ex pomis & pyris & aliis fructibus potione utuntur, Oedematis, colicis dolorib. & aliis omnibus malis ex pituita & flatibus ægrotant, frequentissimè quoque ex iis leprosi fiunt. Minus rubentem, sed magis tumentem faciem habent. Vnde leprosi albi dicuntur. Tales sunt in Flandria & Normania. Solus restat herpes, qui magis ad vitia cutis, quàm tumores referendus est. Nam sine magno tumore fit, quia solius cutis, vel cuticulæ affectus videtur. Apparet enim velut à sole exusta cuticula, & frequentissimè ab insolatione maiore fit. Ex rubro flauescit pars, sentit ardorem, &, si tangas, ex siccitate asperior sentitur. Est Herpes simpliciter dictus, qui parum ab Erysipelate differt, & forte non alia ratione differunt, nisi quòd à flava bile excrementitia fiat magis, quàm à naturali Herpes. Erysipelas verò contra, si materia paulo crassior & acrior fuerit, nò solum cuticulam offendit, sed etiam cutem exulcerabit. Et quia non solum serpit, sed & cutem absument, Estiomenos dicitur. Si in parte affecta parvi tumores milio similes, sero citrino pleni, phligenis minores suscitantur, Herpes miliaris dicitur. Hic affectus perpetuò comites habet vesiculas, sed nò eodem semper loco, quippe cum sedem mutet serpendo. Iis evanescentibus alij eiusdem farinae excitantur, vulgo dicunt (*Enc Dertre*) Fiunt iis tumoribus similes, qui Latinis Sudamina, Græcis Hydrea, aliis Papulæ sudorum dicuntur. Sunt autem minus fluxæ, & magis albescent, frequentiores & aliquando in tota facie, vel in toto corpore. Fiunt autem

Aqua canalium plumbeorum.

De herpes.

Sudamina.

cum quis sudare incipiens, frigido aëri se exponat. Sunt aliquando cum pruritu si minores fuerint. Nam maiores absque pruri esse solent. Fiunt etiā tales humores à pediculis (vulgò Cirocis) dictis in quib. futura est scabies. Si autē hi tumores multò maiores & bullis similes excitatis ab igne, vel aqua feruenti, Phligtenæ dicuntur, potissimum si in tibiis fiāt, à seroso humore collecto inter cutem & cuticulam. Sirumpantur, crustam faciunt, & in quibusdam crusta nigra est, sed sine inflammatione & dolore, atque ea ratione differt à paruis Carbunculis & Phligtenis in carbunculo apparentibus. Variolæ & morbilli à supradictis affectibus facillimè distinguuntur, quòd epidemici morbi sunt, nec vnquam erumpunt nisi febre præcedente, & frequentius in iuuentute, aut adolescentia (quæ primam omnium ætatum continet) fiunt. Hunc affectum pestem Rases appellat communi appellatione, peculiari autem elogio Papulas pituitosas nominauit. Apparent in cute tumores duri, vt Thymus, Verruca, Acrocordon, & Condylomata, Clauis, & Paronychia. Verùm Condylomata frequentius fiunt circa sedem & vterum, quàm in aliis partibus. Clauis verò intra digitos pedis calli, sub planta pedis, verrucæ in digitis manuum, Acrocordon in aliis quibusdam partibus. Thymus frequentius in glande & in ano fit, & in præputio. Refert figuram capitulorum thymi, vel flores thymi. Est enim asper tumor, oblongus & subrubēs. Condyloma eiusdem figuræ est, sed æqualis & sine asperitate apparet. Horum duæ sunt differentiæ: altera est carnosa calore candida, & sine dolore, sed cum quadam inæqualitate: altera dicitur maligna ob dolorem. Est enim cum maiori scabrie & inæqualitate, & cum liuiditate quadam, & facile degenerat in Cancrum ob similitudinem. Verrucæ ab omnibus facile dignoscuntur, differuntque sic, quòd Acrocordon velut pendet tenui filo. Myrmecia est ampla radice, & capite minus lato, dolorem si tangatur, sentit, saltem veluti formicæ vellicantis speciem præbet. Paronychia ab vnguibus dicitur. Nam ad illorum radicem tumor est. In summitatibus digitorum fiunt tumores inflammationi similes, qui citissimè os putrefaciunt, & postea carnem quandam su-

Variola.

Alij tumores.

Clauis.

Acrocordon.

Thymus.

Condylomata.

Verruca.

Myrmecia.

Paronychia.

perfluam ingenerant, quam fortè antiqui pterigion appellauerunt, à carne illa superaddita. Quare plura de hoc dicemus capite de adnatis. A causis procatarcticis fiunt tumores ob sanguinè effusum in quavis corporis parte hūc affectum *euchymoma* vel *euchymosin* vocant. Aliquādo sine magno tumore is est, & tunc potiùs vibices sine liquores dicuntur, de quibus cap. de vitiiis cur. plura dicemus. Tumores in oculis fiunt, quorū alij peculiare sunt, *Tumores oculorum.* alij aliis partibus communes, vt inflammatio coniunctivæ, quæ à parte sumpto nomine ophthalmia dicitur, alioqui toti corpori communis affectio. Condolyma aliquando ex coniunctiva propendet: ego vnum aliquando vidi, quod superabat ovi magnitudinem. Fit propter corneæ erosionem. Vuæ procidentia, quæ tumorem refert, & pro magnitudine sua nomen diuersum accipit. Nam quum admodum exigua est, & quasi muscæ capitis formam repræsentat, *myocephalos* à Græcis dictus est tumor: vbi accreuerit ad acini vuæ magnitudinem *ephylloma* dicitur. Si magis adhuc increseat, & sub palpebras contineri nequeat, *mylon* Græcis est. Quod si obduruerit clavis dicitur, ob similitudinem, quam habet cum clauo reliquas partes afficiente. Totus oculus intumescit per hunc affectum cum vehementissimo dolore pulsatorio, atque feruore. Videtur esse inflammatio flatulenta, quæ in cæcitatem desinit, sitque post vehementissimos capitis dolores. Nullum verum nomen proprium adhuc habet. Si absque dolore fuerit, dicitur oculi inflatio, quæ si in vuæ tunica fiat, rompitur illa rugositas iridis, & sequitur pupillæ dilatio, mydriasis vocata, quæ & à causa procatarctica & percussione fieri solet. In palpebris superioribus tumores fiunt, qui si duri sint, hordeoli, ab hordei figura, vel magnitudine dicuntur: intus latitant nec prodeunt foris, de genere scirrhorum sunt. Quod si *Palpebrarum tumor.* tota palpebra intumuerit, & cum perspicuitate, inflatio dicitur Græcis *ephyssimon*. Si absque perspicuitate, à superficie vigiliis excitatur, œdematodes tumor est. Fit etiam in his, qui cachexia, & cruditate laborant. Accidit enim vt intumescant iis oculi, vnde nobis sæpius signum est futuri hydropis. In cāto maiore oculorum tumor fit, qui *Ægyllops* dicitur, & est abscessus in ea parte, qui si

rumpatur in partem internā, & diutius saniem retineat, fit fistula lachrymalis vulgò dicta. Hanc si digito, manè potissimum, premas partem, cum lachrymis pus effluere videbis. Si verò magis ad medium ossis nasi descendat, per nares sanies effluet, si digito premas citra ossis perforationem. Id autem fit ob foramen in ea parte positum ad neruorum distributionem in partem internam. Materia enim illic colligitur inter os & cutem, & non inter ossa, quæ ethmoideā vocant. Nam cum prementibus digitis à parte externā non cedant, qui illic effluet pus digitis prementibus? A cute exterius pressa facile effluet pus per illud foramen in narium capacitatem. In interna narium parte in carne illa laxa, à defluxione pituitæ flatulentæ fit tumor, qui cum parvus est, parum conspicuus est, minimum offendit respirationem: si maior totam capacitatem internam occupat, & verè polypus est. Nam similis est polypo, & substantia, & colore, & figura. Tumor enim est globosus, vt polypi venter, substantia dura, qualis polyporum, & sepiarum caro. Color intus candidus est superficie, identidem colores mutat, vt polypus, priusquam indurescat: maior fit in singulis lunarum coniunctionibus, & decrescit aliis temporibus, sed quum magnus iam obduruerit, eandem semper retinet magnitudinem. Si caro illa accrescat in circuitu naris, & ab acrimonia humoris vlceretur, ozena morbus erit, à similitudine polypi, qui ab odore, ozitis quoque dictus est. Verum admodum differunt, cum ozitis polypus moscum bene redolet: ozena verò morbus tetrum inspiret odorem. In ore tumores fiunt cum inflammatione, aut sine ea. Nomen verò illis est varium à diuersis partibus. Si fiat in genis, peculiare nomen malum non est sortitus, sed inflammatio dicitur. Fit ex catarrho, & citissime suppuratur ob anhelitum, & loci temporum cum humiditate. Si tumor in gargarone ab eadē defluxione fiat, longus sit, tantum relaxationis vuulæ, dicitur columella seu parua columna. Si verò sit rotunda, & globosa pars extrema crassior multò quàm radix, vuula Græcis *staphyloma* dicitur. Si in glandulis, quæ vtrinque ad radicem linguæ sitæ sunt, fiant inflammationes *antiades* dicuntur. Si in adjacentibus partibus,

Polypus.

Ozena.

*Tumores
ori.*

*Staphylo-
ma.*

Antiades

aut in isthmo fiant tumores, dicuntur *paristimia*. Glandulæ verò in linguæ radicem ob morbum Italicum potissimum inducuntur, defluxionibus longo tempore neglectis, dici possunt hi tumores *cerades* internæ, si exulcerentur, causa sequentis expuitionis sunt. Fit tumor sub lingua cum inflammatione, & sine inflammatione. Cum inflammatione est morbus *burrachos*, ranula dicitur. Si absque inflammatione fuerit, videtur esse inflatio. Fit similis tumor in lateribus ad radicem dentium, qui cum ferro adaperitur, pituitam mucosam reddit, nullum nomē obtinuit, frequenter fit iis, qui morbum Italicum passi sunt, atque recrudescit frequentissimè morbus nisi candenti ferro vratur, & excitetur, non potest esse parocilis. Nam ex Aetij sententia parocilis est phlegmone, & in carne gingivarum fit, unde hoc morbi genus nomen esse puto, ex morbo Italico pituitoso natum, nisi quis velit dicere inflammationem tantum esse, verum inflatio sine pituitosa materia est, hic autem tumor, ut diximus, pituitam (non solum flatum) viscidam habet. In toto corpore sunt latæ pustulæ per scabiem, quæ ciussimè ad suppurationem sponte sua perueniunt. Hactenus de tumoribus externis, qui tactu & visu deprehendi possunt. Interni vero tumores, de quibus iam tempestivum est agere, ratione magis quam sensu dignoscuntur, quò fit ut ægrotis super hac re minus fidendum sit. Hi sunt vel magni vel parvi: si magni possunt etiam tactu deprehendi: si parvi, articulosi tantum coniecturis.

Magni & in ventre inferiore sub septo transverso, aut sub alia parte molli, quæ prementibus cedat digitis, sensu deprehendi possunt: idque potissimum, si regio multum vi morbi intumuerit, aut saltem non fuerit distenta flatibus, vel aqua, ut in hydrope, pars quæ eleuatur in tumorem præter naturam, tactu deprehenditur; discernitur verò ex situ partis, figura, &c. Nam si iecur scirrhus, aut alio tumore infestetur, tractata parte dextri hypochondrij, vel sinistri, ut superius quoque admonuimus, tumor apparet. A figura autem, quod veluti semicirculum efformet. Splenis verò tumores magis in sinistra, quàm dextra parte sunt, & potius ad mediam ventris regionem, quàm in superiore sentiuntur. Intestinalium

*Paristimia**Cerades.**De tumor.
internis.**Quo pa-
to discer-
nuntur
mores.*

tumores in parte vetricis inferiore aut media regione fiunt cum magna inæqualitate, prout essent multi tumores. In collo inferiore fiunt maxime scirrhi, qui figura eminentiuntur spherulas precarias. Si in superiore ventre figuram ferè rotundam sentias, mobilis vteri tumorem esse dicemus. Si duo tumores ex utraque parte aut altera tantum, idque in muliere, testiculorum inflatio est. In viris semine abundantibus tumores fiunt parastatarum, qui sensibus deprehenduntur in quibusdam post seminis longam retentionem. In aliis intus magis latent & feces retinent. Indicium est, quod post concubitum minus apparent in aliquibus, alij reddunt excrementa alui facilius. Quod si non licet partes has attrectare, vel ob tumorum prauitatem, aut ventris crassitiem, tensionemque, astantes vel ægros interrogare oportet, num gravitatem aliquam, vel pondus, aut difficultatem, vel impedimentum aliquod sentiant, ut si in hepate tumorem incipientem, aut incipientes obstructions esse suspicemur. Si tumor magnus rotundus in medio paulò supra pubem, vesicæ tumorem, si cum febre inflammationem esse, si sine febre ob retentionem urinae esse iudicandum est. Rogabimus si sentiat dolorem ad claviculam, vel circa partem posteriorem dorsi ad omoplatas. Si in respirando dolorem sentiat, & post tres vel quatuor horas à sumpto cibo gravitatem sentiat, aut si non potest ferre tantam cibi quantitatem, quantam ferre erat solitus, si per ascensum graduum aut equitationem sentiat gravitatem, & magis dextra quàm sinistra parte, si melius dormiat eo latere iacens, quàm opposito etiam vacuo ventriculo: Si excrementa alui immutata fuerint, aut urina magis tenuis, hæc omnia tumores hepatis etiam incipientes, nobis cerò prænunciant.

Vteri & parast. tumores.

Vesica.

Qua arguant hepatis tumores.

Qua splenis.

Considerato situ eadem ferè symptomata reperias in tumore lienis, minor tamen sit anhelandi difficultas, quia magis alligatur mesenterio, quàm septo transverso, neque tussiculam facit inanem, ut solet hepatis tumor facere. Color faciei & totius corporis fœdior, hepatis obstructions, & tumores significat. Subniger verò ex flavo nigrescens, splenis vitio accidit. Si cum febre sit, interrogare oportet scirrhum phlegmonodè, aut

crysi-

erysipelatodem esse, aut si non præcesserint, inflammationem, vel erysipelas Febris species, quæ necessario sequitur, has inflammationes discernit, & eos affectus. Nam quæ vitio hepatis accidit, synochos putris est, & *Inflammationes hepatis.* alui excrementa erunt liquida, putrida, sanguinolenta, & singultus fiet, ut dixit in Aph Si verò erysipelas, excrementa alui vitiosa, qualia in diarrhæa erunt. Febris autem causus fiet. Et hæc febris distinctio tumores calidos à frigidis discernit. Inflammationes verò splenis comitatur febris quartana continua: Vesicæ & vteri inflammationes febres continuas, sed minus acutas. Ferè semper omnium partium internarum inflammationes naturam febrium synocharum imitantur, quòd illæ à sanguine fieri dicantur, ut inflammationes. Pulmonum verò inflammationes pituitosas, aut biliosas febres habent, qui ex pituita, aut bile esse solent. Sunt & aliquando febres confusæ, ut si febris materia confusa sit permixta. Deprehenduntur verò circa tactum tumores omnes *Quibus* interni, thoracis quidem ex dolore vel gravitate, cum *deprehenduntur tumores thoracis.* difficultate anhelitus & tussi inani, nisi quando est inflammatio, à qua semper aliquid resudat: & hac ratione tubercula cruda ab inflammationibus discernentur, vel febre. Cruda enim tubercula nisi ad suppurationem veniant, febrem non faciunt, neque sputum mutant, nisi post eruptionem. Difficultatem anhelandi faciunt, & tussiculam inanem, & circa partem gravitatem & tensionem potius quam dolorem. Si in spina dorsi est tumor, gibbositatem, vel cavitatem facit processu temporis, & si longus fuerit, multas vertebrae ad intus trahit: si verò brevis unam aut alteram tantum, & fiet potius cavitax laxata ad intra vinculo. Contingit aliquando circa pericardium tumores, & inflammationes fieri. Si crudus tumor vel tuberculum fuerit, palpitationem vel tussiculam facit: si verò inflammatio, eadem symptomata erunt, quæ in peripneumonia, & hac nota discernuntur, quòd minori anhelandi difficultate laborent, & minus leuantur frequenti & multa expuitione. Aëstus maximus & febris maxima in tali affectione esse solet. Nos hanc affectionemprehendimus in nobili & generoso viro, cuius cor erat obductum seroso humore

Palpitatio

verso in saniem quandam, ob partis illius inflammationem. Et ne decipiaris, sentiunt quoque dolorem in lateribus hypofocota membrana consentienti. Ipsi pericardio rarissimus est hic affectus, & à quo pauci euadunt, quem nemo adhuc, quod sciam annotauit. A palpitatio-
ne, quam fecit humor crudus in pericardio, non multo post apparet atrophia, & corporis consumptio, ex cordis passione diaphragmatis inflammationem sequitur febris continua, vehemens delirium, maxima anhelandi difficultas, pectoris coarctatio & dolor à xyphoide & renum regione descendens in colli parte interna. Fiunt musculis stomacho subiectis inflammationes, ad quas sequitur deglutitionis impedimentum, & colli flexio difficilis. Si verò in musculis laryngis, & summitate trachie fiant tumores, difficultas in deglutiendo quidem erit, sed magis in respirando.

*Lethargus
& phreni-
tis.*

Anginae multas species efficiunt huius partis inflammationes, quæ si post morbum acutum fiant, lethales esse solent. In parte capitis interna fiunt tumores & calidi, & frigidi, ut phrenitis & lethargus. Illa magis in anteriore parte esse solet, & comites habet vigilias, deliria, motiones turbulentas. Ad lethargum verò contraria sequuntur, & cataphora, in multis hebetudo. Fiunt per morbum Ital. velu. icalli in superficie cerebri, ad quem sequetur menyngum tensio, & dolor. In vulneribus duræ menyngis fit tumor, à Græcis *μυατις* dicitur. Est verò caro flaccida potius & fungosa à multitudine sanguinis facta. Illam carnem vulneratæ menyngis signum esse certò putamus. Hæc de tumoribus dicta sufficiant. Iam ad reiecta transeundum.

De reiectis.

CAP. XI.

Quia nihil est, quod certius & citius partem affectam vel affectionis causam demonstret, quam quod è corpore reiecitur, de eo, quia hæc & morbi quoque cognitionem ostendit, prius est agendum quam de retento. Reiecitur autem è corpore, quod non erat reiciendum, vel non quale, neque per qualem regionem debebat, vel non tempore conuenienti, vel non tantum. Quare sic erit interrogandus æger, an reiciat nunc, vel prius reiecit. ut præter consuetudinem, vel aliquid consuetum

ſuetum immodicè, aut cum difficultate. Dico reiecit, quia plebei homines, propter aliquod reiectum magis ſe putant laborare, aut imbecilliores reddi, quàm alia cauſa. Multùm enim reiectiones formidant non conſuetas. Interrogabimus num conſuetà ſit reiectione, an largà, & ſi adhuc reiiciat, & quale ſit. Quòd ſi dicat id fuiſſe, ſciſcitandum, & quid reiiciat, vt per nares, os, vterum, veſicam, per os vteri. Etenim per omnes has regiones contingit ſemper aliquid reiici. Quòd ſi regionem indicarit, quale illud ſit, quærendum, vtrum aliquod recrementum vel humor aliquis, vel aliquid de ſubſtantia partis, vel ingenitum in nobis, vt vermes: ob id interrogabimus num liquidum ſit, vel ſolidum: ſi liquidum, an ſanguis, vel ſanguinolentum aliquod aut purulentum, vel vrina, chylus, bilis, pituita, vel atrabilis, ſaliua, vel ſudor, lachrymæ vel ſemen. Primò de ſanguine percunſtandum, quia magis terrenetur, & frequentius de hoc cõſultant medicos. Deinde de reiecto per fluxum ventris. Si ergo ſanguis reiicitur, per quam regionem id fiat, ſcire oportet, & quo tempore, & reiiciendi modum, colorem, conſiſtentiam, quantitatem. Nam non omnis ſanguis reiectus, neque omni tempore neque per omnem regionem malus eſt, modò non fluat immodicè. Reiectione enim ſanguinis poſt partum, & tempore menſium laudatur: Atque ea, quæ ſit à naribus per criſim in Synochis febribus & aliis, modò non ſit ſuperfluus. Hæmorrhagia è naribus poſt capitis dolorem commendatur, iuxta illud Hippo. Caput dolenti, ſi pus vel ſanguis per nares effluxerit, liberatur.

Quare ſi ſanguinis reiectione critica fuerit, priuſquam illam probemus vel vituperemus, ſcire oportet morbi ſpeciem, ætatem, & ægroti naturam. Non enim in omni morbo acuto criſis facta per ſanguinis profuſionem è naribus laudanda eſt. vt in lethargo & Perypneumonia diximus in ſuperioribus ex Galen. non conuenire: quia vtraque affectio à frigido humore fieri dicitur. Quòd ſi Perypneumonia à bile fiat, quod eſt rariſſimum, vituperanda non erit huiuſmodi criſis. In iuuentute laudatur ſerè ſemper omnis criſis per hæmorrhagiam è naribus: In ſenioribus vituperari ſolet. In puellis, quibus

Hæmorrhagia laudabilis.

Quibus illa laudabilis hæmorrhagia, qui bus laudabilis.

*Reiectio
sanguinis
per os.*

nondum eruperunt menses, aut quibus suppressi sunt, aut hæmorrhoides suppressæ, & retentæ, reiectio sanguinis maior etiam laudatur. In aliis mala, & futuræ hydro-pisis, & cachexiæ signū est. Si è naribus fluat per casum vel percussione, venam aliquam in cerebro fractam esse indicat. Si talia non præcesserint, sanguinis reiecti quantitas est consideranda. Nam si in parua quantitate, & frequenter sine capitis calfactione, vel corporis agitatione, aut externa occasione, inspiciendæ sunt nares, vel interrogandum an crustas auferat. Quod si verum sit, & fateatur, vlcus seu erosionem esse oportet in narium parte interna id etiā in leprosis euenire solet. Quare vt vlcus illarum partium sine inspectione agnoscamus, interrogandus, num aliquando illis sanguis è naribus fluat. Quod si reiectum fuerit per aures, magnam cerebri cõ-cussionem significat. Si per os reiectū fuisse sanguinem dicat, vt partem, à qua fluit, & deprehendamus, quantum & quomodo sit reiectum, quærimus, an vomitu, an tussi, an sola expuitione. Nam si parum sanguinis & sine tussi, sola expuitione reiciet, è gingiuis, vel aliquo oris vlcere erit. Quod si eadem quantitas leui tussi reiecta fuerit, sanguis tenuis, & adhuc floridus, è trachia arteria redditur. Si verò cum inspiratione narium & leui tussicula sanguis ater sit recrementis variis permixtus, è cerebro in arteriam fluxisse sanguinem suspicamur, & ob id interrogandum an prius sanguis è naribus fluxerit, aut tale quidpiam reiectum sit sed permixtum variis recrementis. Variarecrementa hîc appello, cum alia sint indurata, alia inspissata, aliqua alba, alia flavescentia, qualia esse solent, quæ per nares reiciuntur. Quod si nõ præcesserit fluxus sanguinis, ætas florens sit, morbo acuto laboret, appareant signa alia futuræ crisis, per nares sanguis erupiturus est. Solet etiam post balnea, insolationes, & alias capitis calfactiones effluere, quare de illis occasionibus interrogare oportet. Quod si cum tussi, sanguinem hunc reïci sciamus, de calore est interrogandum, necnon de consistentia, vt distinguamus num è thorace vel pectore reiciatur. Nam si dixerit sanguinem esse tenuem, splendidum, spumosumque, è pulmonibus reiciitur: Si verò sanguis crassior sit & nigrior;

grior: doleátque thoracis pars aliqua sine Pleuritide, è thorace fluxerit, vel ob retentionem mensum aut hæmorrhoidum, si cum febre reiiciatur, serosus vel flauescens fuerit, & pituitæ permixtus, aut inflammationem pulmonis, aut costarum esse oportet, si id in principio appareat. Quod si sanguis crassior redditus sit, cū febre & dolore pectorio etiam, ex Pleuritide est, in qua sanguinem mittere est periculosum, teste Hipp. in epi. At si vulneratus fuerit æger in aliqua thoracis, vel dorsi parte, vulnus ad interna penetrasse est necesse. Si verò vomitione reiectus fuerit, è ventriculo est. Quod si concretus est & præcesserit hæmorrhagia è naribus, illinc per œsophagum in ventriculū descendisse dicemus. Quod si non fluxerit è naribus, præcesserit autem saltatio, aut immodica corporis agitatio, biberit aquas frigidas, sanguinem in ventriculo concretum esse dicemus, quā nostri affectionem vulgò (*morfondeure*) vocant. Illis tutò dari, quæ sanguinem dissoluunt, possunt, aut non cōcre-scere sinunt. Fluit etiam in ventriculum per casum, vel percussione. Si autē paucus sanguis chylo vel puri admixtus vomitu reiiciatur, arroSIONem ventriculi, vel medicamentis venenosis, vel alimentis acerrimis esse suspicamus. Quare ab illis sciscitamus num dolorē sentiant in aliqua parte ventriculi, maximè cū ueracius bibunt, vel poscam vel acius aliquod. Si per sedem sanguinem reiiciat, ut discernamus an ab hepate, an à venis mesaraicis, vel ab intestinis, vel hæmorrhoidibus fluat, de colore, consistentia, admixtione, cum aliis recrementis interrogandum. Primum num è venis sedis proiciatur, quærendum. Id verò ex tumore venarum externarum quæ illic sunt, deprehendemus: internas autem ex pondere circa sedem, difficultate egerendi, & clysteres aut glandes, aut etiam pessaria immittendi, & quod sanguis aliis recrementis non sit permixtus, sed quod fluat ante vel post, vel simul, aut separatus, serosus & tenuis aliquando est, sed ater frequentius, tenuis & splendidus ob feri admixtionē. Si verò ab hæmorrhoidibus certò sciamus hunc fluere, quæremus iam vtrum per sanitatem id solitus sit pati, & difficulter alui recrementa reddere. Quod si mulier fuerit & cum difficultate pepererit, aut

*Inflam-
mationis pul-
monis si-
gnum.
Pleuritid.*

*Concretio-
nis sang-
uinis.*

*Arro-
sionis Vetrici.*

Fluxionis hæmorrhoidales cachexia laboret) hæc solent esse fluentium hæmorrhoidarum occasiones) tunc omnino colligemus sanguinem ex hæmorrhoidibus fluere. Si verò paucus pituitæ permixtus sit, & cum frequente cupiditate deiciendi, à recto intestino est, maximè si Dysenteria præcesserit. Si autem sine frequenti cupiditate deiciendi, sed & cum difficultate, & dolore, & parùm recrementis permisceatur, & citò post d. lorem reiiciat, dolor sentiatur circa os pubis, aut in lateribus ventris, è regione ventriculi, in colo vlcus esse significat, & ab ea parte sanguinem perfluere. Si verò maior recrementorum permixtio fuerit, dolor circa vmbilicum, & non sic statim à dolore reiiciatur, à superioribus intestinis propter vlcus fluit: potissimum si in minori quantitate, vt post fluxu bilis, & mucorum, pinguedinis, & ramentorum reiectionem, quæ solent Dysenteriam præcedere. Si autem maior sanguinis quantitas reiiciatur, ab hepate reiici est necesse. Reiicitur autem vel aquosus, vel crassius & ater ab hepate. Si, vt bitumen, sanguis nigrescat, & splendet, appellatur improprie Dysenteria. Vulgus medicorum appellat fluxum lotium, in quo sanguis dilutior redditur. Alter affectus, in quo sanguis fluit crassus, nomine caret. Fluit autem ille sanguis per fluxum lotium è venis mesaraicis, & ramis venæ portæ, quæ sanguinem rudem & imperfectum, multo sero permixtum continere solent. Si ab hepate crassior est, magisque concrevit, & nigrior apparet. Quare interrogare oportet num æger in otio degat, multis cibis sanguinem gignentibus utatur, aut mutilatus fuerit, aut sanguinis suppressio aliqua facta sit. Ista autem præscire oportet, vt sciamus num ob Dysenteriam à felle nigro accidat. Quod si illæ causæ non præcesserint, sentiat verò æger tormina ventris, Dysenteriam esse oportet, quæ lethalis, si à felle nigro inceperit. Aliquando redduntur nigra, liquidæque Gal. *melancholica* vocat, sine Dysenteria & cum vrilitate, vt in fine febrium quartanarum, in morbis aliis melancholicis, & in statu pestilenti omnes euaserunt, quibus fluxerint illa excrementa nigra. Dysenteria autem à felle nigro incipiens semper lethalis est. Fluxus ille, in quo sanguis bitumini iudaico similis excernitur

nitur otiosis & comedentibus aliquando magna ex parte
 utilis est. Si per sedem vel vomitum reddiderint sangui- *A vulne-*
 nem post vulnus inflictum, ad intestina vel ventriculum *re locus*
 penetrasse significat. Si cum chylo & alimentis ad ven- *colligitur*
 triculum penetrasse coniicimus. Si cum stercore ad cras- *ex sang.*
 sa intestina: si cum chylo iam flavescentem ad græcilia
 intestina. Sanguis per vulnera redditus semper venas
 aut arterias latus esse significat cum saltu ex arteria: si
 tenuis & sine saltu, ex ramis venæ portæ fluit. Si crassus
 & sine saltu, ex aliis venis fluit. Per penem reici solet *Profluuij*
 sanguis è renibus, aut vesica, aut collo vesicæ. Reddi- *sang. à pe-*
 tur autem vrinæ permixtus, vel ab ea distinctus: si sine *ne.*
 vrina, immissa fistula ænea fuerit, aut iuncus, aut aliud
 instrumentum, ad hanc rem aptum & idoneum, vel in-
 iecerit acré medicamentum, vlcera tum esse penem su-
 spicabimur. Si nihil eorum præcesserit, & cum vrina red-
 datur ille sanguis, statimque subsideat, è vesica fluere di-
 cemus. Si autem post longum tempus subsideat & mul-
 tus sit, è renibus fluit, & potissimum si cantharidas as-
 sumperit, atque dolor è circa lûbos persentiat. Mulieri
 si defecerint menses, idem potest accidere: è vasis sperma-
 ticus potest fluere post immoderatum coitum: Si verò ex *A pudêdo*
 pudendo muliebri sanguis reddatur, à supradictis locis, *muliebri.*
 vel ab vtero fluat, necesse est. Quòd si sensim & sine ali- *A collo v-*
 quo sensu egrediatur, non à vesica, sed à collo vteri, vel *teri vel ab*
 ab vtero ipso fluere necesse est. Si ab vtero, minorem *vtero flu-*
 quantitatem reddunt, nisi pepererint. Si à collo, maio- *xio.*
 rem copiam excernunt, & etiam si non pepererint, vel
 post difficilem partum aut post virginis corruptionem.
 Si ab vtero fluat, animaduertendum est, an gravida sit
 mulier. Quòd si multus sanguis egrediatur, aut abor-
 tum patitur, aut patietur, aut fœtus est imbecillior. Si
 iterum gerat, & sanguis fuerit paucus, serosus magis
 quàm sanguineus fluxus, & tempore, quo purgari con-
 sueverat, minùs formidandum, maxime si huic affectio-
 ni sit consueta: quòd si retineatur, citiùs abortum pa-
 tietur. Si post abortum sanguis fluat, interrogare oportet,
 quorum est mensis. Nam quò maior fœtus fuerit, eò
 maiorem sanguinis fluxum esse oportet. Si mulier, quæ
 peperit, fluxum sanguinis patietur, interrogare oportet.

ter si lactet, aut lactare velit. Si noluerit lactare, permit-
tendus est ille fluxus, ut à mammis evertatur. Quod si
lactanti superfluat, citius compescendus. Si mulier post
partum, vel sine partu, hunc fluxum sanguinis patiatur, vl-
cus est suspicandum. Quare propter quam occasionem
fluat, scire oportet, & quomodo in principio fluxerit.
Nam si à partu id acciderit, vel post virginis corruptio-
nem, vulnus præcessisse oportet. Si verò post menses al-
bos per *diæcagon*, quare vlcus adesse oportet, potissi-
mum si multum sanguinis reddatur, & concresecat, sen-
tiatque veluti puncturas, ab arrosione sanguis fluit: qua-
re vlcus esse necessario dicemus. Si cum tumore duro
sanguis ater & foetidus est, cancrum esse significat. Si au-
tem sanguis paucus est, & is serosus reddatur, & cache-
xia laboret, per diapedesim sanguis fluere putatur. Si
autem multus sanguis & aliquando concretus fluit, multo
præcedente vulnere, aut sine fluxu menstruali per ana-
stomosim fluit. Per oculos sanguinem reiciunt post vul-
nus vel serosum sanguinem ob cachexiam per diapede-
sim: is sub cute colligitur verius quam effluat. Id fit in
coniunctina ut per suffusionem, quod color rubens satis
indicat. Suffusionem etiam hinc intelligimus, quæ à san-
guine est. Per poros cutis etiam sudor quidam serosus
sanguineus reiectus fluit aliquando visus à nobis in stu-
dioso quodam. Is ab omnibus corporis partibus sangui-
nem serosum resudabat, ob venarum raritatem, & san-
guinis tenuitatem. Si reddatur ex tibia, vel ex brachio,
oportet venas esse dilatatas, ut in varicibus solet accide-
re, & cancris, in quibus ob illam sanguinis circa partem
retenti copiam, vel ob flatus, fit crepatura, apertio ve-
narum: ab ulceribus & vulneribus id frequentissime ac-
cidit: in vulneribus statim quidem ab initio: in vlceri-
bus autem phagedenicis ob venarum erosionem, & tan-
dem etiam post carnis generationem. Est enim adhuc
tenera & sanguinea: ob id facile ab illa sanguis effluit.
Aiunt sanguinem reddi per urinam ex cantharidarum
appositione, quod nunquam evenire cognovimus, quanvis
ventri apposuerimus, permixtas tamen aliis medicamen-
tis. Solæ quidem & per se ulcera & corrosiones faciunt,
sed in parte externa tantum, cum illic apponuntur. Non
enim

*Serosus sãg.
per sudore
reiectionis.*

*Canthar.
dubia opi-
nio.*

enim vis earum ad profunda sic penetrare potest, ut sanguis reddatur per vesicam.

De puris resectione.

CAP. XII.

IAm de pure nobis agendum est. Pus effluit per omnes eas partes & regiones per quas fluit sanguis, nisi per cutem. Densior enim est, quam possit hac parte fluere. Semper ab ulcere, abscessu, aut inflammatione interna resudat, ab externa effluit. A qua parte fluat aut resudet eadem & methodo erit inuestigandum, qua prius cognouimus, à qua parte sanguis efflueret, & præter illa quæ de sanguine profluente diximus, nos scire oportet, an ab inflammatione, an ab ulcere fluat. Ob id præsciendum an doluerit pars externa, vel interna, febricitarine, & alia præcesserint, quæ de tumoribus internis diximus. Tunc enim ab inflammatione puri aliquid proportionem respondens resudare dicemus. Quod si dolor statim sedatus, mitior febris statim reddita fuerit, rigor aliquis præcesserit, sudor effluxerit affatim, & magna quantitas, leuata fuerit pars grauitate, ruptionis signum est ab ulcere, vel abscessu rupto pus effluere significatur. Apparêt aliquibus in partibus aliquæ notæ ruptionis abscessu, ut in thorace facta sit ruption, & magna sit puris quantitas, difficultas anhelandi maior erit, & tussis assidua & febricula. Si verò in vesica ruption fiat, vel recipiatur frequenter, suppressio vrinæ sequitur, maximè si vacua vesica accidar. Tunc enim suam retinet crassitiem, qua obstruit. At si in semiplenam vesicam vrina descendat, ita diluitur, ut non obstruere possit, sed vniuersa cum vrina reddatur puris materia. Pus è renibus cum vrina reiectum reiecitur, sanguinolentum aliquando, & exactè vrinæ permixtum, quod & si resideat, semper vrinam turbatam reddit, & non nisi post longum tempus residet. Et quò certiores simus, num à renibus reiciatur, an aliunde interrogare oportet num senserit dolorem à longo tempore fixum, circa regionem renum. Et si aliquando reiecerit calculos, aut passus fuerit dolorem grauè cum febre: quod si fateatur febrem sensisse prius, & dolorem renum grauem inflammationem præcessisse, aut abscessum à quo vlcus, oportet. Si calculum reiecerit, & dolorem senserit, præcesseritque san-

*Ruptionis
signum ab
ulcere.*

*Puris è
renibus
reiectio.*

guinis reiectio, exulcerationem significat, à qua pus effluit. De quâtitate etiam interrogare oportet, num multum subsideat, & valde viscidum, vel spissum. Solet enim multitudo puris à partibus carnosiss, & præditis multo sanguine effluere, viscidum crassumque à partibus internis ob internarum partium caliditatem, quod diutius coquendo & alterando crassius semper redditur, vel à partibus nervosis, quia crasso & pituitoso sanguine nutriuntur. Si verò respõdeat parum puris residere, & quasi mediocriter permixtum, è meatibus vrinæ defluere coniciemus, tum maxime si dolorem illum clamosum

Puris è vesica reiect. ob calculi descensum senserit prius, calculus asper redditus fuerit. & cum paucò sang. Si respondeat pus citò subsidere, & viscidum, vel mucò permixtum, & nullam inflammationem senserit circa lumbos, ab ulcere vesicæ descendere affirmabimus, & potissimum si squammæ aliquæ non carnosæ partes redditæ fuerint. Gravitas circa pubem, vesicæ affectionem significat. Ut autem distinguamus exulcerationem penis à supradictis exulcerationibus, sciscitari oportet si pus spontè profluat sine vrina, aut cum incipit vrinam reddere. Si post vrinam redditam, maiorem dolorem sentiat, ulcerationem in penè certò sciemus. Nil enim à renibus aut vesica redditur, nisi permixtum vrinæ, & ob ulceris deteriorationem ab vrina factam, magis sentiunt post redditam vrinam, quàm in principio. Si pus album, lene, & æquale sit, paucum, minime viscosum, ab ulcere penis profluit. Si viscidum aliquid cum pure reddatur, Parastatarum inflammationem præcessisse, & vlcus significatur. In illis inflammationibus & exulcerationibus semper

Puris per sedem reiectio. aliquid seminis simul reddi necesse est. Per sedem verò inferiorem si dicant pus reiectum, interrogare oportet, ut sciamus num ab hæmorrhoidibus exulceratis, vel ab ulcere recti intestini, vel colli, vel mesenterij, vel ab hepate, vel splene reiectum sit. Si pus illud separatum ab alui recrementis, vel permixtum sit reiectum, si cum dolore ventris, vel torminibus, si secretum reddatur, vel potius detergendo podicem, vel si præcesserit Tenasmus, aut permisceatur sanguini à fistula, vel ulcere hæmorrhoidum reiectum esse intelligemus. Si leuiter permi-

permixtum recrementis duris, cum Tenasmo, à recto intestino. Si cum torminibus, & vehemèter permixtum, à colo & superioribus intestinis vlceratis fluit. Si per paroxysmos & nō semper, à vomica interna. Cū verò præcesserit hepatis aut splenis inflammatio, ab illis abscessu tentatis reicitur. Si cum dolore circa vmbilicum recrementis permixtum reddatur, à mesenterio reici sciemus, & potissimum si nulla tumoris in hepate, vel splene circumscriptio apparuerit.

De bilis reiectione.

C A P. XIII.

QUOD flauum est, vel ex flauo rubescens, vel colore æruginoso, vel lfaridis colore è corpore reiectum, biliosum est. Quare cū reicitur aliquid, quod neque sanguis, neque pituita, vel nigra bilis, neque serum biliosum est. Quare videre oportet, à qua parte reiectum sit, an per os, an per nares, per sedem, vesicam, vel vterum. Et cū bilis diuersa sit colore, consistentiâque distinguatur, de colore & coloris gradu & consistētia eos rogare oportet, si nobis nō liceat videre quomodo per illam regionem sit redditum illud. Si per os redditum dicat æger, rogare oportet si vomitu, vel tussi. Quod si cum tussi reiecerit, & adsit febris, dolor acutus, vel punctorius, Pleuritis à bile est. Si anhelandi difficultas, & rubedo maxillarum, & malarum, pectoris grauitas, tussis Peripneumonia est. In his solet esse sputum flauum, vel subflauum, & spumofum, & paucum. Quod si vomitu reiectum sit flauum, vel viride, vel cæruleum est: Si flauum & amarum, flaua bilis è folliculo fellis in ventriculum fluxit, ob obstructionem intestinorum, vel ob insignem attractionem ventriculi, post vomitionem pituitæ, aut cibi. Rursus rogare oportet, si rigor præcesserit, vel sequutus fuerit. Quare si rigor sequitur, sine vel cum febre, si multa & continua per vomitionem & ventrem fluat, choleram morbum esse suspicabimur, maximè si Cholera præcesserint alimenta, quæ hunc morbum generare apta sunt, vt peponum liberalis copia, olera multa acris, & amygdalæ multæ tempore calido, ab eo qui ventriculum habet calidum. Si verò viridis, æruginosa, vel porracea bilis est, quæ non potest sine magna affatione fieri, vel ex comestione porcorum, alliorum, & olerum,

Peripneumonia signa.

Cholera morbi signa.

*Dysente-
dia signa.
Diarrhea
signa.*

quæ talem succum in ventriculo generant. Si colore cœruleo, Isaridis bilis reiecta est. Per aluum verò sine medicamento, vel Diarrhea est, vel principium Dysenteriae. Si cum torminibus, & pituitosis recrementis, aut ramentis, aut sanguine exeat, Dysenteriam esse affirmabimus: Diarrheam verò si sine morfu & erosione, & cum serosis aliis multis excrementis, illa biliosa reiecta semper cum aliis misceantur recrementis. Adde quòd bilis syncera non est, quæ ex partibus profluit internis. Per vesicâ multa cum vrina expurgatur. Per vterum cum aliis recrementis: sic per nares & pulmonem. Quare sufficit videre, si flavescant, & si admodum amara non sentiantur. Quæ reiciuntur per nares excrementa amara, expelluntur è capite, & illa pituitam quandam mixtam habent, quæ illam crassiores facit. Si verò per vomitionem, vel sedem crocea & vitellis ouorum similis colore, & consistentia reddatur, vitellinam esse dicemus. Quare si cum febre sit, longitudinem morbi cognoscimus: quòd si non licet videre, dicemus nos consultantibus, vt ob oculos ponant humoris Ideam, vt cognoscatur, nòsque certiores reddant. Si rogatus æger de reiecto, dicat nigrum reiectum fuisse, oportet vel per vomitum, vel vterem, vel vterum, raro per sputum. Si per vterum, vel sanguis est refrigeratus, ergo & coagulatus: vel nigrum & liquidum quoddam reiecitur, & fœtidum, & paucum. Quòd si tale sit, Cancri vlcerati in vtero suspicionem habemus. Quare de duritie partis, & de dolore pungente, & acri oportet interrogare: quòd si hæc adsint, certius est vlcus esse cancrum in vtero. Si sputum nigrum, ex melancholia Pleuritis est, si cum aliis signis sit. Si sanguis niger ob affationem, vel extinctionem caloris naturalis, quod mortem proximam necessariò significat. Si per vomitum, nigrum quid reiecitur, tum melancholiam, quæ in ventriculum fluxit, è ramis venæ portæ significat. Si per sedem quid nigrum reiecitur, adinstar bituminis Iudaici, Dysenteriam illam improprie dictam, quæ mutilatis, vel otiosis, vel iis, qui alimentis multum alentibus vtuntur, solet accidere, vel esse oportet, vel cancrum intestinorum. Iam de pituitæ reiectione nobis agendum.

De pituita reiectione. CAP. XIII.

Quia frequentissimè in morbis pituita reiecitur, egrū sciscitari oportet, nū aliquid albū reiecerit. Quod si ita euenisse respondeat, an per nares, an per os, an per oculos, per sedem per vterum, vel per vesicam, denuò petendum. Nam per omnes istos meatus pituitam excernere contingit. Porro de reiectionis modo, de coloris gradu, aut de sapore, de consistentia, de missione, vt de aliis reiectis superius dictum est, vt cū materiam morborū, rum partes affectas, & morbos ipsos per reiecta cognoscamus. Non enim est vna pituitæ differentia, sed plures, quæ pro natura eius diuersa, diuersos morbos, & diuersa symptomata procreant. Consistentia nanque alia est a-Pituita quea, & potius serosa, quæ per oculos in lachrymarum *Varia cō-* fluxu, & per nares in coriza defluit. Alia autem crassior *sistentia.* est, quæ salua dicitur, per os reiecta, magis adhuc crassa est, & viscida. quæ similis albumini ouorum fortiter agitatorum vomitione è ventriculo reiecitur, in ipso ventriculo per cruditatem genita aut per defluxionem è cerebro factam, vel è pulmone. In catarrho crudo est illa insuper species superioribus crassior, albuminibus ouorū nō agitatīs haud ab similibus, sapore dulci vel insipido, quæ à ventriculo, quo appetentiam deiciebat, reiecitur. Quare de appetentia interrogare oportet, an auctam post reiectionem sentiat magis, quàm antea. Crassissima porro omnium illa est, quæ per sedem reiecitur, vitro liquefacto similis, quæque dolores diurnos coli vni parti affixos ingenerare solet: ob id an dolor ventris præcesserit, si sensum similem adfert, ac si terebello intestina perforarentur, sciscitandum est. Quod si ita contigerit, doloris solutionem expectare oportet.

De saporis qualitate.

Aliqua planè insipida est, quæ morbos pituitosos mitiores facit & magna ex parte consistentia tenui & aquosa est atque vt plurimū spumosa ob flatum permixtum, quare dolores & inflationes maiores facit. Alia est sapore dulci in ventriculo genita, quæ, vt diximus, satietatem facit. Alia salsa, quæ sitim in ventriculo excitat, exulcerationem verò & exoriationem in illis partibus, per quas frequenter redditur, dolores, vt circa

sedem in tenasmo, in vesica, aut pene cū vrina redditur: in pulmonibus & trachia arteria, si per tussim, in naribus: si ē cerebro per nares reddatur. Acida verò redditur, quę si in ventriculo est, *boulimon* facit, in intestinis dolores acerbissimos, miniores tamen, quā qui à vitreo humore, qui etiā acidus est, excitantur.

De colore pituita.

Quanquam omnis pituita alba sit, alia tamen magis, alia minus alba apparet. Spumosa enim ob aërem admixtum semper candidissima apparet. Acida minus est & vitrea, & aquea. Vitrea vitri fusi colorem & consistentiam imitatur. Porro quę in pulmone diutius retenta est, vel in naribus, flavior est ob longam cocturam & alterationem. Et quia vomitione pituita plerumque reicitur, de eo reiectionis modo primū interrogare oportet, quo tempore. si manē cum nausea reddatur, ventriculi pituita plenum significat, vel ob cruditates, vel ob cerebri defluxiones. Si verò post cibum, cruditates significat, & pituitę spumosę & lienis redundantiam. Sed si alio tempore excreta sit, suspicio alterius affectionis exoritur. Quapropter si cum frigore reddita sit, idque absque vehementi dolore, febris initium significat, pituitosę nempe aut permixtę, aut composıtę. At si nullus dolor, nec febris aderant initio, nephriticū, vel colicum, vel celiacum dolorem, & affectum protendit, quos sic discernere oportet. Vbi enim anteriore parte ventris magis infestat, comitemque habet recrementorū retentionem, colici doloris certissimum indicium est.

De Vomitione pituita.

Colici doloris certissimum signum.

Nephritici vel celiacifignum.

At si lumbos potissimum occupare videatur, sequaturque statim, vel præcesserit vrinę mutatio, nephriticum affirmare possumus, siue celiacum affectum cū animi defectionem, tum fluxum ventris adfert. Hęc de pituitę per vomitionem reiectione. Per sedem etiā illa reicitur, idque nonnunquam cum alui fluore, aut sine fluore. Quę sine fluore est reiecta, sed pauca & cum dolore podicis, magnoque conatu reicitur, tenasmus est. Quę verò cum fluore etiā spumosa apparet, per defluxionem à capite descendere creditur, vbi potissimum per multos menses perseverauerit. At cū tota alba est

deiectio, chylique speciem referens, dyarrhæa esse indicatur, quæ è venarum mesenterij obstructione prouenit. *Diarrhæa indicium.*

Pituita reiectio per urinam.

Solet quemadmodum per superiora loca, sic per vesicam pituita reddi, variarumque affectionum notas demonstrare. Nam quæ dum excernitur, nullum doloris sensum, aut in pene, aut in renibus infert, & in fundo excreta crassioris farinæ instar residet, crudus succus esse dicitur, qui renum aut articulorum dolorem, aut calculum, vel morbi, qui adest, longitudinem, vel etiam corporis consumptionem minatur. At si alia cum dolore magno conatu reddatur, quæ viscida sit, & parum permixta, talis in exulceratione renum, aut in vesicæ calculo tantum emitti creditur. Ea autem quæ salsa est, propter insignem detergendi vim, quam talia obtinere solent, dolorem maiorem secum adfert. Quod si pituitam æger, qui antea asthma laborabat, emit, morbi commutationem, & transmutationem expectare oportet. Tot ergo modis per vesicam pituita effluit.

De pituita reiectione per uterum.

Per uterum vero mulieres quandoque illam expurgant, præsertim pituitosæ, & in otio deænes post mensium purgationem, quæ aut serosa & tenuis, aut crassa existit. Si tenuis & in magna quantitate fluat, menses illos qui albi dicuntur, excitat. Si autem crassa & viscida, quia lubricum uterum facit, aut abortui obnoxias aut omnino steriles reddit mulieres. Sed si etiam simul salsa sit, saliores, & tandem exulcerationem in utero parit, licet frequenter accidat utero exulcerationem patiente pituitam defluere, quod omnibus aliis ferè partibus corporis exulceratis commune esse videtur. Sunt & aliæ partes, per quas frequenter pituita expellitur, ut per os, in quo salua ducitur, colligiturque vel deflexionem, vel exulcerationem, aut columellæ relaxationem. Dein per nares, in quibus calfacto capite, aut refrigerato multa & acris, quemadmodum in coriza (gallicè, rouspie) solet distillare. Postremo per oculos tenuis & aquosa, ubi lachrymæ nomen assumit, in quos decumbit, vel propter microrem, aut cerebri calfactionem, vel obstructionem, aut ipsorum oculorum exulcerationem, aut carnis canthi

maioris consumptionem, aut eiusdem arrosionem: denique propter rei acris odorem, fumumve: quod eis accidere solet, qui circa fornaces alchymistarum versantur. Talis autem affectum tantum oculorum denotat.

De seminis reiectione.

CAP. XV.

Semen benignioris alimenti excrementum est, quod ad speciei conservationem servatur, cui natura difficiliorem exeundi viam instituit, ne ex eius fluore immodico, corpus cito contabesceret. Seminis reiectio alia est secundum naturam, alia præter naturam: illa secundum naturam dicitur esse, quæ distento pene fit, & post confricationem in coitu factam. Præter naturam effluit semen, aut cum mentulæ erectione, aut sine erectione. Posterioris itaque tantum habenda est ratio nobis, ut morborum & symptomatum, quorum illa significatio est, causam deprehendere possimus. Ut autem ad id sine negotio perueniamus, primum scire oportet, in quod per penem eiectum est, album vel viscidum, vel spumosum fuerit: subinde oportet eius à quo fluit, ætatem, corporis habitum, faciei colorem contemplari, à quibus tandem ad profusionis eius causam deducimur. Quod igitur ad ætatem pertinet, non omnis talem profusionem fert. Pueritia enim ideo seminis excernendi impotens est, quod illius materia in corporis nutritionem, & incrementum vertitur. Ultima verò senectus ob alimenti defectum. Ideo iuuenibus, vel ætate consistentibus, vel iis qui venerem nunquam experti sunt accidere potest, ut semen sponte effluat, ob illius exuperantiam, vel vasorum relaxationem, & imbecillitatem in iis, qui immodicè venerem exercuerunt. A corporis habitu etiā indicia quædam petuntur. Quando enim in corpore quadrato fit, & succis pleno, ob seminis abundantiam exiliisse credi potest. Contrà quæ quandoque in macilentis, & extenuatis, coloremque pallidum habente corpore, seminis emissio fit, consumptionis & huius corporis emaciationis causa esse merito videri potest. Et ut certius de hac re pronunciare liceat, deiectionis seminis modus, tempus, & quantitas diligenter perpendenda sunt. Ad modum refertur distento pene, vel sensim seminis euacuatio facta, quæ indicio esse potest vim expultricem.

trix ab aliquo illarum partium vlcere irritata, vel ob colloquia lasciuia stimulatâ, vel ob vasorum plenitudinē commotam ad eius reiectionem fuisse. Tēpus verò profusionis seminis est cum noctu, vel interdū fit. Noctu autem inter dormiendum per insomnia libidinis, aut in attenta rei veneræ cogitatione, semen affatim procidit. Effluentis autem huius causâ est, seminis vel exupurantiâ, vel flatuum copia, aut acrimonia naturam proritans. Quod autem vnaquæque istarum causarum per se id effecerit, suis propriis notisprehendemus. Tum enim huius effluuij causâ in solam seminis redundantiam non ineptè reiciemus, cum, qui illud patitur, in ætate florens vitam otiosam egisse videbitur, cui ciborum & alimentorum multum nutrientium adiunxerit vsum, vel ipsum veneris vsum, vel aliquantisper intermiserit exercitium, à quo tamen nihil periculi imminet. At si ille potius ex vitæ intemperatiâ cruditates multas collegisse, vel vigiliis intemptiuis, & ex fructuū crudorum, & olerum, & similium flatus generantium immoderato vsum collegisse videatur, vt si abstemius sit, iam non dubitandum, quin propter flatuum copiam seminis profusionem hâc patiatur. Qui si medicamentis semen extinguentibus frequenti assumptione, eam sistere speramus, multo tamen vehementius prouocauerimus, minus mirandum erit, cum omnium talium medicamentorum genus summæ frigiditatis sit particeps, ratione cuius intemperiem, quæ illud profluuium excitabat, auxerimus. Si verò nihil eorum, quæ dicta sunt, adfuerit, quin potius in sene eruperit illud seminis profluuium, quod longo vsum acrium eduliorum, (cuiusmodi sunt omnia piperata, sinapi, & legumina) vesci consuetus sit, non aliunde sanè, quam ex seminis acrimonia, & salugine, huius affectus scaturiginem emanasse credendum est, licet rarissimè ab illa causâ contingat. Aliam autè præter causas enumeratas seminis immoderatè, & intemptiue Error non nullorum
quandâ resolutionis partium spermaticarum fecerunt, de intempestino se-
quod quomodo rationi consentaneum est, non video. minis se-
Nam cum beneficio musculorum nō retineatur semen, f-
neq; sint huic vsui deputati aliqui nerui, resolutio pro fluuiio.

*Receptac.
seminis.*

priè vocanda non est. Sed quemadmodum vetriculi relaxatione vomitus prouocatur, sic etiam è vasis spermaticis ob imbecillitatem virtutis retentricis, aut propter expultricis irriationem, semen præter naturam proci-
dere aliquando posse non negandum est. Decidit autem semen è parastatis, & vesiculis illis appensis, sensimque in pene colligitur, vnde postea affatim profilire necesse est, nisi ob sectionem paruorum illorum musculorum penis exitu arceatur, vel ob penis curuaturam in meatu retineatur, donec cum vrina excludatur. Tale seminis effluuium in quodam nobili obseruare nobis aliquando contigit, qui illud patiebatur ob musculorum illorum penis incisionem. Nam cum antea laborasset ingentis magnitudinis in vesica calculo, qui sua magnitudine vulnus ad podicem vsque extenderat, vnde factum est, vt ex tanta musculorum laceratione, muscoli etiam orti ab osse coxigis vnà cum neruo cauo penem constituyente per transversum secti essent, vnus autem paruorum penis musculorum tandem eandem læsionem subiret, altero sano remanère, ex quo secuta est mentulæ contorsio, inde seminis retentio in pene, cuius rei cendi nulla alia ratio erat, quàm compressa digitis perinæi regione. Malum quidè est seminis profusio, mulieribus perinde atque viris commune: causa est, quòd aliquando extra vterum, aliquando intra vterum profunditur. Si extra nullius periculi metus terret, nisi supra modum fluat, idèmq; sequatur corporis cõsumptio. Verùm cum è vasis spermaticis per cornua in sinus vteri descendit, n eoque retinetur, multorum grauissimorum morborum & symptomatũ fit causa. Horrores enim, furores, manias, melancholias, conuulsiones, vteri que præfocationes parit, cò quòd in vtero corrumpatur, & labem malignam contrahat. Quòd si in copiosum flatulentumque spiritum resoluatur, inflationem, quam vocant, vteri excitat. Effluuij autem istius causæ eadem sunt, quæ in viris, scilicet exuperantia seminis, acrimonia, exulceratio, & partium spermaticarum imbecillitas, & aliæ, quæ superius sunt enumeratæ. Retineri autem potissimum solet semen in viduis, virginibus, & vestalibus. Quare de illis affectibus dum conqueretur mulier aliqua, vt in proprij morbi

*Seminis
profluvij
malum.*

*Sympto-
mata se-
minis ef-
fluvij.*

morbi notionem deueniamus, de omnibus, quæ antea dicta sunt, diligenter est inquirendum, nec prætermittenda victus ratio consueta, ætas conditio vitæ vt vidua ne an nupta sit. Quod autem è vasis spermaticis semen profusum, & in vtero retentum ista symptomata procrearit, ostendunt istorum curationes: quiescunt enim statim, & prorsus desinunt, vbi referato interiore ore vteri semen omnino effluerit. Inuasit hoc seculo ex lue *Alue Se-* venerea aliud quoddam vitium seminis profusioni, & gonorrheæ finitimum. In quo humor, qui redditur, puris similitudinē refert, quod cum a diuersis causis procreatur, diligenter inquirendæ sunt, vt de affectu rectius statuamus. Proinde videndum an illud puri simile, cum vrina effundatur, & exiliat, aut nō, an etiā cum sensu doloris. Si enim cum sensu doloris, & penis erectione fundatur, inflammationem in parastatis esse indicamus, quæ *Inflama-* ea potissimum in parte excitatur iis, qui rem veneream *tio para-* cum muliere infecta habuerint. Postquam enim vsum *stata.* venereum confecerunt, eiaculato enim in vterum semine, partes spermaticæ in eo opere calfactæ, & propter seminis profusionem inanitæ, halitum quendam tetrum & foedum ex vtero elatum in se recipiunt, quo tempore in malignum virus facessit, quod deinde cōtagione aliū quemuis contaminat, tandemque putredinem contrahit, & inflammationem excitat, sed in parastatis potius, eò quod locus ille humidior sit, & magis fistulosus. Fit autem inflammatio interdum in eadem parte, sed alia de causâ quàm in ipso venereo opere multum seminis è vesiculis post longam successionem attractum collegerunt, nec foras eiaculari potuerunt. Quare semen adhuc feruens & nonnihil acrimoniæ retinens inflammationem accendit, quæ ex continua puris effusione internoscitur pudendique perpetuo madore, & erectione, interdum etiam ex hæmorrhoidum inflatione. Solent enim hæc omnia inflammationem illarum partium comitari, propter consensum, qui peni est cum recto intestino. Interdum autem propter inflammationem vlcus, vel scissuræ ex eadem causâ, circa easdem partes proueniunt. Sed hæc ex propriis affectuum signis difficile fuerit internoscere. In inflammatione enim

maior vrinæ ardor, maior item puris tenuitas. In vlcere verò maior puris quantitas, minor ardor, sensus verò non minor. At in scissuris solus est ardor vrinæ, absque vlla puris emissione.

De ramento.

C A P. XVI.

RAmenta vel substantiæ aliquæ concretæ, & corporeæ, è corpore reiciuntur, & sunt vel de substantia membrorum, vel aliquid ex humoribus concretum, & generatum: quare quid sit, rogare oportet, & per quam regionem, & quò excretionis modo, & reuocare in memoriam membri, vnde manat, substantiam, ad quam debemus conferre, vt sciamus si talis sit. Si quid de substantia vel per tpsim reiecta ramenta, aut tunicæ, sunt ramenta tunicæ internæ trachiæ arteriæ, vel quid bronchiarum, vel partes squammis similes, quæ arteriam in pulmonibus componunt, vt nos in anatome diximus, & in tractatu de piscibus agentes de trachia arteria. Quare si calculi ad sint, instar granorum hordei, ex pituita calculus è pulmonibus, vel grandinem dicemus. Si pellicula magna, à trachia arteria: si verò squammæ siue partes sint asperæ arteriæ, indicant partem affectam. Sic ab intestinis ramenta, pingue aliquod calculi, vel pituita indurata, illa deprehenduntur ab intestinis descendere. Vt verò cognoscamus an à ventriculo, an per sedem reddantur, & in eo vlcus sit, an præcesserit venenum, videndum est. Per mentulam ramenta carnosæ, vel furfuracea reiciunt: quòd si carnosæ, à vesica non sunt, sed à renibus: si furfuracea, à vesica. Calculus ex arenis multis compactus, & rubens, præcedente dolore nephritico, reicitur è renibus. Si verò durus, & multis tunicis vestitus, è vesica redditur. E naribus reicitur pituita indurata, vel crusta, vel pellicula interna narium. Si crusta, facile è duritie cognoscitur, & ferè quid sanguinis apparet, si ante vlcis curacionem reddatur. Si verò pellicula, plus sanguinis redditur.

De viuo reiecto.

C A P. XVII.

REiciuntur animalia viua è corpore, vt vermes, pediculi. Vermes in ventriculo gignuntur, & intestinis, in vesica, dentibus, vt aliquibus placet, in vlcerebus. In vrina natantes monstrauit D. Griffus. Reiciuntur

tur vermes, Elumites dicti, vermibus terrestribus similes è ventriculo per os, & nares. Ab intestinis per sedem similes vermibus casei reiciuntur, & circa anum pruritum faciunt, tales infiniti redduntur. *Tinea vermis duo- Tinea.* rum cubitorum per sedem & os reicitur. Est autem albus multis suis partibus veluti seminibus cucurbitæ comparatus, in lateribus ferratus, capite paruo & longo, & cauda breui. Illa, quæ reiciuntur, vt semina cucurbitæ, sunt partes huius. Cum essem in castris Parpinianis, vxor alicuius militis postvsum alliorum reiecit vnum duorum cubitorum, quem siccatum seruavi: scolopendriam in corporis scissuris refert, sine oculis, aut aliquibus partibus distinctus erat. Appellatur Tinea, quod veluti Tinea marina albus est & longus, & latus, à latitudine dicitur. Omnes alij rotundi sunt: hic latus & tenuis. Inter viuia animalia corpore reiecta molam referunt, at falso informis massa sanguinis veluti adnatum, & falsum quod dicunt ambulare & volare. Quod si viuū aliquod reiciatur, vt aliquibus in locis solent facere mulieres, quæ cum bibissent aquam, in qua erat semen Echini, Echinos pepererunt. Quare rogare oportet, quam figuram referant illa animalia. Audiui mulierem aliquid lepori simile reddidisse, sed raro ea accidunt: ob id non possumus iudicare de illis nisi aspectu. Argenterius medicus doctissimus asseruit se vidisse cum vrina reiectum draconem cum alis Pediculi reiciuntur, quod ex relatione, & victus præcedente ratione intelligere oportet, vt si vsus fuerit multis ficubus, carne viperarum, vel tenuibus alimentis, si in temperatura calida & humida, & parum frequenter mutet vestes, ille pediculari morbo afficietur. Quod si scalpat manum, aut aliam partem frequenter, & adsint vesiculæ aqua plenæ, apparet ipsarum pruritus causam esse. Reiciuntur fœtus suo tempore, & secundum naturam nono mense, & in caput primum nascitur. Præter naturam autem si ante septimum mensem, in quo viuere contingit fœtum, & si in pedes nascatur, si in brachium vnum, vel duo, vel in ventrem, si in dorsum, quod minus periculosum. Dignoscitur vnus mensis esse, si non perfectè discretus: duorum mensium, si *Partum.* paruus, & omnes partes discretas habeat, & albas: trium

Mola inter Sima falso refertur.

Pediculi.

si incipiunt partes rubere, quatuor, quòd maior sit, & manifestè incipiant carnosæ apparere. Septimo perfectus est, sed nondum ad consumptionem peruenit absolutam, item clamat: & statim oculos aperit, & claudit. Octauo absolutus est, sed agrotare videtur. Nono perfectus & benè carnosus, modò mater fluxu sanguinis, aut aliò morbo longo non laborarit, aut oleribus, & fructibus per tempus imprægnationis se nutriuierit. Computare oportet vel à tempore fluxus sanguinis absoluti, vel ab hebdomada, qua debent erumpere, & per alium mensem mulierem se sicciorem inuenisse, semen retinuisse, & arctiorem vuluam ab eo tempore concepisse. Quòd si hæc non accidunt, addenda sunt alia signa conceptionis, si se aliter affectam cognouerit, in siti, in appetentia, in aliis corporis affectibus, si nulla occasionis retinendi menses præcesserit. Si vrina bene cocta sit, si in fundo hypostasis instar bombacis flocculi, item ex tumore ventris circa vterum primùm & sensim in superioribus. Quòd si mulier primùm inflata fuerit, & superuenerint menses decolorati, vel inordinati, illam potius laborare ob defectum mensium vel aliò morbo credendum est: quod accidit his mulieribus quæ nunquam pepererunt, & supra modum cupiunt concipere. Puellis verò & iis quæ non admodum cupiunt, & dicunt se sentire quandam motionem sine magna gravitate, concepisse credendum est, neque etiam his quæ aliquando conceperunt, & cupiunt concipere. Nam qui aliquid cupit, facilè decipitur, & sibi insomnia fingunt, & sibi imponunt qui amant, quod in multis experti sumus etiam principum vxoribus: neque etiam annosis mulieribus, quæ iuniorem maritum elegerunt. Solent tales fingere se concepisse, ne steriles maritis videantur, vel quæ malè à marito tractantur. Relicitur à mulieribus ob humorem luxuriantem in vtero veluti adnatum quoddam, quod si accresceret, in molam degeneraret, quod mulieres putant formicas esse. Sed cum fœtus nondum conformatus est, intus apparent vesicæ tres semine plenæ: quare non est illis credendum, neque probare, si aceto non dissoluatur. Nam si caro illa dissoluitur, sed solus sanguis concretus, vt ista discernantur, diligenter.

Sign. conceptionis.

Morbus à mens. defectu.

Amor imposit.

Mola.

ligenter est aduertendum, & sunt interrogandæ, & frequenter palpande. Nam illæ mulieres medicis imponunt sæpe, vt illæ quibus supprimuntur menses morbo: sed quia menstruum sanguinem in nutritionem absumunt, illas interrogare oportet, si partes aliæ, quàm mammæ & venter increvantur. Quod si fateantur, est copia carnis *Conceptio nis exper.* potius, quàm imprægnatio. Non erit inutile dare melicratum, cum it dormitum: si tormina patiatur, concepit, vt admonet Hipp 5. aphor.

De sudoris excretionē. CAP. XVIII.

Sudor qui è corpore manat, humorum carnis exuperantiam, sicuti vrinæ excretio, venarum & artierum plenitudinē demonstrat. Est enim sudor excrementum carnis affatim redditum, & redundante alimento, vel cibi vehiculo. Quare vrinæ & sudoris eadem planè *sudoris* est materia, quāquam inter hæc illud intersit discrimen, *Grina eadem ma-* quod à renibus secernitur vrina, & in vesicam detrudi- *teria.* tur, vt ex ea deiciatur. Sudor verò per poros cutis foras erumpit: quare diligenter est obseruandus, an aliquid boni vel mali significet, vt ex eo partium vel totius corporis affectiones deprehendamus. An etiam à toto corpore emanarit, vel à parte aliqua tantum, calidusve an frigidus, quibusve signis præcedentibus, aut euacuationis, & in qua aëris, & temporis constitutione. De sudoris etiam colore non minus est inquirendum, odore, sapore, consistentia, an tenuis, an crassus, an viscidus, acris, mitis, multus, paucus, quomodo æger illum tolerauerit, an sano, vel ægro acciderit. Rursus si ægro, an acuto, vel mitiori morbo laboranti. Deinde an vno & eodem tempore multos vel paucos ægros infestauerit. Postremò quota die morbi eruperit. Quod si ab vna tantum parte sudor emanasse visus sit, morbum in ea firmatum esse indicio est. Hippo. testimonio pronuntiantis ibi morbum *Apho. 38.* esse, vbi sudor appareret. Id quod intelligimus, si non multus effluerit, morbusque acutus, aut febris non existat. *42. lib.* 4.
Morituris enim à morbo acuto, solet in fronte sudor & in cervice prodire, nullo tamen proprio in illa parte existente affectu. Id quod propter partis sudorem facile promptissimèque emittentis naturam, tum accidit vt frigidus, vel parum calidus exeat. Si verò ab vniuerso

corpore effluxisse certum sit, tum scire oportet an rigor præcesserit & febris continua fuerit, eoque ita existente morbi solutio expectanda est, modò ille sudor morbi die septimo exierit, præcedentibus signis coctionis. At si sexto die, vel mortem, vel recidivam denuntiat. Cum autem sudor à toto corpore prodit in febre quæ non est còtinua, quam præcessit frigus, vel rigor, vel horror, de genere intermittentium esse oportet, cuius accessions remissio, & finis per sudorem significatur. At in quacunque febre, febrem sudor non soluit, longitudinem eius, aut periculosum exitum minatur. Postremò cum sudor sic apparet, non est inutile ab ægro sciscitari, an univèrsalis euacuatio antecesserit: tales enim salutares esse solent, qui tempestivam aliquam solutionem, purgationem vel sanguinis missionem, vel coctionem sequuntur. Quòd si nil horum prius apparuerit, naturam gravari ferororum humorum multitudine indicat. Sequitur, ut qui sudor in morbis eruperit, calidus frigidusve fuerit intelligatur, eò quòd qui calidus est, ex se nihil plerunq. mali adducat: qui verò frigidus, semper aliquid post se mali trahat: unde in morbo acuto mortem, in mitiore verò morbi longitudinè declarat, licet de sudore in accessionibus febrium intermittentium erumpente, non ita iudicandum sit, qui plerunque frigidus est, eò quod corpus refrigeratum erat, ex quo nihil mali ab eo expectandum est. Quòd verò ad eum sudorem attinet, qui cum animi defectione accidit (quem antiqui sudorem non madorem appellauerunt) non mirum si frigidus existat, cum corporis ipsius partes externæ, ob sanguinis & spirituum circa cor retractionem, refrigeratæ sint: sed tamen periculi nunquam expers est, è cuius fortasse genere est sudor ille diaphoreticus à barbaris dictus, sed epidemicus. & pestilens, qui aliquando in Anglià primù, postea in Germania crudeliter grassatus est anno 1529. adeo ut non solum è plebe, verum etià è nobilibus multos sustulerit, idque medicorù quorundam, ut credi potest, errore, & consilio, qui fortasse censebant non esse suppressendum ante 24. horas, quòd existimarent tali euacuatione corpus à morbo liberari: cum ea via non sit multum opportuna ad venarum & arteriarum plenitudinem

Sudor Anglicum.

tudinem vacuandam, non debuerunt vltra prouocare
 sudorem, nec etiam statim suppressere. Verum si causa
 illius fuisset illis cognita, alio repete diuertere vel reuo-
 care per vrinæ regionem debuissent. Essentiam autem
 istius morbi locus, qui primum affectus, & rabiem istam
 sedit, satis declarabat, regio scilicet illa, in qua homines
 perpetuò in hypocaustis degunt, multoque carniū esu
 se ingurgitant, & alimentis piperatis continuò viuntur.
 Quare factum est, vt continua hypocaustorum æstua-
 tione, meatuum cutis relaxatio consequeretur, quæ su-
 doris promptissima, & potentissima causa esse solet, cu-
 ius materia in humorum exuperantia consistebat, quam
 frequens alimentorum multum nutrientium, & piperato-
 rum vsus collegerat. Sunt enim reuera multum eda-
 ces Angli: multaque carne opplere se solent, vnde pro-
 uerbio locum dederunt (*Il est saoul comme en Angloys*)
 & non minus sunt in potu incontinentes, qui liberalius
 vinis generosis vtantur, vel zitho, quæ corpus maxime
 replent, vnde sudoris materia, quæ ex eo cum tanta sup-
 peteret, nec causa efficiens deesset, calor videlicet hypo-
 caustorum, quo humores à corporis centro in superfi-
 ciem & cutim alliciebantur, non mirum si Angli ex cæ-
 teris nationibus cū Germanis soli illud malū passi sint:
 quanquam hoc non sine admiratione sit, quod ante illa
 tempora auditum, & visum nunquam inter eos fuerat:
 vnde illud causam in aliquam aëris constitutionem re-
 ferre oportuit, propter quā accidit, vt ea regio, & eo so-
 lum tempore, tali morbo vexari coeperit. Quemadmo-
 dum & hisce postremis temporibus, anno videlicet, 1557.
 non solum hanc nostram regionē Monspelliensem, sed
 ferè totam Europam morbus quidam epidemicus no-
 uus inuasit à nostris dictus (*la coqueluche*) quæ tantum
 pituitosa defluxio esse videbatur, primum fauces occu-
 pans, deinde in pulmones decumbeas, ita vt quorū na-
 tura vergebat ad phthisim, phthisici eo tempore euase-
 rint, mortuique sint hoc anno 1559. Quibus tamen
 non in pulmones, sed in costas defluxit, speciem quan-
 dam Pleuritidis excitauit, quæ magis medicamentis,
 quàm sanguinis missione curari visa est. Eodem etiam
 anno pabulæ quædam in pueris eruperunt ob aëris te-

Zithi
 & sus cor-
 pus ma-
 xime re-
 plet,

Coquelu-
che.

piditatem, & in quibusdam illorum ea apparuerunt, quæ ab Hippocrat. i. epidem. recitantur. Vnde puerum in nostra vicinia videre contingit, in quo, ob humiditatis excessum, omnium iuncturarum corporis facta est eluxatio, sequutæque est omnium ossium putrefactio. Ex quo concludimus præcedere debuisse aliquam aeris constitutionem, quæ talium morborum causa extiterit. Iam reliqua persequenda in sudoris consideratione signa, quæ illum antecesserunt, quæ medico consideranda diximus, de quibus tamen non est interrogandus æger, qui cœtionis signa, aut alia nec cognoscere, nec obseruare solet. Quare de iis, solius medici est iudicium facere. Non eadem autem est ratio diei, in quo sudor apparet, si acutus sit morbus.

Multum enim interest quotus ille à principio sit, & à prima morbi inuasionem cognoscere, cum ex sudoribus ij tantum censeantur optimi, qui in acuto morbo die oriuntur decretorio, & morbum solunt: qui verò id efficere non valent, inutiles. Quare salutares absolute dicuntur, qui in 3. 5. 7. 11. 14. 17. 20. incidunt. Sub qua etiam aëris constitutione sudor prodeat, non parum refert obseruare. Nam si æstas sit veri similis, sudores copiosos oportet expectare, nec magis negligenda coloris, qui in sudore conspectus est, obseruatio. Qui enim flauum colorem refert, fluxæ bilis exuperantiam, in carne eius, qui eo colore affectus est, testatur. Atqui magis rubescit aut venarum nimium relaxatarum, vel osculorum illarum patentiorum, aut sanguinis ultra modum ferosi indicium est. Talem sudorem in quodam medicinæ studioso conspiciere contigit anno 1547. Sapor qui in sudore ab ægro sentitur, suas habet notas. Nam si multam in eo saluginem renunciet, quæ excedat naturalem, (parua enim salitudine præditus esse dicitur naturalis sudor, quemadmodum serum) sanguinem vehementer aduri, & adassari à magno calore iudicare possumus. At si amarum sentiat, copiosioris bilis admixtionem: si dulcem, serosum esse sanguinem: si verò insipidum, plus ichoris pituitæ, quàm bilis obtinere affirmabimus. Iam de sudoris odore agendum. Sanorum & bene temperatorum corporum sudorem bene olentem esse

esse quidam contendunt, ut de Alexandri corpore historia testantur, qui gratum spirabat odorem. Sunt alij, qui si non bene oleant, malè tamen olere nolunt. Eorum verò, qui succorum vitio laborant, vel leproforum, & impudicorum hominum sudorem, hircum olere non dubium est. Quapropter cum talis sudor è toto corpore erumpit, testis cacochymiae, & dispositionis cuiusdam ad putredinem, quæ in magnis venis existit. Sed cum tantum ex alis emanat, parum mali portendit, minùs verò, cum ex solis pedibus. Omni autem sudori id communiter accidit, ut cum refrigeratur, malum odorem statim acquirat, indicio sunt, qui sudantes pectus denudant, id quod ea ratione fieri puto, quòd sudor, quandiu calidus est, regitur adhuc à calore naturali, refrigeratus verò destituitur. Quare putrilaginem quamdam facile suscipit, & simul odorem prauum, quem priùs non reddebat. In sudoris consistentia diligenter perspicendum est, an tenuis potius, quàm crassus sit. Qui enim talis est, nisi propter constrictionem, & cutis densitatem tenuis exeat, tenuium in corpore humorum multitudinem declarat. Contrariam verò significationem crassus obtinet, utpote qui meatuum amplitudinem, vel humorum crassitiem testatur. Visciditas insuper sudori inest quandoque, sed ea succorum in corpore eodem modo affectorum dominium, aut materiae sudoris paucitatem demonstrat. Sudor potest esse acer, aut mordax, aut mitis. Cum mitis & blandus, nisi in sano homine sit, fel à sanguine, aut spirituum inflammatione accensæ indicium est. Quando verò acrimoniam obtinet, eamque primo occurso refert, & in progressu retinet, febrem biliosam ex putredine accensam consequitur. Sicut ille pituitosam putridam significat, qui in principio mitis est, in progressu verò acrimoniam assumit. Talis enim sudor humoris genus, qui hanc protulit, extulit, adeo ut illud verè dici possit: Quemadmodum animi mores corporis temperaturam comitantur, sic morborum mores corporis & humorum in eo contentorum qualitates, & naturam sequuntur. Quantitas sudorum modò se offert consideranda idque in sano aut ægro. In sano enim si multus effusus sit post

Consistentia.

Visciditas.

Mitis sudor.

Acer.

Qualitas.

somnum, tamen copiosiore vti alimento, aut purgatione indigere, scripsit Hippoc. Aphor. 8. lib. 2. Quare cum vnum deest, alterum adesse significat. Qui verò agrotanti, & acuto morbo laboranti in magna copia accidit, si præcedentibus coctionis & die critico morbi cōtingat, solutionem morbi integram expectare iuber. At qui initio morbi, vel ante crīsim, vel concoctionem profilierit, magnam humorum plenitudinem in corpore, & simul morbi longitudinem, cum vires sint robustæ: cum verò exolutæ, mortem prænūtiat. Alio modo paucō sudoris quantitas se habet, quæ quidem paruum esse adhuc vitium in quantitate humorum indicabit, nisi propter morbi cruditatem, aut materiæ crassitiem, vel meatuum cutis constructionem, & obstructionem perueniat. Non solum necessaria est sudoris quantitatis consideratio, sed quomodo illam ferat æger, subinde prospiciendum. Quoniam vacuatio, quæ per sudores fit, quando copiosior est, vires admodū prostertere solet. Solum ergo vtilis & secundum naturam habenda est, quæ leuare ægrum videtur, & quæ expurgata alio post crīsim, vel post aliquā coctionem succedit, quæque iam vacuata morbi materia crassiore, reliquam tenuem per corporis summa dissipat. Quæ verò vel morbi initio, vel quouis alio tempore, vel ante coctionem, vel ante crīsim exierit, irrita est, & cui nulla morbi solutio fida committi potest, sed potius mortem, aut morbi productionem adfert. Iam locus postulat, vt de sudore

De sudore sanorum. re qui tantum sanos inuadit, dicamus, cui hoc peculiare est, vt calfacto, vel æstuanti corpori succedat. Quapropter cum sanus aliquis absque causa aliqua euidenti, & procatactica in sudores per totum corpus inducitur, certissimum indicium est, vitium in quantitate humorum illum pati, aut multo vti alimento vel purgatione indigere. Quod si non totum corpus, sed aliqua tantum pars soleat illo sudore frequenter diffluere, affectum quendam esse in ea, vel fuisse credendum est, cuius rei fidem faciunt partes, illæ quæ olim vulnus, aut abscessum sunt passæ, ex quibus sudor leui de causa emanare solet, vt accidit iis qui parotidibus, aut abscessu, vel tumore circa inferiorem maxillam sanati sunt, debiliore ex

ea affectu reddita illis ea parte, adeo vt in masticado cibo maiore cū labore functionem suam semper obeat, & ob id sudorē semper mittere frequēius cōspicitur. Sunt tamen, quibus circa faciem, vel ceruicem magis quā ex *Cur sudor* alia parte peculiariter sudor exudet, quod equidem illis *circā faciē* accidere propter summā respirādi difficultatē putarem, *sapient ap-* qua ratione vētricus eodē modo affici solet, cū in chy *paret non-* lo conficiendo & concoquendo laborat. Idē de articulis *nullis.*

& omnibus aliis partibus iudiciū ferendum, quē postquā imbecilliores factæ sunt ex aliquo affectu, maiorem ex-cremētorum prouentum semper producant, vnde minus expeditē functiones suas peragunt: quæ causā est vt statim sudores diffuant. Ex quo illud perpetuū verum esse probatur, morbū ibi esse, aut adesse, aut adfuisse, vnde sudor emanat. Sudor aliquando simul multos & eodē tem-*Aphor. 38.* pore inuadit, quare illius causā constitutionis aeris *q. 42. lib.* tribuendam censerem. Quod si ex tali sudore multi etiā moriantur, inter epidemicos morbos necessariū est refe-*4. Hippoc.* rendus. Superest omnino, vt antequā sudoris sermonem absoluaui, notas & signa, quæ ex tēpore morbi sumuntur, quo ille erūpit, subiiciamus Sub tempore autē comprehendimus morbi initium, medium & finem, & dies, qui iudicatorij & critici pares vel impares dicantur. Quare cū primo alicuius morbi die sudor cum febre profluit, & illam finit, intermittens morbus esse existimandus est.

Quod si propterea febris in quietem nō desinat, præces-*Intermit-* serit tamen aliquod signū eorum, quæ febre intermittēti *tentis mor-* accidere solent vt est rigor, vel horror, non febris inter *bi indicia.* mittentis, sed cōpositæ, vel confusæ indicia cognoscenda sunt, quæ non omnino morbū periculi expertem faciūt. At cū nihil eorum, quæ febrem denotant, cum sudore se præmōstrauerit, iam de plenitudine, quam humorum exuperantia parit, tantū iudicādum, metuendūmq; ne vires illam ferre possint. De sudoris vero profluvio, qui *De proflu-* in processu morbi accidit, inquirendum etiam. Nam qui *uo sudoris* die critico post aliquam cōcoctionem vel moderatē profluit, copiosiorē illius effusionem in die critica proxima promittit, veluti si sudor quarto die pleuritide, vel alio simili morbo acuto existente in qualibet quantitate exilierit, morbi solutionem in septimo die per sudorem

expectare iubet, modò nihil interueniat, à quo naturæ motus impediatur. Similiter quæ in morbi exitu sudoris profusio fiat, potest debellari à natura morbi aliqua indicia, nihil aliud, quàm morbi expulsionem totam ostendit. Contrà cùm prostratæ iam vires videbuntur esse, nullumque naturæ euincens signum præmonstratur, paruum salutis spem relictam esse prænunciat, pari potissimum si facta sit die. Quamuis de sudoribus, qui diebus iudicatoriis & in medio morbi progressu facti sunt, non aliquid melius expectari possit, cùm sine aliquo cœtionis signo, aut alio salutari antecedente exierint. Sed de sudoris excretionem satis multa.

De retento. CAP. XIX.

Quia nomine affectus præter naturam & morbum & symptomata, & causas superius comprehendimus, de retento interrogare oportet, quòd & si morbus non sit, causa tamen morborum præter naturam esse solet. Si ergo nullum reiectum ægrum molester, num aliquid retineatur in eius corpore, interrogare oportet. Solet enim retentum præter naturam, vel reiectiones præcedere, vel sequi. Nam post immodicas euacuationes nihil solet redundare, quòd sua quantitate facultatem expultricem irriter. Porro solent fieri immodicæ & magnæ euacuationes, post longas retentiones eorum, quæ debebant euacuari. Voco autem retentum, quòd secundum naturam debebat euacuari, quòd naturæ vim infert, vel inferre natum est. Quòd non suo tempore, aut per suam regionem à natura institutam, & conuenientem, aut tanta quantitate, quanta debebat euacuari, euacuatur, potest dici *peristoma* retentum. Et quia multa talia sunt, quæ retineri possunt, de illis omnibus sigillatim interrogare oportet. Sunt autem concoctionum excrementa & vteri, quæ retinentur. Et quia excrementa alui diutius retenta multorum morborum & symptomatum sunt causæ, primùm de illis interrogabimus, num suo tempore & tanta, & talia reddantur, qualia debent. Quòd si retineri dicat, causam aut concausam morbi inueniemus. Solent enim esse causæ doloris colici, & capitis vertiginis, & scotomix. Verùm vt huius retenti causam cognoscamus, scire oportet nū præcesserit
larga

larga euacuatio à natura facta, vel à medicamento vel
 usu astringentium prima mensa sumptorum. Nam post
 largas euacuationes supprimitur aluus. Non enim so-
 lent intestina nisi irritata qualitate, vel quantitate deii-
 cere. Quòd si multa copia premantur, minus sollicitan-
 tur, ob id post usum medicamentorum laxantium, &
 clysterum solet talis suppressio fieri, quæ minus suspe-
 cta est. Retinetur cibus aut chylus in ventriculo ob tu-
 morem præter naturam in ecphyssi factum, vel ob scir-
 rhum panchreatis. Quam retentionem deprehēdimus,
 si post coactionem tensio & grauitas circa superiorem
 ventris regionem sentiatur ab ægro, & vomitio sequa-
 tur, quæ leuetur. Quòd si non vomat, perseverat dolor.
 Flatus etiam in eadem regione retinentur, qui solam
 distentionem faciunt sine grauitate, sed cum difficulta-
 te anhelitus, & suffocationis timore. Nomine retenti
 comprehendimus, quòd non euacuetur per propriam
 regionem, vt supra dictum est. Nam in iliaca passione,
 aut coli inflammatione delapsi in scrotum nihil per se-
 dem euacuatur, sed per vomitionem fit reiectio. Et sic
 talis affectio, & reiectum, & retentum dici potest, verius
 tamen reiectio, quàm retentio. Sic in dysenteria, diar-
 rhæa, & aliis fluxibus ventris accidit, in quibus vrina re-
 tineri videtur, propterea quòd tota per ventrē cum ex-
 crementis mixta reicitur, quod & in omni larga eua-
 cuatione euenire solet, siue per vomitum, siue per ven-
 trem fiat, siue per sudores. Paucum est enim quod rema-
 net & trahitur à renibus. Retinetur autem vrina verè
 tum ob affectum renum & vesicæ, tum quia in perito-
 næi cavitatem, per resudationem descendit, quod nobis
 certò futurum hydropem præsignificat. Quibus ergo
 non retinetur ob supra dictas causas, retētionis causam
 vel renibus, vel vesicæ, vel meatibus vrinæ attribuemus.
 Quare de affectibus harum partium interrogare oportet,
 vt cuius vitio id fiat, certò sciamus. Supprimitur au-
 tem vrina, aut non redditur, vel quia renes eam non tra-

*Quos mor-
 bos & sym-
 ptom. indu-
 cit alius a-
 strictio.*

*Retētionis
 cibi aut
 chyli signa*

*De Grina
 retentione*

*Causa sup-
 pressionis
 Grina.*

corpore apparebit. Nam facies prætumida est, venter totus tensus, fluit venter & tandem per vomitionē redditur. Quod & in omni reiectione magna, à quacūque alia causa contingit, verū non tam cito. Quò autē certiores simus, fistulam æneā intrò mittemus: quod si nihil vrinæ prorsus reddatur, certissimum erit indicium, vrinam vel vitio ream, vel vreterū retineri. Nā in omni retentione vrinæ ob calculum vel ob carunculam, & sanguinem cōcretum, vel pus crassum aliquid vrinæ redditur intro-

Vreterum. misso cathetere. Vitio vreterum fieri intelligemus, si dolor aliquis præcesserit vehemēs circa eam regionem. Si ob fistulæ vel mentulæ vitium fiat vrinæ retentio, tumor circa penem manifestus erit rotundus, & immissa fistula ænea, vrina reddetur. Præcessit enim vel vlcus, quod carnis excrescentiā pollicetur, vel fluxus sanguinis, qui grumum reliquit, aut calculus retētus in vesica, aut pituita crassa, aut pus obstruens, vel tumor alicuius cōprimens meatum, qui omnes affectus vrinam in vesica retineri declarant. Hæ duæ retētiones manifestissimæ sunt, & de illis maxime conquerūtur ægri, quòd necessariæ sint, & quotidie fieri debeant per ea loca excrementorum deiectiones. Non enim de aliarū concoctionū recremētis retētis querūtur, quod illis manifeste nō sunt eorū euacuationes secundū naturā. Mulieribus autē quia necessaria est & euidentis sanguinis menstrui reiectio suo tempore, si retineatur, minus est consueta. Fit tamen ferè iisdem de causis, quibus & bilis retentio. Ex retentione igitur excrementorum medicus genitos morbos debet cognoscere, & è cōtra ex morbo, de retētione suspicatur. Quare si medicus videt morbum aliquem factum ex sanguinis retentione vel copia, interrogare oportet, num talis excrementi retentio præcesserit: quòd si fateatur, iam morbi causam cognoscit. Quòd si ob naturam, vel ob consuetudinem (quod præter naturam ex se est) retinētur excrementa, vt pituita, quæ per nares, tum per palatū, & adenes fluit retentionē sequitur in cerebro pituitæ prouentus, à quo carochē, apoplexia, epileps. conuulsio, dolores capitis fieri solent. Quare si aliquis horum affectuum appareat, de illa retentione rogandum est, vt si retinetur talis, tales morbos futuros certò prædicemus.

Retinentur illa, quæ alioqui cōsueuerunt euacuari, quare is nephritico dolori, aut colico obnoxius est, nec non articulari, vel si morbi illi tam ægros occupauerint, de illa retentione, pro causæ cognitione interrogare oportet, retineaturne pus, an pituita crassa, vrinæ retentionē expectare oportet in eo, qui laborat ea, & à qua causâ fiat diligenter perquirere, quemadmodum dum retinetur ea, quæ per aluum reiciebantur, vnde colicus dolor. Si retinetur bilis, quæ per ventrem solet sua natura, vel per consuetudinem excerni, ventris astrictionem expectare oportet, & obstructionem meatuum, qui à folliculo fellis in ecphism descendunt, à qua recrementa cineritia, vel alba futura sunt. Quare si recrementa talia sint, certò obstructionem prædicemus. Si retineatur bilis, quæ vomitu vere & æstate reicitur, oris amaritudinem, in appetentiam tandem, vel morbum colicum, vel biliosam febrem æstate futuram prænunciare, vel si æstate retineatur, Autumno dysenteriam fore, vel diarrhæam prædicemus. Si retineatur sanguis menstruus, hydropem & sputum sanguinis vel fluxum à naribus in iuuenibus expectare oportet. Vbi verò statim sanguis retinetur, & tātus sanguis appetentia deiicitur, concepisse credere oportet. Retētis alui excrementis colicum dolorem, aut vertiginem, aut difficilem excretionem, aut capitis dolorem, aut faintietatem expectare oportet. Si retineatur arenulæ, quas prius solebant reicere, lapidem verèdum est generari. Quare de grauitate loci, & aliis consentientibus rogandum est. Si sputum retinetur in affectibus thoracis, difficultatem respirandi, & mortem expectare oportet, ut in phthisicis, & iis, qui pleuritide, aut peripneumonia laborant, aut alia defluxione. Sudor vel similis euaporatio retinetur, cutis affectionem (vt pruritus, scabiem, febrem, lepram) sequi necesse est, vt ei accidit, qui in primo albulis lauerat. Si retinetur vrina, vel calculum, vel vicinarum partium inflammationem, vel vesicæ, eiusdem nimiam repletionem ob vrinæ copiam causam esse existimandum. Si vrina retineatur in acutis morbis, vel ob delirium, vel quia præcessit, vel quia futurus est sudor copiosus, vel ventris fluxus copiosior. Quare de die, quæ præcessit, rogare oportet. Quare non est absur-

Obstructionis indicia.

Qua comitis tatur sanguinem menstruum retetum.

Qua retetione excrementorum.

Arenularum Sputi.

Sudoris.

1. aquis a lumin. Gal. 8. lib. method. Vrina.

dum interrogare primum, quæ secundum naturam in nobis expelluntur, & de excrementis, quæ ob aliquem affectum reici oportet, ad morbi curationem, vel ad diuturnam vitam. Quare cum ad ægrum accedentes videmus aliquem affectum ex plenitudine alicuius materiæ, an retentum sit rogare oportet, & an vacuationem consuetam reliquerit æger, vt qui febre sanguinea laborat, sanguinis missionem prætermiserit, quam facere solebat Vere, vel purgationem prætermiserit ille, futurum morbum ex illo humore plus redūdante prædicere possumus.

De qualitatibus seu affectibus. CAP. XX.

*Nomine
qualitatum
affectus
significan-
tur.*

*Prima
qualitates.*

*Secunda
qualitates.*

AD partium affectuum, affectuum ipsorum, & causarum quæ illos procreant, cognitionem habendam, qualitarum consideratio multum etiam facere videtur: quare de illis diligenter sciscitandum. Qualitates autem homonymiæ vitandæ gratia intelligimus, quas Galen. affectus nominavit, quomodo etiam superius affectus nomen omni morborum generi accommodauimus, & sub ipso symptomata, & morbos comprehendimus. Qualitatum ergo corporis multiplices sunt differentiæ, de quibus nobis ordine agendum est, initium facientes ab iis, quæ primæ nominantur, siue actiuæ, siue passiuæ sint, deinde reliquas, quæ secundæ sunt & dicuntur, & à prioribus descendunt, persequuntur, quales sunt durities, mollietates, asperitas & lenitas, grauitas, & leuitas, densitas, & raritas, quibus sapores, odores, & colores adduntur, quas quidē cum ægri præsentire possunt facile, de iis sunt interrogandi, vt earum cognitio tanquam affectus ad causam, sic in morborum & partium earum notitiam, quæ affectus sunt, non deducat. Interrogandus est autem æger, aut is, qui à nobis consilium petit, an ab aliquo tempore calorem cuiusdam insignis, aut frigoris sensum præter consuetudinem perceperit. Quod si neget, credendum: si verò annuat, tum cuius harum qualitarum, caloris vitæ an frigoris id fuerit, scire oportet, & an totum corpus, aut aliqua eius tantum pars molestiam persenserit, num etiam causa aliqua euidentis huius causa esse poterit. Quod si nulla aut aliqua, quæ permanentem affectum relinquat, præcesserit, intemperiem aliquam non simplicem, sed cum materiæ consortio esse semper pronun-

nunciabimus: cuius rei certius erit indicium, si respondente ægro calorem cum tensionis vel gravitatis cuiuspiam specie in aliqua parte existere intelligamus. *Causa pro-
catartica* Causarum enim procatarcticarum est, intemperies soluta faciles potius, quàm contumaces, & permanentes relinquere, nisi forsàn causas interiores simul commouerint, cum raro sine alicuius materiæ affluxu intemperies solitaria diu persistere, aut tantum partes externas afficere possit. Vbi enim interiores eam senserint, humores commotos esse necesse est. Quare ad eius humoris, qui in ea parte abundare videtur, aut ad eam confluisse, investigationem nos conuertere consentaneum erit, quod qua ratione fieri deceat, suo loco dicemus. Vbi ergo caput calidius esse præter naturam aut consuetudinem constiterit, *Intempe-
ries cap.* causarum ratio, an interiori an exteriori affectum sit, demonstrabit. Si enim aut ab æstu solis, aut medicamento calfaciente, vel operimento non consueto caput calidius redditum fuerit, in externa parte contingere probabile est, cum eiusmodi causæ exteriora magis, quàm interiora calfacere possint. Sed cum ob odorem vehementem per nares attractum fuisse audiemus, tum cerebrum calfactum iudicabimus. Accidit interdum ut cum illa caliditate simul & dolore caput afficiatur. Insignis enim caliditas humores in capite contentos fundit, & liquat, aut à vicinis partibus sua vi attrahente euocat. Quamobrem si non adfuerit dolor, futurum saltem non temere pronuntiare poterimus. Quando verò nulla alia in parte, quàm *Intempe-
ries Ven-
tric.* circa ventriculum, calor ille non naturalis percipietur, ut is notus fiat, affectus ventriculi intemperiem comitantes in memoriam reuocare oportet. Sine iis enim haud facile est, ventriculi caliditatem affirmare certo, aut potius ab aliarum partium vicinarum calore, ventriculi calorem discernere. Quare si nidorosum ructum, vel ouorum putridorum, aut frixorum odorem referentem expiret æger, aut veluti flammam, vel incendium circa os ventriculi se aliquando percepisse respondeat, simulque calfacientium usu lædi, refrigerantium verò iuari, & delectari, prostratamque appetentiam habere, sitim verò inexhaustam caloris sanè præter naturam ventriculum obsidentis, solamque intemperiem efficientes indicia certissima

habemus. Quòd si cum illis & oris amaror, aut nausea, aut vomitio adfuerint, iam nò simplicem intemperiem, sed cum materia eaque biliosa iunctam esse pronunciamus. Quòd si in latere dextro non còsuetus calor præsentiatur, qui etiam toti corpori citra febrem vel manuum pedumque volæ communicetur, iecinoris intemperiem calidam cognitam habebimus, quæ in vola manuum pedumque relucere maximè consuevit: propterea quòd pars illa omnium externarum temperatissima est, frequentioresque venas in se desinentes habens.

*Intēperies
mesent.*

Interdum mesenterium intemperies calida occupat, sed illa tactu à partium vicinarum calore non facile discernitur: eius tamen certiores erimus, cum excrementa

*Intēp. re-
num.*

alui valde sicca reddi, vaporibusq; multis frequenter caput tentari conspiciemus. At de calore, à quo sæpius posteriores corporis partes circa lumbos incalescunt, agri conqueruntur, quem ad renes pertinere, agitatio corporis immodica, vel exercitatio, equitatio aut lōgus in supinum decubitus, si præcesserint, ostendunt. Incalescunt enim facilius, quàm aliæ partes, tum ob venarum & articularum viciniam, & consensum, tum ob copiam pinguedinis, qua naturaliter sunt conuestiti, quòd efficit ut in febre colliquata & accensa à calore febrili ea pinguedine calor maior circa renes percipiatur. Quare ut eius certiores simus, consulendæ sunt nobis vrinæ, quæ si rubræ, vel flauæ, aut in superiore parte pingues appareant, simulq; inter meiendū caloris mordacis, & acris sensum præbeant, nullam de renum calore dubitandi occasionem

*Qualis
vrina.*

relinquent. Calor porro circa iuncturas præter consuetudinē nonnunquā percipitur, sed qui à laboriosa exercitatione potuit excitari, si tamen ea non sint prægressa, Arthritidem, id est, iuncturarum dolorem, vel earundem inflammationem expectare oportet. Cùm autem non in vna tantum parte, sed vniuersum corpus calorem nò naturalem concepit, quem nec exercitio, nec alia motione calfaciendi corporis vim habente, contraxit, febrem adesse

*Intemp.
iunctura-
rum.*

Quæ febrem se pronūciabimus, cuius speciem ut cognoscamus, & ad intermittēte continuarum, vel intermittētium genus vtrum referretē argēnt. debeamus, scire ab ægro licebit, an non febris cū aliquo eorum, quæ febrem intermittētē demonstrare consue-

uerunt,

nerunt, præhenderit. videlicet cum aliquo frigoris, rigoris aut horroris sensu inuaserit, aut cum pãdicatione, vomitu, dolore capitis, vel ventriculi. Deinde an ab illa inuasione calor magis inualuerit, nec post 24. horas intermissionem fecerit. Quòd si fecisse constet, cum aliqua excretionem, & quibusdam notarum superiorum prægressis, tum de febre intermittente non est dubitandum, ex cuius speciebus tertiana erit, quæ cum rigore inuaserit: quartana, quæ cum horrore: quotidiana, cum *Tertiana* frigore. Tertiana autem vel exquisita, vel extensa esse *exquisita* potest. Exquisitam cognoscimus, cum omnia superius *indicia*, enumerata symptomata miriùs affligunt, accessioque nõ ultra 12. horas producitur, & Æstatis initio maximè. Iuueni, temperatura bilioso, accidit. Sed cum obtusus est rigor ad frigus quodammodo accedens, nec febris vlla remissio ante 26. aut 30. horas percipitur, extensa aut potius spuria, quàm tertiana exquisita iudicanda est. Cum *Extensa tertiana indicia.* autem febris cum solo frigore, & cum manifestis caco- *Quotidianum signum.* chymix pituitosæ signis, nullum à febre tempus solutum relinquens apparuerit, febrem quotidianam affirmare audacter licebit, vt quartanam eam, quæ in abundantia melancholiæ cum horrido insultu exorta est. Sed cum febrium intermittentium aliæ simplices sint, aliæ *Feb. intermittens distinctio.* compositæ, aliæ verò permixtæ, aliæ confusæ, in earum rursus inuestigationem incumbere oportet. Intelligimus autem compositas, quæ ex implexu similium generum sunt, & quæ præter vnus generis, & eiusdem duas vel plures exacerbationes habent adiunctas: cuiusmodi sunt duplices, vel triplices quotidianæ, tertianæ, & quartanæ, quarum cognitionem ex superioribus notis deprehendere facillimum est, nisi quod tertiana duplex, & quartana triplex, cum quotidie repetentes habeant accessiones, à quotidianis circuitus motusque ordine, non perinde distinguuntur: quamuis & excrementorum dominantium, caco-chymixq; peccantis signis, quæ etiam à pulsibus, vrinis, deiectionibus, & aliis petuntur, caloris proprietate, & inuasionis natura, statim discernuntur. In quotidiana enim calor tangenti miris primùm & ha- *Quotidiana. Tertiana duplex* lituosus occurrit: postea verò acer & mordax, & omnia

*Triplex
quartana*

tertiana calor primò occurſu ſua acrimonia manum fe-
rit, & mordet, exacerbationeſque facit, quàm quotidiana
breuiores. Triplex autè quartana cognoscitur, quod
ſimplicem vel duplicem quartanam ſequitur, ſempèq;
cum horrore inuadit, & accéſſiones omnium lōgiſſimas
habet. Compoſitæ verò quartanæ inter ſe diſtinguuntur,
quod duplex quartana duobus diebus excandeſcat, &
tertio quieſcat, quarto & quinto rurfus repetat, eodem
modo in poſterum procedat. At quæ triplex eſt quarta-
na, inſultum quotidie facit. Non ſolùm autem intermit-
tens cum altera intermittente, ſed cum continua impli-

*Intermit-
tentiu diſ-
ferentia.
De imple-
xu diuer-
ſorum ge-
nerum.*

cari ſolet. Nam cùm ſint tres ſimplices intermittentium
differentiæ, harum vnaquæque cum altera, vel eiufdem
vel diuerſi generis complicari poteſt. De ſimilium gene-
rum implexu diximus: de diuerſorum reſtat agendum.
Is autem incidit, cùm aut intermittens diue ſi generis
alteri miſcetur intermittenti: aut cùm intermittēs cum
aliqua continua miſcetur. Intermittentium diuerſorum
generum complicatio eſt, cùm tertiana, quartana, quo-

*Quibus
diſcernun-
tur.*

tidiana inter ſe complicantur, aut duæ ſolùm, vel tres ſi-
mul. Hæ autem tum ex numero, tum ex natura accéſſio-
num deprehenduntur. Si enim tertianæ quotidiana iun-
gatur, vno die duplex accéſſio vtriuſque febris erit, ſe-
quenti verò alterius tantùm, videlicet quotidianæ: ter-
tia die rurfus vtraque excandeſcet, & deinceps eodem
ordine progredietur. At cùm quotidianæ quartana per-
miſcetur, quartus dies binas ſemper habet accéſſiones,
reliqui verò ſolam eam, quæ quotidiana eſt. Cùm tertia-
na & quartana concurrūt, prima die accéſſio incidit, ſe-
cunda quieta eſt, tertia tertianam tantùm excandeſcen-
tem habet, quarta quartanam tātum, quinta rurfus ter-
tianam ſolam, at ſexta quieta eſt, ſeptima ambæ repe-
tunt, & ſi in reliquis diebus ſit. Hæc autem maniſeſtiùs
traduntur & ſub oculos ponuntur, in tabella complicā-
tium febriū, quam libro noſtro de febribus inſeruimus.
Cæterùm intermittens tertiana extenſa cum continua
quotidiana coniungitur, ſitque ea febris, quam ſemiter-
tianam appellamus, de qua fuſiùs egimus, cum de eius
generatione ſermonem inſtituimus. Hæc de febrium
intermittentium cognitione dicta ſufficiant. Super eſt vt

*Semiter-
tiana.*

non intermittentium febrium cognoscendi modum, *Modus*
 rationemque ostendamus. Talem autem ægrum affli- *cognosce-*
 gere tum intelligemus, cum is de totius corporis calore *intermit-*
 iuterrogatus, se nullam notarum superiorum, quæ in- *tes*
 termittentes febres declarant, percepisse responderit. *alias fe-*
 Quare continuam, vel ephemeram, vel hecticam esse o- *bres.*
 portebit. Ephemeram declarat calor non vehementer *Quæ de-*
 accensus, sed suavis, nec à naturali multum discrepans, *clatant e-*
 & qui ferè intra 24. horas cum leui sudore, aut madore, *phemera.*
 & febris cessatione definit, quam aliqua causarum eui- *Quæ he-*
 dentium vis excitat. Hecticam verò languidus non a- *cticam.*
 cris, qui nec post 24. horas definit, aut in sudore erupit,
 ut ephmera. Quod si nulla illarum sit, continuam esse ne-
 cesse est eamque vel symptomaticam, vel primariam, quã-
 vis rectè concludi non possit (ut quidam ferunt) Omne
 febrem symptomaticam continuam esse. Sūt enim sym-
 ptomaticæ quædam febres de genere intermittentium,
 ut quæ obstructions viscerum sequuntur: quales sunt
 tertianæ, & quartanæ, in quibus aut iecur, aut lien, teste
 Galeno laborant. Quare non omnes symptomaticæ fe- *Sympto-*
 bres continuæ sunt pronuntiandæ, si obstructio morbus *maticæ*
 sit, & illam sequantur febres quædam intermittentes.
 Nos ergo censemus eas symptomaticas continuas esse,
 quæ inflammationes partium internarum sequuntur,
 naturamque ipsarum inflammationum referunt, ut si
 earum inflammationum materia & causa sit sanguis, sy-
 nochorum naturam imitari videntur, si bilis tertianarum,
 & hæc typodes appellantur, quæ tertio quoque die exa-
 cerbationes sine rigore habent, in quo à tertianis cōti-
 nuis primariis dictum non differunt, sed ut discernatur,
 videndum esse an gravitatem aliquam, vel tensionem,
 vel tumorem æger in internis partibus præsentiat: si ita
 sit, symptomaticam febrem deprehendimus, quæ ab in-
 flammatione partis tumorem patientis concitatur. Si ve-
 rò hæc absint, febris tantum primaria est pronūcianda:
 id aut de partibus septo transverso inferioribus intelli-
 gendum. Qui enim in partibus superioribus fiunt tu-
 mores, ut in capite & thorace, cum ossibus integantur,
 sensui non patent, quare alia via sunt investigandi. Id ve-
 rò tum ex doloris specie, tum ex accidentibus morbos

- Pleurid. signa.* illarum partium consequentibus, & ex reiectorum conditione conicere licebit. Pleuritim enim doloris species, quæ rei cuiuspiam pungenti similis est, & difficultas spirandi, sputaq; colorata ostendunt. Peripneumoniam maxillarum rubor, spirandi difficultas, sputum quidem coloratum, sed spumofum, atque etiam dolor thoracis, qui non tam grauis est, nec in pleuritide pungens. Si verò peripneumonia incipiendo fiat, dolor grauis est: quod si illa sequatur pleuritidem, est cum dolore punctorio. Quod ad capitis inflammationes attinet, oculorum rubor, mentis alienatio, aliæque symptomata affectus capitis internos comitantia explicant. Sed ubi nihil horum, febre tamen continua existente, apparuerit, tunc etiam verè primariam febrem esse credemus. Continuarum autem cum multiplices sint differentię, singularum cognoscendi modum habere oportet. Proinde si febris, corpore plenitudine laborante, accensa sit, & eundem modum ab initio ad finem vsque seruauerit, ita vt vel in increfcendo, vel in decrefcendo eundem tenorem tenuerit, aut in eodem statu perseuerauerit ad finem vsque, Synochum esse dicemus, qui cum à sanguine solū absque putrefactione inflammato, vel ab eo putrescente accendatur, vter causam febris attulit, inuestigare & cognoscere erit necessarium. Id autem fiet si quæ plenitudine laborauerit æger, an ea, quæ ad vasa, an ea quæ ad vires intelligamus. Febris enim, quæ à sanguine putrescente accensa est, plenitudinem sanguinis, quæ ad vires est, comitari consuevit. Quare calor in illa mordacior & acrior tangenti occurrit, vigilię, sitisque magis infestant. Ea verò, in qua sanguis est inflammatus tantum, à plenitudine, quæ ad vasa est, exoritur: proinde curis vt in altera non squalida, sed mollis, nō acris, sed blando calore, madoreque perfusa est: nec vigilię tantopere infestant, sed somnus magis premit, aut in somnum propensio maior est, vtranque aut plenitudinis ad causam sic internoscere licebit. Dum venę copia distentur turgébunt, & inflammatarum partium more rubescunt, simulque grauitatis in toto corpore sensus percipitur, fuerit antevita otiosa, opipara, multis negotiis aut curis distracta, immoderato ciborum euchymorum usu

usu gaudens, plenitudinis ad vasa certissimum est indi- *Plenitudo*
cium. At cum sine magna venarum tensione, gravitate *ad*
tamen quadam premi corpus, cui accessit suppressa quæ- *Sitis indi-*
dam vacuatio siue hæmorrhoidum, siue mensium, siue *cium.*
narium, intellexerimus, plenitudinis eius quæ ad vires
dicitur, notionem nos habere existimemus. Verum non
sola sanguinis plenitudo utraque, sed etiam quæ in eo
cacochymia peccat, continuas febres excitat, quæ tamē
non synochorum, sed synechis nomine comprehendū-
tur, denominationemque ab intermittentibus mutuan-
tes, quarum typos & accessionem ordinum imitantur,
præterquam quod sine horrore, & rigore excandescūt,
nulloque sudore, aut aliqua excretionē inclinant. Qua-
re quæ tertio quoque die exacerbatur, tertiana continua
est: quæ quarto, quartana: quæ singulis diebus, quoti-
diana continua siue syneces nominanda est. Quanquam *Syneces.*
ex iis quædam ardentes, siue caustones, aliæ continuæ
simpliciter dicendæ. Ardentes biliosæ sunt, ob quæ po-
tissimum Erysipelas internæ alicuius partis principis,
aut materiam circa ventriculi venas putrescentem ha-
bent, aut cor. Aliarum verò materia in venis à corde re-
motioribus, & magis diffitis constituta est. Proinde mi-
tiora sunt symptomata omnia in his, in illis verò sævio- *Ardentes.*
ra, & vehementiora. Sitis enim insatiabilior, ariditas, ni-
gredo & asperitas linguæ maior, quam in aliis conspi-
ciuntur, quas propterea facillimum est his notis distin-
guere. De calida intemperie hæcenus dictum est.

De intemperie frigida.

Sequitur frigiditas, cuius inuestigandi rationem tra-
dere, quemadmodum alterius, propositum est, in quæ-
tes an in toto corpore, vel in aliqua tantum parte frigi-
ditas quædam parte consuetudinem percipiatur. Quod
si in toto corpore, quæ nulla evidens externæ cau-
sa induxerit, sed repente corripuerit, statimque euacua-
uerit, & subinde calor præter naturam ægrum adortus
sit, accessionem cuiusdam febris esse dicemus. Si verò *Defluxio*
non calor, sed tussis, aut dolor in aliqua parte exortus *humoris*
fuerit, defluxionem decubitumque frigidi humoris si- *frigidi*
gnificabimus in eam partem. At cum frigiditas vniuer- *signum.*

*Syncope
aut mor-
tis signū.*

sum corpus occupauit, cui sudor quispiam frigidus accidit, syncopem vel animi defectionem expectare debemus: morbum verò si post longos dolores, & immodicas euacuationes accidat. Proinde si immodicè fluente aluo, aut ingenti doloris cruciatu afflictato corpore extrema refrigerentur, in propinquo mors est. At cum frigiditas vnā tantum partem obsidet, intemperiem in illa parte frigidam contractam docet. Quod si in capite existat, & cum dolore ipsius partis præsertim exterioris diu perseuerauerit, luis venereæ notam habemus: sed si non perseuerauerit, de catarrho metuendum est. Frigiditas ventriculū interdum & iecur afficit, sed illorum situs in imo corporis existens sensibus illam deprehendi prohibet. Proinde de frigiditate conquerentibus ægris non est place credendum, nisi simul affectus qui frigidam illius partis intemperiem consequi solent, testentur. Vt si plures appetant, quàm se concoquere persentiant, flatibusque & crudorum succorum abundantiam molestari, frigida ventriculi intemperie laborare non est dubium. De hepatis verò frigiditate pauci conqueruntur, propterea quòd insignem sensui molestiam non pariat. Sensim enim introducit & hebetiore sensu pars quodammodo affecta est. Quare illam affectus magis, quàm sensus declarabit, atque etiam causæ, quæ etiam huius efficiendi potestatem habent, cum præcesserunt. Effectus autem huius intemperiei sunt crudioris sanguinis generatio, & chyli in eum imperfecta mutatio, ad hæc totius corporis deprauatus color, ad albedinem reddens. Causæ verò sunt immoderata euacuatio, siue ea per menses, aut hæmorrhoidas, aut aliquam hæmorrhagiam fiat, vel consuetæ cuiuspiam excretionis retentio, aut cohibitio, atque etiam intempestiuus aquæ haustus, quibus iecur ad immodicam refrigerationem perducī consuevit. Frigoris etiam molestius afficitur nonnunquam vterus, de quibus tamen concoqueretur frequentius mulieres, quàm illas verè patiantur. Quòd enim omnes, quæ steriles sunt, concipere nequeant, frigiditati vteri semper attribuunt, cum tamen aliter Hippocr. visum sit, qui non solum quæ frigidos & densos locos habent, vtero

*Frigida
Ventric.
intēperies
Hepat.*

Causa.

non concipere, verum etiam quæ præhumidos & densos habent, grauitas fieri non posse, quod extinguatur in ipsis genitura: nec quæ ficciores & æstuosos habent, in quibus semen alimenti defectu corrumpitur, scriptum reliquit. Quarum omnium causarum diligenter habenda est ratio, vt quæ à frigiditate proueniunt, ab aliis distinguantur. Frigiditatem tamen vteri demonstrant mensium retentio, aut pituitosæ cuiusdam humiditatis ab eo reiectio & ad venerem segnities. Sed etiam de patientibus, vt de agentibus qualitatibus sermonem habere oportet. Patientes autem sunt siccitas & humiditas: de siccitate prius dicemus, cuius si aliquam suspicionem præbuerit interrogatus æger, de hectica febre suspicari faciet. Obseruandus cutis & totius corporis habitus erit, qui si ariditate marcescat, de hectica confirmata suspicio erit, aut de alia atrophia inuenta. Hæ enim sunt, quæ corpus ad summam siccitatem perducunt. Sed cum nullum insigne in parte aliqua princeps, vel nutritioni subseruiente vitium esse deprehenderetur, potius ad hecticam quàm ad atrophiam siccitas illa referenda erit. Laborat nonnunquam vniuersum corpus cruditate, quæ tamen in superficie magis, & citra corporis ipsius atrophiam, aut consumptionem apparet. Quare non dubitandum ab effusione bilis aut flauæ, aut atræ eam proficisci: ob id signa hunc vel illum humorem demonstrantia siccitatis istius auctorem indicabunt. Sed & singulas quasdam partes siccitas magis afficere, aliis minus affectis potest: cuius rei fidem facit linguæ siccitas, scabrities, & ariditas in febrilibus ardentibus, & putridis, cum tamen istud malum reliquum corpus nõ tam citò attingat. Sic etiam in corpore ariditas persentitur, eaque interna, & in cerebro, aut externa est: illam vigilæ immodicæ demonstrant, quarum siccitas causa est, vt somni humiditas: hanc vero causæ externæ, vt solis æstus, quæ illam induxerunt. Siccitas porro aliarum partium ex affectis eodem modo cognoscitur. Vox enim clangosa & aspera, arteriæ asperæ siccitatem, sitis immodica, excrementorum alui durities & retentio, intestinorum ariditatem docent. Quare hæc eum considerare oportet, qui illarum partium

*Frigiditas
vteri
signa.*

*Hectica
suspicio.*

*Interna
ariditas
aut externa.*

intemperiem siccam deprehendere voluerit. Nunc ad humiditatem veniendum, qua laborare partes ostéduntur, quæ solito molliores sunt, & humidioribus excrementis magis abundant. Hinc cerebri humiditatem ex copiosæ humiditatis & aquosæ substantiæ per nares, aut palatum reiectione deprehendimus, & ex propen-

Pulmonis sione in somnum, vt in senibus videre est. Pulmones autem humidiores, aut trachiæ arteriæ humiditatem, vox obtusa & rauca declarat. Sic etiam ventriculū humi-

Ventriculi. diorem plus iusto continua frequensque salinæ expulsiō. & ciborum in eo fluctuatio cum pauca siti, nullōque bibendi desiderio. Sic humidiora intestina frequens alui fluor, humidiorēque feces testantur, partium denique externarum humiditatem mollities & laxitas semper significant. De aliis qualitatibus, quia magis nobis

De aliis significant, interrogare oportet, vt de odoribus & coloribus, vt si color in corpore non cōsuetus apparuerit in *qualitati.* *primum* *de colore.* toto, vel in parte. Quare de coloris proprietate interrogare oportet, num niger, vel flauus, vel rubeus, vel albus. Flauus, Icterus flauum significat: niger, Icterus nigrum: color viridis, mixtum affectum nigrum & flauum simul permixtum. Color candidior totius corporis si repente fiat, animi defectionem, vel syncopem significat: si verò perseuerauerit, refrigerationem ob longum morbum, vel ob hepatis intemperiem frigidam. Color rubeus liuidus plethoram: color ex nigro rubeus, rubescē Elephantiasim: color pallidus, iecoris obstructionem, & cachexiam, qualis solet apparere in puellis & virginibus, quæ pica laborant. Hæc enim ob illum affectum solent vel carbones, vel alia similia comedere, & veluti febrem continuam pati, quam aliqui lentam vocant. Deprehenditur ex arteriarum collūpulsatione & ex cordis palpitationibus. Solet enim fieri, cū appetit tempus purgationis, vel non purgantur, vel à nimia vestium cōpressionē. Quare de omnib. istis interrogare oportet nū præcesserint, vel post potionem frigidæ aut saltationē. Nam hæc frequens saltatio cibo obstructionem facit, & hunc colorē pallidum inducit. Si color in aliqua parte apparuerit, humoris alicuius præsentia significat. Color albus in recrementis pituita: cineritius, in fecibus alui,

Color pal-
lidus in
puellis.
Signa.

bilis absentiam, & inde meatus vesiculæ fellæ obstructionem, quæ ad ecphisim fertur, significat. De sapore *De sapore.* verò interrogare oportet, ut ex saporibus materiam morbi, & ex illa morbum agnoscas. Sapor enim amarus bilem effusam, vel genitam in ventriculo, purgatione egeret significat: sapor salus, vel serum, vel pituitam salis: acidus, pituitam acidam: dulcis, sanguinem: insipidus, pituitam indicat. Est enim pituita dulcissima, quæ à sanguinis dulcore parum differt, ad cuius distinctionem reiecti colorem considerare oportet. Quare si rubeus & dulcis, sanguis est: si albus, pituita. Sapor indicibilis multorum humorum permixtionem designat. Quod si cum foetore sit, putredinem significat. Ex recrementis sudor tantum degustatur, quod excrementum abominandum non sit, & ferè omnis sudor salus est, sed alius magis, alius minus, secundum minorem vel maiorem adustionem vel putredinem. Odor quia multa significat, de eo *De odore.* interrogare oportet, num sentiatur aliquis præter consuetudinem. Odores multi in corpore sentiuntur, qui humorum vel partium corruptelam significant. Quare quum ægrotum interrogamus num foetorem aliquem sentiat in corpore toto, vel in parte, vel in reiectis e corpore, si cum sudore, vel sine sudore: si respondeat post sudorem totius corporis, vel sudorem refrigeratum significat, vel corruptelam humorum. Si post sudorem & refrigerato corpore, à sudoris corruptione factum existimabimus. Habent enim recrementa suum colorem naturalem, quo amisso putrescunt, & à putredine fit odor foetidus. Si foetor sentiatur, sudore adhuc & corpore calido, humorum corruptelam significat. Tales enim sunt humores intrà, qualis est sudor extrà. Si foetor in aliqua parte externa sentiatur, vel à pedibus, vel ab aliis prodit, vel à parte externa, vel interna ulcerata: quare de illis partibus interrogare oportet, num humidiores habeant. Quod si fateantur, ab illis partibus effumari odor ille ingratus. Si à parte externa, vulneratam esse oportet. Quare num à materiæ retentione fiat, interrogandum. Quod si nulla sit, à carnis corruptela eveniat necesse est. Quare vel escara, quæ putrescit, vel cancer, vel putridum vlcus, vel phagedæna, vel sphacelos erit.

*Ozenafig.**Polypi fig.*

Illa itaque ex notis propriis cognoscemus. Si verò nullum vlcus putridum, nulla alarum vel pedū humiditas putrescens sit, ab internis partibus emanare verisimile est. Quare de regione, per quam redditur, interrogabimus, num per nares, vel per os. Si per nares, & pus reddatur, ozenā: si sine pure, & cū magna per nares spirādi difficultate, polypum vel sarcoma esse dicemus. Quare primū inspiciere oportet: illa enim sensibus videntur. Quod si nihil horum adsit, humiditas aliqua in spōgio so esse putrescit. Si ab ore odor reddatur, tussiat, & expuant, à pulmonis vlcere prodit, vel ab humiditate intus putrescente citra exulcerationem, vt à morbo Ital. saepe accidit, & priusquam inungantur. Quod si vñti fuerint, odor est vnguēti. Si ab ore sine tussi prodeat odor, acidus est, vel foetidus, vel alimentum, vel medicamentum referat, à stomacho redditur. Si foetidus est, vel ex alimentis, vel à sanguine putrescente, vel ab affectu splenis prodit. Si vinum vel aliquod medicamentū referat, foetidis alimentis vsū prius oportet, vt fabis, cæpis, alliis, ouis, multa carne, vel parum cocta, vel semiputrefacta. Quod si nullum tale alimentum præsenserit, alimētorum corruptionem in stomacho, vel humorum significat. Acidus odor à vetriculo redditus cruditatem significat, aut splenis affectū, si Paulo credimus. In pueris odor acidus, vermium præsētiā ostendit. Quare de aliis signis vermium interrogare oportet, vt nū dormiat, & inter dormiendū num exulret, clamitet, vel strideat dentibus; dolorem sentiat circa aliquam vētris partem, & num reiecerit prius vermes per os, vel per sedem, & num vsus fuerit lacte & vino, caseo, multa carne, & postea dulcibus. Quod si hæc adsint, certissimū est puerum vermes in ventre habere, & acidum saporē vermes præsignificasse. Quod si nulla talia circa ventrem appareant, aut præcesserint, & excrementa alui, & vrinæ perfectam coctionem præmonstrāt, è gingiuis foetidum odorem, vel à dente corroso, vel fluxu sanguinem ex iis prodire necesse est. Caput aliquibus olet, sed potissimū his quibus caput frequenter sudore maderet & comam alunt. Qui sufficiēter vñti sunt vnguento ad morbū Ital. accommodato, foetidum expirāt, quod certissimū signum est

est

est vnguentū ad internas partes penetrasse, vnde nidor, & odor. Vrina foetet ob humorum corruptionem, vel ob puris permixtionē, vel ob alimenta, vel medicamenta in *Vrina cur* iecta, quę talē odorem solent expirare, vt qui terebinthi *oleat.* nam per os assument, vel etiā clystere infusam, vrina eorum violam olet. Qui caules comederūt, vel raphanos, vel asparagos, his foetet vrina. Alui excrementa foetent si cocta sint, si cruda, non, si diutius retenta, si humor putris purgetur, vel pus. Salina & mucus in sanis nihil olent: in aëris quandoque ob pus admixtum male olent. *Salina mucus.*

De dissoluta vnitatē. C A P. XXI.

Solutio continui vel contigui sæpe ægros malè habet, eosque diuexat: quare de ea ægrotum vel altantes interrogare oportet, num in suo corpore solutionē præter naturam, habeat, vel de dissolutionis vnitatis causis interrogare, vt si in bello fuit, aut cum aliquo gladio, vel lapide, aut fuste disceptarit, vel si ex alto ceciderit, si neger, credendum, quia affectus satis euident est, & de istis omnibus certò respondere potest æger. Si vero fateatur aliquam ex supradictis causis præcessisse, querenda est pars, quę solutionem patitur, num dura sit vel mollis.

Quod si dicat, in molli parte vlcus, vel vulnus esse neces- *Vulnus, &c.* se est. Quod si recens & sanguinolentum est, vulnus si *factum.* niosum, vlcus erit. Quod si figuram membri, & firmitatē post casum vel forte ictum se amisisse dicat, de ossis fractura dubitandum. Quare in qua parte sit, & de propriis accidentibus, vel consequentibus illam partem est interrogandus, & de causis procatactis. Nam raro ab interna causa solutio fit continui, quanquam nihil prohibet ab humoribus acris in quibuldā locis solutiones & arrosiones fieri, vt in pulmonibus, in vesicis, utero, intestinis, & in venis. Ruptura à plenitudine, vel tensione, vel arrosione propter catarrhū fit. Et vt in qua parte solutio fit, cognoscamus, interrogare oportet, a qua parte vel per quam partem fuit sanguis, vel pus, si præcesserit aliqua causarum enumeratarum, solutionem vnitatis esse necesse est. Nos magis in partis affectæ cognitione laboramus, quàm solutione vnitatis. Facile enim solutionem ex sanguine & pure cognoscere est, sed in qua parte, vel in quibus partib. sit facta, disquirere opus est.

Ut si dicat in capite vulnus inflictum, scire oportet, num in cute tantum, vel in cute & cranio, vel in menyngebis, vel in substantia cerebri. Sic si in thorace, an membrana succingens costas perforata sit tantum, vel pulmones, vel pericardium, & cor, querendum. Si item in ventre, num ad peritoneum, vel ad aliquam internam partem penetrauerit. Vulnere autem quapiam coniectura artificiali primum cognoscimus, deinde sensu. Quare de robore vulneratis, vel altitudine loci, ex quo cecidit, inuestigandum. Quod si à fori inflictum vulnus, non solum cutem, sed cranium esse effractum conuicimus. Sic si ex alto, & in lapidem ceciderit, os effractum esse verisimile est. Quare oculis inspicendum vulnus apertum. Quod si cutis diuisa non sit, sed contusa tantum, statim diuidenda, vt oculis liceat inspicere. Si verò detectum fuerit cranium, neque depressum, neque effractum appareat, num scissura sit, periculum est. Quare atramento vel vngueto aliquo colorato os denudatum inficiemus, & statim detergemus. Quod si scissura sit in aliqua parte, vnguenti vel atramenti color in parte remanebit, qui scissuram detegit. Aliqui sic inuestigant. Cogunt ægri dentibus nucem frangere, vel filum. Quod si frangendo sentiant ossa parum firma esse, capitis ossa fracta esse necesse est. Verum hoc experimentum in magnis diuisionibus facit fidem, non autem in scissuris. Remanent enim firma ossa, quāquam sint scissa, si breues sint, & non profundæ. Quod si fluxerit sanguis per nares, vel aures, vel per os post casum, vel ictum, læsam aliquam partem internam necesse est esse: quanquam fractura vel ossis depressio extra non appareat. Vulnus in menynge ostendit sanguinis fluxus à menynge factus. Quod si substantia alba, globosa, spissa reddita fuerit prima vel secunda die, vtramque menyngem effractam esse necesse est. Quod si in progressu curationis fracturæ cranij fungus (*myketon* Græci appellant, qui nihil aliud est, quàm carnis fungosæ accretio supra menyngem) adnascatur, læsam menyngem necessario significat. Oculi rubei etiam inflati internam læsionem significant. Quod si bilis primo vel secundo, vel tertio die, vel deinceps vomitio appareat, læsionem internarum partium significat, non cerebri.

Lesio à menynge.

Partium internarum læsio.

febri, sed menyngum. Quod si statim obmutuerint, aut paulò post sopore correpti fuerint, aut delirarint, aut conuulsionem senserint, vel resolutionem, & lædatur respiratio interna, internas capitis partes læsas significant, & inflammationem earum, si febris continua adfuerit, & tandem mortem portendunt. Hoc verum est, modò vulnus non sit in musculis crotaphitis, in quorum vñneribus hæc omnia ob vicinitatem & consensum per neruos tertiæ coniugationis fieri solent. *Thoracis*
Vulnus. Vulnus in thorace videtur: verum an membrana succingens costas læsa sit, inuestigandum. Quare candelam ori vulneris oportet adiuuere. Quod si inspirando aerem reddat, candelamque extinguat, perforatam membranam esse necesse est, quod sit etiam vulneris pulmonibus expirando magis quàm inspirando. Quod si sputum cruentum statim apparuerit, spumofum, & splendidum, *Pulmonis*
læsio. certò pulmones læsos affirmabimus, sed multò magis si vox pereat, aut cum sono spiritus reddatur, & si inclinans in vulnus æger loquitur, & in aliam partem obmutescat, hæc omnia adiungere oportet ad distinctionem. Nam circa pulmonum læsionem aer affatim redditus, per vulnus candelam extinguit. Est enim aer, qui per os vulneris ingressus est, qui redditur dum per inspirationem pulmones aëre replentur & thoracis spatium replent. Dixi sputum spumofum, & motu redditum, quia qui pectus confossum habent, citra pulmonum læsionem expuunt, verum per aliquot dies magis crassum, & minus splendidum. Quod si serum vnà cum sanguine per vulnus redditum sit, pericardium vulneratum significat, vt in Christo apparuit, cui cum lancea latus perforatum esset, fluxit sanguis & aqua, quod certissimè significauit Christum verum hominem, & in cruce mortuum fuisse. Sunt enim vulnera lethalia, quæ ad pericardium vel ad cor penetrant. In nulla alia parte thoracis aqua, siue serum separatum à sanguine reperitur. In homine secundum naturam se habente, si palpitet cor, si arteriæ langueant, & cesset arteriarum pulsatio, si color pallidus sit, & colori mortuorum similis, sudores frigidi, malique odoris appareant, extrema frigeant, cordis læsionem significant, & mor-

tem iam instantem, non minus lethalia sunt septi transuerſi vulnera. Quare ſi vulnus in ea parte inſiſtum ſit, *Septi trās. in qua deſinunt mendosæ coſtæ, inſpicere oportet, & diligenter interrogare, num læſa ſit multum respiratio: Vulnera.* Eſt enim præcipuum inſtrumentum reſpirationis. An deliret: Solent enim maxima deliria potiſſimum inflammato ſepto tranſuerſo fieri. Si rideant: ſolent enim *Riſus ſardon. qui.* ridere riſu Sardonio, qui nil aliud eſt, quàm contractio lati muſculi, qui labra conſtituit. Habet enim maximum conſenſum cum neruis, qui ad ſeptum tranſuerſum deſcendunt. Si præcordia ſurſum trahantur, ſi ſpina doleat ad renes uſque, reſpiratio rara ſit, & ſanguis ſpumans redditur, vel percuſſo pulmone, ſed paulò craſſior, & rubicundior, vel minus ſplendidus. Si infra mendoſas coſtas læſus fuerit æger, non minus interrogare oportet de regione, & de iis quæ reiiciuntur, ut partem læſam internoscamus, ut ſi in parte dextra & prope nothas, coſtas multuſque ſanguis profluat craſſius, iecur læſum eſſe coniciemus. Quare de decubitu interroga-
Iecor. læſio bimus ſcilicet num in ventrem magis grauis ſit decubitus, num ad ſpinam præcordia retrahantur, num dolor ad iugulum uſque prætendatur. Hæc enim certiffimè iecoris læſionem oſtendunt. Quod ſi per vulnus bilis reiiciatur in caua parte vulnus eſt, & ad fellis partem penetrauit. Nonnunquam bilioſus vomitus accedit, præcordia cum ventriculo indureſcunt, vel tenduntur. Si verò percuſſus in ſiniſtro fuerit, quaſi ad latus ſub coſtis mendofiſ ſanguis, qui eſſluit, multus, tenuis, ater, & dolor ad iugulum, ut in iecinore, peruenerit, ſitis ingens oritur, præcordia cum ventriculo tenduntur, lienem induratum certò affirmabimus. Si in anteriore parte infra vel ſupra pubis oſſa, vrina per vulnus reddita ſit, & pro vrina ſanguis per mentulam reddatur, ſi doleant circa inguina, ſingultiant, aut horrorem vel rigorem ſentiant, læſam veſicam pronuntiabimus, & mortem futuram. Quod ſi paulò ſupra vmbilicum vulnus inſiſtum ſit, epiploon appareat, vel aliquod inteſtinorum, fractum eſſe peritonæum neceſſe eſt. Quare num partes cõtentæ peritonæo læſæ ſint, inueſtigare oportet, & quæ ex partibus illa ſit diſtinguere, quod ex reiectis eſt faciendum.

Inter-

Interrogare oportet num aliquid crassi reiectum sit & solidi. Quod si sit, colon læsum esse necesse est, gracilia intestina læsa erunt. Quare hæc vulnera magis lethalia. Si verò cibus & potus exeant per vulnus, præcordia tendantur, ventriculus necessario læsus est. Si circa os ventriculi necessario læsus fuerit æger, alimenta sumpta statim reddit pulsus debilis, & sudores tenues apparent, & animi defectiones fiunt, extremæ partes frigescent illæso corde. Si verò mulier læsa fuerit paulò supra os pubis, vterum percussam verisimile est.

Quare interrogare oportet, num per vulnus multus sanguis effluat, & per os vuluæ. Tunc enim vulnus intrò penetrasse certum est: verum si tantum per vulnus, non penetrasse. Item si dolores sentiat in inguinibus, coxis, & femoribus ob ligamenta, quæ in inguina descendunt à superiore vteri parte, necnon ob consensum venarum, & arteriarum. A venis enim & arteriis cruralibus ad collum vteri multa vasa pertingunt, & quæ exteriores sunt, per membranam cuti adhærent, & per eam membranam doloris sensus concitatur suprâ dictis partibus. Deinde si obmutescat, vel mente labatur, si nervorum oculorumque dolore infestetur, biliosa reiiciat, hæc omnia vteri læsionem significant. Quod si matura sit, arteriæ languescunt, non pulsant, frigent extrema, si sudor frigidus ea occupat, non aliter quàm si cor percussum esset. Si æger in parte superiore, vel circa *cæcæ*, ad renes vulnus penetrare potest. Quare interrogare oportet, num dolor ad inguina & testes descendat, num difficulter *Renum læsio.* urinam reddat, vel nullam, aut cruentam, aut sanguinem tantum, renes percussos esse dicemus. Si verò in collo vulnus inflictum sit, num antè vel retrò, scire oportet, vel in lateribus. Nam si retrò & altè vulnus descendat, nervorum principia, vel spinam læsam esse necesse est, quod ex resolutione alicuius partis inferioris certissime cognoscemus. Si in altero latere iugulares venas læsæ *Vena iugularis.* contingit, quod ex largo sanguinis profluvio deprehendere possumus. Quod si vulnus descēdat altius, multusque sanguis effluat cum saltu, arteriam corotidem, siue soporariam læsam esse necesse est. Quod si obmutescat, & non per vulnus aërem reddat, nervum reuersivum

aut laryngis musculos læsos significat. Quòd si per vulnus aërem reddat, trachiam arteriam læsam esse dicemus & dissectam. Si cibum & potum statim reddat assumptum, œsophagum dissectum esse constat. Si verò *Læsio Vena* antè dissectio facta sit, vox periit, aërem reddit per vulnus, & exsufflando candelam extinguat, trachiam arteriam læsam esse non est dubiū. In partibus externis vulnera facta facile sensibus deprehendimus, sed an vena, an arteria læsa sit, vt deprehendamus, de quantitatis sanguinis reiectione, & modo reiectionis, & de qualitate coloris interrogare oportet. Nam si multus sanguis effluat, vel venam aliquam magnam, vel sectionem maximam in parte carnosâ esse oportet. Nam ex multis venis capillaribus dissectis, etiam multus sanguis effluit, sed longiori tempore: à magna vena multus sanguis affatim redditur. Vulnus vel in emunctorio est, vel per partem internam altè descendit, penetrauitque ad interiores venas, & difficilius retinetur. In istis sanguis consistendo crassior & magis purpureus, & rubore exsaturatus, quippe ex nigro rubescit. Qui ab arteriis defluit sanguis, cum saltu magis splendidus, magisque tenuis est. Vulnera, quæ sunt ad iuncturas, cum neruorum & tendonum dissectione esse solent. Quare si statim æger totam manum aut bonam partem manus stupidam, grauem, frigidam senserit, neruum læsum esse verisimile est. Quòd si sine magna inflatione sit, neque flectere, neque extēdere possit, tendo illius partis dissectus est. Si conuulsio sequatur, & punctum læsus sit gladio acuto, nerui vel tendonis puncturam factam esse necessum est. Quare conuulsio vel adest, vel futura est. Si dolor vehementissimus sit, etiam si præsertim læsus non sit, & conuulsio sequatur, semisectum tendonem esse oportet.

De Ulceribus.

CAP. XXII.

Vlcus vnitatis solutio est, à qua pro sanguine vel pus, vel sanies, vel meliceris redditur. Propterea quòd multæ sunt vlcerum differentia: vt vlcerum speciem cognoscamus, oportet interrogare de eo quod reicitur & de eius grauitate, colore, odore, consistentia post quos morbos factum sit vlcus, quibus præcedentibus, & apparentibus: ex his veras vlcerum differentias inuenire

inuenire licet. Quare istis differentiis contenti, an sit rectum vel obliquum, vel circulare, magnum vel paruum, longum vel breue negligemus. Parum enim facit ad curationem, verum multum facit si ex contusione, vel ex incisione, vel à medicamentis calidioribus, vel arroden- tibus factum fuerit vlcus. Quare in hunc modum inter- rogabimus eum qui de vlcere conqueritur, primum num post tumorem aliquem factum sit vlcus, num ab inflam- matione incoeperit, ab Erysipelate, aut Scirrho. Rursum non erit interrogandum, sed ex tumoris declinatione, scilicet num ex tumore magno rubescente, pulsante, multum dolente, affatim facto vel suppurato, rupto vel aperto factum sit.

Quod si ita respondeat, ex inflammatione suppurata natum vlcus esse iudicabimus, & sordidum. Quod si ne- get magnum esse tumorem, vel rubrum, vel parum fla- uentem, & multum pungentem, ab erysipelate vlcus na- tum est. Quare vlcus virulentum, vel corrosum esse dice- mus, quod est erysipelas exulceratum, vel Herpes ex- dens. Si post tumorem laxum, magnum, albidum vlcus factum fuerit, putridum esse oportet. Si post tumorem du- rum, & sine dolore, vlcus erit cancrum. Quod si idem tumor durus & minor fuerit & doluerit, vel senserit do- lores pungentes, cancrum verum exulceratum esse dice- mus. Quare de eius proprietatibus interrogabimus, vt si partem depascatur, horribile sit aspectu, & foetidum, venæ inflatæ in circuitu appareant, verissimum cancrum certo affirmabimus. Si post paruas pustulas milio simi- les, vlcus serpens erit, siue *nomi*, vel corrosum. Si post ve- sicas similes vesicis, quæ post vstionem fiunt, cum escha- ravlco *cacoëthes*, siue malignum sit, si corpus melanco- licum sit. Si verò corpus humidius fuerit, sordidum vlcus erit, vel putridum. Si post verrucæ violentam extirpationem, cancri naturam referens vlcus est. Si post carbon- culum sit, putridum: si post pruritum, & excoriationem vnguibus factam, virulentum: si post tumorem diutur- num, hoc est abscessum in superficie appareat vlcus su- perficiale sordidum erit. Si abscessus intus fuerit, & ma- gnæ puris quantitatem reiecerit, & foramen paruum & strictum, vlcus sinuosum, aut sinum dicemus. Si tale

cum duritie, & callo, fistulosum. Sunt qui has vlcerum differentias à tumore nomen accipere velint.

Vlcus phlegmonodes, quod post inflammationem factū est, & erysipelatodes, quod ab erysipelade, siue igne sacro: œdematodes quod post œdema & tumorem laxū: scirrhomodes quod post scirrhū: Carcinodes à cancro, sed hi minū propriē facere videntur. Nam omnia hæc vlcera ab abscessu nata sunt immediatē. Nam phlegmone vlcus nō facit, nisi in abscessum versa sit, neque erysipelas, neq; scirrhus, neque cancer. Quare melius erit appellare, vel à materia, vel ab accidente, vel à morbo iuncto aliquo, vt vlcera purulenta, vel saniosa, vel phagedenica, vel depascētia, vel telephia, vel chironia vel sordida, vel putrida, vel vermiculosa, vel à difficultate consolidationis *dysponotica*, quę fortē eadem sunt cum chironiis, & telephiis vel cum iis quę à recētioribus vlcera cum proprietate occulta, & ostracea à labiorum duritie, vel ab accidentibus, vt vlcus dolorosum cum pruritū, cum fetore. Vel cum morbo iuncto, vt vlcus cum carne superflua, cum ossis corruptionē, cum varicibus, cum inflammatione. Et quia ex reiectis vlcera & denominantur, & deprehenduntur, de reiectorum differentiis, & natura breuiter dicemus, vt sciant studiosi de his interrogare.

De differentiis & natura eorum, quæ ab vlceribus reiciuntur. CAP. XXIII.

lib. 5. cap. 28. **R** Edditur ab vlceribus aliquando sanies, aliquando pus, aliquando meliceris, vt vocat Celsus, aliquando sanguis, sed hoc diuerso tempore, & à diuersis vlceribus. Sanguis enim à recenti vulnere, vel ab vlcere corrosiuo, quod ad venas vsque peruenit, & penetrauit vt in phagedeno vlcere accidit. Effluit sanguis etiam ab vlcere curato & carne repleto, nondum cicatrice obducto, si specillo tangatur, vel post arrodens medicamentum, aut post escharæ casum repletur & sanescit, vel post calli arrosionem cum fistula. Sanies verò inter vtrunque tempus in quo sanescit: pus verò vlcere iam ad sanitatē spectante, vel ab vlcere post abscessum facto. Rursus saniei multæ sunt differentiæ, ex Celso, & Guidone, Celsus sic: *lib. 5. Saniei diff.* Sanies quædā tenuis est, quæ i chor Græcis dicitur, à Latinis virus. Altera meliceris. Differunt enim ab inuicem.

Nam

Nam ichor sanies tenuis subalbida à malo vlcere erit, maximèque vbi in neruo læso inflammatio sequuta est. Meliceris verò crassior, glutinosior subalbida tantum, mellique albo sub similis, à quo nomen accepit, est quoque à malis vlceribus, vbi nervi circa articulos læsi sunt, & maximè ex genibus, à quibus *oleodes* tenue, subalbidum quasi vntuosum colore atque pinguedine albo oleo non dissimile redditur. Celsus hoc in magnis vlc- *Auctor à*
 ribus senescentibus apparere dixit. Ego verò in vlceri *Celso dis-*
 bus genu obseruavi maiorem esse illius oleosę substan- *sentit.*
 tię copiam, quę in omnibus articulis à natura posita est ad faciliorem motionem. Quare nec mirum est, si in vulneribus genu, pus oleodes reddi soleat in tãta copia, *Guidoni*
 Guido duplicem saniem facit, & non omnem saniem vi- *quotuplex.*
 rus appellat, sed eam tantum, quę acrimoniam habet, & arrodit. Saniem simpliciter appellat tenuem & aquosam sine morfu, quę sanies vlcera faciet sordida magis quàm arrosiua. Quare de istis per circuloctionem erit interrogandum, vt & affectiones, & tempora affectionũ ex illis distinguamus, vt tenuisne quædam aquosa substantia flauescens, pungens, vel vlcera parsēs vicinas, per quas transit, per vlcus reddatur. Quod si annuat talē saniem reddi, virus est quod redditur & vlcus virulęrum dicitur. Si verò tenuis, serosa, & aquosa reddatur, nullũque pruritus, vel nulla acrimonia sentiatur, vlcus erit sordidũ: quod si foeteat, putridum. Si verò pus crassum, malę olens, putre, si dolorem cadauerosum referat, vlcus cum syderatione, siue sphacelo est. Vel si meliceris crassior, & glutinosior mellique albo non absimilis, vlcus cacoethes in parte nervosa, & circa articulũ esse significat. Si verò tenuis & subalbida oleo albo non dissimilis, partē nervosam vlcera tam inflammata significat. Est etiam interrogandũ de accidentibus, & de morbis cũ vlceribus coniunctis. Non enim cognoscuntur vlcera neque curantur si Medicus non cognouerit, num simplex vel compositus sit. Compositum cum alio morbo, vel symptomate, vel cum causa antecedente est, vt illud vlcus compositũ dicitur, quod cum dolore vehementissimo est, cuius doloris mitigatio curam ad se trahit. Facile enim æger dolore percipit. Quare sine circuitione aliqua interrogan-

dus est, num dolorē sentiat etiā nullis appositis medica-
 mentis, vel etiam mitigatoriis. Solēt enim omnia vlcera
 dolere post medicamentorum detergentium applicatio-
 nem, ob quem dolorem vlcus compositum nequaquam
 dicitur. Loquuntur hīc de dolore qui vrget, & causæ ra-
 tionem habet. Etiam sine circūlocutione de siccitate &
 humiditate cum vlcere iunctis erit interrogandum. No-
 uerunt enim redundantem humiditatē, vel vlceris siccī-
 tatem, vel nigredinē. Non ita faciliē deprehendunt vlcus
 cum varicibus, vel cū carnis excreſcētia, vel cum corru-
 ptione ossis, vel cū proprietate occulta. Quare vt respon-
 dere valeat æger, nō est interrogandus, vt in Scholis iu-
 uenes studioſi interrogari solēt: quare more eorum erit
 loquēdum. Nam si quis interrogauerit ægrum, num vl-
 cus habeat cum varicibus, cū quid sint varices non in-
 telligat, rectē respondere non potest. Verū si dicamus
 num appareant in tibia venæ tumidæ, & in quibusdam
 locis ad formam oliuæ crassioris & nigre, vlcus curari
 non possit, vel si curetur, reuiuiscat, vlcus cum varicibus
 esse ſciemus. Vt inflammationem iunctā cognoscamus,
 ſciſcitabimur nū in circuitu inflatio rubra cum calore &
 pulsatione appareat. Si verō cum œdemate tumor laxus
 & indolens in circuitu: Si cum eryſipelate, num paruus
 tumor flauescēs, & feruidus, pungēs & pruriens apparue-
 rit. De *hypofarceſi* interrogabimus num caro superemi-
 neat vlcerē repleto. De durtie autē, si in circuitu tumor
 durus vt lapis, vel vt os appareat: Num tensa aut renitēs,
 vt in inflammatione apparet. Ostreaceum vlcus cognosci-
 mus, si labra alba & dura veluti ex multis laminis cōpo-
 sita sint, qualis est ostreaceorū testa. Quare num tale ap-
 pareat, ab ægro ſcire oportet. De osse corrupto interro-
 gare ægrū vanū est: nō enim possunt ossis corruptionem
 deprehendere, nisi detectū fuerit. Quare primū inter-
 rogabimus, num aliquod os nudatum appareat. Quōd si
 detectū sit à multis diebus, num nigrum, aut perforatū,
 aut inæquale molle, vel asperū apparuerit, tale omnino
 os corruptū existimatur. Quōd si os carne tectum sit, vl-
 cus verō annuū, nec ad cicatricē produci possit, os abſce-
 dere & corrupti significatur. Quōd si immisſum specillū
 per carnem penetrauerit, veluti per ceram, & butyrum,
 tactum

tactum os sonum edat, vel asperum, vel molle, vel in-
 quale sériatur, os corruptum significat. Vel si vlcus post *Exostosis.*
 exostosis, id est, ossis extuberantiam, & morbus Itali-
 cus præcesserit, ossis abscessum significat, & corruptionem.
 Vt ergo citò & facillè vlceri compositi differentias
 cognoscamus, primùm simplicia & famosa maximè vl-
 cera cognoscere oportet, quæ ex tumoribus, vel vulne-
 ribus, vel ex corporis malitia, vel defluxione fiunt. Qua-
 re de corporis statu interrogare oportet, vt si cum ple-
 nitudine, vel cacochymia sit. Nullum enim vlcus, quod
 sine vulnere factum est. sine defluxione, aut sine partis
 affectione fieri contingit. Dolet enim pars vel pruritus
 sentit. ob quem frequenter partem æger scalpit, vnde
 vlcus fit, vel vesicæ quædam apparent, quæ fractæ, vlcus
 faciunt, vt in herpetibus, & carbunculis fieri videmus.
 Quare si post talem sensum vlcus factū respōdeat æger,
 interrogare oportet num virus appareat, vel num mul-
 tum dilatatum sit, nec multum cauum. Quòd si ita re-
 spondeat, virulentū vlcus esse pronuntiabimus. Quòd si
 latius serpat, & vlcus multum dilatetur, maiusque fiat,
 acuties augetur, corrosiuum vocatū à Chirurgis pronū-
 ciabimus. Si verò talia apparuerint, & vndiquaque dila-
 tetur per carnem, & cutē, sine partu subiectarum cor-
 rosione, serpens & ambulans vocabitur. Quòd si & par-
 tes subiectas, & solidas depascere dicat, depascens, siue
 phagedenicum vlcus dicemus. Aliqui tamen depascen-
 tem vel herpetem exedentem esse affirmant, si ad ossa
 vsque peruenerit. Quòd si non virus, sed meliceris cras-
 sam, saniosam & viscidam, sordidum esse oportet. Quòd
 si tale fuisse dixerit, nūc verò carnem putridam, & quasi
 emortuā esse cū sciri: ho ex quo fumus putridus effluit,
 putre vel putridū *Sphedora* vocant, quod tādē in spha-
 chelon vertitur aucta putredine, quale etiam post car-
 bunculum fit. Si verò vlcus cum paruo foramine mul-
 tūmque puris reddat, magnam cavitatem subesse affir-
 mabimus. Quare sinuosum esse vel syriginodes: cunicu-
 losum verò vel sinuosum si post abscessum, & sine duri-
 tie sit pus magis crassum. Syrinigodes verò si cum duri-
 tie interna sit, cū maiore sensu in parte interna, & quod
 redditur potius ichor, vel meliceris, quàm pus. Si vlcus

post tumorem durum, rotundum, & inæqualem, & dolentem fiat, colore liuido sit, vel nigro, odore foetido, & mucco similis humor, cancrosum vlcus esse dicemus. Quod si neque tactū, neque medicamentum sentit, pruriginē tamen moueatur, & circa vlcus dolor & inflammatio interdum fiat & febris, fluat sanguis, sint veluti multa grana carnis pendētia. Theryoma Celsi est ex cancrosum generatione, quod forte prius *thymion* appellauit, quod floribus thymi similis sit ob grana carnis. Et quia serpit, dicit fieri vlcus, quod Græci *herpeta estriomenon* appellāt.

De continui solutione in ossibus. CAP. XXIIII.

SI quis cecidit ex alto, vel fuisse lapidéve fortiter ictus fuerit, de dissolutione continui in osse coniiciendum. Quare interrogandum in qua parte ictū acceperit: quod si in brachio vel femore, eadem erunt signa. Nam ossa similia sunt in numero & figura, crassitie tamen differunt. Quare facilius os brachij frangitur, quam femoris. Si tactu inæqualitas sentiatur, inter mouendum & flectendum doleat, sonum edat, & pūcturam sentiat, vel decurtetur, fractum esse oportet per transversum ad figuram cucurbitæ, vel raphani modo: vel vt nux lapide fracta, aut triticum mola cōtūsum effractūque, id est, in multas partes diuisum. In his duabus fracturis membrum flectitur, nisi duo ossa sint, & alterū fractum, alterū verò integrū remaneat. Frāgitur arūdinis modo cū calcatur, id est, in longum finditur, & assulatim frāgitur. Difficile agnoscitur, nisi scissura magna sit in qua cavititas appareat. Dolor sentitur ob peritonei tēSIONem vel rupturā.

DE ADNATO.

SI æger vsque adeo sit inepius, vt nolit morbum detegere, sed vult medicū diuinādo assequi, post aliorum morborum genera ad duo veniendum, scilicet ad adnatum, & cutis vitia. Primū de adnato interrogabimus, num in aliqua parte sit adnatū, vel ex natiuitate vel post natiuitatem ex alimentī redundantia, vel recrementis. Quæ adnascūtur à natiuitate, sunt veluti verrucæ, in aliqua parte sextus digitus, aut aliquid aliud. Ex copia excrementorum in genere tumorum præter naturam sunt, polypi, ganglium, lupiæ, Bronchocele, verrucæ, condylomata & id genus. Tertium genus est carnis excrescen-

tia, vt in fistula vrinaria, in canthis oculorum: in magno cantho caro excrescit, adeò vt palpebræ vix deduci possint. In aure fracta vel vlcèrata, in nare, sarconia, in menynge dura vulnerata, michera In vulnere externo hypofarcosis. De omnibus istis interrogati, num aliqua caro redundans appareat, respondere possunt quia videre possunt. At in fistula vrinaria catheter, vel candela immittenda. Quod si renitatur & non possit intrare, & recuruetur, carnem in meatu genitam esse oportet, & quocertiores simus num præcesserit vlcus, vel sentiatur dolor in emittendo vrinam, sciscitandum est, si vrina retineatur, & veluti per strictissimum foramen reddatur. In naribus præpedit inspirationem, quæ si sit cum vlcere grauitè olente, tunc ozena: si sine graueolentia, sarconia erit, quod à polypo differt, quod non sit rotundum ad formam polypi, sed caro excrescens.

De vitis cutis.

Cutis vitia duo sunt, primum genus est cum asperitate, siccitate, & paruis tumoribus, qui non altius descendunt, quàm ad cutim. Inter cutis vitia enumerantur, vt lichen impetiginis species, psidrarfia. Alterum genus, quod sine asperitate & tumore est, sed coloris tantùm mutatio in cute est. Quare vt in illorum vitiorum cognitionem veniamus, interrogabimus si ne in cute externa aliquid, quod pulchritudinem dehonestet, si quæ præter naturam in ægro appareat. Hoc autem sciscitandum, tum vt illa cognoscamus, tum vt ex illis extrinsecus apparentibus in internorum morborum cognitionem veniamus. Sunt enim quæ in cutè apparent, internorum *blastimata*. Quare si talia vitia ab internis causis proueniant, excrementa è corpore reiecta monstrabunt. Quare si nulla reddantur excrementa illaudentia, vitio cutis vel carnis tantùm fieri necesse est. Si igitur nullus tumor, aut cutis eminentia, vel asperitas, maculas dicemus, & potissimùm quæ in aliquibus tantùm apparent partibus. Nam colores vniuersam cutim inficientes, humorum effusionem demonstrant. Non enim fieri potest in tota cute continua coloris mutatio, sine humoris effusione: hinc nomen commune non est inditum, verùm bilis effusione arquatum, siue auriginem ab auri colore,

vulgus medicorum icteritiam simpliciter, quia frequenter fit, nominant: Si autem bilis atra, icteritiam nigram: si color totus candidus ab humore, leucophlegmatiam vocant, hydropis speciem significâtes. Defœdatur cutis & perit viuidus color in puellis cum palleſcunt, quod videtur icteritiæ species. Hepatici omnes colorẽ habet vitiatum. Maculæ cutis si magnæ ſint, aliquam humorum particularium effuſionem ostendunt. At quæ cutis macula non continua, ſed veluti ſparſa in cute, vel in aliqua parte tantum non magna, illius partis vitio fieri dicimus, vt glaucoma, albugo in oculis. Sunt autem aliqua vitia ſiue maculæ, quæ in vna parte ſunt, & propria ſunt huic parti, vt oculi maculæ glaucoma. Aliæ plures partes occupant, vt lentæ ſolent faciem, & manus, & pectoris eam partem, quæ nudatur, quod indicat tum à cauſa externa, tum interna fieri. Apparêt in facie, manibus & pectore æſtate, potiſſimum iis, qui ſub ſole degunt *Nephelides* ſiue næui aliæ in tota cute. Sunt autem vitiliginis ſpecies tres, ecchymoma, ſugillata, vibices, ſtigmata. Hæc viſu vel percunctatione cognoscuntur. Quare ſi nõ licet videre, interrogabimus quem colorem præ ſeferat vitium. Si cum albo colore ſit, alphos, ſi nigro, *melena*. Hodie videtur etiam quæ rubro colore apparent, de quibus antiqui nullam fecere mentionem, niſi ad aliud genus quis referat. Aliqui vocant malum mortuum. Si candidior ſit non ſolum cuticula, ſed & cutis vera, pili quoque albi & tenues renaſcuntur, lanugini ſimiles punctoque cutis non ſanguinẽ, ſed ſaniem albã reddit, *leuce* dicitur. Deſcribi videtur pro lepra in Leuitico. Lens ſiue *phacos*, à quibus Dioſc. nomen accepit, létigo dicitur. Maculæ ſunt colore fuſco, lentis magnitudine, à cuius colore & magnitudine nomẽ accepit affectus. Sparſæ ſunt in facie, manibus, & pectore eorum, qui illud nudant Frequentiùs accidunt ruſſis, forte quod à bilis fuligine ſiant, quæ cuticulam ſolis modo vrit, denigratque. Tempore frigidiore, quia intus repellitur fuligo, & humor non apparet, æſtate verò magis. Colore nigro etiam maculæ apparent, quæ aliquando cicatrices ſunt denigratæ: non multum differunt ab ecchymofi, quæ ecchymomata quaſi circumfluxiones, dicuntur,

visi quòd echymosis magis rubet, quia nò tam citò con-
 crescit ob tenuitatem, ex consequenti non statim deni-
 gratur. Si verò sint vestigia verberum, Latini vibices, cum
 nigrescunt, sugillata. Quidam volunt esse minimas ma-
 culas lividas. Stigmata sunt veluti puncta similia vesti-
 giis factis à morfu pulicum vel cimum. Apparent in pe-
 stilentibus febribus, & qui carbunculo pestilente moriū-
 tur, & lividæ sunt, malum significant. Accidisse tempore
 pestis Galenus testatur libro de atra bile. Sed qui nigra
 non deiecerunt, non euaserunt, sed quibus accidit deie-
 ctio nigra. Fiunt in febre syncho veræ maculæ rubræ,
 quia à sanguine fit febris. Apparēt post dies decretorios.
 In pueris accidunt exanthemata, & quæ echymata dicū-
 tur, verum exanthemata sunt maculæ sine tumore rubræ,
 parvæ & veluti puncta. Echymata pustulæ sunt in sum-
 ma cutē extuberantes albæ, in circuitu rubræ & sunt epī-
 demici morbi, qui nunquam sine febre, sed incipit febris
 syncho similis. Pustulæ 3. vel 5. die apparent, sine tamen
 febris solutione, de quibus copiosè in libro nostro de ex-
 anthematibus Soluitur integrè cum suppurantur pustu-
 læ, & ob suppurationem febris perseverat, absoluitur flu-
 xu ventris. In pueris gulosis frequentissimè, si constitū-
 tio præcedens aeris fuerit humida valde, membra aliqua
 putrescunt: quod vidi in filio mei vicini, in quo factæ fue-
 runt omnium articulorum pedis & manus eluxationes
 ob ligamentorum putredinem, ossa iuncturarum putre-
 facta apparuerunt extra. Omnia, quæ in illa febre appa-
 rent, ortum habet à sanguinis multitudine. Sentitur gra-
 vitas membrorum, somnus in principio ob multitudi-
 nem fumorum humidorum, oculi tument, illa, h. yman-
 tur, & nares stillant. facies tota intumescit, & rubra est.
 Inflammanantur partēs internæ, rauca fit vox, crebra & dif-
 ficilis respiratio, tussis, pulsus frequens & celer pueris &
 iuuenibus. Fit vere frequentius quàm alio tempore: æ-
 state & autumno, quando ver est simile æstati. Fa-
 cilè autem erit hos affectus ex ægro agnosce-
 re si bene interrogetur, id est, si quæ
 vnicuique propria sunt,
 proponantur.

* *



GVLIELMI RONDE-
LETH DOCTORIS MEDICI,
ET MEDICINÆ IN SCHOLA
MONSPELIENSI PROFESSORIS
regij & Cancellarij.

I *De curandis febris, liber primus.*



VERUMADMODVM nemo potest in aliquem locum venire, nisi viam sequatur certam & breuem, aut aliquibus signis interpositis ad eum locum dirigatur: sic profectò medicus morbum curare non potest sine methodo, hoc est, sine via cum ratione, vel cum quodam ordine. Curare morbos methodo interpretatur Galen. ea, quæ ad curationem morbi pertinent, non temerè adhibere, sed ordine, vt quæ prima sunt, primo loco fiât, quæ secunda, secundo: quæ tertia, tertio, & sic deinceps. Quæ facienda sunt, nemo potest inuenire, nisi ea, quæ sunt secundum, aut præter naturam, aut quæ non naturaliter dicuntur indicauerit. Est enim indicatio faciendorum insinuatio. Indicationes autem ordinem quendam seruant, vt aliquæ dicantur primæ, aliæ secundæ, aliæ tertiæ, & sic deinceps ad aliquid quodammodo dicantur. Prior enim non dicitur, nisi secunda subsequatur, neque secunda, nisi præcesserit prior. Est igitur necessarium, & quæ secundum naturam, & quæ præter naturam, cognoscere, & quæ non naturalia dicuntur, à quibus indicationes sumuntur. Nam si indicationes necessariae sunt, vt supra demonstrauius, & ea ex quibus colliguntur indicationes, cognoscere expedit. Quæ secundum naturam sunt, ea prius cognoscenda sunt, vt Hippocrates testatur. Nam quæ præter naturam sunt, ab iis, quæ secundum naturam sunt, cognoscuntur. Vt rectus index est sui & obliqui,

sic v

sicut vnoquoque genere perfectum est imperfectorum index & probatio. Accedit, quod multò facilius cognoscuntur, quæ sunt nobis familiaria & cognata, aut quæ in minori numero, quàm quæ multiplicia sunt. Nam vna est sanitas, sed infinitæ morborum species. Res non naturales secundo loco discendæ sunt. Quod si quis velit res primùm præter naturam cognoscere, non multum peccabit. Nam contraria iuxta se posita magis elucescunt. In cognitione morborum hanc viam sequi oportet. Primùm appellationes morborum cognoscendæ sunt & maxime Græcorum, quia nominis ratio aliquam morborum imperfectam cognitionem & opinionem nobis suppeditat, qualia sunt inflammationum nomina, vt ophthalmia, pleuritis, peripneumonia, phrenitis, & cephalalgia, ictericia, dysenteria, lienteria, diarrhæa, gonorrhæa, & quædam vel partem affectam, vel materiam, vel accidens aliquod morbi indicant. Deinde magis vniuersalia morborum genera, vt quid intemperies, mala compositio, vnitatis solutio. Sunt enim hæc tria genera generalissima, à quorum cognitione ad cognitionem generum subalternorum descendere oportet, tandem ad speciem specialissimam veniendum, cuius si exactam cognitionem habeamus, facile exercitatione particularium, vniuscuiusque morbi naturam nobis comparare poterimus, quæ vltima & absolutissima esse dicitur, à qua non solum primæ indicationes, sed aliæ posteriores colliguntur.

Nos hanc rationem sequentes, febrium cognitionem inuestigamus. Febris à Latinis dicta est, forsan à feruendo, quod in febre omnia ferueant, vt Græci ab igne πυρ, *pyreton* vocauerunt. Hipp. frequenter ignem appellauit. Nec temerè febris dicitur ignis, quod in igne summa caliditas & acrimonia inueniantur. Sic febris inter eos motus, qui sub intemperie sui sunt, caloris vehementiâ obtinuit, vt Galenus in sua descriptione, pro vltima differentia, igneum posuit, cum dixit febrem nihil aliud esse, quàm calorem naturalem in igneum conuersum. In qua descriptione calorem posuit pro intemperie. Nam calor febris genus non est proximum, sed intemperies, & potius est eius intemperiei causa vel pars.

Febrem ex descriptione potius, quàm ex definitione primùm cognoscere oportet, quia ea est nobis cognitū facilior. Conficitur autem descriptio ex genere & accidentibus inseparabilibus, aut ex propriis. Ista autem accidentia, & propria, nobis notiora sunt, quàm veræ differentie. Ob id ferè Galen. in omnibus suis operibus frequentius vsus est descriptionibus, quàm definitionibus, vt cum dicit 9. meth. meden. febris est intemperies excessus in caloris abundantia. Definitiones autem, vt idem docet lib. de diff. pulsuum, sunt obscuræ, propterea quòd paucis verbis essentiam rei complectuntur. Nos tamen definitiones & ad memoriam, & ad exactam rei cognitionem habere oportet.

Definitio febris essentialis ab Auicen. tradita est, quam ex multis locis Gal. collegit, vt, Febris est calor naturalis accensus in corde, procedens per vniuersum corpus per venas, & arterias, actionem lædens. Prima pars desumpta est ex descriptione superius assignata (accensus in corde) ex lib. 1. de differ. febr. quo loco docet nullum caloris excessum appellandum esse febrem, nisi cor incaluerit. Quòd si addidisset (Calor igneus) expressius febrem descripsisset, sed forsitan id intellexit, per hoc vocabulum (accensum.) Ignis est, ergo accendit ligna. Febris igitur cordis affectio primaria, totius corporis secundaria. Quòd autem febris sit passio cordis, sic probari potest. Cor est fons caloris naturalis. Sed febris, mutatio est caloris naturalis, qui per vniuersum corpus distribuitur. Oportet igitur mutari calorem in corde, vt in radicibus, alias in toto corpore mutari non potest. Præterea cōtraria versantur semper circa idem. Téperatio caloris est in corde, ergo & intemperies. Sed ista quibusdam logica videbuntur forsitan, ob id missa faciamus.

Cognito genere febris, species eius querendæ sunt. Cognoscuntur autem species per definitiones. Nam speciei propria est definitio. At febris definitiones non nisi ex genere & differentia constare solent. Sunt igitur febris differentie diligenter inuestigandæ, & quæ à rei substantia sumuntur, & quæ ab accidentibus, & propriis, quia in locum verarum differentiarum substituuntur. Accidentia enim ex Arist. sententia, ad agnoscendum, quod quæ est

est esse rei non parum conducunt. Petuntur autem differentiz febris (vt Gal. docet 1 de feb. & in commenta. *Peri epid.*) à febris substantia, & à materia, siue subiecto, & à caloris motu, tanquam ab accidente.

Substantia autem febris in genere caloris præter naturam. Est autem in caloris excessu, aut in intemperatura, quæ differt secundum magis, & minus. Febris magna est, & quandoque parua, quam differentiam melius in tentione & remissione explicaremus, quam nomine magni & parui. Est autem febris, (vt Gal. eo comment. docet) effusa in totum corpus, aut omnino, aut in plurimis partibus, vel nobilibus, vel nobilissimis, quandoque in nuda cute apparet, vt in epyala, in qua interiora calent. exteriora frigent. Et ne quis putet, id cum præcedentibus pugnare, dicendum est febrem diffundi per vniuersum corpus, nisi prohibeatur. Aer enim externus cutim refrigerare potest. Summa caliditas cordis, & aliarum partium sanguinem & spiritus à partibus externis, tanquam cucurbitula trahit. Ob eam occasionem in morbis acutis calidioribus, partes externæ apparent frigidæ, vt Hipp. in lib. præfagitionum scriptum reliquit.

Ex febrilis caloris differentiis tribus, tres febrium differentias colligemus, ex quibus tria febrium genera constituuntur. Est autem quidam calor acris & mordax, qualis apparet in omnibus vltis, aut putrefactis, talis calor genus febrium putridarum constituit.

Alter est non multum nostro calori dissimilis, maior tamen, & manifestior sine acrimonia, ex quo genus febrium ephemerarum constituitur. Postremus est, qui non admodum magnus est, nec manifestus & velut cineribus sepultus, qui aliquando magis se manifestat & expandit calcis irrorata modo, talis est hæctica. Hanc tertiam caloris differentiam Gal. confort calori leberis lapidei calfacti: calorem febris putridæ, aquæ balnei calidæ: ephemeræ autem, aeri. Sed quia hæ differentię neque satis crassæ sunt, neque satis manifestæ, differentias à materia siue subiecto inuestigarunt, ad eadem differentiarum genera constituenda.

Sunt alia tria subiecta in corpore nostro, in quibus calores isti præter naturam hæreere solent, partes consti-

nentes, contentæ, & impetum facientes, vt Hippoc. par-
titus est. Continentes appellat partes solidas, in quibus
febris hæctica sustentatur. Contentas vocat humores, in
quibus febris putrida fit. Aliæ enim partes in febribus
non putrescunt, impetum verò facientes, spiri us, qui si
inflammantur, si breu ephemeram excitabunt.

11

Differentia à motu caloris.

Motus caloris eadem genera constituit. Calor feb-
e phemeræ citissimè accenditur, & citissimè etiam
extinguitur ob materiæ tenuitatem. Calor hæcticæ tar-
dissimè accenditur & extinguitur, quia est in parte soli-
da: Putridæ autem pro natura humoris, in quo febris fieri
solet, citius aut tardius. Nam in melancholia ob crassi-
tiem humoris non citò fit. Quotidianæ accessiones quo-
tidie, propterea quòd eius materia non exactè euacua-
tur, & tardissimè calor ille in accessionibus mouetur.
Hæ sunt differentię magis vniuersales, quæ constituunt
tria illa febrium genera. Gal. tamen duas febrium diffe-
rentias dixit esse. Vna causam adhuc fouentem habet,
aut quòd illa desit. iam febris excitata: altera verò, quæ
iam facta est, hoc est, febrem alteram esse *en scheset*, alte-
ram *en exes*, quod barbari dicunt, In fieri & in facto esse.
Quia febres clariùs distinguuntur differentiis istis à ma-
teria petitis, eam ob causam, medici non solum illas ge-
nerales differentias, sed etiam speciales differentias ab
illis perì voluerunt. Genus enim febrium, quæ in humo-
ribus fiunt, suam manifestissimam distinctionem à ma-
teria accepit. Et quanquam Philosophi scriptis relique-
runt, nullam differentiam sumi à materia, nos tamen in
medicina proprias differentias, & febrium numerum à
materia accipimus, nec puto esse contra philosophiæ
præcepta. Nam cum dicimus nullam differentiam sumi
à materia, intelligendum est de materia formæ substan-
tialis, & materia prima, non autem de secunda, in qua
omnia quæ sub lunari globo sunt, conueniunt. Nam in
eo, in quo conueniunt, quomodo possent differre, & v-
num idemque in omnibus neque diuersum facere po-
test neque aliud. At in accidentibus, & rebus naturali-
bus subiectum aliquam differentiam facit, & aliquam
distinctionem, quia subiectum præditum est diuersis ac-
ciden-

cidetibus. Quod si subiectum aut materia nihil facit, cur Arist. & omnes Physici in definitionibus physicis materia & subiectum poni iubent? Quare in definitionibus ponuntur, aut generis aut differentiarum vices gerunt, & subiectum & materia pro genere non ponuntur. Ergo per differentias, ut in hac definitione. Ira est efferuescentia sanguinis circa cor vindictæ causa. Efferuescentia est genus, ergo sanguini, qui est materia, & cor, non sunt posita pro genere, sed pro differentia. Lex enim definitionum non patitur, ut duo genera in eadem definitione reperiatur, differentia verò plurimæ. Manifestissimè ergo apparet secundum Philosophos à materia differentiam aliquam sumi. Præterea calor accidens est: accidentia enumerantur secundum subiectum, & materia enumerationem. Igitur ad febrium putridarum distinctionem, necessaria est differentia, quæ à materia & subiecto sumitur. Febres putridæ non curantur nisi vacuata materia. Quod si à materia nulla sumitur differentia, vnum & idem medicamentum sufficit ad multorum morborum curationem. Hæc differentia à materia sumpta, has nobis commoditates adfert. Primum febris propriam & peculiarem cognitionem & eiusdem febris perfectam & rectam curationem indicat, & morbum, & morbi curationem. Et ne lector logica ista esse existimet, huius differentia utilitatē alius repetere oportet. Quod faciat ad peculiarem cognitionem & distinctionem, sic probo, Febrium cognitio ex causis, quæ præcesserunt, & ex his, quæ in feb. apparent, perfecte petitur. Ut si ætate iuuenis quidam febre corripiatur, hinc colligemus biliosam, quod eo tempore bilis motus dominetur, & ætas illa multa bile abundet. Eadem ratione, inedia usus calidorum alimentorum, febrium biliosarum suspicionem præbet. Sitis vehemens, vomitus biliosus, rigor magnus, & vehemens in principio accessionis, febrem tertianam indicat, quod à bile hæc omnia oriri sciamus. Ad curationem verò facit, quod hic morbus sit cum materia. Quod si à bile fieri cognoscamus, excrementa pungente medicamento magis, quam sanguinis missione euacuamus. Si à pituita fiat febris, humorem diutius concoquimus, tenuando, & incidendo. Agaricum, & alia, quæ pituitam agunt, non Rheum damus, neque mittimus

sanguinem. Est ergo vtilissima hæc à materia differentia, quæ non solum in febribus, sed etiam in tumoribus præter naturam vtilis est, & admodum necessaria, quam si quis legem teneat, breuiter & faciliè morbos curabit, symptomata inueniet, quæ ex humorum quantitate, vel qualitate orta sunt. Differentiæ febrium humorum à materia petuntur, scilicet, ab humoribus, qui in corpore nostro continentur, quas differentias colligere nō possumus, nisi prius ipsam humorum cognitionem, hoc est, qui sint, & quot sint in corpore nostro, exactè teneamus. Sunt autem succi in corpore nostro, qui naturales à Medicis dicti sunt, quod corpus nostrum nutriant & foueant. Alij vero non naturales dicuntur, quibus corpus non nutritur, sed aliquam vtilitatem præstant. Ob id autem ita dicuntur, quia præter naturam non sunt, neque etiam naturales, sed quasi mediam naturam habent. Sunt autem succi naturales sanguinis partes. Has differentias circumlocutione quadam plurimi Medici massam sanguinis vocauerunt, quæ & in venis, & in corde reperitur. Non est autem res simplex & exquisita. Nam in ea massa sanguinis, vt in lacte, multæ partes differentes reperiuntur. Est autem ex his vna pars, quæ consistentiam mediam obtinuit, colorem purpureum, saporem dulcem. Dicitur autem hæc pars nostri sanguinis simpliciter, estque calido & humido temperamento. Alia est tenuis, & veluti efferuescentia quædam illius massæ sanguineæ, colore flammeo, hoc est, ex rubro flauescente, sapore dulci, cum quadam acrimonia leui, quam partem, sanguinem biliosum vocamus, aut bilem naturalem, quæ temperamento calidior est & siccior, quàm sanguis.

Tertia pars crassior est secunda, colore ex albo rubescente, sapore insipido. Dicitur autem pituita naturalis, aut sanguis pituitosus, qui aliquando dicitur sanguis minùs coctus, ex quo fit quoque optimus sanguis, si rursus concoquatur, & est frigidior, & humidior pars sanguinis.

Quarta pars est crassa admodum consistentia, colore ex purpureo nigrescente, dulcis sapore, cum quadam leui aciditate. Dicitur autem melancholicus sanguis

guis aut melancholia naturalis, frigidior & siccior.

In hoc cōueniunt omnes differentię sanguinis, quòd extra corpus fluentes, concreſcunt, humores autem non naturales nunquam, ſed ſemper liquidi remanent. Non naturales autem ſunt ſucci, veluti ichores, & ſuperiorum recrementa. Ad tria referuntur, ad pituitam, ad bilem, & melancholiam, quibus poſſumus adiungere ichores ſanguinis, vt ſit numerus naturalium & non naturalium. Sed quia à ſanguine, vel à ſero ſanguinis non ſecernuntur, ſed in venis ſemper ſunt, à multis prætermittuntur. Faciunt tamen quafdam ſcabiei ſpecies non contemnendas, vel quia hæc recrementa proximè accedunt ad bilem, ſub bile plurimis reponuntur, & febres continuas bilioſas excitare poſſunt. Quidam bilem rubram vocant, quæ conſiſtentia ſanguini tenui proxima eſt, verum eò, quòd non concreſcit, idcirco eam bilem nuncupauerunt. Sunt igitur dicti humores non naturales. pituita, ſanguis, & bilis vtræque. Verum bilis & pituitæ multæ ſunt differentię, & nominibus diſtinctæ, quæ varias febrium differentias, & tumores excitare ſolent.

Prima ſpecies eſt bilis flaua, quam Græci *xantyn*, quæ ſeroſo recremento diluta eſt, ob id conſiſtentia eſt liquidior, colore magis pallido, ob id etiam nonnunquam pallidam vocant. Flaua bilis reddita craſſior, & plus calfacta, colore magis flaua, aut *ôcra*, calidior eſt & conſiſtentia craſſior, à colore, flaua Latinis, *ôcra* Græcis dicitur. Quòd ſi craſſior ſecunda illa ſpecies reddita fuerit, id erit aut propter pituitæ admixtionem, aut propterea quòd facta ſit ex alimentis craſſioribus, eam bilem vitellinam vocamus.

Omnes hæc bilis differentię in hepate & venis fiunt. Quæ verò ſequuntur, in ventriculo. Sunt & aliæ bilis differentię, quæ verius dicerentur præter naturam, quàm non naturales, quia nunquam in naturalem habitum reducuntur, neq; aliquam vtilitatem præſtant, & à cauſſis morbificis fieri ſolent in ventriculo & extra venas, qualis eſt illa, quæ æruginofa dicitur, ob ſimilitudinē, quam habet cum æruginē, quæ alio nomine dicitur praſſina à colore porri. Neque differunt, niſi quòd praſſina ex ole-

ribus in ventriculo calido magna ex parte fit, æruginosa verò ex bile torrefacta, & acriori est. Est & alia quæ appellatur isatidis à colore isatidis herbe, quam vulgò (pastel) vocamus, non vt Petrus Apponenfis ab æqualitate coloris, deceptus vicinitate vocis, isotis & isatis. Hæ sunt omnes bilis differentię, ex quibus varias febres, & varios tumores præter naturã fieri postea monstrabimus. Pituitæ autem differentię multæ sunt, quas Gal. ad falsam, acidam & dulcem reduxit. Nos autem in quatuor differentias distinguemus cum eodem Gal. Nam vitrea etiam si parùm acidam sit, ab acidam tamen temperamento & consistentia tenuiore differt. Vocamus pituitam cum Gal. humorem naturæ frigidum & humidum. Prima species à Gal. lib. de differentiis feb. dicitur esse vitrea, quæ vsque adeo frigida est, vt in loco calido non incalescat, & dolores maximos excitet. Est autem humoris, vitro liquefacto similis.

Secunda species, pituita dulcis dicitur, quæ verius insipida est, quàm dulcis, qualis est illa, quam plerique excreta expuunt, & illa minùs frigida est, quàm speciem Gal. aliquo loco negat esse pituitam, sed phlegma vocat, quòd forsan pituita naturalis non sit, sed pituitæ recrementum.

Tertia species acidam dicitur, à sapore acido, quæ minùs frigida est quàm vitrea, magis tamen, quàm dulcis.

Quarta species falsa à sapore falso dicta. Fit autem falsa, aut propter putredinem, vt in febricitantibus, aut propter falsæ serosæq; humiditatis admixtionem, qualis apparet in catarrhis falsis, in quibus nulla febris sentitur. Calida est, si cum aliis cõferatur, & siticulosos facit. Hæ sunt differentię pituitæ, quæ febres pituitosas faciunt. Sic & atra bilis secundum substantiæ varietatem non obscuras habet differentias. Nam alia est, velut i fex sanguinis, quæ admodum spissa est, fecibus vini haud absimilis, quæ terram non fermentat, neque de simplici acidam qualitate participat. Sed hæc species succus melancholicus, aut melancholicus sanguis dicitur, de quo supra inter humores naturales. Ex Gal. de atra bile reperio aliam differentiam humoris melancholici, quàm speciem plurali numero *melana* efferunt. Quòd autem

autem ista recrementa, distinguantur & à succo melancholico, & à melancholia, manifestum est ex lib. Gal. de atra bile, in quo ad verbum hæc scripsit. Verum ad sermonem de atra bile redeamus. Quoniam igitur non concrefcit, ex hoc sanguine nigro distinguitur, non tamen ab his, quæ propriè nigra nominantur, quæ longum esset referre. Alia verò tenuioris est essentia, quam superior, quæ vomentibus & olfacientibus acida videtur, terram radit, fermentat, & ampulas facit, quam mulres gustare nolunt, nec aliud animal. Fit autem melancholia ex assatione bilis, quæ adhuc supradicta tenuior est, acris & mordax. Fit etiam ex adustione pituitæ crassæ, quæ dum à forti causa exiccatur, vel exustione incineratur, in humorem melancholicum transit. Nec valet eorum ratio, qui dicunt pituitam primùm mutari in sanguinem, postea in bilem, & à bile in melancholiam, propterea quod ratione, quod mutatur & mouetur, ab vno extremo in aliud extremum mutatur. Talis autem per media transitus fit quando ex alimento fiunt humores. Sed in hac violenta, ac præter naturam vstione, aut incineratione, non fit, quia id quod mutatur, illam aptitudinem non habet, ut fiat sanguis. Quod autem ex pituita crassa fiat melancholia, docet morborum commutatio. Febres erraticas & quotidianas, quæ à materia crassa fiunt, in quartanas febres quotidie commutari experimur. Item scirrhi à pituita crassa fiunt, & à melancholia, & tandem in scirrhos melancholicos transmutantur. Nam, ut Philosophi docent in habentibus symbolū, facilis est transitus. Quod autem habeat symbolū pituita crassa cum melancholia, testis est lib. meth. docens, Scirrhum fieri à pituita crassa, quæ (ut inquit) proximè accedit ad naturam melancholiæ. Igitur melancholiæ factæ per adustionem multæ erunt differentia, ut à flaua bile crassa, & octa, & vitellina quæ incineratur, caliditatem amittunt propriam, aduentitiam tamen acquirunt ex putredine vel adustione, quemadmodum in medicamentis acris fieri dicimus, quæ vstione mitiora redduntur, & si perfectè incinerantur, omnem caliditatem amittunt, & frigidiora redduntur. His prælibatis oportet docere, quomodo ex istis humoribus febrium differentia fiunt.

In summa dicemus, omnes febres continuas fieri ab humoribus naturalibus contentis in venis, & in corde.

Quòd si sanguis ex æquo auctus putrescat, febrem continuam facit, quæ Synochus propriè dicitur. Si autem sanguis purus, aliis non supra modum auctis inflammetur, tunc febris citra putredinem fit, reponiturque sub genere ephemerarum, aut alio modo dicitur Synochus non putris. Fiunt autem istæ febres crescentes, aut decrescientes, aut consistentes. Crescentes fiunt, si semper putredo aut inflammatio sanguinis augeatur magis, & obstructio maior fiat: Si autem maior fiat in dies difflatio, fiunt decrescientes: Si verò tanta fiat accessio, quanta resolutio, in eodem statu permanent. Si sanguis biliosus, aut bilis in venis maioribus & longinquis putrescat, febrem tertiatam continuam parit. Hæc tertio quoque die quasdam exacerbationes inducit, vt tertiana intermittens, sine rigore tamen. Si verò bilis in venis ventriculi, vel cordis putrescat, causonem facere aiunt. Putarim ego tertianam continuam fieri à sanguine bilioso, vel sanguinis ichoribus, hanc verò à bile flava, vt indicat maior caloris acrimonia, sitis vehementia. Febris tertiana continua fit aliquando ob putredinem bilis flauæ, vel vitellinæ genitæ in venis, aut cum sanguis, ob obstructions meatus vesiculæ fellis, ob quas non potest recipi in vesicam, in hepar & venas regurgitat. Quòd si tantum peccet quantitate, morbum acutum facit, si autem putrescat, febrem tertianam continuam, vel causonem facit. Ob id Auic. iubet vrinas inspiciendas esse, vt febrem factam à sanguine bilioso, vel à bile distinguamus. Quòd si vrina tenuis & flava appareat, sanguinem mitti non vult, quia à bile retorrida fit. Quòd si rubra sit, tunc iubet sanguinem mitti. Vrina enim rubra à sanguine fieri significat, vt flava, à bile. Differunt quoq; tertiana continua, & causus, quia causus ob visceris alicuius obstructionem frequentius fit, vel à pituita falsa, vt ex quarto commentario de victus ratione in acutis distinguere licet. Sanguis pituitosus, vel pituita ipsa sanguine permixta, si putrescat, febrem continuam quotidianam efficit, qua continuo affligit, & quotidie circa noctem videtur quodammodo in-

do incrudescere sine frigore præcedente. Melancholicus verò sanguis, vel melancholia sanguini permixta febrem quartanam continuam fecit, quæ quarto quoque diè grauior fit, & sine horrore inuadit. Humores non naturales vnà cum sanguine per vniuersum corpus effferantur. Quòd si putrescant, febres continuas faciunt, vt humores non naturales. Differunt à sanguineis malitia symptomatum & caloris acrimonia. Illæ enim exacerbationes maiores habent. Omnes hæ tres febrium differentiarum quatuor mutationes habere dicuntur, si salubres fuerint, quas mutationes appellat ærates, siue tempora, & istis mutationibus potissimum distinguuntur febres veræ continuæ à continuis, quæ intermittentibus proportionem respondet, quas febres *synochus* Græci appellant. Febres enim veræ continuæ nulla tempora manifesta habere dicuntur, propterea quòd nullas mutationes habent, cum semper decrescant, aut augentur, aut consistant. Distinguntur autem ab intermittentibus, vt nunquam desinant in febricitationem, & mutatio nulla appareat, excepto illo primo morbi insultu, in quo fieri solet quidam sensus rigoris aut frigoris non manifestus. Diebus iudicatoriis & criticis fiunt quædam mutationes, quæ morbos aut iudicant, aut solvunt. Ne fortè quis hanc febrium diuisionem somniasse existimet, quibusdam rationibus ostendere volo, febres cum putredine & sine putredine sanguinis fieri posse, & quòd materia febris continuæ intra venas sit: febris verò intermittens, extra venas. Quòd autem febris fiat ex inflammatione sanguinis, testis est Gal. 9. meth. quo loco docet ab inflammato, & putrescente sanguine continuam febrem fieri alteram, quam diutius opposuit, propterea quòd ex inflammatione tantum sanguinis facta sit, & non perduret. Nam soluitur vel sanguinis è naribus fluxu, vel sudore intra tertium aut quartum diem, aut mutatur in synochum putrem, & illas duas febris differentias docet exemplo duorum adolescentum, quorum alter liber erat, palæstræ peritus, alter seruus. Liber continente febre citra putredinē laborabat, seruus continente cum putredine. Sanguis laudatus multus, si non exactè euentiletur, propter cuius

tis constipationem, aut ipsius copiam & carnis, pinguedinisque, incalescit ob fumos illos calidos retentos, qui per insensibilem transpirationem euacuari solent, & statim putrescit, tuncque febrem citra putredinem excitare dicitur. Quod autem constipatio corporis calfaciat, manifestissimum est, in tumorum præter naturam maturatione, ad quam afficiendam medicamentis utimur, ut retineatur effluuium caloris naturalis, ut Galenus 2. de causis morborum docet, scilicet, constipationem esse causam caloris. Item, ut omnibus compertum est, omne calidum aliquam euentilationem & refrigerationem requirit, qua si priuatur, statim maiorem calorem concipit. Sic sanguis multus in corpore nostro cutis constipatione non euentilatur, & fumus ille calidus retinetur. Item illa carnis abundantia, quam Græci *poly sarciam* appellant, euentilationem prohibet, idem etiam facit pinguedinis copia. Quod autem sanguis laudatus non statim putrescat, prohibet eius bonitas, item naturæ regimen, quæ humores & succos à putredine conferuet, illud autem regimen Galenus libro method. expressit. Alio loco dicit putrescere, vel euinci à natura & domari. Sanguis igitur potest sine putredine inflammari, ob illas diuinas facultates in nobis positas, quæ & succos, & partes omnes à putredine vindicant, quantum fieri potest.

Quod autem facultas illa diuina humores à putredine & corpus vindicet, monstrat animæ & corporis separatio, qua separata corpus statim putrescit. Etiam corpora tabe absumpta siccissima sunt, neque ob largam humiditatem, quæ mater putredinis esse dicitur, putrescunt, sed ob animæ separationem, quæ in corpore est pro sale. Cum ergo virtus conuincit, & dominatur in humores, omnia seruantur à putredine: cum autem vindicantur ab huius regimine, omnia malitiam acquirunt. Et quia illa facultas magis residet in principibus principibus, in corde, iecore, & in venis, humores non tam facile putrescunt, aut venenum acquirunt, quam cum extra venas sunt, vel in paruis venis. Ob id Hipp. scriptum reliquit, sanguinem putrescere, si in ventrem descendat, & in carbunculo materia venenum acquirit

extra illa magna vasa. Materia herpetis exedentis acrimoniam acquirit, postea quàm à sanguine separata est. Humores etiam in venis sese mutuò conseruant, & venarum facultas humores naturales conseruat ob nutritionis necessitatem. Quare nemini mirum videri debet, quòd sanguis aliquo tempore duret sine putredine.

Dicimus autem durare aliquo tempore, quia tandem putrescit propter maiorem prohibitam transpirationem. Calor enim ille maior factus corrumpit alios humores, & putrefacit aliquam partem sanguinis, & sic non putris mutatur in putrem, nisi diligentia medici prohibeatur. Quòd autem in Syncho putri omnes putrescant humores æqualiter in omnibus vasis, potissimum verò in maximis, testis est Gal. lib. 2. meth. in hunc modum scribens: Atque vnum quidem hoc Synochum febrium genus, quod ex eadem cum diariis natura constat: alterum est, vbi in omnibus vasis ac potissimum maximis succi æqualiter putrescunt, quod & ratione monstrari potest. Febris serui erat à putredine humorum, vt ex notis putredinis, tum in vrina, tum in pulsu Galen. agnouit. Quòd si putresceret bilis tantum, tertianæ exacerbationes tertio quoque die haberet: si melancholia, quarto quoque die: si pituita, singulis diebus. Quare oportet vel sanguinem totum, vel omnes æqualiter putrescere. Quòd si sanguis putrescat, purus & syncerus, oportet alias partes sanguinis minus temperatas putrescere. Quæ superius diximus de febribus ex putredine sanguinis, videbuntur pugnare cum rationibus Gal. 2. de differen. feb. cap. 12. quo loco quærit nunquid quemadmodum in vtraque bile, & pituita sunt quædam febrium species, ita & in sanguine putrefacto soleant accidere febres. Aliqui intellexerunt ex illo loco sanguinem quidem putrescere, sed febrem putrem nõ posse excitari: quia pars tenuis in flauam bilem vertitur, crassior in atram. Sed illi mihi videntur contra Galeni sententiam statuere. Nam eo loco fateretur Galen. sanguinem posse putrescere, vel quia non diffiatur, aut quia natura non conuincitur, & maximè putrescere, quando in aliqua corporis parte plurimus acervatus, eiusdem corporis opprimit vim, quod postea in hunc modum

concludit. Quare non procul à vero est existimandum, sanguinem ipsum nonnunquam in his, quæ inflammationem patiuntur, particulis, subire putredinem, ex quo simpliciores quidam, quàm ex aliis humoribus febres fieri, similem verò accessionem proportionem assumere, qualem tertianæ maximè febres ostendunt, quod obseruatione sua cõfirmat scribens. Nam ita in his, qui laterum inflammationes patiuntur, obseruatum est, quo tempore maximè rubidum expuunt: non dixit in putredine sanguinem mutari in bilem atram, & flauam, sed quando supra modum affatur, vt in carbunculis, quos à sanguine supra modum efferuescēte fieri dixit, in quibus ad atræ bilis humorem transmutatio fiat, non exquisitè, sed in quodam confinio. Has febres ad tertianæ naturam refert, quod vt ipse ait, accessiones tertianæ accessionibus respondent. Item cap. 2. li. 2. de differ. feb. Synochū febrem ex bile flaua provenire scribit his verbis. Continuarum autem, quæ ex flaua bile proveniunt, duplex est species, altera earū, quæ Synochi appellātur, quarum vniuersum tempus in vnica consumitur accessione, quæ à principio ad finem perdurat. Quo loco & ægmasticas, & paragmasticas, & epagmasticas recenser, quibus locis Gal. bilem accepit pro sanguine, vt ex eius dictis apparet. Nam lib. 9. meth. has Synochi differētias à sanguine inflammato, vel putrefacto fieri dixit, cui loco magis credere debemus quàm aliis, quia exemplo rem demonstrat. Quod attinet ad locū de differ. feb. cap. 12. lib. 2. puto Gal. intentionē esse, vt velit inuestigare, num ex putredine sanguinis fieri possit febris intermittens. Coniecturæ multæ sunt certissimæ, primū quod antea de febrib. intermittētib. egerat, & sequenti capite, de causis per quas febres quædā sunt interpollatæ, & quædā cõclusæ docet. Accedit quod in eo capite illud quærit, an ex putredine sanguinis fiat febris. De sanguine putrescēte in aliqua parte, vt in inflammatione, exemplū dedit. Nam ipse eodē cap. sanguinē posse putrescere docet ab aliena qualitate. Neque sequitur, sanguis cū putrescit, in alienā qualitatem mutatur: igitur sanguinis febris non erit. Nam sanguis cū mutatur in bilem, nō statim, sed tēpore mutatur, dūmq; mutatur, putrescit, dum

dum putrescit, febrem excitat. Quare febrem à sanguine dicere oportet, vel simili ratione, nulla febris tertiana erit. Bilis etiam mutatur in melancholiam, & sic omnes febres tertianæ, quartanæ esset, aut in quartanas mutarentur. Præterea in fine eiusdem capitis ex qualitate caloris docet febres à sanguine distingui ab aliis febribus putridis, humoralibusve. Quo loco dicit febrem esse simpliciorē à sanguine & mitē, alias omnes, habere qualitatem acrem & mordacem. Denique quomodo esset febris *omnino*, si tertio quoque die grauius affligat, aut quæ differentia erit inter febres syncheis, & synchos? Quare satius erit dicere, febres verè continuas à sanguine fieri, & semper eodem modo progredi, vel increcendo, vel decrecendo, vel in eodem statu permanendo. Et in ea sententia fuit Hippocrates, Auicenna, reliquique Medici, tum Græci, tum Latini & Arabes. Quod autem Galen. dixit febres inflammationum accessiones tertianæ ostendere, hoc ad febris inflammationem referre tantum oportet, non ad febrem morbum. Febres enim tales fiunt à sanguine maxime bilioso, & qui ob tenuitatem facile in partes proruit, ob id tertianæ accessiones habet, vel quia sanguis concutatur in parte aliqua, multum elaboratur, & biliosior redditur, ob quam causam similes tertianæ accessiones habere scribit, hoc est, moueatur diebus imparibus, quod ferè in omnibus morbis acutis vnusquisque obseruare potest. Sed hoc nimis de febre à sanguine redeamus ad continuas, quæ intermittentibus proportionē respondent. Quod autem aliqua febris continua, tertiana, aut quartana dicenda sit, ostendere oportet. Nam id præter rationem videtur, quod sanguis biliosus in vasis putrescat, non putrescente pituita aut melancholia, cum in eodem loco cōtineantur, & permixti sint. Omnibus compertum est, plethoram fieri, quando ex quo omnes humores naturales aucti sunt: cacochymiam verò, quādo aliquis malus succus in corpore nostro augetur, vt pituita multa aceruat in intemperaturis frigidis, & humidis, in otio viuētibz, in regione frigida & humida, alimentis frigidis & humidis aut intemperanter viuētibz, & potissimum in cōstitutione

frigida & humida, talis cacochymia constitutio à pituita dicitur. Bilis multa colligitur in his, qui tenui victu variantur, alimentis calidis, & in æstate, & in constitutionibus calidis & siccis, in otiosa vita, sed curis plena, cacochymia esse biliosa dicitur. Sic quoq. melancholia multa in corpore nostro colligitur, aut autumnii tempore in frigidis & siccis temporibus, alimentis crassis, terreis, siccis vescētibus. Quòd si humores tales naturales sint, biliosi, pituitosi, aut melancholici dicuntur: si verò non naturales sint, tunc cacochymi dicuntur. Cùm autè aliquis istorum humorum putrescit intra venas, febrē continuam quotidianam, vel tertianam, vel quartanam facit, quanquā alię partes sanguinis tandem vnà putrescant. Sed quia maior est copia bilis putrescentis, biliosa febris apparet, & motus manifestos bilis putrescentes habet, quando in pituitoso homine, quotidiana potius continua fit, quàm melancholica, eadem ratione, & quartana continua fit. Nemo enim dubitat nullum esse purum & syncerum humorem in corpore nostro, tamen dicimus aliquam esse inflammationem à sanguine, erysipelas à bile, œdema à pituita, scirrhum à melancholia. In omnibus istis tumoribus præter naturam, est aliquid sanguinis, aut pituitæ, nihilominus tamen tumores simplices dicuntur, ab humore vincente, vt inflammatio erysipelatodes, quia cum sanguine bilis peccat magis, quàm cum pituita, vel melancholia, aut œdema phlegmatodes, aut erysipelatodes, aut cirrhodes, sic febres appellantur ab humore, qui vincit & superat, vt fortè etiam in febribus, quemadmodum in tumoribus, præter naturam talis complexus inueniri possit, vt in hemitriteis obseruarūt, & in tertianis continuis, quartanis cōtinuis accidere potest. Fieri enim potest, vt biliosus aliquis hyeme febre tertiana continua laboret. Febris illa exquisita tertiana nō erit, sed aliquid à pituita accipiet. Sed quia hæ febrium differentię compositę sunt, & ex simplicium cognitione vnusquisque illas cogoscere potest, à Medicis negliguntur. Manifestum est igitur febres continuas fieri à sanguine inflammato ex putredine humorum naturalium, & putredine pituitæ, vel bilis, vel melancholię, & omnium istarum febrium materia est intra venas, sed veræ febres continuæ ab hu-

ab humoribus naturalibus tantum fiunt. Continētes autē intermittētes respōdent ab humoribus tum naturalibus tum nō naturalibus. Non naturales enim humores etiā si à natura receptacula habuerint aliqua semper tamē aliqua portio cū sanguine defertur, vel ob illius humoris copiā, vel ob partis illius quæ illā recipere debet, obstructionem, vel imbecillitatē, vt icteritia nigra & flaua, herpes, scirrhī, œdemata declarant. Fiunt enim ex humoribus non naturalibus emendatis à toto corpore, vel ob intēperiem alicuius partis genitis. Ex hac materia febres intermittētes fiunt, quāquam aliquis conatus est quibusdam rationibus monstrare, materiā intermittētium in venis putrescere, suam autem opinionem his rationibus stabiliebat. Si materia feb. intermittētium non est intra venas, cur in febrib. intermit. entib. & tertianis, & quartanis puris sanguinem mitti iubet Galenus? Cur in vrinis speculamur coctionē? quibus argumētis facili responderi potest, distinguendo de materia antecedēte, vel coniuncta siue immediata. Nam materia antecedens in venis continetur, ob quam mittimus sanguinē, & medicamēto purgante vtimur nō propter bilem illam, quæ accessionē facit: illa enim per sudorē & insensibilē euaporationē euacuatur tantum. Et cōcoctionem spectamus in vrinis, & in excrementis, vt aliquid de cōcoctione particulari, quæ sit in omnibus membris colligamus. Nam si optima concoctio in magnis vasis sit & in carne, & in mēbris consecutione quadā optima fieri necessarium est. Quod autē materia sit extra venas, docet rigor, horror, & frigus. Solēt enim hæc symptomata fieri initio febris, cū à venis descēdunt, ac partes sensibiles sua qualitate afficiunt, vt vehemens illa concussio à bile, horror à melancholia, frigus à pituita. Quod autem rigor indicet motū materiæ à venis exeuntis, ostendit Hipp. dicens: à causone habito rigor superueniēs morbi solutio fit. Soluitur autem morbus, quia materia illa quæ in venis putrescebat, extra fertur, & sudore euacuatur, quia extra venas erat, sub cute in carne. Sic feb. desinunt in infebrecitationem, quia per sudorē, vel in aliquibus per insensibilem euaporationem solvuntur quotidie, quod nō fieret si intra venas esset materia. Et Hip. pro certissimo scripsit:

Lib. 4.

Apho 38.

Lib. 4.

Apho 63.

Quibus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur. Solvuntur autē quotidie, quia materia est per habitum sparsa & disseminata, quæ per meatus cutis expurgatur in declinatione. Quod si intermittens non solvatur, in continuam vertitur, ob materiæ retentionem. Satis manifestum esse puto, materiam intermittētis extra venas ferri ab ipsis venis sed forsan aliquis curiosus perquiret, an in carne, an in venis capillaribus id fiat. Nam si a venis magnis in capillares descendat, erit intra venas, quare vera erit illorum opinio, quam licebit confirmare hac ratione. Esse intra venas, ostendit solutio. Solvuntur sudore. Sudor per cutis meatus insensiles fluit. Cutis autem spiracula, venarum & arteriarum sunt veluti terminus & cotyledones, ut in utero. Ergo materia intra venas adhuc putrescit. Quod autem cutis spiracula in venas & arterias desinant, ostendit inspiratio insensilis per hos meatus cutis facta. Item dicimus sanguinem euacuare per poros cutis. Quod si occludantur, accenditur sanguis, & putrescunt humores. Omnes hæ rationes manifestum faciunt, materiam in venis putrescere. Nos autem dicere possumus, materiam esse intra venas parvas, & cum Gal. dicit fieri per habitū, vel extra venas, de magnis intelligendum est. Magnæ in minores venas humores semper trahunt. Sed re vera extra etiam capillares venas humores putrescere sic monstramus. Si biliosa materia moveatur à venis magnis in parvas venas, cur rigorem facit? Dicimus enim rigorem fieri, cum affatim natura acrem & pungentem humorem in sensibiles partes descendere facit. Venæ capillares non magis sentiunt, quam maiores. Quare sine rigore esset illa febris initiō. Præterea, si materia biliosa pungens affatim mora rigorem facit, cum ex magnis vasis in exiguas venas descendit, cur in erysipelate non fit rigor? Descendit enim affatim bilis magnis vasis in capillares. Igitur oportet humores in partes carnosas sensibiles descendere, & extra venas ferri. Quod attinet ad illas rationes à spiraculis petitas, dico spiracula aliqua esse venarum & arteriarum, & aliqua etiam in spatia cutis desinentia. His addo, quod corpus est transpirabile, & quia meatus cutis in spatia inania descendunt, venæ & arteriæ poros in spatia

spatia descendentibus habent, quibus nutrimentū fundunt in carnem, & quibus aerē eliciūt Quod autem nostra hæc opinio vera sit, monstrat inflammationum resolutio, & discussio. Scirrhi, œdemata, erysipelata, & inflammationes medicamentis calidis discutiuntur, & resoluntur. At inflammationis materia siue dispositio, à magnis venis in minores, à minoribus in spatia inania descendit, ut Gal. lib. de Inæquali intemperie, de tumoribus præternaturam, atque aliis locis dicit. Sed illa materia per sudorem, vel insensibile euaporationem euacuatur. Quare oportet esse spiracula ab illis spatiis carnis ad cutem, quibus euacuentur recrementa. Sudor est euacuatio carnis immediate, & cutis, & non venarum. Quare luce meridiana clarius est, materiam quotidianæ, tertianæ, intermittentium extra venas esse, & non expurgari, nisi sudore aut insensibili transpiratione: materiam autē antecedentē, sanguinis fluxu vel missione, & purgante medicamento & per venas, & per vomitionem, & menses, & hæmorrhoidas. Non tamen eo inficias, quæ ex venis capillaribus, & paulò maioribus, venis etiam per sudores euacuetur, sed hoc tantum in diebus criticis, non autem singulis diebus, aut exacerbationibus accidit.

Nunc quamobrem febres aliquæ sunt intermittentes, quærendum. Item cur aliæ intermittunt duos dies, aliæ aliquot horas tantum. Causa continuitatis febrium est continuus feruor in sanguine, & materiæ retentio. Nam, ut Galen. lib. de differen. febr. docet, tandiu perseverat febris continua, quandiu qui ei causam adferunt, humores, aut ex toto consumantur, aut coquantur: aut utrunque patiantur. Febres intermittentes fiunt per circuitus, quia materia, quæ putrescebat in ambitu corporis, extra venas concocta est & euacuata per sudorem. Quod autem illa euacuatio sit causa intermittentium febrium, manifestum est ex retentione. Qui enim laborant febre tertiana, vel quartana, & per impatientiam non sudant, febris accessionem diuturniorem habent, & secundam celerius repetentem, & mutatur nonnunquam in febrem cōtinuam, ob materiæ putridæ retentionem, quæ cum retinetur in parvis venis, recurrit ad venas maiores, & humores putredini iam paratos in-

ficit, atque corrumpit. Hoc evidentissimè etiam ex febre quotidiana deprehenditur, in qua sudores pauci fiunt, ob id in veram infebrecitationem non desinit, & secunda accessio post sex horas fit. E contrario tertiana & quartana, in quibus sudores copiosi fiunt, ob id desinunt in veram infebrecitationem, & longam habent remissionem. Illa est causa, quod in infebrecitatione desinant. Sed quod tertio quoque die in tertiana, in quartana verò quarto quoque die fiat accessio, illa euacuatio, vel alicuius putridæ materiæ retentio potest esse in causa. Nam in tertiana continua & quartana continua fiunt exacerbationes, quæ proportionè respondent intermittedium accessionibus. Nam cum in istis inflammationibus partium nullæ fiat euacuationes, non possunt referri repetitiones accessionum ad euacuationes. Nos autè dicimus circuitus accessionum & exacerbationes ad materiæ naturam particularem referri. Quod autem exacerbationes referendæ sint ad humorum naturam, argumento est, quod nulli ex intemperatura morbi accessiones habet, sed dolores, febres, & inflammationes, quæ ex humoribus fiunt, paroxysmos, & accessiones experiuntur, vel quod quotidiana singulis diebus fiat, in causa est, quod quotidie pituita moveatur. Quod tertio quoque die exacerbationes in biliosis fiant, bilis natura & proprietas in causa est. quod autem quarto quoque die, melancholiæ proprietas. Sed duplex proprietas, altera actiua, altera passiva. Quod moveatur bilis tertio quoque die, est passiva, resistit enim putredini usque ad tertium diem: melancholia verò, ad quartum usque diem. Motio hæc experientia constat, sed à qua moveatur causa, peculiarine an vniuersali, Medicis nondum est perspicuum. Id quod remanet in prima accessione, non potest esse causa, quod bilis expellatur è venis in partes sensibiles, & rigorem faciat: bene autem potest corrumpere & putrefacere id quod defluit. Si febre intermittentes fierent ex recrementis congregatis in ambitu corporis, id quod post accessionem remansit, posset esse secundæ accessionis causa. Sed hoc non fit. Nam si fieret ex huiusmodi recrementis, cur rigor in tertiana fieret? Fit enim rigor ex sententia Medicorum, cum materia

ria spargitur per partes sensiles. Illa autem iam sparfa erat materia. Ideo cum sparsi essent illi humores per corpus, non debebat humorem excitare. Non eo inficias febres aliquas intermittentes fieri sine rigore, cum illa tantumcrementa putrescant, & non descendant e venis. Fit autem frigus, rigor, & horror, quando materia extra venas deferretur ad partes sensiles. Si quis huiusce rei causam euidentem requirat, hanc posset reddere, quod quotidie moueatur natura ad expulsionem pituitæ, cuius maior est copia in copore nostro, quam bilis, aut melancholiæ. Et tertio quoque die bilem expellit & quarto melancholiam, & ad hoc, quod non moueatur ad expulsionem oportet esse aliquam notabilem quantitatem humoris noxij ad mouendam facultatem expultricem. Cum autem melancholiæ pauca sit quantitas, respectu aliorum humorum, duos dies desiderat ad congregationem illius materiæ, ut bilis vnum diem, & pituita tantum aliquot horas. Possumus & aliam rationem reddere, nempe resistantiam humorum ad putredinem. Humor etiam melancholicus, cum sit natura frigidus & siccus, diu resistit calori putredinali, unde & quarto quoque die patitur accessionem. Secundo magis resistit bilis, siccitate sua, sed propter eius caliditatem, & tenuitatem substantiæ, citius calorem illum externum putrefacientem recipit. Pituita autem, quia humida est & tenax, ob lentorem non euentatur, in omnibus suis partibus facilius putrescit, & ob id quotidie accessionem facit. Hoc autem referri potest ad illam proprietatem occultam, sed quod non omnino dependeat à proprietate occulta, vel quod illa proprietas causis manifestis iuuetur, ostendunt anticipationes accessionum, & retardationes. Si enim æger vtatur praua victus ratione, aut se exerceat supra modum, & præter consuetudinem, accessionem accelerat, quia materiam mouet, quæ mota facilius calorem illum febrilem latitantem excitat.

Sed cur accessiones maiores, vel minores accelerantur, vel retardantur, non inutile erit inuestigare. Accessionum longitudo & breuitas dependet à maiori materiæ resistantia. Resistit autem magis multitudo materiæ, citiusque concoquitur, aut dissipatur pauca, quam multa.

Item lentor vel crassities humorum & frigiditas. Substantia enim tenuis facilius alteratur, quam crassa. Crassa enim sua crassitie resistit prohibendo, quò minus à calore in omnibus suis partibus contingatur. Ad longitudinem accessionis facit etiam corporis habitus, & virium robur. Non solum enim oportet humorem dissipari, & euinci viribus concoctricis facultatis, sed etiam oportet materiam extra propelli. Propellitur autem virium robore, & meatus amplitudine. Quòd si corpus gracile fuerit, facilius discutitur humor, & accessiones minores facit. In habitu verò spisso & denso, & constipato diuturniores sunt accessiones. Materia pauca, tenuis, & quæ minus distat ab humoribus naturalibus, in corpore raro & tenui facilius concoquitur, si accedat virium robur, quod concoquit, & concocta expellit. Sed hæc satis de causis febris, nunc ad particularem cuiusque naturam descendere oportet, facta tamen prius enumeratione febrium, tam simplicium, quam compositarum. Febres igitur sunt ephemerae, vel hecticae, vel humorales. Humorales voco clarioris doctrinae causa, non putridas, ut comprehendatur febris sanguinis citra putredinem. Sub hoc genere rursus febres putridae aliae sunt continuæ, aliae intermittentes. Continuæ aliae sunt, continuæ veræ quæ unicam accessionem habent citra exasperationem aliquam, ut omotona paragastrica & agmastrica & hæc duplices, vel à sanguinis massa æqualiter putrescente, vel ab inflammatione sanguinis citra putredinem. At veræ continuæ aliae, sunt quotidianæ à sanguine pituitoso & putrescente intra venas. Tertianæ continuæ à sanguine bilioso, vel à bile putrescente intra venas remotiores: vel Causus ex putredine bilis circa ventriculum & cor. Est & huius generis causus, quod ad pituitæ genus referemus. Est & genus febris quartanæ continuæ, cum sanguis melancholicus vel melancholia non naturalis in venis putrescit. Dicuntur autem non veræ continuæ, quia habent inclinationes aliquas post exacerbationem, nec continuè ex æquo ægrotantem molestant, ut Synochi. Omnes hæc febres sunt morbi, vel morborum symptomata, quæ & si symptomata sunt, tamen particularem aliquam desiderant euacuationem. Sol-

uuntur

nuntur enim vel sudore, vel fluxu sanguinis è naribus. Hæ autem euacuationes non soluunt inflammationes, sed febrem aut soluunt, aut remittunt, quod in plenitudine est manifestum. Nam post sudorem adhuc expuunt per aliquot dies. Rursus febres intermittentes fiunt ab humoribus non naturalibus tantum putrescentibus extra venas. Ob id tantum sunt tria genera, scilicet, genus tertianæ, quotidianæ & quartanæ. Si enim ichores sanguinis putrescant extra vasa, tertianam intermittentem faciunt. Si sanguis offendit, vel putrescit, vel assatur. Si assatur pars tenuis in bilem vertitur, & in melancholiam pars crassa. Ob id febrem facit non exquisitâ, sed implicatam & commixtam. Si autem sanguis in aliquam partem colligatur, & inflammationem pariat, febrem continuam facit, tum ob vicinitatem, tum propter continuam illam effumationem ad cor. Est autem febris continua simplex, & similes accessiones habet tertianis, quia sanguis tenuissimus in partes influere solet, tenuissimus autem sanguis naturam bilis retinet. Quare non mirum, si accessiones similes tertianis dixerit Gale. Discernitur autem à febre biliosa caloris suauitate. Nam etsi plurimus manibus tangenti sentiatur, est tamen omnino mitis, sicut is, qui in balneo contrahitur. Calor enim, qui in sanguine fit, vaporosus est, & ferè expers mordacitatis. Erunt igitur tantum tria genera intermittentium febrium simplicium. Sunt & febres compositæ, vel ex continuis, vel ex intermittentibus, & continuis simul.

De Syncho.

III

SYNCHUS febris est, verè continua, nullas exacerbationes habens, à sanguine putrefacto, vel inflammato accensa. Quia hæc febris cum aliis febribus similitudinem quandam habet, visum est hæc descriptione delineare, ut possint ab aliis distinguere. Distinguitur autem facile ab intermittentibus, cum dicimus nullam habere exacerbationem. Distinguitur & à continuis intermittentibus proportionem respondentibus. Item particula (verè continua) distinguitur à febribus prædictis, à sanguine putrefacto, vel inflammato, separat & distinguit ab ephemeris, quæ ab inflammatione spirituum, & ab hecticis, quæ ab inflammatione partium solidarum sic.

ri solent, & à putridis aliorum humorum. Quòd dicimus à sanguine inflammato, differre facimus ab omnibus febribus humoralibus. Solus enim sanguis & spiritus inflammantur, sine putredine, propter causam prius traditam, scilicet: quòd sanguis magis à natura seruetur, & sit minus excrementitius.

Cognoscuntur huiusmodi febres facile, eò quòd sanguinem tantum materiam, vel subiectum esse intelligimus. Nam statim perquirimus causas, ob quas multus in corpore nostro congregetur. Quare si præcessisse cognouerimus, febris materiam à sanguine coniiciendum. Quòd si causa aliqua, quæ sanguinem inflammare possit, ad sit, vel præcesserit, febrem certò esse scimus. Sanguis augetur vel ob bonam nutritionem, vel in his, qui sunt optima temperatura præditi, & optimis alimentis multum sanguinem gignentibus vsi sunt, qualia sunt vitelli ouorum, succus carnis, vinum, & vsus multæ carnis, casei, lactis, & alicæ. Redundat etiam sanguis ob euacuationem aliquam sanguinis intermissam, vel retentam. Nam cum illa sanguinis euacuatio non fit, nec magis exercetur, nec minus nutritur, quàm consuevit, oportet sanguinem redundare, vt in muliere, cui retenti sunt menses, aut cui non fluunt hæmorrhoides, cui non fluit sanguis è naribus vt consueuerat, aut cui mutilata est aliqua pars. Redundat Vere sanguis, ob perfectam nutritionem factam Hyeme, ob caloris naturalis robur, & in ætate florenti, & in regionibus temperatis, & non nimium frigidis, habentque plurimum calidi innati.

Inflamatur autem sanguis ob prohibitam euentilationem, & ob fumorum calidorum retentionem. Retinentur autem fumi, & non euētatur sanguis ob cutis constipationem. Cōstipatur autē ob frigus externū, ob sordes cutis, ob balnea astringentia, vel obstruentia & ob medicamēta. Qui enim natat in aquis aluminosis, vel pinguibus, vel argilosis, tunc cutis facile cōstipatur. Non euētatur sanguis ob nimiam copiam, nec non crassitiem, aut ob carnis & pinguedinis copiam. Quare si hæ causæ generantes sanguinem, & quæ eundē inflammare possint, præcessisse intelligantur, & morbus & morbi causa cognoscetur, nihil aliud spectandum, sed statim ad morbi cura-

curationem veniendum, quam colligimus ex morbi essentia, quæ contrarietatem indicat, & à causa, à qua id quod cōfert, intelligitur, vt Galen. de optima secta ad Trasib. scripsit. Essentia morbi calida & sicca refrigerandum & humectandum indicat. Et quia nullom est medicamentum quod sanguinem trahat, neq; alia est via, qua subito sanguinem redundātem in corpore nostro extrahere valeamus, necessarium est venam secare, idq; subito, ne febris ex inflammatione sanguinis in putridam vertatur. Ob id Gal. duo esse præcipua remedia huius febris, nono methodi scripsit, sanguinis missionem, & frigida potionem. Sed sanguinē mitteri vult, si vires & ætas patiantur vsque ad animi diliquiū Si autem vires & ætas dissuadeant, duabus cucurbitulis cum scarificatione humeris aut naribus apposis, illam magnam sanguinis redundantiam auferri iubet, & huiusce rei causam reddidit, quod subito in contrarium habitum corpus trahat, nihilque iucundius ægris & naturæ esse possit.

Missio sanguinis ad syncopem materiam calidam, id est, sanguinem & fumos calidos retentos subito euacuat, à quibus caliditas illa præter naturam excitata fuerat, & quia in locum sanguinis extracti, venæ multum aëris frigidi, fuga vacui, extrahunt, à quo reliquus sanguis & venæ refrigerantur, & in naturalem habitum reducitur, extinguuntur incendia, prohibetur putrefactio. Quod autem corpus refrigeretur ex magna sanguinis missione, experientia manifestum est. Calor enim tam naturalis, quam præter naturam in sanguine & spiritu fitus est, mutatur igitur in cōtrarium habitum. Nam habitus calidus in frigidiorē vertitur. Lucidum autē est, & naturæ, & ægris, quia leuantur maxima abundantia sanguinis feruidi. Verum quia periculosa est hæc subita mutatio, neque vires eorum satis perspectæ esse possunt, cum quibus antè non sumus versati, satius erit magnam sanguinis quantitatem non extrahere, & post vnā atque alteram horam, quod reliquum est, euacuare. Eadem enim utilitas sequitur. Præstaret aliquando minorem quantitatem trahere in prima illa euacuatione, quando satis certi non sumus de specie febris, aut eius magnitudine, aut cum nō licuit clysterē prius iniicere,

aut cum æger aliqua cruditatis vestigia in ventriculo habet, aut quando æger formidat magnam euacuationem, aut qui ægro adstat. Non solum in hac febre id faciendum, sed etiam in ea quæ à putredine sang. fit, trahitur sanguis vsq; ad animi defectum in vehementissimo dolore inflammationis, & in euidentissima febre, vt Gal. iubet in lib. de experimento & comment. in aph. 23. li. 1.

Facta igitur sanguinis missione pro viribus ægrotantis vel per venam basilicâ dextri vel sinistri brachij, iniiciamus clysterem, si prius non licuerit. Clyster sit emolliens, & modicè refrigerans. Nam qui nimium refrigerant, constringunt potius, quàm laxant, & hoc commune præceptum sit, in omnibus morbis, in quibus mittere sanguinem oportet, vt prius iniiciatur clyster, vel paulò post missionem, vt recrementa intestinorum detergantur: ne venæ inanitæ succum crudum, vel corruptum ad sese trahant, & in quibus aluus astricta sit per aliquot dies, vt in his quibus præcessit cibi corruptio, vel cruditas, non solum vtile est clysterem iniicere, sed vomitione, vel conueniente medicamento, id quod in ventriculo est, & intestinis, euacuare oportet. Clyster hoc modo parabitur.

℞. Maluæ, branchæ vrsinæ, viol. ana M. j. sol. lac. vel cucurbitæ, vel melonum M. ss. prunorum paria iij. seminis anisi ʒ. ij. florum cordialium p. j. furfuris p. ij. fiat decoctio, in tb. j. ss. diss. mellis viol. lohoth de cass. ana ʒ. ij. olei viol. ʒ. iij. fiat clyster.

Si aluus sit valde astricta, & facultas sit sopita, irritanda erit ʒ. j. salis communis, aut succi ciclæ ʒ. j. ss. habet vim detergendi, & quantitate nitrosa mouendi ventrem. Si diues sit, loco lohoth de cass.

℞. cass. cum saccharo ʒ. j. aut ʒ. ss. cath. vel ʒ. ij. saccharum, rub. ol. viol. & mell. viol. ponendum non rosatum propter astrictionē. Violæ refrigerant simul, & leniunt. Quo tempore non reperiuntur folia cucurbitæ & aliarum ponentur quatuor semina frigida maiora ad maiorem refrigerationem, sed hoc magis in secundis, tertiis & quartis iniectionibus, quàm in prima. Sufficit in primo clystere lenire aluum & non calfacere. Et quâquam Gal. contentus sit sua sanguinis missione ad syncopem,

& po-

& potione aquæ frigida, nos in eiusmodi febre solemus caloris incendium extinguere syr. conditis, & aliis multis remediis. Syrupi autem dentur, qui habent vim refrigerandi. Sed ex his alij id faciunt leniendo, alij cōstringēdo, alij incidendo, alij incrassando. Itaq; syr. delectum facere oportet. Deligitur syr. qui ægrotantis dispositionibus magis conueniet. Nam non omnes ægrotantes, neque vnus & idem æger eodem modo afficitur. Sunt enim, quibus aluus liberius fluit & illis iulep. Alexandrinus, & conserua ros. aut syr. capil. ven. conueniunt, syr. viol. syr. de cucurbita non cōueniunt, quia ventrem leniūt, neque his, qui bilem multam vomitione reiiciunt, vt frequenter in hac febre accidere scribit Gal. 9. meth.

Qui autem sanguinem habent vitiatum, facile in febrem putridam incidunt, quod ne fiat, syrupos putredini resistentes damus, vt syr. de acerositate citri, de limonibus, de granatis, oxyfaccharum simplicem. Hi nanq; omnes refrigerant, & putredinem arcent. Quod si æger ad bilem propensus sit, aut multis recrementis abūdet, syrupum de endiuia, de fumo terræ simplicem, quia serosa recrementa euacuat, damus. Istis syrupis & aquis similibus, potiones matutinas paramus, quas improprie digestiuas dicimus. Sunt enim alteratiuæ, & prohibentes putredinem manēte substantia. Sunt quibus præstat sanguinem crassiores attenuare, leuiter incidentibus, aut acidis syrupis, qui refrigerando etiam incidunt. Sunt è contra, qui sanguinem tenuissimum habent, quem incrassare refrigerando expedit, non tamen vsque adeo, vt fluxus sanguinis è naribus impediatur. Tracto sanguine, prima die nullo præcedēte clystere, vel minoratiuo, si cognoscamus morbum posse protrahi vsq; ad septimum diem, damus medicamentum purgans ad serosa & biliosa recrementa euacuanda, quæ solent hanc febrem in putridam transmutare. Sunt autem talia medicamenta, quæ citra calfactionem, & humorum conturbationem aluum laxare possunt. Triphera persica, cath. infusio rhab. in aqua endiuia, decoctum pulpæ sebestem & tamarind. syr. ros. laxatiuus, aut syr. ex infusionibus multis violarum, cass. cum sem. berberis, aut aliis quæ acrimoniam eius extinguunt, aut prohibent transmutatio-

nem in bilem. Omnium istorum dosis est ab ʒ. j. ad ʒ. j. ḡ. vel ʒ. ij. cass. verò ab ʒ. j. ad ʒ. x. rhei. ad ʒ. j. ḡ. Sufficit hæc quantitas, quia materia euacuanda non multum distat ab intestinis.

Quòd si medicus tertio demum die, vel quarto vocatus fuerit, id tentare non debet, sed potius naturæ committere. Non tamen debet (si vires ferant) sanguinis missionem prætermittere, vt docet Gal. lib. de Curandi rat. per sang. mission. & 9 meth. in hunc modum scribens, maxima verò continentium febrium remedia hæc duo sunt, sanguinis missio, & aquæ frigidæ potio. Verum illa nullo non tempore, modò vires sustineant. Harum enim & in pulsu, & in vrinis, & in concoctione euidentes cernuntur notæ. Febris autem est maxima. Quòd si in die critica signa concoctionis manifesta præcesserint, notæ fluxionis sanguinis, vel sudoris iam appareant, silentium satius est habere, & naturæ totum negotium committere.

Quòd si nulla signa concoctionis appareant, aut appareant futuræ criseos aliquæ notæ, satius etiam erit naturæ relinquare, quia moriturus est, & Hipp. iubet morituros solis prognosticis relinquendos. Quòd si nullæ notæ alicuius criseos, siue bonæ, siue malæ appareant & morbus in diés augeatur, viresque ferre possunt, sanguinem mittere oportet, in minori tamen quantitate, quam in primis diebus, propter vires imbecilliores.

Nam quicumque ab hac febre euaserunt propter sanguinis missionem, vel propter sanguinis fluxum è naribus factum, liberati sunt, vt Gal. lib. 9. meth. scriptum reliquit. Quare non est prætermittendum illud certum & tam præsens remedium, quod materiam simul & intemperiem aufert. Cæterum quæ medicamenta diximus danda esse post sanguinis missionem, si cognoscamus morbum protrahi posse vsque ad septimum diem, qualia sunt triphera persica, ea, inquam, dilui debet, vel in aqua, vel in aquis vel in decoctione. Multò enim facilius descendunt medicamenta liquida, & minus remorantur in ventriculo, quam si in forma solida assumantur, nisi æger propensius sit ad vomitum, tum satius erit dare in forma boli, Decoctum autem magis laudandum,

dum, quàm aquæ distillatæ : decoctione enim determinantur medicamenta vel ad humorem, vel ad temperamentum. vt si quis daturus sit rhabarbarum, quod & calefacit, & contrahit in hac sequenti decoctione datum, minime id efficiet. Nā in decocto, quæ possunt eius caliditatem obtundere damus, vel quæ augent, si quando opus fuerit, vt exempli gratia hæc decoctio caliditatem etiam laxando minuet, obstructions internas aperiet, & ventrem leniet.

℞. Prunorum, sebestem ana paria iiii. semi. frig. maiorum contusorum ana 3. iij. anisi drac. j. tamarindorum 3. j. florū trium cord. ana p. j. fiat decoctio. In quarario vno coll. dissol. syr. viol. 3. j. Hæc decoctio per se ventrem lenit, & acrimoniam sanguinis & bilis extinguit. Quod si maiori euacuatione opus fuerit syr. ros. laxatiuum ad 3. ij. ponemus. Quod si diues sit, minuemus quantitatem syr. laxatiui, & 3. vnam rhei infusi in decoctione vel aqua endiuiz imperabimus. Hæc omnia ferrosa recrementa & biliosa liquida euacuant. Potuissimè addere in decoctione iuiubas, sed illæ nimium incrasant. Satius enim est vel ante, ad humoris præparationem, vel post, si humor nimia tenuitate peccauerit, decoctum iuiubarū & similium administrare : quia hic morbus est acutus, & extremos habet labores, statim tenuissimo victu vtendum est, ob id interdicemus vsu vini, carnis, & aliorum alimentorum, quæ multum sanguinis generant & corpus calfaciūt, ob id aquam pro vino damus, aut vinum malorum granatorum, aut iulepum Alexandrinum, pruna cocta, acida poma, præterea cocta. Concedimus cremorem hordei paratum ex paucis saccha. ros. decoctum herbarum refrigerantium, vel lactucæ, portulacæ. Denique victus ratio esto tenuissima. Quod si vires vtrunque imbecilliores talem victus rationem ferre nō possunt, decoctum pulli aut coxæ capi, vel gallinæ, cum lactuca, vel borragine, vel portulaca, aut seminibus frigidis, si herbe non reperiantur, concedimus. Vti etiam potest lacte amygd. dulc. maceratarum in aqua frigida & aqua rosa. cum emulsione quatuor seminum frigid. maiorum, ne in bilem vertantur.

Quod si recentes essent, minus verterentur in bilem.

Est autem hoc lac dandum præcipuè his, qui dormire noctu non possunt, ut caput repleat fumis & vaporibus. Conceduntur cucurbitulæ conditæ, lactucæ, stolones conditi saccharo, pyra condita, pauperibus etiam recentia cocta. Vinum dandum non est, nisi signa concoctionis appareant, aut dolor capitis aut delirium prohibeat, nisi ad symptomatis mitigationem, ut ad syncope. Et cum dandum erit, illud sit tenue, album, dilutum multa aqua. Medicus proinde ex magnitudine & vehementia morbi longitudinem poterit cognoscere, & viribus ægri exactè perpensis cogitabit num cum tali victu æger perdurare possit usque ad statum. Sed hoc semper in memoria habeat, morbos esse eò breviores, quò acutiores: diuturniores verò, quò mitiores, & quò minus celeriter moventur, minusque gravia symptomata habent, ob id victus rationem instituet convenientem morbo, ætati, & consuetudini.

Et quoniã huius febris præstantissima remedia duo esse superius diximus, scilicet sanguinis missionem, & frigida portionem, hic nonnulla de huius usu dicendum, cum & ad victus rationem pertinet, de illa verò superius satis diximus. Docebimus igitur quænam aqua, qualis, quanta, & quomodo danda sit, & propter quam causam detur, & quibus danda non sit. Sunt enim nostro tempore Medici quidam *psycrophobi*, id est, frigida exhibendæ formidantes, quod putet omnes aqua frigida lædi. Datur autem frigida dulcis, quæ prorsus sit gelida, & quantum bibere ægro licet, postquam coctionis signa manifesta apparuerint in urinis, & febris est remissior non alio tempore. Danda non est his, qui crassos & lētos humores habent, qui obstructions, qui phlegmonem, aut erysipelas, aut scirrhum, aut œdema in visceribus habent. Item, qui gulam & ventriculum, aut nervorū genus debilia habent. His frigida non est offerenda, sed his tantum, qui febre laborant ob cutis obstructions, & putredinem sanguinis in omnibus venis, saltem maioribus. Cum ergo coctionis humorum in his notas videris, audacter frigida dabis: quippe solidarum animalis partium natura roborata, prætenuatos iã humores aggreditur, ita ut qui viles sint, ad nutriendum habiles,

habiles, hos quidem ad se trahat, inutiles verò per ventrem & cutim deliciat. Quòd si etiam frigida affuetus fuerit, magna cum fiducia frigidam exhibebis, scilicet, experientia iam doctus, omnia viscera eius occursum familiariter tolerare. Nonnulli, qui potui frigida non sunt affueti, propter ardentem febrem bibere coacti, nullum incommodum senserunt, multò profectò minùs eorum, qui assuenerunt, quispian lædi debet, etiam quasi ex *epimetroy*, & actuarij vice ipsa caloris copia accedit. Læduntur autem aqua frigida, qui parum sanguinis, & parum carnis habent, quia celeriter ad solidas animalis partes peruenit, nulli, quod eius vim trangat, occurrens. Eo etiam fit, vt hæcticæ febres, nec multam desiderent frigidam. Ex his omnibus satis manifestum est, quæ, qualis, quanta, & quibus danda sit frigida. Quæret forsàn aliquis rationem, cur aqua frigidissima præstantissimum sit remedium harum febrium: febribus verò, quæ ex inflammationibus viscerum fiunt, aduersissima. Nonnulli ad concoctionem materiæ dari putant, quod falsum est. Nam si ad materiæ concoctionem danda esset, illà possemus dare, antequam notæ concoctionis apparerent. Eo siquidem tempore danda sunt medicamenta, quæ concoquunt, non post concoctionem, vt medici præcipiunt. Dicemus autem id fieri ad partium solidarum refrigerationem, & concoctionem, & roborationem, vt verba Galeni superius citata docent, cum dicit, Cum ergo concoctionis notas in his videris, de quibus dictum est abundè in libris de crilibus, audacter frigidam dabis. Quippe solidarum animalis partium natura roborata, datur & ad materiæ inutilis vacationem. Quòd autem ad euacuationem detur, quæ sequuntur, docent. Præternatos humores aggreditur, ita vt qui vtilis sunt, hos ad se trahat inutiles, vel per ventrem, vel per cutim eiciat. Illud confirmat quod scriptum est, paulò ante libr. 9. meth. de incommodis aquæ frigida, vel intempestiuè, vel immodicè exhibitæ. Porro incommoda, quæ frigidam potionem intempestiuè, immodicèque exhibitam sequuntur, in his consistunt, quòd lentos crassosque humores, siue hi obstructiones, siue putredinem, siue phlegmonem, siue quis erysipelate, aut scirrho, aut œdemate est

affectus, excitauerint, digeri prohibeat. Ergo quoties febris ex his accenditur, atque ad eos euacuandos frigida data, non conducit, ad præsens quidem non paruum adfert leuamen, propterea quòd accēsam iam febrem extinguit. Verum quòd causa eius adhuc perstet, aliam denuò accendi est necesse, nonnunquam difficiliorem; propterea quòd densum ex frigida corpus est. Huius rei certissimam dat fidem experientia. Videmus enim in dies post largam aquæ frigidaë potionem sudores à toto corpore prorumpere, & recrementa per ventrem expurgari, nō solum in hac febre, sed etiam in accessionibus febrium intermittentium. Potionem aquæ frigidaë post concoctionem materiae, præsertim in declinatione, sudores mouere experiuntur, & febrem extinguere. In principio autem refrigeraret, incrassaret & nullā utilitatem præstaret: quia nullam euacuationem faceret. Mouet autem sudores densatis partibus interioribus, & solidis corroboratis. Partes enim solidæ humectatæ & refrigeratæ quandam faciunt humiditatem, aut vaporem ad ambitum emittunt, ex quo sudor fit: aut vaporem retentum in ambitu corporis extra propellunt, vel vt partes superiores ventriculi constrictæ, recrementa deorsum propellunt: sic venæ maiores aqua frigida compressæ, ad minores venas fumos & recrementa propellunt. In febribus cum inflammatione non conuenit, propterea quòd digestionem, & euacuationem prohibet. Nam si inflammatio vel erysipelas sit in hepate, vel splene per secessum, vel per vrinas, materiam expurgari est necesse per meatus illos strictos, qui strictiores sunt potiones aquæ frigidaë. Vt ergo aquæ frigidaë potione commodè vtamur, danda est opera, vt partes inflammatione obsessas, aut tumore aliquo distentas exactè cognoscamus, vt aquam frigidam his, qui citra inflammationem febricitant, demus, aliis verò minimè. Est quoque utilis hæc dignotio ad sanguinis missionem faciendam. Nam si citra tumorem & inflammationem febris fiat, nihil refert à qua parte trahatur sanguis: Sin inflammatio sit in hepate, à parte dextra. Si in splene, à sinistra, vt euentatio fiat secundum rectitudinem.

Partes autem affectæ cognoscuntur ex tumoribus, doloribus, excretis, & functione læsa, ut Gal. lib. de locis affect. docet, ex quo loco require, si veis. Hactenus de aquæ portione. Porro cum hæc febris sit ex earum numero, quæ symptomata habent grauiora, horum ratione aliquid faciendum. Sunt autem symptomata grauiora, quæ febrem sequuntur, dolor capitis, itis vehemens, delirium, vigiliæ, & in quibusdam somnus profundus. Dolor capitis mitigatur oxýrrhodino, ol. viol. nenuphari. lacte muliebri recenter emissio, & aliis refrigerantibus. Iisdem remediis vtitur in superflua vigilia, hoc tantum nomine differunt, quod quæ ad somnum conciliandum sunt, minùs ætè recipere debent. Quia acetum vigilias inducit. Iisdem remediis admiscetur albumen oui fortiter agitarum, quod quia suo lentore nimium obstruit, ob id priore vtendum, nisi cum acida medicamenta, ut pulueres, sunt adhibenda. Isthis remediis refrigerantibus, vel ad dolorem capitis, vel ad somnum conciliandum, non est vtendum ex qualibet causa: propterea quod hæc medicamenta repellunt à capite, & fortiter repellendo eruptionem sanguinis per nares impediunt. Quam ob causam si dolor sexto die oboriatur, præcedentibus signis concoctionis, hypochondriis tensis, facie tota rubescente, venis circa caput distentis, & arteriis multum pulsantibus, non est vtendum istis refrigerantibus supra caput, neque syrupo de papauere, ne fluxus sanguinis è naribus (qui solet has febres magna ex parte terminare) impediatur. Tunc enim satius erit expedire diem sequentem, in quo iam natura cœpit expellere materiam. Quod autem talia medicamenta possint crism impedire, lippis & tonsoribus manifestum est. Sedabitur ergo dolor, & conciliabitur somnus, si pars anterior capitis, illis oleis perfundatur, vel detur lac amygdalarum dulcium, ut supra dictum est, quod potest somnum conciliare, & impetum sanguinis non impedire, sed potius iuuare.

Sitis & portionibus & inspirationibus aeris frigidi, sedatur. Inter omnes syrupos violaceus principatù obtinet, quia refrigerat & humectat. Idem præstat cōserua violarum, iulep. ex violarum aqua, Alexandrinum, & si-

miles syrupi, qui refrigerant & humectant, qui amari non sunt, sed palato grati.

Si æger ventriculum habeat imbecillum, tunc condita paramus, quibus cum aqua vtatur. Parantur autem ex conferuis frigidis & humidis, vt ex conferuis violarum, nymphæe, florum borraginis, buglossi, quia humide sunt, & caloris temperati. Quod si aliæ conferuæ ponantur, id fiet propter aliquod aliud symptoma. Sed hoc potissimum obseruare oportet in delectu harum conferuarum, vt palato gratæ sint, veluti quæ neque nimium odoratæ sunt, neque saporem nimium medicamentosum habent. Conferua florum cichorii, quia amara est, reicienda. Solemus aliquid puluerum cordialium admiscere, vt puluerem diatragacanthi frig. vt eos, qui neque nimium amari, neque nimium odorati sunt, neque nimium siccant, aut constringunt, vt puluis triasandali, vel puluis diarrhodum abb. vel puluis diamargaritici frig. Saccharum rosarum tabellarum additur in magna quantitate. Horum autem medicamentorum paradigma tale est. Si ventre sit nimium laxo, fiat ex conferua ros. in maiori quantitate, ex conferua buglossi. vel borrag. in minori, vt

R. conferuæ ros. 3. ij. buglossi 3. β. puluer. triasand. & diatragacanthi frigidi ana 3. β. sacchari ros. tabulati ad duplum pondus omnium. Hoc modo gratius quidem fiet conditum. Efficacius verò, si addatur 3. j. pul. pro 3. j. sacchari. Si autem non sit ventre laxato, damus ea, quæ magis humectant, vt facit conferua violarum cum pauca quantitate puluerum: quia pulueres fere omnes videntur resiccare, vt

R. conf. viol. 3. ij. confer. borrag. & nenuph. ana 3. β. pul. diatrag. frig. 3. j. sacch. quantum suffi. fiat conditum. Damus cochlear vnum conditi humectari aqua frig. postea syr. diluti aqua, vel aquæ frigidæ cyathum vnum. Alij condita miscent aquæ, & sine syr. bibunt. Humectant autem aqua, quia propter linguæ & oris ariditatem quandoque deuorare non possunt, quandoque propter siccitatem oris, trachiæ arteriæ, aliarumque partium frequentius bibere cupiunt, propter quam occasionem illis conceditur frequens oris ablusio, cum aqua frigi-

frigida, additis aliquot guttis vini albi, vel paulo aceto. Dantur pruna, cerasa exsiccata, & in aqua macerata, vel poma in taleolas diuisa ad oris humectationē. Propter illam summam siccitatem redditur acida & scabra lingua: ad cuius asperitatem tale remedium conficitur.

R. mucilaginis semin. psilij nigri, vel cydoniorum extractæ in aqua ros. vel viol. 3. ss. sacch. parum, fiat ad formam lothoth, teneat sæpe in ore. Idem potest fieri ex mucilag. gummi tragacan. vel arabici. Assumuntur ista post absolutam oris ablutionem, & lingue deterfionem. Delirium fit & phrenitis, curaturque iisdem remediis, scilicet repellentibus à capite in principio. Sufficiunt autem repellentia ea, quæ ad dolorem capitis præscripsimus, & ista solent sufficere ad curationem delirij, quod à fumis tantum sursum elatis fieri consuevit. Ad phrenitidem verò curandam, reuulsione opus est, quia est inflammatio inuolucrorum cerebri, quæ per defluxionem fit, vt omnis inflammatio fieri solet. Fit autem reuulsio sanguinis missione facta per venas cephalicas, si vires & ætas cōsentiant. Et si per illas totum non liceat emittere sanguinem, cucurbitulas apponemus, reuulsionis causa, in partibus internis coxarum, & ad deriuationem collo, potius quàm omoplati, vt vulgus medicorum facit. Sunt autem ponendæ supra ramos venarum, aut saltem propè, quia retractio debet fieri per magnas venas, non per capillares, per quas non potest fieri magna sanguinis euacuatio in his, qui abundant sanguine. Scarificatio faciendæ est post applicationem, vt sanguis ille attractus exeat, & inflammationem non pariat in parte scarificata. Et ob id rursus applicantur cucurbitulæ post scarificationem cum paruo igne, & citius auferruntur. In scarificatione autem faciendæ animaduertendum est, ne fiat supra magnas venas, neque nimium profunda, ne venæ magnæ aperiantur. In quibus magna limetur debilitas ob sanguinis missionem, vtendum est cucurbitulis sine scarificatione, aut strictis ligaturis dolorem inferentibus. Clysteres erunt acres & pungentes sine calfactione magna, ob id nō probo vsum benedictæ, neque hierę picrę, quia nimium calfaciūt, & resiccant. Satis erit clysteri præscripto augere quantita-

tem succi ciclæ, vel addere succum mercur. Quòd si co-
gamur fortiùs humores retrahere ad partem inferioré,
facius erit decoquere aliqua medicamenta simplicia, al-
uum laxantia in nodulo ligata, vnà cum herb. frig. & hu-
midis, quibus castigabitur nimia illa siccitas: nam minùs
siccant ista, quàm còposita medicamenta ex istis & odo-
ratis, qualis est benedictæ còpositio, quæ esulam, aga-
ricum, & alia medicamenta recipit. Sic parabitur clyster.

R. decoct. clyst. præceden lb. j. β. cui adde parietariæ,
mercur. ana M. j. agarici in panno raro ligati ʒ. j. vel ʒ. ij.
& in lb. j collaturę dissolue mellis viol. & succi ciclę an.
ʒ. ij. ol. vio ʒ. iij. misce, fiat clyst. Addi potest succus mer-
cur. loco succi ciclę, vel singulorum ʒ. j. Idem clyster vi-
lis erit in somno prouocãdo. Si phrenitis perseueret, nec
repellatur, tunc ad topica remedia veniẽdum erit, scili-
cet, à repellentibus ad digerendum, sed per media, vt in
illis tumoribus præter naturam facere solemus, in quo-
rum incremento, & status principio digerentia repellẽ-
tibus admiscemus, pro ratione digerendæ materiæ vel
impactæ. Quòd si maior sit materiæ copia collectæ,
quàm fluentis, plus digerimus, si autẽ plus affluat, quàm
sit receptum, repellentia digerentibus prævalent. Quò
autem clariùs hæc intelligantur, exempla proponam, si
priùs admonuero partem affectam duobus modis posse
còsiderari, vel vt partem principem, vel vt partem sitam
in profunda parte, carne coopertã, ob cuius situm, quæ
fortiùs digerunt, vel refrigerant, vel penetrant, vsurpan-
tur, vt acetum, mandragora, papauer, hyosquiamus, ca-
storeum, spòdium. Hæc autem sunt extrema remedia,
propter cuius partis facultatem omnia, quæ vehemen-
tia sunt, reicienda erunt. Pars enim princeps non potest
ferre citra noxam supra modum resoluentem. Est siqui-
dem caloris naturalis robur còseruare. Sed vtimur mo-
deratis in principio, postea fortioribus, vltimo loco ve-
hementissimis. Moderata sunt, quæ conficiuntur ex ol.
ros. omphacino & aceto, oleo hienupharino, ol. vio. de se-
mine lactucæ. Fortiora præparantur ex oleo de papauere,
de semine papaueris, & aliis frigidioribus. Vehemen-
tissima ex opio, mandragora, hyosquiamo & similibus.
Remedia vel in forma liquida, vel in forma sicca exhi-
bentur.

bentur. In forma liquida, vt oleis supradictis. Id principio, statu, & declinatione, & semper additur acetum ad penetrationem aliorum medicamentorum, vel sunt decoctiones ad embrocationes faciendas ex alto & ad repellendum & digerendum. Ad repellendum sic.

℞. lactuæ M j fol. salicis M. j. florum ros. viol. & nenuph. an. p. j. fiat decoctio. Quandoque addimus semen papaueris albi, vt fortius sit remedium. Quod si radices mandragoræ, aut semina hyosquiami, aut papaueris nigri addideris, extremum erit.

Hac embrocatione vtimur in delirio, phrenitide, & superfluis vigiliis. Quod si primæ descriptioni adiiciantur flores stechados, & rorismarini, vel chamomillæ, vel saluæ, repellit simul & digerit. Quod si ex hac decoctione detrahantur aliqua infrigidantia, & augeantur calefacientia, medicamentum erit fortius, & digerens. Sin in totum auferantur repellentia, & addantur aliquæ herbæ aut radices calfacientes magis, & digerentes, fortissimum erit, veluti si radices iridis, spondilij, calami aromatici, aliorumque odoratorum addantur.

Hoc remedio tantum in declinatione phrenitidis vtendum, & in augmento, & in statu lethargi, aut somni profundi, aut aliarum affectionum cerebri frigidarum. In forma sicca cōficiuntur pulueres, quibus inspergitur caput, vel cū albumine oui excipiuntur, & fronti applicantur, vt

℞. ros. rub. viol. nenuphar. an. ʒ. ij. seminis lactuæ ʒ. iij. misce, fiat puluis.

℞. seminis papaueris albi & nigri an. ʒ. ij. addantur supradictæ, & inspergatur caput, vel excipiantur albumine oui, & applicentur fronti. Vel solemus perfundere caput oxyrrhodino, deinde inspergimus pulueres. Vel in statu & declinatione pipionem, vel catulam capiti apponimus post insersionem puluerum digerētium & resoluentium Puluis talis erit.

℞. rad. iridis, calami aromatici ana ʒ. j. garyoph. ʒ. ʒ. sandal. omnium ʒ. j. florum camomillæ, anthos, & stech. an. ʒ. ʒ. misc. fiat pulu. Inspergatur caput. Postea superponatur catulus aut pulmo veruecis, aut pullus gallinaeus. Si hic vltimus pulu. misceatur primo, sit medicamentum medium, quo vtuntur in statu.

IV

*De Syncho putri.**Metb. lib.
lib.4.*

HÆc febris oritur à sanguine, sed qui manifestæ putredinis indicia præbet. Quare, à non putri distinguitur, magnitudine & vehementia. Nam propter putredinem calor increfcit, & acrior redditur multò. In curatione primas tenet venæ sectio. Sanguis igitur sine mora detrahendus est, copiosior, quàm in altera syncho, vt inhibeatur putredo, & calor ex ea contractus extinguatur. Gal phlebotomiam celebrat, quæ fit ad animi deliquium, sed genus hoc remedij cœpit iampridem esse suspectum, neque enim tantum commodi habet, quantum periculi: cuius rei fidem facit ipsa experientia, & quorundâ tristis exitus, qui cùm ex multi sanguinis euacuatione, animo defecissent, nunquam postea reuocari, aut ad sese redire potuerunt. Quo quidem casu nonnulli medici, alioqui celebres, in summû dedecus inciderût. Quapropter illa vacuandi ratio vt temeraria, & periculo plena, ita nunc meritò damnatur. Longè igitur tutius est, quod à peritissimis Medicis præcipi solet hodie, venæ sectionem repetere, vel paulatim, & per interualla sanguinis tantum auferre, quantum ægri conditio, morbiq; status exiuit, & ægri robur. A phlebotomia statim vel paulò ante, alius emollienda est clystere superscripto. Postridie leui quodam medicamento, vt bolo ex cassi. vel catholico minuenda materia. Tunc exhibendi sunt syr. qui putredinem prohibeant, cuiusmodi sunt syr. de acetositate citri, de limonibus, de berberis, de acetosa, & aliis id genus: quibus miscendæ sunt aquæ refrigerantes, & putredinem arcetes, vt aquæ acetosæ, ros. & iisdem syr. nenuphar. de cichoreo, endiuia ad sitim leniendam vti commodè possumus. Quartus dies diligenter obseruandus est, nam si materia manifestæ coctionis futuræ, & crisis indicia præbeat, sperandum est, vt die septimo morbus iudicetur. Tunc enim materiæ morbum facientis, quâta maximè vi poterit, euacuationem aggredietur natura. Fiunt autem excretiones, hæmorrhagia, alui profluvio, vomitu, copiosis vrinis, sudoribus. Harum excretionum notæ, ex Galeno, & aliis peti possunt, quocirca memoria teneri oportet, vt qualis, & per quam viam crisis fieri debeat intelligamus. Cæterum crisis, quæ die septimo solet

solet accidere, non dubiam spem salutis ostendit. Quòd si die sexto accidit, etiam si coctionis signa præcesserint, ea tamen infida semper est. & imperfecta. Nam vel recidiuam facit, vel ægrum iugulat. Sed magis exitialis est, & mortem præsentem ostendit, si ante coctionis signa acciderit. Nonnunquam huius febris initio, ventris fluor oboritur, qui si magnus est, & copiosus, vires ita dissoluit, vt postea coquendo morbo sint impares.

Quòd si alui fluor fiat à multitudine materiæ, nec diutius perseueret, morbum facit breuiorem. Si verò à maligna prauaque materia excitetur, subito interimit. Soluitur quandoque hæc maculis quibusdam purpureis in ambitu corporis erupentibus, quæ si die critico post signa coctionis appareant, certam salutem, aliàs mortem portendunt. Hæc igitur nobis summa attentione consideranda sunt, vt temeritatis & ignorantie suspicionem careamus. Porro habenda imprimis ratio virium, ne deficient. In hunc vsum variae remediorum formæ institui solent à Medicis, sed nullis frequentius vtuntur, quàm conditis, quibus vires instaurant, cor muniunt, sitim temperant. Sint autem condita iucundo, quoad licet, sapore, vt his tum facilius vtantur ægri, tum libentius. Quibus in febribus & præsertim acutis sic solet esse deiecta appetentia, vt omnia ferè, ac præsertim parùm grata fastidiant, ac deiciant. Itaque ineptè faciunt, qui maiori mensura, quàm par sit, conditis conseruas miscent amaras, pulueres valde odoratas, qui sapore quodam medicamentofo displicent. His enim vel non vtendum, vel parçè admodum, addito etiam multo saccharo, vt sapor insuauis, & odiosus tegatur, ne gustum offendant, vt,

R. conf. rad. bug. (quæ idcirco omnibus conditijs misceri potest, quod sit temperata) ʒ. ss. Cõseruæ capil. ven. (quæ vires restaurat & corroborat) & acetosæ ana ʒ ij. pul. diamargariti frigid. ʒ j. pul. diatrageanthi frigid. ʒ. ss. sacchari ros. tabulati quart. ss. fiat conditum. Conseruæ capil. ven. & cichorij pondus exiguum esse oportet, quòd altera propter amarorè ingrata sit, altera propter siccitatem non faciliè alteretur. Saccharum ros. in febribus vtilius est, quod non ita faciliè in bilem vertitur. Præterea in hoc condito modus sacchari augeatur, vt con-

feruæ cichorij amaritudo muniatur. Quod sequitur, proderit, vbi alius nimis fluit, vel ventriculus propter laxitatem est imbecillior.

R. conf. ros. 3. j. nymphae & florū bugl. capil. ven. an. 3. j. pul. diamarg. frigid. & triasand. an. 3. β. coral rub. in tenuissimum puluerem redacti 3. j. β. sacch. ros. tabulati, quantum sufficit. Hic exiguo saccharo est opus, quia nulla conserua, nec pul. ingratus ponitur, vt pul. de corde cerui vel bouis, fragmentorum lapidum preciosorum, & similibus, quibus maximè vtitur in delicatis, & morosis hominibus, quia omnia medicamenta sapore prædita respuunt, & aspernantur. Conuenit autem horum vsus, cum roborandum & desiccandum est citra calorem. Sequens conditum alium humectat & lubricat.

R. conf. vio. 3. j. conf. florū bugl. 3. β. pul. diamargaritū frigidi, vel diarrhod. abb. 3. j. sacch. q. β. Non debent condita multū soluere, alioquin non roborarēt. Pro delicatis.

R. conf. rad. borrag. bugl. an. 3. β. pul. margarit. non perforatarum 3. j. coralli, si sit restringendum, 3. β. cristalli, si sit ref. igerādum, tantundem, ossis de corde cerui vel bouis 3. j. sacchari quantum sufficit, fiat cōditum.

R. myrob. conditorum numero viij. carnis cydoniorum conditæ saccharo 3. j. conser. ros. 3. ij. corall. rub. 3. j. β. pul. diamargaritonis frig. 3. j. sacchari ros. tabulati q. s. Possunt addi trochisci constringentes, vt de spodio, de terra sigillata, & similes. Sed quia sunt iniucundi saporis, præstat eos miscere pilulis, vel opiatis. Hæc opiata utilis est in magnis alui fluoribus, à quib. periculum est, ne vires omnino labefactentur, aliàs non licet vti multum astringentibus, quia críticas excretiones impedit.

VD

De Causo.

Causus duplex est, Alter à bile, vel sanguine biliolo putrescente in magnis vasis cordi. & ventriculo proximis: Alter à pituita salsa nascitur, & sub finem Autumni, vel Hyemis frequentius accidit, præsertim post multos & graues labores, post multas inedia, medicamenta calida & sicca, ac alimenta, aliàsque deniq; causas, quæ humores etiam frigidos accendere possunt.

In curatione primum videndum est, an conueniat phlebotomia, & cōuenit maximè, si febris sequatur inflammationem.

Inflammationem partis internæ, si plethora adsit, & cætera consentiant. Alioquin non temere secunda vena, ne separatò sanguine bilis excandescat. Ex medicamentis eligi debent cholagoga mitiora, & quæ bilis acrimoniam obtundant, vt cassia extracta vel cum decoctione semin. berberis, vel mixta cū decocto tamarindorum, & sebesten. Vt autem sit facilior purgatio, clyster prius supponatur. Vtilis est hæc potio.

℞. prunorum, sebesten ana nume. x. tamarindorum 3 j. quatuor seminum frigid. maiorum ana 3. j. florum cor. p. j. fiat decoctio in aqua vio. vel endiuæ & in 3. iiij. colaturæ diss. syr. ros. laxatiui 3. ij. fiat potio. Addatur interdum 3 ℞. syr. viol. Potest dari bolus ex catholico vel diaprunis simpl. Quod si imbecilliora videantur, vel quod aluus sit nimis astricta, vel quod æger leuioribus medicamentis non facile moueatur, adiaci potest 3. j. diaprunis sol. vt elect. de succo ros. Nisi enim medicamento aluus soluat, plus nocet quàm profit. Ab usu calidi medicamenti (qualia sunt prædicta) præderit exhibere postridie 3. ij. syr. viol. cum decocto hordei, vel lactucæ, vel alterius herbæ, cui par facultas insit, vt vestigia caloris auferantur. Sciendum verò in his febribus ardentibus, & aliis, in quibus ante quartam diem non est missus sanguis, plus conducere, vt aliquid è materia morbum committente detrahatur. Sic enim materiam reliquam natura facilius cōcoquit. Sed hoc potissimum debet fieri, cum bona pars materiæ in ventriculo, & circavias cōmunes continetur. Ea nanq; tunc turgere dicitur. Materiæ in dictis partib. contentæ signa sunt, sitis, ardor, morsus ventriculi, vomitus biliosus, qui sæpè initio huius febris accedit, eamq; breuiorē, & faciliorē curatu reddit. Vulgus Medicorū temere rheum, & myrob. usurpat, cum hæc biliosis morbis sint aduersissima, nisi vi astrictoria, quā habent spoliētur. Vt si coquatur rhab. in aqua endiuæ vel in eadē maceretur, & leuiter exprimatur misceaturq; aliis detergentibus ac lenientibus, & sic præparato non incōmodè licebit vti. His etiā minus cōuenit māna, quæ in bilem facile vertitur, cum mellis naturā referat. Cassia verò, etsi dulcis sit, tamē propterea quod humida est, habetque aliquantulum saporis acidi,

*Rhabarb.
biliosis
feb. contra
rium.*

non est contemnenda, præsertim si extrahatur ea ratione, quam diximus. Ad alterationē, antiqui frigida aqua utebantur, nos verò attenuantes syr. præscribimus, cuiusmodi sunt de nymphæa, viol. de acetositate citri, de limonibus, de endiuia, de granatis, de agresta, de acetosa, de berberis. Ex his magis idonei & conuenientes naturæ & symptomatibus eligantur. Vt in delirio, semitur syr. de nenuphare, de papauere. In spirationis difficultate, syr. viol. præferatur. Si verò nullū symptoma vrgeat, sine distinctione prædictis syru. vti permittitur. Habendus est similiter delectus aquarū quibus syrupi diluuntur. His rectè institutis, crisis expectanda est, videndum quo excretionis genere, & qua via fieri debeat, ne quid à nobis tentetur, vnde naturæ impetus impediri possit, cui potius suppetias ferre æquū est, si fortè propter imbecillitatem tardius moueatur. Sub finem septimi diei solet rigor accidere, qui si natura & vires valeant, & præcefferint signa coctionis, & sequatur fodor, morbum finit, aliàs perniciosus est. In magna virium imbecillitate præscribi solent à Medicis restaurantia vulgò dicta, sed in his parandis multi aberrant. Quidam distillata seruant parata citra vllam vtilitatem: quando hæc facile corrumpuntur. Alij ex contusis carnibus testamētaria solida parant, sed hæc non conueniunt in morbis acutis, in quibus liquidiora, & coctu facilia dare conuenit, vt vires facilius reficiantur. Nonnulli in vase duplici eadem restaurantia parant, idq; rectè, sed hoc reprehendi debet quod carnes crudas pulueribus permiscēt, & simul decoquant. Nā prius puluerū vis euanescit, quam caro cocta sit. Sic igitur commodius restaurantia parari possant. Sumatur decoctum gallinæ, pullivæ, vel fasiani, & huic aquæ cōseruæ ros pulueres misceantur, atque hæc omnia simul in vase duplici bene obstruētō leuiter coquantur.

Vtiles cōseruæ, quæ cordi robur addunt, & vitium humorum castigant, vt cōserua ros. nenuph. bugloss. viol. acetosæ. Pulueres conueniunt, vt diamargariti frigid. de gemmis, diarrh. abb. triasandalo. diacamerum, confectio alchermes. Ex his eligendi sunt minùs calidi. Gratiores verò minimo pondere miscendi sunt, & aliquo frigido corrigendi. In horum omnium delectu obser-

obseruandum est, quod suprà meminimus, in syr. Sed imprimis habenda est ratio virium & symptomatum, quæ circa statum solent esse valentiora. Symptomatis verò non tantum præsentibus, sed etiã futuris occurrendum est, & his præsertim, quibus multum substantiæ deperit, & dissipatur. Igitur in magnis alui profluuiis, à quibus vires dissoluuntur vt pessimis, aqua ros. acetosæ, corallo & aliis quæ roborant, simul & leuiter astringunt, vtimur, nõ quidem, vt materiã biliosam retineamus (sic enim naturæ conatus impediretur) sed vt illũ impetum vehementiorẽ moderemur, ne vires tam imbecillæ euacuationi succumbant. Restauratiũ sic præscribi potest.

R. conferuæ buglos. ʒ. ij. conferuæ viol. nenuph. ana ʒ. ʒ. diamargaritonis frigidi ʒ. iij. pãniculos auri numero iij. decocti capi perfectè cocti lb. ʒ. aquæ ros. viol. nymphæ ana 3. iij. Si vires valde sint imbecillæ, & multa fiat calidi innati dissipatio, proderit addere parum vini albi. Ponantur omnia in vase vitreo diligenter obturaro, & fiat leuis decoctio. Si adsit immodicus alui fluor, vel futurus metuatur, vnde periculum sit de viribus iactura, misceri potest aqua prunellorum, vel cuspidum ros. & conferua ros. loco viol. Corall. etiam. Si delirium infestet, loco astringentium poni debet aqua lactucæ vel nymphæ. Si vigilæ torqueant, addi possunt semina, vel capita papaueris albi, vel semen lactucæ. Si calor vrgeat, licet addere crystallum, semen citri etiam.

Fiant etiam epithemata, quorum vsus est in vigore accessionis, calore per vniuersum corpus fuso, admouebuntur hæc, cordi & hepati.

PRO CORDE.

R. aquæ bugl. ʒ. ij. aquæ ros. viol. nymph. ana quart. j. trochiscorum de camphora ʒ. j. pul. diamargaritonis frigidi ʒ. j. Potest addi modicum vini albi: hæc, madefacto panno, regioni cordis applicetur. Quidam pulueres simplicium medicamentorum epithematibus miscent, & puluerem sandali, corall. ossis de corde cerui.

PRO HEPATE.

R. aquæ cichorei, endiuiz, solani, lactucæ ana q. j. triasandali ʒ. j. aceti parum, misce, loco vini ponatur acetum: quia non hic metuatur astrictio, quemadmodum

in thorace. Ob id miscentur quoque astringentia epithematis hepatis. ut semen acetos. berberis, portulaca, endiuia, scariola, corallus etiam, & absinthium, nisi vehemens febris prohibeat. Epithemata thoraci admoventur, quando in eo caloris acrimonia siccitas est corrigenda. Hoc ipsum fieri solet in hecticis, & aliis, quibus est magna siccitas corrigenda totius pectoris. Fiunt autem epithemata pro pectore ex decocto hordei, vel quatuor seminum frigid. vel in aqua viol. vel bugl. addita tertia parte ol. violati, vel amygdal. dulcium.

In hecticis pro pectore.

R. decocti hordei quart. j. olei viol. q. s. misce, intincti panni, thoraci admoveatur, vel,

R. aqua viol. lb. s. ol. viol. 3. iij. agitentur simul valde, & fiat, ut supra.

Pro hecticis.

R. hordei mundati p. j. florum viol. p. ij. fiat decoctio in lb. s. Adde olei amygdal. dulc. quart. s. olei violati 3. j. s. misce, fiat ut supra.

VI

De tertiana exquisita.

Hæc febris vel est continua, vel intermittens. Illa curatur eadem ratione, qua febris ardens. Mittitur sanguis, sed parcius, lenitur aluus, alteratur corpus, symptomatis occurritur. Intermittens rursus in duo genera dividitur, altera exquisita & legitima, à syncera bile effusa extra venas, & ad partes sensiles delata. In hac inutilis est venæ sectio, nisi adsit plethora. Galenus tamen in omni febre putrida sanguinē mitti iubet, & in hac etiam, sed non ante tertium paroxysmum. Verum hoc non rationi consentaneum cuiuspiam videri possit. Cum enim febris hæc, septem circuitibus terminetur, post tertiam accessionem, status vel adest, vel instat, quo quidē tempore Hipp. quiescere consuluit. Itaque primum si venæ multum sanguine turgeant, non video cur statim sanguis mitti non debeat. Quod si ex Galeni consilio venam secueris, vel medicamentū purgans dederis post tertiam accessionē, quoniam proxima est quarta accessio, gravior futura est, id tibi fuerit prædicendum, ut calumniæ occurras, & ne quis mali desperati culpam in te conferat.

Ante phlebotomiam, clystere simili prædicto aluus

est

est mollienda, postridie syr. concoquentes exhibendi. Quod si eger nauseat, & illi os amarescat, vomitus excitetur cū syr. acetoso, & aqua tepida. Si ab aceto, metuitur ventriculo, eius loco dari potest syr. vio. qui relaxando etiam vomitum prouocat. Post syr. concoquentes, portio quædam materiæ, leui quodam medicamento subducenda est, vt catholico, vel decocto descripto capite superiore, vt syr. ros laxatiuo cum aqua graminis, aut endiuiz vel decocto quatuor seminum frigidorum.

Reuocandum in memoriam, quod supra de rheo & aliis astringentibus medicamentis monuimus capite de Causo. Corpore leuiter purgato repetendus est vsus syruporum attenuantium, qualis est syr. endiuiz simpl. & composit. in magna obstructionis suspitione. Conuenit syr. acetosus, capilli veneris, violatus, oxyfacchara, & alij id genus, qui in aquis alterantibus diluuntur. Vbi materia concocta est, vrinis & sudoribus vacuetur, & vt commodius fiat, vtendum est syr. bilem attenuantibus, & aperientibus, vt syrupo endiuiz composito, syr. de bizantiis cum aqua graminis, & endiuiz Si alius resistat, tertio quoque die clystere mollienda est. Syrupus violatus, quia multum est humidus, præcipue in potu dandus, vt syr. acetosus simplex, & in magno feruore iulep. Alexandrin.

Hæc febris sudoribus copiosis, vt plurimum, finitur. Quare post tertiam aut quartam accessionem, si apparuerint signa coctionis, & purgatio præcesserit, vinū album & tenue, & plurima aqua dilutū in declinatione paroxysmi dandum est. Curata febre, si quid adhuc bilis restet, vnde periculū imminet recidiuæ, detur medicamentum supra præscriptum initio febris ardentis, aut aliquanto fortius. Cum verò in hac febre hepar immodicè calefiat, ad eius refrigerationem dandæ sunt tabulæ triasandali & diatragacan. frig. bibendū parum aquæ endiuiz, & cichorei. Syrupus acetosus simplex, & compositus, si per se, vel cum aqua exigua dentur, potenter mouent sudores, vel ventrem soluunt, & de fumaria, de cichor. alioqui si cum multa aqua diluantur, sunt minùs efficaces. Vsus horum aperientium præcipue est in declinatione, alterantium & leuiter aperientium in principio.

Tertiana spuria fit à bile mixta pituita, & interdum à bile vitellina. In hac febre magnæ sunt obstructions, & cruditates. In vetriculo autè & intestinis maxima materiæ pars cõsistit. Quamobrem laudantur hic clysteres, quibus tertio quoque die repetitis nõ paucos curatos vidimus. Si venæ multum distentæ appareant, mittendus sanguis post excremètorum vacuationẽ, quæ in vetriculo & intestinis cõtinentur. Quia ad vomitum proclives sunt, his vomitus excitãdus, alioqui detur clyster molliens, cui 3. ij. vel iij. agarici misceantur, vel sic.

℞. cass. 3. j. diaph. 3. j. fiat bolus, vel cum decocto cicerum rub. fiat potio, vel dentur 3. ij. vel iij. syr. ros. laxativi, cum decoctione fœniculi, anisi, petro. Vel si calor vehemens est, cum aqua graminis vel asparagi, vel cum aqua borraginis, bugloss. & 3. ℞. cinamomi. Minuta materia concoquenda syr. & iniectionibus. Syrupi conveniunt sine calore aperientes, & refrigerantes sine astringitione, qualis est syr. endiviæ simpl. capilli veneris & vehemẽtiores. Syr. de bizantiis, endiviæ compositus, acetosus simplex & compositus, qui miscetur aquis, vt sunt endiviæ cich. graminis, scariolæ, aspar. apij, petro. Poterunt inungere venter, & totum ventrem, & interdum his syr. vino albo mixtis. Præparata materia detur medicamentum superiore fortius, vt rustico & fortioribus electuarium de succo ros. addito agarico, diach. indo maiore & catholico. Delicatis detur hæc potio.

℞. glyc. polyp. ana 3. vj. medullæ carthami 3. j. sennæ 3. ij. agarici 3. j. fiat decoctio. In quart. j. diss. rhab. infusi in vino albo, vna parte decoctionis, 3. ij. cinamomi 3. ij. misce, fiat potus. Potest etiã fieri ex memoratis electuariis vel confectiõibus bolus. Si post has euacuationes febris adhuc perseveret, urinæ ciẽdæ sunt aqua graminis, aspar. & petros. Si verò febris curationi resistat, tandem ad syr. compositos veniendum, qui obstructions referent, & cruditates concoquant, & reliquam materiam vacuent. Huius generis sunt syr. de epyth, de fumaris compositus, de cich. cum radiculis. Etiam in obstructionis suspitione reiciendi sunt syr. qui myrebal. recipiunt, nisi castigetur eorũ astringitio, aquis aperientibus

bus, vt decocto supradicto, vel aliquo syr. aperiente vt,
 ℞. syr. fumariz compos. vel de epith. ʒ. vj. syr. de bizan.
 vel endiuiz compos. ʒ. ij. vel loco syrup. addimus aquam
 end. apij. petro. grami. aspar. oxalidis, vel sic.

℞. rad. petro. aspar. grami. cichor. & acet. ana ʒ. ij. her-
 barum capill. cich. end. bugl. borrag. agrim. ana M. j. be-
 tho. M. ʒ. quat. sem. frig. maior. ana ʒ. iij. apij. petro. anifi
 ana ʒ. j. pass. prunorum ana paria x. agarici trochiscati ʒ.
 ʒ. ramarindorum, senæ, semin. carth. ana ʒ. ij. florum cor-
 dial. & chamo. ana p. ij. Radices macerentur aqua & ace-
 to, & in eadem infusione fiat decoctio. In tb. j. collaturæ
 diss. sacchar. q. ʒ. fiat syrup. arom. cum cinamomo, & pul.
 diarrh. Quoniam hoc syrupo vtendum est, diutius eius
 altera pars mediocriter alteranda, de qua capiat alternis
 diebus. Pars altera perfectè coquatur, & seruetur vsui, ca-
 piat semel in hebdomada cum decoctione cicerum rub.
 vel aquis memoratis.

Hæc febris vix fieri potest sine offensione partium na-
 turalium. Itaque ad refrigerandum & alterandum datur
 electuarium triasandali diarrh. abb. diamarg. frig. Si ma-
 gis refrigerandum est, conuenit electuarium diamarga-
 ritonis frig. Si magis roborandum, diamargariti. Ex his
 mixtis fiunt quoque electuaria vt si sint obstructions a-
 periendæ, vel opiatæ, vt si sit refrigerandum, & obstructio-
 nes aperiendæ.

℞. diatrag. frig. ʒ. j. diarrhodi ʒ. ʒ. triasand. ʒ. j. Si robo-
 randum & refrigerandum, misce diamarg. frigid. cum
 diatrag. & cum sacch. dissol. in aqua cichorij vel endiuiz,
 vel absynthij, fiat electuarium per tabulas, capiat vnam
 superbibendo parum vini albi, vel aquarum prædicta-
 rum. Si fastidiat tabellas, confici potest iulepus ex aquis
 memoratis.

℞. aquæ cich. endiuiz, bugloss. ana q. j. sacchar. quan-
 tum sufficit, fiat iulep. aromat. cum ʒ. iij. triasand. & ʒ. j.
 diamarg. frig. Hoc roborat & refrigerat. Toto morbi de-
 cursu vtendum est, tertio aut quarto quoque die clystere
 sequenti.

℞. mal. betæ, pariet. an. M. j. mercur. M. ij. florum cor-
 dial. & cham. ana p. j. quatuor seminum frigid. endiuiz,
 anifi, fœniculi ana ʒ. ij. agarici trochiscati, in sine deco-

ctionis positi 3. iij. in colat. diss. mell. ros. vel sacchar. vel cath. 3. j. ol. chamo. 3. iij. fiat clyster.

Sed quoniam hæc febris in multos dies extenditur, & molestum esse potest tam frequenter vii syr. fiant pil. ad eradicationem materiæ. Hæc verò componi debent ex aperientibus, & his quæ bilem & pituitam detrahunt, vt
 2. agarici trochisc. 3. iij. succi agrimonix, petro. ana 3. ss. spicæ celti scœnanthi, cinamo. ana 3. j. rhab. tenuiss. pul. & irrorati aqua endiuix 3. ij. cum syr. laxatiuo, fiant pilulæ, de quibus capiat tres semel in hebdomada, ante cœnam vel prandium.

Hæ pilul. ab iis differunt, quòd minùs calfaciunt & astringunt. Rubea trochiscata Nicolai, & folia bursæ pastoris, si post vniuersales purgationes carpis admoucantur, hanc febrem depellunt. Idem præstat dentularia, & ea species thlaspi, quæ similis est bursæ past. Terantur simul cum sale & aceto, & carpis applicentur.

VIII

De quotidiana continua.

Hic febris, quemadmodum & aliis omnibus continuis, venæ sectio competit, si vires & alia permiserint. Sed quoniam multa pituita solet intestinis hære, proderit ante phlebotomiam, vel statim post clysterem iniicere, cui emolliendi, & detergendi vis in sit, vt,

R. mal. mercu. pariet. betæ ana M. j. pass. sic. ana pa. xx. anisi, fœnic. ana 3. iij. flor. cord. & champ ana p. j. hordei integri p. ij. fiat decoctio. In tb. j. collaturæ dissol. mell. ros. & sacch. rub. ana 3. ij. succi betæ 3. ij. salis communis 3. ij. ol. cham, 3. iij. misce, fiat clyster.

Hic primò conuenit, in progressu verò addendum est aliquid agar. vel medullæ seminis cartha. si aluus nimis astricta sit. drac. ij. diaph. quod vacu. pituitæ aptius est, quàm bened. vel hiera picra. Hæc enim plus æquo calfaciunt. Circa statum cautiùs est agendum, præsertim si suspicio est de alui profluuiò, quo febris hæc non raro soluitur. Tunc igitur cauendum ab acri clystere. Hic humor concoquendus est moderatè detergentibus, incidentibus & aperientibus. Et quia magna putredo subest vnde calor plurimum augetur, vtendum refrigerantibus. Detergunt mel. ros. col. hydromel. Incidunt & aperiunt, oxymel simpl. & compositius, syr. acetos. simpl.

de bi.

de bizantiis, capill. veneris. His admiscantur, cum magnus est calor, syr. endiuæ simpl. & compositus, vel aque refrigerantes. Ante vsum syrup. materia est minuenda, duobus a phlebotomia diebus interiectis. Cum enim soleat longior esse febris hæc, non statim a phlebotomia purgare conuenit, nec conuinis motibus subito & repente factis, nimium humores agitentur. Potest autem minui materia decocto ad pituitam parato, cui vel catholicum vel aliquid diaph. miscetur. Fitque potio vel bolus ex cathol. & 3. j. ag. vel diaph. 3. ij vel indi maior. Catholicum, licet ducendæ bili proprium sit, mixtum cum decocto tenuante, & incidente pituitam quoque purgat. Syrup. ros. laxat. hic per se inutilis est, sed cum infusione vel decocto agar. vel sem. carth. anisi, vel fol. senæ, anisi vel fœnicu. pituitam purgat. Idem præstat, si cum syr. aperiente misceatur, vt

R. syr. ros. laxatiui 3. ij. syr. de bizantiis 3. j. Hæc verò medicamenta, quanquam maximè conueniant in quotidiana intermittente, tamen & horum vsus est aliquis in continua. In hac enim ventriculus, intestina & venæ mesaraicæ copiam pituitosi excrementi cogerunt, quod repurgari debet, tum vt natura ad vincendum morbum expeditior sit, tum ne excrementum vi medicamentorum in venas retrahatur. & inde obstructions augeantur. Cæterum primis diebus magis detergentibus vtetur, deinde aperientibus, & rursum in declinatione detergentibus, vel horum loco n. medicamentum purgans datur, vt dissecta materia, & præparata vacuetur. Detergentia, quæ sunt in iis dustuum, & si quid vim, actionemque medicamentorum effugerit, detergent. Aperientia pituitam crassam, quæ in venis est, tenuant, & incitant, atque sudores eliciunt.

Ad detergendum.

R. mell. ros. collati vel mell. viol 3. j. syrupi capill. veneris 3. ij. aquæ hordei, vel graminis, vel asparagi parum, fiat iulep.

Ad incendendum.

R. syrupi acerosi simpl. vel de bizantiis, vel oxymel. simpl. 3. ij. cum aqua graminis vel aspara. primum, deinde cum aqua apij, petro. fiat iulep. Si calor magnus

est, prædictis syrupis, syru. endiuiz simpl. vel aquæ refrigerantes miscentur, vt iam diximus. Vbi concocta est materia, sæper vi naturæ morbus vincitur, & vt plurimū copiosioribus sudoribus, vel fluxu ventris soluitur, qui nec concoquentibus, nec soluentibus vinci potest.

IX

De quotidiana intermittente.

A Liquando febris hæc in quotidianam intermittentem mutatur, tuncque co. pore semel atque xerū purgato, hoc apozemate erit vtendum, cuius præcipuus est scopus roborare partes internas, ne cruditates pariant, ex quibus morbi curatio retardatur, obstructions aperire. & ea. quæ sunt in viis ductuum, & quicquid materiæ concoctum est, expellere.

R. rad. apij, petro. grami. aspar. ana ʒ. ij. herb. capill. agrim. cich. ana M. j. mercur. M. ʒ. betonicæ, hyssop. ana tertiam partem M. j. pass. ʒ. ij. quatuor seminum frigid. maiorum ana ʒ. j. seminis apij, petro. anisi an. ʒ. j. ʒ. florum bugloss. chamomillæ, borragi. ana p. j. medullæ seminis carthami, polypod. quer. an. ʒ. ij. ʒ. ag. trochis ʒ. ʒ. fiat decoctio. In col. lb. j. ʒ. diss. mel. ros. ʒ. ij. saccha. q. s. fiat syrup. perfectè coctus, arom. cum ʒ. ij. aut iij. diarrh. abb. capiat quarto quoque die cum decocto cicerum rubrarum. Diebus interpolatis vngatur totus venter cum ol. chamomillæ & pauco vino albo. Detur tabella vna diarrh. abb. manè, tribus horis ante prandium, vt corroboretur hepar, & alię partes cōcoctioni dicatę. In quotidiana inueterata, quę nec concoquentibus, nec soluentibus medicamentis vinci potuit, vtile est post aliquot euacuationes, theriacam veterem exhibere, tribus aut quatuor horis ante prandium, vacuo ventriculo, & reiectis excrementis primæ concoctionis. Confert etiam ciere vomitum, maximè ex decocto seminis, vel radic. asari, vel chamo. cum syrup. acet. idque principio accessionis faciendum est. Eodem tempore plurimum profunt vnctiones spinæ ex oleo abrotani, anethi. & irino. Præterea quarto die clyster est iniciendus. Qualis est suprà scriptus cap. de quotidiana continua, mirificè confert, tandem verò maximè astringentibus, etiam si laxandi quandam vim obtineant. Neque enim absinthium, si Galeno credamus, pituitosis morbis conuenit, præterquam

quàm in declinatione, ad roboranda viscera. In declinatione conueniunt electaria, roborantia, & vnctiones ex ol. nardino, & chamomelino.

De quartana continua.

X

Quartana continua nascitur à sanguine melancholico, vel infecto multa melancholia, quæ propter infectum vel infirmum lienē in sanguinis massa relicta est. Ea verò, si sola quantitate peccet, icterum nigrum, si putreat, febrem inuehit. In hac non secus ac in reliquis continuis sanguis detrahatur, aluo prius subducta. Vena autē sinistri brachij eligenda, quæ magis consentit lienī, circa quem magna pars materiæ collecta est. Misso sanguine dandum medicamentum aliquod leniens, vt cass. cath. cum decocto mercuri. vel sero lactis, vel decocto pass. polypod. & sennæ. Neque verò statim à phlebotomia duobus aut tribus diebus interpositis hoc fieri debet: quando hæc febris solet in multos dies extendi. Neque est perinde acuta. vt reliquæ continuæ. Ad alterandum & concoquendum valent syrupi humectantes leuiter, & refrigerantes, vel temperati in calido & frigido.

Refrigerant & humectant syr. viol. lactucæ, portulacæ. Temperati sunt syrup. de bugl. de borragine. Vt imur etiam syrup. de fumaria simpl. vel de acetositate citri, si magnus est ardor. Addimus & aquas eiusdem facultatis, vt violariæ, portulacæ, cucurbitæ, buglossi borraginis, & in biliosis naturis, cichorei & endiuæ. Si ex adusta bile generata est melancholia, conuenit syr. endiuæ simpl. & compositus. Sed composito syrup. nō prius est vtendū, quàm humor aliqua ex parte coctus sit, atque si dentur per se ad ʒ. iij. vel iij. Horum autem syr. facultas purgatoria, mixtione aliorum syrup. obtunditur. Quod si ventrem non mouent, plus efficiunt, quàm prosint. Syrupi compositi conueniunt de fumaria, de epirh. Hi verò purgant commodiū post iniectum clysterem. Atque si astricta sit aluus, quarto quoque die repetere oportet. Porro febris hæc adeo grauis est, & periculosa, vt ægri vix mortem euadant. Itaque diligentia adhibenda in conseruandis, ac fouendis viribus.

Fouentur autem vino pauco, atque diluto, restaurantibus & conditis. Condita sunt, vt ex conseruis buglossi.

borragin. viol. capil. ven. cicho. & pulueribus diamarg. frig. de gemmis. Fiunt etiam potiones cordiales ex confectione alchermes, cum aqua viol. borraginis, syrup. viol. Et si vigiliis torqueatur æger, syrupo de nymphæa & de papauere.

XI

De quartana intermittente.

Hæc febris fit aliquando à melancholia naturali, & aliquando à melancholia præter naturam, ut est quæ ab adusta bile gignitur. Prior species melior est, minusque molesta, sed longior: alia grauior, & acutior, & in hac, postridie accessionis malè habent ægri ob relicta vestigia caloris. Quod in illa non ita fit, in qua nec deiecta appetentia, nec sitis molesta. Ut accidentibus, & materia, sic ratione curandi differunt. Quæ fit à bile asfata, iisdem ferè remediis, quibus tertiana, curatur. Quæ verò à melancholico humore ortum habet, hoc modo tractanda est. Primum aluus clystere molliatur, deinde si plethora sit, vena aperiatur, sed si crassus & niger sanguis appareat, sinatur fluere: contra si tenuis & rubicundus, sistatur. Sed rarò mittitur sanguis à principio, magis verò circa medium tempus augmenti, vbi omnia consentiunt. Perspiciendum etiam, an lien intumuerit, an viscus aliquod obstructum sit: quia in re aperientibus medicamentis vtendum, ut syru. de bizantiis, de duabus radicibus, de fumaria, cum aquis eiusdem facultatis. Quod si nullus tumor sit, vel obstructio, coquatur materia syr. viola. de bugloss de fumaria simpl. deinde purgentur cath. diaph. confectione Indi maioris, confect. hamech. nisi cruditas ventriculi sentiat. Tunc enim pituita detergenda est, & coquenda, deinde etiam vacuanda vel decocto cath. elect. diacarth. & de citro. Post has euacuationes ventriculus & hypochondria corroboranda fotu & oleo chamomille & nardi ad prædictarum partium & cordis corroborationem, danda est opiata sequens.

R. conseruæ rad. bugloss ʒ. j. conser. anthos & capill. ven. ana ʒ. ʒ. pul. aromat. ros diarrh. abb. ana ʒ. j. ʒ. diamargarit. frig. ʒ. cum syr. conseruationis citri, fiat opiata, capiat alternis diebus, superbibendo aliquid vini. Viles sunt & conseruæ thamarisci, ceterach, rad. apij, præfer-

præsertim si fuerint obstructions. Præterea si nauseatur æger, prodest initio accessions vomitum inducere. Huius remedij tâta vis est, vt hoc vnico multi conualuerint.

℞. florum chamomillæ ʒ. j. florum anethi ʒ. ʒ. fiat decoctio in aqua raphani. vel cum eiusdem decocto, bibat initio accessions: Vel fiat decoctio ex sem. asari, vel ex rad. eius. Conuenit etiam quarto die clysterem infundere, à quo humore melancholicus & pituitosus facillè educatur, maximè verò concocto iam humore & apertis obstructionibus. Cōficiendus autem clyster ex mollientibus, & melancholiam, pituitâque vacuantibus, vt

℞. mal. bismal. an. M. j. mercur. M. j. pass. ficuum anaparia iiij. anisi, fœnic. an. ʒ. iiij. semen apij, petro. ana ʒ. j. medullæ sem. cartha. polypod. ana ʒ. ij. ag. ʒ. ʒ. florum chamomillæ, meliloti, sambuci, thama. an. p. j. fiat decoctio. In tb. j. diss. mel. ros. ʒ. ij. ol. chamomillæ & succi merc. ana ʒ. j. fiat clyst. In principio sufficit clyster molliens tantum cum succo mercurialis & multo ol. Sunt qui in principio accessions vtuntur hoc puluere.

℞. piperis, myrrhæ, fol. fennæ ana ʒ. iiij. misce, detur cum vino albo. Sed hoc medicamentum, vt theriaca, mithridatium, & quæ conficiuntur ex liquore cirenaico apud Galenum ad Glauconem, nisi cocta materia, non debent dari, alioqui periculum est, ne ex simplici, duplex reddatur. His peractis fieri potest apozema ad euacuationem materiæ contentæ in venis, & circa lienem, & hepar. Quæ continetur in venis, per vrinas: quæ est circa hepar, & venas mesaraicas, per aluum debet euacuari, ob id sunt apozemata ex radicibus aperientibus, & quæ obstructions recludunt, humorem crassum tenuant, vrinas & sudores mouent. Adduntur flores, semina, fructus ad eundem scopum. Quoniam verò non potest esse diuturna quartana, sine noxa lienis, splenica aliis præpollere debent.

℞. corticis thamarisci, corticis medianæ fraxini, sambuci ana ʒ. ij. radicis apij, petro. graminis, asparag. ana ʒ. j. buglossæ, borrag. cum radic. ceterach. linguæ ceruinæ, mercur. adianti, polytrici, capil. ven. an. M. j. cichorei, endiuiz, mentæ, absynt. an. M. ʒ. chamed. chamepit betonicæ an. tertiam partē M. j. pass. ʒ. iiij. quatuor seminū

frig. maiorum ana 3. iij. sem. apij, petro. anisi an. 3. ij. sem. cassuræ, medullæ sem. carth. an. 3. j. polypodij 3. iij. seba 3. j. β. ag. trochisca. 3. iij. flor. cordial. anthos, genistæ an. p. j. fiat decoctio ad lb. ij. in quibus dissolue sacchari quantum sufficit, fiat syr. perfectè coctus, cum 3. β. cina. momi & 3. iij. diarrhod. abb. Huic syru. vtiliter addi potest radix ciclamini, maxime si lien intumuerit, & periculum hydropis immineat. Potest etiam ei asarum misceri, modò æger non facile vomat. Dentur autem 3. iij. prædicti syru. quinto quoque die cum decocto cicerum rubrorum, vel cum aquis betonicæ endiuizæ.

Post usum præcedentium remediorum proderit bibere manè vinum album, in quo per noctem sub dio folia saluizæ maduerint. In horrore, qui statim initio accessionis sentitur, vngenda spina dorsi oleis calfacientibus neruos, qualia sunt oleum de abrotano, rutæ, & nucum, oleum de piperibus, vel cui incoxerint folia dētilariæ, quibus & misceri potest aqua vitæ. Hæc enim maxime purgato corpore conueniunt. Non enim tantum faciunt ad horrorem, sed etiam valent ad sudorem mouendum. In potu vinum est vilissimum. Nam materia morbi concoquit. Initio accessionis vinum album sumptum vomitum iuuat. In declinatione magis etiam conducit, ad sudorem prouocandum. Vfus piperis in condimentis & iusculis quartanam inueteratam sanat. Hæc enim, nisi corpus admodum calfiat, curari vix potest. Theriaca, vt supra monuimus, danda est post signa coctionis. Vidi mus tamen aliquos curatos ante id tempus data theriaca antiqua in initio accessionis cum vino, sed id tentandum non est, nisi in robustis. Postremò non negligenda, quæ corpori admouentur, vt quæ sæpe experti sumus magno successu.

R. foliorum sambuci, saluizæ, pedis columbini, rutæ, ana M. β. caltæ tertiam partem M. j. salis & vini parum, omnia simul trita carpis admota ante accessionem. Remoueantur hæc, quoties videbitur.

Febris hæc aliquando soluitur fluxu sanguinis è nari bus, præsertim si sanguine multo abundat, interdū vertitur in febrem continuam, vbi graue periculum est, ac ferè desperatio. Nonnunquam permutatur in morbos perni-

perniciossimos, vt epilepsiam, conuulsionem, aquam intercutem, cancrum, scirrhum alicuius partis internæ, & aliquando in elephantiasim, præsertim si huic vitio æger fuerit opportunus & obnoxius. Vulgare dictum est (*la febre quattana, non fa sonar la campana*) quod verum est de iuuenibus, non de senibus.

De febre Hæctica. **XII**

Febbris hæctica quasi habitualis dicitur, quia amplius non est in dispositione, sed in habitu. Huius tres sunt differentię, quarum duæ primæ nomine carent, tertia, marasmus dicitur, propter solidarum partium consumptionem. Eius essentia & natura est calida, & sicca, partes solida occupans. Fit enim cum caliditas illa & siccitas est in partibus solidis, non in humoribus, vt putrida, aut in spiritibus, vt diaria. Ob id ratio eius curandi in alteratione. Prima species, quia videtur proxima dispositioni, facilius curatur, sed non ita facile percipitur, quia corpus in ea nondum assumptum est. Tertia verò facile apprehenditur, nunquam omnino curatur. Satis enim est in ea, si extremam exsiccationem, quo ad licet, retardemus. Secunda media inter has, facilius cognoscitur, quàm prima, difficilius curatur. Difficilius cognoscitur quàm tertia, facilius curatur. Fit hæc febris post alias febres, aut morbos immodicè siccantes, vt post dysenteriam. Nam cum humiditates aliqua ex parte assumptæ sunt, caliditas acrior fit, & facilius accenditur suo pabulo destitutus calor. Sunt, qui dicunt hanc febrem fieri incipiendo, quòd raro accidit. Difficilissimum enim est ac ferè impossibile, substantiam frigidam citius inflammari, quàm spiritus, vel humores. Fit enim perpetuo post alias febres, vel morbos partium internarum, post venena, longas inedia, tristitias. Sed ab ephemera primùm ferè incipit, & nõ raro iungitur cum putrida. Curatur autem alteratione, sed quò facilius curetur, primùm oportet diligenter animaduerrere, à qua cāussa primùm excitata fuerit, & quibus affectibus iuncta sit, num sit morbus, vel symptomā, videndū erit. Nā si symptoma sit, non poterit curari præsentem morbo: vt si fiat propter vlcus pulmonis, non potest curari, vlcere pulmonis non curato, etiam si iam sit facta, & non vi-

deatur prouenire à caussa aliqua particulari. Si simplex sit, refrigerare & humectare oportet. Et quia partes solidæ calfactæ & exsiccatae sunt, refrigeramus eas & humectamus, tum per sumpta, tum per admota. Per assumpta quidem, qualia sunt medicamenta alimentosa, quæ plus proficiant, quàm alia tantùm alterantia: tum quia trahunt ad partes solidas, & exsiccationem impediunt, vel arcent assationem. Quæ verò extrinsecus assumuntur, illa quidem refrigerare possunt, sed humectare, substantificè nimirum. Alimenta medicamentosa sunt herbar, fructus, radices, semina. Inter herbas laudatur lactuca, viola, portulaca, buglossa, endiuia, lenticula aquæ. Nec improbandæ maluæ, præsertim cum alius astricta est, fructus cucurbitæ, cucumeres, poma, pruna recentia, & exsiccata, vuæ passæ suspensæ, amygdala recentia, pinei nuclei recètes. In marasmode, semina frigida maiora, & minora, sed illa meliõra, si recetia sunt propter humiditatem semen papaueris, berberis, cydoniorum, flores buglossi viol. nymphaeæ, & quæcunque frigida & humida sunt. Ex his conficiunt condita cum pullo, & manè facta prima coctione sumuntur, vt

℞ lactucæ, buglossi. portulacæ an. M. j. quatuor seminum frigid. maiorum ana ʒ. ʒ. seminis berberis ʒ. j. decoquantur omnia simul cum pullo gallinaceo, vel columba admodum iuvene, capiat ius singulis matutinis. Continuet per nouem dies, & à prandio capiat aliud medicamentum sub alia forma.

℞. quatuor seminũ frigidorũ recenter mundatorum an. ʒ. ʒ. sem. berberis, & papaueris albi an. ʒ. j. amygd. dulc. temperatarum in aqua frigida, postea in aqua violarum lb. j. contendantur omnia in mortario, quibus adde sacchari quantũ sufficit, confice in morcellos, vel tartam, & coquantur in furno leuiter, vtatur inter prandiũ & cenam. Huic remedio in marasmode, addimus pinearum eodem modo præparatarum quartarium vnum. Sunt qui addunt carnem testudinis nemoralis, vel cæcorum fluuiatiliũ, quod nõ improbo, sed tunc addere oportet modicum anisi & cinamomi ad gratiam. Nam eo tempore propter siccitatem ventriculus minũs coquit & generat flatus. Loco decoctionis pulli potest fieri syru. ex iisdem her-

herbis, addendo sacchari quantum sufficit, hoc modo.

R. radice buglossi ʒ. ij. liquir. ras. (quia humida est)
 ʒ. ij. radic. satyrionis ʒ. ʒ. (multum enim humectant, &
 coctione flatus amittunt) lactuæ, portulacæ, solani hor-
 tensis, viol. an. M j maluæ M. ʒ. prunorum, sebesten ana
 paria decem, quatuor seminum frigid. seminis bomba-
 cis, papueris albi an. ʒ. iiij. seminis alchecangi, & ber-
 beris an. ʒ. j. seminis cydoniorum ʒ. ʒ. florum vio. nym-
 phæ, buglossi an. p. j. fiat decoctio in tb. j. collaturæ dis-
 solve sacchari quantum sufficit, fiat syru. aromatizetur,
 cum ʒ. ij sandali rubri, adde decocto anisi ʒ. ʒ. (quia ista
 humida flatus generant) & non fœniculi, vel alterius
 magis acris, quia nimis calfaciunt & siccant.

Cæterum, quia hic morbus est diuturnus, & diu ven-
 dum medicamentis, etiam eadē facultate medica sunt,
 tamen modo diuerso his medicamentis utendum, ne sem-
 per eadem nos fastidiant, & opinionem inutilitatis egro-
 pariant. Utatur verò aquis distillatis ex herbis prædictis,
 vel in forma iulep. vel cum vino iulep. conficiatur, addi-
 to saccharo, ut,

R. aquæ buglossi. (quæ multum humectat, & cordi
 propria est, ob id nunquam prætermittenda) quart. ʒ.
 aquæ lactuæ, vel portulacæ, vel nymphæ, vel vio. quar.
 vnum. His aquis temperet vinum in prædio & cœna. Iu-
 lep. fiat ex aqua ros. viol. nymphæ & aliis. Sed cum de-
 beat semper esse iucundus, & datur ad sitim, & per se su-
 mitur, ob id huic misceri solet aqua rosarum, alias ea
 raro utimur, quoniam frigida est & sicca, ut,

R. aquæ ros. qr. j. aquæ violar. qr. ij. sacchari albiss.
 quantum sufficit, fiat iulep. utatur tempore sitis & fre-
 quenter. Nam hæ potiones utilissimè distribuuntur pro-
 pter substantiæ tenuitatem, & multum refrigerant. Ex-
 trinsecus apponuntur epithemata, vnctiones, balnea. E-
 pithemata fiunt ex frigidis & humectantibus modicè,
 plus tamen humidis, quàm frigidis Nam quæ multum
 frigida sunt, illa aditum sibi præcludunt. Fiat epithema
 ex prædictis aquis supra cor & hepar, ut,

R. aquarum buglossi. vtriusque violar. ana quarta-
 rium j. vini albi guttas aliquot. Iutingantur panni, ap-
 plicentur pectori, & hypochondriis. Potest fieri epithema

ex decoctione hordei, vel herbarum prædictarum. Sed quod paratur ex decoctione hordei mundati, & semine cucurbitæ, aliis præfertur, paratur autem sic.

R. hordei mundati p. j. cucurbitæ & peponum, vel cucumeris ꝑ. j. vel omnium simul ana ꝑ. iij. decoquantur In fine decoctionis adde olei vio. vel amygd. dul. ꝑ. iij. agitentur fortiter. Postea inringantur panni rari, & pectori ac hypochondriis applicentur, ubi incaluerint, remoueantur, & hoc manè & ante coenam faciendum bis vel ter.

Inunctiones verò fiunt in dorso, & in pectore, sed non ex eadē materiâ indicatione sumpta à parte. Nam supra dorsum, & partes externas Gal. facit linimenta ex frigidis, & quodammodo astringentibus, vt oleo rosato, cera, & aqua, vel ex oleo myrthi & nymphææ. Supra pectus ex refrigerantibus, & modicè relaxantibus: quia pars propter respirationē laxanda est. Cū dicimus astringentia esse adhibenda, de moderatis intelligimus. Nam quæ id immoderatè faciūt, insensilē perspirationē impediunt, & calor maior in partibus internis incenditur Frigida leuiter astringentia, quia refrigerant, robur partibus addunt, & dissolutionem membrorū retardant. Inunctiones supra pectus fiunt ex oleo violato, vel ex oleo de seminibus cucurbitæ, vel decoctione seminis lactucæ, vel papaueris, & nymphææ, quibus addendum est oleū amygd. dulc. vt minuatur vis astrictoria, & minus refrigerent. Nam hæc caliditas sensim est alteranda, & non subito. Nam quæ vehementer refrigerant, & subito id faciunt, calorem narium extinguunt. Fiant ergo vnctiones sic.

R. ol. viol. in aqua hord. loti ꝑ. ss. Tota regio thoracis vngatur, vel sic.

R. ol. de semine cucurbitæ, vel melonum, vel citruli, vel omnium, vt supra, fiat inunctio vel sic.

R. ol. de semine lactucæ vel papauetis ꝑ. iij. olei amygdal. dulc. recenter extracti, & non ex amygd. antiquis, vel rancidis ꝑ. ij. Quòd si defint recetes, per aliquot dies ante macerentur, deinde oleum apponatur. Vngenda quoque spina, vel oleo rosat. vel myrti vel cydoniorum. Iisdem inungi potest regio ventriculi, & hepatis, ac totius ventris, nisi obstructio splenis, vel aliud symptoma impediât. Vnctiones fieri debent manè & serò, cum

cum ibit dormitum, & maximè ante balneum, & post balneum. Balneum sit aquæ dulcis, & non sit particeps alicuius qualitatibus, tum verò sit tepida, nec prouocetur sudor in lauacris. Misceri possunt flores rosæ nymphææ, folia salicis, hordeum mûdatum. In tertia specie ius capitis & intestinorum veruecis cōducunt, ad humectandum & relaxandum partes, quæ propter nimiam siccitatem conciderunt, & densiores factæ sunt, alimētum recipere non possunt. Optimum est ingredi balneū, postquam aliquid concoxerunt, vt alimentum trahatur ad partes: nec ingrediendum ventriculo ieiuno, ne fiat nimia dissolutio: ob id damus alimenta, quæ facilius coquantur, tribus aut quatuor horis ante balneum, vt vitellos ouorum, succum carnis, vel micam panis cum vino puro. Regatur autem, vt infrà docebimus. Balneum debet parari in tribus lauacris, vel in vno, sed longè alio modo, quam soleant practici facere. Nam illa balnea magis detergunt, & discutiunt, quàm humectant. Antiqui tria sola habebant, vt potest ex lib. De sanit. tuenda colligi. Sed nos sic disponemus, quod illa folia non habeamus. Primum lauacrum erit ex aqua dulci, modicè tamen calida, vt aperiantur pori. Secundi autem aqua tepida erit, tertij verò erit frigida. In primo balneo laxantur partes, in secundo humectantur, quia aqua post relaxationem partium penetrat. Tertium densat cutim & refrigerat, vt illa humiditas maneat. In vno eodémque balneo fieri potest. Balneum sic parabitur aqua calida modicè plusquam tepida, paulò deinde refrigeratur per se, vel addita frigida, tanta quantitate, quanta est necessaria, vt tepida fiat. Postremò in vltima parte apponimus plus aquæ frigidæ, vt balnei aqua refrigeretur, vel tantisper in balneo maneat, dum aqua refrigeretur per se. In balneo calido nō oportet diu morari, in tepido mediocriter, in tertio minùs, quàm in secundo, in secundo magis, quàm in primo. Eodè modo de aliis balneis & decoctionibus ex herbis, floribus & aliis faciendum. Circa balnei apparatus hoc fieri expedit. Regatur sic, pridie imperatur clyster molliens, vt recremētum auli, quæ & siccitate retineri solent, euacuentur. Deur mane, deinde prandeat hora nona, & dentur in prandio

alimenta, quæ solidiorem alimoniam præstent, qualia sunt, quæ postea dicentur, vt carnes, iuscula, in quibus cocti sunt pedes vituli & porci. Cœnet hora quarta, sed parcius cibos edat coctu faciles, inter prandium & cœnam semel bibere licebit. Hora prima post mediam noctem sumat ius pulli, vel cremorem ptisanæ, vel vitellos ouorum, vel oua duo tremula, quibus mixtum sit aquæ ros. & sacchari parum loco salis. Quatuor vel quinque horis post, ingrediatur balneû, vt supra diximus. Deinde in exitu balnei abstergetur, & linteis fricetur, postea applicentur linimenta supra scripta, tum quiescat in lecto duabus aut tribus horis, dormiatque si fieri potest. A somno capiat ptisanam & iuscula, & id genus alimenta coctu facilia. Deinde vinum capiat in cœna, apponantque, quæ solidius præstant alimentum. Manè verò detur cremor ptisanæ, vel alius eiusmodi leuior cibus, & rursum descendat in balneum, tracteturque, vt supra dictum est. Decimo quoque die proderit vti balneo, idque continuis tribus diebus. Quod si fortè adsit ventriculi cruditas, tum balneum fuerit inutile, sed vt prohibeatur, corroborandus erit ventriculus vnctione cydoniorum, & de absynthio, vel apposita crusta panis, quæ aspersa sit puluere sequenti.

R. ros. sandali ana 3. ss. garyoph. 3. j. misce, fiat puluis. Hæc crusta panis inspersa, & paucò vino irrorata applicetur regioni ventriculi, & circa decimam tertiam vertebam dorsi, dum ingreditur balneum. Alimenta duorum sunt generum. Quædam ægrè concoquuntur, sed diutissime nutriunt, vt sunt extremæ & nervosæ partes animalium, alica, crythinum, vulgò semola, & alia, quæ ex triticea farina parantur. His adiungi potest gelatina. Sunt & alia coctu difficilia, quæ diu multumque nutriunt, sed quia crassum & melancholicum succum gignunt, omnino reicienda, qualia sunt aues aquatiles, &c. Quædam verò citò quidem nutriunt, sed citò etiam dissipantur. vt vinum, succus carniû, testiculi gallorum, oua sorbilis. Sed controuersia est inter Medicos, vtræ sunt eligenda. Nonnulli cibos coctu faciles anteponunt propterea quòd partes destinatæ coctioni imbecilliores redditæ sunt, & idcirco alimenta concoctu difficilia

conficere nequeunt. Alij huiusmodi alimenta parum prodesse contendunt, quod sint tenuium partium, & proinde facile alterantur, & citius diffluunt. Sed his incommodis facile occurri potest, adhibita hac distinctione. Principio febris, dum adhuc robusta est coquendi facultas, conueniunt solidiora alimenta, viscida, & humida. Hæc enim siccitatem retardant, & cum adhuc multus humor membranis super sit, calorem præter naturam facile euincere possunt. Cum verò præ nimia ariditate partes naturales sunt infirmiores, cibi concoctus faciles sunt exhibendi. Elixæ magis laudantur, quia magis humectant: quanquam assa humidiora sunt humido substantifico, vt author est Aristot. præsertim si luculento igne torreantur, neque nimium igne siccantur. Sed quoniam assa facilius inflammatur, & vertuntur in bilem, elixæ præferenda sunt, præsertim si cum suo iure fumantur, nec longiore concoctione intabescant, & salis expertia sint. Sunt autem assa temperanda aqua ros. vel succo citri, aratorum, vel mali granati, atq; id, quod semiuustum est, abiici, interior verò eligi debet. Hac ratione assa minus calida, & suauiora multò sunt. Ex carnis sunt, caro vituli, hœdi, agni, sed vituperatur agnus, nisi sit educatus pascuis siccioribus, & odoratis, quales sunt Narbonenses. Hi enim, quanuis sint humidissimi, non tamen excrementitij. Non sunt insalubres porcelli impingati, & adhuc lactâtes, quorum caro minus pinguis est accipienda, pinguedo verò reiicienda. Laudantur autem pedes porcellorum non saliti, & bene cocti, fasiani, perdices, cuniculi, pulli gallinacei, pipiones, capi, lepusculi. Auiculæ elixæ sunt meliores assis. Nam hæc facilius in bilem vertuntur, vt 6. epid. scripsit Hipp. Quod si assæ magis arideant, minus coquedæ, & vt supra, temperandæ. Inter frumetacea sunt, prisana ex hordeo & auena & tritico. Sed quæ ex auena & hordeo fit, paranda est cum iure carnis, vt sit humidior, vel cum lacte amygdal. dulcium, additis seminibus frigidis maioribus, aqua ros. & sacch. Amygdalæ macerentur aqua frigida, vel hordei, vel viola. vel rosa. quia facile in bilem vertuntur, nisi recentes fuerint. In hæctica marasmode adduntur nuclei pinei, vt iâ diximus. Ex oleribus

utilia sunt, quæ supra memorauimus, vt lactuca, solanū hortense, violæ, borrago, bugl. scariola, spinacia, beta, caules, & talia nitrosa, quorum vsus est tantum ad subducendū aluum, & tunc dantur cum iure pingui. Inter fructus utilia sunt poma, licet flatulenta sint. Gignunt enim sanguinem frigidum. Et quemadmodum tradita sunt seruare flatulentam substantiam vsque ad tertiam coctionem, sic non minus refrigerādi vim retinet. Dulcia gratiora sunt, arida magis refrigerant. Eligenda igitur sunt pro vario temperamento ventriculi. Idē est iudiciū de granatis. Pira meliora sunt minus dura, & quæ minus astringunt. Passulæ quoque non sunt insalubres, ficus rarò comedendæ, pruna dulcia, cerasa dulcia, tam recentia, quàm condita, refrigerando habitui corporis conducunt, si alios cibos præcedant, nec aliis commisceantur. Sumptis his fructibus, si æger potui aquæ sit assuefactus, bibat aquam potius quàm vinū. Hoc enim modo prædicti fructus magis leniunt, & refrigerant. Nocent nuges, amygdalæ, & in summa omnes duri fructus, ac pingues. In potu cōceditur vinum tenue, album, & olygophorum. Nec minus utile est secundarium vinū, quod loram vocant. In huius vini penuria, aliud diluatur multa aqua, duabus aut tribus horis antequā bibat.

A piscibus salis, pinguibus, duris, testaceis abstinendum. Alij sunt ex vsu, quando succum frigidum & humidum gignunt, sed omnium optimi sunt saxatiles, nec contemnendi, qui viscida carne constant, vt anguillæ in aqua pura capræ, & bene præparatæ. Inter testacea, canceri fluuiatiles, & qui reperiuntur in stagnis maritimis, & squillæ (quas Normani, de grenette, Santones, de la sanie) locustæ & astaci damnantur: quoniam sunt carne durissima. Testudines nemorales, & quæ degunt in aquis, quia sunt carne teneriore, hæ sunt seruandæ in hortis, diebus aliquot, vt excrementiciam humiditatem deponant. Ranarum coxæ elixæ non insalubres ius & earum optimū est, si coquātur cum gallina, & capone. Quidam commendant decoctum coclearū, sed cum succum melancholicum gignat, ab his est abstinendum. Ex carnibus testudinis, amygd. nucleis, pineis fit tarta, vt sequitur.

Æ. carnis testudinis q. j. amygd. dulc. iufusarum in aqua

aqua rosarum lb. $\frac{1}{2}$. pinearum eodem modo infusarum \mathfrak{z} . ij. quatuor sem. frig. maiorum ana \mathfrak{z} . j. anisi \mathfrak{z} . iij. cina-
momi \mathfrak{z} . j. sacchari dissoluti in aqua ros. violar. vel bu-
gloss. ad pondus omnium, fiat tarta. Anisum non tritu-
retur, coquatur leuiter in furno. Ex carne ranarum idē
parari potest. Passulæ mundatæ hoc modo corpus ari-
dum alunt citra calfactionem.

R. uuarum pass. à gigartis mundatarum lb. j. tempe-
rentur in aqua buglossæ & endiuicæ, & ros. & abluantur
diligentissimè, vt vis laxandi amoueatur, postea in iis-
dem aquis decoquantur leuiter, addito pauco saccharo
ad perfectionem cum quo seruentur vsui. Capiat manè
& post prandium, & bibat parum. Hac confectione cu-
rantur, qui macie laborant, & malo habitu præditi sunt.
Item, quibus cor palpitat, sunt maximo iuuamento, me-
lancholicis & senibus non parum conferunt. Caules, la-
tucæ, & caro cucurbitæ cōdita refrigerat, & humectat.
Ob id laudandæ sunt. Mollitio ventris per clysteres,
multum dormire, parum corpus exercere, est illis utili-
ssimum. Horum remediorum continuatione curabun-
tur hecticæ febres, si sine vlcere sunt. Si cum vlcere, cu-
rare vlcus oportet. Nam & si hectica fiat ab vlcere, fo-
uetur per accidens calor sine materia. Et hac ratione
differt à putridis, quæ vapore acri continuantur. Hæc de
febris hecticis simplicibus sufficiant.

De hectica cum putrida. XIII

HECTICA sæpe complicatur febribus putridis, cu inos
tattentos esse decet. Tunc ergo vtendum medica-
mento purgante, sed mitiore quàm si simplex esset pu-
trida. Obstructiones quoque aperiendæ: nimirum cal-
facientibus. Et quāuis non admodum sitiant ægri, eo-
gendi tamen sunt, vt sæpè bibant, ne calore alieno hu-
mor naturalis absumatur. In febre tertiana detur syru.
ros. laxat. cum aqua viol. capil. ven. endiuicæ, vel fiat de-
coctum ex tamarind. sebesten, quatuor seminibus fri-
gid. in quo dissol. rhab. infusi in aqua end. & cum syru.
ros. laxat. vel viol. fiat potio. Potest dari causâ per se, vel
in decocto, vel in aquis præced. Ad concoquendum va-
let syr. capil. ven. end. fumar. simpl. cum syr. viol. Aper-
tis obstructionibus potest repeti medicamen. aliquod

ex suprà dictis. Quòd si accessio diuturnior fuerit, quàm vel relinquatur tempus idoneum cibàdi ægri, detur etià in ipsa accessionis declinatione decoctum pulli, vel cremor ptisanæ, vt de picrocholis docet Gal. 9. meth. ne scilicet eorum corpus immodicè siccetur. Cibus autem extinguit acrimonià bilis, modò sit eiusmodi, vt non facile vertatur in bilem. In quotidiana damus ius antiqui galli confarcti semine carth. pass. ana ʒ. j. anisi ʒ. ʒ. Addi possunt aliqua folia petro. cum saccharo, vel manna. Syrupi coquentes sunt cap. ven. de bizant. hydromel. Concocto humore rursus exhibeatur medicamētum præscriptum, pondere carthami aucto ad ʒ. ij. Postridie detur aqua hordei cum syr. viol. in febribus quartanis. In quotidianis verò, cum syr. capil. ven. Quòd si mitioribus his non cedat febris, ad fortiora transeundum.

℞. agarici à ʒ. j. ad ʒ. ij. infusi in aqua viol. Expressioni adde mellis ros. collati ʒ. ʒ. syr. ros. laxat. ʒ. j. fiat potus. Potest etiam agaricus decoqui in iure galli antiqui. Non est opus zinzibere, & sale gemmæ. Nam hîc nulla extenuatione opus. Præterea calidius est medicamentum, quàm par sit. In quartana detur decoctum mercur. ciclæ in iure galli valde pinguis. Si autem magis purgandus sit, adde foliorum senæ, summitatū thymi, polypodij, quercini ana ʒ. ʒ. Concoquenda materia syr. viol. de fumaria simplici, bu. loss. borraginis. Etenim omittendi sunt omnes compositi, vt de fumo terræ, de epithymo, quoniam plus equo desiccant. Post has febres putridas conuenit balneum, quod etiam in his febribus putridis, veteribus maximè laudatum est. Licet & aliis remediis vti ad extinguedum calorem, vt epithematis impositis cordi & hepati, in febre tertiana & quartana: in quotidiana vngendus ventriculus & hypochondria: oleo chamom. Accidit igitur alui profluuium, cui statim est subueniendum. Nā is fluxus in morbis tabificis est lethalis. Arguit enim imbecillitatem facultatis retentricis & totius corporis colliquationem. Curatur frigidis & astringētibus, alimentis crassis, vt oriza, pulre, lente & cæteris. Applicentur extrinsecus, quæ astringendo roborant, & aliquatenus refrigerant præterquam in lienteria, in qua modicè calfaciendum.

De febre pestilenti ali.

Non solum antiqui medici, sed etiam recetiores aduersus feb. pest. len. multa remedia prescripserunt. Multi de causis huius febris disputarunt, sed pauci morbi essentiam docuerunt, nihilque certi de eius specie tradiderunt, nisi quod feb. perniciosam esse dixerunt, sed illi non satis explicant naturam rei. Nam scire oportet, num febris pestil. morbus sit an aliquarum inflammationum internarum, vel externarum symptoma, & ad quos genus feb. referri debeat. Quare nihil determinatum ad hanc feb. potuerunt inuenire, ignorata morbi essentia, quæ quid faciendum est, insinuat. Nos autem diligentissime huius feb. formam annis superioribus, cum diutius in hac regione versaretur, considerauimus, & ex his, quæ præcesserunt feb. pestil. & ex his, quæ in feb. apparerent, cognouimus febrem pestil. non vnam & eandem naturam particularem habere, sed pro natura constitutionis temporis præsentis, & præteriti alio modo homines infestare, & alio modo alia animalia, ob eam causam diuersa nomina apud diuersas gentes obtinuit. Dicta est aliquando, *marenne*, propterea quod insidiosa & periculosa sit. Superioribus annis vocata fuit, *trouffe galat*, quod fortissimos quoque iuuenes cito iugularet. Aliqui pestem internam esse dixerunt, & pro arbitrio unusquisque illam appellat, secundum varias formas, & varios effectus quos præstat. Nos autem putamus esse tertium genus Causonis factum ex sanguine melanch. Quod autem causus sit, monstrat si-
Pest. aqua
materia.
tis illa inexhausta, quæ in hac feb. esse solet inseparabile symptoma, & incidium maximum circa cor, regionem ventriculi, & maxime circa splenem, & quandoque circa pulmones. Neque illa frigiditas, quæ partibus externis sentitur, impedit. Nam quotiescunque magnum est incendium in partibus internis, sanguis, & spiritus ad intra retrahuntur, vel potius à calore magno trahuntur, & ob id partes externæ frigidae apparent, quæ nota est pessima, si Hippoc. & Galeno credamus, item delirium, mania cum studio, ut quæ referat naturam atræ bilis, & quæ proximè accedat ad furorem. Difficultatem anhelandi & alia multa symptomata, quæ febrem ardentissimam comitari solent, eadem manifestissime ostendunt.

Quod autem hæc species caulonis à sanguine melancholico fiat putrescente, aut propter putrefactionem ebulliente, declarat illa magna similitudo huius febris cum febre quartana continua, & humores præter naturam, qui in illis febribus apparere solent, aperte docent. Sunt enim carbunculi interni vel externi, qui ab omnibus medicis dicuntur fieri à sanguine crasso efferuescere. Idem docent stigmata illa nigra per vniuersum corpus sparsa. Huius rei suspicionem augent causæ harum febrium, vt coniunctiones planetarum in Saturno, item bella, annonæ caritas, quæ solent hanc febrem præcedere, vnde natum est commune Græcorum prouerbium, *meta timon ho loimos*. Coguntur enim homines vesci quibuslibet, vel leguminib. radicib. herbarum, & non conuetis alimentis, vt vidimus panem confectum ex radicibus graminis, filicis, fabis, castaneis, lentibus, quæ quidem alimenta sanguinem melancholicum gignunt. Adde quod eo tempore curæ, sollicitudines, timores, & aliæ animi affectiones spiritus absument, sanguinem exsiccant: quibus absumptis, via illa diuina, quæ humores continet, regit, & moderatur, imbecillior redditur, ob id humores putrescunt, & venenum aliquod concipiunt. Idem tempore belli euenire videmus: neque id tam propter sanguinis corruptionem, aut corporum putredinem, quam ob mæores, pauores & tristitias. Et, vt à nostris exempla petamus, apud Parpegnianum multa clades facta est, pestis tum secuta est ingēs, quæ non solum vicinos, sed etiam eos, qui in montibus viuebant oppressit. Et apud Auernos febris pestilēs ita grassata est, vt multo plures occiderit homines, quam pestis anni superioris. hæc autem longè euidentiora sunt, quam, vt longa egeant disputatione. Quod autē febris pestilens sit diuersa, ipsa experientia docet. Est enim aliquando febris ardētī similis, quæ fit à bile putrescente circa pulmones, & ventriculum. Hoc tantum interest, quod contagiosa sit & quandoque cū spūto sanguinis incipiat, vt illa, quæ tempore Guidonis grassata est. Aliquādo est magis exquisita, & tunc semper terminatur tertia vel quarta die in carbunculis, nisi qui velit carbunculos morbum esse, & febrium symptoma.

Nos tamen hoc modo describemus. Febris pestilens *pest. des-*
 est è genere morborum, qui epidemij dicuntur, pernicio- *criptio.*
 sa, & contagiosa ex sanguine atro putrescente, & ebullien-
 te facta cum carbunculo externo, & cum inflamma-
 tione interna, referente carbunculum. Quod autem hic
 morbus sit epidemius, ex eius natura facile discerni po-
 test. Peculiariter enim grassatur. Pestilentialis verò dicta
 est hæc febris, quod sit pestis, aut pestem referat, *loimon*
 Græci appellat, vel *loimodom* omnes eos vocant, qui exi-
 tiosi sunt. Nam, vt Gal. scriptum reliquit in epidem pe-
 stes appellant, omnes homines prauos, sciuntque exitia-
 les morbos esse, & etiam ad deos sæpe referunt de cura-
 tione eorum consulentes. Fiunt autem hæc febres à caus-
 sis maximis & vniuersalibus, vt post summas caliditates
 & siccitates, post bella, & annonæ caritates, quæ in no-
 bis generant magnam cacochymiam, & humores à na-
 turæ regimine aberrare faciunt. Et vt vnum, quod canic-
 ulæ tempore cõturbatur ob fecem ad partem superio-
 rem excitatam, vel ob ebullitionem: Sic melancholia
 sanguinem inficit, cõturbat, ad putredinem, & vene-
 nositatem disponit, vnde tales febres fieri solent.

Humorum agitatio proxima est causa, quæ humo-
 res excitat, & de potentia ad actum reducit, eaque potif-
 sima videtur esse causa & immediata. Nam in peste vi-
 demus homines leuissima de causa corripì propter san-
 guinis agitationem. Vt in peste videmus omnes illos qui
 propter lucrum ægrotis ministrant, ventrigulæque de-
 ditos, & cacochymos, non tamen hoc morbo facile cor-
 ripi, propterea quod nõ cõturbatur, etsi videant multos
 mori, lætantur enim propter lucrum magis. Huius sen-
 tentiæ fuit Cornelius Celsus, cum docet tempore pestis
 non esse mittendum sanguinem, aut non purgandum
 fortioribus medicamentis, ne fiat humorum agitatio.
 Fit autem hæc febris propter putredinem aëris, in ali-
 quo loco factam, & per contagionem aliis corporibus
 communicatur. Neque existimare oportet aërem esse
 putrefactum & corruptum in quo pestis grassatur.
 Nam pestis, quæ superioribus annis nos infestauit, ci-
 tra aëris vllam infectionem facta est, sed per Heluetios
 milites, qui hæc iter faciebant ad obsidendum Perpi-

gnianum, ex Germania communicata fuit, & per nebulones quosdam retenta, cuius rei argumento est, quod hi tantum infecti sunt, qui infectas domos frequentarunt. Est autem contagiosa propter aerem infectum, qui ab ægrotantibus redditur. Conseruatur autem hæc infectio maximè in pannis, & in locis conclusis, nec aeri peruiis. Quare corpora illa mortuorum, quæ amplius non expirant, nullum venenum eiaculantur. Quod si aliquid contrahatur, hoc potius ab eorum pannis contrahitur, quàm vlla re alia. Siquidem dissecuimus aliquando corpora mortuorum ex peste, multis spectantibus studiosis sine aliquo damno: propterea quod mortuo animali perit omne venenum. Et quia ignorabamus etiam eos mortuos ex peste, quæ causa fuit, vt minus turbaremur, quod certissimè confirmat illam fieri propter perturbationem sanguinis cacochymi, vt supra diximus. Tunc enim venenum maximè corpora nostra inficit, propterea quod humores suo loco mouentur, vnde venenum illud recipiunt, quia à natura non conseruatur. Natura enim humores, & succos omnes quiescentes suis locis facilius regit, quàm agitados, & quasi extra suos limites digressos.

Febris hæc pestilens in prima hora, si fieri potest, deprehendenda est. Cognoscitur autem ex summa & subita viriū imbecillitate, sine aliqua manifesta causa præcedente. Nam sine magna euacuatione facta, ita vires omnes naturales prostratæ sunt & deiectæ, vt diceres illos grauissimo morbo fuisse vexatos. Incipit quandoque cum oris ventriculi morfu, cordis palpitatione, somno profundo, vel mentis stupore. Magnum sentiunt calorem in partibus internis, in externis verò nullā caliditatem insignem, ita vt quandoque sanos eos iudicet minus experti: propterea quod pulsus & vrina non admodum immutantur in hac febre. Et tamen summa inquietudo, & aliqua anhelandi difficultas, in excrementis foetor, & alia grauissima accidentia, & quandoque tertio die delirium, fluxus ventris, & vomitiones magnæ etiam primis diebus, sitis magna, appetitus deiectio. Animaduertendum est ex his signis, aliqua semper adesse, aliqua verò tantum, cum aliquæ partes afficiuntur, vt dif-

ut difficulates spirandi, quando partes respirationi inservientes afficiuntur, & deliriū, cum diaphragma, vel cerebrum magis læditur. Læduntur autem, vel cum materia putrescit nō longè ab his partibus, vel ipsæ partes ea inflammatione laborant, quæ carbunculorum naturam refert. In omnibus communis est magna virium imbecillitas & cordis affectiones. Nam cum hæc materia uniuersa sit, & naturæ nostræ contraria, vitæ fontem inficit, & propter illam causam nonnulli existimarunt, hanc febrem fieri ex putredine spirituum, sed cum spiritus magis referat naturam ignis, quàm alterius rei, non facile putrescunt. Adde quod natura illos conseruat, quantum potest propter necessitatem, neque facile putrescunt: propterea quod semper euentantur, & minus permixti sunt impuro sanguine. Non eo inficias ex aëre infecto, & venenoso aliquam contagionem accipere primum, sed statim contagionem illam, aliis humoribus communicare. Neque propter illam febrem ephemeram dicendum ex putredine spirituum ortam. Nam & aliæ febres continuæ, vel putridæ primum accenduntur in spiritibus. Accedit quod si ex putredine spirituum fieret hæc febris, citius interficeret, neque cum excrementis tantis solueretur, sed cum sudore tantum, ut aliæ febres ephemeræ, atque etiam illa remedia conueniunt, quæ ab omnibus practicis imperantur. Quare in humoribus fieri dicemus. Harum febrium prænuntiationes difficillimæ sunt, iuxta illud Hippoc. Acutorum morborum, &c. Est tamen mortis prænuntiatio certa, propterea quod morbus magnus est, & peracutus, insidiosus qui magis vi illa venenosa inficit, quàm manifesta qualitate.

CVRATIO.

CVratur autem febris pestilens remediis sequentibus, sed primum distinguere oportet. num febris populariter grassetur, cū tumore aliquo externo, vel sine aliquo tumore externo multos occidat. Nos hîc de curatione illius quæ sine tumore externo est, dicimus. De carbunculo & eius curatione postea dicetur. Quò verò facilius huic feбри medeamur, meminisse oportet constitutionum præcedentium, ut qualis sit cacochymia, præco-

gnoscamus. Nam si constitutio calida & sicca fuerit, aut propter annonæ penuriam, capis, alliis, cruce, asparagis, brionio, & aliarum huiusmodi herbarum radicibus vsi fuerint, exquisita non erit, sed naturam tertianarum continuarum, aut ardentium referet. Si autem constitutio pituitosa fuerit, frigida & humida, post victum frigidum & humidum, minus ardens erit, sed naturam quotidianam referet. Sic de constitutione calida & humida, & victu sanguinem gignente dicendum est. Nam mitior erit propterea quod magis à plenitudine sanguinis, quam à vitio sit, sed raro id euenit. In curatione habenda est ratio horum humorum, ita ut alia ratione inuenienda sit cura febris tertianam referentis, alia ratione cura eius, quæ quartanam refert. Antequam medicus aliquid ad curationem præscribat, scire debet, num cum vomitione, aut cum alui deiectione facta sit. Nam si cum vomitione, aut alui profluuiio incipiat, sanguis non est mittendus, ne naturam imperum impediamus, qui potius iuuandus est iuxta illud Hipp. Quò natura vergit, eò ducere per loca consentientia. Et cum vtraque regio sit convenientissima ad humores euacuandos, per vtranque tentabimus euacuare id quod superabundat, non his remediis, quibus vulgus medicorum frequenter vitur, sed leuioribus & mitioribus. Si igitur non satis, vel difficile vomant ægri, porione aquæ calidæ, vel syr. vio. aut syr. acetoso simplici, facta frictione in gyrum circa os ventriculi, prouocanda est vomitio. Si autem aluius fluat, tunc clyster detergente iuuanda est natura, non fortiore. Quòd si istæ excretiones non fiant ab initio, neque statim futuras præuideamus, mittendus est sanguis statim, si vires, ætas, tempus, non dissuadeant. Nam morbus est peracutus, extremos habet labores, & citissime ad statum mouetur in quo silentium melius est habere, neque vires amplius ferre possunt, ob eam causam intra vigintiquatuor horas misisse sanguinem oportet. Facienda est sanguinis missio de basilica sinistri brachij, si nulla inflammatio interna appareat, quæ ex dolore, aliisque notis deprehendi possit. Fit autem ab ea parte propter cor & splenem, quæ duo viscera maxime patiuntur. Quo pacto facienda sit, in aliis, suo loco dicemus. Si propter tenellam ætatem, aut imbe-

*Apho. 21.
lib. I.*

Imbecillitatem, sanguinem mittere non liceat, cucurbitulas applicabimus naribus, ut reuellatur materia illa venenata à corde & medicamento purgante, leuiter corpus purgabimus, non argento viuo præcipitato aut fortioribus medicamentis, quemadmodum empyrici faciunt, sed danda erit triphera persica, catholicum, syr. ros. laxatiuus, rhab. quia ista euacuant sine magna agitatione, calfactione, viriû deiectione. Propter quas causas alia medicamēta vituperantur. Adde quod hic morbus propēsus est ad fluxum ventris, qui periculosus est, propterea quod corporis nutritionem impedit, & cōcoctionem retardat. Hæc etiam purgatio ante tertiû diem facienda est, ut etiam de sanguinis missione supra dictum est. Datur autem ℥.j. triphera persicæ cum aqua viol. & bugl. vel ʒ.vj. catholici cum aqua hordei, vel syr. ros. laxatiui ℥.j. ℥. cum decocto hordei, vel cum aqua endiuie & cichorei, vel expressio ʒ.j. Rhei, infusione facta in aqua endiuie & ʒ. ℥. syrupi rosati laxatiui. Si præcesserit vomitio vel aliquis fluor, damus rhab. vel tripheram persicam, quia minù laxant, & constrictionem relinquunt, vel minù calfaciunt. Facta autem euacuatione, siue per missionem sanguinis, siue alio medicamento statim ad ea, quæ corroborant, & venenum propulsant à corde, & agitationem sanguinis compescunt, veniendû. Datur autem ea in omnibus formis, hoc est, in forma conditi, instauratiui, & potionis. Fiunt autem ista ex pulueribus syr. aquis, conseruis. Sunt autem pulueres ad id faciendum apti, puluis diamarg. frig. qui mihi videtur magis conuenire, quàm alij pulueres: propterea quod minù calfacit. Puluis triasandali non est reiiciendus. Puluis diarrag. frigid. addito crytallo fit utilis, aliis cordialibus admixtis. Puluis de gemmis post. supradictos, sed in minori quantitate, & compositio alchermes cum volumus calorem semiextinctum accendere, vel cum syrupis illis narcoticis & stupefacientibus vii. Laudant Practici in peste & febribus pestilentibus puluerem beseardicum, qui posset conuenire, à motis aliis rebus calidioribus, ut leuine rutæ, dictamni, & radice tunicis. Alia enim omnia refrigerant, & siccant, & inspissando humorum agitationem impediunt. Foësius

Alexipharmacum vocat. Ad idem valet puluis contra pestem, traditus in dispensatorio Nicolai, remotis foliis dictamni, & tunicis radice. Quamuis enim ista valeant aduersus venena, nimium tamen calfaciunt. Adde quod ignoratur herba illa tunicis. Puluis de bolo minus conuenit propter multò plura medicamenta calida, vt galangam, lignum aloes, radicem tunicis, nucem moscatam, macis, cubebas, anisum, zinziber, garyophylum, & semen iuniperi. Quòd si dicantur reliqua, ex quibus componuntur hi pulueres, esse crassarum partium, nec posse penetrare sine adminiculo, dicemus cinamomum solum posse sufficere, vel admixtionem pulueris diamarg. frigidi, diatrag. frigidi, alchermes aliorumq; quæ recipiuntur in eadem compositione. Vituperanda est theriaca, maximè antiqua. Recens enim minus læderet. Sarius tamen est vti ad præcautionem tempore sanitatis, quàm in febre. Aqua buglossæ borraginis, acetosæ, scabiosæ erunt in frequenti vsu. Quarta die, & quando sudores prouocare studebimus, cum aqua cardui benedicti aquam acetosæ ministrabimus. Aqua myrthidis ab antiquis, magnopere commendatur, qua nos etiam vsi sumus. Conserua acetosæ, buglossæ, borraginis, cortex citri, conserua ros & nenupharis sunt in frequenti vsu. Ex istis parantur, quæ supra diximus, vt condita, hoc modo.

℞. conseruæ acetosæ ʒ i conf ros bugloss. an. ʒ. β. pulueris diamarg. frigid. ʒ. ij. sacchari ros quantum suff. fiat conditum, vtatur cum aqua bullita tempore sitis. Potiones autem tales erunt.

℞. pul. diamarg. frig ʒ. β. confectionis alchermes gr. ij. aquæ bugloss. acetos. ana ʒ. j. syr. de acetos. citri, vel de limonibus ʒ j. misce, fiat potus

Si autem conciliandus esset somnus, minuere oportet pulueres & addere ʒ. j. syr. de papauere & aquæ lactuæ. Instaurantia fiunt eo modo, quo monstrauimus facienda in capit. de Causo. Syrupi acidi omnes multum conueniunt, & ab omnibus laudantur, vt syr. acetos. citri, de limonibus, de granatis, de acetosa, de berberis, & similes. Cum aquis superius enumeratis fiunt syr. digesti, vt

℞. Syrupi de acetositate citri, vel de limonibus ℥. ij. aquarum bugloss. ros. acetosæ ana ℥. j. cum puluere diamarg. frigidi ℥. ij. aromatisentur, & capiat singulis matutinis. Extrinsecus adhibeantur epithemata cordialia, qualia sunt ea quæ descripta sunt in capite de causone, & post aliquam euacuationem supra cor, & hepar apponenda, ut minuatur ardor sanguinis, & tueantur partes à veneno. Ista remedia sufficient, modò quis dextrè utatur. Quòd si symptoma aliquod vrgeat, oportunis remediis oportet id minuere. Huic febrì solent aduenire, ut in principio somnus immodicus, quandoq; inexpugnabilis, & maximè quando cum tumoribus fit hæc febris. Quare erunt excitandi clamoribus, ligaturis, & frictionibus. Proderit etià oxyrrhodinum præparare cum vna parte olei, & aceri duabus partibus. Multum dormire est valde periculosum in morbis venenosis: propterea quòd in somno fit sanguinis reuocatio ad partes internas, & ibi retinetur venenum. Circa statum delirium statim eos infestare solet, cui occurremus remediis supra scriptis in cap. de syncho. Syncope huic malo familiaris est. Quare adhibenda diligentia erit, ut medicamentis cordialibus huic affectui medeatur. Si syncope propter oris ventriculi affectum prouenerit, & nauseabundi sint, remediū erit prouocare vomitionē. Postea medicamento leuiter astringente regionem oris ventriculi roborare, vel oleo rosarum, melino. insperso puluere corallorum, vel coriandri, sandal & rosarum. Si autem sit affectus cordis, parum confectionis alchermes cum aqua ros. vel syr. de acetositate citri dandum erit. Quòd si aliarū feb. symptomata superueniant, remediis præscriptis occurrèdum erit. Victus ratio in istis negligenda nō est, quæ initio tenuissima esse debet, donec cruditas ventric. vel alimentorum corruptio castigetur. Postea paulò crassiore est utendū, quàm si esset causus, vel alia febris, ob virium imbecillitatem, quæ semper deiectæ sunt, ob partium principum læsionem, sed quò melius victus rationem instituamus, cōsiderare oportet, quàm remotus sit status. Nam si ob sui acutiem statim ad statum perueniret, tenuiori victu utendum est si vires cum tali victu perdurare possunt. Si autem remotior fuerit

status, vt solet esse in feb. pestilentialibus, quæ quotidianæ naturam referunt, paulo crassiore victu vtendum est, vt vires conseruentur & ferre possint sæuissima symptomata. Medici summum illud ius morborum acutorum obseruantes, summa iniuria affecerunt ægrotantes, tenuissima illa victus ratione, in qua vires delinquant. Quare in hac febre tria potissima erunt, recrementa exagitata leuiter & facile purgare: alterum, vim veneni frangere medicamentis alexicis. Tertium autem, vires conseruare alimentis & potionibus cordialibus.

De febribus compositis.

LIBER II.

AD febrium cognitionem plurimum valet diuisio generis in species, deinde specierum diuisio. Quare rursus diuidemus, feb. in febres ordinatas, & inordinatas, siue erraticas. Rursus inordinatarum alix simplices, alix compositæ. Compositarum verò alix sunt ex simplicibus febribus, vt duplex tertiana ex duabus accessionibus tertianis, triplex ex tribus. Quotidiana ex duabus quotidianis, vel tribus, sed raro. Quartana duplex sit vel triplex. Compositæ ex diuersis febrium differentis, vel ex continuis, vel ex diuersis intermittentibus fiunt, vel ex continuis & intermittentibus, vt in hemitritæ. De erratica, quia simplex est, inter simplices enumerabimus, si prius demonstrauerimus has neque facile dignosci à quouis, neque facile curari. Omnis enim cognitio certa à quodam firmo & fixo capienda est, cum in his febribus nil certi & ordinati sit, nisi quod inordinate sint, & sabinde moueantur de vna natura in aliam naturam (quod erraticas & mutabiles facit) ab omnibus ordinatis distinguuntur, sed hoc nihil ad curationem. Nam ab eo nulla sumitur indicatio, nisi quod diuersi putrescant humores, & in diuersis locis, vnde accessionum diuersitas. De ea dicemus quid sit, & quotuplex sit feb. inordinata, quæ nullum ordinem seruat. Et quia ordo duplex est typorum & inuasionis, duæ erunt inordinate. Nam seruata typi forma, interdum præoccupat, interdum verò tardius mouetur, manente semper dierum figura, hoc est, quæ quotidiana erat quotidie, sed hodie prima hora, sequenti tertia, alia die septima, aliquando manè, aliquando serò. Hæc secundum partem inordi-

inordinata est, aut particulares inordinationes dicuntur. Habent sua nomina, quibus expresserunt antiqui, quæ immobiles sunt, & quæ præueniunt, & quæ celerissime horas præoccupant, *proegoumenoi* dicuntur, id est, præoccupantes. Quæ tardius mouentur, & tardantes dicuntur. At vero inordinatæ, quæ erraticæ dicuntur, sunt, quæ omnino typorum expertes sunt, id est, neque quotidianæ, neque tertianæ, neque quartanæ sunt, sed præter modos enumeratos, adhuc citra dierum ordinem fiunt, id est, quæ tertianæ paroxysmum, deinde quotidianæ, vel tertianæ, vel quartanæ, & nunc tardat, nunc accelerantur. Tales verò inordinatæ dicuntur, & sunt, quarum multæ particulares differentiæ sunt, quas difficile est enumerare, sed vnusquisque eas per otium speculari poterit. Hæ solent Autumno fieri ob diuersitatē humorum in corpore congregatorum. Aëstatis tempore & autumnī, temporis inordinatione solent fieri post longas feb. & spurias in corporibus debilioribus. Non enim possunt illam diuersorum humorum naturam vincere, & deriuare, qui multi sunt, & si ad vires referantur, multi simul. Sed si particulatim & seorsum sumantur, pauca est humorum quantitas, quæ est in causa quod ex eadem materia duæ vel tres accessiones fiant consequenter, vel quod bona fiat expurgatio. Plato illa recrementa vult subinde ab intemperatura visceris alicuius generari. Pauca retineri in corpore & cito putrescere ob caloris imbecillitatē. Ad earum curationem diligenter necessarium est inspicere, cuius visceris vitio id fiat, ventric. hepatis, vel lienis, si tumor aliquis in parte interna aut grauitas sentiatur. Talis pars in causa est vel intemperies.

Quare indicatione sumpta à parte affecta, intemperaturæ remedia instituere oportet. In hisce febrib. liberare ægrum obstructionibus, bonam procurare actionē & lubricam aluum habere potissimum est. Quare pilulæ sequentes, quia liberant ab obstructione, & leuiter euacuant, quæ sunt in visceribus, & non admodum calfaciunt, sunt ex usu. Dentur in crastinum accessionis, post primum somnum.

R. ag. in oxymel. infusi ʒ. j. rhei in aqua endiuia infusi ʒ. ss. cinamomi, spicæ, asari ana ʒ. j. succi api, petro.

liquir. an. ʒ. ʒ. cum oxymel. formentur pilul. sex pro ʒ. capiat semel in hebdomada. Deinde vtatur sequēti syr. per multos dies, interpositis quibusdam diebus.

R. rad. petro. apij, gram. ana ʒ. j. herbarum capil. endiuæ, cichorei, buglossæ, borraginis, scariol. agrimoniz ana M. j. anisi ʒ. j. seminis apij, petro ana ʒ. ij. quatuor semin. frig. maiorum ana ʒ. ij. florū cham. florum cord. ana p. j. fiat decoctio. In lb. j. ʒ. diff. syr. acetos. simpl. ʒ. iiij. sacchari quātum sufficit, fiat syr. arom. ʒ. ij. diarrho. abb. vel ʒ. j. cinamomi, capiat duobus diebus vel tribus sequentibus, & postea capiat ʒ. j. pil. Quod si æger pilulas deuorare non possit, cap. syr. sequentem.

R. Syr. de bizantiis & endiuæ compositi ana ʒ. iiij. aquæ absynthij, & buglos. ana ʒ. vj. arom. In illa aro. adde rhei grosso modo pul ʒ. ʒ. cinamomi ʒ. ij. infundantur ʒ. ij. agarici in prædictis aquis, vel leuiter bulliant, dum fiat syr. Vel si reperiatur syrupus de cichorio cum rheo paratus, detur, addita agari. infusione pro ʒ. iiij. syr. ad ʒ. ij. Quod si neque in forma syr. fiat pu. uis talis, de quo detur in brōdio pulli, & cicerum rubrorum.

R. Sennæ orientalis ʒ. j. rhei ʒ. j. anisi ʒ. ʒ. diagridij ʒ. ʒ. vt potentissimè moueat cinam. ʒ. j. fiat pul. de quo capiat post vsum syr. ʒ. j. vtatur diarrhodo abb. superbibendo aquæ absynthij & cicho. parū. Tertio quoq; die, hoc clystere vtatur, dū cessat à pil. & aliis medicamentis.

R. mal. ciclæ, merc. bugl. ana M. j. pass. sic an. nu. xx. seminis cartha. ʒ. j. flor. cham. p. j. fiat decoct. in lb. j. diff. mel. ros. ij. succi merc. ʒ. j. olei cham. ʒ. iiij. mis. fiat clyst. Hypochondria foueantur oleo cham. amygdal. amararum, & vino albo. Hæc sufficiunt ad februm citationem. Quod si symptoma oriatur ex supradictis remediis, erit occurrendum. Sed præter dicta accidentia, icteritia, & hydrops accidunt interdum. Quare illis erit occurrendum. Sed ea ipsa remedia, quæ ad curationem instituiamus, eadem affectum curabunt. Quod si fortiora necessaria, ad capita illorum recurrendum, à quibus accommodatissima remedia petantur. Vtatur optima victus ratione, & magis sit attenuans, quàm inspissans, vel obstruens Vtatur vino albo, vel claro. Iusculis cum radicibus petro. & foliis. Eligat auicularum.

rum carnem, & reiciat crassam, & pedes animalium. Si cruditatem patiatur, vomat.

De compositis, mixtis & confusis febribus.

Compositæ febres simplicibus opponuntur, & illæ sunt compositæ, quæ præter vnius generis febrem, sui generis vel alterius vnâ, vel duas accessiones habent adiunctas, vt sunt duplices, vel triplices quartanæ, tertianæ, quotidianæ, vel semitertianæ omnes, vel febris commixta continuæ. Quare non leuiter errauit Gordinius, alioqui vir doctus & prudens, qui hepialem febrem compositam dixit, quod pars materiæ, quæ putrescit, calorem efficiat: pars, quæ putruit, frigus. Nam febres ducuntur à materia putrescente, non ab ea, quæ non putruit. Nulla enim materia sine inflammatione, vel putredine febrè immediate suscitât. Quare non est dicenda composita, aut dicere oportet omnes febres putridas cõpositas esse, quod est absurdum dictu. Inepta esset febrium diuisio in simplices & compositas, si omnes esset compositæ. Nulla est enim febris putrida, quæ materiâ putrescentem, & non putrescentem non habeat, sic omnes essent compositæ. Nec ob id dicendum est ob sensum caloris & frigoris, febrem illam compositam esse. Nam in intermittentium principiis talis sentitur sensus, dum interna calent, externis refrigeratis adhuc ob caloris reuocationem, vel ad interna retractionem, quod manifestissimum facit sitis, quam frigoris tempore patiuntur ægri. Neque enim febres propriè compositæ dicuntur cum accidentibus. Accidentia sæua, sæuos morbos etiam, vt corpus vmbra sequuntur. Neque etiam febres compositæ dicuntur à diuersa simpliciter diuersorum humorum commixtione. Nam omnes febres puræ, compositæ essent. Oportet enim humores, qui febres faciunt compositas, ad tantam peruenisse copiam & putredinis gradum, qui si soli essent, febrem facere possent. Nam omnis putredo febrem facit, vel humoris putrentis quantitas. In catarrho salso inest aliqua pituitæ putredo, vnde falsugo. In tumoribus præter naturâ partium externarum est putredo, sine febre tamen. Quare illæ tantum compositæ sunt, & dicuntur, quæ ex diuersis accidentibus sui generis, vel diuersi cõponuntur, quo-

rum ratione Medicus curandi rationem variat. Dico propter febrem ephemeram, quæ omnibus febrib. aliis putridis & hecticis coniungitur. Qui enim fieri potest, ut quod inflammatur facile, non inflammatur, inflammato, quod ægrius accenditur, ut humoribus & partib. solidis? Omnis substantia tenuis facilius inflammatur, quàm crassa. Verùm, quia hæc semper fit & in omnibus, & nullam curam per se desiderat, ob id Medici antiqui commixtionem illam prætermiserunt, quæ semper est.

Diuisio febrium compositarum.

Febres cõpositæ sunt, vel eiusdem generis febres, vel diuersi. Eiusdem generis in continuitate, vel intermissione materiæ, ut duæ febres cõtinuæ simul infestantes, confusæ febrem faciunt compositam. Quomodo id possit fieri, postea inuestigabimus. Sic duæ intermittentes iunctæ, compositam faciunt eiusdem generis, & materiæ, ut duæ tertianæ, duæ quartanæ, quotidianæ, ambæ sunt intermittentes, & à materia biliosa. Si ex eiusdẽ generis intermissione, & materia duplices dicuntur, si vna accessio vni addatur: triplices, si duæ vni. Ita fit ut omnes in vna periodo, vel interuallo fiât, & sic sunt duæ quotidianæ, cùm intra viginti quatuor horas duæ accessiones cum frigore fiunt. Tertianæ duplices, cum tertio quoq; die duæ accessiones fiunt cū rigore & vomitu bilioso, & soluuntur sudore. Triplex, si tres sunt etiam triplex tertiana, ut docet Gal. 2. de crisi. Talis febris formam tradidit eo in loco, quem se cognouisse secunda die gloriatur. Quartana duplex, & triplex facta composita dicitur. Triplex quartana facilius cognoscitur, quàm tertiana triplex: quia plus temporis intercedit. Verùm, & quotidiana accessionem quotidie facit, quod iis imponit, qui ex circuitu febrem distinguere volunt, non ex natura febris & accidentibus. Ex diuersis generib. fiunt, ut ex continuis & intermittentibus, ut si quotidiana tertianæ adiungatur, cùm primo quidẽ die inuadit bis, & bis remittitur, die sequenti semel, tertio verò rursus similiter. In primo die inuadit, in secundo bis, tertio die semel. Quotidiana etiam quartanæ commiscetur, cùm prima quidem die, bis inuadit, duobus sequentibus diebus semel, quarta die bis. Non solum vna febris vni miscetur,

miscetur, vel complicata, sed etiam tribus diebus di-
 uerforum generum, vt quotidiana, tertiana, quartana
 inuicem miscentur, cum dies quidem prima tres habeat
 accessiones, secundam accessiorem, tertia vero duas,
 scilicet, quotidianam, & tertianam. Quarta rursus duas, sci-
 licet, quotidianam, & quartanam. Quinta vero duas, ter-
 tianam & quotidianam, atque in reliquis diebus idem cum
 primis, ordo seruabitur. Tertiana quartanam iungitur,
 cum dies prima duas inuisiones inducat, totidemque
 remissiones, secunda vero, nullas omnino inuisiones
 adducit, tertia vnam, quarta vnam, quinta vnam, sexta
 nullam, septima vnam, & sic deinceps commiscuntur ad-
 huc tres, scilicet tertiana, quartana, & quintana. Prima
 die, accessio tertianam tantum, secunda nulla, tertia vna,
 quarta vna, quinta duae tertianae, & quintanae, & sic de
 aliis. Simplex cum composita, vt tertiana cum semiter-
 tiana, quam commixtionem Gal. 2. de crisib. & de typ. is
 monstrauit, quae fit, cum quotidiana continua, cum dua-
 bus intermittentibus tertianis coniungitur. Hic no-
 tandum est, quod tales coniunctiones, etiam omnes
 vno die, simul, & hora non incipiant, sufficit in vna pe-
 riodo istas compositiones duarum, vel trium inueniri,
 & postea eodem modo progredi. Sic in haemitritia fit,
 vt prima die incipiat tertiana sola, postea, quotidiana
 continua procedente tempore inueniatur. Haec enim
 omnium intermittentium difficillima, quam nemo im-
 possibilem esse affirmabit, cum diuersi humores non na-
 turales, in diuersis locis discreti inueniantur, bilis in ve-
 fica fellea, pituita in ventriculo & intestinis, melanco-
 lia in splene. Cum separati & impermixti reperiantur,
 quid impedit simul putrescere, cum obstructio sit com-
 munis causa prohibita euétationis, & prohibita euent-
 tio putredinis? Pretereacaloris naturalis, aut facultatum
 corpus nostrum gubernantium imbecillitas, humoris ad
 putredinem dispositionem habetis preparatio, & causae
 efficientes? Non est difficile diuersas febr. fieri, vt in humo-
 ribus naturalibus, qui in venis contineantur. Quomodo
 fieri possunt diuersae febr. continuæ, difficile creditu est.
 Nos tamen fieri posse experientia ipsa didicimus, & ex
 Galen. tales febr. constitutæ sunt. Febres synochos posse

simul confundi, hac ratione ostendo. Euenit aliquando aliquibus, vt sint habitu pituitoso, & tamen bilem euacuent. Si pituita putrescat in venis habitus corporis, sit quotidiana continua, sic bilis, quæ euomitur, si genita in venis minoribus putrescat, sit febris confusa ex tertiana continua, & quotidiana continua. Vel sanguis, dum putrescit, vertitur in bilem, crassa pars in melancholiam, cessat synochus, & si putrescant duæ istæ partes, altera faciet tertianam continuam, altera quartanam continuam, & sic erit febris ex vtraque confusa, & permixta. Verum, quia illæ febres ob permixtionem confunduntur, & semper magis in alteram vergunt, vocantur ab humore, qui magis se promit & manifestat, quæ & si minus exactè & citò dignoscatur, parum aut nihil damni accidit, quia certissimum est omnium febrium continuarum remedium, missio sanguinis, quæ in omnibus conuenit, clysteres, victus ratio tenuis. Quare citra illa exactam cognitionem, si modò syrupo acetoso simplici, vel capillis vener. vtamur, qui syrups in omnibus febribus conuenire possunt, curantur hæ febres. In principio, cum omnia sint mitiora, non distinguuntur, sed circa statum & ex declinatione, & symptomatum propriorum remissione, vel in illis sunt symptomata, quæ media sunt. Discernuntur, vt supra. vigiliis, somno profundo. Fiunt vigilie, sopor, pro rigore, & horrore, & frigore. Sic per signa syncerarum, & febrium continuarum facile cognoscet istas confusas. Sed vulgus Medicorum non vltra progreditur, quàm ad genus, cognita febre, quæ non definit ad infabricitationem, continuam vulgus vocat, illa cognitione vniuersali contentus. Quare si illos vulgares Medicos interrogemus, quis morbus, quæ febris sit, satis bene se respondisse putant, si dicant febrem continuam, quasi vnum tantum genus febrium continuarum esset. Quare vos precor, vt tales asinos prætermittatis, & præter eorum consuetudinem speciem febris vltimâ inuenire omnibus modis studeatis, vt citius morbum propulsetis. Pudet recensere, quantum cæcutierint maiores nostri, & qui eos sequuntur, quibus nunquam contigit agnouisse speciem semitertianæ, de qua hoc loco dicere con-

constituimus, vt februm omnium compositarum types
& formas cognoscatis.

De semitertianis febribus.

Istæ febres, vt prius dictum est, vel ex intermittentibus
duabus, vel tribus componuntur eiusdem generis, vel
ex continuis, vel confunduntur. Tertium genus est, quod
ex utroque genere componitur, scilicet, ex continuis, &
intermittentibus, quales sunt, quæ appellantur semiter-
tiana. Componuntur ex continua quotidiana, & tertia-
na intermittente, vt autoritate & ratione ostendemus,
si prius de nominis ratione aliquid dixerimus. Oportet
enim nominis significatione inter nos & antiquos con-
uenire, neque vt rem difficilem, & inutilem prætermi-
tere debemus: quia nominis quæstio, quid sit, præcedere
debet. Quod autem facilis non sit nominis huius hemi-
tritæ, vel semitertianæ cognitio, de huius significatione,
antiquorum Medic. variaz sententiæ ostendunt, vt mul-
torum consensus de varietate coniecturam præbet. De
hac nominis significatione multa Gale. scripta reliquit,
vt lib. 2. de different. feb. lib. de typis 2. de crisib. & 1. epi-
dem. comment. 3. Inter antiquos neque de si. nificatio-
ne, neque de etymologia satis conueniebat. Eam ob cau-
sam Agatinus solum primum librum scripsit de semi-
tertiana, in quo nominis significationem inuestigat, teste
Galen. libr. 1. epid. comment. 3. Agatinus semitertianam
relatione ad tertianam dictam esse censet. Et Gal. anno-
tat lib. de typis alia ratione dici. Porro, inquit, quidam
semitertianam appellatam esse aiunt, quemadmodum est
semicirculus & semisphæra. Alij vero appellatam volût,
quasi sesquialteram, vt si tertianæ inuasio, verbi gratia,
12. horis constet, semitertianæ sanè 12. horas tertianæ
comprehendet, atq; his adhuc dimidium duodecim ho-
rarum adiiciet, atque omnes octodecim numero erunt.
Ita vt dimidio maior tribus per circuitum repetentibus
typis quotidianæ, tertianæ, quartanæ, quæ ratione ipsa
24. horis constare asseruntur. Alij febr. omnes tertianas
extensas hemitritæas, vel semitertianas appellabât. Ga-
len. missa hac nominis improprietate scripsit 1. epid. cõ-
ment. 3. Equidè illud (Hipp. intelligit) vocabulū impro-
prium reprobare censco, siquidem illis, quæ integrant

non sunt affectura absolutionem, dimidij vocabulum attribuimus. Itaque dicimus semimortuū, semimortalē, semideum, semiuultum, & id genus alia: At semitertiana tantū abest, vt dimidia sit tertiana, vel multitudine symptomatum, vel viribus, vel horum tōta cōditione, vt longē etiam sit deterior, vel potius huius illa, quā hęc illius dimidia esse videatur. Quare non venit mihi in mentem, qua re adducti sic potius nomen imposuerint primi istius nominis inuētores, quā aliter. Poterant tamen hi, cū tertiana febris habeat, vt in tertio quoque die, inuadat, & ad integritatem veniat, ita vocabulum in-
stituisse. Habet enim, vt tertio quoque die inuadat (aiūt) ad integritatem veniat, non item. Poterant præterea, & quod accessione careat, cum rigore incipiente adhuc, non quod excretionē fiat, iam quod diem integram secundū non habeat. Hactenus Gal. de nominis ratione. Sed nos semitertianam appellamus cum Hipp. feb. illam quæ ad statum statim tendit, horrida, & continua acuta, omnino non intermittens, vno die leuior, altero grauius inuadit, & geminationes, vel reduplicationes habet, tanquā quid proprium, cū accessionum extentione. Vel vt manifestius Gale. 2. de diff. feb. explicat, & nominis & essentia rationē his verbis cap. 7. non abs re inditū huic feb. nomen hemitritæi. Nam ex quotidiana continua, & tertiana intermittente tota eius natura confusa, dimidiam partē vtramque harū feb. retinet. Sicut igitur semiasinus & semideus nomen tale sortiuntur, ita hemitritæus est. Semideus dimidia quidem parte deus esse mōstratur, cū verò alterā partem hominis habet, hæc pars in homine omittitur. Sic hemitritæus dimidiā eius habet tertianā, alteram quotidianam continuā. Sed hæc forsitan de huius nominis ratione, & eius natura vniuersa plus satis. Quomodo autē fiat, id demonstrare aggrediar & quotuplex sit. Sed quod semitertiana fiat ex quotidiana cōtinua, & tertiana intermittēte ex Hipp. verbis colligitur, & hac ratione ab illis petita demonstrari potest. Cū composita sit, impossibile est vnā & eandē simplicem continuā & intermittētē simul esse. Quare compositam esse necesse est non ex duabus continuis, non ex duabus intermittētib, ergo ex continua & inter-

mittente. Verum quod non fit ex duabus continuis, patet. Si esset ex continuis, non esset horrida. At ex Hipp. horrida. Igitur non ex continuis. Horror & rigor siquidem fiunt, cum per partes sentientes, è venis humores acres, & mixti sparguntur, quod non fit nisi in principiis intermittentiũ. Ex duabus intermittentibus non fieri sic demonstro. A quibuscunque fierent, illæ desinerent in in febricitationem aliquando, quare non esset continua. Quare ex continua & intermittente fieri necessario sequitur. Verũ fieri posset ex tertiana & continua & quotidiana intermittente, & contra, sed quod ex tertiana continua nõ fit, manifestè ostendimus. Si tertiana continua fit & quotidiana intermittens, tertiana continua continuo affliget, intermittens verò quotidiana quotidie accessionem longissimã haberet, non ergo alter dies leuior esset. Adde quod nõ esset horrida, sed cũ refrigeratione inciperet. Quare cũ neque ex tertiana continua fieri necessario, quæ nunquam desinit ad integritatem donec soluta sit integrè, & ex tertiana intermittente. Illa intermittens facit horrorem, qui parum differt à paruo rigore, facitque vt morbus grauior appareat quotidie, & in illa reduplicaciones fiunt, ob retardationem à pituita factam. Quotidiana verò facit, vt in multos dies extēdatur. Tertiana etiam illam reddit acutissimã ob symptomata, quæ hæc febris inuolueret solet, de quibus postea. Huius febr. duæ sunt species, altera exquisita dicitur, altera non exquisita. Exquisita est, interprete Gale. in qua est æqualis mixtura duarum feb. quæ ex duobus humoribus constat, qui cùm admiscuntur, horrorem faciunt. Non exquisita, quando alter humor vincit, vt idem author scribit. Atque non est exquisita vbi aut bilem, aut pituitam habet præpollentem. Cognoscitur, quod bilis præualeat, si rigor magis, quàm horror fit, & ad statũ celerius peruenit, sine multis reduplicacionibus, & calor magis acris est & euidentior, & vomitiones, & aliæ excretiones magis synceræ. Symptomata, vigilie, sitis, & alia magis bilem, quàm pituitam referunt. Non exquisita ob pituitæ dominium est, si frigus potius, quàm horror fiat. Plures reduplicaciones, tarditas caloris, & paucitas sitis, excretiones magis pituitosæ. Exquisita verò incipit cum

horrore ob mixturā frigoris & rigoris, & partem bonam accessionis in reduplicacionibus cōsumit. Semitertianæ tres sunt differentię à Gal. traditæ. Est enim quæ parua dicitur, altera magna, tertia inter has duas posita, media dicitur. Differunt lōgitudine & breuitate hæ tres, vt Galen. inquit, quòd ob magnitudinem differentias habet. Alia enim semitertiana exigua, alia media, alia magna. Exigua est igitur quæ circa 24. hor. torquet: media, quæ circa 36. horas: magna, quæ circa 48. quæ continuæ feb. est proxima. Verum vnde petatur istæ differentię, multi hæsitant. Alij à pituitæ & bilis maiore vel minore quantitate, vel crassitie. Sed quòd à magnitudine nascantur hæ tres differentię, dubitatur an à duratione paroxysmi vel à remissionis tēpore, vel interuallo, quod aliqui voluerunt dicere, sed hoc potius ad magnitudinē, id est, ad longitudinem paroxysmi, quàm ad aliud referendum est. Quare non ad cōtinuam, sed ad intermittētē has differentias referri oportet. Quòd si ad intermittētē, rursus inuestigandum, num à tertiana exquisita, vel à tertiana simpliciter, vel à producta referri oportet has differentias. Tot enim sunt tertianarum differentię apud Gal. Nos ad exquisitam non esse referendū diximus, quia accessio ad 12 tantum horas extenditur, semitertiana 24. hor. pro accessione habet. Neque etiam ad simpliciter tertianam, quia illa non potest extendere paroxysmum ad 24. horas. Quare concludere oportet à producta, seu extensæ tertianæ accessione colligi, propterea quòd extensæ tales accessiones habet, vt ex Gale. & quotidiana experientia cognouimus. Gale. harum extensiones 2 de differ. feb. cap. 8. hunc in modum scripsit, Omnium februm fons & principium, atque elemētum, &c. Neque plurima est earum multitudo, cū omnes tres numero sint, vt quæ ex amara bile, & quæ ex atra, & quæ ex pituita generantur, quarū singulæ duas habent differentias, continuas scilicet & intermittētes. adeò vt omnium, quæ ex humorum putredine ortum habent, fiat sex numero differentię. Quòd si aliqua illis accesserit, in his particulatim cōtinetur. Differentia ex humoris copia, quantitate, vel ex qualitate, vel ex putrefactionis qualitate, præterea ex modo motus, ac particula, in qua putredo habebit,

origi-

originem, veluti earum febrium intermittentium, quæ tertio quoq; die accessionem faciūt, quæ quidem breue habent accessionis tēpus, & tum rigore inuadunt, & per sudores, & vomitū bilis, & biliosa excrementa finiuntur. His etiam tertianæ exquisitæ nomen inditū est. Quibus verò aliquid deficit, hæc nō exquisitæ, sed simpliciter tertianæ appellantur. Quod si intermissionem breuiorem, accessione, videlicet, in longius tempus producta, hæc tertianæ productæ vocātur, cum tantum hæc ipsa res in eo, quod magis & minus suscipit, differentiam habeat. Licet quidam ex his aliquā simpliciter extensam nuncuparint, quæ cum 24. horas in accessione consumpserit, reliquas horas febris expertes habet, aliquādo sufficienter extensam, quæ ad 30. extēditur horas, atq; etiam amplius vsque ad 40. vel plures. Hactenus Gal. Nunc cuius gratia hæc transcripserimus ostēdamus. Hoc manifestissimè monstrat hemitritæum fieri ex tertiana extensa. Nam accessio parua semitertianæ respōdet durationi febris simpliciter extensæ, media, tertianæ in longius tēpus extensæ, scilicet, ad 36. horas. Magna verò accessio respondet tertianæ amplius productæ, cuius accessio ad 40. vel plures horas protēditur. Semitertiana verò maxima, quæ circa 48. horas (quæ febri cōtinuæ proxima est, propter extensionem magnā accessionis) est lethalis & periculosa ex Hipp. quod intelligendū est de acuta, vel quando in hac febre morbi eueniunt acuti, vt Hipp. loquitur in epid. cōm 2. aph 3 In febre, quā semitertianā vocāt, morbi veniūt acuti, tū præter cæteras, est lethalis. Puto Hipp. per acutos morbos, acuta symptomata, quæ in hac eueniunt, intellexisse, quæ multa sunt, & grauissima, vt experientia docet, & hæc enumeravit lib. de typis Gal. Atq; inquit, semitertiana periculū minatur, eo quod non solū stomachum, & partes nervosas attingat, & in vniuersam eas ad huc, quæ media cōpositione existūt, verū etiam veterinosos inducit sopores, atque cū deliriis annexas vigilias, nōnunquam & resolutiones, quas syncope comitatur, vnde linguam valde siccet, atque animi defectū efficiat, eūmq; in profundo vehementius moueat. Typus hic ferus est, ac vndiquaque periculum portendens. Quandoque autem prima die constituitur, quemadmodum & alij typi,

interdum verò à secundo & tertio incipit, quò fit, vt huiusmodi inuafione promptissimam Medicis curandi causam exhibeant. Oritur autem nonnunquam à tertiana producta, nonnunquam etiam soluta in tertianam permutatur, interdù in duas tertianas, & quartanas ob inuafionis lōgitudinem dirimitur. Quod attinet ad naturas, virilem corrumpit: quod ad ætates, florentem maximè, quod attinet ad anni tempora, in Autumno præsertim, quādo valde periculosa existit. At verò nō perpetuò cōtinua est, sed intermittēs quandoq; inuenitur, atque ab Hipp. traditū est, nō solū inter morbos acutos, verū etiam inter diuturnos morbos numerari. Solet etiam his accidere, qui tabe, & aliis morbis laborāt, vt 1. epid. com. 3. aph. 3. At tabidi & qui longius aliis morbis detinētur, hac præcipuè ægrotant. Satis de feb. cōpositarum accessione, quæ nihil aliud est, quàm reduplicatio accessionū vel permixtio varia febrium. Quare qui simpliciu annotationes & signa ad vnguē tenet, faciliè duplicatarum, complicatarū, aut mixtarum naturam cognoscer. Quare nihil aliud addendum censeo, nisi quod diligenter, & attentè (si post duas accessiones nō euidenter feb. specie cognoueris) redeat rursus ad inuestigationē, consideret si simplex sit, vel cōposita. Simplicem ex simplicibus accessionib. cognoscer. Deinde nū exquisita, vel producta, considerandum. Si producta, ad quot horas extendatur, vel ad 24. vel ad 36. vel ad 48. Quod si nulla febris adsit, tales esse ex paroxysmi inuafione luce meridiana clarius est. Si composita, ex duplicatis, vel ex confusis. Confusæ sunt cōtinuæ. Duplicatæ sunt vel quotidianæ, vel tertianæ, vel quartanæ. Quod si neq; ex confusis, neq; ex duplicatis, aut replicatis, ex hemitritæis esse oportet, exquisitis vel spuris. In vtraque enim est cōtinua quotidiana, & intermittens tertiana. Quod si æqualiter mixtæ sint, exquisita est. Si verò vel magis bilis, vel pituitæ naturam referat, spuria est. Quare in cognitione non errabit. Sed qui morborum exactam cognitionem negligit, vel illos fieri ignorat, in inuestigatione toto cœlo aberrat & tantū in curatione aberrat, quātum in cognitione peccauit. Curātur duplices, vel triplices, vt spurix, vel extensæ sui generis. Hoc est duplex, vel triplex tertiana, vt extēsa.

Febres

Febres quartanæ duplices, vel triplices, vt quartanæ cōtumaces, nisi quod mitius cum illis est agendum: quia ex duplici fit triplex, & ex triplici fit cōtinua, quæ lethalis est, vel admodum periculosa. Commixtæ difficilior curantur, quàm duplices, vel triplices: propterea quod cum sint ex diuersis humoribus multum à se inuicem differentibus, & putrentibus eodē tempore, diuersis in locis, non vno medicamento curari possunt, vel alterante vel concoquēte, sed vnusquisq; suum medicamentū determinatum desiderat. Alter alterū impedit, & retardat. Quare vnum vtile & saluberrimum præceptū inueniri, vt medicamentis mixtis, id est, mediis vtamur, tam alterantibus, quàm laxantibus. Quare non erit præter institutū hīc obiter aliqua considerare, quæ materiæ biliosæ & pituitosæ cōueniunt. Syrup. acetosus per se attenuat pituitæ crassitiem, & bilis acrimoniam obtundit, & obstructions, quæ in quotidianis, & quartanis euenire solent, aperit. Syrup. capil. ven. non malè quadrat. Syrupus endiuie, si aquæ attenuantes, & aperientes, vt apij, petros. addatur in febribus ab vtroque humore factis. Cōuenit violatus, in materia biliosa, & melancholica. De stechade, in pituita, & melancholia naturali. Inter laxantia, catholicum syr. ros. laxatiuus, agaricus in pituitosa & biliosa: cordialia in omnibus, vt borrag. bugl. herbæ capil. &c.

Curatio Semitertiana.

Semitertiana curatur deterfis intestinis, clystere detergēte, missione sanguinis ad ʒ. ʒ. vel plures, si vires, ætas, regio, & alia cōsentiant. Hæc enim omnibus putridis continuis conuenit, & febribus tertianis spuris, vt supra monstratum est. Ergo & in hac, hoc tantum inspiciendum, an sit semitertiana acuta futura, vel longa. Quod si acuta, statim, nisi cruditas ventriculi impediat, vel cibi plenitudo, mittendus sanguis. Si longa sit futura, post duas aut tres accessiones, vt Gal. faciendū docuit 1. ad Glau. Quod si nō liceat, propter aliquam occasionem mittere sanguinem, dabimus minorans medicamentum. Missio sanguine, non nocebit syrupos dare ad alterationem, & viriusque materiæ præparationem ex supra enumeratis.

℞. syrapi acetosi simplic. capill. veneris ana ʒ. i. ss. aque endiuie, bugl. capill. ven. ana ʒ. ʒ. ss. aromatizentur

cum 3 i. diarrh. abb. & cap. in tribus matutinis. Interea dum vitur his syrupis, inīciatur clyster sequens.

R. mal. merc. ciclæ, borrag. ana M. i. prunorū num. xx. quatuor sem. frig. maiorū an. 3. 3. anisi 3. 2. florum cham. p. 2. floru cord cōmunis p. 1. fiat decoctio. In cuius lib. i. diss. mell. viol. 3. 2. succi ciclæ 3. i. olei viol. & cham an. 3. 2. misce fiat clyster. In processu infunde in vna parte decoctionis clysteris agarici 3. 2. Finitis syrup. inspicere oportet, in qua parte morbi sint febres, vel in augmento, vel in statu, vel in declinatione. Quod si in incremento ambæ sint, laxandum, si vires ferant. Si in declinatione, laxandum, quia non integrè morbus est solutus. Quod si in statu ambæ, quod est difficile, propter materiæ diversitatem, melius est silentium habere. Quod si biliosa in statu sit, & continua in incremento, euacuandum est, ad pituitæ diminutionem. Si verò continua sit in statu, melius est silentiū habere: quia plus est periculi in cōtinuæ statu, euacuatione, quàm in intermittētis statu. Medicamenta media, vt agaricus, catholicum eligi debent. Rhab. si vsurpetur, in vino albo infundatur, & aqua endiuæ. Syr. rosatus laxatiuus non est prætermittendus. Si symptoma aliquod ex iam commemoratis infestauerit, non erit negligēdum. Nam aut euacuationem suadebit, aut dissuadebit, vt syncope, animi defectio, conuulsio, somnus veternosus, corporis grauitas, plenitudo. Hæc ad illā curandā, quæ sine supra enumeratis accidētibus est, sufficiunt, cum supra dictis aliis, ad viriū cōseruationem.

Victus ratio optima esse debet, cibus dandus, & missio sanguinis, & medicamenta purgantia in die & in hora minoris afflictionis. Quod si post alias febres fiat, vt in tabidis, & aliis debilibus naturis, vel ætate, vel morbo, tunc prætermittenda missio sanguinis, sed eos curare oportebit, vt eos, qui syncope, vel animi defectū patiuntur, vt qui hunc in modū curandi veniunt. Si animi defectus, vel syncope fiat ob affectum oris ventric. quod ex dolore, vel morsu, vel nausea deprehenditur, in illis vomitionem facere, & mouere oportet, iniecto prius clystere, ne excrementa sursum consecutione quadam ferantur. Reddito clystere & perpenſis excrementis, vel coniectura artificiosa cognitis, si erudi succi, vel prau

biliosi

biliosi sint, ventriculi os mordicantes, non alio modo curari vult Galen. exolutionem factam à prauis & biliosis, & alio modo à crudis. Illius exolutionis causa, curationem partis affectæ, situm, regionem, per vomitum indicat. Ergo detur aqua tepida, quòd si non vomat, detur hydrelæum, vt Galen. præcipit. Quòd si non facile vomat, calfaciendæ sunt partes ventris, & fouendæ oleo calido, vt relaxentur, non autem manus & pedes ad vomitum prouocandum. Nam sic potius impediretur vomitio, tractis humiditatibus ad partes remotas, sed tantum indicatione à syncope, in qua omnes spiritus recurrunt ad cor, veluti ad cætrum & fontem spirituum, sumpta. Quòd si neq; illa remolliitione vomat, missis in os, vel penna, vel digitis, stomachus irritandus est. Sin neq; sic vomat, rursus oleum calidum, quàm optimum exhibendum. Id autè non solum vomitum prouocare, sed etiã ventrem lenire solet. Id quod nõ parum ad rem, de qua agitur, facit. Quocirca nisi sponte accidat, arte prouocare oportet, maximè appositis remediis, quibus si facile vomat. absynthij coma aquæ mulsæ iniecta, in potu danda est. Deinde modis omnibus roborare partes, tũ medicamentis forinsecus impositis, tum absynthij potu. At non per initia quidè, sed post, purgato corpore, scilicet. Nam cùm ventriculus continet prauos & crudos. cibos, astringendus non est. Hęc Gale de exolutione à biliosis humoribus. Nos verò nostris syrupis vti possumus ad materiæ deterfionem, & ventriculi corroborationem, vt syrupis, conditis, vnguentis & aliis leuiter laxantibus, sine magna agitatione. Syrupti sunt endiuizæ compositus, & simpl. capil. ven. Aquæ endiuizæ, absynth. cichor. scar. vt

℞. syr. endiuizæ simplic. & capill. veneris ana ʒ. i. aquæ cichorei, end. & absynthij ana ʒ. ss. aromatisetur ʒ. i. diarrh. abb. &c. pro vna dosi, & reiterentur. Conditum verò pareretur hoc modo.

℞. conseruæ capill. veneris, conseruæ florum cichorei ʒ. ʒ. conseruæ bugl. ʒ. ss. pul. diarrh. abb. diatrag. frig. & triasand. ana ʒ. i. sacchari q. ss. Si verò syncope esset, diamarg. frig. loco aliorum ponenda est ʒ. i. Inunctiones ex ol. cydoniorũ & ros & absynthij & non nisi post vomitionem, quia astringunt. Si vires ferre possunt,

rheum infusum, & expressum, syrupus rosatus laxatius cum aqua hordei conueniunt. Quod si nō potest ob frequentem animi defectum, frictionibus reuocare & euacuare oportet clysteribus detergentibus. Si verò causa exolutionis sit frigida, pituita in ore ventriculi collecta, plurimum fouere oportet ol. cham. & nardino, & eo, in quo absynthij coma cocta sit. Mulsam dare, in qua hyss. vel id genus maduerint, & acetum mulsam (cui addit Galen. piper.) cōuenit. Dari potest syrupus acetosus simplex, aqua hordei decocta cum pauco pipere conuenit. Gal. præcipit, diospoliticū, & diatrium pipereum. Si hæc in cruditate conueniant, in syncope cum febre reiicienda, quia calidiora & sicciora Vsurpanda verò ea, quæ à nostris fuerunt inuenta, vel pulueres cordiales, stomachici, vt pul. diarrhod. abb. aromatici rosati, rosatæ nouellæ, de gemmis, ex quibus etiam potiones, & condita parantur. Nos igitur occurremus huic feбри, cui adiuncta syncope, vel animi defectio, syrupis cōcoquantibus, & conditis, & suprà dictis inunctionibus. Ante inunctionem iniiciatur clyster detergens & laxans. Deinde syrupo acetoso, vel mulsæ, vel aqua tepida cum syrupo capillor. veneris prouocetur vomitus. Dentur syr. concoquentes, detergentes pituitam, quales sunt syrupi conseruationis corticis citri, syrupi capill. veneri., acetosus simplex. Diluantur aquis apij, petro. aqua distillata hyssopi, mentæ, betonicæ. Istæ quanquam astringendi vim habent, illam perdunt in sublimatione, quia per illam separantur partes terrestres ab aliis partibus. Quare sine reprehensione dare possumus, vt Gal. aquam mulsam, in qua coma absynthij fuerat macerata diu, dederit. Nō autem dandus est syrupus de absinthio ob succum cydoniorum. Hi syrupi cōcoquant, leuiter detergent materiam, quæ os ventriculi leuiter obsidet. Galenus aqua hordei cum pipere dat, quod puto faciendum in spuria tertiana, ob pituitæ dominium, & in ea, cui syncope adiuncta est. Condita parantur hoc modo.

R. conseruæ corticis citri ʒ. i. conseruæ radicis buglossæ & capillorum veneris ana ʒ. ss. pul. diarrhod. abbatis ʒ. i. vel aromatici rosati ʒ. ss. vel rosatæ nouellæ, capiat per se, vel cum aqua hordei. Si vires ferre possunt,

sunt, medicamentum purgans detur tale.

℞. glyc. raf. 3. ij. pass. par. x. anisi 3. j. agarici in panno ligati 3. j. ℞. florum cordialiū p. j. fiat decoctio. In quartario vno, dissolue syrupi rosati laxatiui 3. ij. zinziberis, & cinamomi ana ʒ. ℞. fiat potio.

Rhabarbarum infusum & leuiter expressum addi potest. Infundatur in vino albo, & pro 3. j. addatur cinamomi ʒ. j.

Non probo Practicos nostros, qui in hoc affectu grauissimo & vehementissimo turbith præscribunt, immemores theorematum vniuersalium, & turbith facultatum. Quòd si obiciant agaricum, dico medicamentum esse familiare, & securum. Adde quod decoctum datur non in substantia. Hac ratione curatur febris syncopalis à practicis dicta, quæ nihil aliud est, quàm semitertiana, vel alia febris maligna.

Victus ratio est instituenda tenuis circa statum, si diuturnior sit, cremor ptisanæ cum pipere, vel cinamomo est cibus conueniens, aut ius capi cum prædictis, aut aqua liquot foliis hyssopi.

Si verò conuulsio fiat, à plenitudine, aut ab inanitione. Si à plenitudine, ob illam magnam excrementorum cõmixtionem, & agitationem, ob bilis tenuitatem, quæ pituitæ aquosæ commiscetur. In cerebro enim cum nervos penetrat, conuulsiones facit. Erunt instituendæ fortiores euacuationes, vel frequentiores, quàm in illa, in qua syncope aderat. Sunt etiam humores magis detergendi, quàm incidendi, ne magis ad partes excrementa deducantur. Ad digestionem excrementorum oleis modicè detergentibus aliis resoluantur, vt ol. amygdal. amararum, nucis indicæ, ol. irino. Adde aquæ vitæ parum. Si ab inanitione, non curatur. Tamen ne despici videatur æger, ol. relaxantibus, & humectantibus per spinam & partes externas inungere oportet, vt ol. amygdal. dulc. violato, &c.

Tabula dinumerandum accessionum in febribus complicatis.

Dies. Quotidiana, Tertiaria, Quartana, Quintana.

1		1		3		4		5
2		1		3				
3		1		3				
4		1		3		4		
5		1		3				5
6		1		3				
7		1		3		4		
8		1		3				
9		1		3				5
10		1		3		4		
11		1		3				
12		1		3				
13		1		3		4		5
14		1		3				
15		1		3				
16		1		3		4		
17		1		3				5
18		1		3				
19		1		3		4		
20		1		3				
21		1		3				5
22		1		3		4		
23		1		3				
24		1		3				
25		1		3		4		5

Expli-

Explicatio tabulae.

IN hac tabula sunt quinque columnæ numerandæ à
 laeva in dextram, in quarum prima annotantur dies,
 in quibus sunt accessiones, earumque reduplicaciones
 & copulationes. In secunda, quotidianæ perpetui cir-
 cuitus. In tertia, tertianæ febris alternatim periodi. In
 quarta, quartanæ febris quartani paroxysmi. In quinta,
 quintanæ tardæ & admodum raræ accessiones osten-
 duntur, atque harum omnium simul complicatarum
 circuitus redit 13. quoque die, 20. & sic faciendo deinceps
 supputationem vsque ad centum eo modo, quo
 solemus supputare paroxysmos tertianæ & quartanæ,
 ita vt vnus & idem dies, sit prioris circuitus termina-
 tio, & sequentis initium. Vnde intra 25. dies, ter ap-
 paret hæc complicationis forma: intra 36, quater: in-
 tra 46, quinquies: intra 61, sexies: intra 72, septies: in-
 tra 84, octies: intra 96, nouies, & deinceps supputanti-
 bus nobis per ternarios & denarios dies. Sic intra di-
 ctos 25. dies, typus quotidianæ solius, & non compli-
 catarum apparet octies scilicet 2. die, 4. 6. 8. 12. 18. 20.
 24. quoque die, partientibus nobis vniuersum hunc
 typum per decimos tertios dies. Typus verò quoti-
 dianæ cum tertiana sola complicata, quater, scilicet, 3.
 11. 15. & 23. die accidit. Typus cum quartana sola, et-
 iam quater accidit, scilicet, 4. 10. 16. & 22. die fieri so-
 let. Quotidianæ verò cum tertiana & quartana bis, 7.
 & 9. die. Quotidianæ cum tertiana & quintana, qua-
 ter contingit 5. 9. 17. 21. Quotidianæ autem cum quar-
 tana & quintana, nunquam contingit, nisi cum aliis fe-
 brium circuitibus. Cæterum hic est ordo semper rein-
 cidens in hanc annotationem omnium simul concur-
 rentium, quæ tota 13. diebus includitur, circuloque eo-
 dem semper redit, quocunque semper progrediaris per
 decimos tertios dies. In hac tabella apparet, quòd ac-
 cessiones sunt in commixtione februm, vt si quotidia-
 na cum tertiana tertio quoque die duas accessiones ha-
 bet, nunquam mutatur à principio ad finem. Sic cum
 quartana seruat semper illum ordinem. Hoc tamen
 interest, quòd quarto quoque die accessiones sunt.
 Verum quando tertiana quartanæ miscetur, tunc

si in prima die fuerunt duæ accessiones, in secunda nulla, in tertia vna, in quartavna, in quinta nulla, in sexta nulla, in septima rursus ambæ coniunguntur, & in 13. die, 19. 25. 31. 37. 43. & 49. ita fit, vt 7. die semper complicetur, supputando dies accessionum, vt supputatur quartanæ. Quintana complicatur illis tribus 13. quoque die accessionem suam miscet cum tribus aliis, sed cum miscetur tertiana, quartana, & quintana, si prima die accessio tertiana tantum fit, secunda nulla, tertia vna, quarta vna, quinta duæ, scilicet tertianæ accessio, & quintanæ.

Quintana 13. quoque die cum quartana coniungitur, & semper cum tertiana inuenitur, vt aspicienti in tabula videre est.

GVLIELMI



GVLIELMI RONDE-
LETII DOCTORIS MEDICI,
ET MEDICINÆ IN SCHO-

LA MONSPELIENSI PROFESSORIS
regij & Cancellarij.

De morbo Italico, liber Vnus.



MORBVM Italicum nouum esse mor-
bi genus, omnes ingenuè fatentur.
Qui quidem contagiosus est, & ma-
ximè si per coitum maris & femi-
næ contractus sit. Est autem intem-
peries humida, & multorum sympto-
matum causa. Et hoc pro diuersitate humiditatis, & cor-
porum patientium. Quare sic describemus: Morbus Ita- *Morbi I-*
licus est intemperies mala partium externarum cum *talici de-*
humore contagioso, ex venereo contactu mediata vel *scriptio.*
immediate contracta: ad quam pustulæ plurimum, &
mala vlcera, vel dolores sequuntur. Huius descriptionis
partes explicare, & demonstrare conabimur, quia cum
iis, qui hodie de hac materia scribunt, non conuenit.
Nos hunc morbum sub intemperie collocauimus, quia
primùm in intemperies massam sanguinis inficit: deinde
cacochymia nascitur, à qua pustulæ, tumores, vlcera,
dolorésque nascuntur. Nemo ibit inficiatis, morbum ef-
se intemperiem, quæ humores corrumpit. Nam in hoc
omnes ferè cōueniunt. Sed à nobis in specie dissentiunt,
vt Montanus vir doctus putauit eum morbum calidum
& siccum esse, quem tamen curat calidis & siccis medi-
camentis, vt giaci decocto, & aliis omnino exiccatio-
nibus; quibus si stare eius sententia, potius foueretur
& exacerbaretur morbus, quàm curaretur aut mitiga-
retur, frigida nimirum & humida postulante, & impe-
tante morbi natura. Verùm cum frigida & humida huic

*Montani
error.*

*Doloris
causa.*

morbo planè, & velut ex diametro contraria esse nos & experientia, & eorum, quos mala hæc lues infestat, testimonio doceant, quis ita in Montani verba iuravit, ut illam eius definitionem mordicus retinere, & pertinaciter defendere conetur? A frigidis autem & humidis humoribus tantos excitari dolores nemini mirum videri debet. Nam vidi ego multos ex sola capitis & pedum lotione in summos & acerrimos incidisse dolores, ob introductam frigiditatem & humiditatem nimiam: quos tamen dolores multum calidis sedari quotidie experimur. Quare si à iuvantibus & lædentibus sumitur indicatio, haud dubiè morbus hic, intemperies frigida & humida erit, ut ex rei natura, atque affectibus apparet. Cæterum materia illa humida diutius moram in corpore trahendo incrassatur, & acrimoniam acquirit, tandemque partium temperamentum immutando, ipsaque partes diuellendo aut arrodendo, continui solationem, quam vocant, efficit. Hæc autem frigida & humida intemperies pro corporum, in quibus concluditur, varia natura, alia atque alia euadit. Nam si corpus, quod hoc morbo corripitur, sanguine abundet, statim infecto sanguine, pustulæ erumpunt sine dolore. Quod arguit materiam non esse adustam. Sunt & in aliquibus pustulæ, veluti carnosæ, in aliis ichores in capite à substantia crassa & viscida, quæ quidem pustulæ mitiores sunt ob humiditatem, minus frigida ob sanguinis calorem. Sed hoc tantum in principio, & eo tempore, quo maligna illa qualitas nondum infecit sanguinem, neque immutauit. Postea verò oboriuntur dolores, qui noctu infestant, & interdiu cessant. Mitigantur autem calidis, frigidis verò & humidis exacerbantur. Procedente verò magis morbo & corpore magis affecto, frigidior redditur morbus. Et cum fiant vlcera, id à pituita falsa fieri certum est. Quare nos materiam pituitosam & viscidam huius morbi causam esse hinc colligimus, quod dolores articulorum sine calore fiat circa noctem, & circa manifestum tumorem in partibus carne denudatis, ac ligamentosis ut circa ceruicem, clauiculâ, caput, sternum, anteriores sibiæ partes, & in aliis ossibus multum à capite distantibus. Nam hæ partes omnes frigida cum sint, alimento

pituitæ

pituitoso nutriuntur. Et cum hi dolores à recrementis partium fiant, ut in tibia, vel à defluxione à capite, à quo pituita redūdat, vel ex aliis ossibus, nō potest esse alius humor. Et hinc fiunt dolores òmoplatarū, qui pituitā subesse declarant. Fiunt etiā in pituitosis corporibus per defluxionē, cum subito tumores & dolores cōtingunt. Fieri autē à pituita, tumorum apertio ostēdit, qui cum secantur, vel vruntur, pituitā viscidam & pus viscosum emittunt. Quare miror, cur alij melancholiam, alii aflatum humore, vel aliam materiam esse dicant. Hoc enim vnū argumētum satis est (ut opinor) efficax ad sententiam nostrā probandā: quo etiā Gal. vtitur cum docet inflammationes à sanguine fieri, tum albi, tū libello de tumoribus præter naturam. Illud quoque probare possumus ex iis, quæ post sudationē excernūt. Quādoque enim expuitione liberatur à dolore, & perfectē curatur. Morbum hunc humidum esse satis ostendit sanatio. Curatur autē resiccatibus & mouētibus sudores potius, quā mouentibus vrinas, vel ventrē laxantibus. Quare colligendū est, morbū esse partiū externarum, ut cutis, carnis iuncturarum, & partium frigidarū. Ob id infestatur frigida partes doloribus, ut caput, articuli, sura, sternū. Partes verò internæ non multū inficiuntur, quia calidiores sunt & excrementa facilius concoquunt aut expurgant. Quod autem sint partes externæ primū affectæ, deinde internæ, hinc manifestum est. Cum enim fiat per contactum hic morbus, quæ prius tãguntur partes, & excrementis pituitosis vel humidis abundāt, primæ omnium inficiuntur. Et si ylcus primum in pene sit, ex coitu fiat necesse est, à contactu partis affectæ. Deinde emunctoria vnguinum, quia hæ partes agitatae incalescunt, vel à materia venenosa tanguntur. Si verò ob dormitionem, tunc cutis afficitur ob panni aut hominis venenosi contactum. His autem partes oris & pulmonum læduntur, qui inter cœnādum aut accubandum, & ore tetram & venenatam auram hauriunt, & veluti venenatum alterius spiritum excipiunt. Quò fit, ut qui festinanter & sine osculo, auersoque capite coeunt, non tam facile hoc modo corripiantur, neque illis pustulæ in fronte & occipite excitantur, quia non multa materia in eo loco abundat, & quia partes illæ

excrementa tertiæ concoctionis, quæ morbum faciunt, facilius expellunt, quemadmodum videre est tempore sanitatis. Nam quum sudamus, sudor ferè à fronte incipit, & nunquam aliquis sudat, quin circa caput sudet, ob humiditatis excrementorumque copiam. State omata & exostoses (Gallicè subros. Italicè, quies, vocantur) non nisi à materia viscida & crassa fieri contingit, ut dissectione eorum, qui mortui sunt, & tumorum præternaturam aperio, denique ipsa curatio ostendit. Non me latet in multis herpes fieri, sed miliares, qui ex bilis & pituitæ admixtione ortum habent, idque in corpore bilioso. Neque tandiu durarent herpes, nisi illa pituitæ admixtio adesset. Fiunt etiam furfures, aut inæqualitates in cute, & pruritus. Quæ omnia, non minùs à pituita salsa fieri existimandum est, quàm à bile. Quod nemo sana mente negabit. Quod si ulcera fiant, non curantur, nisi corpore prius euacuato, & hoc potissimum per sudores. Quare si à materia calida & sicca morbus fuerit, hisce remedijs potius foueretur, quàm curaretur. Nec verò minùs ridendi sunt, qui frigidum & siccum morbum esse statuunt. Nam hæc remedia sicciorrem redderent, atque ideo magis læderet. Et tamen, quæ sicca sunt, curant, ut lignum gaiaci, schina, salsa parilla, argentum viuum, & eiusmodi alia. Ergo nullo modo frigidus & siccus morbus est. Quod dolor sit potius in externis, quàm in internis, inductione patet. Pericranium enim læditur, à quo dolores fiunt extensui, ita ut videantur pili sursum erigi. Circa sternum etiam & in epomide, & in suris est dolor. Ostendit etiam id solutio, quod non nisi sudore morbus solvatur, aut frequenti & magna alui deiectione, quæ longo temporis tractu habitum corporis siccatur, & inedia quæ tales humiditates absumit. Quare cum elephantiasi conuenit, quia partes occupat externas. Sed in hoc differt, quod morbus Italicus à partibus externis, elephas siue lepra à partibus internis ortum habet. Et ad externas progreditur elephas, ad internas verò repit morbus Italicus. Hoc etiam in pueris natis ex matre vel patre infecto ostenditur: hic enim morbus in partibus externis relucet ac apparet. Ego vidi puerum nasci totum coopertum pustulis morbi Ita-

bi Italici. Hoc facit etiam, ut morbus sit contagiosus. Nam partes externæ, si externis obiectis apponantur, magis afficiuntur: ut qui carne sunt molliore & rariore cute, citius hoc morbo corripiuntur per contactum. Quare non mirum, si ophthalmia videndo acquiratur, scabies, & hic morbus contactu, quia cum in extremitate cutis existat, effluit aliquid, quod intro receptum, oculum inficit: sic carnem, iecur, & reliquum corpus. Argumento est, quia morbus Italicus, qui neque scabiem, neque pustulas habet, sed dolores tantum, raro contactu illo contrahitur, nisi cum vlcus, vel scabies, vel pustulæ egrum infestant. Neque etiam post sudationem morbus hic, ut prius infestat, neque ab aliis corripitur, nisi per contactum venereum. Qui excernunt excrementa pituitosa satis declarant morbum esse frigidum. Neque aliquis contrarium docere potest, etiam si in quibusdam aliqua bilem ostendant, ut herpes, aliqua sanguinem. Hoc enim evenit, quia morbus in corpore pleno bile factus sit, vel melancholico, vel sanguineo. Et hoc in principio. Nam morbus tandem corporum illorum temperiem immutat, & pituitosus morbus verè tunc fit & apparet.

Mediatè vel immediatè aliquis corripitur hoc morbo potest. Nam qui per contactum patitur, vel à nutrice, vel à parentibus, vel ab aliis accepit, vel per ventris contagionem. Et per contactum, vel cum nutrice, vel cum parentibus, vel cum aliis, mediatè. Non enim contingit videre aliquem tali morbo correptum, qui castè pudicèque vixerit, nisi qui cum infecto sit versatus. Quare neque vitio alimentorum, neque ab astrorum influxu, ortum habere potest hic morbus, sed ex India, in quo loco frequens est, & forsan familiaris & proprius morbus, ut olim Carbo, in Gallia Narbonensi: Lepra, in Alexandria: Bronchocele, in montibus Sabaudia. Hanc lue venereum contagiosam esse nemo negare potest, nisi sensum & experientiam negare non veretur. Nam ex contactu venereo primum fit, & magna ex parte tunc à pudendis incipit. Fiunt enim extrà vlcuscula, quæ quamvis parva sint, disepulorica tamen sunt, & curatu difficillima. Vel intus fit inflammatio, in glandulis parastatis, qua parte fluit semen cum pure. Ob id hoc

*Quomodo
fiunt bu-
bones & e-
nerei.*

aliqui appellant gonorrhæam. Si verò spuma, vel sanies aliqua, inguina contingat, vel cum hoc plus iusto morientur, vel cum partes referatæ internæ & externæ sanguinem trahunt, tunc bubones fiunt venerei. Pueri lac sugendo viciosum, ore malum contrahunt. Cum verò nutrices à pueris accipiunt, tunc in mammi primum fiunt vlcera. Fit etiam hic morbus iis, qui post aliquem hoc infectum bibunt. Alij cum ægrotis dormiendo, hæc luem contrahunt: & tunc in cute tota apparet, & præsertim in ea parte, qua ægrotum tetigerunt. In principio sunt papulæ & ichores, & potissimum in inguinibus in iis, qui concubitu sibi morbum contraxerunt. In pituitoso vel in eo, qui recidiuam patitur, dolores ac tumores frigidi & duri fiunt. In biliosis, vlcera *cacoetheia*. In habetibus tennes humores, alopecia (de qua dicemus in fine huius tractatus) in aliquibus fissuræ manuum & pedum. Omnia hæc à pituita falsa fiunt. Sunt, quibus cuticula sola deperditur, quia humor serosus & falsus ob suam tenuitatem cutim penetrat, ac cuticulam abscedere facit, ita vt siccata decidat in frusta. Dicere verò, quod morbus habeat occultam quādam naturā ac venenum, est confugere ad sacram illam diuinā anchoram. Non nego in quibusdā morbis proprietatem quandā inesse, in aliis idiosyncrismam. Sed in quibusdā magis est euident, quia magis familiaris. Quemadmodū phlegmone differt ab erysipellate, febris tertiana à quartana & ephemeræ. In aliis minus euident vt in epilepsia, suffocatione vteri, apoplexia, & etiam in hoc morbo. Cui si inest aliqua vis deleteria occulta, & in scabie quoque erit, quia scabies non minus contagiosus est morbus, quàm Italica lues. Quod si in scabie idem sit, etiam in herpete, erysipellate, & aliis morbis idem erit. Verum in hoc morbo proprietatem & singularem quādam naturam concedamus. Corpus enim ita inficit, vt ossa dura emolliat, afficiatque tumoribus & carie, nullo extrinsecus apparente vitio in cute. Dolores pituitæ morum sequuntur, vel serosorum humorum naturam. Quare nō tam occultus est, vt sibi & aliis multi magni viri persuaferunt. Et quia hoc crediderunt, remediā proprietate occulta curare, coacti fuerunt dicere. Quanquam rationem non minus euident

*Occulta
proprie-
tas.*

*Scabies
contagio-
sa.*

*Huius
morbi pro-
prietas.*

evidentem reddere possumus, quàm cur aqua maris scabiem curret, vel lixiuum siccet partem perhumidam, & quæ detergant, vel per halitum digerunt, curèt icturum. Indocti & imperiti est statim ac subinde ad sacram illam anchoram cõfugere. Sed hoc à plerisque ferè omnibus fit, vt leui negotio sese à multis difficultatibus extricent. Hoc autem tum faciendum, cùm evidens causa nulla est. Tunc enim verisimile est à tota substantia, vel cæca causa provenire, vt cùm dicimus rhabarbarum, vel scammonium hunc vel illum humorem trahere cū delectu. Cuius rei rationem reddere nemo potest, nisi ob similitudinem substantiæ, vel quãdam sympathiam. Sed quod arg. viuum, gaiacum, china, salsa parilla, & alia multa curent hanc affectionem, causa evidens est nō occulta, scilicet, quia morbo aduersantur, & siccando mouent sudores, & euacuant à partibus affectis humorem morbum facientem. Quod postea monstrabimus, si prius de notis & curatione in vniuersum dixerimus. Morbus hic syncerus est, & nulli permixtus, cùm partes externas occupat, nec offuscatur alio morbo eundem, vel symptomare aliquo. Tunc manifestus est lippis & tonsoribus scilicet, cùm vlcera in pudendo post coitum, & pustulæ in fronte & capite erumpunt. Quod qui videt, morbum esse Italicum securè potest pronunciare, & præsertim si accadat ei, qui cum scortis versatur. Quod si virgini aut religioso accadat, dubitamus quodammodo, & talem morbum esse dicere veremur, sed fucare pronunciamus calorem hepatis esse, cùm fissuræ manuum, vel papulæ, vel alia exanthemata apparent. Itē, si herpes appareat cum tali morbo, vel morbi dispositione, tunc morbo euidenti omnia appingimus, & sub manifesto alium occultamus, vt pote Italicum, cum quo difficillimè dignoscitur, & sic testus facilè latitat. Sic in capite ac aliis partibus nihil mali extrà apparuerit, tunc multi negant se morbū pati, propterea quod neque vlcera neque tumores habent in manibus aut aliis membris. Quare oportet hunc morbū diuidere in primum morbum & reciduum: & rursus in primum, & secundū: & secundum in causas morbi, & in corporis intemperaturas. Nā alius est, si ex cōtactu venereo immediatè factus vel mediatè fuerit. Alius

in sanguineo, alius in bilioso, alius in melancholico: alius in recidiuam patiente: alius si renascatur, vel à nouo concubitu, vel quia imperfectè fuerit curatus.

De signis morbi Italici incipientis.

Deprehenditur morbus ex causis præcedentibus, & ex iis, quæ mox apparent, & quæ sequuntur. Si vir aut mulier vago concubitu vratur, huius morbi suspicio habenda est. Si verò qui nos adit & consulit, morbum hunc sit passus, nobis suspicio augetur. Magis etiam, si in fronte papulæ carnosæ, vel in capite pustulæ, aut crustæ appareant sine dolore, & subito abortæ sint: aut si cum his signis vlcus in pudendo, vel intus, vel extrà sentiatur humidum, curatu difficile, vel cum tumore, vel exuberantia carnis, vel gonorrhœa, quâ vocant. Sunt enim hæc certissima morbi Italici signa & indicia, quæ ferè in sanguineis & biliosis apparent. Hinc etiam coniecturam facere licebit, si post concubitum nulla purgatione vsi fuerint, aut sanguinem sibi mitti non curauerint. Hoc enim solent facere, qui morbi huius suspicionem habent aliquam, vnde solent morbum incipientem curare, aut ita debilitant, vt non nisi post longum tempus seipsum extrà prodere, aut proferre possit. Quare cum in aliquo aliquas notas morbi Italici videmus, debemus interrogare vtrum illa supradicta egerint, an aliquo morbo correpti fuerint ab eo tẽpore, qui quidẽ potuerit immutare & retardare morbum Italicũ, vt febre tertiana, aut alia, in qua multi sudores erumpunt. Quòd si morbus sit in habitu corporis, & refrigeretur, tunc latitans morbus erumpet. Vt accidere vidi cuidam, qui morbum latitantẽ patiebatur, ex fissuris & crassitie volæ manuum & pedum conieci. Is dysenteria correptus fuit, qua curata gravissimo capitis dolore fuit diuexatus, qui dolor nunquam sedari potuit, nisi inunctione argenti vini. Si qui dolores omoplatae, clauicularum, & sterni cum vel sine vlcere, & tumores illos duros in capite, vel brachiis, vel labiis, patiantur, præcesseritque exulceratio in mentula intrà vel extrà, & bubones venerei, qui non profluxerint, sed retrocesserint, vel indurati sint, eos morbo Italico laborare certò & intrepidè, etiam si negent, affirmare possumus. Si vlcus in aliqua parte ortum sit ei, qui aliquando morbum

Certissima morbi Italici signa.

Cautio.

Historia.

Quæ certò morbum Italicum indicant.

dum Italicū passus est, adhibita fuerint remedia cōuenientissima, & non curetur, hunc in cachexiā ex morbo Italicō incidisse certū est. Itaque in vnguento sublimatum vel argentū viuū addere oportet, vt vlcus curetur. *Cachexia ex morbo Italicō.* Quod si non cesset, ob id, verēdum, ne in habitu corporis retineatur, ac tegatur aliqua morbi Italici lues. Quare toti corpori adhibenda erunt remedia. Si corpus extenuetur, & ischiadicum dolorem patiatur, morbum Italicū esse censendum est, & remediis oportunis curare oportet. Si quis dolorē dentium frequēter sine carie, cum ischiadico dolore sentiat, vel cū dolore capitis, vel omoplatarum vel sterni, & dolor magis noctu quā interdiu infestat, & post aliquam leuem calfactionem, tunc morbum Italicum certō pronunciare possumus. Si quis areas habet circa crotaphitas, & in occipite, à morbo Italicō, est vulgò dicta (*la pelade*.) Quod si barba cum superciliis decidat, magis etiam certū erit. Qui fissuras manuum & pedū frequentes habent, à morbo Italicō imperfectè curato ista sibi accidere credāt. Si quis vngues veluri leprosos habeat, hoc morbo Italicō referat acceptū. Hæc autē affectio vulgò, ab vnguibus (*Englade*) vocatur. Denique qui cuticulā manus sine pruritu mutāt, hanc sciat morbi Italici esse sobolem, quæ vulgò (*la Parallele*) dicitur. Hæc autem, quæ sequuntur, inter notas morbi Italici non obscuras licet agnoscere. Qui hoc morbo corripiuntur, tristes sunt, & statim post contractum morbum in illis extinguitur venus, & mentula mollis & humida efficitur, dummodo non sit vlcus in interna vel externa eius parte. Nam vlcus solet priapismum siue distentionem prouocare, & aliquando ad venerem irritare, ob excrementa acria. Sternum dolet in hoc morbo, quæ vna est ex certissimis notis. Sentiant & contractionem thoracis sine difficultate manifesta respirationis. Dolet etiā epomis & omoplata, quia masculi tenues & membranosi sunt: atque etiam pars occipitis dolet.

De curatione.

MOrbus à plenitudine est: itaque euacuatione curabitur. Sed cū plenitudo possit esse coniuncta cū aliqua praua qualitate, morbo correptus non refrigerabitur, etiam si euacuetur per sanguinis missionem: quæ

*Quomodo
Vena se-
ctio nō cō-
petit.*

quidem conueniens erit, modò ætas, regio, tempus & vi-
res consentiant, & modò morbus sit in principio, & cum
pustulis, scabie, vel vlceribus. Nam si dolores capitis &
articulorum diuexent ægrum, missio sanguinis tunc non
competit, quia refrigerat, & refrigerando, morbum au-
get ac deteriorem reddit, latitantemque frequenter de-
tegit. Quare cum summa animaduersione videndum est,
an sanguis mitti debeat. Quòd si morbi magnitudo ac
corporis vires, & temporis constitutio suadeat primum
excrementa alui & ventriculi euacuanda erunt, vel pi-
lulis, vel bolo, vel syrupo. Pilulis, si alias formas reme-
diorum assumere non possit, vel si pituita euacuanda sit.
Pilulæ erunt ex aloë tantum non lota, vel ex hiera, vel
pilulis ante cibum, vel sabellis, & aliis quæ plus aloës
recipiunt. In omni morbo Italico inter omnes pilulas
conuenientiores erunt pilulæ ex aloë. Nam sola aloë
morbum curat exsiccando.

In principio morbi, & temperaturis calidioribus sic
erit progrediendum. Si morbus initio est cū scabie, vel
herpetibus, vel vlceribus, minoretur syr. ros. solutiuo,
qui syr. magis dicetur conuenire, & etiam in tempera-
turis calidioribus. Paretur ergo vt sequitur.

*Vena se-
ctio.*

R. syrup. ros. lax. ʒ. 2. decoct. mercur. ʒ. 3. misce, capiat
manè die præcedente miss. sanguinis, vel si quis malit
cass. cum cathol. in forma boli poterit accire. Si morbus
inueteratus & pituitosus magis sit, vel in corpore pituito-
so, ea quæ componuntur ex sena, carthamo, & agarico,
sunt efficaciora, vel ex diaphœnico, vel indo maiore, cum
aqua enulæ camp. vel beton. vel absynth. misceantur.
Quare talibus, vt postea docebimus, erit vtendum. Sed
nunc morbi incipientis curationem trado, & in pletho-
rico, vel multum sanguineo. In crastinum ergo minora-
tioni mittatur sanguis e vena basilica dextri brachij, nisi
vlcus vel affectus in altera parte fuerit, altera illæsa vel
minus affecta. Quantitas sit ʒ. 3 vel 4. primum: in crasti-
num verò ʒ. 6 vel 7. si vires ferant, rursus detrahantur.
Hic affectus vel lassitudo curandus est, in qua lassitudi-
ne Gal. iterat missionem sanguinis ad animi vsque deli-
quium. Quod nunc non censeo faciendum, sed quantum
vires ferre poterunt. Si morbus sit adhuc in principio, &
mate-

materia sanguini permixta, materiam illam ab habitu retrahere non possumus nisi euacuatione magna. Quæ etiam ratio instituenda erit in iis, quibus sanguinẽ mittere non licebit. Eos enim purgabimus multum & frequenter, apozematibus, & syr. compositis ad serosos & pituitosos humores detergendos: quales sunt syr. de fumarina compositus, syr. de epithymo, qui dantur cum sero lactis, si biliosus vel calidior fuerit, vel cum decoctione mercur. & borraginis, vel cum aqua absynthij, quæ in ista specie optima est, ac etiam pituitosa. Siccat enim, & adstrictionem deposuit separata aquea & aërea, ac ignea substantia à terrestri, vel fiat sic. Syrupus ad serosa recrementa & aquea, & ad illa quæ satis sunt præparata à natura, & separata ab humoribus laudatis, qui quidem purgat, sed prius præscribendum est medicam. laxans, utpote minoratiuum ex suprascriptis.

℞. cichor. endiuæ, scariolæ, lupuli, fumiterræ, acetosæ, herbarum capil. an. M. i. brassicæ marinæ M. ss (si sicca fuerit ponatur ad 3. 3) prunorum, sebesten, passul. sicuum an. par. 20. anisi 3. 3. semin. carthami, polypod. querc. ana 3. 3. senæ orient. 3. 4. si brassica sit, sin minus ss. florum buglossi, borrag. ana p. i. anthos, chamæmeli ana p. ss. (chamæmelū caput & partes relaxat, & dolores ventris, à senæ & polypodio excitatos compescit, *Chamæmelū* aut inhibet ne fiant) Sacchari q. s. fiat syru. quem continuat per 5. dies. Priusquam autem præscribatur medicamentum laxans consideretur euacuatio facta per syr. Quod si non mouerit syr. ob corporis constitutionem, ei adde syr. ros. lax. 3. i. Et alternis diebus tunc utatur, vel die præcedente medicamento eradicatorio. Quod si laxauerit quinquies, sexies, vel pluries, considerata corporis plenitudine, vel cacochymia medicamentum paratur ex confect. hamech, vel succo ros. vel electuario diacarthami. Utile enim est corpus benè purgare. Quod si non possit tolerare, frequentius non erit dandum medicamentum. Neque tamẽ euacuationem per cutim tentare oportet, quin prius corpus sit mundatum à recrementis, ne fiat maior attractio, quàm per cutim euacuari possit. Quod si fiat, vel nõ curabitur, vel recrudescet breui morbus, vel deterior reddetur. Noui ego multos, qui

post inunctiones & dietas, dolores vel exostoses passi sunt, cum antea nihil tale passi essent, quia materia fuit attenuata, liquefacta, & ad partes externas attracta, non autem euacuata. Quare multum vel frequenter corpora illa vacuanda censeo in principio. Si verò minus licet tantopere vacuare, post tres certè inunctiones exhibendum medicamentum, ut quæ liquata sunt, euacuentur. Medicamentum debile non potest vacuare ob sudationem, quæ extrà ad cutim euacuat materiam. Fortè verò medicamentum periculosum est, tum ob viriù imbecillitatem, tum quia frequenter materia per ventrè euacuatur. Quare neque debile ut cassia vel catholicon, neq; forte, ut prius dictū est, sed mediū conuenit, ut si detur confect. hamech ad 3. 2. cum aqua hordei & 3. 2. syr. ros. laxatiui, vel si volumus naturam excitare, ventrem primū, deinceps partes inferiores inungemus vnguento, circa vmbilici regionem. Si vnguentis vramur, vel decoctione gaiaci semel in hebdomada medicamentis purgantibus aluum mouemus. Purgato corpore materiam coniunctam, quæ in habitu corporis est, euacuare oportet. Euacuatur autem per masticatoria, si morbus firmatus sit in capite. Si in iuncturis, cucurbitulis, cum scarificatione. Si cum frequenti squalore, vel vlceribus corporis, missio- ne sang. è venis lingue, si aliqua pars oris vlcerata sit. De masticatoriis, quibus euacuandum sit, postea dicemus. Nunc de causa, quæ sanguini permixta est, nobis institutus est sermo. Euacuamus quod in carne collectū est, sudore per cutim, tanquam per propinquiorem & conuenientiore regionem. Sudor prouocatur vel externis auxiliis, vel internis. Verum alia sunt aliis efficaciora ad hunc morbum propulsandum, & curandum. Prouocabunt sudores balnea, stuphæ, emplastra, vnguenta. Verum balnea, quæ siccant digerendo citra attritionem, longo vsu hanc affectionē curare possunt. At quæ ex aqua dulci fiunt, plus nocent sua humiditate, quàm euacuando prodesse possunt. At sublimata in doloribus & vlceribus: nitrosa in vlceribus & scabie: aluminosa in doloribus articulorum. Stupharum frequentior vsus maxime proderit. Nam morbum debilem curare potest, sed longo tempore. Emplastra ex argento viuo eadē ratione curant,

*Quibus
modis eua-
cuatur ma-
teriam con-
iuncta.*

*Quæ &
quomodo
sudores
prouocent.
Balnea
aqua dul-
cis non co-
ferunt &
cur.*

curant, qua vnguenta. Sed magis per insensibilem transpirationem, & faciendo, quàm euacuando sudores. Quare in iis, quibus ob negotia sudare, & domi manere non licet, emplastra conueniunt, sed in doloribus magis, quàm ad scabiem, vel ad tumores, & aliqua ostracosa vlcera. De emplastris dicemus suo loco, si prius de vnguentorū vtilitate, & eorundem diuersitate docuerimus.

De Vnguentis.

Vnguenta fiunt ad materię educationem. Nam quæ solet morbum facere, euacuatur per poros cutis. Igitur vnguenta ex chalaisticis, areoticis, & epispasticis, & mouëtibus sudores paranda sunt, si morbi dispositionem per totum habitum sparsam videamus. Quod si vel vlcus particulare, vel scabiem, vel herpetem, aut alium quendam morbum curare voluerimus, nobis particulari remedio erit vtendum. Solent enim illa particularia impedire sudorem, qui tamen necessarius est ad dispositionem vniuersalē: quæ quā primū emēdanda venit. Deinde veniendum ad particulares cuiuslibet membri curationes, quæ (vt iam dictum est) vniuersalem & sudores impedire solent, vt quæ fiunt per cinnabris factitiū ob sulphur, cerusam, acetum, oleum amygdalarum, quæ quidem solent vim argēti viui minuere. Et illa particularia sunt. Est autem ad id maximè accommoda, axungia porci, quæ veluti basis & fundamentum horum vnguentorum est, quia relaxat, emollit, & argētum viuum excipit, si preparata sit, vt debet, scil. non salita, non liquata, sed recens, vel sine sale seruata, à qua ablatae sint membranae, diligenter in mortario cōtusa, vt melius misceatur. Liquefacta verò axungia, nunquam post liquefactionem bene coalescit, aut retinet argentum viuum. Axungia gallinae anseris, vbi ponuntur, sed hoc particularem affectū, & in parua quantitate, quia tā magna quantitas nō reperitur. Quæ cum tenuium sint partiū, minus retinent argētum viuum, & tātum in doloribus poni debent. Butyrum his succedit, quod tamen multo magis, quàm prædictæ axungia, argentum viuum retinet. Verū tamen ad dolores & papulas præscribi solet, quia papulas magis & melius digerit, quàm aliud quoduis, & maiori quantitate, quàm axungia anseris, & alia similes poni

non debet. Olea conueniunt rarefaciētia & digerentia, vt chamæmelium, liliorum, irinū, rutaceum, de spica, & similia. Ol. amygd. cōmune, lēsaminum, anethinum, quia nimium humectant, nō cōueniunt nec valent. Sed in hac prima specie, quia corpus calidius est, oleo chamæmelino, & liliorum possumus vti, & magis vsurpari debent. Quibus etiam adduntur aliquot vnciæ laurini, si scabies & papulæ adsint, quia illas curant emolliendo & digerendo. At in doloribus, oleum irinum, anethinū, cum laurino & de spica, in doloribus articulorū hæc valent. At in doloribus capitis propter odorem insignem minus valet hoc. Et si posuerimus, parum admodū erit ponendum, vt in extremo morbo. Terebinthina, abietina, & aliæ liquidæ cōueniunt, quia acopa sunt medicamenta, corpus calfaciunt, & humores euacuant ac digerunt. Resina cocta & cera, ad inspissationem ponuntur, scilicet, cum pulueres non recipit vnguentum. Tunc etiam vnguento apponimus lithargyrum, etiam si aliqua ex parte sudores supprimat. Non enim ponimus, nisi cum multis relaxantibus alijs, & magnā argenti viui quantitate. Argentum viuum & axungia, vnguenta cōficiunt. Sed quia illud nimium penetrat ac dissoluit, minori quantitate ponitur: tūmque necessaria sunt ea, quæ superius adiunximus, & alia multa. Noui aliquos, qui solo argento viuo, axungia porci, & cineribus curabant morbum Italicum, & paucissimis diebus. Verūm vidi etiam aliquos in tremorem incidisse ex intempesti-
no argenti viui vsu. Iraque satius est remedia minus effi-
cacia habere, ac longiori tempore curare, quā pericu-
losa exhibere, quia sat citò, si sat tuto. Non enim bonum est repentē euacuzre, vel replere, vel calfacere, vel refrigere, eliquare, vel multa excremēta attrahere ad par-
tem per quam egredi nō possunt. Hoc enim est pericu-
losum, & plus lædit, quā profit.

℞. axungię porci non salitæ, nec liquefactæ ℥b. j. ol. chamæmel. & irini ana ℥. iij. terebinth. & resinæ ana ℥. ij. ceræ parum, argenti viui extincti in succo limonum ℥. iij. misce fiat vnguentum. Et vngantur partes extremæ circa iuncturas, & emunctoria, & spinam: & sensim pro-
pocetur sudor, cooperiendo, vel apponendo lateres. Te-
gatur

gatur bene, ne ab aëre frigido tangatur, aut impediatur perspiratio, & euacuatio integra fiat. Vngatur semel pro prima vice, deinde bis, deinde semel: & sic fiat, donec medicamenti vis ad partes internas penetraverit. Cōficietur hoc modo efficacissimū, quod nunquam me fefellit.

℞. vnguenti martiati & aragon ana q. j. axungia porci non salita, nec liquefacta ℥b. j. ol. chamæ. aneth. ana ℥. j. ol. laurini ℥. ij. argenti viui ℥. v. resina, terebinth. ana ℥. ij. misce, fiat vnguentum, quo vngatur, vt dictum est prius. Si sint vlcera, & affectus sit cum multis papulis, & vlcusculis, tunc thus, mastix, iris, ærugo æris, & alia hoc modo miscebuntur.

℞. axungia porci ℥b. j. butyri recentis, terebinth. lotæ in aqua vitæ ana ℥. ij. resina & vnguētū martiati ana ℥. ij. argenti viui ℥. v. thuris, mastichis, iridis ana ℥. iij. viridis æris ℥. ij. ol. icini & laurini ana ℥. iij. lithargyri auri ℥. j. Misce, fiat linimentū, quo vtatur, vt prius. Si verò sint vlcera maiora & curatu difficilia, addantur vni parti vnguenti, quæ vlceri conueniunt ad deterfionem vel mundificationem carnis. Vel si sit dolorosum, & quoquo modo nō possit sigillari, fiat hoc modo,

℞. vnguenti præscripti q. j. vng. apostolorum ℥. j. misce. Applicetur supra vlcus putridū & sordidum. Ad maiorem arrosionem faciendam, & vt quicquid est putridi, auferatur, necessum erit addere parum sublimati. Quod multū proderit, vbi vna vel duabus applicationibus vsi fuerimus, ne frequenter partem vexando, labefactemus, vel intēperiem calidā inducamus. Cū verò detersum fuerit, & ad vlcus naturam reuocatū, ruc addemus vni parti vnguētū plus resina, mastichis, thuris aloës, sarcocolla, vel panacis, vel cerusæ, vel minij, vel plūbi, vel antimonij, semper ista augendo, & mercurij quantitatē minuendo. Sed de vlcerū curatione integrē suo loco dicemus. Redeamus ergo ad vniuersalem curadi rationē. Si scabies & herpes appareāt, hoc morb. esse videbitur potius quā aliquid aliud & tale parandum esse vnguētū, quale sequitur: & sic vtēdum, vt prius. Euacuatis igitur interni corporis serosis recrementis paretur tale vng.

℞. vng. enulati ℥b. ℥. terebinth. lotæ in vino, vel succo fumarie ℥. iij. styracis, myrrhæ ana ℥. ℥. arg. viui extincti

in succo limonum ʒ.iiij.ol. ros. antiqui cōpleti.ol. irini ana ʒ.ij.resinæ ʒ.iiij. lithargyri ʒ. ʒ. fiat vnguentū cuius vni parti adde cinnabrij & cerusæ ana ʒ. ʒ. Sed hæc parte non vtatur, nisi post tres primas inunctiones ac sudationes. Et vngantur manus & pedes hac vltima parte vnguenti. In herpetibus cum scabie, fiat modo sequenti.

R. succi lapatij acuti, & limonum ana ʒ.ij. olei irini ʒ. j.ol. tartari ʒ. ʒ. vnguenti martiati ʒ. j. ʒ. arg. viui ʒ. v. cerusæ lotæ in aqua vitæ ʒ. j. resinæ & terebinth. ana ʒ. iiij. Argētum viuum extingatur cum succis, deinde incorporetur cum axungia, & fiat linimentum, quo linantur partes affectæ. Post aliquā morbi Italici castigationem, sunt addenda quæ fortiter siccare possunt, vt alumē, sulphur, calchytis. Quæ quidem fortiter siccantia non erūt primū apponēda, quia illa sudores cōpescunt, & sic retinendo morbi curationem impediunt, quamuis siccant. Cū enim astringant, vim morbi altius impellunt, ac profundius delitescere ac hædere faciūt per aliquod tēpus. Deinde reuirescit & recrudescit, & quā prius, deterior redditur. Hæc sunt linimenta, quibus vti possumus in biliosis & sanguineis, in scabie, papulis & vlceribus. Istis omnibus vtile erit, si non fluat aluus, syr. laxatiuum præscribere: vel apozema illud, quo initio vti sumus. Porro hæc euacuatio impedit effumationē ad os, à qua, vlcera oris & dentium sortes proveniunt: ab effumatione & sorde, vlcus: ab vlcere, pituitæ fluxus. Rarò autē eiusmodi effumatio sine vlcere accidit. Quare ad hæc, vel maiora vitāda, vtile erit purgare. De castigatione autē accidentiū suo loco dicemus. Vbi ergo vel fluxus vëtris accider, vel anhelitus foetidus emittetur, tūc pituitā inflammari, certissimū est signū. Itaq; cessandum erit ab vnctione, & mutāda linteamina erunt. Quibus verò ista nō apparēt, certò conicere licet non sufficientem esse argenti viui quantitātē, vel astringentia, aut obstruētia, aut emplastica addita fuisse vnguentō, quæ vim medicamento impediuerint. Itaq; fortius erit reddendū, vel frequentius inungendus æger, vt si semel inungi cōsueuerit, bis inūgatur. Inungantur etiam emunctoria. In quibus autē videmus paucam euacuationem factam fuisse per sudores, morbum fore contumacem certò prægnoscere possumus.

Interdum

Interdum non erit inutile purgare per os, si vires ferat, & vti decoctione gaiaci, vel echinæ simplici, si talis sit affectus, qui scabiem, vel tenuia vlcera habeat. At si contumacia sint, laxantia medicamenta erunt propinanda. Si verò dolores & tophi adsint, composita erunt adhibenda, quorum descriptiones postea dabimus.

De morbo inueterato.

SI morbus fuerit inueteratus cum doloribus & tumoribus duris, tunc primum distinguere oportet, an morbus sit cum corporis consumptione, an non: an dolores sint capitis sine tumoribus, an verò cū tumoribus: an denique sint cum ossis carie, an non. Et pro variis his modis, remedia veria erūt adhibenda. Si morbus est inueteratus, sciscitandum est ab ægrotante, vsus ne sit aliquo remedio, an non, vt intelligamus, quid fuerit in causa, cur minus fuerit curatus. Quod si ob vnguenti imbecillitatem curatus non fuerit, fortius erit exhibendum, quia fortius medicamentum expostulat huius morbi contumacia. Si ob defectum euacuationis, videndum, ne in eundem errorem incidamus. Cum ergo inueteratus morbus frigidior sit & materia crassior, magis calefaciendum atque attenuandum, & fortius trahendū erit per assumpta, & admotā. Primum itaque fiat hoc modo minoratium ex diaphen. & cathol. vt pituitosa excrementa ventriculi & intestinorum purgentur, & incidentibus, vt medicamentum ad partes deducatur. Sic,

℞. cathol. & diaphen. ana ʒ. iij. cum sacch. fiat bolus. Vel dissolue cum aqua beto, vel hyffo. & fiat potus. Vel vtatur pilul. & hiera fortificatis agarico, vel pilul. sine quibus vel aureis in minori quantitate, scilicet, ad ʒ. β. vel ʒ. ij. Deinde vtatur syrupis incidentibus, qualis est syr. de stech. de artemi. cum mel. scyllitico, vel anthosato. Alij verò syr. non conueniunt, quia frigidi, vel humidi, vel quia corpus non est aptum frigidis. Quare syr. de fumar. ros. laxat. non conueniūt hoc tempore vel in hoc modo inueterato nisi approprientur cum decoctis. Decocta ergo fiant ex quibus talis syrupus paretur.

℞. decoctionis beto. calamin. hyff. lb. j. β. syr. de stech. ʒ. vj. arom. cum ʒ. ij. diarrho. & fiat syr. Vtatur in quinque matutinis. Vel sic,

℞. syru. de artemisia ℥b. ℞. aquæ absynthij, hyssopi, cichor. bugloss. ana quartarium i. aromatizetur cum 3. i. aromat. ros. cap. in quatuor matutinis.

Tertio quoque die cap. tab. 3. i. pilularum ex aloë, vel sabelliarum.

Finitis syrup. cap. medicamentum ex electuario de citro, vel diatarth. vel Indi maior. vel in forma boli, vel in forma potionis.

℞. Elect. de citro sol. 3. 3. confect. hamech. 3. i. Dissoluantur in decoctione mercur. & cum 3. i. syru. ros. laxat. fiat potio. Capiat manè, & in crastinum detur masticatorium ex piretro sequenti modo preparato.

℞. piretri cocti in oxymel. 3. i. masticet per tres dies manè expuendo. Post cuius assumptionem detur tab. i. elect. diagal. & reliquatur eger per aliquot dies ad viriū refocillationem. Post quod tempus & viriū refocillationem, vtetur syr. sequenti laxatiuo.

℞. rad. elenij 3. 2. galang. maior. 3. i. herbarum capill. bugloss. borrag. cichor. ana M. ℞. beto. hyss. acet. sampsi-chian. M. i. anisi 3. 3. polyp. senæ ana 3. 4. agar 3. i. florum anthosstechad. chamæmeli, bugloss. borrag. ana p. i. fiat decoctio in aqua fontis & in aqua bugloss. & absynth. ℥b. i. In collaturæ ℥b. 3. dissoluë syrup. de fumar. compos. & syr. ros. laxat. ana 3. 4. mellis anthosati 3. 3. saccha. q. s. fiat syr. cuius media pars coquatur ad perfectionem, & seruetur vsui. Reliquam mediam partem, quæ erit mediæ decoctionis, capiat in quinque dosibus. Prima die cap. 3. 6. manè. Secunda 3. 5. manè, & ante cœnam 3. 4. & tantundem die sequenti. Quod si fatigetur ob maiorem laxationem, quiescat per vnum diem post duas doses, vel capiat semel tantum in die.

Talis syru. solus potest incipientem morbum curare, si bis in die assumptionem continuet, & magnam euacuationē ferre possit. Et plus prodest hic solus syr. quàm fortiores pilulæ, vel alia medicamenta & longis intervallis assumpta, quia in illis intervallis viscera replenturcrementis, quæ attractionem materiæ habitus corporis impediunt. Verum cum illa recremēta continuè euacuetur, vt manè communia: à prædio, secunda ab hepate, tertia, potio matutina à vena magna, & quarta à ramis, sic cu-

fic curantur, quia euacuantur exquisitè. Ego curavi incipientem morbum quinque diebus, similibus medicamentis. Si ergo facta fuerit insignis vacuatio, pauca erit materia, quæ in cuti & carne remaneat. Quare illud remedium, quod sequetur, vehemens non sit oportet. Nam medicari vi necesse est, quia longius est securus. Corpora enim extenuata non possunt fortissima medicamenta ferre. Parabitur ergo unguentum sequens, utendum post excellentem syr. laxat. quod erit pro vlceribus, scabie, doloribus cum corporis extenuatione à longo tempore.

R. axung. porci non salitæ, neque liquatæ, butyri recetis, axung. gallinæ & anat. ana ʒ. 2. ol. chamæm. & aneth. ana ʒ. 3. ol. de spica ʒ. ʒ. arg. viui extincti in prædicta axungia ʒ. 6. mastich. myrrhæ, iridis ana ʒ. ʒ. tereb. lotæ in aqua vitæ ʒ. 3. resinæ & ceræ parum, fiat unguentum. Vngatur ut artis est, incipiendo à iuncturis, deinde vngatur spinæ inferior pars, postea tota spina cum emunctoriis. Ista autem debent fieri sine magna calefactione, ut sensim trahantur excrementa, fundantur, & euacuetur. Unguentum ad dolores capitis, iuncturarum & ad duros tumores, quod sedat dolorem materiæ calefaciendo, liquando, euacuando per sudores, & per oris expurgationem.

R. quat. vnguentorum calid. ana q. r. 1. axung. porci lb. 1. ol. laurini, aneth. & irini ana ʒ. 2. ol. de spica ʒ. 1. argenti viui ʒ. 6. terebinth. lotæ in aqua vitæ ʒ. 3. flor. chamæ. leuissimè puluerisatorum, rad. irid. ana ʒ. 1. resinæ & ceræ ana ʒ. 2. fiat unguentum. Vngantur partes dolentes externæ, excepto capite. Incipiat ab inferioribus & emunctoriis inguinum, ut materia à capite diuertatur. Quo facto vngatur spina & ceruix, donec os calefactum sit, & spuat frequentius. Et in hac specie diutius purgetur per os. Si verò tumores adsint duri, hoc idem unguentum valet, non quòd supra duros illos tumores ponatur, sed melius erit sequens ceratum apponere.

R. vnguenti præscripti lb. ʒ. euphorb. ʒ. 1. gummi hederæ ʒ. 3. ammoniaci, opopanax, bdellij dissolutorum in ol. liliorum ana ʒ. 1. styracis rubæ & calamin. an. ʒ. 3. aristol. longæ & rotundæ ana ʒ. 2. terebinth. abietinæ ʒ. 2. ol. liliorum & laur. ana ʒ. ʒ. argenti viui ʒ. 2. misce. Vngatur pars. Vel addendo ceræ multum, fiat ad

formam ceroti, idque vt diutius supra partem hæreat. Vel si malueris emplastrum de ranis, id est, de vigo, adde argenti viui, euphor. ac irid. ana \mathfrak{z} . i. Malaxentur cum terebin. lota in aqua vitæ & applicetur. Aliud emplastrum ad tumores duros morbi Italici inueterati.

R. emplastri filij Zachariæ & ceronei ana \mathfrak{z} . 3. euphorb. \mathfrak{z} . ss. Malaxetur simul, & fiat emplastrum. Emplastra omnia ex gummi, idem efficient addito argento viuo. Sunt autem isti tumores a pituita viscida & concreta, quæ non nisi calidis dissolui potest. Si os cariosum sit cute adhuc integra, primum cauterio, aut nouacula, aut ruptorio aperienda cutis ac detergendum os, tum auferendum quicquid in osse, vel circa os præter naturam est. Quibus peractis, cum volemus vlcus ad cicatricem ducere, tale parandum est linimentum.

R. axung. porci lb. ss. quat. vng. calidorum ana qr. i. ol. frini & laurini ana \mathfrak{z} . 3. ol. de spica \mathfrak{z} . i. arg. viui \mathfrak{z} . 5. mastich. thur. sarcocol. aristoloch. rot. an. \mathfrak{z} . 3. opopan. dissoluti in aqua vitæ \mathfrak{z} . i. myrrhæ \mathfrak{z} . ss. resinæ pini \mathfrak{z} . 4. misce, fiat linimentum: quod est admouendum post mundificationem, & ossis reparationem. Eò ducemus vlcus tumorum duorum morbi Itali. inueterati ad cicatricem. Quod si velis ossis discissionem accelerare, potes vti supra partem, vnguento vel emplastro ad duritiem facto, quia euphorb. recipit, quod quidem desquammat ossa eadem die, vt ait Dioscor. Et optimum est. Vel huic vnguento adde euphorb. \mathfrak{z} . i. vel vni parti vnguenti tantum, qua parte vtatur in circuitu partis affectæ, & supra partem. In hac specie vtilissimum erit etiam vti dixi ex gaiaci decocto ad pituitæ resiccationem. Sūt qui ad dolores vng. parant ex decoctione herb. calidarum. Sic,

R. Beton. marrub. conizæ, absyn. calamin. florū stech. rorism. chamo. sampsoci ana M. i. Omnia hæc in vino albo antiquo decoquantur, & oleo. Deinde facta collatura & expressione, ad inspissationem linimenti addantur terebinth. & ceræ pro lb. i. quart. i. Et axung. porci nō salitæ lb. i. argenti viui in axung. præcedente extincti \mathfrak{z} . 5. misce. Si verò ad dolores paretur, vt diximus, addemus euphorb. & staphisag. ana \mathfrak{z} . i. hermodactyl. & aristoloch. ana \mathfrak{z} . ss. Et fiat vnguentum.

Alij myrrham, thus, sarcocollam, mastichen addunt si cum vlceribus sit morbus. In scabie verò & vlceribus alij vtuntur viridi æris, quod valde prodest, si post inunctiones aliquas apponatur, quia compescit sudores.

Alij sal apponunt, quod in scabie & pruritu valet detergendo: Verum minus laudatur, quia sudores nimium impedit: Sed post sudationes addi debet, vt & sulphur, calchytis, & alia astringentia.

Alij ex cineribus sarmentorum & argento viuo parant linimenta, & efficaciora sunt, sed minus tuta. Sunt qui duo remedia simul adhibēt, alij bene, alij malè. Qui bene, vtraque veluti conspirantia adhibent. Qui verò malè, inter se pugnancia. Conueniunt autem quæ sudores mouent siue intro assumpta, siue exterius admota. Externa sunt vnctiones & stuphæ, quæ quidem stuphæ præparant corpus ad sudationem, & ad humores trahendos ad partem externam. Et satius est primum ingredi stuphas, deinde vt i vnguento, quia apertis poris facilius penetrat vnguentum. Etiam in fine ingredi stuphas vtilissimum, quia attrahunt humores, & linimenti sortes auferunt.

Alij in principio dant decoctum gaiaci, & post aliquot dies linimentum applicant. Quod malum non est, in quibus frigidi sunt humores, & in alto delitescentes, vt qui doloribus afficiuntur articulorum & capitis.

Alij in fine diætæ linimenta adhibent. Quod non fit tutò, quia corpus redditum debile, non potest tam forte & insigne remedium ferre. Itaque satius est post primâ à diætâ hebdomadam, vel ante diætâ vt i vnguento. Deinde dum ob imbecillitatem, vel ob oris affectionem delitescunt, in cubiculo decoctione gaiaci, in potu manè vt possunt, etiam si non provocetur sudor. Sunt alij, qui alia duo adhibent remedia, & illa cōtraria, scilicet sudationem, & alui subductionem. Quæ duo simul & semel fieri nec bene, nec facile, nec vtiliter possunt. Nā si multū sudet, nō potest aluus fluere. Si fluit aluus, non potest sudare. Quare satius est vicissim, seu alternatim fieri. Poterit igitur sudare per tres vel quatuor dies: Quinta verò subducatur aluus decoctione iam præscripta. Vel quotidie subducatur aluus eadem decoctione, vt iam

diximus, & non cogatur ad sudorem. Nam cum isti motus sint contrarij, simul fieri non debent, quia purgans medicamentum à circumferentia ad centrum trahit, sudor verò contrà. Vtile autem erit post vsum vnguenti, quando non fluet aluus, vti medicamento purgante, scilicet post tres aut quatuor dies, vt quod dissolutum est intus aut commotum, expurgetur. Ista autem plurimum iuuant decoctiones, syrupi cientes sudorem, aquæ, vt aqua illa nostra theriacalis, quæ data potentissimè mouet sudores. Cuius præparatio, ne quid omittamus, à nobis nunc dabitur. Aqua theriacalis prouocans sudores in morbo Italico inueterato, & curans dolores si detur cum aquis infra scriptis.

R. theriacæ veteris à nobis dispensatæ lib. i. acetosæ M. 3. flor. chamæmel. pulegij, graminis, card. benedicti ana M. 2. Temperentur omnia in vino albo, & distillentur, & aqua seruetur vsui. De qua cap. 3. 2. cum 3. 3. aquæ acetosæ & buglossi. Hoc autem faciendum est, cum ingrediatur lectum aut stupham. Hæc aqua curat dolores, si per se detur, vel cum decoctione milij solis, vel schenæ, vel bardanæ. Ego cum optimo successu curavi multos pueros & senes, & debiles, hac aquæ theriacalis potione, vel addendo guttas aliquot decoctionis communis gaiaci. Nam propter tenuitatem citò penetrat, & extra propellit. Hæc, cum aqua extinctionis auri omne vitium argenti viui emendat.

Est & alia ratio curandi morbum Italicum, & potissimum quando cum doloribus fit. Et ea est ratio, quæ fit per decoctum rerum odoratarum. Cui quidem decoctio addetur mel, & dabitur cum vino, vt materia incalescat, attenuetur, & expellatur. Fietque sic

Decoctum quod calefacit, attenuat, expellit materiam morbi Italici inueterati.

R. galangæ maior. & min. Macis cariophyl. cinamo. schœnanthi, spicæ celticæ ana 3. i. florum anthos, stachados, elamon. ana p. 2 fiat decoctio in vino albo: Et de hac decoctione cum melle fiat portio. Cap. singulis matutinis 3. 3. Et prouocetur sudor. Ego curavi pauperem facta euacuatione aqua illa ablutionis aloes ad pilularum elephang. præparationem. Quam quidem
aquam

aquam abiciunt Pharmacopœlæ. Et est aqua cisternæ, in qua decocta sunt odorata, & in qua abluitur aloë, & quia relinquitur in ea aliqua vis siccandi, quam desideramus ad morbi curationem, & præcipuè eius qui cum doloribus, vel scabie infestat, hanc retinemus, & vitumur. Fit etiam decoctum ex gaiaco, palma sancta, schina, salsa parilla. Sed primum cœpit fieri ex magnis truncis gaiaci, & cortice: Deinde ventum est ad palmam sanctam, quæ materia eadem est. Et fiebat decoctum ex rasurâ gaiaci lb. j. & 3. iij. corticis, cum lb. xij. aquæ post infusionem 24. horarum. Hoc facto rationales quidam Medici magnificè de se sentientes, aliquid addendum existimarunt, & addiderunt castigantia calorē & tenuitatem partium. Et id facere se affirmabant, ne corpus calidius redderetur. Sed hi, dum castigationis caloris curam habere se existimant, tantum abest, vt calorem castigent, vt omnino ipsum calorem impendant. Verum satius erat morbum curare cum leui aliqua noxa, quàm non curare. Potest enim vitium amoto morbo emendari. Nam hi rationales, existimarunt lignum calidius esse, quàm oporteat, & sit, decepti tenuitate partium. Præterea hi addebant endiuia, scariolam, lactucam, & alia similia, & sic præscribendo, impediabant sudores, atque adeo morbi curationem. Sunt & alij, qui non castigare nituntur, sed iuuare. Alij verò cientia sudorem dant. Alij purgantia sudorifica præstantiora putant, quia iuuant operationem medicamenti: alij verò addunt laxantia medicamenta, vt veratrum nigrum, non sine multorum magno malo. A-*Veratrum* liij colocynthida, alij senam, agaricum, turbith. & alia la-*pericu.* xantia. At hoc non est methodicè factum, velle & per alium & per sudorem simul & semel euacuare. Quare satius erit vnâ partem decoctionis accipere, & in illa purgantia dissoluere, & de illa dare tertio, vel quarto, vel quinto die, vt iam dictum fuit, vel quotidie, & non prouocare sudorē. Quod vtile est in principio, quâdo morbus externas partes non infecit adhuc, vel læsit. Fiant ergo decoctiones simplices & cōpositæ. Simples ex simplici rasura ligni gaiaci, & aqua; sic.

R. rasuræ ligni gaiaci libram 1. cortic. eiusdem 3. 4. fiat infusio in lib. 12. aquæ, & decoctio ad consumptionem

tertiæ partis. Utatur. Fiat decoctio secunda ex eodem ligno, id est, residua primæ decoctionis, ut prius. Deinde addunt vinum, quod bonum est, aliquando tamen malum in doloribus exteriorum membrorum, & in duritiis, & aliis. Valet tamen illa vinosa decoctio in doloribus capitis. Deinde facta est decoctio composita. Nam alij addiderunt multa, hoc modo præparantes.

R. ligni gaiaci lb. 1. rad. elenij, beniouini, santal. ommium, senæ orient. ana ʒ. 2. herm. ʒ. 1. coloc. ʒ. 3. fiat infusio, deinde decoctio. Cuius collaturæ adde mell. lb. 2. fiat syrupus clarif. & aromat. cum ʒ. 2. cinamomi. Quibus adde vini lb. 2. Alij mediam partem addant. Vel sic faciunt.

R. ligni gaiaci lb. 1. cort. eiusdem ʒ. 3. polypod. querc. recentis mummia, santal. carabæ, beniouini ana ʒ. 2. senæ orient. quartar. 1. fiat infusio in æquis partibus aquæ & vini: cui adde mellis lb. 2. fiat syrup. arom. ʒ. 2. cinamomi electi.

Decoctio, quæ hodie fit efficacissima in aquis distillis, quæ citò morbum curat, laxat potenter & siccatur.

R. rasuræ ligni gaiaci lb. 1. cort. eiusdem ʒ. 3. agar. ʒ. 1. senæ orient. lb. 1. aloës quart. 1. fiat decoctio in lib. 6. aq. bugl. & tantundem absynthij. Et fiat decoctio ad consumptionem quartæ partis. De cuius coll. capiat mane & sero ʒ. 6. Multum laxat & siccatur, ob id curat potenter. Aloë & absynthium quia potenter siccant, huic morbo multum præsunt. Itaque iis qui dolores patiuntur, utile est uti pilulis ex sola aloë. Sed quia in pilulis non possumus iustam quantitatem aloës apponere nec accipere, utilius erit hieram picram deuorare, vel quotidie, saltem ʒ. 4. Infinitæ aliæ decoctiones parari possunt additis aliis, ut rad. cyclaminis, quia urinas & sudores mouet, vel milio solis, quod potenter siccatur, & sudores mouet.

In pauperibus usus sum syr. sancti Ambrosij, qui ex decocto milij paratur, & rametis ligni ficuum. Non dubito rasuram buxi, quia sudores mouet, morbum curare posse. Sed quia dolorem capitis facit, & foetidior est, negligitur. Non defuerunt qui ramenta iuniperi usurpanda censerent. In qua sententia erat Franciscus Rex Galliarum, & Castellanus. Pugnaui nixus auctoritate Diosc. qui ex
anti-

antiquorum sententia ramenta iuniperi occidere dicit. Quam sententiam cum negarent esse apud Diosc. ostendi. postea requirebant cur semina iuniperi usurparent in medicamentis, ramenta verò reiicienda censerent. Ego rationem sic reddidi. Compertum est observatione multa, partes multarum plantarum diuersas habere facultates, alias viles, alias inutiles, vt patet de centauro minore, cuius flos usurpatur & quotidie in vsum venit, radix verò prorsus negligitur & inutilis est. Sic de coriandro, cuius semen odoratum est & in vsum medicum venit, herba autem foetida est, & planè venenosa. Itaque non mirum est si dixerimus fructum iuniperi alium succum magis coctum habere & alterius esse facultatis, alterius verò ipsum lignum. Semen iuniperi in decoctionibus gaiaci ponitur, quia sudores mouet, & digerit potenter, ac articulari dolori à morbo Italico, atque etiam in declinatione alterius morbi prodest. Quod de ligno demonstrari & probari non potest. Sunt qui dum herbas humidas in principio addunt, medicamenti vim corrumpunt. Inter laxantia medicamenta, sena maxime laudatur, quia suo sapore non est molesta, & mirus impedit sudores. Alia autem laxantia vel quia potentius trahunt, vel quia adstrictionem seruant, minus laudantur, vt rhab. polypod. quæ nõ nisi in declinatione debent dari. Rhabarb. & polypod. cum vino propinantur, cum dolores in articulis sentiuntur. Rhabarb. cum scabies, herpes, vlcera egri infestant, assumi debet. Postea quàm autem ad sumenda venimus, non erit præter institutum de aliis remediis quæ ad hunc morbum faciunt, aliquid in medium adferre, & de illis tractare. Sunt qui ligni substantiam in forma pulueris vel conditi administrant. Sed id parum emolumenti ac adiumenti adfert, quia ramenta illa sunt nimium crassarum partium, atque adeo sudores mouere nequeunt. Quare hunc modum curandi tanquam inutilem relinquimus.

Alij ad tophos, vel exostoses digerendas, doloris materiam absumendam in morbo antiquo aliud remedium usurparunt, quod quibusdam profuit, nonnullis verò vitium in ventre reliquit, quod emendari non potuit. Vocatur autem illud remedium, pilulæ Barberouffe. Vel

paratæ ex cordialibus & laxantibus medicamentis, & argento viuo. Sed inter harum pilularum compositiones melior est hæc. Pilulæ ad morbum antiquum, ad exostoses & tophos digerendos, doloris materiam abluendam: quæ Barberouffe dicuntur.

R. rhab & agar. an. ʒ. 2. aloes ʒ. 1. arg. viui extincti in succo ros. ʒ. 3. cina. ambra ana ʒ. 1. myrrhæ mastich. ana ʒ. 1. Cum terebinth excipiantur: Et fiat pil. 8. pro drachma. cap. ʒ. 1. pro prima dosi, deinde ʒ. 1. ʒ. postremo ʒ. 2. Pro diuitibus adde limaturæ auri, vel pannorum auri ʒ. 4. Non desunt qui diagredium colocynt. & fortiora remedia addi velint, & addant. Verum novæ materie descensum nimium accelerât, sicq; corpus minus siccat. Itaq; parum iuuant. Sed quia timetur ne remaneant in corpore ob tam parvam quantitatem, idcirco ingrediuntur rhabarb. & agary ad leuiter laxandum. Nam si tam parvam morâ in corpore traherent, nihil aut parum iuuarent. Possunt & fieri pilulæ alio modo, vt sequitur.

R. ladanî puri, hypocistidis ana ʒ. 1. aloë ʒ. 1. ambra, moschi ana ʒ. 1. argenti viui loti in vino ʒ. 2. incorporentur simul cû syr. ros. laxatiuo, & fiant pil. cap. ʒ. 1. singulis matut. Verum hæ pilulæ non debent assumi nisi purgato corpore. Et qui vententur, debent vti donec aut venter laxetur liberalius (quod pro quantitate medicamenti fiet) aut in ore foetor aut calesfactio appareat & sentiatur. Hæ pilulæ debent seruari, piæq; in officinis præscribi ob calumniâ: Quia etiâ si post decem annos aliquo morbo corriperebuntur, qui hoc remedio vsi fuerint, huic impingerent ac imputarét. Quare Medicus ipse potest parare, ac paratas seruare, & quotidie propinare, aut quando necessum erit, idque ne argentum viuum cognoscant, quod non potest latere cuidam datum. At sublimatû dare cauendum est, quia vrit vt præcipitatum. Sunt qui ob negotia non possunt domi residere, sed equitare, & ad negotia ire coguntur. Alij morbum detegere nolunt. Omnibus talibus pilulas dare oportebit. Atque etiam emplastris eos curare possumus, præmissis tamen ac prius propinatis multis purgationibus, vt iam supra imperatum est. Illis autem fient emplastra magna ad formam lati scuti, vt omoplatas & sternum vsque ad lumbos integre

tegere possint, vel latissimæ fasciæ, quæ veluti zona, corpus cingant, ita tamen ne in anteriore parte emplastri materia ponatur, sed in lateribus, & parte postica. Possunt & fieri manilia, & carpis, & malleolis apponi. Sed multò melius erit, si emunctoriis apponantur dicta emplastra, & locis affectis: Sed emunctoriis primum, deinde super tumores vel partes dolentes. Emplastra fiunt ex his, quæ ex alto trahunt per sudorem, vel per insensibilem transpirationem. Parari etiam possunt ex superscriptis unguentis minuendo ol. quantitat. & addendo picis vel resinæ q. suffic. Possunt etiam fieri ex omnibus emplastris digerentibus & malacticis, addendo argenti viui 3. 4. pro lb. i. emplastri. Fieri etiam possunt emplastra ex emplastro de meliloto, oxycroco, ceroneo. Vel fiat hoc modo. Emplastrum pro iis, qui ob negotia domi manere nequeunt, vel nolunt omnibus morbum patefieri.

R. massæ emplastri de meliloto, vel oxycroci lb. β. argenti viui 3. 2. malaxentur cum terebinth. & ol. laurino, vel irino, vel rutaceo, vel de spica: & reducantur ad formam cerati. Est emplastrum paratum in officinis de Vigo nomine, vel de ranis, quod adhiberi potest. Verum erit efficacius si dosis argenti viui augeatur, utpote pro lb. i. emplastri, 3. i. addatur argenti viui. Conueniet hyeme, vel cum fuerit tempus frigidum, & quando ossium fragmenta trahenda sunt. At si vlcerâ ostracea castiganda sunt, vel cicatrizanda, emplastro diuino, vel diacalcy. addito argêto viuo & cinnabrio citius curabuntur, quàm aliquo alio. Nam argentum viuum videtur esse antipharmacum morbi Italici, tum ob siccandi vim, quam tantam habet, tum ob tenuitatem partium, & euacuationem quam facit potius quàm alia qualitate, ut postea declarabitur. Nam ut ex India morbus allatus est, sic etiam inde remedia huius allata sunt, & multa, ut gaiacum, schina, salsa parilla. Quæ quidem ostendunt Deum omnia summa prudentia composuisse, qui eo in loco, ubi morbus populariter grassabatur, ibi remedia quoque multa & conuenientia præstò esse voluit. locique incolis diuinam remediorum vim detexit. Verum rei propositæ consentaneum videtur, ut de schina ac eius præparatione aliquid dicamus. Schina radix est cuiusdam

iunci, similis fermè radici rhodiz, nodosa, rara, ponderosa cum recens est. cum vetus, leuissima. Quæ quidem leuitas eam antiquatam & deteriorem esse ostendit. Hæschina ad colorem galangæ maioris accedere debet, si bona sit: viribus tamen differt. Nam est planè sine sapore, vnde dicta est à nonnullis apios. Quod nomen multos & Medicos & pharmacopolas decepit, existimantes esse apion Diosc. quæ quidem viribus & forma differt & nominis impositione. Nam Diosc. apios dicitur, quòd pyri agrestis formam referat: hæc autem, quòd nullo sapore prædita sit. At satius est eam schinam nominare ne abutamur nomine. Cuius vsus talis est.

Preparatio radic. schinæ in diætâ morbi Italici.

Radic. schinæ diuidatur in taleolas, & decoquatur in aqua fontis, & ex illa aqua bibant ægri manè & sero. Decoqui debet ter. Et 2. ac 3. deco. cum minori quantitate aquæ debet fieri, quâ prima vel diutius concoquenda, facta prius infusione per 12. horas. Est aut decoquenda sine fumo, & seruanda in loco calido. Prescriptio talis est.

R. radic. schinæ in taleolas diuisæ 3. 2. aquæ fontis lb. 12. infundatur per 12. horas, & decoquatur ad consumptionem tertiæ partis. Et de hac cap. tepidè manè, & cooperiatur: & sudet in lecto. Fiat & secunda deco. ex eadem radi. iam cocta, quæ prius siccetur oportet. Fiat & tertia eodem modo. Delicatis & iis, qui aliquibus aliis sunt. vsi remediis sufficit ista, etiâ si addatur mel vel saccharum, vel vinum. Si autè nullis remediis sint vsi, nec vsuri, illa sine melle, vino, & saccharo, vti debet, quia minus nutrit & magis siccatur. At hi possunt vti amygdalis, pineis, prunis, & pane asso. Delicatis, & qui nullo alio remedio vtuntur, vel qui diu hoc volût vti, cõceditur vsus auicularum tostatarum. Si verò hi vtantur decocto gaiaci, quia magis nutrit, tenuate victu est vtendum, quia illud habet aliquem succum quo nutrit. Ob id diutius erit vtendum, & parcius viuendû, vt tota materia absumatur. Abstineant à carnibus & vino, vtantur pane puro fermentato & bene cocto: & regantur hoc modo. Facta prius purgatione vt sæpius dictum est, ægri accipiant bis in die decoctum schinæ, manè hora quarta, & sero hora tertia post meridiè, ad quât. 3. vj. Et sudet in lecto. Die secunda autem

autem decoctione bibant, quantum voluerint. Poterunt
 uti fructibus lenientibus aluum, passulis, ficibus, amy-
 gdalis, pineis, prunis coctis, pane bis cocto. In gaiaci ve-
 ro diæta, nihil ultra. In diæta verò salsa parillæ, ut schi-
 næ, usus auicularum multum tostarum cōceditur serò vel
 manè. Abstineant à iusculis, aliisq; nisi in die quo medi-
 camenta assumuntur. At si æger imbecillior sit, semel in
 hebdomada capiat de syrupo laxatiuo iam præscripto,
 vel de opiatis laxatibus sequentib. Vel infunde ʒ. j. fenę.
 Et hæc in leui morbo. Et ca. manè. Et eo die nullo modo
 prouocet sudores. Opiata verò cōficiatur sic. Opiata que
 poterit exhiberi qualibet hebdomada, dum fiet diæta.

R. cathol. & confect. hamech. ana partes æquales,
 quibus adde ʒ. ij. fennæ oriēt. pro libra. cap. semel in heb-
 domada, ut dictum est. Et detur in forma boli, vel dissol-
 uatur in parte decoctionis. Ex salsa parilla eadem deco-
 ctio paratur, quæ ex schinæ, & eadem victus ratione uti
 oportet, ut dictum est, quia non nutrit, ut gaiacum. Qua-
 re cōceditur caro auicularum assatarum: & eodem mo-
 do administratur, purgato iā exactè corpore, etiam se-
 mel in hebdomada assumendo medicamentum laxans,
 prouocando sudores cooperaturis vel calidis lateribus.

Si post usum istorum remediorum aliqua remaneant
 ut erant prius, signum est aliquid esse quod impediat
 curationem, ut intemperiem alicuius partis, quam ca-
 stigare oportet, idque contrariis remediis. Vel si os est
 corruptum, vel vlcus adsit nondum satis detersum, illa
 omnia sensim castiganda erunt. Verum huic morbo
 quedam accidentia sæpe eueniunt, ut videlicet inter su-
 dandum ex nimia ac repentina calfactione iuxta ignem,
 incidunt aliquando in animi deliquium. Qui quidem
 sunt subleuandi aeris frigidi inspiratione, & aspersione
 aquæ frigidaæ cum pauco vino reuocandi. Quod si sym-
 ptoma illud post multos sudores accadat, recreandi sunt
 pane immisso in vinum: & infectos vnguento pannos
 permutare optimum erit, ut resumant vires. Quo sym-
 ptomate sedato, sensim erunt rursus vngendi, ut curen-
 tur. At si fluxus ventris sequatur, sinendus, si vires ferre
 possint. Sin minus, succo carnis, iusculis, panatella, hor-
 deato reficere oportet, & leuiter adstringētibus assum-

ptis mederi. Sed primùm euacuanda materia commota. Quòd si non tota euacuari possit, moderanda tamè est, & non in totū relinquēda. Aliquando etiam dysenteria huic morbo superuenit, quam clysteribus detergētibus curare oportet, in quibus pinguedo hirci addenda erit, vel axungia porci, si magna sit acrimonia. Axungia enim porci optima est ad retundendā acrimoniā medicamēti inducentis dysenteriā. Theriaca recēs cum limatura auri, vel cum pannis auri curat dysenteriā mala qualitate castigata. Hæc dysenteria curanda est vt alia, assumendo scilicet rhab. myrob. & hoc ad humoris euacuationem. Utendum etiā erit astringētibus, detergentibus, & cicatricē inducentibus. Aliquando etiam fiūt vlcera in ore, quæ quidē in principio gargarif. detergentibus erūt detergēda, deinde aqua forti tēperata aqua rosarū & plantaginis erunt tangēda: Postremò gargarif. adstringente, etiā fortiter siccante curāda. Sed vt ordine procedatur, sic erit faciēdum. Primò gargarismata paranda ex decoctione hord. mundati, & syr. de ros. siccis, hoc modo.

℞. hord. integri p. ij. ros. p. ℥. fiat decoctio. & in ℔. j. coll. dissolue syr. violari (ob calorem & fœtorem) ℥. iij. fiat gargarisma, quod quidem refrigerabit, & non adstringet multum. Si autem vlcera fuerint à principio, gargarif. ex adstringentibus parare oportet, ne pars affecta tam auidē materiam recipiat, fiat igitur sic.

℞. foliorum oleæ, myrthi, lentisci an. M. j. plātag. M. ℥. ros. p. ℥. hord. p. ij. fiat decoctio ad ℔. 2. in col. d. solue vini maiorū granat. ℥. ij. diamoron & syr. ros. laxatiui ana ℥. j. Misce fiat gargarisma. Syrupus ros. laxatiuus abstergit. Magis adstringit & siccatur syr. de ros. siccis. Quare post deterfionem, vel sufficiētem exsiccationem adstringentia fortiora addi debent. Vt cūm vlcus siccandum est, efficacissimum erit hoc gargarisma.

℞. pilosellæ M. ij. foliorum pyri syluestris vel myrthi vel mali cydonij, vel sumachi vel sorborum M. j. cort. mali grana vel balaustiorum ℥. j. ros. p. j. fiat decoctio in aqua & vino albo: & in lib. iij. coll. dissoll. mell. ros. col. syr. de ros. siccis ana ℥. iij. fiat gargarif. clarificatum, quia cortex mali granati denigrat linguam, & asperam reddit, huic adde aluminis ℥. j. & siccabit, vel aquæ fortis

fortis 3 j. in 3. iiii. Nota quòd nunquā cessat defluxio donec vlcera integrè curata sint, & dentes deterfi. Nam illa lippitudo vel fulgio quæ expiratione fit, exulcerat linguam. Itaque oportet aqua forti confricare dentes, vt auferatur vis illa arrodendi vel putrefactiua. Hæc aqua detergit dentes & dealbat, & firmat. Fricantur dentes panno alligato specillo vel bacillo, & immisso in aquam illam, castigatam aqua ros. & plātag. Si vlcus perseueret, & inflammatum appareat, oportet iudere linguæ venā, & cucurb. cum scarificat. admouere ceruici: deinde gargarismis supradictis repellere, siccare, & cicatricē inducere. At quia aliquando peccat iecur, ad eius deterfionē & purgationem bonum erit vti syr. sequenti, qui ægros vindicat à recidiua, & aliis subueniētibus affectionibus. Syru. ad deterfionē & purgationē iecoris in iis qui exulcerationes, scabies, herpes, & alia cutis vitia patiuntur.

R. rad. lapathi acuti, acetosæ, & buglos. borrag. endiuæ, cichor. scariolæ, ceterach. polytr. adianthi, agrimonia M. j. passul. prun. sebest. ana num xx. anisi 3. ij. quatuor semin. frig. maiorū ana 3 j. senæ orient. & polypod. querc. ana 3. iiii. tamarind. 3. ij. myrob. citri chebul. ind. confic. in succo ros. ana 3. j. florum cord. ana p. j. fiat decoctio in decoctione gaiaci, aquæ bugl. & absynth. ana lb. j. Et in lb. j. β. vel ij. dissol. syr. ros. lax. 3. vj. rhab. electi tenuiss. pul. & in panno ligati 3. j. aro. cum 3. iij. cinamomi, & cap. 3. vj. bis in hebdomada. Duobus diebus sequētibz ad refocillationem virium fiat talis opiata.

R. cōf. flor. cichor. & bugl. an. 3. j. conf. capil. 3. β. pul. diamarg frig. 3. iij. rasuræ eboris & limaturæ auri an 3. β. triasand. & diarrhodi abb. an. 3. j. Cum syr. confer. cortic. citri, fiat opiata, cap. ad quantitatem auellanae, superbibendo parum aquæ cichor. & absyn. Si ve. ò articulorum dolores, & trophos, vel tumores duros passi sint, aut etiam patiantur, hoc modo fiat syr.

R. elenij 3 j. galangæ maioris & schinæ ana 3. β. betonica, absynth. menthæ, marrubij ana M. β. herbarum capil. cichor. & bugl. ana M. j. passul. dactyl. mūd. ana N. xx. anisi 3. iij. polypod. querc. lb. β. senæ orient. quart. j. sem. carthami 3. ij. turbith. 3. j. agar. 3. iij. florum anthos, stechad. an. p. j. cortic. citri 3. β. fiat decoctio. Et in lb. iij,

colaturæ dissoll. mel. ros. & syr. ros. laxat ana ʒ. vj. sacchari q. suffic. fiat syrupus aromar. cum ʒ. ij. diagalangæ. Et cap duobus diebus sequētibz continuis ʒ. vj. semel in hebdomada per mēsem, postea bis in mense: deinde semel. Accedente hyeme capiat bis in hebdomada vt in principio. Vel si malit, vtatur pilulis ex aloe si curatus sit: Sin minus, pilulis ex hydrargyro, vt supra imperatum est. Pilulæ quæ poterunt accipi loco syrupi supra scripti, vel loco pilularum ex aloë.

R. aloës ʒ. j. galang myrrhæ, agaric. salis gēmx ana ʒ. j. succi absynth. ʒ. j. ʒ. & cum aqua absynth. fiant pilulæ. Cap. manē in exitu lecti ʒ. j. bis vel ter in hebdomada. Et si non sit bene curatus, vel timeat recidiuam, vtatur theriaca, vel mythrid. vel aur. alexandr. Et hoc in crastinum syrupi vel pilularum, bis in mense. Vel fiat talis opiata, quæ poterit accipi loco theriaces, vel mythrid. vel aur. alexandr.

R. cons. anthos, stech. & cort. citri ana ʒ. j. confec. aro. ros. ʒ. ʒ. pul. diamosci vel diambæ ʒ. iij. Cum syrup. de stech. fiat opiata. Cap. manē ad quantitatem auellanz, superbibendo aquæ absynth. parum. Aliquando fissuræ in manibus apparent, quæ argumento sunt morbum non esse curatum. Itaque repetenda erit inunctio, quæ parte sunt fissuræ manuum. Quod si non curētur, etiam vniuersali purgatione facta, possumus hoc modo tentare curationem.

Linimenta, unguenta, & decoctiones, quæ possunt fieri post vniuersalem purgationem, & vunctionem vniuersalem, & hoc in fissuris manuum non curatis à morbo Italico.

R. sublimati ʒ. iij. aluminis ʒ. j. albuminum ouorum fortiter agitatorum quantum suffic. Applicentur supra partem aff. Etam. Vel sic.

R. Vnguenti enulati ʒ. iij. argenti viui ʒ. j. sublimati ʒ. j. misce, vngantur manus. Vel sic.

R. aq. parietar. chelidon. maior. maior. plantag. ana ʒ. iij. sublimati ʒ. iij. calchytidis & aluminis ana ʒ. j. Decoquātur leuiter. Et serò cum ibit dormitū, fricentur & abluantur partes tantum crustatæ, & quæ in circuitu sunt. Hunc affectum aliqui falsurati, aliqui phlegma salsum

tum vocant: & hoc à materia, quam sudant, creduntque hanc materiam morbum committere. Sed scissura est affectus partis interne manuum, & pedum. Itaque oportet proprium esse morbum, vel ob exactam partium illarum temperaturam, vel potius ob tendonem, vel musculum illum latum qui constituit manuum pedumque plātam sensilem & mollem. Aliquando herpes in facie & aliis partibus eueniunt, & curantur remediis herpetibus aptis, & sublimatum vel argentum viuum addatur cum aquis acetosæ, pariet, vel plantag. Quibus aquis adde sublimati decocti cum aqua forti 3. j. in qua ponendum est argentum viuum. Vel tale fiat linimentum.

R. resinæ pini 3. j. cerusæ 3. ℥. arg. viui 2. iij. succi citri, & lapathi acuti ana 3. j. ℥. incorporentur simul, & fiat linimentum, quo linatur pars. Sic herpes curantur, nec amplius redeunt. Efficacius erit, si 3. j. sublimati addatur. Sed quia calfacit, molestiam adfert. Aqua qua extinctum est sublimatum quod ad fucum paratur, etiam curat herpes, vel alumen, maximè si vstum albumine oui exceptum sit, cum succo araniorum vel citri, etiam si non præcesserit sudatio, quemadmodum aloë dissoluta in oxymelite scillitico. Aliquando fit alopecia sine dolore articulorum aut capitis. Sed si aliquando accidat cum dolore, certissimum est signum morbi Ital. Fit etiam sine magnis vlc. eribus, quia humor serosus est sub cute arrodens pilos. Cognitio alopeciæ est, cum non solum pilorum deperditio sit superciliis, vt in lepra, sed in mento, ac etiam in capite fiunt areæ, quæ si in occipite, vel in lateribus fiant, hoc demonstrat eas esse à solo morbo Italico. Nam hæ partes caluitio & casui capillorum ab aliis causis resistunt, ob carnis humiditatem. Retinemus alopeciā abluendo partes affectas lacte. Quæ potius curatur vnguento, quàm diætā. Quare hunc in modum cura erit aggredienda. Purgetur frequenter & fortiter, primum scilicet minoratiuo, deinde apozemate ex herbis quæ purgant aquas, & serosa recrementa siue ichores, vt syr. ros. laxat. cum decoctione mercur. ciclæ, brassicæ marinæ, senæ orient. Deinde confect. hamech, electuario de succo, vt sequitur. Minoratiuum pro alopeciā à morbo Italico.

R. syr. ros. laxat. ʒ. ij. decoctionis mercur. & ciclē ʒ. iij.
fiat minorat. cap. manè. Apozema pro alopecia à morbo
Italico.

R. herbarum capill. abrot ciclē, agrimo. fumiter. la.
patij acuti, acet. ana M. j. brass. mercur. senæ orient semi.
carth. & polypo. querc. ana ʒ. iij. anisi ʒ. iij. florum anth.
bugloss. borrag. ana p. j. fiat decoctio. Et in lb. j. ʒ. dissol.
syr. de fumar. compos ʒ. vj. misce, cap in quatuor matu-
tinis. Potest dari cum decoctione simplici gaiaci, & vii
per quinque dies manè. Quibus finitis cap sequens me-
dicamentum eradicatuum.

R. confect. hamech. ʒ. iij. electuarij de succo ros. ʒ. j.
syr. ros. ʒ. j. aquæ borraginis, & capill. vener. ana ʒ. ij. mi-
sce, capiat. Quod si non satis medicamentum hoc eua-
cuauerit, rursus accipiendum erit de apozemate adden-
do syr. ros. laxat. tantam quantitatem quantam apposiui-
mus syr. de fumar. Et cap. bis in hebdomada, manè ʒ.
iij. serò ʒ. vj. internis partibus purgatis quicquid in ha-
bitu corporis per sudores euacuare poterimus, hoc se-
quente vnguento.

R. pinguedinis vrsi ʒ. iij. olei de abrotano ʒ. iij. vn-
guenti martiati ʒ. ij. argenti viui ʒ. iij. myrrhæ, thuris
olibani ana ʒ. ʒ. cineris abrotani, & pellis talparum a-
na ʒ. iij. resinæ, & terebinthinæ lotæ in aqua decoctio-
nis abrotani ʒ. iij. ceræ parum, fiat vnguentum, quo vn-
gantur primum partes inferiores cum brachijs & spina:
deinde superiores, ac etiam eæ in quibus nulli sunt pilij,
addendo in fine vñctionis in residuo vnguenti quod se-
quitur.

R. ladani depurati ʒ. j. cineris pellis vrsi, & pilorū mu-
lieris vel viri an. ʒ. ij. mellis ʒ. j. fricetur pars affecta ma-
nè & serò, ac vngatur, deinde cooperiatur Post vnguen-
tum fiat lixiuum, quo abluentur partes tentatæ alope-
cia, hoc modo.

R. ciner. abrot ʒ. iij. ciner. absynth. ʒ. ij. ciner. talpæ, &
pellis vrsi ana ʒ. j. aquæ lb. iij. fiat lixiuum, in quo deco-
quantur herbe sequentes.

R. herbarum capill. abrot. beton. saluiz, pulegij, ana
M. j. Et cum decoctione abluantur partes. Et si talpa re-
periatur in illa regione, erit decoquenda, & pars leuiter
confri-

confricanda. Aliquando etiam fit dolor capitis à morbo Ital. & hoc euenit quando materia pituitosa vel serosa & putrescens est: & tunc dolorem in parte anteriore capitis, & circa tempora & aures, & maximè cum quadam grauitate facit. Aliquando is dolor in internis partibus est, aliquando in externis. At quando in externis est, & sentitur extra caluariam, nec oculorum nec aurium dolor eos vexat. Et aliquando in hoc dolore alopecia apparet, & hoc in aliqua parte capitis, & sæpissimè in lateribus, tuncque est certissimum morbi Ital. argumentum. At internus externo, & nocte magis afficit, quàm interdiu, ac magis in mutatione. Austrina ad Borealem, & à Boreali ad Austrinam, quàm alio tempore. Et in palpebris dolor sentitur grauis, ita vt pili videantur sursum erigi. Verùm aliquando recens est, aliquando antiquus. Si recens sit, sine tumore sit, qui & si aperiatur, nulla sanies aut materia apparet. Et hoc est quia incipit distendere pericranium a cranio. Alia quoque signa morbi Ital. præcessisse oportet. Vt si diuturnus fuerit, & tumorem faciat, verendum de abscessu oris & carie. In aliquibus primùm incipiunt apparere tumores ob vsum vnguentorum multorum, quæ quidem potuerunt humorem tenuare, & in vaporem mutare, sed non resolvere: aut etiam quia æger ante perfectam curationem se aeri frigido commisit, unde relictæ sunt materia sub cute, quæ pericranium distendendo dolorem facit. Aliquando etiam cum dolore capitis sentitur dolor in acromio, sterno, ceruice, & iuncturis extremitatum, nulla tamen apparente exulceratione vel scabie. Et ob eam causam multi putant dolorem hunc à morbo Ital. nec procedere nec oriri. Et leuis calfactio hunc dolorem mouet ac exagitat, magnus verò calor mitigat: quemadmodum videre est de cibo assumpto qui eum euidenter sedat ac mitigat, etiam si per consensum non fiat dolor. Hic aliquando primarius affectus est, id est, æcidit in recenti morbo, aliquando ex recidiua. Ad cuius curationem iniiciendus est primùm clyster præscriptus in dolore capitis à pituita: deinde exhibendæ pilulæ stomachicæ, vel de hiera cum agarico & sale gemmæ. Postea coquatur materia cum syr. de stecha. & melle ros. vel anthosato, vel scyllit. dissoluta.

in aq. beton. melissæ, hysslo. vel in decoct. herb. capill. vel gaiaci. Et capiat in quatuor matutinis. Quibus finitis purgetur potenter pilulis euacuantibus pituitā, vt cochliis & de sarcocolla, de agar. acaliis similibus vel electuario diacarthami vel de citro solut. vel Indo maior. vel diaphæn. vt de dolore capitis à pituita monstratum est. Facta euacuatione præscribatur masticatorium ex pirethro, quo vtatur per spatium quatuor aut quinque dierum manè & serò. Post vsuū verò masticatorij exhibeatur theriaca antiqua, superbibendo parū aquæ vitæ, vel parum decoctionis gaiaci. Vel detur aqua theriacalis prouocans sudores, quæ quidem aqua parabitur sic,

Aqua theriacalis pro dolore capitis à morbo Italico.

℞. theriacæ antiq. ℥b. ℞. rad. elen. schinæ ana ℥. iij. cyclam. 3. vj. ligni gaiaci, & corticis eiusdem maceratorum per diem in vino albo ℥b. ij. Ponantur omnia in vase vitreo, & distillètur vt solet distillari aqua vitæ. Cap. pro dosi ab ℥. ij. ad ℥. iij. At si sit corpore multum pituitoso ac obæso, neque facile sudet, vtatur decocto sequenti.

℞. rad. elen. ℥. iij. polyp. quer ℥. iij. eboli ℥. ij. rasuræ ligni Indici ℥b. j. follic. senæ ℥b. ℞. Macerentur maceranda, & decoquantur in ℥b. i. aquæ ad consumptionem tertiaræ partis. In fine iniicere senā, & ℥. iij. sem. colocy. mel. ℥b. ij. fiat syr. arom. cum ℥. ℞. cinam. vel zinz. Cap. manè & serò ℥. iij. Et non prouocet sudorem. At pro imbecilibus, fiat sine colocyn. Vtatur per octo dies, donec dolor sedatus fuerit vel mitigatus. Super caput apponantur præsidia topica descripta cap. de dolore capitis à pituita. Si autem sit pauper, nec tantam impensam ferre possit, aut ob sua negotia non possit retineri domi, vtatur sequenti vnguento.

℞. vnguenti martiati. & aragon. an. ℥. iij. euphorb. ℥. j. argenti viui ℥. iij. (extinguatur in lib. ℞. axung. porci) ol. cham, & rutac. ana ℥. iij. tereb. lotæ in aqua vitæ ℥. ij. ceræ parum, fiat vnguentum. Vngantur primum partes dorsi, deinde ceruicis, postremo iuncturæ extremitatū. Quod si hisce remediis dolor sedatus non fuerit, vt funditus auferatur, fiat sequens emplastrum.

℞. emplastri diuini ℥. iij. vnguenti de vigo. ℥. iij. euphor. ℥. ℞. argenti viui ℥. ij. malaxentur cum oleo rutaceo, &

ceo, & fiat emplastrū. Apponatur supra caput illis prius abrasis. Quod si multa alia remedia præcesserint, oportet primū talia emplastra partibus remotis ad mouere, deinde capiti. Multi in curatione huius morbi Italici vniuersali medicamenta frigida adhibent magno errore, quia hæc frigida humores refrigerant & incrassant. Aliquando accidit etiam vlcus narium, quod difficillimè curatur. Et vt huic possimus mederi, sicut & reliquis accidentibus, hic apposuimus exemplum tale.

Ad vlcus narium à morbo Italico, quod non potuerat curari neque à Medicis Italię, neque ab aulicis, neque à cæteris Monspeliensibus.

*Curatio
Vlceris na-
rium à
morbo Ita-
lico.*

R. cortic. thuris, sang. drac. ana 3. j. cort. mali gran. 3. iij gummi tragac. leuiter assi 3. j. ꝑ. fiat puluis tenax. qui immittatur naribus cum tenta, addita mucilag. sequenti.

R. ichthyocollæ 3. ꝑ. calcis viuz nouies lotæ in aqua cister. deinde cum aqua plantag. 3. j. fiat mucilago.

R. cort. thur. mastich. olibani, myrrhæ, styracis, gummi iuniperi ana 3. ꝑ. ros. rub. santal. omnium ana 3. iij. auripigm. rub. 3. iij. marchasitæ, id est, lapidis pyritæ 3. iij. cum mucilag. gummi tragac. fiant troc. quibus suffumigentur cooperimenta capitis, addendo balauft. & spongiæ bedegar. ana 3. iij.

*Troc. ad
suffumig.*

R. cort. mali gran. 3. j. gallas num. x. plantag. caudæ equinæ. polygoni maris, herniarie ana M. j. herbæ re-trahit. M. ꝑ. fiat decoctio in aqua ferrata, de qua abluantur partes affectæ. Deinde apponatur puluis cum mucagine præscripta. Reiteretur fumigium prius ordinatum addendo cinnabrij 3. iij. Et formentur trochisci cum terebint. Et fumigentur vt prius.

Hic omisimus omnia alia, quæ illi & in Italia, & in Gallia præscripta fuerint, tum propter multitudinem prescriptionum, tum quia ab eis non fuerat curatus. Hec sunt accidentia quę ferè solent euenire in morbo Italico. quibus debetur curatio. Nunc ad suffumigia veniendum, quibus etiam solēt vti in hoc morbo. In curatione dolorum à morbo Ital. vtimur suffumigio, & ad curationem vlcera humidorū, quę diffici è cōsolidantur, vel etiam cum vlceris cōsolidationem accelerare volumus. vt ego feci in quodam nobili, qui per sex menses Lugduni à

medicis & chirurgis tractatus fuerat, neque tamen vlla diæta, vllôve medicamento curari potuerat. Ego verò quatuor diebus curavi eius vlcus, ita vt priusquam perveniret domum suam, quæ quatuor dierum itinere distabat, integrè curatus sit. Hoc remedium (scilicet fumigium) desiderat vires robustas, quia forte est, & periculosum. Itaque in præhumidis & fortioribus eo est utendum. At debilioribus, & qui multa alia remedia frustra sunt experti, quod sit in lecto, fumigium optimum erit, vt nunc ostendam. Purgato corpore diligenter iterum atque iterum utendū erit masticatoriis per aliquot dies, modò non sit vlcus in ore. (Nam tunc errhinis, non masticatoriis est utendum) deinde suffumigio manè vel serò in lecto, cuius fumum per canalè dum accensum cremabitur, ducet. Tale autè erit, quod sudorè prouocabit. Ponantur carbones accensi in olla, & in eadè superiniiciatur fumigium super carbones, & cooperiatur operculo, à quo fistula deducatur in interiorè partem lecti. Quòd si æger non possit ferre odorè, exerat licet caput extra lectū, modò ceruix exactè pānis & linteis circumdetur & obuoluatur, vt fumo per superiorè partem nullus pateat exitus. Hæc autem fiunt in debilibus, & iis qui cubiculum calidum & pavilionem (vt vocant) commodum habere non possunt. Fit autem pavilio ex linteis simul ligatis & ex alto dependentibus, & vndiquaque ægrum inuoluentibus, in quo sedet æger ad sudandum: & imponitur fumigium super multos carbones, vt aer sub pavilione inclusus calefiat multum, atque adeo madore suffumigij infectus, sudores alliciat, sicq; corpus siccet. Si verò odorem ferre nequeat, extra pavilionè caput reneat, & paulò post lecto impositus egregiè sudet. Reiteretur suffumigium pro viribus ægrotantis, & morbi cōtumacia, donec fiat excretio per os. Quòd si ob imbecillitatem continuè vsum ferre non possit æger, vtatur ex intervallis, vt per tres dies, deinde quiescat per quatuor vel plures, deinde ad idem redeat suffumigium. Interim verò vtatur optima victus ratione attenuante, & leuiter exsiccante, aut saltem non multum humectante. Alimenta sint laudata, & quæ faciliè concoquantur. Et abstineat à vino. Cum hoc suffumigio utentur, sit illis vini loco

loco hydromel, vel decoctum secundum Igaici. Nam vini potio eo tempore vnà cum argento viuo facit paralyfim. Cæterum post has tres fumigationes purgetur rursus vniuersum corpus, vt prius imperatum est in diætâ, idque singulis hebdomadis, syrupis scilicet laxantibus, vel opiata, vel denique pilulis ad humorum pituitosorum euacuationem accommodatis.

Observa

Suffumigia vim habent in cinnabrio, ob argentum viuum. Quare oportet illud quâtitate superare alia. Sed adduntur aliqua, quæ ad odoris castigationem faciunt, alia verò ad curationem morbi, alia deniq; ad excipiēda medicamēta. Sed illud à me semper obseruatū est, quod li. de medicamentorū quât. & lib. de formis remed. à nobis monstratū est, vt scilicet ea vsurpētur, quæ ob multas rationes vsurpari debent, vt si fieri possit forma remedij pluribus nominibus iuuet. Vt exempli gratia. Cinnabrio sunt addenda aliqua quæ odorem castigent, nō cinamomum, non moschum, non muscum arborum, non hypocist. non ladanum, quia etiam si sunt odorata, sunt tamen adstringentia, & actionem præcipuam retardarent, vel impedirent sudorem: Sed sunt vsurpanda odorata, quæ sudores mouent, vt beniouin, styrax, calamita & liquida. Si ergo scōpus sit procurare sudores pro doloribus sedandis, sufficiunt supradicta cum cinnabrio, sic.

℞. Cinnabrij ʒ. j. styrac. rub. & calamitæ. nucis mosc. ana ʒ. iij. beniouin. ʒ. ss. Excipe terebinthina, & fiant trochisci ʒ. iij. quibus vtatur, vt diximus. Terebinthinam prescribimus, quia cōfert ad dolores sedandos, & ad faciendum multum fumum. Quod si ex aridis fieret, pinguedo vel oleum addēda essent, vt fumū facerent. Ob id lachrymæ & quæ fuliginem excitant, sunt materia fumigiorum.

Forma suffumigij ad mouendos sudores.

Si ad vlcera curanda fumigium parare voluerimus, parabimus ex iis, & aliis vlcera detergentibus & siccantibus, qualia sunt myrrha, masticx, olibanum, opopanax, gummi ladani, ligna pingua quæ resinam fundunt, vt lignum aloes, ramenta iuniperi, cortex pini macis, nucis moschatæ. Sunt alia quæ arida sunt, vt santala, & illa minùs probantur, quemadmodum neque theriacam & similia istis remediis addi bonum putamus (vt neque vnguentis admisceri, quemadmodum ineptè quidam

fecerunt) quia neque materia apta est ad fumigia faci-
cienda, neque conferunt extrinsecus adhibita, vt neque
theriaca intrò assumpta. Sed fiat sic fumigium ad vlcera
curanda.

℞. cinnabrij ʒ. j. beniouini, styracis, myrrhæ, oliba-
ni, opopanacis an. ʒ. ss. mastich. macis, thuris, an. ʒ. ij. Ex-
cipiantur terebinthina, & fiat fumigium. At ego in vl-
ceribus addo sandaracham, vel auripigmentum, & po-
tissimum cum vlcera in pulmonibus, vel naribus, vela-
liis partibus internis opinor esse. Addimus etiam mar-
chasitam, id est, lapidem pyritem, quia vlcera siccant, &
emollit durities, vt monstrauimus in cura vlceris na-
rium.

Magna helicroi maceratum in ol. laurino, & de ca-
storeo, dolores sedat, si cinnabrium admixtum sit.

Si vlcus remaneat post alia remedia, nec curatum
fuerit, sufficiet partem vlceratam fumigare post deter-
sionem, vel ossis castigationem. Et hæc sufficiant pro
curatione per suffumigia.

Ex supradictis satis apparet argentum viuum antido-
tum, & maximè accommodatum remedium ad mor-
bum Italicum, quia quomocunque administretur,
morbum curat. Nam sudores mouet, & ob tenuitatem
partium siccant. Quod alia medicamenta non faciunt,
quia vel adstringunt, vel sudorem impediunt. Argen-
tum autem viuum siccando ob aeream quandam sub-
stantiam cum tenuitate, quam habet, curat, & suo calo-
re moderato, non autem stupefaciendo vel refrigerado,
vt aliqui somniarunt, aduersus quos in nostra digressio-
ne de argento viuo satis superque disputauimus.

Curatio per vnguenta ex argento viuo ab empiricis
primùm tentata fuit, qui cum scabiei, & illi generi tu-
moris, quod *achor* dicitur, & aliis huiusmodi conferre
vidissent, eoque scabiem capitis & totius cutis curari,

huic morbo accommodare non veriti sunt, eoque
deinceps ratione optima, atque adeo
foelicissimo successu vsi
sunt.

FINIS.

GVLIEL.



GVLIELMI RONDE- LETII DOCTORIS MEDICI, ET MEDICINÆ IN SCHO-

LA MONSPELIENSI PROFESSORIS
regij & Cancellarij.

*De compositione medicamentorum tam internorum, quam
externorum libri duo, quorum prior est de internis.*



ORBORVM alij à natura ob il-
lorum paruitatem vincuntur: alij au-
tem à medio vt illi qui in numero
aucto, & situ consistunt, in quibus cu-
randis natura nihil præstat. Alij à na-
tura quidem vincuntur à medico ad-
iuta victu, ratione, chirurgia, & medicamentis. Aliquã-
do sola victus ratione: quandoque chirurgia, & victus
ratione: interdum victus ratione, & medicamentis: in-
terdum tribus simul. Medicamenta subministrat medi-
cus propria vnique causæ, vel morbo. Primùm caus-
sæ accommodat, deinde morbo, iuxta illud: vnâquam-
que causâ primùm abscindere oportet, deinde ad in-
temperiem factam venire. Remedia autem iustam quan-
titem postulant, ne fortiora quæ sunt, nouum morbum
inducant, neue, quæ multum imbecilla, parum aut nihil
vtilitatis præsent, & curationis occasionem retardent.
Desideratur etiam medicamentorum contraria quali-
tas, & medicamenti forma, de qua nobis hic agendum. *Medica-*
Cæterum variis modis instituuntur medicamenta, vel *menta va-*
ob affectus, vel ob partes læsas, vel voluptatis causâ, vel *riis modis*
ob medicamenti conseruationem. Hinc fit, vt medica- *instituun-*
menta aliquando liquida sint, veluti quando volumus *tur.*
celerrimè in aliquam partem medicamēta defluere, aut *Quando*
partem aliquam humectare, aut cum nolumus medica- *liquida de*
mentum diutius in vetriculo remanere, qualia sunt me- *bent esse.*

*Quando
dura de-
bent esse.*

dicamenta laxantia, quæ ventriculū suā malitiā infestant, ut sunt Veratrum, Thymelæa, Chamelæa, Brassica marina, vel medicamenta quæ ad obstructiones parantur. Multo enim facilius penetrant, quæ liquida sunt, quàm quæ spissa. Item & ea quæ ad mouendos menses, & vrinas, vel sudores præscribi solent, liquida forma esse debent. Aliquando autem dura & sicca parantur ad causas contrarias ut ad ventriculū & intestina resiccanda, constringenda, calefacienda & refrigeranda. Damus enim grana Piperis integra calefacturi ventriculū, hepar non item. Liquida igitur sunt medicamenta ut syr. aquæ, decoctiones & olea: Dura, ut pilulæ: sicca, ut pulueres, trochisci, qui magis ad conseruationem puluerum sunt, quàm ad alium vsum: Item tabellæ tam alterantes, quàm laxantes. Media sunt, ut his vtamur tam in forma spissa, quàm liquida: veluti cum diluimus Antidota & Opiatas, quæque ad mellis cōsistentiam redigi solent, veluti Theriaca, Michridatiū, Diaphenicum & alia huiusmodi, quæ forma boli componuntur, quæ addito saccharo aut puluere liquiritiæ deglutiuntur. Distinguuntur autem medicamenta à forma, ab effectu, & à partibus. Nā alia forma appellatur syrupi, & alia clysteres, alia ab effectis purgantia, alia alterantia, cū vrinas, sudores, hæmorrhoides. A partibus alia appellantur ocularia, hepatica, stomachica, & nephritica. Cæterum quia ista non vna & eadem forma præscribuntur, satius erit formas medicamentorum præscribere, & proponere, facta prius diuisione in medicamenta quæ intro assumuntur, & quæ foris applicantur, & ea, quæ medio modo se habent. Quæ intro assumuntur aut per os deglutiuntur, aut iniiciuntur per sedem, aut per vterum, aut per penē, aut per nares, aut per aures, vel per alia foramina sumuntur. Quæ deuorantur, sunt vel Antidota vel opiatæ, vel pilulæ, vel pulueres: vel liquida ut syrupi, & decoctiones. Quæ verò iniiciuntur, omnia liquida sunt, excepta Balano in anum, & pecto in vuluam immisissis, & puluere, qui insufflatur in oculos, nares, & aures. Extrinsecus admoventur emplastra, ol. vnguenta, fots. sacculi, balnea, pulueres, & huiusmodi. Medio modo ambigunt, nempe quæ apponuntur & iniiciuntur, ut sunt olea quædā, veluti oleum oli-

*Distinctio
medica-
mentorum.*

*Medica-
menta ex-
terna.*

*Internorū
diuisio.*

*Externorū
diuisio.*

uarum dulce, amygdalarum dulce, & alia olea, quibus
vrimur aduersus venena: Omnia enim pingua venenis
resistunt. Et ad vomitiones prouocandas, nec non ad do- *Pingua*
lores partium internarum & inflammationes, vt oleum *venenis re*
amygdal. dule. recens paratum (quia vetus sua acrimo- *sistunt.*
nia dolorem excitat) dolores coli vteri, & ilei, pectoris,
& renum soluit. Eodem oleo pectus inungimus, vëtre
inferiorem (quia stomachus non est relaxandus) aliasque
partes, quas volumus emollire, & laxare. Oleo ouorum *Oleum ouo*
cutis maculas emendamus, & dolores internos seda *rum quid*
mus præsertim ab humore acri. Vlcera interna cura- *præstat.*
mus addito Antimonio: quia siccatur sine morfu: quo ni-
hil est præstantius. Butyrum & intrò & extra assumptum
valet, quemadmodum & omnes adipēs. Collyria quæ-
dam & foris & intro assumpta conueniunt, vt Trochi-
sci de terra sigillata, de bolo armeno. Trochisci verò al- *Trochisci*
bi Rasis in vlcerebus vesicæ, vteri, & inflammationibus & *albi rasis.*
doloris oculorum, & vlcerebus admoventur. Quia ta-
men non possunt deglutiri, tantum extrinsecus admouen-
tur. In summa omnes Trochisci, qui metallica recipiunt,
iniici quidem possunt, sed non deuorari. Verum hæc de
medicamentis medio modo se habentibus. Quare su-
perest vt de reliquis agamus. Hoc itaque lib. de medica-
mentis, quæ intro sumuntur, altero verò de his quæ fo-
ris admoventur, agendum est. Cæterum intro assumpta,
vt iam dictum est, aut per os ingeruntur, aut iniiciuntur:
de quibus omnibus suo ordine.

De ordine.

PArum referre cuique videtur, quo ordine res quæque
doceatur. Quod fuit in causa vt quisque hunc librum
pro suo arbitratu disposuerit. Ego verò semper cum Ga-
leno in scribendo, docēdoque, tum etiā in curando, me-
thodum sequendam censui. Quare cum res sint docēdæ
secundum earum vtilitatē, primum de Balano, deinde de
clystere dicemus. Nam Balanus solet esse primum & fa-
cillimum remedium ad aluum sollicitandam. Quod si
Balanus nihil proficiat, tunc clysterem instituimus. Præ-
terea & syrnpos, medicamenta purgantia, post illa, Opi-
as, Tabellas, Topica remedia. Hunc igitur ordinem se-
qui malimus, quàm alium. Quare de balanis primum

De Glandulis & Suppositoriis.

Huius remedij formam indicat, nominis ratio. Dicitur enim Glans siue Balanus à glandis similitudine, qua olim conformabatur. Barbaris autem suppositorium dicitur, quod supponatur, vel in anum mittatur. Quæ verò nunc cōficiuntur, glandium formam non referunt, sed pessorum potiùs. Teretes enim cōficiuntur instar candellarum cerearū dodrantali longitudine, unde ab earum similitudine, vulgus cādellas vocat. Ea autem longitudo inutilis est planè cū facultatem expultricem non irritent glandes, nisi qua parte tangunt podicem, aut recti intestini extremum. Ea autem pars sensibilis maximè est. Satiùs itaque erit ad glādis maioris similitudinē effingi, crassitiemq; digiti vtrinq; acuti, quò faciliùs ingerantur & egerantur, si integrè egeri debeant. Formantur autè glandes, & suppositoria ad irritandam facultatem expultricem recti intestini, vt expellat induratas feces, & diutius retentas ob duritiem & siccitatem. vel vt clysteres injecti reddantur, vel vt medicamēti iuuetur actio, aut acceleretur: dum intestina nihil habeant lubricitatis à pituita: aut quia podex à frigore nimio ita est cōtractus, vt ne specillum quidem ingredi valeat: aut ob tumorem præter naturam, aut ob tumentes venas hæmorrhoides. Balanis seu glandibus vtimur, cū clysteres ægri non admittūt ad hæmorrhoidas irritandas, claudendas, ad doloris sedationem, ad vlcera sedis, ad inflammationes, ad ventriculi subuersiones, ad vermes sedis occidendos, ad sedis & penis resolutionē, ad mensū prouocationem, & quādo offendūtur partes clysterū iniectione, vel in soporosis affectibus, in quibus somni profundi suspensionem timemus. Sūt etiam inflatendæ glandes, cū clystere non est vtēdum: aut quia morbus, vt Enterocèle, aut tēporis breuitas non patitur clysterem parari: aut quia etiam si clysterem dare instituamus, stercora obdurata clysteris iniectiones ad superiores partes non sinunt penetrare. Sollicitanda est igitur Balano facultas sopita. Fieri autem debent ex relaxātibus astrictas partes, & facultatē animi mouētibus. Ad alutem itaq; cōstrictam fiat ex pinguedine porci saliti, vt in pueris, quod pinguedo, quæcuti adheret, lubricet, & laxet ob pingue-

pinguedinem: salis verò ratione stimulet facultatem expultricem. Fiunt etiam ex radicibus lentum humorem habentibus, vt radice altheæ & maluæ sale trito inspersis. Candella sebacæa inditur, aut cerea oleo intincta. Fiunt præterea ex detergentibus, vt ex pediculo betæ, & pauxillo salis, quod facultatē mouet. Interdū cum nihil aliud sit præ manibus, paramus ex ficubus Massiliensibus abstracto pediculo iqueris, ac sale conspersis. Laxat enim illud pingue ficus internum, & detergēt, & granula illa cum sale, acrimonia sua, facultatē expultricem excitāt. Possunt & perfundi paucō oleo, quò facilius ingrediantur. Quandoq; amygdalas saccharo obductas supponimus. Saccharum enim dissoluit, & partes lubricat, atque ita detergendo, incitat ad alia crassiora expellenda. Ad eundē affectum parantur ex melle cocto indurato, cui salem communem adiungimus, interdum salem ammoniacū, vel gemmæ ad acrius pungendum. Aliquando hieræ vel benedictæ, vel sterco muris: acre enim est. Ad dunt mulierculæ quædam ad pungendum, pilos in tenuissimas partes dissectos ex melle, & sale tosto. Fiūt etiam glādes propter alios affectus, quā vt laxent. Cum enim vlcer in ano est, ad formam glandis remedia redigimus: Ex melle tantum, vt detergeant, consolident, & exiccent: Ex emplastris consolidantibus, vt emplastro diuino, de cerusa: vt sedent dolorem vlcerum, vel hæmorrhoidum. Hæmorrhoidum dolor sedatur glādibus ex seuo, vel oui vitello indurato, vel cocto cum butyro, vel oleo amygdalarum dulcium. Vlcerum dolores sedantur pauxillo opio, leuiter torrefacto, & myrrha castigato, addito emplastris. Pars enim illa faciliè resoluitur, & malum contrahitur appositione narcoticorum. Glandes vlceribus, & ano determinatæ duriores esse debent, quā quæ ad hæmorrhoidum dolores, & alios tumores parantur. Debent enim hę esse molliores ne duritie sua dolorem excitent. Balani ex melle parati in oleo seruātur. Prohibet enim mellis iam cocti, & indurati, dissolutionem. Multo autem melius infiguntur butyro, aut axungia porci. Sunt itaque glandes figura magnarū glandium quernarum, breues, & crassæ, vtrinq; autem acutæ. Earum crassitudo augenda, vel minuenda pro cor-

Hæmorrhoides quibus sedantur.

poris constitutione. Pueris minores, iuuenibus, & adultis maiores. In Italia sunt crassissimæ. Fiunt & supposito-
ria ex sapone, stercore muris, & aliis pulueribus.

De iniectionibus.

*Emolliē-
tia & re-
laxantia.*

*Constrin-
gentia.
Detergēt.*

*Sedantia
dolorem.*

OMnes iniectiones in hoc cōueniunt vt liquidæ sint, fiāntque vel ad emolliēdum, vel laxandum, vel detergendum, vel sedandum dolorem, vel ad resiccādum: quandoque ad calcaciēdum, vel refrigerandum. Conueniunt etiā magis ex parte in materia. Nulla est enim pars quæ maluam agrestem, vel hortensem, vel altheam, vel Brancham vrsinā non ferat, si vel emolliēda sint recrementa, vel pars relaxanda: quibus adiungimus semen lini, scēnugræci, & maluarum semina, quæ lentorem habēt cum qualitate quadam calida. Sūt enim aliqua medicamenta quæ lentorem habent, sed quia refrigerant, plus constringunt, quā laxant, qualia sunt semina cydoniorum, pīlij, pōmorū, & aliorum fructuum. Ad deterfionem cum emollientibus medicamētis fructus aliquos etiā adiūgimus, vt ficus, vvas, pruna dulcia. Nam acida magis astringūt, quā emolliunt. Fructus hī forte magis ad deterfionem, quā emolliitiōē parantur. Ad deterfionem communiter vsurpantur etiā beta, parietaria, caules, absynthiū, & omnes reliquæ herbæ amaræ, & nitrosæ, veluti iniectionibus vlcerum, vel ad occidendos vermes auriū, vel aliarum partiū, de quibus particulatim suo loco dicemus. Decoctū hordei integri semper ad deterfionem ponitur. In quibus autē fortius detergendum & siccandū, lentes, fabas, orobos, & lupinos accipimus. Exiccant enim, & propter amarorem detergūt potenter. Fructus dulces detergere dicūtur, sed cū quadam emolliitiōe, & relaxatione: vnde in clysteribus tantū, & remediis pectoris apponendi sunt. iniectionibus partium induratarum ob callum, fistulāmq; putrescentibus, aut emollientibus, flores, quales sunt rosarum, cētaurij minoris, cucumeris. Detergunt enim semina illa, quæ remollire diximus. Quare in illis tantū iniectionibus, in quibus remollire & detergere volumus imponenda. Fiunt etiā iniectiones ad sedationem doloris, cum vlcere, aut inflammatione, vel sine vlcere & inflammatione. Sedantia dolorem sine vlcere aut inflammatione re-

ne re-

ne recipiunt pro materia medicamenta malactica, & relaxantia & discutientia, vt & emollientia superius enumerata extrinsecus, aut intrinsecus adhibita. Liquida in funduntur, item adipēs & olea. Et quia eiusmodi dolores ferē semper fiunt à retentione excrementorum, vel ab intemperie frigida. Retentio autem excrementorum vel à nimia siccitate oritur, vel à nimio frigore, vel à nimia caliditate: ob id ab initio malacticis vel sedantibus dolorem est vtendum, deinde ea adhibenda, quæ magis calfaciunt, vel magis resoluunt, vt quatuor semina calida maiora, vel ea quæ magis relaxant, & sine morfu, vt sunt olea illa temperata, quale est chamomilæ, ouorum, lini, amygdal. dulcium. Quod si dolor oriatur ab inflammatione, malacticis adiungimus quæ magis, quàm illa malactica, refrigerare possunt in principio, vt folia violarum, lactucæ, endiuicæ, portulacæ, & cucumeris. Sin vero dolor fiat sine retentione excrementorum, non sunt reiiciendæ illa medicamēta, quæ leuē quandam astringentiam habent, vt solanum & similia, quæ non possunt dolorem facere. Nam quæ multum constringunt, potius dolorem augēt, quàm sedant, ob impeditam distensionem, in quorum numero recensentur cucumeres & cucurbitæ, pruna, sebesten, iuiubæ, quæ si decoquantur in aqua & oleo, dolorem sedant refrigerando, & laxando inflammationem: vt pomorum dulcium decoctum in aqua, vel iusculo, vel lacte, quibus non est præstantius remedium ad sedandum dolorem ex ictu bombardæ, si emplastrum ex his fiat in aqua, vel iusculo pulli, aut capris veruecis, vel capi, vel lacte, quia aufert empyreuma. Quin & lac ipsum præsertim capræ, & asinæ in vlcere vesica, aut alterius partis, quæ detersione egeat, dolorem soluit. Item mucilago seminis psilij, & cotoneorum, deinde semi. lini, vltimo loco, scœnugræci, mucilago seminis psilij, & cotoneorum magis refrigerando, seminis lini, laxando, & modicè calfaciendo, scœnugræci autem mucilago, aut decoctum, calfaciendo, aut resoluendo, magis quàm semen lini.

*Quibus
vtendum
in retentione
fecum.
Relaxantia.*

*Quibus
occurri
mau dolori
ab inflammatione.*

*Lac capra
aut asina
dolorem
sedat.*

Sedantia dolorem cum vlcere.

*Detergentia sine
morfu.*

Si adfit dolor cum vlcere, primū quæ leuiter detergunt & sine morfu, sunt iniicienda, ne excrementa

Ol. rosarū detineatur, augeatur dolor, vt serum lactis, decoctum quibus cō- hordei mundati. Postea quæ dolorem sedant sine nimia ferat. relaxatione, & constrictione, quale est ol. ros. aut ouorum, quod dolorem vlcis soluat & exsiccat. Vlcus alia olea non patitur, quia id non præstant, & vlcera sordida reddunt. Post deterfionem iniicitur & axungia porci, in dolore vehementissimo dysenteria, vt & Galenus lib. simpl. medic. imperat. In non vehementi vero dolore seuum veruecis, deinde hirci, denique albumen oui fortiter agitarum, dilutum aquis plantaginis, solani, vel rosarum: dolores soluit in principio, & præsertim, qui sunt cum inflammatione, & in dolore vlcis toto morbi tempore. Albumen autem oui fortiter agitarum lenit partem, & excrementorum impedit contactum, & acrimoniam minuit, maximè si dolor fiat propter transitum recrementorum per partem multum sensilem. *Albumen oui.* Albumen oui post reiectionem & ante, iniicere oportet: Ante, vt pars non lædatur: Post, vt dolor factus ex acrimonia recrementorum sedetur, siue in anum, siue in vesicam, aut vterū, siue in nares, siue in aliam partem, per quas fieri possunt iniectiones. Iniectionibus etiam resiccamus vlcera, partes nimium laxas, & humidas, & profundas. Si verò cum vlcere sit calor & fluor, resiccamus, & leuiter refrigeramus, vt in dysenteria, & vlcibus aliarum partium. & hoc cum leui quadam deterfione. Ad id conuenientissimæ sunt herbæ refrigerantes & exiccantes, vt vtraque plantago, bursa pastoris, vel polygonum, (quorum succo non est præstantius remedium sistendo sanguini vndeunque fluenti) rapus barbatus, solanum, folia myrthi, oleæ, agrimonie, ceterach, folia palmæ, herniariæ, salicis, rubi & semina quæ decoquuntur in aqua hordei. Solanum tamen à Galeno s. simp. de indurantibus reicitur, tanquam non satis exiccans. Superioribus adiungi possunt cortices mali punici, gallæ, nuces cupressi, mala cydonia immatura, mespila, dactyli immaturæ, nuces immaturæ, pyra syluestria, corna, oliuæ immaturæ, mora viridia, fructus myrtillorum, acini vuarum, & quæcunque magnam astrictionem habent & manifestam, cum leui amarore, vt folia pyri syluestris, & mespili. Hæc omnia siccant, astringunt, consolidant,

lidant, & cicatricem inducunt in internis vlceribus. His *Deter-*
ad maiorem deterfionem mel. ros. saccha. rub. vel syr. de *gentia.*
ros. siccis, vel saccha. ros. tabularum addimus. Ad resic-
cādas partes laxatas, & nimium humidās, eligenda sunt
quæ siccant cum quadam calfactione, tum quia partes
refrigeratæ sunt, tum quia calida profundius descen-
dunt, ut vehementissime desiccant. Ad refrigerandum
vel calfaciendum vsurpantur, quæ manifestè refrige-
rant, vel calfaciunt. Id autem raro euenit, ut partem ali-
quam internam vel calfacere tantum, vel refrigerare
conueniat, quin & simul humectare, vel exiccare, vel
constringere, vel detergere oporteat. Et quia nemo ex
vniuersalibus doctior redditur, ideo *paradigmata* quæ-
dam adhibenda sunt ad maiorem elucidationem. Pri-
mum igitur agemus de ea forma, quæ frequentius ini-
citur, vulgò clyster & enema dicitur.

De clysteribus.

Funt clysteres ad emolliendum excrementa, ad ex-
pellendum, ad calfaciendum, refrigerandum, siccā-
dum, astringendum, relaxandum, & ad dolores inflam-
mationum sedandos, vlcerum inflammationes, ad nutri-
endum, ad diuertendum, ad detergendum, arrodendum,
consolidandum, ad vermes deorsum eliciendos & occi-
dendos. Verum primum ad sedis & intestinorū affectus,
deinde ad ventriculi, & splenis, renum, vesicæ, vteri, me-
senterij, & aliarum partiū vicinarum. Porro ad corporis *Quibus*
affectibus
adhibetur
clyster.

affectus, ad capitis materiam reuellendam, & (ut breui-
ter dicam) nulla est pars corporis, quæ aliquā ex clyste-
ribus non sentiat vtilitatem, sed aliæ aliis maiorem. Ve-
rū cum operationes hæc sint diuersæ, nūquam possunt
eadem materia perfici, vel s. opo vnique affectui, vel
causæ cōuenienti. Oportet deligere cōuenientem ma-
teriam, & in formā liquidam redigere, quæ per fistulam
inici potest. Est enim iniectionis species magis cōmu-
nis & frequens a Græcis enema, quod interpretatur in-
iectio. Ab Ibide didicerunt homines hoc remedij genus
& modum immittendi, quæ materiam rostro acuto & *Polyd.*
Virgil. lib.
longo in ano aquam marinam iniiciebat. Est enim salsa
ad facultatem expultricem mouendam & irritandam.
Fiunt potissimum ad excrementorum alui excretionem, *1. cap. 2.*

aut intestinorum ablutionem, vnde nomen clyster accepit. Clyster enim ablutio est à verbo *clyso*.

Clysterum differentia. Clysterum multæ sunt differentiæ. Alij enim sunt laxantes. Laxantium alij sunt molles dicti, alij acres. Molles autem, qui ad molliendum excrementa alui dura parantur, quibus etiam ad partium sedis induratarum, vel contractarum relaxationem uti nihil prohibet.

Mollium clysterum antiquis materia erat aqua dulcis calida sola, vel oleum oliuæ, vel aqua & oleum, quæ antiquis fuit materia, & hodie esse potest. Sunt enim illa paratu facilia, & pauperibus utilia. Oleum autem amygdalarum dulcium, ditioribus materia esse potest.

Communis clyst. materia. Communis materia est, decoctum omnium specierum maluarum, ut altheæ, maluæ, quæ passim nascitur, hortensis, arborescentis, altheæ, vel geranei secundæ speciei, & quæcunque humectant vel emolliunt, vel letum succum habet, ut acanthus, decoctum fructuum, ut ficuum: seminum, ut lini & fœnugræci, florum, ut mal. liliorum: radices maluarum, vel liliorum idem præstare possunt.

Axungie liquatæ vim molliendi habet. Quare etiam molles clysteres dicuntur, qui ex multa axungia parantur. Parabitur clyster mollis, vel emolliens, vel ex aliquibus in hunc modum. Sunt qui delectantur magis compositis, quàm simplicibus, & paratu facilibus. Quare paradigma apponemus, ut nostrorum formam habeamus, & antiquorum.

Emolliens. R. rad. mal. bismal. & lilior. an. q. j. fol. mal & bismal. an. M. j. sem. lini ʒ. j. sic. par. xx flor. melil. viol. an. p. j. anisi ʒ. iij. Decoquantur in iure pingui, vel in aqua fontis, & in lb. j. diss. olei communis, vel butyr. recent. vel axung. porci ʒ. iij. misce, fiat clyster.

Hic est purè emolliens. Nulla enim adduntur, quæ vim emolliendi non habeant, excepto semine fœnic. vel anisi, quod addimus ad flatum discutiendos. Nam solent, quæ emolliunt, multos flatum gignere.

In decoctione mollium dissoluitur cassia sola, vel cassia ab ʒ. j. ad ʒ. ij. Emollit enim cassia ob humiditatem magnam. Olei dulcis ʒ. iij. Hic clyster mollit, tenas partes laxat, dolores soluit, & inflammatas partes non irritat, aut exasperat.

Neceſſe eſt aliquando non ſolum emollire, ſed etiam cum quapiam relaxatione & caſſatione ob dolorem, tuncque illa quæ emolliunt & caſſant, magis eliguntur, vt fœnugræcum, lini ſemen, vel altheæ, vel rad. cum liliorum decocto. Oleum, butyrum, axungia ponitur in maiori quantitate.

Quando emollientem cum caſſat. & relaxat.

In doloribus aliquando etiam oportet refrigerare, vt in febribus & inflammationibus ventris partium internarum: & tunc herbæ, quæ modicè refrigerant & emolliunt, ſunt uſurpandæ, & quæ ſine magno calore emolliunt. Sunt autè multæ, quæ id poſſunt efficere, vt omnes maluæ, quæ parum caſſant ob largam humiditatem, qua temperatur caliditas, quibus adiungimus folia viol. quæ ſerè omni tempore inueniuntur.

Quando refrigerat. & emollientem.

Æſtate verò folia cucurbitæ, melonum, cucumerum ſolum habentur, quæ quidem emolliunt & refrigerant, ſunt uſurpanda, & his ſimilia, quæ frigiditatem cum humiditate habent adiunctam ſine adſtrictione. Nam quæ aſtringunt, in molli clyſtere non conueniunt, quanquam portulacam inter emollientia enumeret Oribaſius, & plantaginem, & roſas, & alia multa, quæ potiùs aſtringunt, quàm laxent. Sunt etià quæ acrimonia pungunt & detergunt, vt beta & decoctum alicæ. Hæc minus probari debent in emollientibus.

Herba refrigerat. & emollientes. Hæc im- probantur in emollientibus.

In refrigerantibus verò poſſunt, vel in principio inflammationis, vt plantago, portul. decoctum alicæ. Sed de his poſtea agemus. Nunc enim ſcopus eſt rectè demonſtrare rationem, non autem omnia errata reprehendere, ſed pernicioſiora quæ ſunt, tanquam digito demonſtrare.

Clyſter.

R. malua. viol. ana M. ij. flor. viol. bugl. ana p. ij. hord. mund. p. j. fiat decoct. in lb. j. ſ. diſſ. ol. viol. 3 ij. miſce. Si verò facultas ſopita ſit, ad eam irritandam addenda ſunt quædam, quæ facultatem expultricem moueant citra caſſationem & ſiccationem. Quare his adiungemus ſuccos herbar. irritantium, vt merc. betæ, in decoct. vel herb. ipſas. Hæc enim humiditatem niſroſam habent, unde facultatè expultricem mouere poſſunt abſque inſignis caſſatione. Conducunt detergentia dulcia, vt mel, ſacch. loth de caſſia, diaprun. ſimpl. vel ſalis parum. Fiet ergo clyſter molliens, & acris, cuius forma talis eſt.

Clyſter molliens & laxans a febr. im- mittentibus.

℞. mal. cum radic. bism. branch. vrsinæ, ciellæ, pariet. merc. (detergunt enim & stimulant, neque multum cal. faciunt) ana M. j. pass. sic. par. xx. sem. lini 3. j. anisi 3. ij. flor. viol. melil. ana p. j. fiat decoctio in aqua, vel in iure veruecis, vel intestinorum, vel in iure mugilis piscis, vel saxatiliū, vel ostreorum, ve. aquæ maris, & in ℥. j. β. diss. mel. viol. 3. ij. salis parum, fiat clyst. Emollit, deterget & laxat, neque multum calefacit. Quare conueniet omnibus febribus intermittentibus & continuis nō multum ardentibus, vel in illis ardentissimis, quando sollicitanda erit aluus, addendo maiorem quantitatem refrigerantium, vt folia cucurbitæ, melonum, & semina etiam frigida maiora. Si verò dolor capitis adsit, prætermittere in omnibus clysteribus oportet, quæ caput replent & tentant, vt cuminum, fœnug. semen lini, nitrum, & alia odorata, vt docet Aetius.

Cautio.

De acrib. clysterib.

Herba acres.

Compositiones acres.

Acres clysteres sunt, qui pungunt & stimulant ventrem pungendo. Horum materia acris est, vt inter herbas mercur. cicla, atriplex, parietaria. Pungunt etiam & stimulant & multo magis succus earum per se vel cum decocto permixtus. Item salis omnia genera, sal cōmune, ammoniacum, sal gemmæ, nitrum. Compositiones omnes laxatiuæ, vt hiera omnis, benedicta, & quæ diagridium, colocynthidem, & alia purgantia recipiunt. Colocynthidis autem & agaricus etiam si per se decoquatur, acrem clysterem faciunt. Parabitur verò acris sic.

Forma clysteris acris sine magno calore.

R. Mercur. ciclæ, pariet. ana M. j. anisi, fœnic. ana 3. ij. fiat decoctio in aqua marina vel sal. & in ℥. j. β. diss. succi betæ, vel mercur. 3. ij. salis 3. ij. fiat clyster.

Si clyster acris sit, sine oleo, & emollientibus parari potest. Magis etiam stimulant & pungūt acria sola, quàm cum talibus iunguntur. Nam nihil sanè est, quod magis obtundat acrimoniam medicamentorū, quàm pinguis, vel multum humida. Quare si oleum ponendum, antiquū eligatur, aut omnino prætermittatur, nisi cum alia ratione cōueniat, vt ad doloris sedationem coli, vel aliarum partium. Hic autem clyster acris est sine magno calore. Quare in quibus timetur nimia calefactio, hoc vti licet, vel emollientes herbas addere, vel quatuor semina frigida

frigida maiora. Cum verò nihil prohibet vti calidis, vel potius, morbus aut symptomata suadet, benedicta hieraque ponitur, & omnes laxantes compositiones, Sal etiam nonnunquam hoc modo.

Clyster superioribus acrior & calidior.

R. Superioris decoctionis vel communis lb. j. ss. in qua diss. benedictæ 3. j. mel. communis 3. ij. succi mercur. 3. iij. salis communis 3. j. antiqui 3. ij. fiat clyster.

In huiusmodi clysteribus dissoluuntur compositiones acres, quales sunt hiera benedicta, Indum maius, & similes. Sed illam magis eliges compositionem, quæ humori euacuando magis conuenit, & hoc faciendum, cum ob imbecillitatem medicamenta laxantia vereamur præscribere, vel cum medicamentum injectum non operatur. Ad eius prouocationem clysteribus acribus vtendum, atque etiam in omnibus morbis soporiferis, & in quibus somni profundi propensio quædam est, cum virtus expultrix multum sopita est, vt in Lethargo, *Quibus* Sopore, Caro. Cum etiam diuertere à parte aliqua, aut *conueniunt* etiam vermes occidere volumus, eligendo tamen affectus *acres clyst.* cui materiam conuenientem, vt si ad Apoplexiam, & alios morbos frigidos clyster acris ex laxantibus parandus sit, assumimus herbas incidentes, & calfacientes, quæ vulgò capitales vocantur, vt origanum, pulegium v- *Herba* trumque, calamintha, melissa, hyssopus. Ex floribus verò *capitales* flores rorisma, saluix, stechados. His adiungimus agarium & pulpam colocynthidis, quæ in decoctione decoquitur in panno ligato, ex quibus parabitur clyster acris in hunc modum ad pituitæ euacuationem, & ad affectus capitis & intestinorum.

Clyster ad morbos capitis frigidos & intestinorum.

R. Mercu. M ij. organ. calament. rutæ ana M. j. flor. centaurij minor. anth. stecha. chamomi. ana p. j. agar. in panno ligati 3. ij. vel colocynth. 3. iij. anis fœnugr. ana 3. iij. fiat decoctio in aqua maris, vel fontis, in lb. j. ss. diss. benedictæ 3. j. vel nitri 3. ss. si in aqua dulci præparetur, fiat clyster. Cæterum oleum hic prætermisum est, vt actius sit, sed si addatur, antiquum sit, vel lœnum, vel rutaceum & similia.

Clyster ad enecandos Vermes.

A Cris clyster ad occidendos vermes, qui sunt in colo, vel recto intestino, addito oleo ad ℥. iij. supra scriptus aptus est. Laxat enim, trahit, & amarore occidit vermes. Nam omnia sunt ferè amara, ex quibus componitur, vt flores centaurij, agar. colocynth. benedicta: vel fiat ex his, quæ vermes occidunt, qualia sunt omnia amara, & nitrosa, & acria, & oleosa. Amara verò sunt, flores centaurij minoris, absynthium omne, aristolochiæ omnes, cichor. abroton, puleg. oleum antiquum, amygdal. amar. oleum persic. petroleum, laurinum & similia: vel fiat decoctio in aqua, & collaturæ adde oleum, & fiat clyster: vel decoquatur in oleo, & oleum iniiciatur hoc modo.

Amara omnia ad occidendos Vermes.

℞. absynth. Romani, seryph. abrot. ana M. j. lupinorum p. j. β. flor. centaur. minor. p. j. fiat decoctio in lb. j. diss. olei amygdal. amar. olei, laurini ana ℥. iij. misce, iniiciatur. Si autem sine febre sit, hæc præscribuntur, & vinum generosum additur, & fit coctio in oleo, de quo iniicitur lb. j. Sin verò sit laxandum, additur hiera, benedicta, agar. in decoctione.

Ad ascarides.

Quòd si fuerint ascarides, id est vermiculi, quales in caseo inueniuntur, decoctum fiat in lixiuio debili, vel lixiuium ipsum iniiciatur, vel in lixiuio decoquantur sequentia, & iniiciatur per fistulam multis foraminibus perforatam in latitudinibus, & non in extremitate paratis, hoc modo.

℞. radic. gentianæ, aristoloch. rotundæ, vel longæ, clematidis, vel pistolochiæ ana ℥. j. florum marrhub. foliorum persici & absynth. ana M. j. lupini, vel orobi p. j. fiat decoctio in lixiuio, & aqua, æquis partibus: iniiciatur, sed sensim, & bis eadem hora: vtile est etiam istis hieram vel benedictam ad pituitæ euacuationem, & recti intestini deterfionē dissoluere. In his etiam iniicere muriam oliuarum, vel persicum, vel vrinam, cui additur parum fellis hirci, vel bouis, vel salis gemmæ. Parum sumere vtile est.

Cum Vermes in Ventriculo & superioribus intestinis sunt.

Sive

SI verò sunt in ventriculo, aut superioribus intestinis *Frigida*
 Supportet eos potionibus occidere, & deorsum detur- *& amara*
 bare, vel clysteribus dulcibus elicere. Parantur autem ex *herba.*
 decocto hordei vel tritici, vel ficuum, vel passularum
 hoc modo.

R. hord. mundati p. j. fic. par. x. anis. ʒ. j. fiat decoctio
 in lb. ʒ. diff. mel. vel sacch. ʒ. iij. vel sapæ ʒ. iij. fiat inie-
 ctio sine oleo & sale. Fugiant etiam oleum omnia ama-
 ra, & salsa, & acuta, dulcia verò & insipida sequuntur.

Cum febris una cum vermibus adest.

SI febris adest, clysteres debent laxare, & vermes oc-
 cidere & refrigerare. Fiunt autem ex amaris & fri-
 gidis, vt cichor. endiuia, scariola, portulaca. Fit decoctio
 in sero lactis, vel aqua fontis, vel decoctione pulli, & in
 lb. j. ʒ. diff. mel. ros. colati ʒ. ij. succi ros. ʒ. ʒ. Vel loco il-
 lius syr. ros. ʒ. j. Nihil enim prohibet syrupis vti in cly-
 steribus, si sua qualitate conueniant, & potissimum hye-
 me, cum succos herbarum non possumus habere, &
 hoc in diuitum remediis. Hic clyster refrigerat, laxat, &
 occidit vermes. Est autem aliquando necessarium occi-
 dere, & fluxum ventris cohibere, quem vermes excitant.
 Quare detergentibus amaris, non autem astringentibus
 vtendum, ne vermes occisi retineantur, & putrescant.
 Fiant ergo ex decoctione lentium vel lupinorum, & de-
 coctione aquæ caulium, quibus addere possumus ro-
 sas, vel fructus amaros, vel myrobal. qui parantur hoc
 modo.

Ad occidendos vermes & una fluxum

Ventris cohibendum.

R. Lentium p. j. ros. p. ij. fiat decoctio. In lb. j. infunde
 per sex horas corticum myrobal. citrino. ʒ. j. facta
 expressione iniiciatur in fluxu & vermibus, vel decoqua-
 tur cum herbis hoc modo.

R. summitatum oleæ, & myrthi ana M. j. ros. rub. p. j.
 centaur. minor. p. ʒ. fiat decoctio, & iniiciatur. Vel sic.

R. cortic. mali granati ʒ. j. myrobal. citrinorum &
 chebul. ana ʒ. ʒ. fiat decoctio in aqua hord. perfecte co-
 cti & colaturæ lb. j. iniiciatur.

R. summitatum portul. M. ij. cichor. M. j. lentium
 p. j. fiat decoctio, iniiciatur. Pauca enim quantitas infun-

denda, quia ad rectum intestinum tantum debet pertinere, & coli principium.

De clysteribus detergentibus.

Verum posteaquam in clysteres astringentes & detergentes incidimus, non erit à methodo alienum de clysteribus detergentibus, deinde de constringentibus hoc loco agere. Detergentibus autem clysteribus utimur in affectibus intestinorum, nempe in ulceribus, & inflammationibus, in quibus resudat aliquid in intestina. Item in tenasmo. Fiunt ergo detergentes ex fructibus, cerealibus, floribus aliquibus. Detergunt autem dulcia, nitrosa, amara. Ex fructibus aliqui detergent & leniunt, ut ficus, & passilæ. Quare in ulceribus non conueniunt. Alij detergent & astringunt, ut myrobal, omnes, nucum cortex externus, quæ in ulceribus magis conueniunt, quia siccant. Ex cerealibus hord. surfur, alica, & triticum. Ex leguminibus orobus, fabæ, lupini, lentes. Flores detergent fortiter, ut Centau. minus rosæ, & leuiter astringunt. Serum lactis etiam ex genere detergentium est, & vrina, & lixiuium. Quare deligere oportet conuenientem materiam, & illam accommodare: quanuis omne vlcus egeat deterfione. tamè ob symptomata deterfio augetur, vel minuitur, & nonnunquam prætermittitur, ut si dolor adsit vehemens. Si vero paruus sit, vlcusq; profundum, si bilis sincera diu fluxerit, detergentum, sed leuiter. Quare à leuioribus incipiemus. Si vero sit cum magna pituitæ copia crassa, fortioribus erit utendum. Primum igitur deterforium leuamen, siue enema ex hordeo mundato est, quod conuenit in ulceribus cum dolore: deinde ex hordeo integro, postea ex lentibus, orobis & lupinis. Fiunt autem detergentes pro dysenteria, & tenasmo in principio, in quo non requiritur magna deterfio.

Clyster detergens in principio dysenteria & tenasmi.

R Hord. integ. p. ij. fiat decoctio in aqua, & in lb. j. diff. sacchar. rubri vel mellis communis 3 j. misce fiat clyster. Si plus detergere oportet, ut in tenasmo, & illa pituitæ reiectione, decoctum lupinorum, vel orobi, vel lentium, vel plus mellis communis, vel rosari addemus. Si vero detergentum & siccandum magis sit, hordeum assumimus, minus tamen mellis ponimus, vel saccha.

charum ros. tabularum dissoluimus, quod deterget, & astringit & siccat & minùs calfacit hoc modo.

Clyster detergens & siccans.

℞. Hord. integ. asi p. ij. ros. rub. p. j. fiat decoctio diss. mel. ros. ʒ. ss. sacch. ros. tabulari ʒ. j. misce capiat. Cum autem, siccandum, constringendum, & consolidandum est, herbas & radices addimus decoctioni siccanti, vt radices bistortæ, tapfi barbati, plantag. fol. polygoni, myrthi, lantisci, & sumach. summitatû pyri syluestris, quercus: & tunc seuum hirci, vel herbarum succum admiscemus, sed hoc solum post iniectionem detergentis clysteris iniici debet. Interea verò cum vlcus detersum est, fit hoc modo.

Clyster astringens & consolidans.

℞. Hord. integ. asi p. j. bistortæ qr. j. foliorum plantag. & linguæ passerinæ, sumach. an. M. j. fiat decoctio. In tb. j. diss. seui hirci ʒ. ij. misce, fiat clyster. Detur post clysteres deterforium, vel purgatio excrementorum ventris. Vel sic fiat ex decoctione & succo herbarum.

℞. rad. ta. fi barbati tb. ss. sumach. plantag. vel myrthi, vel caudæ equinæ, vel herniariæ, vel polygoni an. M. j. cortic. mali granati, balaustiorû an ʒ. j. ros. rub. p. j. fiat decoctio in aqua ferrata, & in tb. j. succi plantag. ʒ. ij. seui hirci ʒ. j. ss. misce.

Cum dolor adest.

Accidit aliquando vt sit dolor, ob quem addimus ea, quæ etiam dysenterix minùs conueniunt, vt sunt ouorum vitelli, quæ quidem leniunt asperitatem, & sedant dolorem, quia illorum substantia lenta est, potest obducere intestina, & impedire abrasionem, hoc etiam facit seuum liquefactum, oleum omne vlceribus aduersatur, eò quod illa reddit sordida. Verum ad doloris sedationem oleum ros. admiscetur ad ʒ. 4. Non est autem sigillandum & constringendum cum sedare doloré volumus, quo tempore Galenus axungiam infundendam imperat lib. 2. simplic. Ad eandem rem etiam hordeum mundatum magis aptum est, quam integrum vel assum, cum dolor adest. Vlcerà intestinorû nimis deterfa sunt phagæ denica, & maligna. Quare diligenter inspicienda sunt alui excrementa, si nigrescant, foeteant, vel eadem

oleosa redoleant. Si minus doleant, aut nihil priusquam reddere vellent excrementa: tunc enim non esset inutile iniicere ea, quæ fortius detergunt, vt antiqui imperabant, qui muriam & alia ex sandaraca, itémque alia, quæ caustica sunt & astringunt, similiter vsurpabant. Quod si quis hæc formidauerit, paret clysterem ex multis resiccantibus, & detergentibus.

Clyster fortius detergens.

℞. lentium, lupinorum ana p. β. foliorum myrth. oleæ, absynth. ana M j. florum centaur. minor. ros. rub. an. p. j. fiat extractio in aqua ferrata, vel lixiuio debili, & in ℥b. j. diss. mel. ros. collati ℥. iij. misce cap. mane. Sunt qui ex muria tales clysteres parant. Alij decoctionibus vnguenti ægyptiaci dissoluunt ℥. j. & iniiciunt: fortiores fiunt ab oleis antiquis, quæ hîc recensere non audeo, ne quis abutatur: quandoquidem vrunt, anum tanto morsu detergunt, vel exiccant, vt periculosum sit ea iniicere. Quare oportet excrementa alui diligenter & attentè considerare, vt illam corruptionem statim cognoscamus. Cum enim illa perfecta est, illam incurabilem ausim affirmare.

Clyster ad Tenasum.

IN tenasmo iidem clysteres sunt ex vsu, diminuta tantum quantitate. Sufficit enim minor quantitas, nec fistulam tam longam esse oportet, sed vndiquaque in circulo perforatam, vt in Ascaridum clysteribus imperauimus.

De clysteribus Ulcera intestinorum consolidantibus.

VLcera intestinorum, vt aliarum partium, postquam deterfa sunt oportet ad cicatricem perducere, quod sit sarcoticis medicamentis leuiter astringentibus. Materia horum erunt, quæ astringunt, folia, & radices vt consolidida, hyppuris, polygonum, plantago vtraque myrth. oleæ, folia ros. flores: hoc ergo modo parabitur.

℞. rad. rapsi barbati, & consolidæ maior. an. ℥. ij. caudæ equinæ & plantag. an. p. j. ros. rub. p. j. fiat extractio in aqua ferrata, & in ℥b. j. diss. seui hirci ℥. ij. misce, capiat, redditis alui excrementis, & præcedente clystere detorsorio. In his practici solent arida quædam apponere, vt sanguinem draconis, corallum, trochiscos albos Rasis, de spodio: sed hæc arida dolorem inducunt, cum supra partem

tem exulceratam resident. Quare illa præterire suadeo, *Error præ-*
 nisi cum cicatrix confirmanda, vel magis induranda es- *fic.*
 set. Tunc enim talia fieri possunt, si ut collyriū, sint pul-
 uerifata: alioqui omnis pulvis aridus, qualiscunque sit,
 dolorem inducet. Ea ratione antiqui pulueribus adde-
 bant oleum, & ceram, ad eorū asperitatem castigandā.
 Quò si quis talibus uti velit, malim vnguentum album
 Rasis detineri potius quàm trochiscis uti, vel vnguento
 ex pompholige, vel ea eligere, quæ sicca & lenta sunt,
 qualia sunt, quæ ex terra sigillata, bolo armeno, rubrica
 fabrili, amylo, cerusa lota, hæcque in coctem iniicere &
 miscere, ut solent pictores ad colores parandos. Id quod
 in oculorū affectibus & partibus exulceratis est facien-
 dum, fiat ergo hoc modo.

℞. decoctionis clysterum ℥b. j. In qua dissol. boli ar- *Consoli-*
 meni 3. iij. iniiciatur. *dans cly-*

℞. hord. integ. torref. p. j. plantag. fol. myrthi, ana M. j. *ster.*
 florum ros. p. j. fiat decoctio. In ℥b. j. trochiscorum albo-
 rū ras. (dissoluti superioris memor ut collyr.) 3. j. amy-
 li 3. β. misce, iniiciatur. Si verò fluat sanguis, tales cly-
 steres erunt ex usu, qui primū detergunt, & sanguinis
 fluxum retinent. Vel fiunt tales emplastris astringenti-
 bus, & sanguinem retinentibus.

Clyster sanguinem sistens in Dysenteria.

℞. radic. consolidæ maior. 3. iij. hyppur. burs. pastor.
 plantagin. sanguinar. an. M. j. hordeum mundatum p. β.
 fiat extractio in ℥b. j. diss. succi plantagin. vel bursæ pa-
 stor. 3. iij. albuminum ouorum fortiter agitatorum 3. ij.
 fiat clyster.

Quò si fortius remedium requiras, adde boli, vel ru-
 bricæ fabrilis 3. j. vel de carabe 3. j. misce & iniiciatur. Si
 affectus erit magis in superioribus intestinis, iniice
 magnam quantitatem, si verò circa sedem, vel in recto
 intestino, paucam, ut melius æger retineat. Nam quo
 diutius in eo est, magis prodest, si cum extrinsecis reme-
 diis ad sanguinis impetum. Si verò ex erosione, vel ma-
 gnarum venarū eruptione fluat, vtilis sunt in vera Dy-
 senteria, in immoderato fluxu hæmorrhoid. In im-
 dico fluxu muliebri, siue per vterum, siue per anum,

magis si in vterum per metrenchitem iniiciatur.

Ad lienteriam & diarrhæam.

*Herbæ a-
stringentes.
Fructus
astring.*

Si partes nimia humiditate longiores factæ sint, vel frequenti pituitæ defluxu in ventriculum, vt in lienteria, & diarrhæa, conuenit materia astringens, quales sunt herbæ aliquæ, vt rapus barbatus, virga pastoris, plantago, folia myrthij, fructus oleæ, & oliuæ immaturæ, cortex mali granati, quercus, radix bistortæ Fructus verò vt mala cotonea, mala syluestria, mespila, sorba, corna, pruna immatura, dactyli immaturi, glandes, nuges cupressi, castaneæ integumenta. Ex floribus ros. paratur autem hoc modo.

R. rad. rap. barbat. bistortæ ana ℥. iiij. hippur. folior. myrthi, & summitatum rubi ana M. j. pyrorum syluest. vel pomorum, vel castanearum par. xx. ros. p. j. fiat extractio in aqua ferrata, & in lb. j. diff. acaciæ, vel hypocistidos ℥. ss. misce, iniiciatur post aliquam detersionem, per medicamentum purgans & astringens, vt rhab. vel myrob. aliquibus, vel clystere astringente. In lienteria, diarrhæa, aliòve fluxu ventris constringit, & roborat. In istis autem neque oleum, neque saccharum, neque ceram, aut alia quæ detergere aut laxare possunt, sed quæ siccant & astringunt, tantum admiscenda. Adiantur fructus, succi astringentium & herbarum, & tunc efficaciores redduntur in lienteria, & Tenasmo. Vinum etiam astringens, cum magna utilitate. Ex residentia autem horum clysterum, addita mica panis & aceti, fiunt cataplasmata efficacissima. Deinde odorata adduntur, de quibus suo loco dicemus. In dysenteria, quia à nimia frigiditate & humiditate fit, ex astringentibus, calfacientibus, vel frigidis, calida erunt addenda. Sunt autem conuenientiora folia maioris cupressi, absynthij coma, radix cyperi, acori vulgaris, & his similia.

*Astringē.
calida.*

Ad lienteriam sequens faciet.

R. Cyperi, rapsi, bistortæ ana ℥. j. absynth. foliorum Cupressi ana M. j. nucum cupressi n. iiij. flor. ros. anthos, stechad. & saluæ ana ℥. j. fiat extractio in aqua ferrata, & vino astringente & in lb. j. diff. hypocist. ladani ana ℥. ss. fiat clyster, iniiciatur.

Clyster

Clyster ad sedandum dolorem coli, ilei, & steri, & renum.

Coli dolores sunt pro diuersitate causarum. Nam si à flatibus, discutientibus potissimum dolorem sedamus: Si à distentione stercoreum, euacuantibus: si à pituita vitrea, calfacientibus, cōcoquentibus, & euacuā-
tibus leuamus dolorem. Si à bile sine vlcere dolor colicus fiat, detergente & euacuante: si verò cum vlcere, detergentibus & acrimoniam frangentibus & his quæ vl-
cus contegunt. Est ergo communis omni morbo, in quo recremēta sunt retēta & indurata, vt emolliantur, idque clyster mollis præcedat, vel acutus & molliens, in colico autem dolore emolliēs. Ergo additur benedicta, vel hie-
ra, deinde ad doloris sedationem intēdimus, cum causa flatus gignēs, vel retinens ablata est. Stercora retinet
pituita vera, intemperies frigida flatus gignit. Quare ad partium tensorum, vel contractarum relaxationem, &
viz obturationē & doloris remissionē paratur ex emol-
lientibus, discutientibus & euacuantibus hoc modo.

Ad colicum dolorem.

R. radic. bism. vel liliorum ꝑb ꝑ (malactica, relaxan-
tia, & anodyna.) malua. branc. vrsinæ, absynth. an. M. j.
fic. pa. xx. seminis lini, vel fœnu. 3. j. vel ij (vel etiam præ-
termittuntur, vel in quantitate minore illud ponitur, ne
lentore & mucilagine decoctum viscosum redditum in-
gressum per fistulam impediat) anisi, carui, fœnic. cy-
mini ana 3. ij. vel 3. ꝑ vel 3. j. flor. cham. melil. sambuc. a-
na pa. fiat extractio, in ꝑb ꝑ dissol. benedictæ 3. j. olei
chamo. vel anethi 3. iiij. vel butyri 3. ij. viui 3. iiij. misce,
iniiciatur. Quòd si venter glāde prius supposita, vel alio
clystere acriori, vel pilulis euacuatus sit, ad anodyna ve-
niemus. Quòd si non sufficienter euacuatus est, his for-
tiores dandi sunt, neque vtendum est de attractione ad
partem: quia vis iniectionis ob intestinorum obstru-
ctionem altius non potest penetrare, neque attrahere
humores, neque aliud quicquam facere contra nostrum
præceptum, quod à Galeno dictum fuit de reuulsione,
vel auersione facienda per partem contrariam, hoc de
inflammatione dictum fuit, non de aliis affectibus par-
tium, quæ meatus apertos habent, ad euacuationem fa-
ciendam sufficientes. In præcedentis clysteris paradi-

*Præceptū
de auer-
sione &
remissione*

gmate obseruare studiosus debet, nos vitare debere nimiam quantitatem rerum viscosarum, ne transitus impediatur: & quod iniectionis quantitas paucā sit, ne distendendo magis dolorem augeat. Itēq; in hoc laxantia ponuntur medicamenta, quia sunt primi clysteres, ad educationem materiæ. Euacuata igitur materia remaneat dolor à flatibus, vel à frigiditate humorum contractus. Quare ad discussionem flatuum & relaxationem partium, iniiciend. sequens.

Clyster sedans dolorem colicum.

℞. seminis anis. fœnic. ana ʒ j. seminis apij. petro. aneth. ana. ʒ. ʒ. flor. cham. melil. sambuc. ana p. ij. fiat extractio in aqua & vino & in t̄b. ʒ. diff. olei cham. & rutac. ana ʒ. iij. fiat clyster. Vel ex vino, & decocto nucum æquis partibus paretur clyster, qui citò discutit flatus, & dolorem sedat. Præterea omnia olea ad hunc affectum

Olea consentanea. cum summa utilitate iniiciuntur, quæ discutunt flatus, vel partes dolentes laxant, vt oleum antiquum, chamoliliorum, amygd. amar. anethi rutac. nucum, & similiū, quæque magis sunt tenuium partium, ea altius, & citius per partes diffunduntur.

Cum dolor est à pituita vitrea.

Signa pituita vitrea.

SI dolor colicus diutius perseverauerit, & sentiat æger se quasi palo perforari, & intestinum frigus sentiat, verisimile est dolorem esse à pituita vitrea, & tunc ad alia remedia est veniendum, nempe ad clysteres multum calfacientes, humores liquantes, & fundētes, deinde laxantes, & ex alto trahentes. Paratur autem hoc modo, & sedans dolorem.

℞. fol. myrthi, puleg. vtriusque marrh. calaminth. an. M. j. semin. fœnugr. ʒ. j. semi. fœli, carui, cymini an ʒ. ʒ. flor. cham. lauendulæ sambuci, anthos. stech. ana p. j. fiat extractio in t̄b. j. vel ʒ. x. colaturæ diff. vini maluatici, vel vini albi veteris ʒ. iij. olei anethi ʒ. iij. fiat clyster, iniiciatur bis in die. Oleum cham. sambuc. anethi, nucū, de spica, castorei valent ad pituitæ vitreæ alterationem & coctionem; oleum autem commune & amygdal. dulc. imbecilliora sunt quàm vt possint humores congelatos concoquere. Axungia antiqua porci, gallinæ, anatis, & butyrum vetus, concoquunt, & detergant. In his clysteribus

Olea ad pituitam vitream.
Axungia & butyrum.

ribus radic. attenuantes, calfacientes addi possunt, vt *Radices*,
enulæ campanæ. Siccæ etiam radices vt apij, petro. ga-
langæ, quæ prius decoqui in oleo debent, & post iniici.

Vinum hippocr. consentaneum.

MVlier quædā nobilis grauissimo dolore coli cum
teneretur, vt nihil aliud ad manum esset, vinum
hippoc. iniiciendum imperaui, & paulo post curata fuit. *Experien-*
Rusticus etiam qui vinū emerat, aromatites ex melle ad *tia.*
hylaria celebranda curatus fuit. Vina autē hæc, vel sac-
charum, vel mel ad deterfionem: hippocraticum verò
vinum cinamomū, aliud piper, zinzib. grana paradisi re-
cipit. Quare non debet esse mirum si his remediis cu-
retur. Curaui alium rusticum brodio, quod ex alio con-
trito in mortario, & oleo (albidum alij vocant, alij tor-
ridum) nam quæcunque incidunt, & attenuant, discu-
tiunt, ob id curant, vt erysimi decoctum quo multos cu-
raui, quod etiam ex vno efficacissimum est remedium.

Castoreum & euphorbium si perseveret dolor, neque *Castoreū*
moueatur suo loco, ad id conferunt, & præsens, extre- *& Euphor-*
mumque est remediū. Nam qui castorei ex vino bibunt *bium.*

g. vj. & vini parum, cito curantur. Euphorb. etiam in-
funditur eadem quantitate, & alia Lachrymæ periculo- *Nota.*
sæ ob lentorem, quòd aliquando adhærent & non pos-
sint repelli, & occidunt, vt ex morte nobilis viri Guber-
natoris Mōspeßuli D. Gaudeti, id nobis fuit cōpertum.
Nam pharmacopola cum medici officio fungi vellet,
in scis Guilberto, Griffio & Falcone, qui illum curabāt,
iniecit sagapenum, ammoniacum, & alia dissoluta, qui-
bus immixtis subito, & repētē mortuus est. Verū sicut se-
quētes ad humorum attenuationē & piritæ eductionē.

℞. radic. enul. camp. resiccata (nam recens flatus ha-
bet) iridis pyretici ana ʒ. j. (Calefacit enim & euacuat)
puleg. marrhub. origan. folior. rutæ ana M. j. baccarum
lauri ʒ. ʒ. flor. cham. aneth ana p. j. mellis squillit. ʒ. j. a-
garici tro. in panno ligati ʒ. ʒ. Indi maioris, benedic. an.
ʒ. ʒ. vini maluatrici & olei nucum ana ʒ. ii. j. fiat clyster. In
istis dissoluuntur omnes hieræ vt archigenis, diacober.
hiera picra, trochisci alandal. diaphenicū & indum ma-
ius, & quæcūque turbit & agaricum recipiunt vel tur-
bit colocynth. & agaricus puluerifata, & in pāno ligata

Vinum decoqui, & iniici debent. In his vinum nunquam præter,
nunquam mitti debet, quia cōcoquit materiam, sedat dolorem ita-
prætermis tus discutiendo, & quodammodo reficiendo. Eligendum
tendum. autem vetus, & tenuium partium. Olea etiam superim-
Olea an- ponenda ad sedationem doloris, & cōcoctionem mate-
tigua. riæ, sed antiqua & tenuium partiū. Axungiz etiam aliquæ
Axung. ad cōcoctionem & doloris mitigationem præcipiuntur:
buty. axungiz porci sine sale, gallinæ, anatis plurimum pro-
 sunt, vt butyrum etiam vetus nō salitum: nam sal dolorē
 excitat. Quare in nullo dolore ponendum, nisi in primo
 clystere, ad irritationem facultatis expultricis & hoc in
 stercoreosa colica. Iuuatur autem concoctio aliis reme-
 diis, vt fotu, balneo, vnguentis. Eductio autem pilulis ex
 lachrymis foetidis, de euphorbio, aut opopanace, sebel-
 linis & aliis, quæ sine myrob. paratæ sunt, addendo ca-
 storei quartam partem, vel euphorbij quintam partem.

Pilula.

De nephritico dolore.

Nephriticus dolor clysteribus curatur, vel leuatur,
 primi molles, vt in colico, deinde molles & discu-
 rientes, tundētes, & attenuantes, tunc molles & leuiter
 refrigerantes necessarij sunt, quales postea docebimus.
 Ad nephriticum dolorem ob calculi descensum per po-
 ros vrinarios ad vesicam, parabitur ex supradicta mate-
 ria discutiente & incidente, citra calfactionem, & exic-
 cationem, vt ex rad. altheæ. mal. glyc. gra. asparag. apij,
 petro. Aliæ enim sicciore, & calidiores calculum retar-
 dant, pituitam exiccando. Parabitur autem hoc modo,

Quæ discu-
tiunt &
incidunt:

℞. rad. altheæ. rad. gramin. aspar. glyc. ras. vel pedis
 columb. ana ʒ. ij. beton. linariæ fol. feeni. marini ana M.
 j. anisi, semin. lini, scenug. ana ʒ. ss. flor. champ. melil. ana
 p. j. fiat extractio in aqua, vel in iure pingui, & in tñ. j. dis-
 solue butyr. recen. vel axung. porci recen. ʒ. ij. olei scor-
 pionū ʒ. iij. mell. cōmunis ʒ. j. misce, iniiciatur. Vel sic.

℞. mal. cum rad. M. ij. sic pass. ana pa. xxx. seminis li-
 ni ʒ. j. seminis mal. alchechangi, milij solis, apij, petro.
 ana ʒ. iij. baccarum lauri, & iuniperi ana ʒ. ij. flor. hy-
 pericon. chamom. genist. ana p. j. fiat decoctio in aquæ
 & vini æquis partibus, & in tñ. ss. diss. olei liliorū, amy-
 amar. & scorpio. ana ʒ. iij. terebinth abietis ʒ. j. misce, in-
 iiciatur. Quod si lariflea sit, quæ magis tenuis & calens
 est,

Terebin-
thina.

est, magis in hoc affectu commendatur, quæ sese facile per abditas, & occultas partes insinuat, quod manifestè indicat odor urinæ. Olet enim urina violam perinde ac si per os sumpisset. In huiusmodi clysteribus diutius herbas concoquere optimum, ne flatus gignant. Com- *Cautio.* positiones lenientes, vt cassia, catholic & aliæ fortiores ad id genus conueniunt magis. Nam quæ leniunt laxando partes, calculi descensum iuuant, aliæ verè fortiter trahendo deorsum. Hoc tamen cauendum, ne plus trahant clysteres & siccant.

Ad comminuendum calculum,

SI calculum comminuere volumus, cum maior sit quam possit per poros descendere, calculum cominuentem decoquere oportet, vt palyuri semen, rameta palyuri, id est, ramum nigrum potissimum dictum, fiat hoc modo.

R. rad. graminis, apij, petro. glyc. aspar. bism. ana ℥. ij. beton. saxifrag. fœnic. marini, lunariæ ana M. j. seminis alchecang. m. li. j. solis, seminis palyuri ana ℥. j. fiat decoctio in ℔. j. dissol. succi pariet. vel fœnic. marini, vel raphani ℥. j. olei scorp. ℥. ij. misce, iniiciatur. Decoquantur ramenta palyuri nigri in aqua, & vino albo, vel simili modo iniiciatur decoctum hyperici, vel succus cum decoctione. Succus portulacæ exsiccat, deinde in *Succus* aqua aliqua, vel in decoctione dissolutus. calculos renū *portulacæ* comminuit. Si autem nephriticus dolor est ab inflam- *frangit* matione, clyster talis parabitur ex remollientibus, re- *calculum* frigerantibus & dolorem mitigantibus. *Nephrit.*

R. mal. cum radic. viol. ana M. j. foliorum cucurb. M. *ab in-* s portulacæ tertiam partem M. j. seminis lini ℥. j. florum *flamma,* chamo. viol. an. p. j. hord. mund. p. ℔. fiat decoctio in ℔. j. dissol. viol. & ros. ana ℥. ij. quorum fortiter agitator ū, n. ij. misce, fiat clyster. Si præcesserit alui euacuatio, vel cassia, vel clystere euacuante. Quod si aliqua recremēta quæ detergant leuiter, vel irritant citra calfactionem, admiscere oportet, vt decoctione diss. cassiæ recenter extractæ ℥. j. vel sacch. rub. ℥. j. vel succi ciclæ ℥. ℔. vel cath. ℥. vj. vel ℥. j. Hæc enim purgant leniendo, & non irritant partem inflammata. Quando inflammatio est in retribus, ista in minori quantitate, & audaciùs dantur *Cautio.*

ne cū vsurpetur maior quāritas iniectionis altius ascen-
dat, & partem affectam lædat. Vel si inflammatio sit in
vtero, vel vesica, magis emolitioni, quā irritationi in-
tendendum. Quod si tum irritanda sit aluus, id potius est
balano, quā clystere faciendum. Hic clysteres erunt
vsui inflammationibus inferioris ventris, & sedis.

Ad iliaca passionem.

*Quid ilia-
ea passio.*

SI verò iliaca passio fuerit, alio modo incedendum.
Nam duo genera clysterum iniiciuntur. Primi enim
iniectiones emollientes, leuiter detergentes, euacuantes esse
debent, vt excrementa intestinorum inferiorum vacuen-
tur. Nam cū affectus sit graciliū intestinorum inflam-
matio, acres clysteres non sunt ex vsu, ne ad partem affe-
ctam excrementa trahantur à partibus remotis: neque
etiam qui nimium detergunt, ne dolorem irritando au-
geant. Secundi erunt refrigerantes, relaxātes, & acrimo-
niam caloris extinguentes. Primi parantur hoc modo.

℞. rad. altheæ ℥b. ℥. mal. cum rad. M. ij. viol. M. j. flor.
viol. & cham. an. p. j. fiat decoctio in aqua hord. vt habeat
vim detergendi, & in colaturæ ℥b. j. diss. mel. vio. vel cass.
nouiter extractæ, vel cymi cum sacchar. ʒ. j. ol. viol. ʒ. ij.
misce, iniiciatur. Si hoc clystere non purgetur venter ob
fortem attractionem à parte affecta, addemus succi ciclē
ab ʒ. j. ad ʒ. ij. & mel. & cass. quantitatē augebimus. Se-
cundi parantur ex lacte vaccæ recentē mulso cum pau-
co saccha. vel melle, ne concreascit, & ol. viol. vel ex alio
lacte, vel ex decoctione hord. mund. & quatuor semin.
frig. maior. & ol. viol. vel amygd. dulc. aut si maximus sen-
tiatur æstus, paretur hoc modo.

℞. mal. viol. ana M. j. quat. semin. frig. maior ana ʒ. ij.
pomorum acidorum p. x. florum viol. nenuph. bugl. ana
p. j. fiat decoctio in ℥b. j. dissol. mucilag. seminis psili ʒ. j.
ol. viol. vel nenuph. albumi. ouorum fortiter agitatorum
ana ʒ. j. misce, iniiciatur liquidus. Veteres vehementia
doloris coacti, colica remedia iniecerunt, quæ opium
recipiunt. Sed quia cum opio castoreum, pyretum, vel
piper, sinapi. & alia calidiora admiscunt, magis proba-
mus arteriacas compositiones, quæ minus calfaciunt &
leuiter detergunt, modò non constringerent, quæ dissol-
uuntur in sapa, vel olei amygd. vel ol. lini. Iniiciatur pri-
mum

num in parua quantitate. Minus pernicioſa ſunt quæ deuorantur, quia in ventre melius & citius alterantur, quàm quæ in inteſtinis. Hæc pro principio, & ad euacuanda recrementa & doloris ſedationem. Quod ſi contingat ægrum poſſe euadere principium, & incrementum, ſunt alij detergentes & reſoluentes iniiciendi, qui parantur ex oleis chamom. anethi, amygd. amar. & vino. Verſus ex decoctione florum chamom. melil. & ſeminis lini, prout ſunt clyſteres molliètes. Auertunt enim euacuando excrementa & deorſum trahendo prohibent ne ad ventriculum ferantur, & vomitione reiciantur. Alij trahunt circa partem affectam, vel quando magna quantitas iniicitur, fere ad affectum veniunt, vel conſecutione partem affectam refrigerant leuiter, vel caſfaciendo relaxant. Hic affectus colicis & clyſteribus curari debet, & auerſionibus. Eſt enim ferè inflammatio eryſipelatola à bile, quæ per inteſtina descendere debebat, quæ retardata tumorem in ileo excitauit.

De affectibus Vteri.

IN affectibus vteri viles ſunt clyſteres propter magnum eius conſenſum cum recto inteſtino & aliis inteſtinis ſuprà poſitis, vteri o intra iejunum, & ob conſenſum, quem habet ex peritonæo, quod illas partes omnes integit, ligat, & ſuſpendit. Si ergo dolor vel affectus vterum malè afficiat, iuuatur clyſteribus. Quod ſi id à flatibus accidat, vel inflammatio ſit, uſurpetur clyſter ad colicum dolorem, & flatus diſcutiendos præſcriptus. Et ſi proprium vel ei accommodatum requirat, parare hoc non licebit.

Clyſter ad flatus Vteri.

℞. mercur. arthem. matricar. ana M. j. flor. anth. ſtechad. chamom. ana p. j. apij, petro. ana ʒ. iiij. fiat decoctio in lb. j. diſſ. benedictæ (ſi flatus diſcutiendi & materia inteſtinorum euacuanda.) ʒ. j. ſ. Sin minus euacuandum, hieræ tantund. olei nard. ʒ. iiij.

Ad Vlcus Vteri.

SIverò dolor fuerit cum acrimonia vel eroſione. quæ ſentitur in carchinomate, vlcere corroſiuo, aut depaſcente, iniiciantur clyſteres, ſicut in dyſenteria, detergentes vel ſedantes dolorem dyſentericum.

900 DE MEDICAMENTIS
vel iniectiones, quæ iniiciuntur in anum, in vterum ini-
ciuntur.

Ad scirrhum vteri emolliendum.

SI vteri scirrhus emolliendus sit, clysteres emollien-
tes vel sedantes dolorem, illi erunt utiles, vel fiant ex
malacticis, in oleo tenui & vino sine sale coctis, vt diu-
tius remorentur.

℞. radic. altheæ quar. i. corti. rad. vlini ʒ. 2. mal. M. 2.
seminis lini, fœnugræc. ana ʒ. ʒ. sic. p. xx. seminis apij,
petro. & bismal. ana ʒ. 2. flor. ehamom. melil. viol. &
mal. hortensi, vel aliarum, si reperiantur, ana p. i. fiat de-
coctio in aqua vel in iure intestinorum porci, si reperia-
tur, vel verucis, vel iure pingui. Decoctioni adde pin-
guedinis porci, vel butyri recentis, vel ol. t̃b. ʒ. iniiciatur
t̃b. ʒ. frequenter.

Alter emolliens.

℞. olei amygd. dulc. liliorum, & irini ana quar. i. vini
dulcis, vel sapæ ʒ. iij. fiat clyster, iniiciatur.

*Axungia
felis.*

Axungia felis, vel ius felis mirum in modum emol-
lit, aut parui porci, aut anatis, aut anseris, aut anguilla-
rum pinguium, vel mugilum, vel axungia illorum ani-
malium ob partium tenuitatem & largam humidita-
tem. Medullæ etiam in vino dissolutæ iniiciuntur ad e-
molliendum cum terebinthina: sed potissimum lauda-

*Porci &
hominis.*

mus porci & hominis. Sunt etiam efficaciores omnibus
aliis. Vitulina & ceruina supradicta sequuntur. Styra-
calamin. aut opopan. si in multo oleo dulci diluantur,
minùs hærent & vehementissimè emolliunt. Vinum
dulce his clysteribus additur, quia minùs siccât & magis
emollit. Multò autem magis sapa, ob dulcedinè & æ-
ream substantiam, in qua sita est dulcedo.

Ad vrinæ retentionem.

IN retentione vrinæ clysteres iniiciuntur, vt si ab in-
flammatione retineatur, qui ad inflammationē sunt
instituti. Si à calculo, qui ad calculum communiendum,
& ad crassos succos & grumos sanguinis vsurpandi.

Ad ascitem.

Idem clyster, si auferatur oleum, in ascite valet, cui
addetur vrina pueri, vel si fermentum dissoluatur, aut
si quæ aquas trahunt, in decoctione ponantur. In ascite
clyster

clyster fiet ex herbis siccantibus, & aquas trahentibus. Quare neque emollientibus, neque relaxantibus in his erit utendum. Fiet autem hoc modo.

R. pariet. ped. columb. rutæ, foliorum sambuci & ciclæ ana M. j. foliorum chamomil. vel brassicæ marinæ, vel thymelæ ana M. ss. anisi fœnic. ana ʒ. ss. apiij. petro. ana ʒ. j. florum anthos, genistæ ana p. j. azari ʒ. iij. fiat decoctio in aqua fontis, in lb. j. diss. benedictæ ʒ. j. urinæ pueri ʒ. ij. misce, iniiciatur. In his autem sal addi potest, quia exiccat, & facultatē expultricem irritat. Clysteres hi robustis tantum exhibendi sunt, & qui hæmorrhoidas non patiuntur, quas solent hi clysteres exasperare, non autem debilibus, in quibus ventris fluxum excitarent, quo frequenter moriuntur. Quare in desperatione, ne diffamentur optima remedia, experienda non sunt. Adduntur etiam eiusmodi clysteribus in decoctione radices: & hoc modo parantur.

R. rad. apiij. petro. gramin. aspar. rub. maior. pentaph. ana ʒ. ij. azari, iridis recens. ana ʒ. j. mercur. brassicæ marinæ, rutæ, ciclæ, vel cucum syluest. ana M. j. folior. genist. p. ij. fiat decoctio in lb. j. diss. urinæ impubis ʒ. iij. benedictæ ʒ. ss. salis parum, fiat clyster.

Ad tympanitem.

IN tympanite clyster dissoluens flatum & pituitam educens, qualis est ille coli, vel sic.

R. fol. rutæ M. i. anisi, fœnic. carui, cymini, baccharum laur. ana ʒ. ss. flor. anthos, stechad. ana p. i. azari vel agari. ci ʒ. ss. fiat decoctio in lb. i. diss. bened. ʒ. j. ol. rutæ. vel anethi ʒ. 3. vini ʒ. 4. misce. Idem in anasarca valebit, addito sale in magna quantitate.

Ad anasarcam.

IN anasarca autem clysteres acres conveniunt, ut qui ad apoplexiam & soporosos affectus. Hoc tamen differunt, quod in clysteribus hydropicorum oleum prætermittendum, vel rutaceum ponendum in parva quantitate. Proprius fiet hoc modo ex resiccantibus, & pituitam incidentibus, & euacuantibus sic,

R. puleg. viriusque, calaminth. samplici ana M. i. agari. in panno ligati ʒ. i. anisi, fœnicu. seminis rutæ ana ʒ. ss. florum anth. stechad. ana p. i. fiat decoctio, in

℞. j. diff. muria. piscium, vel urinae pueri ℥. j. benedicta
℥. j. misce, vel sic.

℞. rad. enulae campan. & irid. recentis ana ℥. ij. azari
℥. j. foenic. carui. sampsi. ruta pulegij chamep. merc. ana
M. j. seminis apij, petro. an. ℥. ij. florum lauendulae, geni-
sta an. p. j. fiat decoctio, in ℞. j. diff. benedicta ℥. ℥. mellis
ros. colati ℥. ij. salis communis ℥. iij. iniiciatur frequen-
ter. Euacuat enim pituitam, discutit flatus, incidit, & at-
tenuat, humorum crassitiem, & intestina calfacit.

Ad coxendicum dolorem.

IN coxendico dolore clysteres tales sunt faciendi. Si
pituita in causa, ultimus est ob azari quantitatem ac-
commodatus, & prior ob muriam. Solebat enim veteres
muriam iniicere in coxendico dolore & viceribus inte-
stinorum depascentibus, vel trochiscos causticos, vel
chartam combustam. Verum de his suo loco dicemus.
Ad coxendicum itaque dolorem debent praescribi cly-
steres ad materiae aduersionem. Fiunt etiam alij veluti ad
concoctionem, vel calfactionem materiae dolorem gi-
gnentis, & dolorem sedantis. Quare illi clysteres vsur-
pandi sunt cum multo ol. calfaciente, attenuante, vel re-
laxante. Ex horum genere habetur oleum chamom. li-
liorum, de semine lini, & illa, quae calidiora sunt, ut o-
leum irinum, ruta, de spica, nardinum & similia.

Ol. Scilla.

℞. decoctionis praecedentis clyst. ℞. j. in qua diff. be-
nedita, vel hiera, colocynthi ℥. j. ol. aneth. vel ol. nu-
cum (quod ob partium tenuitatem, ut de spica magis con-
uenit) ℥. ij. misce. fiat clyster. Residencia autem huius de-
coctionis supra partem ponatur.

*Forma
clyst.*

*Aliud ad
idem.*

℞. puleg. vtriusque, erysimi, & iberidis ana M. j. semi-
nis foenug. ruta azari ana ℥. j. flor. chamom. melil. sam-
puci & lauendulae an. p. j. fiat decoctio, in ℞. j. infunde
agarici trochiscati ℥. iij. benedicta ℥. ℥. ol. liliorum &
amyg. ana ℥. ij. ol. de spica ℥. ℥. misce. Omnia olea facta
per sublimationem ob tenuitatem cum vino iuncta, huic
affectui profunt, ut ol. de thymo, de rore marino, de me-
ta, de terebinthina. Primum in decocto vel vino albo,
vel urina fiat clyster. Ego solis istis clysteribus breuissi-
mo tempore hunc affectum curavi, sine iberide, vel na-
sturtio, vel erysimo.

Ad dolorem, qui æstate picrocholis accidit.

Parantur etiam clysteres ad dolorem, qui æstate picrocholis accidit: qui vt clysteribus acribus & caloricis augetur, sic temperatis dolorem sedantibus temperatur hoc modo.

℞. mal. bismal. cicla, mercu. ana M. j. quat. seminum frig. maiorum an. ʒ. ss. seminis lini ʒ. j. florum chamom. melil. viol. ana p. j. fiat decoctio in aqua hord. & in tb. j. diss. mel. ros. colati ʒ. ij. diaprun. soluti. vel ʒ. de succo ros. ʒ. iij. vel cath. ʒ. j. olei viol. & chamom an. ʒ. ij. misce, iniiciatur. Deinde additur quod dolorem calidum mitigare possit, vt ol. ros. & viol.

Ad nutriendum.

AD nutriendum, clysteres aliquando sunt ex vsu, cum ægri ob imbecillitatem, ætatis, vel morbi, vel teneram ætatem cibum deuorare aut deuoratum retinere non possunt: vt in vomitione, & alio affectu ventriculi. Intestina nanque concoquendi vim habent. Sunt enim ex eadem cum ventriculo substantia, & eundem *Intestina vim concoquendi habent.* Quare alimenta, medicamenta alterare, & præparare possunt, à quibus per venas meseraicas hep. trahet. & inde sanguinem conficiet. Cum autem *Cōueniens materia.* imbecilliozem concoquendi vim habeat, necesse est ea, quæ iniiciuntur, facilioris esse concoctionis, & tenuium partium, quò facilius & citius trahantur à venis. Conueniens ergo materia talium clysterum in non febrientem & capite dolentibus est vinum dilutum aqua hordei. Item ius capi, cremor ptisanæ, lac recens mulsum. Si verò febricitat, decoctum pulli, capi, vel aqua decoctionis pulli vel capi cum pauco saccharo. Oua dissoluta & tremula, saccharum in pauca quantitate ponendum, ne detergendo purget, neque sal eadem ratione, neque mel, neque oleum ne lubricet, iniici debet, nec magna quantitas, ne altius conscendat. Nunquam id *Tempus.* fieri debet nisi post reiecta excrementa, vel cum dormuerit, alioqui excrementa miscerentur, & inficeretur id quod iniiceretur. Ne igitur ad reiectionem concitetur, faciendum est, accepto clystere vt superdormiat. Nam sic melius retinebunt ac concoquent. Si verò post assumptionem, aliquam quantitatem velit reddere, non

est impediendum. Parabitur autem hoc modo ex supra-
dictis clyster.

R. aquæ distillationis capl, vel decoctionis lb. j. ss. vel
lb. j. sacchari ros. 3. ss. misce, iniiciatur. Vel

R. lactis vaccæ lb. j. ss. mel. 3. iij. iniiciatur.

R. decoctionis hordei mundati in cremorē conuersi
lb. j. ss. vini qr. j. misce, iniiciatur. Vinum addendum est
ad distribuendum cremorē hordei, tūcque augenda est
ipsius vini quantitas pro crassitudine cremoris. Vel

R. decoctionis pulli vel hordei perfectē decocti lb. j.
ss. vitellorum ouorum num. iij. vini 3. iij. misce, capiat ve
prius admonui. hi clystere ægrotos optimē nutriunt.

*Ad appetentiam deperditam à satietate
humore pituitoso.*

Quibus appetentia deperdita est ob ventriculi satie-
tatem & intestinorum, valent clysteres attrahen-
tes & laxantes pituitam. Est autem pituita dulcis, quæ si
in ventriculo vel intestinis sit, satietatem inducit maxi-
mam. Quare vomitu, si in ventriculo, vel in medica-
mento purgante, vel clystere euacuanda erit. Hoc modo
fit ad pituitam vacuandam.

R. mercu. ciclē an. M. j. agarici in panno ligati 3. j.
florum chamom. p. j. fiat decoctio in aqua hordei, vel
vrina pueri, & in lb. j. dist. benedictæ 3. ij. muricæ 3. j. mi-
sce, capiat manē. Si verò appetentia deiecta fuerit, ob sa-
tietatem vel retentionem excrementorum, utilis erit illa
iniectio: in aliis casibus parum prodest.

Ad prouocationem mensium.

Ad prouocationem mensium clysteres parati ad re-
tentionem vrinæ à crassis humoribus accommoda-
ri possunt, quibus addere possumus, vel benedictæ, vel
hieræ maiorem quantitatem, vel confectionem agarici.

Ad hæmorrhoidas irritandas.

Ad hæmorrhoidarum irritationem fiat decoctio ex
acore, aristolochia, cucumere agresti, capis, &
tum sale sine oleo iniiciatur, vel cum hiera, vel cum fel-
le bubulo, vel porci, hæc enim sanguinem mouent.

De iniectionibus in Vterum, Vesicam & aures.

Fiunt etiam iniectiones in alias cavitates, veluti in
vterum, vesicam, aures, & sinus. Omnes autem he
inie-

injectiones fiunt ad deterfionem & euacuationem excrementorum, deficcationem calositatis. Erosionem, ad carnis regenerationem, & consolidationem vlcerum vteri. Eas autem tales fieri oportet, quales in dysenteria fieri præcepimus: hac tamen aduersione adhibita, vt si pars aliqua medicamenta determinata habeat, aut propter eius functionem, aut propter temperamentum, aut aliam quampiam occasionem, ea clysteribus iam præscriptis adiungamus, vt vterinis injectionibus matricariam arthemif. tanacetum, aut propter exactum partis sensum, vt in mammaris, & similibus etiam, quæ deficcant sine morfu, aut detergunt, eligimus, aut aliquid adiungimus, quod aliorum medicamentorum morfum frangat: Diosc. ferè semper medicamenti aurium vel rosaceum vel opium adiungit.

Quorsum fiant in vterum injectiones & quibus patentur.

IN vterum fiunt injectiones ad mensium prouocationem, quæ ex detergentibus medicamentis fiunt, quæ sunt amara, acris, nitrosa, non astringentia, & ex radic. aperientibus, seminibus, floribus, & odoratis in hunc modum.

℞. quinque radic. aperitiuarum, & rubiæ maior. ana ʒ. ij. radicum eryng. & ciclaminis, iuniperi an. ʒ. iij. matric. sabinæ, mercur. ana M. j. cinamomi tenuis, spicæ vtriusque propter odorem suauem quo vterus gaudet) azari ana ʒ. ij. seminis nigellæ ʒ. ss. fiat decoctio in aqua & vino albo, vel in vino, & oleo chamom. Ex collatura fiat injectio per metrenchitam.

Potest etiam fieri ex succis herbarum, vel radicibus prædictis extrahendo succum cum vino albo. Commodius fuerit ei decoctioni vteri ad defensionem addere lupinorum, & corticum fabarum an. M. j. si pituitosa fuerit mulier.

Ad deterfionem vteri & vlceris post foetum mortuum.

AD deterfionem vlceris, vel excrementorum vteri retentorum, vel secundinæ putrescentis, vel post mortuum foetum retentum fiunt injectiones. Quare cum ad excrementa vteri pituitosa detergenda paranda sit, decoctio facienda est, quales sunt clysteres detergen-

tes, & clyster ad Ascitē præscriptus, & quæ fiunt ex huiusmodi medicamentis laxantibus dissolutis in eadem decoctione: fiunt autem sine oleo & sale, ne citius cogantur expellere: sed ex aqua, vino, vel lixiuio facto ex corticum fabarum farina: illudque lixiuium debet esse debile. Nam è corticibus, vel caulibus fabarum tantum deterget, vt exulceret & tātum siccet vt ossa spoliet: vel ex cineribus sarmentorum in valde humidis. Quod si ferrosi humores, vel acres sint abluendi, iniectiones fient quales in dysenteria fieri diximus, nempe ex hordei decocto, saccharo vel melle rosato. Succus enim rosarum dissolutus in aqua cisternæ, vel hydromelite deterget. Urina etiam pueri impubis diluta aqua, serivices gerit. Decoctio leguminum idem præstat, quod etiam faciendum est in vlcere vteri: consideranda vlceris natura, & symptomatis, quæ vlcera comitantur. Nam si vlcus sordidum sit, qualia sunt fere omnia, sine magno tamen dolore, & sanguinis fluxu iniicienda sunt, quæ fortiter detergunt, veluti quæ ex amaris & nitrosis parantur, in quarum numero est decoctum lupinorū, fabarum, marrubij, radix ciclaminis, vel aristolochiæ, vel ex herbis amaris, vt ex decocto abynthij, marrubij, abrotani, arthemisi, vel ex floribus centauri minoris, rosarum sic. In illis autem iniectionibus dissoluuntur, mel aut voguentum ægyptiacum, aut apostolorum, quando magna est putrefactio. Sin vlcus cum dolore sit, quæ detergunt sine morbo negligemus, adiungemusque quædam dolorem mitigantia. Exempli gratia, cum decocto hordei mundati, cum succo plantaginis vel solani, vel albumen oorum cum paucis sacch. vel syr. de rosis siccis. Si cum fluxu sanguinis primum astringentia frigida, quæ fluxum sanguinis sistunt, iniiciamus, veluti succum plantag. polygoni, bursæ pastor. cum bolo armeno, sanguine draconis, aliisque astringentibus. Deinde quæ siccando leuiter detergunt, eligimus, vt

R. fol. plantag. agrimon. ceterach myrthi, lentisci vel summitatum pyrorum syluestrium, vel rubi an. M. j. fiat decoctio in aqua fontis, vel extinctionis plumbi, & in collatura dissolue sacchar. rub. & mel. ros. collati vel syr. de ros. siccis ℥. iiij. pro lib. misce, fiat iniectio.

Fiunt

Fiunt etiam injectiones ex succis & aquis distillatis prædictarum herbarum cum sero lactis, aut lacte calybeato ad desiccandum. Ad easdem intentiones fiunt etiam injectiones in doloribus vteri, quales dictæ sunt in doloribus intestinorum, cum sine vlcere sunt. Iniiciuntur autem magna ex parte cum oleo, veluti amygd. dulc. aut amar. maximè cum sedare dolorem, & meatus aperire volumus. Sin cum vlcere sit dolor, ol. cum vitellis ouorum: Sin autem ex floribus, fiat decoctio ex seminibus carminatiuis, & herbis leuiter laxantibus, & detergentibus, & iniiciatur.

Ad scirrhus vteri & similes affectus.

Iniiciuntur medicamenta in vterum induratum scirrhus, aut propter eius densitatem, aut acrimoniam excrementorum, vt emolliant, fiuntque ex oleis & vino, & axungijs liquefactis, quando iniicienda sunt in colum vteri, vel decoctionibus malisticorum medicamentorum. Olea erunt amygd. dulc. & amararum, & alia olea spissa odoratis adiicienda præscriptis à Diosc. Qualia sunt vnguenta de croco, anethinum, narcissum, irinum, amaricinum, nardinum. Quæ quia non reperiuntur parata, oleis simplicibus supradictis radices irid. & narcissi, vel aliquid styracis, bdellij addimus. Decoctiones autem fiunt ex herbis emollientibus, quibusdam seminibus odoratis, vel herbis additis, vt

R. radic. bismal. & liliorum ana ʒ. iij. puleg. vel origani, vel artemis. M. ss. seminis lini, & fœnugr. ana ʒ. j. florum chamo. viol. (Nam propter caliditatem, vel humiditatem rarefaciunt, & laxant partem calidis additis) melil. ana M. j. fiat decoctio in iure pingui intestinorum, vel in aqua, & vino albo dulci, non astringente, aut sapa, fiat injectio. In summa in vuluam, & sinus possunt iniici quæcunque morbus postulat, diluta in liquidis, vel oleis, partibus, aut affectibus, aut symptomati accommodatis.

Ad suffocationem & descensum vteri.

Quod si cum duritie vterus sursum feratur, & suffocationem faciat, obduratæ lachrymæ, vt styrax, & bdellium, iniici possunt. Si verò deorsum præcipitetur, galbanum recens, opopanax, assa foetida, & sagapenum

erunt ex vlu. Quæ si recentes sunt, emolliunt, antiquæ verò digerunt. Recentibus verò similes redduntur, si in oleo amygd. dulc vel violarum diluantur, vt

℞. galbani & opopanax. ana ℥. j. ol. amygdal. dulc. & viol. ana ℥. ss. vini albi dulcis, vel sapæ q. ss. macerentur in sapa, vel vino per noctem, deinde liquefiant & coquantur, rursus liquefiant in oleis & iniiciantur. Alioqui ob lentorem & visciditatem difficile iniiciuntur. Ceterum hîc vinum pro aceto ponitur, quod in aliis partibus apponeretur: sed quia vtero aduersatur, prætermittendū est, & eius loco vino dulci, quod siccet minus & magis emollit, vtendum. Idem faciendum de styrace, & bdello in suffocatione vteri, & mensium prouocatione. Quod si constringendus sit vterus, aut vlcus exiccandum, sequenti decoctione fieri poterit.

Constringens & siccans.

℞. radic. bistortæ (quæ maximè conuenit vtero: est enim astringens) q. j. cortic. mali granati, balaustiorum, myrtil. ana ℥. j. hippur. fol. sumach, & lentisci ana M. j. feminis viol. & plantag. ana ℥. ss. florum ros. siccatur p. j. fiat decoctio: in aqua cisternæ vel ferrata. Dissolue aluminis q. j. fiat iniectio.

Iniectiones in sinus ad carniū generationem.

Sarcotica.

EAdem decoctiones in sinus iniicimus ad deterfionem primū, addito melle ros. vt q. j. pro ss. j. Deinde ad exiccationem sine melle. Quandoque cum resiccantibus, deterfione iam facta, addimus myrrham, corticem thuris, radicem panacis, vel ininum, vel alia sarcotica ad carnis generationem, indicatione sumpta à parte, quæ magis vel minus siccari debet.

Ad callum.

Callum minuen.

IIn fistulas verò ad callum iniicimus lixiuium propter medicamentorum nigrositatem, in quibus decoquantur callum minuentia, vt radix veratri, aut vnguenta erodientia dissoluimus. quale est ægyptiacum, Apostolorum, & ea, quæ ex ærugine æris parantur.

Ad doloris sedationem.

Olea vlc. & amica.

AAd sedationem autem doloris possunt iniici olea & alia anodyna, quæ non sunt ipsi vlceri inimica, vt rosarum, omphac. cydoniorum hypericonis, myrthi & vitel-

vitellorum ouorum, & amygdalarum. Vel si repellendum sit, astringentia, vt ros. omphac. & myrthi.

Ad Ulcera in Vesica.

AD curationem vlceris vesicæ vel colivescæ, similes sunt iniectiones. Primum enim oportet detergentibus sine morfu vti, quales sunt iniectiones, quas ad dysenteriam præscripsimus, nempe ex decocto hordei, ex lacte, nisi vlcus sit fœtidum, & depascens. Tunc enim *Egyptiacum.* utile est in iniectionibus dissoluere, aliquid ægyptiaci, quod cum mordicatione deterget: postea vbi vsumus vnguentis suprâ dictis, sedare dolorem anodynus debemus, quale est quod paratur albumine oui, & aqua ros. simul agitaris. Serum lactis, decoctum hord. mundati cum capitibus papaueris, aut pauca quantitate radicis mandragoræ, aut additis trochiscis ex opio, quales sunt trochisc. alchechangi Ras. cum opio dissoluti in cote. Narcotica autem ista nunquam adhibenda sunt, quando aut pus, aut aliquid aliud à parte affecta expellendum, aut detergendum est, sed duntaxat cum volumus *Narcotica quando.* constringere, aut sensum partis minnere, ne scilicet medicamenta nimium acria sentiat. Iniectiones verò ad vlcera resiccanda fieri debent ex resiccantibus cum pauca astringentia. Nam nimium astringentia vrinam retinent, quæ retenta multum torquet. Vrina siquidem acris, & mordax cum per angustum meatum descendit, maiorem excitat dolorem, quàm si per partem laxam demittatur. Hanc itaque vnam arbitror ex causis, cur vesica exulcerata dolorem non sentiat. Mentula verò etiam si *Cur Vesica non sentiat.* ne vlcere acerrimum dolorem sentiet ex pure vel pituita reddita vnâ cum ipsa vrina. Parabitur autem efficacissima iniectio ad vlcus vesicæ hoc modo.

℞. rad. consolid. maioris ʒ. j. quæ huic affectui conuenit, quoniam consolidat, & mucilaginem quandam habet necessariam, vt medicamentum parti adhæreat, & partis asperitatem leniat, quemadmodum in vlceribus intestinorum seuum ad eundem affectum addere solemus (caudæ equinæ, fol. plantag. ceterach.) multum enim exiccat, vt pilo sella, quæ potest addi, & herniaria, & polygonum, ana M. j. vel ℞. flor. ros. p. j. hyperic. p. ℞. (Hypericum enim confert maximè calcu-

Hypericū. lo, & cicatrici vlceris vesicę: quia & calculum commi-
 nit, & vlcus consolidat) fiat decoctio in aqua hord. vel
 extinctionis plumbi, aut ferri, fiat iniectio. Vel aquis di-
 stillatis, vt rhapontici, ros. vel plantag. vel hipur. Adi-
 dem valde litharg. puluerisatum & diu decoctum & per
 philtrum transmissum, iniectum vt prius, & lac virgi-
 nale. Apponi etiam possunt quęcunque nervos conso-
 lidare creduntur: Pars enim magis nervosa est, quàm
 carnosa: ob id radix narcissi, propter mucilaginem, cau-
 da equina, polyg. femina & quęcunque nervos conso-
 lidare creduntur, huic affectui maxime conferunt. Pra-
 xici solent trochiscos iniicere, qui supra partem vlc-
 ratam adhærentes, solent dolorem excitare. Quare sa-
 tius erit talia medicamenta decoqui, aut infundi: po-
 stea vero diligenter per philtrum transmitti, ne pars a-
 liqua maneat aspera: Aut trochiscos illos in core, aut
 supra marmor comminui diu, collyriorum more, vt pi-
 ctiores suos colores comminuerē solent, quos antiqui
 in suis collyriis faciendis imitati sunt. Cortex mali pu-
 nici, & pinearum decoctum insignem vim resiccandi
 habent.

Error.

De iniectionibus in aures.

I Niectiones in aures aut fiunt propter inflammatio-
 nes, aut vlcera detergenda, aut dolores, aut sibilos,
 aut surditatem. Quare propter inflammationem succi
 herbarum repellentium commodè iniiciuntur, aut ea-
 rum decoctum ad refrigerandum & repellendum. Sus-
 ci autem purificati facta residentis, aut colati efficacio-
 res sunt. Quod si cum ros. iniiciantur, magis sedabunt
 dolorem. Ad doloris sedationem etiam iniiciatur lac
 recens mulsum, vel decoctum mandragorę cum pau-
 co croco, aut oleo violaceo. per se, vel cum pauco cro-
 co, aut opio. In declinatione autem & post vsum narco-
 ticorum admiscetur castoreum. Si somnus concilian-
 dus, non est vtendum castoreo: quia calidum & siccum
 nocet: sed croco, quia vaporosus, vel styrace, vel aliis re-
 pellentibus. Idque intelligendum ad opium castigan-
 dum. In declinatione vero iniiciatur ol. ex vino, in
 quibus decoquitur origanum, puleg. calaminth. ruta.
 spondyl. & similes herbę, quę quauis calidę sint, in decli-

declinatione tamen adhibendæ sunt, ad absorptionem materiz, etiam si in principio fuerit calida.

Ad sibilum & aurium dolorem.

Similis fit iniectione in aurem propter dolorem à frigido humore & sibilo, addito pauco aceto, aut semini-
bus flatus discutientibus, ut est cuminum, seselli, semen
porri, aut succus. Est enim huic parti valde accommo-
datus. Præterea doloribus, vlceribus, & aliis affectibus,
in quibus detergere optimum, maxime conuenit. Quod
si auris opposita alteri fricetur allio, dolor sedabitur,
quia materia inflammationis auris est humor frigidus.
Id enim euenit in aurium doloribus. Succus porri præ-
sens est remedium ad dolorem aurium à flatu, à materia
crassa, ut ait Diosc. lib. 2.

*Succus
porri.*

Ad aurium surditatem.

Surditates fiunt ob diuersas causas. Nam aliquando
surditas ex pure retento oritur circa eam partem. In-
terdum a flatibus, aut materia collecta circa hanc par-
tem. Interdum ob cicatricem obductam in ea parte. Id-
eo ex diuersis iniectione constitui potest. Si autem à crassis
humoribus & sibilis fiat surditas, iniectiones supradi-
ctæ fient, quæ ad declinationem inflammationum insti-
tutz fuerunt, addito raphani succo, vel melle squillitico,
vel aceto simplici, vel diuretico, vel sambucino.

Ad cicatricem.

Si à cicatrice fiat surditas, difficillime curatur, quia
cicatrix auferri non potest, quemadmodum & quæ à
ruptura tympani fit, nunquam curatur, quoniam cica-
trix nunquam tolli potest.

A pure.

Si à pure collecto fiat, oxymellite, omphacio, & mel-
le, ænomellite, succo centaurei minoris, succo por-
ri, succo aristolochiæ, melle squillitico diligentissime
pars est detergenda: resiccando verò tandem ex suffi-
migiis & iniectionibus, quæ fiunt ex vino & aceto, mo-
dò non sit vlcus, in quo decocta sit scoria, aut lithargi-
rum, aut tuthia, aut herbæ, aut radic. quæ insigniter exic-
cant. Quippe cum pars suapte natura sicca sit, medica-
menta sicciora postulat. Surditas autem à causa occul-
ta curatur potissimum iniectione facta ex decoctione

Corticis & foliorum fraxini mediani, occulta quadam proprietate: radix veratri nigri in vino, & oleo amygd. amar. aut oleo multū resiccante, vt rutaceo & similibus. Iniectiones autem ad vermes aurium tales sunt, quales superiūs descripsimus, vel quæ ad deterisionem vlcerum accommoda sunt, & præcipuè quæ quandam amaritudinem habent, vt succus aristolochiæ, vel absynthij.

Ad sinus iniectiones.

Iniiciuntur post calli erosionem iniectiones, quæ parantur ex detergētibus leuiter, & ex decocto hordei, vel in vino mellito, vel vino tantum, vel in aqua vitæ, in quibus vnguenta sarcotica dissoluuntur, vel simplicia in tenues partes comminuta ad carnis generationem, vt

Sarcotica. myrrha, thus, cortex thuris, panax, aloë, sarcocolla, iris florentiæ hyperic. vel centaurium minus in parua quantitate, & corporibus vel partibus in quibus detergere oportet. Non consolida, radix narcissi, hippuris, syderitis, & similia. Vnguenta dissoluuntur, basilicum magnum, vnguentum aureum, emplastrum diuinum, & quæ è simplicibus.

Sarcotica Vnguenta. supradictis parantur. Ad cicatricem inducendam si intus sit vlcus, neque pituita lenta & crassa, iniectiones sicciores, & frigidiores, vt ex corticibus, balauistiis, malis punicis, & aliis supra dictis fortioribus additis mineralibus, vt cerusa, litharg. tuthia, cadmia, scoria ferri. Cum iniectionibus etiam enumerari possunt ea remedia, quæ gargarismata dicuntur, & errhina liquida.

De gargarismatis.

Instituuntur gargarismata ex diuersis rebus pro ratione diuersa affectuum. Fient itaque ad principium inflammationis oris & palati gargarismata repellentia ex aqua, & aceto & vino malorum granatorum acidorum, succo cotoneorum, succo mororum, aut pitorum agrestium ex aquis distillatis refrigerantibus & resiccantibus, vt aqua rosarum plantaginis, caprifolij, peculi ros. myrtill. & similibus. Ex decocto earum herbarum aut fructuum aut seminum, quæ neque ingratum odorem habeant, aut saporem, aut venenosam quandam qualitatem, veluti ex pomis, piris, prunis acidis, sorbis cornis, cotoneis malis, vuis immaturis, & summitatibus rubi, lentisci, myrthi, mali granati, vel punicis, sum-

mitatibus vitis, ceterach, plantaginis, pilosellæ, quæ in vino decocta citissime oris vlcera, & inflammationes curat, ligustri, citri. & similium: Ex flor. ros. summitatibus berberis: Ex seminib. frig. minor. & eorum decoctionib. circa finem autẽ decoctionis addimus aceri parum. Ad di possunt & cort. mali gran. balauft. citrini: sed linguam denigrant, nisi illud decoctum clarificetur, sed clarificando magnam partem virium amittit. Efficaciora & gratiora sunt, quæ parantur, præ cæteris, ex fructuum succis & pauco aceto, quibus ad dicitur syr. de ros. siccis & myrrh. & cotoneorum. Interdum repellendum & leuiter detergendum est, quia à partibus inflammatis semper aliquid resudat, quod est detergendum leuiter. Conueniunt igitur hordei decoctum vel mel. ros. In declinatione aut detergendum, & resoluendum. Conueniunt ergo herbe detergentes & digerentes.

Gargarismata ad eris inflammationem.

R Hyss. vel satureiæ, vel orig. M. j. Nam hæ omnes nec sapore nec odore sunt ingrati, quibus addere poterimus flor. anth. & stecha. ana p. j. glyc. ras. 3. j. pass. sic. an. p. xx. fiat decoctio in aqua hord. integri, & in tb. j. 3. aut tb. ij. 3. diss. mel. ros. collati 3. iij. Præscribenda est autem horum medicamentorum magna quantitas, quandoque nimia collutione multum medicamento absumitur. Hæ autem medicamẽta præcedunt simpliciora gratiora, ut quæ ex aceto, vel fructus alicuius acidı succo parantur hoc modo.

R. aceri communis vel ros. 3. iij. aquæ cisternæ tb. ss. misce, fiat gargarisma: facile paratur. Itaque parantur ex succo cydoniorum, vel malorum granatorum non recetium, sed diu seruatorum, quibus aquæ aliquam quantitatem addimus, ad augendam molem medicamento, & temperandã aciditatem, & ad partium calidarum extinctionem. Nam ut in aceto, ita in omphacino, aliisq; succis vestigium aliquod caloris reperitur, ex quadam veluti imperfecti putredine. Quod si quis gratiora palato velit adiungere, addat sacchar. ros. pauca quantitate. Sapor enim ille dulcis astrictionem minuit. Ex paratu facilibus sunt gargarismata repellentia ex aquis antea enumeratis hoc modo.

R. aquæ peculi ros vel plantag. vel caprifolij q^r. j. acet. ti ros. parum, misce, fiat gargarisma. Fiunt ex decoctione fructuum, vel florum, vel herbarum: verum, quæ ex fructibus parantur, graviora sunt, minusque amara. Nā fructus ferè omnes immaturi, austeram & astringentem habent facultatem, cum vel acidi, vel acerbi sint. Fiunt autem hoc modo.

Gargarismata ad eadem ex fructibus.

R. Ceraforum acidorū vel immaturorum leuiter contusorum an. M. ij. coquantur in aqua cisternæ cum paucō aceto. In colatura addatur acet. parum, fiat garg. Eodem modo fit ex pomis, pyris, cornis, & aliis supradictis. Si autem defunt ex succis eorundem fructuum, vel syr. seruari, tum etiam ex summitatibus arborū & fructuum. Solent enim magis resiccare & repellere.

R. summitatum rubi, vel myrthi, vel pyri, vel vitis-agrest. M. j. pilosellæ, ceterach plantag. an. M. j. ss. ros. rub. p. j. (Rosæ enim ponuntur propter odorem, & propter astringentem vim, quandoquidem hæc omnia medica. gratum odorem habere oportet, aut omnino nullum, at vsui apta sint) fiat decoctio in aqua pluuiali. (Ea enim cū sit tenuium partium, efficacior est reliquis) & in tb. j. ss. saccha. q^r. j. vel syr. ros. vel mel. ros. aut diamoroni, propterea quod digerit ob mel. mistum, maximè quando à repellentibus ad digerentia transire volumus. Tunc enim aut sapim, aut mel. siue saccharum, adiciamus, aut quantitatem dulcium augemus.

Detergentia gargarismata.

Detergentia gargarismata fiunt ad deterfionem dentium, aut ad eosdem dealbandos, aut vlceris deterfionem, aut eius quod in summitate trachæ arteriæ collectum est, extractionem, aut quod ab inflammata parte excidat, aut ad dolorem dentium.

Ad dentium conseruationem à putredine.

Ad dentium cōseruationem, siue deterfionem fiunt gargarismata, seu, si mauis. collutiones determinatæ ex multum resiccantibus, ex aceto scillitico, aut ex distillatione saluæ. ex roremarino, sale & vino, si detergendi & dealbandi sint. Talis enim collutio & cōseruat, & mirum in modum dentes dealbat.

Ad dentium dolorem.

AD dentium dolores fiunt duobus modis gargarismata, nempe à dolore, qui ab incipiente fit defluxione, & eo qui fit defluxione iam facta. Ad dolorem itaque qui fit ab incipiente defluxione, parari debent ex astringentibus nullo, aut minimo calore præditis, veluti è radice pentaphilli, hedera, nucibus cupressi, vel gallis in aceto, aut vino styptico coctis hoc modo.

Ad dolorem dentium à fluxione incipiente.

R. Radic. pentaphil. ʒ. ij. hederae M. j. radic. cyperi, nucum cupressi ana ʒ. ʒ. fiat decoctio in aqua, & aceto, quod quidem gargarism. retinendum est in ore. Ad dolorem autem à defluxione iam facta. augeatur dosis calidorum vel discutiētium eam defluxionem, quæ in gingivas recepta est.

R. pyretri ʒ. ʒ. rad. quinque folij ʒ. j. caryoph. de cubeb. ana ʒ. ij. & piperis longi ʒ. ij. hederae M. ij. fiat decoctio in vino astringente, & aqua, hacque decoctione ut priore, est utendum.

Ad oris Ulcera exsicccanda.

AD exsicccanda oris ulcera fiunt collutiones ex herbis, & fructibus refrigerantibus, & exsiccantibus, in quibus dissolvimus alumin. ʒ. j. vel ʒ. ij. vini albi parum loco aceti.

Ad oris fætores.

AD oris fætores fiunt collutiones, ut prius, ex detergentibus, & odoratis, deinde ex odoratis, & resiccantibus tantum hoc modo.

R. hordei integri torrefacti p. j. rosa. p. ʒ. corticis citri ʒ. j. ʒ. caryoph. cinamomi crassi ana ʒ. iij. fiat decoctio in aqua cisternæ, ex qua, & paucio aceto colluatur os. Vel,

R. radic. cyperi ʒ. j. ros. rub. p. j. sandali citrini, & cinamomi ana ʒ. ij. fiat decoctio in aqua cisternæ, vel aqua chalybeata, colluatur os. Vel ex aquis distillatis odoriferis aliquot grana mosci i. 8. ut

R. aquatum myrrhi, ros. ana ʒ. ij. aquæ ex floribus genistæ vel citri ʒ. ʒ. mosci vel ambrae gr. vj. salis parum. Quod si ditiori pareretur gargarisma, maior portio mosci, vel ambrae poterit dari.

Ad decrementa, quæ ex parte inflammata resudant.

A De a vero excrementa, quæ ex parte inflammata resudant, supradictis vrendum, nempe sapa, melle, cum decocto hordei vel fabarum, vel lentium, aut aliorum detergentium.

Herba incidentes.

Ad deterfionem pituita, quæ partibus oris adhæret.

A D pituitam viscidam & lentam detergentam, quæ partibus magis adhæret, herbas aliquot incidentes decocto addemus, veluti hyssop. origan. glyc. & similia. In collatura vero addemus mel squilliticum, aut oxymel aut ex syr. detergentibus aliquem, vt est syr. de glyc. de prassio, de stichade, qui potenter incidit, eadem proportionem, quæ de aliis supradictum est, videlicet pro lib. j. decoctionis adduntur ʒ. iij. syr. aut mellis. Verum cum eodem gargar. interdum decoquimus humores à capite trahentia, veluti pyretum, carthamum, radicem turbiti, & ea quæ pituitam agunt, nec amara sunt. Amara siquidem, vt agarius & colocynthis reiciuntur. Non desunt qui medicamenta composita velint admisceri, quale est diaphenic. Indum maiu. Masticatoria autem magis conueniunt, & potentiora sunt, quia ob caliditatem maiorem, quæ sunt prædita, & agitatione dum masticantur, potentius trahunt, quibus tamen non est vitendum in defluxionibus in pulmones.

*Syrupi incidentes.
Trahentia à cap.*

Ad vlcera oris deterfionem.

A D vlcera vero oris deterfionem parabuntur ex decocto hordei, & quibusdam herbis, quæ cum facultate deterforia desiccant & refrigerant, & constringunt. Vix enim vlcera absq; inflammatione reperias. Ex herbis & fructibus, & aliis eiusmodi eligenda sunt medicamenta, vt acrimonia, ceterach, plantago, summitates rubi sylvestris, folia arbuti, pyri sylvestris, myrthi, lentisci, & vt breuiter dicam, si ex fructibus repellentibus, & istis herbis fiat decoctum, detergit, & leuiter astringit, in quo dissoluendum aut mel ros. aut syr. de ros. sicis in maiori quantitate, quam inflammationem, in minori vero, quam in pituita educenda. Eadem etiam obseruanda sunt, quæ in vlcere vteri impetrauimus, si putrescat, aut cum dolore, vel fluxu sanguinis sit. Tunc enim similes iniectiones parandæ erunt, habita semper

Herba refriger. & constring.

partis

partis ratione, quæ medicamenta neque sapore, neque odore ingrata venenosa ob periculum deglutitionis ferre potest. Quòd si fortè vlceris aliqua malitia sit, & aquam fortem, vel sublimatam desideret, non est gargarisandum, sed pars contigenda specillo, vel scalpello obvoluto bombaci, aut linteo partem contangimus, aut pars oris anterior abluenda, non gargarismatis, sed immixtis tantum aliquot guttis aquarum, rosarum, plantaginis vel solani in aquam fortem.

Ad Vlcera oris in morbo Italico.

Ceterum quoniam in morbo Italico frequenter utimur emplastris, aut vnguentis ex argento viuo paratis, aliquando in aliis morbis: Argenti autem viui nidor per os iniectus dentes inficit, qui linguam, aliasque partes suo contactu exulcerat. Præterea pituitam liquefaciendo, defluxionem ad os excitat. Quòd autem argentum viuum id efficiat, argumento est, quòd si quis iisdem vnguentis utatur sine argento viuo, nihil tale ei accidit, neque etiam si vnguenta argentum viuum recipiant, dummodo aquam puram inter sudandum ore contineat, aut ante sudationem dentes ol. amygd. dulc. fricentur, nullam exulcerationem sentiet in labiis, aut buccis. Prohibet enim eius asperitatem, & medicamentis acerbis aduersatur, ut omnia ferè pingua, cuiusmodi sunt ol. commune, butyrum. Ad horum autem affectuum præcautionem utimur gargarismatis ex ol. amygd. buty. aut iusculo pingui. Prohibent enim hæc gargarismata exulcerationem, & pituitæ defluxum non impediunt.

Cum inflammatio circa os fieri incipit.

Verum cum inflammatio circa os fieri incipit, utilissimum erit pro gargarismate uti iure pulli cum pauco syr. violac. ut refrigerentur partes, & leuiter detergantur. Deinde danda gargarismata è cremore hordei sine saccharo, si iam vlcerata fieri incipiant: Sin iam facta sint, addendum saccharum ros. tabulatum ad deterfionem. Cremor enim hordei aduersatur asperitati vlcenum suo lentore, minus tamen quam pingua, quæ facile accenduntur, quæ ob id minus vlceribus sunt accommodata. Vlceribus utique deterfis, & facta purgatione ad astringentia gargarismata veniendum erit, quæ

*Argentum
vium.*

sunt ex aquis, & decoctionibus herbarum. Ex aquis hoc modo, si sit magna inflammatio.

Ad inflammationem oris.

℞. Aquæ solani plantag. caprifol. ana gr. j. syr. ros. laxatiui ʒ. ij. fiat gargarisatio. syr. ros. laxat. magis ref. i. gerat & deterget, quàm qui ex ros. siccis paratur, qui magis exiccat, & astringit. Si vlcus sit exiccandum, fiat gargarisma ex aquis magis exiccantibus, vt

℞. aque peculi ros. vel myrtil. lb. ss. syr. de ros. siccis ʒ. ij. misce, fiat gargarism. Aut si guttæ duæ, aut tres aquæ fortis in prædictis iniiciantur, citissimè vlcera exiccabunt, & curabunt. Hoc gargarismate abluendi sunt dentes, vt suam albedinem recuperet. Moderata autem erit huius aque quantitas ne maior dolor sit, quàm æger ferre possit, neq; minor, quàm vt non sentiat. In his quæ ex decoctione herbarum sunt, idem obseruandum. Nam si inflammatio adsit, magis refrigerandum: sin vlcus exiccandū, magis astringentibus vrimur, vt videre est supra cap. præced. Si autem decoquitur pilosella in vino albo cum quibusdam ex iam prædictis, multò citius curabuntur. Idem efficit herniaria, & polygonum mas. Hoc gargarismate vtemur cum partes oris interiores detergendæ aut exiccandæ sunt. Nam si interiores, quæ sunt citra œsophagum, affectæ essent, penicillo tetigisse satis erit.

De errhina.

DE errhinis iam nobis dicendum est, quæ à naribus nomen acceperunt, quibus vrimur aut in detergendis naribus, aut in euacuatione recrementorū anterioris cerebri. Detergentia autem sunt iam ad pituitosa recrementa vacuanda illa, quæ in parte cōgesta sunt ratione vlcerū. Ad recrementa verò cerebri expurganda sūt errhina pituitosa, vel biliosa, vt in arcato morbo, maxime cum oculi bilioso colore, & humore sunt infecti. Nec oberit in melancholico affectu melancholica adhiberi, vt in melancholia morbo, & ictero nigro. Verum quia pituitosa frequentius per eam partem expurgantur, de his prius agemus. Fiunt itaque purgantia ex calfacientibus, attenuantibus, liquefacientibus, & pituitam trahentibus, nisi in coriza, in qua resiccantibus & refrigerantibus tantum ob humoris acrimoniam vrimur. Si quidem

*Pilosella.
& alia
herbae
ficaces.*

quidem nimis tenuis & liquida aut calida plus iusto fluit, aut facultatem expultricem cerebri irritat, veluti in dysenteria, ob idq; purgatur cum multis sternutamentis. Medicamenta autem calfacientia & exiccantia citra ullam astringentem, sunt herbarum capitales dictæ, calefacientes, sicantes, & vicunque odoratæ: quia cerebrum odoratis delectatur, & pituita, qua maximè abundat cerebrum, vacuatur. Eadem hinc usurpantur, quæ in gargarismatis discurrentibus, minorem tamen delectum habemus. Nam & amara iniiciuntur, modò nimium foetida non sint, quia talia cerebro sunt inimica propter spiritus. Hoc autem modo purgans fit.

R. radia. pyretri irid. ana ʒ. j. puleg. calamint. origan. ana M. j. agarici trochi. ʒ. iij. florum anth. & stechad. an. p. j. fiat decoctio in lb. j. colat. diff. mel. anthos & squillit. ana ʒ. iij. fiat caputp. At vulgus medicorum dissolvit mannâ, sed imbecillior est, quàm ut possit dissolvere pituitam: mel potentiùs id efficit. Possunt autem in hac decoctione dissolui indum maius, diaphenicû, aut hiera picra cum fortiùs est trahendum, aut cum nullæ fuerint in decoctione addita purgantia ut agaricus. Verùm multò satius fuerit medicamenta simplicia ut agaricum colocynth. turbith. unâ decoqui, quin & semen carthami, femina, brassicam marinam, & quæcunque serosa excrementa, vel pituitam trahunt. Huius vero ratio est, quòd compositiones illarum cum sint spissæ, spissam injectionem effecerunt, atque minùs permeabilem per meatus illos spongiosos & ossa spongiosa, imò magis nares obstru-

*Quæ ma-
gna à Rom-
del. proba-
tur.*

rent & respirationem impedirent. Multò magis probam errhina ex succis herbarum pituitam trahentium, qualia sunt ex succo anagallidis parata, succo cicla, maioranæ in vino & melle, vel succo ciclamini, aut cucumeris sylvestris hoc modo.

R. succi cicla, anagal. depuratorum ana ʒ. iij. vini albi ʒ. iij. mel. ʒ. ij. hæc propter consuetudinem, parvam vini quantitatem recipiunt, ne augeatur moles, atq; ita vis succorum minuatur. Ponitur autem vel ad penetrationem, vel ad molem augendâ, & succorum acrimoniam minuendam. Fortiora sient hæc errhina, si succi fortiores melle tantum excipiantur, & ad opiatæ consistentiam

reducantur: quæ ut efficaciora sint, addimus diagredium aut agaricum, aut colocynthidem, aut veratrum, quando opus est, modò nulla sit exulceratio, aut sanguinis fluxus, in quo nunquam tali errhino utendum est. Errhina autem sic parata digito immittuntur in nares, ut diutius naribus inhæreant, & potentiùs trahant. Non enim impediunt respirationem, hoc modo.

R. succi cucumer. asinini, aut ciclæ, aut mercur. aut ciclamini. (Eius enim succus potentissimus est, ita ut in omnibus addi possit) \mathfrak{z} .ij. agar. troc. \mathfrak{z} .ij. vini parum, fiat decoctio, quæ transcolentur, in colatura diss. mel. q. s. ad inspissationem, aut mel in decoctione ponatur sine vino contritumque sit agaricum & decoquantur simul. Decoctio inspissetur ad mellis consistentiam. Sin medicamentum maiorem desideret coctionem, ut radix pyretri & veratri, decoquendi primum erunt cum vino & melle, ne si diutius decoqui cogantur succi, vires suas diuturna illa decoctione amittant.

Errhina ad bilem purgandam.

SI quis ad purgandam bilem errhina præparet, addat succum ros. aut syr. ex infusione ros. aut parum diagredij hoc modo.

R. succi rosar. \mathfrak{z} .ss. diagred. \mathfrak{z} .j. mellis parum misce. Si nimium liquida sint, adde ad inspissationem farinæ lupinorum parum aut hord. aut orobi. Si autem ex syr. ros. laxatiuo parare velis, mel erit superfluum, propter saccharum quod est in syrupo. Additur autem mel non solum propter deterfionem, sed ut parti adhærere faciat medicamenta: habet enim lentorem quendam: habet etiam saccharum coctum. Eadem erit obseruanda diagredij proportio, nisi potentiùs trahere velimus. Tunc enim augere poterimus dosim diagredij à \mathfrak{z} .ij. ad \mathfrak{z} .iij. Si dolor huiusmodi medicamentis acerbis excitetur, lac mulsum iniiciemus, deterfis primùm naribus aqua valida, vel oleo rosato. Si verò calor sentiatur, aqua frigida, vel ros. vel plantaginis, vel vnguento albo Ras. intemperiem illam calidam castigabimus.

Errhina ad melancholiam.

SI ad melancholiam parentur errhina, pituitam purgantibus medicamentis, adiungemus medicamenta melan-

melancholiam purgantia, puta senam, polypod. thymū, epirhymū, & veratrum: ita fiet errhinum ad affectus melancholicos, in quibus cerebrum est læsum.

Errhina detergentia.

Errhina detergentia sunt, aut ad deterfionem recrementorum in offe spongioso retentorum, aut congestorū in ea parte, ratione alicuius vlceris, vt dictū est. Si recrementa pituitosa detergentia sunt, vsurpabimus quæ præscripta sunt ad euacuationē, laxatium quantitate diminuta, & aucto melle. Commodè autē sunt, aucta vini quantitate. Nam detergentia vt ænomeli, & hydromel. vel decoctum hordei cum paucō melle sufficient.

Errhinum detergens pituitum.

℞. hord. integri p. j. lentium, vel lupinorum p. ℥. marubij aut puleg. M. j. sãmpluci M. ℥. fiat decoctio in ℔. j. diss. mel. anthos. vel squil. an. quar. ℥. vel singulorum qr. j. misceantur: deinde attrahantur per nares.

Paratur etiam ex succis, vino albo, & melle, vt

℞. succi anag. aut ciclae, aut ciclamini qr. j. vini albi ℔. ℥. mel. anthos. ℥. iij. fiat caputpurg.

Ad vlceris erosioni deterfionem.

Ad recrementorum vlceris deterfionem sunt iniectiones ex leuiter detergentibus, sine morfu, quæ etsi frigiditatem aliquam habeant, & leuem constringēdi vim, ideo reiicienda non sunt. Pars enim frigida & sicca constitutione est naturali: vnde etiam similibus conseruanda, & vlcus exiccandum. Astringentia autē quia resiceant, & vlceris dilatationem impediunt, vsui sunt. Solent enim vlcera depascentia esse, aut virulenta, aut cum quadam carnis supercrescentia laxa, vt in Ozena, Polypo vlcerato. Præterea iam satis patens est vlcus, neque potest tenuis illa astrictio recremēta retinere. Mitiora sunt ex decoctionis hordei ℔. j. & ℥. ij. vel iij. mel. ros. colati quod detergit, & constringit leuiter. Si maior requiratur astrictio, syrupum de rosis siccis addimus. Refrigerat enim, exiccat, detergit, & astringit. Aut parabitur decoctio ex herbis amaris, aut summitatibus arborum. Amara enim illa & vtcunque astringentia, mirum in modum conueniunt in istis vlceribus, veluti quæ parantur ex summitatibus myrthi, olea pyri syl-

vestris, rubi, oxiacanthæ, aut quercus, additis cæterach, plantagine, agrimonia. Nonnunquam etiam prætermittenda nō sunt putamina malorū punicorum, quæ *psidia* Græcè dicuntur, quia detergunt, & vlcera maligna curant. Liciū, balauſtia eadem ratione conueniunt. Additur etiā frequēter vinum malorum granatorum acidorum.

Ad vlcera narium detergenda & exiccanda.

℞. summitatum myrthi, vel lentisci M. j. malorum punicorum integr. immatur. contus. nūme. ij. fiat decoctio cum aqua & vino, si non adſit inflammatio: quæ ſi adſit, cum aceto contundantur, deinde fortiter exprimantur, colaturæ addo mel. roſa. colati ℥. iiij. errhinum, quo vtatur in tumoribus & vlceribus malignis potiſſimum narium.

Poſſunt etiam fieri errhina vlceribus malignis curandis, ex ſuccis plantag. ſolani, roſ. dilutis in vino albo, aut vino malorum granatorum, diminuta tamen mel. quantitate, & aſtrictoria facultate auſta. Sin vlcus fuerit cum carnis ſupercrescentia, aut polypo, aut carne putrida, diſſoluatur omphacium paratum in vaſe æneo (acquirat enim quandam æruginem, quæ arrodendi vim habet) auſta vel diminuta quantitate, veluti ſenſus partis, ac magnitudo ſeu præſtantia, ſeu morbus poſtulat. Detergit enim & carnē minuit. Aqua etiam fortis vulgo appellata temperata attrahitur, aut penicillo immittitur, ne partem ſanam vrat. Vtile autem erit cum medicamentis iſtis acribus, & multum detergentibus vtimur, os plenum aqua habere ne in os eorū aliquid elaboratur, aut ſi delabatur, exceptum aqua vires amittat.

Ad fœtorem narium.

AD fœtorem nariū errhina parantur, quibus vtimur poſt errhina detergentia ſupradicta, deinde ex ſucco roſ. vel ex ſucco ſampli. aut alio ſucco odorato, aut aqua odorata. Sunt autem paranda liquida, vel ſpiſſa. Vt ℞. ſucci roſ. vel maioranæ ℥. ij. aquæ roſ. vel aquæ florum aranciorum, vel aquæ myrthi ℥. j. mel. roſ. colati ad adhæſionem, parum, vel adde modicum gummi tragac. & arab. ad inſpiſſationem, naribus admoueantur. Quod ſi fœtor narium ſit cum vlcere, ex ſucco roſ. tantum, & aqua roſ. vel aqua myrthi parari debet. Si verò

à nimia

à nimia humiditate, aqua ex floribus citri, succus maloranz, & alia calidiora sunt vsurpanda. Sed quia liquida facile effluunt, & diu retineri nō possunt, satius erit spissa reddere, vt diu retineantur. Fiunt autem spissa, longa decoctione, melle, vel mucilagine aliqua, vt cidoniorum, gummi tragac, vel arabici: aut fiat ex rebus consistentiam habentibus, vt styriace diluto pauco oleo, musto, vel amurca, dissolue in melle. Et hastenus de his, quæ per nares, & os assumuntur: nūc verò de medicamentis, quæ in ventriculū per os ingeruntur & immittuntur.

D Syrupis & decoctis.

Medicamenta ea quæ per os in ventrē iniiciuntur, aut alterantia sunt, aut cōcoquentia, aut laxantia, aut corroborantia partium internarum, aut obstructiones soluentia, aut obstruentia, & constringentia, aut in-
crassantia, aut cientia vrinas, menses, sudores. Alterantia autē medicamēta parantur, vel ad humores, vel ad partes, vel ad humores & partes simul. Ad humorum alterationem seruantur syrupi, in officinis parati, & aquæ distillatæ, & sunt decocta ad syruporum dissolutionem.

De Syrupis alterantibus.

Primū igitur de syrupis humores alterantibus agemus: deinde reliqua persequemur. Multi verò sunt syrupi à veteribus compositis, quibus sine delectu, & intempestiue vtuntur medici huius temporis, quia illorum facultates titulo tenus cognouerunt. Quare nos in proprias classes, vt nullo eorum sit confusio, eos hoc modo distribuemus.

Primū syrupos calfacientes cum quadam humiditate, qualis est syr. de borrag. vel syr. de bugloss. conueniunt, vbi decoquendus est humor melancholicus. Deinde sequuntur syrupi leni attenuatione modicè calfacientes, qualis est syrup. de capil. quo vtimur in febribus quotidianis, & omnibus aliis, in quibus obstructiones sunt mediocres, etiam si sit fluxus ventris, quia pectoralis, sedans quoq; sitim in febribus ab obstructione. Alij sunt cum maiori caliditate & alteratione calfacientes, ex quorum numero est de bizantiis, qui post syrupum de capil. vener. dari potest. Valet etiam in compositis & spuris febribus, & morbis qui ab hepatis, & lienis

Syrupi cōcoq. melācholicam. Ad obstructiones & febres quotidian.

Bizantijs.

Incident. obstructionibus oriuntur. Præterea alij sunt, qui amplio-
attenuant. re etiam attenuatione calfaciunt, vt est de quinque ra-
dic. dic. stechade, de arthem. de prassio, quo vrimur in ma-
detergentes. ximis obstructionibus, & quibus lentus humor deter-
 gendus & attenuandus, vt in capitis, & articulorum af-
 fectibus frigidis, qui sine fluxione sunt & febre. Hi enim

Des. radi- omnes incidunt, attenuant, & detergunt. Alij autem sunt
cibus. syrupi cum quadam aperiōne calfacientes, vt syrupus

De eupat- de quinq. radicibus. Alij cum quadam aperiōne & cor-
torio. roboratōne hepatis, vt de Eupatorio, & omnes alij, qui
 ex aperiētibz, permixtis astringentibus aliquibus ad

De mēta. hepar determinatis, vt syrupus de absynthio, ex nostra
 descriptione. Alij autem calfaciunt cum leui astrictio-
 ne, vt syrupus de menta, aut cum astrictione & deterfio-
 ne, vt syrupus de absynthio.

Violatus.

Refrigerantes.

de succo **D**iuidentur præterea in frigidos, quorum alij refri-
cucurbita. gerant & humectant, vt syrupus violatus, de succo
Endiuia cucurbitæ, qui omnes conueniunt sitī, & febribus he-
simplex. cticis, item calidis inflammationibus thoracis. Alij re-
Endiuia frigerant, leuiter detergunt, & aperiunt, vt syrupus endi-
comp. ace- uix simplex. Alij potentiū refrigerant, & leuiter ape-
ros. riunt, vt syrupus endiuix compositus, acetos simplex &
simpl. cō- compositus. Alij refrigerant & exiccant, vt syrupus de
pos. nenuphare, de papauere, qui sistant defluxiones & reti-
De nen- neant, dolores etiam soluant stupefaciendo. Alij refrige-
nuph. rant, & siccant cum manifesta astrictione, vt de rosīs sic-
papauere. cis, & myrthinus. Alij refrigerant cum attenuatione, vt
De ros sic- de acetositatē citri, de succo acetosæ & de omphacio, v-
cis, myrth. tiles ad refrigerandum in febribus putridis vel quando
De acetos. aperiendum est & refrigerandum. Alij refrigerant & a-
citri de stringunt, vt syr. myrthinus, & de coroneis. Alij refrige-
succo ace- rant & detergunt serosa recrementa, vt syr. de fumaria
rosa. simpl. & compos. detergit enim & laxat, de quo suo loco
De om- dicemus.

phacio. Diuidimus & in syr. laxantes leniendo, vt syr. viola-
Myrthini. ceus, ex multis infusionibus. In laxantibus constringendo,
citon. vt syr. rosarum laxatiuus, syr. de brionia, de cheiri, de ab-
De fama- synthio, de cichoreo, cū rabarbaro, de fumaria, cōposito,
ria. vel de epithymo, qui purgat humores melancholicos.

Incrassan-

Incrassantes.

Duidimus etiam in syrupos incrassantes, & sisten- *De hyssopo de iuiubis.*
tes defluxiones, vt est syr. de hyssopo, qui modicè id
efficit: Syr. de iuiubis, qui id præstat manifestè: syr. de
papauere, qui magis manifestè. In syrupos contraria fa-
cultate præditos, id est, qui fluxiones detergunt, & expe-
ctorant, vt est syr. de glycir. de prassio, de acetositate ci- *Deter-*
tri, & de omphacio. *gentes & expect.*

Syrupi partibus determinati, & pectori.

Sunt etiam syr. ad partes determinati, vt ad thora-
cem syrup. capi. ven. viol. de glycir. de hyss. de prass.
Vel incrassantes, & attenuantes, vt de iuiubis. Quòd si
astringendum, vt in sputo sanguinis, syr. de ros. siccis,
myrthiauis aliis præponitur.

Syrupi Ventriculo conuenientes.

Ad ventriculum referuntur, qui modicè calfaciunt
cum quadam astrictione, vt de menta, de absyn-
thio, conseruationis cortic. citri, conseruationis cortic.
myrobal. sine cassia conditi sint.

Spleni & hepatis.

Spleni aperientes conueniunt syr. & minùs astringen-
tes. Hepati verò minùs aperientes, & maiòri astri-
ctione præditi. Omnes præterea syr. qui acerum reci-
piunt, magisque calfaciunt, & attenuant, spleni aptio-
res sunt, quàm hepatis, ob humorem melancholicum
crassum, & terreum, quem continet.

Vtero & capiti.

Ad vterum syr. incidentes & attenuantes referun-
tur, vt de arthemif. de stech. de pass. Item qui para-
tur sine aceto ad obstructions, vt de duabus radic. cum
scirrhis & obstructionibus vterus laborat, si mouendi
sint menses & obstructio auferenda. Ad caput idem re-
feruntur, qui ad vterum, sed primus syr. de stechad. de-
inde syr. de prass. postremo de arthemif. nihil enim est
in eo, quod cerebro noceat, maxime cum humorem
crassum attenuare volumus & exiccare.

C O R D I.

Ad cor referuntur, qui succo melancholico coque-
do sunt determinati, paranturque ex modicè cal-
facientibus & temperatis, qualis est syr. de borrag. de

buglos. de pomis redolentibus & acetositate citri: quorum hi duo refrigerant, illi calfacere dicuntur. Porro Medicus volens refrigerare, calfacere, humectare, & siccare, vnum ex istis colligere. Considerandum autem, quid cum illa calfactione faciendum sit, laxandumne an constringendum, veluti si quis refrigerare volens & constringere, pro syr. de cotoneis, & myrtil. usurpet violaceum, is maxime peccet. In febribus ergo, in quibus est maxima ventris constipatio, syrupi lenientes alium usurpandi sunt potius, quam qui refrigerando astringunt. Itaque cum syrupos calfacientes, siue refrigerantes, volumus eligere, curandum est, ut cum parte inflammata, aut cum ea quæ materiam continent, conueniãt, veluti si affectus sit in thorace, & aliquid sit educendũ, syrupum capill. ven. vel viol. vel de liquir. usurpamus, quemadmodum cum calfacere ventriculum volumus, syrupum de menta, qui cum leui astringitione calfacit. Vel syr. de hyss. qui calfacit, & leuiter deterget, eligemus. Quod si singuli syr. ea quæ necessaria sunt, non præstent, additur alius quidam, veluti si ad expectorationem præscribatur syr. capil. ven. adiungatur de glycir. vel parũ mell. vel decoctum passul. vt liquir. Si bilis ab hepate educenda, citra eius debilitatem syr. de cichor. vel endiuiz compositus rhab. additur. Sic itaque syrupi determinati sunt vnicuique parti & causz.

Syrupi proprij de fluxionibus.

DEffusiones sistant syrupi refrigerantes, & incrassantes. Quod si defluant ad thoracem, syr. de papauere, de iuiubis, cum ad alias partes, syrupis frigidis & resiccantibus, vt est syr. de ros. siccis, de myrtho, & aliis ne laxetur ventriculus.

Humoribus & partibus simul conuenientes.

Humoribus & partibus simul conueniunt, qui medijs sunt, vel minùs proprijs, vel alicui parti ascripti cum aquis distillatis, herbarum decoctis: Veluti sunt syrupi apti capiti, qui omnes sũt, syr. capil. ven. viol. Vel eidem pituitæ excernendæ sumptis hyeme, aut alio tempore, quo non licet alias herbas habere aquis distillatis, calfacientibus, & exiccantibus sine manifesta astringitione, vt aqua hyss. beton. organi, calaminthæ, vel prassij.

Apti capiti.

præstij. Aut si liceat herbas ipsas habere, decoctum earundem, & illud & præstantius est.

Partibus thoracis, & pituita detergenda.

THoraci & pituitæ detergendæ & incidendæ, eorum, *Deter. & incidunt.*
quæ pulmoni magis convenire videntur, syropos
determinant, ut endivia, enula campan. vngula caball.
radix peoniæ, decoctum liquir. pass. ficuum. Si verò ma- *Inspissant & detergunt.*
teria inflammationem pariat, sitque tenuis, ut iam fluat,
sumenda sunt, quæ inspissant, & leuiter detergunt, ut
initio pleuritidis, catarrhi tenuis, peripneumonix, ut a-
qua hordei mundati, violarum, vel buglossi.

Quod si materia iam defluerit, sitque expectoranda, *Humida*
supradictis attenuantibus adduntur humida, quæ horum *ad expe-*
ficcitatē tēperant, ne pituita exiecerurita, remaneatque *toranda.*
indurata in pulmonibus, ut sunt violæ, & earum deco-
ctum, semina quæ frigida maiora, semina bombacis,
mal. & pass. quæ omnia supradictis attenuantibus addi
possunt. Detergunt & inspissant iuiubæ, decoctum hor- *Deterget. inspissant.*
dei mundati, sebesten, semen papaveris cum liquirit. sa.
pa, sacch. & mel, diachodium, vel syr. de papauere.

Ad pituitam Ventriculi præparandam.

Ventriculo conveniunt, quæ calfaciunt, & leuiter
constringunt, aut quæ modicè refrigerant, & astringunt. Cum autem pituita præparanda est, aut educenda, absynthio prohibet uti Galen. & aliis astringentibus, ne pituita magis inculcetur. Ergo eligenda minus *Calfac. & con-*
astringentia, quàm absynthium, ut beton. menta, hyss. *string.*
origanum, aut aqua absynth. fœniculi, apium. Sin nullo
la supersit materia, ut plerūque contingit post magnam
vomitionem aut fluxum ventris, medicamenta satis a-
stringentia ponuntur, & assumuntur ad ventriculi la-
xati coniunctiōem.

Hepatici.

Hepati conveniunt leuiter detergentes, quales sunt
Hæquæ vel decoctiones, quæ ex herbis amaris com-
ponuntur, astrictionem aliquam habentibus, ut sunt omnes
intybi species, condrylæ, & sonchi. & leuiter ape- *Intybi*
riētes, ut spica nardi, absynthium: aut fortioribus etiam *species.*
aperientibus additis, magis constringentibus, exempli *Capit. &*
gratia, ut syr. capill. ven. magis accommodetur hepati, *Syrup.*

refrigerat enim & leuiter aperit obstructions, dabitur cum aqua endiuæ vel cichor. vt calfaciat autem, & corroboret, cum decoctione absynthij exhibere conuenit.

Splenitici.

Astringentia.

Aqua ferri.

Splenitici fiunt additis attenuantibus & incidentibus decoctis, aquis & aceto in magnis obstructionibus & constringentibus, vbi est inflammatio minuenda, vt aqua portulacæ, ceterach, decoctio scolopendriæ, & foliorum & florum thamarisci, aqua extinctionis ferri. Illa enim splenem minuit constringendo, qui ob cauitatem & laxitatem suam flatus retinere solet, veluti multa alia astringentia, & etiam aperientia quædam, vt est cortex cappar. Spleni etiam accommodantur syrapi additis quæ serofa recrementa, & melancholica expurgant, vt si detur syr. acetos. simpl. syr. viol. bugloss. syr. endiuæ compositus, enulæ campanæ cum decoctione mercuri vel fumariz vel epithymi. Iidem conueniunt hepatri, addito rhab. aut biliosis medicamentis euacuantibus recrementa, quæ in eo solent abundare.

Vterini.

De arthe.

Vtero conueniunt syr. de arthemif de stechade, vel alius extenuans sine aceto paratus, vt de prassio, quia quis vterinis determinatur. Sunt autem vterina, quæ fiunt ex his herbis omnibus, ex quibus conficitur syr. de arthem. hoc autem vtimur in affectibus frigidis, & humidis duntaxat, & cum menses mouere, & refrigeratum ad concoctionem præparare volumus. In calidis vero affectibus, & vlcerationibus, & fluxionibus muliebribus, quia ad partem affectam excremēta attenuata deducunt, ab eis abstinendum est. Ad calfaciendum vero & extenuandum solo syr. de stechade vtimur, additis paucis, vel melle. Ad deterfionem vero vteri syr. de hyss. de glyc. cum aqua arthemif. vel hyss. vel matric. datur ad vlceris deterfionem cum decocto hordei, vel cichor. vel agrimoniz, vel plantaginis.

Syr. ad Vesicam.

Vesicæ accommodantur omnes syr. sine aceto parati. Cum vero aperiendum est & incidendum, aperiētib, incidentibus, & attenuantibus vtendum. Cum autem magna vrget necessitas, etiam syrupis fortiter aperiētib, & oxymelite vtimur, quia vis aceti iam cuius est, antequam ad partem affectam perueniant, & puita

tuita crassa ac lenta, aceti acrimoniam retundit, vt cum calculum in vrerere retentum à pituita propellere volumus, oxymel. simpl. vel diuretico, squillitico vtimur, alioqui nunquam : quoniam acetum non minùs aduersatur vesicæ, quàm vtero, & fortè magis.

Syr. ad articulos.

Articulis proprios nullos facimus syr. sed potius humori deferenti, aut defluxo. Si interdum syr. de stechade, & similes dentur, qui nervos ù affectibus còuenire videntur, non propter nervos, sed propter pituitam illic contentam magis exhibentur. Magna enim est adhibenda diligentia, vt in affectibus articulorum conuenientes syr. præscribantur: quod facilius fiet considerata materia, nempe an calida sit an frigida, an propter defluxionem, vel decubitù, id est, sensim citra defluxionem fuerit pituitosus, neque attenuâtia, neque multùm calida, neque nimium detergentia syr. sunt adiungenda. Ea enim calida omnia defluxionem augent, neque danda sunt, donec còstituerit defluxio, aut absumenda sit in parte materia. Eligantur itaque syr. resiccantes & leuiter astringentes vt syr. de ros. siccis, aut myrthinus. Ad calidum verò & tenuem humorem syr. de papaue. de iuiub. vsurpandi sunt, cum decoctionibus & aquis leuiter astringentibus, & inspissantibus. Ad humorem verò sensim in parte collectu syr. de stech. mel. squillit. & oxym. cum decoctione siluæ, arteriæ, puleg. vel beto. præscribimus : quia nihil est periculi defluxionem ad partem affectam facere, sed tantum, quod in parte est infixum, attenuare ad faciliorem concoctionem, & digestionem, vel consumptionem in parte.

Ad sitim sedandam.

AD sitim sedandam syr. vtimur in febribus & aliis affectibus, in quibus sitis iuncta est, in quibus parâdis cura adhibenda. Nam si febris acris est & ardens citra magnas obstructions, syr. viol. quia refrigerat & humectat, cum multa aqua datur : Sin cum obstructione & materia pituitosa, syr. acetos. simpl. vel syr. capil. vener. eligendus est. In siti autem restringenda omnes alios syr. nimium medicamentosos à cibo & potu negligimus : quanquam in digestiuis, aliisque potionibus

imperantur, quia quæ ad sitim sedandam frequenter assumuntur, grata esse debent. Digestiui verò simul assumuntur, ideò non tantum curamus de gratia. Syrup. de acet. citri in pestiferis præscribitur, in ardentibus & malignis febribus biliosis, & sanguineis, ex aqua rosarum & sacchar. fit iulep, Alexandrinum vulgò vocatum. Aut ex aqua viol. bugl. & ros. in hæcticis febribus & aliis morbis siccioribus oxysacchar. pro syr. acet. simpl. datur. Vbi refrigerandum & astringendum est, vt in cholera morbo, & fluxu ventris, syr. de ros. siccis cum multa aqua, qui etsi sit siccus, & astringens, vt retineatur, cum aqua datur. Hæc de syrupis in officinis paratis, nunc de syruporum tam simplicium, quam compositorum materia, & cõpositione aliquid dicamus, vt possit medicus in quouis loco caussis singulis, & partibus aptos parare & præscribere.

De syruporum materia.

Componuntur autem syr. ad refrigerandum ex frigidis, ad calfaciendum ex calidis, ad humectandum ex humidis, ad siccandum ex siccis, ad aperiendum ex his, quæ obstructionem auferunt: aut ad obstruendum ex obstruentibus, ad laxandum ex laxantibus, ad constringendum ex constringentibus, ad mouendas vrinas ex cientibus vrinas, ad mouèdos menses ex cientibus menses, ad aquas ex aquas ducentibus, ad euacuationem bilis atræ ex melancholiam purgantibus, ad flauæ euacuationem ex flauam bilem agentibus, ad pituitæ expectorationem ex expectorantibus, ad vomitus ciendos ex vomitione prouocantibus, aut compescèdos ex roborantibus ventriculum. Item ad partes vt pulmones, ventriculum, hepar, lienem, aliàsque partes valde remotas, ad quas medicamenta spissa peruenire non possunt, calfaciendas, refrigerandas, humectandas, siccandas, laxandas, constringendas, corroborandasque. Fiunt autem ex decoctione herbarum, aut radicibus, fructibus, seminibus floribus, & aliis quibusdam, quæ decoqui possunt, quæque vim in decoctione deponere possunt.

De aqua.

ELigantur herbæ fini, quem querimus, respondentes. Decoquantur in aqua, cui additur ad conseruationem

nem mel, saccharum aut sapa: vinum verò aut acerum ad meliorem actionem. Aqua igitur illa eligatur, quæ *Aqua optima.* fit tenuium partium siue attenuandum sit, siue aperientum, siue calfaciendum. Ea autè est aqua pluuiæ, secundo loco fluuiatilis, tertio fontana, quarto putei. Ea autem optima est, quæ citò descendit per hypochondria, cuiusmodi est illa quæ est tenuium partium: quod facile apprehenditur, si citò cale scat, aut refrigescat, non autem pondere, vt vulgus existimat. Plurimum etiam refert, ex qua aqua medicamèta componantur, ynde Galen lib. *cata topus* rationem componendi diacodium docens, aquam pluuiam cæteris prætulit, cuius quantitas pro herbarum, radicum, & earum rerum, quæ decoqui debent, ac medicamentorù præparandorum quantitate sumi debet. Plurimæ herbæ, nisi adsit magna aquæ quantitas, citra vstionem decoqui non possunt. Augetur autem aquæ quantitas, cum diutius simplicia decoquenda, aut nimium amara, & infusio prius facienda. Nam radices, & quæ infunduntur, aquæ quantitatem maiorem expostulant, cum diutius decoquenda sunt. Satiùs ergo fuerit pharmacopei iudicio relinquere, ac dicere, quantum sufficit nulla quantitate expressa.

De saccharo & melle.

Saccharum, mel, sapa, per se miscentur aquæ, interdum saccharum & mel, & sapa, nec his contenti veteres admiscuerunt penidias, male tamen, vt suo loco docebimus. Ex melle parantur syrupi, qui ad pituitæ deterfionem, aut pectus, aut cerebrum refrigerandum confici solent. Magis enim incidit, calfacit, & excretionem mouet reliquis syrupis: vt syrupus de stechade, de arthemisia ab antiquis parati. Interdum ex sapa parantur medicamenta, quæ non inspissata diuturna decoctione syrupis respondent, inspissata verò eclegmatis, maximè autem cum pituita detergenda est, *Quomodo ex melle parandi.* aut expectoranda, aut sistenda, vt Galenus ipse fecit, *ex sapa,* quando parauit diacodium ad sistendas fluxiones ex sapa: Minus enim defluxiones mouet, quàm mel, tum quia minus est acris, tum quia astrictionem quandam habet, minùsque detergit. Quæ enim deterguant, multum fluxionem excitant. Saccharum autem syrupis

admiscetur aliarum partium, aliorumque humorum. Horum quantitas augetur aut minuitur pro quantitate decoctionis usurpandæ, aut pro sapore, aut quando diutius sunt conseruandi syr. aut gratiores parandi, exempli gratia: Decoctum rerum dulcium aut insipidarum paruum quantitate saccha. desiderat: syru. verò amari aut qui diutius conseruandi, maiorem. Sic etiam succis magna ex parte plus sacch. quàm decoctionibus miscetur, quia succus efficacior est decocto, faciliq; putrescit. Ad eius ergo conseruationem maior quantitas sacch. quàm mel. requiritur. Sic syr. de bugl. ex lb. iij. de succo bugl. ex lb. 3. sacchari paratur. Syr. de limonibus, quia magis acidus est & efficacior, ex lb. 1. lb. succi limonum ex lb. 3 sacchari. Syrup. ex æquis partibus fiunt, vt syrupus ex infusione florum nymphæ, florum lb. 2. recipit, & sacchar. lb. 2. In syr. ex multis infusionibus ros. & viol. succus libra vna quantitate sacchari superat. Recipiunt enim infusionis lb. 5. saccha. lb. 4. Syru. ex multis infusionibus sacchari quantitate maiorem recipit, ne perdat vis laxatoria. Succorum apij, & fœnic. lb. 4. sacch lb. 4. desiderant, maximè si acetum addatur. Sed hæc satis de mellis & sacchari quantitate.

De vino & aceto.

Vinum & acetum syr. adduntur humorum attenuandorum causa, aut vt medicamentum penetret. Vinum album in mulieribus, in viris acetum, nisi vehemens sit dolor, aut nimius sensus in intestinis.

Succi cydoniorum.

Succi cydoniorum & prunorum frequentissimè adduntur syrupis, ad ventriculi corroboracionem, refrigeracionem, laxacionem, constrictionem, ad calfaciendas partes, aut refrigerandas, siccandas, aut humectandas. Facile parantur syrupi ex succo, & decoctione earum, quas eiusmodi rebus faciendis accommodatas speramus.

De syrupis compositis.

Compositi syrupi parantur in morbis compositis, aut in complexu multorum affectuum, iisque vtendum post vniuersalem aliquam euacuationem, veluti post sanguinis missionem, aut medicamentum purgans, aut
in de-

in declinatione febrium, aut cum partim per vrinas, partim per secessum trahere volumus. Fiunt autem ex herbis, fructibus, floribus, radicibus, seminibus, herbis supra enumeratis, non sine delectu. Nam si febris adhuc ægrum infestet, sitque biliosa, habeatque aliquas obstructions, non omnes radices, aut herbæ sumendæ, sed hæc duntaxat, quæ citra calfactionē obstructions aperiunt, recrementa purgant per apertas regiones citra partis allicuius dissolutionem.

Syrupus ad febres biliosas & Vrinas ciendas.

℞ rad. gram. vel asparag. vel acetos. vel plantag. vel cichor. ʒ. j. vel vnus horum ʒ. ij. vel si omnes ponantur ʒ. ʒ. scariol. cichor. bugloss. borrag. rostri porcini, dentis leonis, & herbarum capil. an. M. j. qu. seminū frigid maior. an. ʒ. ʒ. semin. apij, petros anisi an. ʒ. ʒ. flor. trium cord. an. p. j. fiat decoctio & in lb. j. ʒ. diss. syr. acetos. simpl. ʒ. iij. sacchari q. s. misce, fiat syr. Si velis, ʒ. j. triasand. aut diarrhodi abb. arom. Si verò radices temperantur in aceto, non est necesse syrupum acetos. simpl. apponere, gratior tamen erit cum syr. Magis mouendis vrinis, quàm aluo ducendæ conuenit, & ob id maiorem radicum aperientium quantitatem, & quatuor semina maiora recipit.

Ad laxandum Ventrem.

SI quis itaque ventrem laxare velit, adiunget ea potissimum medicamenta, quæ humorem abundantem laxare possunt, vt si pituita euacuanda sit, plures ficus & passulæ addendæ sunt, sin bilis, pruna & sebesten admiscenda, & eorum numerus augendus, neque prætermittendi tamarindi, aut rhabarbarum, pro ditioribus: pro pauperibus, succus ros. aut syr. ex infusione ros. rhabarbari loco. In fine decoctionis vel clarificationis rhabar. ponitur, quia non decoquitur.

Si verò pituita educenda, aut obstructions soluendæ, semen carthami ad ʒ. ij. additur, & agaricum pro minùs delicatis, refrigeratis magisque pituitosis: Polypodium, fena, epithymus, & semen cuscutæ pro melancholicis. Herba verò mercurialis pro omnibus, nisi venter valde affectus sit.

Ad refrigerandam & euacuandam bilem.

Refrigerans & euacuans bilem hoc modo paratur.
 ℞. rad. cichor. ʒ. j. glyci. raf. ʒ. ij. cichor. scariol. bu
 gloss. borrag. rostri porc. id est, sonchi, dentis leonis ana
 j. prunorum, sebest. an. pa. xx. pass. p. x. anis. ʒ. ij. tamarin-
 do. electorum ʒ. j. senæ orient. medullæ femin. cartha. a-
 na ʒ. iij. flor. trisū cord. p. j. fiat decoctio & in tb. β. sacch.
 q. s. fiat syr. addendo post clarificationem, vel in ipsa cla-
 rificatione succi ros. ʒ. ij. velsy. ex infu. ros. ʒ. iij. cinamo-
 mi ʒ. ij. misce. fiat syr. Quod si pro diuite fuerit, vel de-
 licato, vel moroso, aromatisetur vt gratioꝝ palato fiat,
 & vt efficacior sit, minusque ventriculū lædat, aut a-
 liam partem. Aromatisetur itaque syrupis odoratis &
 gratioꝝ medicamentis.

Contra igitur institutum faciunt, qui corallum tem-
 perant in clarificatione, cūm omnis odoris & saporis
 sit expers. Neque minus peccant, quia tragacanthū fri-
 gidum iniiciunt, aut lignum aloes, aut myrrham. Rhab.
 in aromatisatione additur, non propter odorem iucun-
 dum, aut saporem, sed quia ipsum decoqui nolumus, ne
 vim suam laxatiuam perdat, aut vim suam astringendi
 remittat, maiorque tum cinamo. quantitas additur, vt
 illius odor offuscetur. Idem est de agarico iudicium, cu-
 ius gratia zinziber addimus, & alia odorata.

*Modus ex-
 hibend. a-
 pud maio-
 res.*

Maiores nostri sine aromatisatione solebant syropos
 simpl. & compositos propinare, sed post syrupi assu-
 mptionem tabellam vnā alicuius electuarij imperabāt,
 vt triasandali, diatrag. frig. diagal. quod etiam & nunc
 fieri deberet.

Obseruandum est hunc syrupum aperientibus radi-
 cibus carere, quia in morbis, qui fiunt sine obstructio-
 nis suspitione, datur, aut post vsum syruporum ape-
 rientium obstructionem vesicæ, fellis, venarum mela-
 raicarum, & meatuum, per quos bilis ē venis, & ab he-
 pate trahenda est. Et componitur ex intybi speciebus,
 quæ aquea quadam substantia refrigerant ventriculū,
 & hepar: amarore verò quodam detergunt, & astrictio-
 ne leui partem, in qua maximè abundat bilis, roborant.
 Minori quantitate additur radix glycir. quā si pituita
 educenda fuisset, aut obstructio auferenda, quia derer-

*Quid ob-
 seruandum
 in hoc sy-
 rupo.*

git, &

git, & aliorum amarorem cum saccharo temperat. Fructus item maiori quantitate additi sunt, quo bilis acrimoniam exinguant, & purgent, ut pruna, sebest. pass. tamarindi. Passulæ verò minori quantitate, quia dulces cum sint, hepatis substantiam corroborant, maxime quæ mundatæ non sunt, sed cum gigartis impositæ. Anisi 3. ii. iniecimus, non addito fœniculo, quia acrius est aniso, quod est dulce. Imponitur autem propter flatuum diffusionem, & iniici debet quotiescunque aliqua decoctio paratur ex radicibus, fructibus, herbisque humidis. Ea enim omnia flatus gignunt. Quin in medicamentis purgantibus, in his semina odorata adiungi præcipit Hippoc. & quia sena tormina excitare solet in ventre, anisum, fœniculum, aut similia nunquam prætermittere debemus. Addimus etiam semen carthami, & senam, quæ minùs convenire videtur, quod duplici facimus ratione, & quia nullus purus, & syncerus humor in corpore nostro reperitur: & quia bilis, si pituitæ admisceatur, medicamentis biliosis difficillimè trahitur. Sed cum minor quantitas agarici vel medullæ carthami succorosæ vel scammonia adiungitur, multò facilius ea recrementa expurgantur. Huc accedit quòd bilis in corpore nostro non redundat, si quotidie à natura per intestina purgetur. Sed non expurgatur cum vesicula tellis eam bilem ab hepate non trahit propter obstructions, aut cum ad intestina non transmittit. Optima igitur ratione medicamenta pituitosa, quæ purgant, & obstructions aperire creduntur, iniiciemus, qualis est medulla carthami quæ obstructions aperit hepatis, & pituitam mouet: & sena quæ pituitosos humores, & serosos purgat, cum melancholicis. Bilis enim si diutius in corpore remanserit, vertitur in melancholicam. Optimum est igitur senam addere in eiusmodi euacuationibus. Præterea omnia ista medicamenta si biliosis adiungantur, biliosorum medicamentorum naturam induunt, aut operationem iuvant ex Galeni sententia, qui scammono, pituitam purgat addito castoreo. Castoreum enim suo calore liquefaciendo pituitam, efficit ut diagredium melius pituitam purget, quemadmodum in hiera pura, aloë additis attenuantibus.

*Intybus.**i. acinis.**Nullus humor syncerus in corpore.**Cartham.**Sena,*

*Semina
frigida
maiora.*

*Syrupi ro-
sarum la-
nat.*

In hoc syrupo quatuor semina frigida maiora non sunt addita, propter multas causas, nempe quia urinas mouere nolumus: medicamenta enim nimium sicca non sunt, nec nimium calida. His enim de causis quatuor semina frigida maiora addi solent, & quia difficile fuerit simul & semel per urinam, & ventrem humores exacte purgare, alterum enim alteri officit. Ponuntur autem in syrups aperientibus, & mouentibus urinas, in medicamentis pleuriticis, & thoracis ad siccitatem temperandam, ut docuit Gal. *ata topom.* agens de compositione medicamentorum pectoralium veluti si addatur enula campana, iris, hyss. decoct. medicamenta attenuantia, quae calore & siccitate pituitam exiccent in pulmonibus, & expuitioni minimè aptam redderent. Semina item minora addita non sunt, ut sit in syr. alterantibus, quia in hoc syrupo non est necessaria magna astrictio, & magna pars herbarum aliquid astrictionis habet, ut pass. radix cichor. Adde quod aperientia & laxantia multum non recipit hic syrups. Succi autem ros. 3. ij. imperamus, vel syr. ex infusione ros. quia magis liquida liquidis conueniunt, quam terrea, & succus, vel infusio ros. eodem modo laxat, quo & rhab. minus verò constringit. Cinamomi 3. j. addimus. Nam ut in rhab. additur, sic & in hoc medicamento ut astrictionem imminuat, aut ut pituitam incidat. Agaricus in pituitosis additur, zinzib. miscendo parum, ut postea docebimus. Si rhab. addere quis velit, in clarificatione tantum addat, aut diligentissimè tritum, & in panno raro ligatum suspendatur in syr. quod fieri solet ubi syrupum diutius seruare volumus, atque pro syrups ʒ. j. rhab. 3. j. ponitur.

Syrups bilem alterans.

Syrups bilem alterans fiet ex scariola, aut cich. sonchis, lactuca, & aliis frigidis & humidis herbis, aut ablatis supradictis laxantibus fiet alterans. Pruna, sebestem, tamarindi non solum laxant, sed etiam acrimoniam extinguunt refrigerando, ideo syr. & eclegmaris iniici solent. Cum autem alterationis causa ponuntur, minori quantitate id fit, veluti cum suspicio est de fluxu ventris, tunc parabitur sic.

R. scar. lactuca, rostri porc. bugloss. borrag. ana M. j. pruno-

prunorum, sebest. ana pa. v. quatuor semi. frigid. malorum ana 3. ij. anis. 3. j. flo. cord. p. j. fiat decoctio & in tb. j. diss. sacchari q. s. fiat syr. Addi possunt, & syr. parati, ut syrup. de endivia simplex & compos. oxyfacc. & alij refrigerando & humectando bilem immutantes, ut syrup. viol. nenuph. de cucurbita.

Syrupi ad pituitam concoquendam & laxandam.

Syrupi ad concoquendam & laxandam pituitam sunt. Concoquuntur autem & præparantur calidis sine astringione, attenuantibus, incidentibus, & detergentibus. Conficiuntur autem ex radicibus aperientibus communibus, & herbis calidis attenuantibus, & incidentibus & syr. beto.

℞. radic. apij, petro. fœnic. vel graminis, vel asparag. (Radices priores magis calefaciunt, & attenuant, unde si febris non adsit pituitosa, usurpantur, si cum febre, posteriores) hyss. vel betonic. vel marrhub vel puleg. vel calaminth. M. j. Recentes autem esse debent, ne nimium siccant. Si enim siccae sint; satis erit ponere M. ss. Addantur semina frigida maiora ad siccitatem minuendam. Seminis anisi 3. iij. pass. mundatorum, sic. ana pa. xx. florum anthos, stechad. bugl. ss. borrag ana p. j. radic. glycir. 3. j. fiat decoctio & in tb. j. ss. diss. mell. despumati, vel rosati q. s. Aut mediam partem mellis addimus, & tertiam sæpe, si affectus aliquis sit antiquus in thorace, vel à thorace pituita expectoranda. Ex hoc syrupo multi fieri possunt, veluti ad coctionem pituitæ, deterfionem, & expectorationem, aucta tantum detergentium quantitate, & additis feminibus frigidis maioribus hoc modo,

℞. decoctionis præcedentis tb. j. cui adde pass. pa. v. dactylorum mundatorum (si dolor capitis non adsit, dolorem enim solent inducere) pa. vj. quatuor semin. frigid. maior 3. ss. cum melle, saccharo, & sapa fiat syru. ut prius dictum est. Pituita siue in cerebro, siue in thorace, aut ventre semper detergenda est, aut incidenda, nisi multum tenuis sit, & fluat, ut in catarrho, & morbo articulari, in quibus neque multum detergere, neque aliqua parte attenuare pituitam oportet, nisi constiterit de fluxu. Quæ verò in thorace est, expectorantia magis,

quàm incidentia desiderat. Ideoque augetur numerus fructuum, adduntur semina frigida maiora, vt medicamentorũ siccitas minuatur, & ne in thorace pituita retineatur exiccata. Talis syr. pectoralis commodè radice ireos aromatizatur: sin in ventriculo ad pituitam collectam, cinamomo: sin ad pituitam cerebri & neruorum, zinzib. aromatizatur.

Ad pituitam laxandam è thorace.

IN syrupo laxante detergentia pituitam superare debent incidentia. Syrupo igitur pectorali addi imperamus, quæ sequuntur.

℞. Decoctionis superioris ℥b. ij. in quibus decoque polypod. querc. recent. ʒ. j. medullæ seminis carth. contusi ʒ. ij. agarici troc. ʒ. ij. anis. fœniculi ana ʒ. j. fiat decoctio, cui adde mel. viol. vel rosati q. s. fiat syrupus: aromatizatur ʒ. j. zinzib. & ʒ. ij. iridis.

Polypod.

Carthamus.

Que pituita educenda conueniunt.

Bile agitata facilius agitatur pituita.

In hoc syrupo maior quantitas carth. quàm polyp. ponitur, quia polypod. quandam astringentiam habet, & ventriculum lædit. Carthamus autem cum imbecillior sit, & magis conueniat pituitæ euacuandæ, ʒ. ij. pondere ponitur. Agaricus propter amarorem, & satis insignem purgandivim, minori quantitate ponitur. Anisi dosim auximus addito semine fœniculi ob medicamenta laxantia. Prætermisimus autem fructus acidos, veluti pruna, tamarindos, sebesten, & iuiubas, quia incrassant minisque conueniunt in pituitæ educatione. Passulæ & ficus in pituitosis, vt tamarind. pruna, & sebestem in biliosis conueniunt. Hæc omnia decoqui possunt in iure galli antiqui, qui sua facultate nitrosa laxat aluum, cui decocto si addatur sena, efficacius erit. Potest etiam addi succus ros. aut syr. ex infusione ros. ad mouendum aluum. Bile enim agitata multò facilius mouetur pituita, quæ lenta est & admodum tarda, vel quia hic ex incidentibus & detergentibus componitur, quibus si adiungatur, commodè pituitam laxat, solétque illi esse pro vehiculo, & veluti calcar, vt in morbis per fluxionem factis videre est, in quibus etiam quædam bilis apparet. Tunc cinamomum & zinziber in maiori quantitate addi debent, quando syr. ros. vel succus ros. additur. Pituitam enim incisam & attenuatam euacuat, vt superius est

est ostensum. Semina etiam frigida maiora non expun-
ximus, quia siccitatem istorum medicamentorum la-
xantium temperant. & diluendo pituitam magis fluxi-
lem efficiunt. Tenuis enim & aquea substantia, si crassæ
permisceatur, fluxiliorem reddit.

Syrupi ad melancholiam.

AD melancholiæ euacuationem & alterationem sy-
rupi parantur. Quod si ab adustione bilis facta sit,
bilem alterantibus alteratur, & eandem euacuantibus
euacuatur, additis borrag. bugloss. & aliis quibusdam
temperatis, humectantibus, & discutientibus, ut capillis
ven. & aliis herbis capill. quemadmodum si syru. de bu-
gloss. aut borrag. aut decoctio earum herbarum, syru-
pus endiuiz compositus sumatur, medicamentum alte-
rans fiet hoc modo.

℞. endiuiz, scariolæ, bugloss. borrag. viol. lact. port. *Alterans*
ana M. j. pass. ʒ. ij. seminum quat. frig. maiorum ʒ. iij. *melanch.*
flor. cord. p. j. viol. p. ij. fiat decoctio, & in colatura diss. *ab adust.*
sacch. q. s. fiat syr. Fiunt syrupi concoquentes & præpa- *bilis.*
rantes melācholiā, ratione splenis habita, quia in parte
naturaliter cōtinetur melācholia, quæ ex adustione pro-
priè non fit, sed potius quæ ex fece sanguinis provenit.
Fiunt, inquam, ex alterantibus & modicè calfacientibus
cum quadam humiditate, ut ex radicibus communibus,
& cortice radic. cappar. fraxini, thamarisci, genistæ co-
ctis cum seminibus quat. frigidis maioribus, vel syru-
pum de fumoterræ, & borragine permistis. Sed ad syru.
euacuantem melancholiam redeamus. Euacuatur au- *Vacuans*
tem melancholia, ubi syrupo præcedente præparata fue- *melācho-*
rit, syrupo laxante bilem, cuius supra meminimus, addi- *liam.*
tis quibusdam medicamentis melancholicis, qualia sunt
polypod. sena, epithymum, summitates thymi, semen
cuscutz. Cum autem syrupo prædicto, aut syrupo endi-
uiz hæc medicamenta adiunguntur, commodum erit
quædam humida siccitatem eorum temperantia adiun-
gere, qualia sunt quatuor semina frigida maiora, pass.
aut radic. bugl. & glycir. ras. aut fiat hoc modo.

℞. radic. bugloss. glycir. ras. ana ʒ. j. cichor. scariolæ, *Vacuans*
borrag. & bugloss. fumiterræ, viol. mercur. an. M. j. pass. *melācho-*
ʒ. ij. quat. seminum frig. maior. & anis. ana ʒ. iij. senæ *liam.*

orient. polyp. querc. origani, epithymi ana ℥. ij. tamarindorum 3. ss. trium florum cordial. p. ij. misce, fiat decoctio, & in colatura diss. sacch. q. s. cui adde syr. viol. ex multis infusionibus, vel syr. ros. lax. ℥. iiij. aut v. Hic syrupus purgando serosa recrementa biliosa & melancholica morbum melancholicum minuit. Et hoc potissimum obseruandum in syrupis laxantibus & alterantibus melancholiam à quocunque humore adusto factam, ut sit insignis humiditas in eo syrupo. Caliditas verò ad melancholiam quæ citra adustionem facta est: modica refrigeratio ad eam, quæ per adustionem bilis facta est, & ad eam, quæ ex pituita & exiccatione fit. His obseruatis similes syr. parantur facillè ad eos humores adustos. In summa vsurpandi syr. concoquentes materiam, ex cuius adustione facti sunt morbi, & illis quædam adiungenda, quæ humectant in alteratiuo, & quæ laxant melancholiam in laxatiuo, ut in superiore syrupo videre licet, qui magna ex parte alterantibus bilem constat, cui adiungimus bugl. borrag. pass. & alia, quæ modicè calfaciendo & humectando humorem melancholicum alterare possunt. Hæc in syrupo concoctorio. In laxatiuo autem polypod. & senam ad euacuationem adiungimus, & interdum cuscutam & epithymum, & alia fortiora & calida, cum nimiam calfactionem non pertimescimus.

Ad pituitam & stam, aut melancholiam ex pituita or. am.

EAdem ratione syrupos concoctorios & laxantes pituitam vltam, aut melancholiam ex pituitæ adustione factâ & incineratione. paramus. Et quia pituita crassa non multum differt à melancholia, teste Gal. cum id quod tenue est, calore nimio resoluitur, illam tenuem humiditatem amittit, & in atram bilem vertitur: ideo syrupi concoquentes attenuare debent citra magnam caliditatem, & cum aliqua humectatione. Hoc itaque nomine differunt syrupi concoquentes pituitam, à concoquentibus melancholiam ex adustione bilis, quia syrupi concoquentes pituitam, calfaciunt, & non humectant, incidunt, attenuant, & detergunt, & eorû materia erit radix glycir. borrag. rusci, asparag. & herbæ dictæ capil. permixtis seminibus frigidis maioribus. Laxantes autem fient

*Alterans
melanch.
ab adusta
pituita.*

si aga-

si agaricus & medulla seminis carthami misceantur.

℞. rad. bugloss. borrag glycir. raf ana ʒ. j. radic. graminis, asparag. recētis ana ʒ. ij. herbar. capil. M. j. bugl. borrag viol. cham. chamep. vel melis vel marthub an. M. ʒ. passul. mundatarum ʒ. ʒ. quatuor semi. frig. maiorum ʒ. anis. ʒ. ij. florum cham. bugloss borrag. viol. ana p. j. fiat decoctio. & in t̄b. j. diss. sacch. albi q. s. misce, fiat syru. aro. cum ʒ. j. zinzib. & ʒ. j. cinamomi, hic syr. concoctiorius est: fiet autem laxatiuus, si dosis pass. augeatur ad ʒ. ij. quibus adiungi possunt siueus, mere. agaricus, sena, & polypod hoc modo.

Syr. laxans pituitam & melancholiam supradictam.

R. Rad. glyc raf ʒ. j. radic. enulæ cāpanæ ʒ. ʒ. Radices gram. & aspar. prætermitti possunt, sed hic syrupus detur post præcedentem, aut post concoctionem materiæ, sin secus fiat, possunt addi, sed minori quantitate. Nam, uti superius ostensum est, medicamenta aperientia, & vrinas mouentia, non recipiuntur in medicamentis laxantibus, nisi in pauca quantitate, ut scilicet adiuuent actionem medicamenti laxantis: ut nec in concoquentibus passulas addimus in magna quantitate, ne concoctionem perturbent laxando, vel leniendo, sed ut quid obhumectando iuuent humoris præparationem. Prætermittendæ igitur sunt, aut ʒ. ʒ. tantum sumenda addito mercur. M. j. capill. ven. M. ʒ. passul. mundatarum ʒ. ij. sic pa. x. anis. ʒ. j. sem. melon. ʒ. ʒ. medullæ seminis cart. & polyp querc. ana ʒ. ij. agarici ʒ. ij. flor. viol. bugl. borrag genistæ ana p. j. epithymi, cuscutæ ana ʒ. ʒ. fiat decoctio in colat. t̄b. j. ʒ. diss. mel. viol. ʒ. iij. sacchari q. s. fiat syrupus aro. ʒ. j. zinzib. pro quatuor dosibus.

Syr. ad melancholiam è fece sanguinis.

Absolutis syrupis concoquentibus & alterantibus melancholiam ex adustis humoribus ortam, veniendum ad syrupos cōcoquentes, & alterantes humorem melancholicum, qui fex sanguinis dicitur. Præparatur autem ille humor ad euacuationem medicamentis calidis, humidis & aperientibus splenis obstructions, & humoris crassitiem incidentibus. Sunt autem ea, quæ superius recensuimus, ut bugl. borrag. pass. herbæ capill. radic. aperientes, cortex rapic. cappar. flores, folia

& radix thamarisci, & sambuci, enula campana recens data cum violis, species orcheis, behen verum & liquiritia: laxant etiam superius enumerata. Fit autem hoc modo syr. concoctorius.

Syrup. c. concoquens melancholiam precedentem.

℞. Radic. bugloss enulæ camp. liquir. ras. ana ʒ. j. graminis aspar. apij ana ʒ. ʒ. radic. satyr. ʒ. vj. pass. ʒ. j. herbar. capi. viol. melis. cichor. ana M. j. calaminth. chamed. chamepith. ana M. ʒ. quatuor seminum frig. maior. ana ʒ. j. seminis bombacis ʒ. iij. apij, petro. ana ʒ. ij. florum bugloss. borrag. anthos viol. ana p. j. fiat decoctio, macerentur radic. in vino albo & aqua, si scirrhus non sit in splene. Si verò scirrhus sit minuendus, in aceto maceretur. In colatura lb. ij. diss. sacchari q. s. fiat syr. aro. ʒ. ij. cinamomi: sumatur per quinque vel sex dies.

*Concoquē-
tes.
Euacuā-
tes.*

Syrup. de borrag. viol. bugloss. capil. ven. in officinis parati concoquuntur. Euacuant autem syrup. de fuma. compos. syr. de epithymo, liquir. sambuci. Non sunt igitur permiscendi concoquentibus, sed cum laxantibus. Ad euacuationem igitur & dissolutionem syrup. compositorum laxantium fiet huiusmodi decoctio & ex ea etiam syr. fieri possunt medix decoctionis, qui per se assumi possunt.

Syrupi laxantes melancholiam.

℞. Cortic. medix sambuci ʒ. j. polyp. ʒ. ij. pass. mundatarum, ficuum ana pa. xv. summitatum thymi, epithym. senæ orient. ana ʒ. j. agarici recent. tro. ʒ. ij. flo. viol. & genistæ ana p. ij. mercur. M. j. aut ij. fiat decoctio, in lb. ij. diss. melancholiam trahentia, vt confectionem hamech. diaphen. Sic igitur paratur laxatiua potio, quæ etiam ex superius enumeratis laxantibus fieri poterit, veluti additis compositionibus pituitosis ad pituitosos, biliosis ad biliosos. Ex eadē decoctione fiat syrupus sumptis colaturæ lb. iij. & addito saccharo in suffic. quantitate vel syr. de fumar. composito, aut de epithy. q. s. coquatur ad perfectionē, & ex eo sumatur duobus diebus continuis cum decoctione mercur. pass. & cicer. rub. Accipiet singulis diebus continuis, priusquam intestina grauentur nouis decrementis, aliam bilem trahere potest secundus syrupus.

De educendis aquas in hydropo.

Postquam in syropos laxantes incidimus, de syropis vrinas mouētibz & menses instituendus est sermo, præmissis tamen syropis cientibus vrinas & aquas, deinde purgantibus, quorum nullam aut admodum parvam mentionē fecerunt maiores nostri: sed eam aquam euacuare volebant, & exiccare medicamentis siccis, vt pilulis mezerei, & his, quæ calidissima sunt, & febrem exiccant. Si autem syrups dentur, citius à ventriculo in intestina descendunt, & aquam facilius trahunt. Sunt autem ea intestina, ex quibus multa sunt periculosa admodum, & iecoris, aliorūque partiū robur dissoluunt, quale est elaterium, & ferè omnes tithymallorum species, thymelea, chamelea, cocc. gnidium. Syrupi ad mouendas aquas fiunt, aut vt per ventrem aquam trahant, aut vt per vrinas, eamque intra venas. Fiunt autem ex radicibus aperiētibz, herbis, fructibus, seminibus ad id determinatis, additis hepar quodammodo corroborantibus, ne eius substantia supra modum diffluat, & quia non fit hydrops sine læsione hepatis. Tales autem reperiuntur in officinis parati, vt syrupus de eupator. Mesuræ in intemperie frigida. Syrup. de cicho. & endiuia cum rhab. si à causa calida oriatur. Idem præstabunt syr. de bizatiis, de duabus radic. si cum aqua absynth. vel decoctione spicæ celticæ & marrubij dentur. Vtiles sunt hi syrups quia obstructions soluunt, & aquas leuiter mouent, vel fiant hoc, qui sequitur, modo.

Syrup. ad deducendas aquas per vrinam.

R. Quinque radic. aperitiuarum, vt radic. rub. maio. ana 3. ij. radic. valeria. 3. j. herbar. capil. cichor. endiuia chamep. chamed ana M. ss. absynth. tertiam partem M. j. seminis apij petro. seseli, azari ana 3. ij. florum geniste & thamaris ana p. j. fiat decoctio.

Si scirrhus sit in hepate aut splene, macerentur in aceto radices. Si autē sit Anasarca, & mulier morbida, in vino albo. In col. diff. syrup. aperientes vel saccharum. Possunt & addi passulæ, quanquam non mouent vrinas, sed ad intēperandas radic. aperiētes, quæ si sint antiquæ, interdum renes, hepar, & vesicam lædunt exulcerando. Aromatiseantur semper syrup. hi vel spica nardi, vel aza-

*Qua robo-
rant he-
par &
vri-
nas
mouent.*

ro, vel spica celtica, aut scenantho aut cinanomo, aut galanga: quia omnia hæc roborant hepar, & vrinam mouent. Dantur & aquæ distillatæ à radicibus, & herbis, quæ tenuioris sunt substantiæ. Itaque aptiores ad vrinam mouendas, & menses, & ad obstructions liberandas. Hi syrupi recipiunt tantum verè vrinam cientia, non autem ea, quæ aquea substantia id præstant, ut quætuor semina frigida maiora, nisi cum hydrops est cum caliditate coniunctus, vel quando vrinam prouocare volumus, quæ à calculo, vel à crassis humoribus subito retenta fuit. In hisce enim causis nihil est periculi humidis vti, quod in hydropse faciendum non est.

Syrup. purgans aquas.

*Hydropis
species di-
stinguenda*

Syrupi purgantes aquas fiunt ex medicamentis aquas purgantibus suprâ enumeratis, ut thymel. chamel. adiunctis corroborantibus & quibusdam aperientibus, ut melior fiat eorum actio. Conuenientissimè his medicamentis vtimur in forma syruporum. Multò enim facilius distribuuntur per corpus, & aquas trahunt. Còsiderandum verò, quæ sit hydropis species. Nam tamen in omnibus sit aqua, differunt tamen quantitate. Nam Ascites multum aquæ continet: Tympanites minus, plus verò flatuum. (Addenda igitur, quæ flatus discutiunt) Anasarca pituitæ multum. Adduntur ergo incidentia, aperientia, & pituitam purgantia. Si ascites factus fuerit ex intemperie calida, aut post inflammationem, hæc medicamenta adduntur syrupis modicè refrigerantibus: ut syru. de endiuia simpl. & compositus, syru. de cichorea cum rhab. aliisque similibus aperientibus, refrigerantibus, & corroborantibus hepar sic.

Syrup. ad ascitem.

R. Pass. 3. ij. fol. brass. marinæ M. j. thymel. vel chamel. M. ʒ. seminis hederæ, seminis seselii an. 3. iij. fiat decoctio in lb. j. diss. syrup. endiuie simpl. lb. j. vel syrup. endiuie compos. lb. ʒ. fiat syrup. arom. cum 3. ij. cinnamomi, vel 3. j. spicæ celticæ. Loco syr poni possunt species cichorii & herbæ capil. atque syrupus inde confici potest cum saccharo hoc modo.

Ad idem.

R. Radic. valerianæ, radic. rub. maior. & ciclamini

ana ʒ. ij. radic. apij, petro. ana ʒ. j. endiuiz non lotz, sca- *Hedera*
riolz, herbarum capil. agrimon ana M. j. seminis he- *Grinas*
derz (quod aquas mouet non minus quam thymelea) *mouet.*
ʒ. j. brass. marinæ M. j. chamelez, thymel. ana ʒ. j. pass.
mundatarum ʒ. iij. anis. ʒ. iij. fiat decoctio, & in lb. j.
ß. diss. saccha. q. s. fiat syr. arom. ʒ. iij. spicæ celticæ, vel
cinamomi, dentur ʒ. iij. per se, si sit mediæ decoctionis,
vel cum aquis endiuiz & cichorei, si sit coctus ad perfe-
ctionem.

Ad anasarcam.

SI autem sit anasarca, his adiungenda erunt medica-
menta magis incidentia, attenuantia, & alterantia, vt
enulæ camp. rad. apij, petro. rub. maior. in maiori quan-
titate, & pituitam purgantia, vt agaricus, semen cartha-
fena, polypod. aut medicamenta trahentia aquas de-
coquenda in syrupis ad pituitam purgandam præscri-
ptis.

Si sit tympanites. fiet hoc modo.

R. Pass. (quæ in roborando hepate non debent enu-
cleari, sed cum gigartis poni, secus in detergentibus) ʒ.
ij. seminis petro. apij, fefeli ana ʒ. ij. rad. azari. & valeria-
næ ana ʒ. ß. mentæ, absynth. beto. ana M. ß. marrub.
M. j. mercurialis brass. marinæ ana M. ß. senæ orien. &
seminis carth. an. ʒ. vj. florum anthos & genistæ ana p.
j. fiat decoctio in lb. j. diss. sacch. q. s. fiat syr. aro. ʒ. ij.
diagalangæ, vel ʒ. j. aromat. ros. detur alternis diebus.
Hic syru. compositus est ex odoratis aperientibus siccis
(neque herbæ, vel radic. recentia ponuntur, quia flatus
gignunt) & flatus discutientibus, quibus adiungimus
pituitam purgantem. Tenuis enim & aquæa pituita fla-
tum materia esse solet, in circo euacuanda, vt in tumo-
ribus œdematosi fieri imperant medici. Præterea adiū-
ximus aquas purgantia, diagalang. arom. ros. quæ ven-
triculum & alias partes roborant. His itaque remediis
facile educetur aqua, siue sit in peritonæo, siue in vtero,
siue in aliqua alia parte, vt in thorace, vel capite, vel in
tumoribus aquosis, phlistenibus flatulentis.

Cum hydrops est cum scirrho.

Cæterum si hydrops est cum scirrho splenis, tunc
incidentia & splenetica adiungimus, vt cortic. rad.

capp. sambuci, vel fraxini, populi, aut thamariscis, ac in aceto macerentur & decoquantur, vt suprà dictum est.

Ad cacochymiam & mensium prouocationem.

*Menses mo-
uentia.*

Funt & syrupi non multò his ab similes ad cacochymiam, & prouocationem mensium, & aperientibus & prouocantibus menses & vrinas. Syrupi autem prædicti apti sunt ad mouendis vrinas, & menses prouocandos, additis radicibus eryngij, foliis arthemisiae vel matricariae vel sabinæ, & aromatis ʒ. j. vel ʒ. j. β. vel ij. cinamomi. Cinamomum enim & cassia menses mouent, licet recentiores ineptè corticem cassiæ apponant pro cassia antiqua, vel corticem radic. polemonij, quam cassiam ligneam vocant. Cinamomum in his syrupis tantum ab ʒ. β. ad ʒ. j. vel ʒ. ij. ponitur, & quo efficaciores sint, vinum album tenue in clarificatione, ne vires amittat ac saporem gratum. Porro ciēt vrinas syrupi facti ex duabus vel quinque radicibus, oxymel diureticum. Sed syrupi, qui parantur cum aceto, nō admodum apti sunt. Acetum enim vtero aduersatur. Fieri autem poterunt modo sequenti.

*Vrinas
mouentia.*

Syrupi ad menses prouocandos.

R. Quinque radicum aperientium ʒ. iij. radic. rub. maior. ʒ. ij. radicis quinquefolij, id est, pentaphili & eryng. ana ʒ. j. puleg. vtriusque, calaminth. orig. ana M. j. quatuor seminum frigid. maior. ana ʒ. j. flor. anthos leuchoi ana p. ij. florum genistæ p. j. fiat decoctio in aqua & vino, in quibus per noctem radic. macerentur, & in col. th. ij. diss. mel. despumati ʒ. iij. sacchar. q. s. fiat syrup. arom. ʒ. j. cinamomi. In hoc differt hic syrup. à syrupo prouocante vrinas quod magis attenuat, itacidit ac deterget crassos & viscidos humores obstructionem facientes, & mensium profluvium prohibentes, in quo casu hoc syrupo vtimur, aut similibus. Nam si post longam sanguinis effusionem per vterum, vel per aliquam aliam partem menses retinentur, idque ob sanguinis penuriam, non dabuntur syrupi, quia magis adhuc exicarent corpus. Dabuntur ergo paulò antequàm fluant menses, aut quum instat tempus purgationis. Possunt etiam dari in retentione vrinæ ab eadem causa orta. Dabitur etiam hic syru. ad vteri calfactionem, apertionem, & re-

*Quo tem-
pore exhi-
benda.*

& reficcationem, ablatis seminibus frigidis maioribus.

Ad conceptum.

ET quò facilius concipiant mulieres, dari possunt per se illi syrupi vel cum decoctione arthemisiæ, & mercurialis, persicariæ, vel cum pauca quantitate syrupi de arthemisia, ad quæ vicia vsurpamus syrupum de stachade cum decoctione vel aquis prædictarum herbarum, aut syrupo de arthemisia, qui si dentur cum decoctione persicariæ maioris, multò erunt efficaciores ad conceptum.

De iulepis.

QVia frequenter plures aquas imperamus accipien-
das post opiatas, quæ si diu permixtæ feruentur
facile corrumpuntur, ad earum conseruationem mel
vel saccharum addimus. Ex aquis & saccharo iulep.
conficimus, quorum vsus est post opiatas Syrupus sim-
plex, qui ex floribus, vel ex vna tantum herba confici-
tur, vocatur etiam iulep, vt iulep violatum, rosatum, &
sic de aliis. Parantur autem ex aquis distillatis, & cum
saccharo coctis. Saccharum autem conseruat suo lentore,
ne putrescant, Vt

Iulep. ad sitim sedandam.

R. Aquæ ros. lb. j. sacchari lb. β. coquuntur, & fit
iulep, vocatum Alexandrinum, quia vtuntur in Alexan-
dria, ad sitim sedandam, sed in febrib. intermittentibus,
& cum quibus est obstructio, non est ex vsu. Ex multis
autem aquis fiunt iulepi veluti ad sistendum sanguinem
imperamus,

R. aquarum peculi rosa. sanguina. id est centinodiæ,
burs. pastor. ana qr. j. sacchari parum, fiat iulep, capias
post opiatam.

Ad hepatis refrigerationem.

SI ad hepatis refrigerationem fiat, aquas refrigerantes
vt lactucæ, cichoriæ, endiuæ, solani, & aliarum eius-
modi eligimus.

Ad pectus.

SI ad pectus, viol. bugl. & sic de aliis. Aquas determina-
stras cognoscet medicus, ex iis quæ dicta sunt cap. de
syrup. quare his contenti, ad alias medicamentorum
formas veniendum.

De medicamentis purgantibus.

Post syropos concoctorios aut ante, medicamentis purgantibus utimur. Videndum itaque est quæ medicamenta ante syropos concoctorios dari possunt, & quæ item post syropos. Cæterum medicamenta laxantia, forma distinguuntur, aut consistentia, aut quòd humori alicui euacuando, aut parti sint determinata. *Distinctio.* Distinguuntur præterea actione. Nam alia solvunt attrahendo, alia constringendo, alia lubricando, alia remolliendo. *Forma duplex.* Formæ medicamentorum laxantium sunt in vniuersum duæ, nempe humida & sicca. Humida sunt, aut modo confectionis conformata, v. catholicum, cassia, diaphenicum, electuarium Indum, de psilio, confectione hamech, triphera persica, diaprunis simplex & solutium: aut forma liquida, vt serû lactis, succus ros. mercur. syropus de fumaria compositus, de epith. de cichor. cum rhab. ex infusionibus multis ros. viol. decoctum fructuum, & aliorum quorum supra meminimus. Sicca triplici sunt differentia, aut forma pilularum, aut electuarij, aut pulueris. Pilulæ sunt multiplices, de quarum differentia postea. Electuaria sunt, de succo ros. diacartham. de citro. Pulueres sunt diasena, diaturbith, & præterea alia medicamenta, quæ in pulueris forma dari possunt, de quibus suo loco: verum pro humorum ratione, quos euacuant, etiam distinguuntur. Nam alia tantum recrementa communia expurgant, quæ *ecoprotica* dicuntur, quale aloe, & hiera, quæ ex aloe & odoratis componuntur, vt hiera picra, Gal. catholicum, lohoth de cass. pulpa tamarindorum, sebesten, pruna, ficus pass. & ferè reliqua purgantia cum lenitione, & deterfione, & lubricatione, vt decoctum caulium, ciclæ cum multo oleo, vel piscium saxatiliu, vel aliorum humidorum.

Bilem purgantia.

Alia autem sunt cholagoga, alia phlegmagoga, alia quæ bilem atram agunt. Purgantia autem bilem magna ex parte ex succo ros. vel earû infusione, ex rhab. scamnoneo parantur. Quæ enim paruum eorum quantitatem requirunt, aut non laxant, vt in puluere triasandali, rhab & alijs pulueribus cordialibus; aut soluendo mouent,

mouent, aut adiuuant alia medicamenta & aliorum medicamentorum vim sequuntur.

Phlegmagoga.

Pituitam purgantia recipiunt agaricum, turbith, colocynthid. polypod. medul. cartha. aut biliosa incidentibus, & attenuantibus permixta, vt diagrid. cum castoreo pituitam vacuat: aloe cum aromatibus pituitam mouet. Incidentia & attenuantia etiam si cum detergentibus misceantur, pituitam euacuant, veluti si semina flatus discutientia, & alia incidentia crassius conterantur, & melle excipiantur, pituitam purgabunt, eam maxime, quæ in ventriculo, & intestinis collecta est.

Melancholica.

Idem præstabunt medicamenta melancholica, si incidentia quædam admisceantur, vt polypod. fena, mercur. cum anis. foenic. cinamomo, & azaro, si ex vino vel melle dentur, pituitam purgant.

Composita phlegmagoga.

Composita medicamenta pituitam purgantia, attractentia sunt diaph. Indum maius, electuarium, diacarth. de citro solutium, puluis & turbith, pilulæ omnes ferè, quæ agaric. colocynth. & lachrymas recipiunt, vt foetidæ maiores & minores, de opopana. ex colocyn. cocchiæ, de agar. & turbith, & similes.

Composita melancholica.

Melancholiam purgant, quæ lapidem lazuli non assum recipiunt, vt veratrū nigrum, tithymalum, epithymum, fena, polypod. cortex samb. decoctū eiusdem, & vt summam dicam, omnia medicamenta quæ crassam pituitam purgare creduntur, modo humida quædam, & calida admisceantur melanch. purgant: eam ob causam diaphenicum, & Indum maius efficiunt. Confectio hamech. diasene solutium, & pilulæ omnes, quæ prædictorum medicamentorum aliquot recipiunt, quales sunt pilulæ Indæ, de lapide Lazuli, foetidæ & similes.

Aquæ purgantia.

Aquas purgantia iam prius enumerata sunt, & quia, vt prius dictum est, talia medicamenta potius dari debent in forma liquida, quàm vllō alio modo, in classes purgantium referemus tales syropos.

Medicamenta secundum partes purgantia.

Medicamenta talia dicuntur, quia è certis quibusdam partibus vacuant magis, quàm ab aliis: inde etiam cephalica denominantur, quæ pituitam purgant, quia in capite maximè pituita redundat, & quæ fortiter ab ea parte trahunt.

*Rhabarb.
anima hepatis,*

Hepatica eadem ratione dicuntur, quæ bilem purgant, sed cum quadam astringitione: hepar enim bilem laxantibus, quæ illud molestat, delectatur, modò leuiter astringant. Eadem causa rhabarbarum amicum hepatis dicitur, & anima hepatis, quòd sit ipsi familiare, & succ. ros. Euacuans enim & leuiter astringunt. Scammonium autem, quia astringitione caret, quanquam bilem euacuat, hepaticum medicamentum re vera non est, nisi prius coquatur cum malo cydonio, aut detur cum myrobal.

Splenitica, quæ artam bilem purgant, qualis humor in splene colligitur inde extrahitur.

Ventriculo conueniunt detergentia humores, citra ventriculi subuersionem, & laxationem, propter addita odorata, & ea præsertim, quæ pituitam detergent, quæ in eo propter cruditates multa colligitur. Agaricus itaque maximè conueniet rhab. myrobal. & succus ros. ob astringitionem. Turbith verò, scammonium, & colocynthis sunt aduersissima, hiera picra, aloe, & quæcunque parantur ex odoratis & eccoproticis, apta sunt ventriculo, & intestinis. Syr. de absynthio si ex eo solo paretur siue succo cydoniorum, aptus erit ad bilis deterfionem, & ventric. corroborationem. Vnde commodè exhibetur in fine tertianarum.

Pulmonibus verò & thoraci conueniunt fortiter pituitam purgantia medicamenta, indicatione sumpta à situ. Distant enim multum ab intestinis, quòd ex Dioscoride colligere licet, qui asthmaticis absque pulmonum affectibus, quæ fortiter trahunt, maiori quantitate præscribit, ob loci fortè distantiam, & materiæ vacuandæ contumaciam.

Quæ medicamenta danda in morbis thoracis.

Commandanda sunt itaque iure inter medicamenta composita laxantia, vt diaphenicum, indum maius, & alia quæ turbith, agaricum, & colocynthidem recipiunt,

piunt, & alia pituitosa, quæ neque myrobalanos, neque rhab. recipiunt, sed hoc in morbis sine inflammatione, *Quæ in in-
flamatio-*
in quibus aptiora sunt soluentia leniendo, quàm trahē *ne adhi-
benda.*
tia fortiter. Sufficiunt enim medicamenta lenientia ad
euacuationem materiæ antecedentis quæ est in ventric.
intestinis, & primis venis. Quæ autem fundunt & agi-
tant humores, maiorem defluxionem excitant, & nihil
à parte inflammata euacuant, & impediunt expulsi-
onem, in contrariam partem trahendo. Facta igitur mis-
fione sanguinis damus decoctum fructuum cum cassia,
aut manna, in pleuritide, peripneumonia, & similibus.
Quod si fortè medicus vocetur incipiente defluxione, *Quid fa-
ciendum*
poterit rhab. supradictis admiscere. Rhab. sua purgatio
ne, & astrictione defluxionem intercipit: idem efficit *incipiente*
syru. ros. Quando autem materia iam parti impacta est, *fluxione.*
quæ spuitionem retinet, satius est eo abstinere, & eo tan-
tùm in pleuritide biliosa est utendum, vt in pituitosa a-
garico, & id cum præmeditatione faciendum.

De iuncturarum medicamentis.

AD iuncturas etiam quædam medicamenta refe-
runtur, quæ arthritica dicuntur, aut quia à iunctu-
ris pituitam trahunt, aut quia quibusdam additis pituitæ
educendæ apta sunt. Ea autem sunt, quæ pituitam for-
titer solvunt, qualia sunt quæ thoracis affectibus ac-
commodantur, quia sine inflammatione, vel atrophîa,
vel spuito sanguinis sunt. Aptæ autem sient additis qui-
busdam, pituitam incidentibus, vt zinziberis hermo-
dactyl. Behen albo, & rub. semine rutæ agrestis, sed sale
gemmæ, radicibus pentaphyl. His autem tantùm uten-
dum est in morbis articularibus per decubitum humo-
rum nõ per defluxionem factis, vel etiam per defluxum,
si defluxio constiterit, & plenum corpus adhuc recre-
mentis videatur. Nam tùm illis utendum est, quibus vsi
sumus in inflammationibus thoracis, & ad capitis vel
thoracis euacuationem vt agarico trochis. turbith, esula,
aliisque pituitosis. Arthritica dicuntur, quia materiam,
cùm fluit, euacuant, non eam quæ adhuc est in articulis.
Illa enim topicis remediis excutienda est, vt quæ in aliis
partibus non valdè remotis, vt in ventriculo. & intestinis
collecta est, multò facilius euacuatur per vrinæ & su-

dores. Arthritica medicamenta aut pleuritica affectibus vteri sine inflammatione conueniunt, & renibus, aliisque partibus valde remotis. Habent enim hæ partes meatus conuenientes, ad excrementorum vacuationem. In his enim sufficit materiam in corpore redundantem inspicere, eamque euacuare per partem in qua est, veluti per menses, eam quæ est in vtero, & vrinas, quæ in renibus, & vesica.

De potionibus.

Potio siue potus est medicamentum minus liquidum, quàm syrupus, quia compositionem, & puluerum molem aliquorum medicamentorum recipit, vt laxantia, catholicum, diaphenicum, indum maius, & alia. Adhæc pulueres cordiales vt confectiones quæ dissoluntur in aqua, vel decocto aut syr. aliquo, vt gratior, & dulcior fiat potio. Fiunt ergo portiones laxantes, quibus vtimur pro minoratiuo, eradicatorio post materię concoctionem. Cordiales ad virium corroboracionem, spirituum restaurationem, conciliandum somnum, sedandum dolorem, frangendum calculum, ciendas vrinas, & menses, constringendum, siccandum, aut aduersus vim veneni, vt in peste, aliisque venenis, de quibus breuiter diximus, cum de eorum materia in superioribus sumus loquuti. Forma igitur & proportio tantum indicanda est. Fiunt autem ex decoctionibus, aquis, pulueribus, vel decoctionibus & pauco syrupo ad materię concoctæ eductionem vel alium emolliendam.

Fusca ad materia communis eductionem.

℞. Cath. ℥. ij. diss. in aquæ decoctionis hord. aut aquæ viol. ℥. iij. syru. viol. ℥. j. fiat potio. Interdum verò syrupum ros. laxatiuum in maiore quantitate ponimus cum magis laxare volumus.

Potio ad pituitam laxandam.

Talis diaph. aut indum maius, aut minus recipit, aut syrup. capill. veneris aut mel. parum, vel si non sit morosus æger, nihil addimus, ne augendo molem imbecillius reddatur medicamentum, hæcque modo fieri poterit.

℞. diaph. ℥. β. diss. in pauca quantitate aquæ hyss. fiat potio. Minor hic quantitas vsurpatur, quia ad dissolutionem

tionem addere intendimus decoctionem pituitosam, aut syr. laxantem, aut indum maius, aut diacarth. aut de citro solutium.

Potiones ad melancholiam.

Potiones laxantes melanch. fiunt ex confectioe hamech, diap. diasena solutiuo dissolutis in aqua fumar. bugloss. vel decoctione senæ, epithymi, mercur. vt
℞. polypod. querc. ʒ. j. pass. ʒ. ʒ. senæ orient. epithy. an. ʒ. ij. anis. ʒ. j. flor. cord. p. j. fiat decoctio. In qr. j. diss. diap. ʒ. ij. syr. ros. laxa. ʒ. j. misce, sumatur mane.

Fit autem decoctio, quando volumus uti medicamento minus proprio, aut quando caremus proprio, aut quando magis conuenit propter causam aliquam. Cum verò confectioe hamech utimur, aquis sumus contenti, vel decoctione mercur. quia purgat fatiseum humorem.

*Quando
Sciendum.*

Potiones ad serosa excrementa.

Ad serosos humores (-vt in scabie) utimur confectioe hamech cum decocto purgante ichores humorum, de quibus supra, vt

℞. brass. marinæ M. j. pass. mundatarum ʒ. j. anis. ʒ. j. fiat decoctio in iusculo. (Alioqui brass. marina ventricul. & hepatis noxam inferet) pulli vel galli, & in quar. j. diss. confect. hamech ʒ. ij. syrup. de fumaria ʒ. j. misce & fiat potus.

De potionibus cordialibus.

Potiones cordiales fiunt ad virium imbecillitatem, quæ prouenit à magna euacuatione, aut spirituum dissipatione, profecta ab intemperie, aut alia. Ex pulueribus autem cordialibus alij calefaciunt, vt diamargar. calidum, diambra, diamosc. refrigerant diamargar. frigid. triasandal. Constringunt & superfluam euacuationem moderantur, diamargar. frigid. & triasandalum. In potionibus itaque cordialibus, quibus erit mediocriter constringendum, vsurpabuntur diamarg. frigid. & triasandalum: raro autem cum aliquid per sputum euacuandum est, sed aliis potius, quæ nec fragmentorum lapidum preciosorum quantitatem recipiunt, nec astringentia vt aromatic. ross. diarrhodum abb. Confectio diamosci calefacit, vt dictum est (alij addunt & diaris.) Constringit electuarium de gemmis. In affectibus itaque

*Calefac.
refriger.*

*In promo-
uendo spu
to his
Sciendum.*

*Quibus
tendendum
in affecti-
bus pul-
monum.*

pulmonum parua quantitas vsurpanda & admiscenda diatragacant. frigidum, & diatris. Confectio alchermes ad cordis confortationem valet, in quibus est constri- ctio non laxatio, veluti in quibus calor naturalis languidus est, & ferè extinctus ac humore melancholico perturbatus. Rarò vtimur in fluxibus ventris & pauca quantitate, aut cum syr. de papauere vtimur, viribus debilibus existentibus.

Ad vires imbecillas in affectibus pulmonum.

℞. pul. diamarg. frig. 3. ℥. diatrag. & diatris an. 3. j. a- quæ bugloss. & viol. vel capilli ven. an. 3. j. syr. viol. 3. j. misce. Cor reficit, expectorationem iuuat, lenitque pe- ctus. Nam syrup. viol. & aqua bugloss. asperitatem tem- perant, pulueres expectorationem iuant. Cum autem materia frigida est, & calor languidus, etiã datur con- fectio alchermes, sed temperata.

℞. confectiois alchermes 3. j. diatrag. frigid. 3. j. a- quæ viol. & bugloss. ana 3. ℥. syrup. viol. 3. j. misce, fiat potio, quæ corroborat, lenit, & expectorat.

Ad somnum prouocandum

SI verò prouocandus sit somnus in huiusmodi affecti- bus, additur syrup. de papauere in cordis affectibus, hoc modo.

℞. confect. alcherm 3. ℥. aquarum bugloss. borrag. an. 3. j. syrupi conseruationis corticis citri 3. ℥. misce, aut syrupus de pomis redolentibus in affectibus æstuosus erit ex vsu. Potiones cordales ferè omnes cū leui qua- dam astrictione sunt dandæ, præterquam in affectibus thoracis: in reliquis verò cum maiore vel minore astri- ctione, vt in fluxibus sanguinis à quacunque causa fa- ctis, vel aliis fluxibus. Somnum conciliantes huiusmo- di potiones fiunt ex humidis, frigidis, & effumantibus ad cerebrum. Ex humidis quandoque conciliatur som- nus. Narcotica verò somnum non conciliant, imò po- tius stupidos reddunt: quibus tamen vtimur, cum pro- pter motiones immodicas corporis vires deiciuntur, & quietem adhibere volumus, aut sensus communis ita ligatus, vt dolorem non sentiant, aut quando corporis motus somnum impedit. Somnum autem conciliantes fiunt sequenti modo.

*Narcoti-
ca.*

℞. aquæ

R. aquæ viol. lactuc. ana \mathfrak{z} . iij. syr. viol. \mathfrak{z} . j. misce, capiat serò. Hæc potio somnum conciliat, non stupefacit, & dari etiam potest iis, qui sumpturi sunt pharmacum, purgans postmodò. Si verò syru. de papauere misceatur, non item dari potest. Conciliant etiam somnum quæ ex lacte amygd. non cocto parantur, pauco croco aut iride additis, aut hoc modo.

R. amygd. dulc. \mathfrak{z} . iij. contundantur & extrahatur lac eum pauca aqua fontana pluuiali, violariz, vel lactucæ, in qua diss. sacchari parum, croci scrupul. j. harum verò portionum vsus erit in debilibus, aut inflammatione aliqua laborantibus in parte interna thoracis. Abstinentium verò, vbi dolor capitis grauedinem inducit, quia quædam recipiunt, à quibus eleuantur fumi ad caput. Ex nucibus & pineis simili modo parantur, præparatis sunt huiusmodi potiones, quibus vtendum est, vt diximus.

Quando abstinentium.

Potiones narcotica.

Potiones stupefactiue, quæ etsi quiescere faciant, non tamen somnum inducunt, sunt ex narcoticis, veluti ex syrupo de papauere nigro præsertim (minùs enim efficax est albus) Aut sunt ex compositione, quæ dicitur requies, falsò Gal. ascripta. Horum autem vsus est in pleuritide, in dolore articulorum vehemētissimo, aut capitis: non ita autem conueniunt doloribus internis, nisi in summa necessitate, ne videlicet retineatur materia in thorace, ventriculò, aut intestinis. Fiat autem hoc modo.

Quando vtendum narcoticis

R. syr. de papauere \mathfrak{z} . ij. aquæ nymphææ \mathfrak{z} . iij. fiat potio, detur hora somni.

R. pul. requiei \mathfrak{z} . j. diss. in aqua nymphææ, violarum & lactucæ, fiat potio, detur hora somni.

His potionibus adiunguntur pulueres cordiales, aut quia imbecillibus dandæ, aut quia veremur ne his ventriculus, hepar, aliæque partes naturales nimium refrigeratæ, debiliores reddantur, maximè quando frequentius iterandæ sunt, veluti cum cor confortare volumus & calfacere, confectionem alchermes addimus. Diamarg. frig. cum corroborare quidem, nihil autem calfacere: diarrh. abb. vel aromatic. Ros. si quando iuuandus

Pulueres cordiales.

Ventriculus, aut corroborandus, vt triasand. cum iectu corroborandum. Vbi autem in fluxu ventris astringendum est, addimus diamargar. frigidum, aquam myrtillorum, vel prunorum syluestrium. Si in pectoris affectibus cogimus vri ob vigilias, addemus puluerem diatrachae frigidi, aut diaireos simpl. 3. ℥. alij 3. j. Si ad sistendas fluxiones, dabitur cochleare vnum, aut duo, idque noctis tantum tempore, aut diacodium.

De Vomitu cientibus.

QUae superiori parte ventriculi innatant, conuenit commodissimè per vomitum, nisi affectus pulmonum, aut constitutio corporis *pterigodeis* prohibeat, euacuari. Estque via breuior, ac maximè natura procliuus ad id, aut cum nausea, vel cordis dolor, aut oris amaritudo adsunt. Fiunt autem ex laxantibus superius os ventriculi, vt oleis, & leuibus, cuiusmodi est agaricus, & conturbantibus ea, quae in ventriculo sunt, vt est semen azari, radix eius, semen atriplicis, succus raphani vtriusque. Decoquantur autem, aut in puluerem reducantur, quibus admiscetur multa aqua tepida, vt & oleum, vt

℞. feminis atriplic. 3. ℥. decoquatur in aqua raphani, vel cum 3. j. raphani, fiat decoctio cui addatur oleum, vel butyrum rancidum, vel parum foetidum: fricetur ventriculi regio in circuitu. Deinde cibum capiat, & digito in os immisso prouocetur vomitus.

Aut ex azaro & semine genistae fit, quae duo ellebori modo vomitum prouocant decocta, aut contraria atque propinata ex aqua multa, & paucio oleo. Haec dantur, quando cibum aut aliud quid facilius vomitione excludatur, vt vinum, & reliqua liquida. Cum vero pituita lenta ventriculo adhaerens euacuanda est, tunc incidentia & detergentia damus, vt in decoctione praecedente raphani radicem cum oxymelite, aut syr. acetos. simplicis, & aqua tepida, vt

℞. rad. raphani 3. j. azari 3. j. agarici 3. j. fiat decoctio in oxymelite ad 3. vj. sumatur mane, & retineatur aliquandiu in ventriculo, vt praepararetur materia: postea moueat citò, & multum saliat, vel vehatur curru, aut nauticula si proximus sit stagno, mari, aut flumini, deinde digito in oleo foetido immisso prouocetur vomitus. Incidenda

videnda autem & detergenda est pituita, priusquam pronocetur vomitus. Vomitus etiam scientia danda sunt initio febr. quotidianæ, tertianæ non veræ, & quartanæ, vel his quæ venena deuorant, præterquam his, qui ex esu fungorum periculo suffocationis laborant: Tunc enim ad partes inferiores sunt deturbandi: quod probatur eorum antipharmaco pigro agresti, & aliis astringentibus. Clysteribus igitur & medicamentis purgantibus deorsum deturbandi sunt, & os ventriculi claudendum astringentibus, vt malo cotoneo, piro syluestri. Qui difficultate respirandi laborant, aut sputo sanguinis, vel vlcere pulmonum vexantur, aut vertigine, aut suffusione, raro ad vomitum ducere oportet. Quibus verò fluxus ventris est, aut vlcus aut articulorum dolor, vomitione auertendi in his sunt humores.

De medicamentis siccis purgantibus, ac primis de pilulis.

HActenus de differentiis purgantium medicamentorum in vniuersum: sequuntur nunc particularia, ex quorum numero sunt pilulæ. Ex medicamentorum siccorum numero sunt pilulæ & electuaria solida & pulueres. Hæc forma vtilior est, vbi medicamentum tardius operari volumus, aut vbi corpus humidum est. Easdem ob causas fiunt pilulæ, tum etiam propter odorem, & saporem. Conficiuntur autem ex amaris, acris, & vt ex aloë, colocynthide, agarico, opopanace, ammoniaco, aliisque lachrymis, veluti pilulæ fœtidæ maiores, de enphorbio, de opopanace, sagapeno, & sarcocolla. Cæterum differunt ratione partium, humorum operationis, & operandi modo.

Pilula determinata partibus.

Partium ratione sunt, quæ ad cerebrum, ad nervos referuntur, compositæ ex medicamentis pituitosis, aut è capite trahentibus, quales sunt pilulæ cochix, ex agarico, ex turbith, fœtidæ, de opopanace, & aliis lachrymis, vt sarcocolla, euphorbio. Sunt & stomachicæ, quæ ad ventriculum referuntur, vt de hiera simpl. de aromatibus, ante cibum, sebellinæ, & aliæ multæ, quæ ex medicamentis stomachicis supra enumeratis componuntur. Sunt & aliæ, quæ ad oculos pararunt antiqui, pi-

*Quomodo
sciendum
medicam.
sicco.*

*Ad cerebro-
brum.*

Ad stoma-

Ad oculos

lulæ lucis maiores & minores, easque putarunt oculis conferre, quia medicamenta multa recipiunt, quæ apposita & intro assumpta siccando, aut detergendo oculos iuuant. Hæ autem veræ oculares sunt, quæ ventricul. detergunt, si affectus per consensum ventriculi fit, de hiera. Gal pilulæ stomachicæ, ante cibum, de aromatis. Si verò sine consensu ventriculi, pilulæ euacuantes fortiter pituitam aptæ sunt oculis, non quæ forniculum, aut euphrasium recipiunt: illæ enim præferendæ in morbo facto per consensum, quæ nihil craci

Ad hepar. aut saltem paruam quantitatem recipiunt, vt myrrhæ, *Ad vterū.* quæ caput replent, dolorē capitis faciunt. Sunt & hepaticæ veluti pilulæ de rhab. vel quæ rhab. tantū recipiūt.

Ad vterum referuntur foetidæ, & quæ neruis, & cerebro aptæ sunt, si morbus frigidus, vel humidus sit, vel retenti sunt menses, ob obstructions.

Ad artculos. Sunt & arthetice maiores & minores, vt pilulæ de hermodactyl. & similes, quæ ex pituitosis fiunt, quarum differentia duplex: quæ ex astringentibus, & modicè laxantibus parantur, illa in fluxu conueniunt. Altera est quæ ex fortiter trahentibus pituitosis parantur, siue astringentibus, quales sunt quæ ex lachrymis, colocynthide, turbith. & similibus compositæ sunt.

Pilulæ humoribus determinata.

HVMORUM ratione pilulæ etiam distinguuntur, quos scilicet euacuant Stomachicæ enim sunt ferè omnes hæ, quæ ad recrementa bona euacuanda conueniunt, eccoproticæ dictæ Biliosæ, quæ rhab. vel diagrid. pro maiori parte recipiunt. Pituitosæ, quæ plus agariçi, vel turbith, vel colocynthidis habent. Melancholicæ verò indæ, de lapide lazuli, & omnes quæ veratrum, cianzum lapidem, vel armeniacum, senam, polypod. thymum, epithymum, cuscutam, & alia simpliciter melancholicam purgantia, aut pituitam crassam recipiunt.

Pilularum differentia secundum operationis rationem.

Distinguuntur & pilulæ secundum operationis rationem. Aliæ enim laxant, aliæ astringunt, aliæ potius sistunt, vt pilulæ de styrace, pilulæ ad catarrhos, ex opio paratæ. Hæ siquidem omnes incrassando defluxiones sistunt. Aliæ constingunt & siccant, vt de bdellio.

quæ

quæ ex conchis venereis, etiam myrobal. parantur. Aliæ laxando astringunt, vt quæ ex rhab. & myrobal. tantum conficiuntur. Purgant enim bilem & cōstringunt indy-
fenteria, & fluxu. Aliæ obstructionibus hepatis & lienis conueniunt, vt quæ ex pulueribus & trochiscis parantur. Aliæ laxant, vt quæ ex medicamentis laxantibus componuntur.

De differentia ab operandi modo.

Operandi autem modo sic distinguuntur. Aliæ nanq; detergendo soluant, vt stomachicæ, de hiera, & aliis amaris eccoproticis: aliæ constringendo, vt quæ ex myrob. componuntur. Aliæ attrahendo, vt quæ ex agarico & aliis leuiter attrahentibus fiunt. Aliæ fortiter trahendo cum magna perturbatione, vt quæ ex turbith. Aliæ fortiter trahendo & fundendo, scilicet quæ ex lachrymis parantur, vt pilulæ de euphorbio, opopanace, foetidæ, & sagapeno. Earum autem vsus est, quando humores sunt congelati, & minimè fluxiles, vt est pituita vitrea & mucilaginosæ. Cōtra verò nunquam illis vtendum est, cum humores tenues & fluxiles sunt, sed potius moderatè attrahentibus. Astringētibus autem, cum aliquid à ventriculo vacuare volumus, aut intestinis, aut membro robur addere, vt lienteria, & ventriculi subuersione. Pilulis etiam stomachicis vtendum erit, cum ventriculi duntaxat recrementa detergere volumus, & hæ, quæ ad ventriculi deterfionem & inflammationem parantur, duabus horis ante cibum sumi possunt, vt & quæ constringendo euacuant. Reliquæ verò post primū duntaxat somnum, facta priùs coctione, & non ante.

De pilularum materia.

Pilularum materia est Aloë, quia alio modo cōmodè sumi non posset propter insignem eius amarorem, & quia emplastica est: ob eius enim viscositatem in pilulas redigi potest & alia arida coniungere. Admiserantur autem omnia arida laxantia, vt colocynthis, sena, turbith, agaricus, rhabar. myrob. omnes, & quæ ea medicamenta castigant, vt mucilago trag. propter colocynthidem, caro cydoniorum, rosæ, propter scammonium. Ingrediuntur etiam, quæ medicamentorum actiones iuuant siue laxando, siue attenuando, siue fun-

dendo, vt zinziber pituitosis additur, quia pituitam incidit, & attenuat sine magna reficcatione. lungitur autem agaricus & turbith, non autem colocynth. quia illa nimis tenuis est, & intestina exulcerat. Quare incrassantia potius desiderat, quàm incidentia, & attenuantia. Rhab. spicam, vel cinamomum addimus, cum eius astringentem in obstructione pertimescimus. Sin verò laxandum sit, & constringendum, est nobis prætermittenda, & potius deligendi myrob. & mastich. Hæc enim constringendi, & reficcandi vim possunt augere. Adduntur etiam lachrymæ, & quæ detergant, & molliunt, vt bdellium, & myrrha. Aut quæ fundendo soluunt, vt opopanax, euphorb. sarcocolla, sagapenum. Aut quæ calfaciendo tantum soluunt: aut incidendo & attenuando, vt semen apij, fœniculi, seseli, cinam. spica, carpesium, azarum, pulpa tamarindorum & sebesten.

Pilula pro biliosis, & ardori &rina obnoxiiis.

Pilulis eiusmodi affectibus quæ conueniunt, adduntur pulpa tamarindorum, & sebesten. Fiunt autem hoc modo. Primum enim materiam consideramus, quam euacuare volumus, & à qua parte, fortiter ne an moderatè. Nam si materia in ventriculo collecta sit, euacuanda eccoproticis, vel detergentibus tantum. Parantur pilulæ, & ex aloe sola.

Ad pituitam in Ventriculo.

Si pituita, additur cinamomum, azarum, spica, carposbalsamum, ad incisionem materiæ, myrrha ad detersionem, crocus ad coctionem. Ex his omnibus paratæ sunt pilulæ de hiera, de aromatib. sebelinæ, & quæ ante cibum dicuntur. In his autem proportio seruanda est. Nā quo plura incidentia aromata, & quo maiore adduntur quantitate, eò magis minuitur quātitas laxantium. Pauca igitur quantitate talia vsurpanda. Multo enim satius est, medicamēta esse efficaciora, & moderata, quàm maiori quantitate, & minus efficacia. Hanc ob causam pilulæ lucis maiores, & aliæ multæ vituperantur. Tales enim pilulæ hebetantur multitudine medicamentorū, ad quorum medicamentorum accelerationem diagridium quidam addiderunt. Satius tamen fuisset quædā prætermisisse, quàm diagridium, aut cinamomū, aut colocynthidem

thidem in pilulas recipe, fient autem hoc modo.

℞. aloes nō lotæ (si magis purgare volumus) ʒ j. myr. Aloes non
rhæ ʒ j. cinamomi azari, spicæ an ʒ. vj. formentur pilulæ lotæ.
v. pro ʒ. hæ pilulæ magnam quātitatem aloes recipiunt,
quoniam hæc sola laxat. Deinde plus myrrhæ additum
est, quā aliorum, quia quæ detergunt, quodam modo
laxant: maiori itaque quantitate ponenda. Si verò alicui
tenuis quædam humiditas sit in ventriculo, exiccanda, &
ventriculus corroborandus, minorem quātitatem aloes
sumemus, & roborantium & resiccantium maiore quan-
tatem, sic.

Ad roborandum & siccandum ventriculum.

℞. aloes lotæ ʒ. cinamomi, scænanth. spicæ nardi cel-
ticæ, carpobalsami ana ʒ. ʒ. Cum vino formentur pilu-
læ sex vel septem. Tales autem pilulæ nō recipiunt myr-
rham: Quod si quis eam addere velit, minori quantita-
te addat, vt de aloë dictum est. Crocum prætermisimus,
addi tamen poterit, vbi coctio ventriculi iuuanda, & in
his, quibus non sit effusio ad cerebrum à ventriculo,
vt in suffusionibus, capitis doloribus, & vertigine: Tunc *Qua offen-*
enim myrrhæ & crocus, ex Galeni sententia, prætermitt- *dus caput.*
tenda: quia capitis dolorem inducunt. Interdum quo-
que aloë prætermittitur ob hæmorrhoidas, vel ablu-
itur, quia ventriculus siccandus, & roborandus magis,
quā humor euacuandus, sed eius loco vel pulpa tama-
rindorum, vel terebinthina, aut ex syru. aliquis additur,
aut mel ad conformationem, vel bdellium, si verum re-
periatur, non myrrhæ, vt pharmacopolæ etiam nunc fa-
ciunt in pilulis de bdellio. Quod etiam in declinatione
februm squallidarum obseruamus, in quibus interdum
pilulæ parantur ex addito succo absynthij, aut apij, aut
succo smirnij pro myrrhæ. Hi namque succi obstructio-
nes tollunt, & detergunt sine magna calfactione, non
sine minori resiccatione, & partes internas roborant.
Ex his pilulis fiunt aliæ pilulæ addito agarico, quando
est obstructio, aut euacuanda pituita, aut addito rhæb.
vel succo ros. vel syrup. ros. laxatiuo. Si morbus sine ob-
structione sit biliosus, aut cum ventriculi relaxatione,
magis euacuabimus, si illis scammonij, vel diagridij vo-
cati aliquid addiderimus. Diagridium enim in biliosis

Scammonium.

quia minùs est tenuium partium, ob præparationem factam in malò cydonio: scammonium vero in pituitosis, & his quibus est obstructionum suspicio, quia magis tenuet, & calidius hoc modo.

Pilula Vehementer laxantes pro pituitosis.

℞. ex pilulis priùs ordinatis 3. agarici & mastichis ana ʒ. j. scammonij gran. 3. vel 4. vel 5. vel 6. pro ægrotantis natura.

Pilula pro biliosis.

℞. puluer. de aloe lota in aqua endiuix ʒ. j. rhab. ʒ. 2. diag. gra. 2. vel 3. formentur pilulæ cum syr. ros. laxatiuo. Harum pilularum differentia animaduertenda. Superioribus enim descriptionem primam vsurpamus, in qua est aloe non lota, quando est suspicio obstructionis, quæ magis soluit, & scammonium pro diagridio accepimus. In altera verò descriptione aloem lotam, ne tam calfaceret, elegimus, & eius ʒ. j. tantum, quia maiorem incidentium quantitatem acceperunt hæ pilulæ. Rhabarb. autem ʒ. 2. in addito syrup. laxat. rosa. siue diagrid. dari possunt, quibus ventriculus est malè affectus, aut cum tempus anni, virium imbecillitas, ventris lubricitas non permittit.

Ad bilem synceram in febribus.

Funt pilulæ ad bilem synceram, vel cum febrem exci-
tauit, & hoc in declinatione tantum, aut cum venter est admodum lubricus. In febribus enim medicamenta dura & sicca non conueniunt, sed quum æger alia forma medicamenta assumere non potest, cogimur vti pilulis, quales sunt à Mesue ad omnes febres descriptæ.

Pilula ad omnes febres.

℞. rhab. electi 3. β. cinamom. spicæ ana gran. 6. tamarindorum ʒ. j. succiapij ʒ. β. (quia minùs calefacit & astringit minùs quàm absynthium.) Temperetur rhabarb. cum spica & cinamomo in succo rosa. & cum eodem succo, aut syr. ros. laxa. for. pilulæ. Quoniam verò pilulæ istæ magnam molem habent, optimum est diagrid. gran. 2. pro 3. addere, infundendo vnà cum alijs prædictis, si æger liberam non habeat aluum, nec ferre possit, priùs iniiciendus est clyst. & assumptis pilu. imperandum vt bibat ʒ. j. vel ʒ. ij. syrup. viol. cum pauca quantitate

sitate aquæ viol. vel bugloss. vt copia illa humoris temperet siccitatem medicam, & lenitatem his addat.

Forma alia pilularum ad biliosos.

Funt etiam pilulæ alio modo, nempe ex electuario de succo rosaceo, vel myrobal. & scammon. Tales autem pilulæ adæo siccæ & astringentes, quæ ex myrob. formantur, in febribus non dabuntur. In morbis autem biliosis, qui sine obstructione sunt, vt in doloribus capitis à bile, & in morbis articularibus dabuntur, sine diagridio quidem in affectu qui sit cum defluxione, aut cum alui laxitate: cum diagridio autem pauco, vt acceleretur tarda aliorum euacuatio, in aliis morbis biliosis. Cæterum ne videamur facere aduersus Galeni præceptum, quo docet celeriter purgantia non esse admiscenda tardè purgantibus, animaduertendum est diagridium accelerare aliorum tardam operationem, & non purgare, nisi ponatur in ea quantitate, qua possit mouere corpus, & purgare. Si autem admisceatur tardè purgantibus, nec diu maneat permixtū, difficilem omnino faciet purgationem. Nam cum in pilulis vel aliis compositionibus permiscetur myrobal. vel rhabar. eius celeritas illorum tarditate temperatur, quemadmodum tarditas illorū, illius celeritate. Pilulæ denique ad bilis purgationem minùs frequenter dandæ sunt, sed potius dantur forma humidioris medicamenti.

Pilula ad pituita euacuationem.

Dvæ pilularum differentia ad hoc negotium conficiuntur. Aut enim tenuis pituita euacuanda est, quæ sit in ventriculi intestinis, ad quam euacuandam sunt pilulæ ex agarico, multis detergentibus, & paucis incidentibus additis ad tenuem pituitam.

R. pilul. de hiera simplic. \mathfrak{z} . j. agar \mathfrak{z} . ij. cum vino fermentur pilulæ 7. Aut pituita crassior, & magis distans euacuanda, veluti quæ est in pulmonibus, cerebro, iuncturis siue articulis. In hac autem euacuanda agaricum trochiscatum, & in vino albo infusum, cui adiunctum sit zinzib. aut sal gemmæ, aut turbitih, aut colocynth. aut trochisci alandal. sumenturque hoc modo.

R. pul. hieræ picræ \mathfrak{z} . j. agarici trochiscati \mathfrak{z} . ij. cum oxymelice fermentur pilulæ 5. vel 6.

℞. agarici, turbith. ana 3. ij. zinzib. salis gemmæ ana 3. j. cinamomi, spicæ, myrrhæ, mastich. ana gra. 6. cum oxymelite vel terebinth. formentur pilulæ.

Ex terebinthina verò conficiuntur pilulæ, quando affectus est in parte neruosa, aut in pulmonibus, aut in cerebro, aut cum materia fundenda est. Ex oxymelite autem, cum crassior est, & non fundenda, sed incidenda, & attenuanda.

Pilula ad fluxionē.

Fiunt & aliæ pilulæ ad pituitam fluentem, addita mastiche, aut myrobal. chebul. medicamentis phlegmag. Astrictionem enim quandam relinquunt post euacuationem, neque sinunt humores in alias partes defluere, quibus maximè utendum in catarrhis & morbo articulari, aliisque morbis per defluxionem factis, ut in fluxu ventris, & cerebri hoc modo.

℞. agarici 3. i. myrob. cheb. 3. i. mastic. 3. ss. formentur pilul. 7. cum melle ros.

Agaric. nō trochiscatus.

In huiusmodi pilulis neque incidentia adduntur, neque multum detergentia, quia defluxionem mouent. Si quis fortè velit odorata addere, sumat ea, quæ astrictiōne quandam habent, veluti cinam. spicam nardi, pauca tamen quantitatē. Agaricum autem trochiscatum non accipimus, quia materia, quæ educenda est, cum sit tenuis & fluat, incidenda non est.

Conficiuntur etiam pilulæ ad pituitæ crassæ euacuationem, additis pilulis de opopanace, sagapeno, aliisque multis, in quibus astringentia non conueniunt, nisi ea, quæ contrarias habent facultates, ut mastiche, quæ emollit, & astringit simul.

Pilula ad melancholiam purgationem.

Quibus purgatur melancholia.

AD melancholiam purgationem parantur pilulæ de lapide cianeo, & hæ quæ vulgò de lapide lazuli dicuntur. Istæ enim pilulæ & reliquæ aliæ, quæ magna ex parte componuntur ex melanagogis, purgant melancholiam. Verum cum sit humor terreus, & siccus non facile fluit, maiore igitur difficultate trahitur à medicamento sicco. Satius itaque fuerit uti potionibus, aliisque humidioribus confectionibus. Præterea purgantia melancholiam crassarum sunt partium, nec facile in pilulas reducuntur. Adde quod ventriculum lædūt, ut lapis

Cianeus,

Cianeus, polypod. fena, thymus, epithymum, fumaria.
Ne quis autem destituatur pilulis ad id determinatis,
utatur Indicis, fœtidis, de lap. lazali.

Pilula ad serosa recrementa.

AD serosa recrementa vacuanda vñ sunt antiqui etiam pilulis de mezereo, quibus tamen non esse vrendum alio loco diximus. Ea siquidem medicamenta magna ex parte calidissima sunt, deinde remorando in corpore ipsum calfaciunt nimium. Huc accedit quòd illis pilul. sine ratione admiscant astringentia, cum potius dulcia aut pingua admiscenda forent. Hæc enim vim acrem meserei obtundunt, & lubricant: astringentia vero retundūt, & retinēt. Satiùs itaque fuerit, vt diximus, vti syrupis, vel pilulas phlegmagogas conformare cum succo brassicæ marinæ, aut thymelæ, aut similibus.

Pilula ad Urinas prouocandas & obstructions aperiendas.

AD urinas prouocandas, & obstructions aperiendas parantur pilulæ, cum æger medicamēta necessaria ob fœtorem, aut ingratum saporem deuorare non potest. Veluti si quis ad hepatis, & lienis obstructions aperiedas trochiscis de eupator. de rhab. aut de absynth. in formam opiæ reductis, quia masticandi sunt, sumere non possit, imperamus tales trochiscos tenuissime teri, & cum syrupo aliquo aut succo cuiusdam herbæ, aut oxymelite formari in pilulas.

Ad hepatis obstructionem, & aliarum partium.

R. trochiscorum de absynthio 3. j. succi apij, vel syrup. de bizan. q. s. formentur pilulæ parue numero x. pro 3. j. dentur manè superbibendo parum vini albi modice diluti 3. iij. aquæ gramin. asparag. endiuiz, capil. ueneris

Tales autem pilulæ forma minima & mole debent fieri, vt citissime diluantur, obstructionsque tollant. Quò autem facilius, & citius venas subeant, vinum album, aut aqua, aut syrupus aliquis erit propinandus. Vel si quis velit obstructions splenis, aut scirrhum minuire, hoc modo imperabit.

R. trochiscorum de cappar. vel de myrrh. 3. j. cum syr. acet. vel oxymelite formentur pilulæ x. pro 3. & plures scirrhum.

Ad obstructions lienis aut

si fieri possint, quas capiat cum syr. acetos. ex cochleari, deinde bibat aquas gramin. & portulacæ ana ʒ. ij. cum ʒ. ij. syr. acet. simpl. vel oxymelite.

Iisdem ferè medicamentis, & eodem modo vtendum in prouocantibus vrinam, & menses. Trochisci enim de myrrha, & menses mouent, & obstructiones aperiunt, & fetus mortuos expellunt, & secundinas, maximè si superbibant aquam graminis, & portulacæ, & liquidum aliquod medicamentum. Quod si tales trochisci in officinis parati non reperirentur, parentur ad obstructiones hepatis, primum obseruatis his, quæ diximus in cap. de syr. secundum astringentia quædam admiscenda esse, & bilem purgantia cum astrictione, vel trochiscos de rhab. qui ad hepar referuntur hoc modo.

Ad hepar.

℞. succi absynth. depurati, & exiccati ʒ. j. spicæ nardi & scœnanti ʒ. ss. seminum apij & petros. ana ʒ. j. puluerisentur subtilissimè, & cum pauco syr. endiuicæ fiant pilulæ paruæ, quibus aliquando addimus rhab. ʒ. j. quia sua astrictione hepatis dissolutionem prohibet, & bilis aliquid educit.

Pro splene fortiores pilulæ.

℞. myrrha, asari, aristol. vtriusque, semin. cappar. aut florum ana ʒ. j. spicæ nardi, scœnanti ana ʒ. ss. apij, petros. agni casti ana ʒ. ss. cum syr. acet. aut oxymelite, fiant pilulæ paruæ.

Ad mouendas vrinas.

Pilulæ ad mouendas vrinas ex iisdem parantur. Nam quæ splenis obstructiones tollunt, quia acriæ sunt, vrinas etiam mouent, vt asarum, quando in tenuissimas partes reducitur, alioqui vomitum excitat, spica celtica, & alia permulta. Quæ verò ad lienem minuendum ex limatura chalybis fiunt, ad mouendas vrinas vsurpari non debent. Nimiùm enim exiccant, & astringunt, sed ea duntaxat, quæ superius diximus. Cæterùm ex sequentibus efficaciora parantur.

℞. carabæ ʒ. j. gummi prunorum vel ceraforum, azari, seseli ana ʒ. j. sem. apij, petros. spicæ celticæ ana ʒ. ss. cum succo apij vel brass. mari. fiant pilulæ, quæ sumantur vètriculo purgato, & oxymelite superbibito, cum aqua

aqua graminis, asparag. & apij.

Si quis in calculo minuendo vti velit pilulis, his adiungat semen paliuri, ocræ, lapidem iudaicum, lapidem spongiæ, cinerem capitis muris, lumbricorum, scorpionum, & astragali leporis. Ea enim efficacissima sunt ad comminuendos calculos tam vesicæ, quam renum hoc modo.

Ad renum & Vesicæ calculum.

℞. pilularum postremò præscriptarum 3. ℞. ocræ, seminis paliuri an. 3. j. cineris scorpionum, vel aliorum supra enumeratorum ʒ. j. reducantur in formam pilularum cum oxymelite, si calculus retineatur in poris urinariis à pituita lenta. Sin adhuc sit in renibus, cum aceto, succo limonum, citri, vel malorum acerborum, vel cum succo hyperici, & superbibatur vinum dilutum aqua graminis, asparagi, vel saxifrag. aut decoctum fœniculi marini recentis, vel conditi cum aceto. Sin autem calculus urinam retineat, tunc maior quantitas urinas prouocantium addetur, si non retineat, minor. Hæc medicamenta excipiuntur interdum terebinthina, quando scilicet urina retinetur à frigidis humoribus. Calfacit enim & fundit humores. Interdum lenta quædam adduntur, vt semina mal. bismal. fœnugr. vellini, cum scilicet timemus ne exulceratio in renibus fiat, aut vesica, ab asperitate, & acrimonia eorum medicamento- rum. Adduntur præterea quatuor semina frigida maiora minutim incisa, cum urinam prouocare volumus, aut caliditatem aliorum medicamentorum minuere, & temperare, veluti semen alchecangi, opium, & alia narcotica veteres addere solebant in doloribus mitigandis, quod etiam interdum nunc fieri necesse est, vt cum vehemens dolor ægrum cruciat. Permisceatur autem diu opium, si eo statim sit vtendum, dissoluatur in vino maluatico calido, & cum castoreo, myrrha, styrace diligenti simè permiscebitur hoc modo.

Ad dolorem calculi mitigandum.

℞. opij ʒ. j. styrac. croci, myrrh. castor. ana ʒ. ℞. Incorporentur simul cum vino maluatico, & pistillo calido, in mortario calido diu permisceantur. His deinde addatur 3. j. pilul. postremò præscriptarum.

Castigantia opium.

Ad Ulcera renum & Vesica.

IN vlceribus harum partium sunt pilulæ, tum ex his, tum ex consolidantibus, & exiccantibus. Non enim possunt medicamenta astringentia integris viribus eo peruenire, nisi admisceantur, quæ tenuitate partium ea ad eas partes deducant, vt

℞. gummi tragac. & arab. leuiter assiatorum, coral. rub. sang. dracon. boli armeni præparati secundum artē ana ʒ. ss. mastich. Lapidis iudaici ana ʒ. j. seminis melonum, alcherangi ana ʒ. ij. seminis bismal. ʒ. j. cum succo caudæ equinæ, vel narcissi, quia neruos discissos curat, & partibus neruosis prodest, formetur pilulæ. Quod si vlcus inferat magnum dolorem ob caliditatem, semen papaueris addimus. Sin doloris vehementia suadet, opij paucam quantitatem castigati addimus. Castigatur autem ad dolorem colicum, & nephriticum supradictis medicamentis, id est, multum calfacientibus & concoquentibus, vt euphorb. castor. croco, pipere. Ad dolorem vlcæris myrrha, styrace, vel thure. Ea enim & opium castigant, & vlcus detergunt citra magnam calfactionem. Idem esto iudicium in arteriacis aut pilulis ad retinendos catarrhos tenues, & vlcera pulmonis, quæ sunt ex leuiter detergentibus & incrassantibus hoc modo.

℞. Gummi tragac. & arabic. ana ʒ. j. amyli ʒ. ss. corti. thur. styrac. an. ʒ. j. myrrhæ, succi liquir. ana ʒ. j. opij ʒ. j. cum sapæ excipiantur, & reducuntur in formam pilularum ʒ. j. fiant pilulæ x. ex quibus sumantur duæ vel tres tempore somni longè a pastu.

Ad pulmonum Ulcera.

SI ad pulmonum vlcera hæ pilulæ parantur, assari debent gummi, & addantur terra sigillata, bolus armena, sang. draconis, mastichem. corallum, aucta detergentium quantitate. Quod si vlcus fuerit sine inflammatione, pilulis pro defluxione factis sine vlcere opiū, & quæ minus detergunt maiore quantitate sunt ponenda, & loco sapæ excipiendæ sunt succo de papauere, vel syr. de iuiubis, quoniam incrassare magis oportet, & refrigerare. Idem fiet in vlcere pulmonum, vesicæ, renum cū inflammatione facto, & hæc habuimus de pilulis dicenda. Nunc ergo sequitur, vt de pulueribus dicamus.

Quibus castigatur opium.

De pulueribus.

OMnia ferè medicamenta sicca in pulueres reducuntur, non vt in eadem forma omnes remaneant, sed vt in trochiscos, electuaria, antidota, opiatas, & alias formas reducantur. In forma autem puluerum remanent, quæ ad calfaciendum, refrigerandum, exiccandum, non autem humectandum conueniunt. Illa enim forma apta non est ad humectandum cum sit actu sicca: quanquam nostri practici puluere resumptiuo, & puluere diatragac. ad humectandum corpus frequenter vtantur. Sed hi pulueres recentes dispensari debent, hisque recenter dispensatis vtendum, reducendiq; in opiatas, ne eorum humiditas citò euanescat. Commodissime autem parantur pulueres ad constringendum, & laxandum ventriculum, hepar, & intestina corroboranda, oculorum vitia, dentes, & vlcera resiccanda, ad contusa, ad dolores sedandos, & sudores arcendos. Differunt itaque pulueres operatione, & partium respectu. Quidam enim sunt capitales, stomachici, hepatici, alij ad constringendum apti, alij ad concoquendum, alij ad chyli distributione iuuandam. Alij status discutiunt, alij menses & vrinas mouent. Alij vlcera resiccant, carnem minuunt, cicatricem inducunt, aut dolores sedant, sed nos à capitalibus incipiamus. Primus itaque vsus capitalium puluerum fuit, ad vlcera capitis resiccanda. Eos vero Medici ad cerebri exiccationem, capitis dolores, & defluxiones deinde vsurparunt. Exiccatiuus autè paratur ex insigniter resiccantibus, additis quibusdam, quæ sunt tenuium partium, & quæ sunt odorata, præterquàm in dolore capitis. Odorata enim capitis grauitatem inducunt. In summa horum puluerum materia herbæ capit. exiccatae sunt, vt beton. meliss. organ. & huius generis herbæ calidæ & siccae, & vtrunque odoratae, vt flores rosarum, saluæ, stechad. vtriusque, centaurij minoris, hyperici, & similium, cortices mali panici, citri sicci, macis, thur. cinamomi, pini cortex & fructus. Item myrtill. nux moscata, coriandrum, sandali omnes, myrrha, thus, sang. draconis. aliisque succi vel lachrymæ, quæ in puluere reduci possunt. Adduntur & metallica, vt antimoniu in vulneribus duræ menyngis, antispodium, frigida.

*Differen-
tia pulue-
rum.*

Capitales.

*Ad capi-
tis dolore
à causa
frigida.*

tuthia, alumen. Communiter tamen ex his parantur pulueres, vt pul. ad sedandum capitis dolorem, & corroborandum à caussa frigida, vt

℞. coriandri, ros. ana ʒ. β. nucis moscatae, macis gariop. santal. omnium, granorum tinctorum ana ʒ. ij. fiat pul. tenuissimus, vt alcohol. Hic pul. medius est, & communis quo vti possumus in statu doloris capitis, & cum caput corroborare volumus.

Ad capitis dolorem à calore, & ad phrenitidem.

Satius autem erit pulueres refrigerantes, calfacientes, & medios habere, vt ad refrigerationem capitis, & in vehementi capitis dolore à calore, & in phrenitide. Conficitur autem hoc modo.

℞. coriand. ʒ. ij. flor. nymph. ʒ. iiij. viol. ros. ana ʒ. ij. semin. lact. & papaueris an. ʒ. j. coral. rub. ʒ. j. β. sandal. rub ʒ. ij. fiat pul. tenuissimus, quo sinapisetur pars capitis anterior. Hic pul. recipit partem quandam santalorum, quia sunt quaedam admiscenda magis tenuia, ad aliorum penetrationem, propter quam occasionem aliquando admiscemus parum spicae, scaenanthi, florum anthos vel stech. irrigamus cū oxyrhodino, deinde sinapisamus. Fiet frigidior pro caussa maxima, vt in phrenitide, si capita papauerum, pro eius semine, & parum corticis mandragorae addiderimus, quod fieri non debet nisi in summa necessitate, & additis quibusdam calidis, ad eorum correctionem hoc modo.

Ad phrenitidem vehementissimam.

℞. Florum viol. nymph. ana ʒ. j. ros. ʒ. β. flor. camom. ʒ. ij. cap. papaueris, vel cortic. mandrag. ʒ. j. seminis papauer. albi ʒ. ij. semin. anis. aneth. granorum tinctorum ana ʒ. j. fiat puluis. Hic ad mandrag. & cap. papauer. albi castigationem adduntur, non omnia quae calefaciunt, sed quae tantum calefaciendo somnum possunt inducere, vt semen anisi, anethi, crocus, styrax, radix iridis. Nam haec omnia replendo caput fumis somnum conciliant, & vtcunque discutiunt. Neque omnino est reiciendum castoreum in phrenitidis, & lethargi declinatione, quia illa frigida emendat, & inflammationem cerebri discutit, teste Dioscoride.

*Ad calfaciendum & discutiendum in causa
frigida, & lethargo.*

R. Nucis moscatæ, macis, galangæ ana 3. ij. gran.
tinct. cinamomi ana 3. flor. stech. ros. rosmar. camom.
ana 3. j. β. cortic. citri sicci ʒ. j. scœnanthi, spicæ celticæ
ana ʒ. β. fiat pul. tenuiss. quo utimur in declinatione
phrenitid. aut lethargi, aut in somno profundo, maxime
si addatur castoreum vel costus.

Ad capitis dolorem à vaporibus ortum.

IN dolore autem capitis à fumis orto abstinendum est
à nimium odoratis, sed primum fieri debet pulvis re-
pellens ad prohibendum ne fumi recipiantur in caput:
postea ad discutiendū ex digerentibus, & resoluentibus.
In incremento debemus ex his duobus mediū conficere
medicamentum ut partim digerat, partim discutiat, ut
R. flor. nymph. 3. β. coralli rub. balaustiorum, fol. su-
mach. exiccatorum ana 3. iiij. santal. rub. cortic. citri ana
3. j. fiat pulvis, ut alcohol. Hæc sunt inodora, aut non ad-
modum odorata, quibus etiam addi possunt semina fri-
gida minora ut port. endiuizæ, caput papauer. baccæ
myrthi. Post inunctionem ex oxyrrhod. inspergi debent,
aut cum puluerisantur, irrorari pauco aceto, & aqua pe-
culi ros. Pro augmento verò talis redditur augendo quan-
titate citri, santali, & granorum tinctorum, aut adden-
do flores rosmar. qui non multum redolēt. Difficile au-
tem est pulverem digerentem citra odoratorum admix-
tionem conficere. Ex his itaque minus redolentia & ca-
put minus ferientia, sunt eligenda. In declinatione verò
minus religiosè id est observandum, quòd caput iam
fortius redditum sit, nec fumi facilè iam tum caput con-
scendunt, factis frictionibus, ligaturis, & aliis necessariis
ad reuulsionem. ut

R. cyperi 3. β. flor. anthos 3. j. cortic. citri sicci, gra-
norum tinctorū, sandali albi, & rub. ana 3. ij. misce, fiat
reuiuissimus pulvis. Alio modo potest parari pulvis qui
multum discutiet, citra magnum odorem, nempe si quis
sumat quæ descripta sunt ad discussionem. Vruntur om-
nia in furno vasi crudo imposita, donec in pulverem
reducantur, ut fieri solent antispodio. Discutiant infi-
gniter, præsertim sale addito, hoc modo.

℞. cranij hominis ℥b. j. cornu cerui ℥. iiij. coralli rub. garyoph. macis, cinamomi, costi an. ℥. iiij. cyperi, scœnanthi, stech. d. spicæ nardi ana ℥. iiij. Vràtur omnia simul in furno vasi crudo imposita, id est, fictili crudo nouo, vt dictum est. Extinguantur vino & aceto, si in forma pilularum vii volueris. Sin lixiuium propter eandem parare volueris, nulla extinctione opus est. Imbecillius enim redderetur lixiuium, & his adiungi potest, sit parua tamē quantitate. Quia si magna addatur, pilis denudat caput. Eadem de caussa, nec auripigmento, nec sandaraca, nec calce vtimur, nisi quando vrere volumus, aut pilos auferre. Ad capitis autem vulnus potius conficiatur ex sarco- tics maximè hoc modo.

Ad Vulnere capitis.

℞. Myrrhæ ℥. ℥. granorum tinctorum, cyperi, iridis, sarcocollæ an. ℥. iiij. misce, fiat pul. Non incommodè adduntur sandali, & resiccātia, vt antimonium, tuthia præparata. Nam vt cutis capitis dura est, & sicca, ita siccioribus remediis est resiccanda.

Ad vlcera capitis manantia.

AD talia vlcera sunt etiam pulueres: quibus vtimur post capitis deterfionem, & longam frictionem. Confici autem debet ex insigniter detergentibus & resiccantibus, sed quia minùs adhærent, commodum erit prius inungi caput melle, ol. lucernarum, oleo iuniperi, aut oleo nucum hoc modo.

℞. cineris nucum antiquarum ℥. ℥. fuliginis furni ℥. j. ℥. sulphur. ℥. ij. aluminis (Alumen enim constringit partes sanas, ideo impedit dilatactionem morbi) & calchitidis ana ℥. iiij. litharg ℥. j. ℥. misce, fiat puluis. vtatur vt dixi.

Ad pediculos.

QUod si copia pediculorum fuerit in capite, ita parabitur.

℞. seminis staphisag. ℥. ij. salis communis ℥. j. aloë ℥. ℥. cinabaris, id est, cynabrii ℥. ij. fiat pul. tenuissimus, quo sinapisetur caput. Sin hoc remedio non occidantur pediculi, addi poterit parum sublimati, aut argenti viui extincti in sulphure.

Pulueres pro Ventriculo.

Supra pectus non solemus pulueres apponere, vt supra ventrem, aut ad ventriculum calfaciendum, aut constringendum vrimur, inunctione tamen prius facta ex oleis conuenientibus. Efficaciores enim sunt pulueres inspersi, quàm in formam linimenti redacti, vel cerati, quoniam parantur ex odoratis, & odorata coctione exoluuntur, nisi in diplomate decoquantur. Primum enim animaduertendum est supra ventriculum non addenda esse calida, sine aliqua astringitione, neque nimium calida. Calida enim medicamenta calorem imbecillium resolunt, maximè ea, quæ sine astringitione calfaciunt. Pulueres autem calidiores, aut minùs calidi fieri possunt, pro ratione intemperiei, & spissitudinis partium hypogastrij. Nam qui obesi sunt, partes valde spissas habent. Quare oportet medicamentum & fortius & tenuius esse, quò facultas medicamenti ad partem affectam peruenire possit. Qui verò extenuato sunt corpore, pulueres minùs calidos, sed magis astringentes desiderant: quia impediunt dissipationem natiui caloris. Parantur autem ex odoratis, quæ quandam astringitionem coniunctam habent, vt cinamomo, spica, nuce moscata, garyoph. galanga, pipere longo, ladano, hypocistide ad calfaciendum. Ex constringentibus frigidis vt rosis, santalis, coriandro, corallo, balaustis, & similibus ad refrigerandum.

Ad Ventriculum calfaciendum.

R. Galangæ, cyperi, garyoph. ana ʒ. ij. absynthij sicci, mentæ siccæ ana ʒ. ss. misce, fiat pul.

Ad calfaciendum & constringendum.

Quod si simul calfaciendum & cōstringendum fuerit, adduntur calidiora, vt piper longum, aut maior quantitas præcedentium ponitur, additis constringentibus frigidis. Magis enim astringunt, quàm calida.

R. absynthij, cyperi, mastich. macis ana vnc. ss. coralli rub. balaustiorum, sumach. myrtil. ana ʒ. ij. piperis longi, cinamomi crassi, sanguinis draconis ana ʒ. ij. fiat puluis tenuissimus, quo sinapisetur venter, & stomachus, prius facta inunctione cum oleo mastichino, aut lentiscino, aut cytoniorum, & pauco aceto, cum

astringendum est, aut vino albo pauco, cum tantum calfaciendum.

Ad flatus discutiendos.

Quod si flatus discutiendi fuerint, puluere priori utemur, additis quæ flatus discutiunt hoc modo.

R. galang. maior. & minor. cinam. spicæ nard. scænanth. ana 3. iij. cymini, carui maceratorum in aceto, 2. pij. petro. an. 3. ij. seminis rutæ 3. j. misce, fiat pul. quo in, spargatur venter melle perunctus & pauco vino, aut exceptus stercore bubulo, applicetur supra ventric. Animaduertendū tamen est, ista discutientia adhibenda esse circa vmbilicum parte inferiori, tum quia magis flatus redundant ea in parte, tum quia nimis odorata sunt, minusque astringentia, quas ob causas os ventric. contingere non debent.

Puluis pro ore Ventriculi.

Flunt pulueres ad calfaciendum, refrigerandum, exsiccandum, & astringendum os ventriculi superna parte, aut inferiore. Ad calfaciendum autem & exsiccandum multi in officinis parati reperiuntur, nē e pulueres aromatici ros. diagalangæ, rosatæ nouellæ. Ad refrigerandum verò utimur pulueris triasandali, diatrag. frigidi, & aliorum.

Ad constringendum os superius Ventriculi.

In affectibus cereb. per consensum ventriculi, & in vomitu facto à nimia relaxatione ventriculi. Confi-ciuntur autem ex cōstringentibus & prohibentibus fumos, qui nullo odore, vel sapore malo præditi sunt, ut *R.* coriand. 3. ij. coralli rub. vsti & loti (si nimia sit ventriculi humiditas) 3. β. anis. 3. ij. ros. rub. cortic. citri sicci, carn. cydoniorum, vel sorborum, vel pyr. agrest. & exicatorum, aut dul. diacytonitæ ana 3. j. sacchari. ros. tab. q. s. misc. fiat pul. Quod si cum illa astringentia calfacere etiam oporteat, cinamomi non tenuioris, sed crassioris (quod magis constringit, & tentat caput minus) 3. j. addimus. Et quia hic puluis ad fumos conficitur, magnam ideo coriandri quantitatem, & carnis sorborum, cydoniorum, aut aliorum fructuum astringentium, paruum verò cinamomi, aut aliorum calidorum caput tentantium addimus.

Ad vomitum & ventris fluxum.

SI autem constringendum sit os ventriculi, ne vomitus fiat,paretur ex odoratis,& cōstringentibus,neque permiscebuntur euaporationes ad cerebrum.

℞. carnis cydoniorum exsiccatarum ʒ. j. corall. rub. ʒ. ʒ. ʒ. corticis citri sicci, seminis vuarum, vel florum labruscæ ana ʒ. ij. cinamomi crassi ʒ. j. ʒ. ʒ. alias ʒ. j. sacchari ros. tab. q. s. fiat pul. ad fluxum ventris, si sumatur per dimidiam horam ante pastum. Si verò ad vomitum, post cibum, neque superbibi debet quidquam, neque in cibo liquido sumendus est puluis.

Ad iuuandam coctionem, & flatus discutiendos.

PVI. ad iuuandam coctionem, & flatus discutiendos paratur sic.

℞. anis. conditi ʒ. ij. galang. cinamomi crassi ana ʒ. iij. piperis longi ʒ. ʒ. cortic. citri sicci ʒ. j. sacchari solidi ad pondus omnium, fiat pul. qui sumi possit interdum ante, interdum post cibum. frequentius tamen ante, quàm post. Oportet enim ventriculum prius calefieri, quàm alimenta iniiciantur, & calorem oportet esse in fundo, non in parte superiore. Idem vtilis est ad *anadosin*, sed illum dari oportet post primam concoctionem, ne cibum adhuc crudum, in venas, & in vniuersum corporis habitum deducat. Vt autem efficacior sit, & verè digestius, augēda est quantitas cinamomi tenuioris, & piperis: quoniam illa suo calore, & tenuitate partiū alimentii distributionem perficiūt. Quòd si eo tempore detur, ratione Galeni de tuenda sanitate, nullius erit pōderis. Eo enim loco vsum calidorū vituperat à cibo, propter ea quòd cibum adhuc crudū citò distribuunt. Non poterit autem crudum cibum distribuere, si post perfectam ventriculi concoctionem detur hic pul. vt imperamus. Ipse tamen alio in loco diacalamiten & diatrium piperium à cibo dedit, & forsitan eo modo, quo nos docuimus esse dandum. Non vitupero vsum elect. diagalang., aut arom. ros. aut similia, modò augeant ea, quæ magis accommodata sunt ad id, quod volumus facere. Verbi gratia, si constringere volumus, corall. ros. diacytoniten, & alia huiusmodi addimus: Sin flatus discutiendi, anisum. Hoc autem notandum est, nimium odo-

Vsum calidorū à cibo vituperat Gal.

*Hac à cibo
impro-
bantur.*

rata non convenire affectibus capitis, factis à fumis. Sati-
us itaque fuerit ex minùs odoratis parari pulveres &
ab his abstinere, quæ moscum, ambram, crocum, & alia
quæ caput tentant, recipiunt. Cæterum ego eos impro-
bo, qui liquiritiam addere solent: etiam si *adipheys*, id est
fitum sedas sit, et si aliàs aliquid astrictionis habeat. Dul-
cia enim os ventriculi relaxant, & flatus gignunt. Eos et-
iam improbo, qui nucem moscatam, & macem addunt,
cum oleosa sit, ac omnia huiusmodi ventriculū subuer-
tant. Non abs re etiam additur semen fœniculi, & feseli,
pulveribus flatus discutientibus, & digestivis, ut ocula-
ribus, quia tenuat spiritus visorios. Cumino autem, car-
ne, & semine rutæ parçè est utendum, ob eorū saporem
ingratum, & nimiam acrimoniam. Macerentur in ace-
to si ad digestionem cibi pulveres parètur. Sunt, qui nō
verentur folia senæ pulveribus his addere, suamque o-
pinionē stabiliunt autoritate Mesuæ senā oculis con-
venire dicentis, quomodocunque adhibita sit. Non ani-
madvertunt senam laxare, flatus generare, & ventris per-
turbationem. Nullo igitur modo convenit his pulve-
ribus stomachicis non laxativis. Sunt, qui euphras. &
betonic. folia addunt: quod fieri potest, si pauca quanti-
tate addantur, ne amaritudo medicamentum ingratius
reddat.

Ad hydropem & cachexiam.

IN hydropè, cachexia & intemperatura frigida, & hu-
mida viscerum parantur optimi pulveres ex intesti-
nis gallinæ, vel lupi, quia hæc animalia insignem habet
facultatem costricticem, additis quibusdam odoratis hoc
modo.

R. Intestinorum gallinæ cum interna ventriculi tu-
nica, à carne separata & in vino albo abluta ꝑ. j. Vratur
in furno, deinde vino albo, & aqua absynth. extinguan-
tur, & pro qualibet ꝑ. ponatur ꝑ. j. galang. aut cinamo.
aut singulorum ꝑ. ꝑ. vel ꝑ. j. vel ꝑ. ꝑ. sacc. ros. ꝑ. j. misce,
fiat pul. Conficitur etiam ex spongia eodem modo vsta.
Dabitur manè ante pastum, ut ventriculū exiccet.

Ad lateris dolorem.

AD id parantur pulveres ex priapo tauri, cum de-
fluxio.

fluxio cessauit. Nam sic digerit humorem. Idem potest rasura dentis apri sumpta ex vino, & aqua cardui benedicti. Dabitur autem postea quàm confluxit humor. Materiam enim exiccando curat inflammationem.

Ad morsum canum rabidorum.

Fiebat etiam ex cancris fluuiatilibus, & gentiana puluis ad morsuram canum rabidorum, qui etiam fieri potest ex canero marino, vel stagni marini.

Ad pulmonum Ulcera.

Ad id fiunt pulueres ex supradictis, additis terra sigillita, bolo armena, gummi tragac. & arabici, assis,

vi,
℞. ciner. cancrorum, priapi tauri lotorum in aqua ros. an. ʒ. ij. boli arm. terræ sigill. gummi tragac. & arab. an. ʒ. j. seminis papa. albi, & quatuor femin. frigid. maior. incisorum an. ʒ. j. lyquir. ras. ʒ. ij. sacchari ros. tabul. ad pondus omnium, penidiarum ʒ. j. misce, fiat puluis, capiat cum lacte asinæ, aut capræ, aut vaccæ, amota pingui aut butyrosa parte, vel chalybeato. Non multum intererit, etiam si penidias prætermittamus.

Ad morbum articulare & capitis morbos à nimia humiditate.

℞. Cranij ʒ. iij. cineris cucul. & hirund. an. ʒ. ij. cineris priapi tauri vel castor ʒ. ʒ. Verùm quia malè olet, auferri potest galægæ crassæ ʒ. ʒ. sacchari q. ʒ. misce, fiat puluis. Detur manè superbibendo parùm vini albi diluti aqua betonice, vel callitrici.

Ad membrorum contusiones.

Fiunt pulueres ad membrorum contusiones ex astringentibus in principio ad fluxum inhibendum. Quare non solum in parte contusa, sed etiam in partibus vicinis inspergendi sunt tales pulueres præcedente inunctione olei astringentis, ut ros. myrtil. cotoneorum. Nam non solum ros. sed etiam reliqua olea constringentia conueniunt, etiam si vulgus solo ros. utatur Possunt etiam retineri pulueres, si albumen oui fortiter agitatum supra partem adhibeatur, atq; hoc pro certissimo theopremate habendum est, nunquam puluerem aliquem aspergendum supra partem aliquam, nisi præcedente in-

Olea astringentia

unctione, aut perfusione alicuius humoris visci di, vt retineatur, nisi in capite, vbi pili puluerem conspersum satis retinent, aut cum pul. bombace, aut lana excipiat, & supra partem adhibeatur, bombace quidem, aut lana excipiat, cum refrigerare aut repellere volumus. Lana

Quibus excipiuntur pulueres.

Materia.

autem sordida cum attrahere, & digerere, purgata verò & lota, cum modicè calfacere volumus. Malè autem unguimus partes inflatas, & à flatibus relaxatas, vt in hydrope, oedemate, & aliis similibus dispositionibus. Redeamus ad contusa. Puluis igitur ad contusionem fit ex sem. myrrill. ros. siccis, aut rhab. aut capsulis glandium, aut gallis aut balaustris, citrinis aliisque astrigentibus, vt radice bistortæ.

Ad ossa exscammanda.

Sarcotica.

AD ossa exscammanda, & extrahenda dum corrupte sunt, aut post vltionem fiunt pulueres ex sarcoticis vt myrrha, panace, thure, additis quibusdā, quæ sua proprietate existimantur trahere ossa, veluti radix cannari, quæ aculeos, & festucas extrahit. Addunt etiam nonnulli pini corticem, sed sine delectu, & ratione. Nam hic puluis interdum quidem utilis est, & efficax, vt in ossibus, quæ constant substantia rara, aut duabus tabellis, vt chirurgi loquuntur, qualia sunt os crani, os coxendicis, os sacrum: Venas enim habent parte interiore, vnde ex ossibus carnē trahunt. At in ossibus densioribus & solidioribus minùs commendantur, quoniam in illis caro generari non potest in parte inferiore. Sunt igitur inuenienda remedia sicciora epispastica facultate prædita, vt est puluis paratus ex agarico, tartaro, & cineribus ossiū. Talis enim puluis propter agaric. humorem intus latentem, & ossa corrumpentem extrahit propter calorem quem habet, & vim trahendi pituitam. Præterea fæx vini vsta calore suo, & magna siccitate partes ægras à sanis fecernit, & separat. potissimum in corruptionibus ossium à morbo Italico. Grossos item cum papaueris nigri foliis ossa extrahere scribit Dioscor. præsertim si vrantur, & in puluerem reducantur.

Ad cicatricem inducendam.

AD cicatricem inducendam adhibentur pulueres sicci, nulla præcedente humiditate, tum quia multum

tum ficcare volumus, tum quia pulvis satis parti adhaeret. Nam partes, quæ cute denudatæ sunt, semper madesunt, & illa humiditas puluerem conspersum satis retinet. Conficiuntur autem huiusmodi pulueres verè & propriè epulotici, ex rebus carnem cōstringentibus, constipantibus, condensantibus, ac instar calli indurantibus, & exiccantibus, qualia sunt cortex thur. mali granati, gallæ, ostrea vsta, & corallum vstum. Ex accidenti cicatricem etiam inducunt, myrrha, litharg. diphriges, charta combusta, alumen vstum, vitreolum, & alia quæ carnem colliquant, & extrahunt, modò ad exactum leuorem reducantur, & specilli cuspide leniter cōtangant partem affectam. Nam si maiore quantitate, & paulò largiùs quis vtatur, mordicant, carnem colliquant & vlcus concuant. Verè autem epuloticorum quo maiorem quantitatem imposueris, eo citiùs cicatricem inducent. Ad vlcera autem plana, in quibus carnem minuire non oportet, talis fiat.

R. cortic. thur. myrrh. litharg. cortic. mali gran. ana partes æquales, fiat pulvis tenuissimus, & inspergatur modicè. Aut sit ex carnem minuentibus hoc modo.

R. aluminis vsti, æris vsti, aut scammeæ æris ablutæ, gallarum, cortic. mali gran. ana partes æquales, fiat pulvis tenuissimus, & inspergatur modicè. Hic autem obseruandum est æs vstum, scammeam æris, & florem æris abluī in cicatrice inducenda, vt non nihil causticæ facultatis amittant, magisque epuloticum sit medicamentum. Talibus autem medicamentis vtendum in corporibus siccioribus, & partibus minùs sentientibus. Ad carnem autem comedendam sit pulvis ex ære vsto, scammea æris, alumine vsto, chalcitide, aliisque modicè vtentibus, & arrodentibus. Nam auripigmentum inspersum carnes minuit, item sublimatum, frequentius tamen vtitur alumine vsto.

Pulueres ad oculos.

Oculares pulueres sunt detergentes, detrahentes carnem, & cicatricem inducentes. Detergentes fiunt ex modicè detergentibus vt saccharo cando, stercore laceratæ, felle exiccato, cineribus hirundinum, myrrha, aloë. Quia autem oculus propter exactum sensum pul-

ueres non patitur, satius est uti in forma linimenti, aut collyrij, quod aliquid viscosi habeat ad puluerum retentionem. Puluis autem erit tenuissimus: Humectabitur oculus albumine oui, aut decocto fœnugræ. deinde inspergatur pul. albumine oui, quando pul. maiorem dolorem infert. Decocto fœnugræci cum pars laxanda, aut materia concoquenda est.

℞. sacchari candi 3. ij. oss. sepiz, stercor. lacerti ana 3. β. myrrhæ 3. j. fiat puluis tenuissimus. Quoniam si crassior esset, partes exasperaret.

Ad Ulceris in cornea deterfionem.

℞. Myrrhæ 3. ij. sacchari candi 3. j. aloë 3. β. Ad ulceris verò consolidationem fit ex sarcocollæ 3. ij. myrrhæ, thur. ana 3. j. sanguinis draconis 3. β. fiat pul. Vleera ad cicatricem perducta simili puluere, cicatricem in oculo, aut maculam crassam non contrahunt. Pulueribus ocularibus, utimur potissimum in pterigiis. Nam pterigium ex carne confusa factum est, venis capill. oculorum copia sanguinis distentis, quæ sensum exactum non habent, ob id medicamenta detergentia, siue detrahentia ferre possunt. Præterea locus ille rotandus non est, pulueremque recipit, & continet. Insufflantur autem hi pulueres arrodentes, & carnem minuentes, donec ad panniculum adnatum peruentum sit. Confi-ciuntur verò ex variis rebus, sed efficacissimi fiunt ex supradictis, ut alumine vsto, scamma æris, & cæteris. Parantur quoque ex testa ouorū dissoluta in aceto, aut parum vsta, item ex spōgia, aut testis mitulorum tenuissimè confractis. Citissimè minuitur illa pterigij supercretio, si mittatur sanguis, & frequens fiat corporis purgatio, victūque attenuante, & exiccante utatur. Iisdem pulueribus utimur ad ozenas, & polypos, sed propter foetorem odorata quædam addimus, & nonnulla quæ magis astringunt exedendo carnem. Ex odoratis præstat cyperus, cinamomum crassum. ex constringentibus alumen, chalcitis, cortex mali punici.

Ad oris vitia.

IN oris etiam vitiis pulueribus utimur, vel ad columellæ exiccationem vel ad dentes detergendos, incarnandos, confirmandos, & fricandos. Ad columellæ au-

rem exiccationem fit ex pipe. præsertim longo, deinde albo, quia constringendi vim habet. Hunc autem pulverem ex specillo imponemus, & lingua depressa columella contangimus, statim exiccatur, & densatur columella, quæ à pituita à cerebro descendente laxior, aut humidior facta est. Dentes verò detergantur ex pulve. facto ex detergentibus non amaris, nec foetidis, vt sale trito, offe sepiæ puluerisato, ouorum non vstorum pulvere. Vsta enim malè olent: aut ex cineribus cornu cerui, coralli, vel panis hordeati hoc modo.

℞. salis commun. ʒ. iiij. panis hord. ʒ. j. cornu cerui, aut dentium equi vel elephantis ʒ. ij. extinguantur vino, & aqua ros. fiat pulvis medius, id est, non radactus in tenuissimas partes. Oportet enim asperitate partium dentes fricari, & detergi. His puluerib. additur aliquid garyoph. vel cinamomi, vel mosci, ad oris gratiam.

Ad dentium incarnationem.

Incarnantur dentes potius ex corallo non vsto, iride, ros. & myrrha. Sed myrrha cum sit amara, præmittitur, nisi vratur: quia tunc amittit amarorem, & eius loco parum beniouini additur, & sarcocollæ modicum. Cinis cornu cerui, & cinis præscriptus ad deterisionem etiam generant carnem, maximè in pauca quantitate. Firmantur dentes pulueribus factis ex astringentibus, non tamen omnibus. Nam quæ cōstringunt, non solum dentes denigrant, sed etiam pilos vt galla, cortex mali punici, & pleraque alia: ideo corallo in puluerem radacto cum paucò alumine fricamus dentes. Conficitur autem pul. insignis ad dentes dealbandos, firmandos, & conseruandos hoc modo.

Pulvis ad dentes dealbandos.

℞. Summitatum myrthi, lentisci, oleastri, saluæ, ros. mar. ana M. corall. rub. eboris, & dentium equor. ana ʒ. iiij. ponantur in vase fictili, & simul vrantur, addito p. j. salis communis, donec omnia dealbata sint, deinde reducantur in puluerem crassum: cui adde garyoph. ros. cinamomi crassi ana ʒ. iiij. fiat pulvis. Et hoc pul. potest aliquis cum oxymelite squillitico opiatam conficere, & dentes confricare, aut mucilag. gummi tragacanti, aut arab. aut prunorum dentifricia longa conformare,

quibus exiccatis ad deterfionem vti poterit, aut in forma pulueris vtatur. Hic puluis confert ad oris fetorem humiditates reficcando, sed tunc mofcum addere oportet ad oris gratiam.

Pulueres laxatiui.

*Diatur-
bith, diafe-
na.*

Pulueres laxatiui parantur in officina duo, vnus ex turbith, quem diaturbith appellant, ad laxandam pituitam, & pul. diasenæ ad melancholiam purgandam. Possunt & alij confici ad horum similitudinē, veluti ex rhab. ad purgandum bilem, ventriculum constringendum, & reficcandum. Ex agarico, zinzib. sale gemmæ ad pituitæ purgationem cum saccharo parantur. Item ex cineribus tartari vini albi. Laxat enim detergendo, & intestina exiccat. Cōficiūtur ex laxantibus, & detergentibus potissimum, quæ minori amarore, aut minus ingrato sapore sunt prædita, quibus pauca quantitate adduntur corroborantia, & horum operationem accelerantia, & castigantia, veluti cum ex turbith pul. paratur, parum zinzib. additur: Cū ex rhabar. parum spice, aut cinamomi: Cū ex sena aut epith. sal. Nam si maiore quantitate adderentur vim laxatiuam impingerent. Sal commune & sal gemmæ maiori quantitate adduntur, quia & humorem extenuando, & extergendo purgationem adiuuant. His pulueribus saccharum rub. vel mannam addere debemus, saporis gratia. Sed quoniam assumi non possunt hi pulueres sine substantia liquida, minus frequenter in forma vtimur sicca, sed cum aqua aliqua præbemus, aut in decocto galli antiqui, cum pituitam purgare volumus: cum decocto mercur. quando atram bilem agere: cum aquis portulacæ & graminis, quādo vermes occidere, & ex corpore eiicere volumus. Cum decocto hord. pul. rhab. sumitur, cū detergere volumus: aut cum aqua plantag. quando constringere. Quidam etiam ex manna puluerem parant, nonnulli ex diagridio, saccharo & paucō cinamomo crasso, quo vtimur cū agros fallere volumus, ponentes scilicet in iusculo, aut pulpa prunorum, vel passularum.

Ad Vermes enecandos, & eiiciendos.

Parantur ad vermes etiam pul. Occidunt vermes pul. ex amarjs parati, vt pul. hieræ, ex aloë, ex myrrha, ex femi-

*Quomodo
sumendi
pulueres.*

semine fantonici, quod semen contra vermes appellantur quibus vtendum, quando sine febre pueros infestant, *Abſynth.* & sine fluxu ventris. Solent enim fluxum ventris ali *quando &* quando excitare vermes & amara nimium detergendo *tendum.* fluxum augent. Si cum febre infestent, dandus est pul. ex rhabar. cum aquis temperatis, & aperientibus, vt aqua graminis, & aspar. Si cum fluxu ventris infestent, & purgatio sit necessaria, pul. ex rhabar. dandu, erit, cum myrobal. citrinis, & aqua portulacæ. Sin purgatio non sit necessaria, sed corroboratione potius egeat, pul. di- margariti frigid. cum semine portulacæ & citri dari so- *Pul. post e-* let, & cum aquis prædictis addito syru, de aceto. citri, vel *uacuat.* de limonibus. Conficitur item pul. ex constriquentibus & resiccantibus, quæ vtuntur in fluxu ventris post euacu- tionem, vt corallo rub. rasura eboris, cineribus rasuræ cornu cerui. Hic pul. ventrem astringit, & vermes occi- dit exiccando.

Ad mensum prouocationem.

Parantur pulueres ad mensum prouocationem ex fortibus medicamentis ingratis & amaris, vnde in pilulas redigimus hoc modo.

R. myrrhæ, cinamomi ana 3. j. sabinæ 3. *ß.* seminis apij, petros spic. nardi, scœnanth. asari ana 3. j. fiat pul. cap. 3. j. cum succo eryngij. In prouocantibus menses oportet multum humiditatis accipere, quia medicamē- ta hæc non faciliè perueniunt, neque distribuuntur in partes affectas, sed aliquando humores absunt, & e- xiccant: ob id commodè datur post vsum balnei, vel post fotum, vt faciliùs penetrēt ad partem affectam, & sanguis trahatur in eam partem.

Ad vrinæ mouendas.

AD mouendas vrinas conficiuntur pulueres ex his, quæ verè mouent vrinas, quæ acia sunt & calida. Interdum admiscemus, quæ humiditate sua mouent eas.

R. gummi prunorum, carabæ (quæ fundit sanguinem, & ferofam substantiam ab alia separat) ciner. cancro- rum ana 3. j. semina. apij, petro. alkekangi ana 3. *ß.* cina- momi, scœnanthi, azari ana 3. ij fiat pul. tenuiss. vt alco- hol: sumatur manè cochlear vnum, superbibendo cya- hum vini albi, vel ex aquis prouocantibus vrinas, quales

sunt aqua graminis & asparagi. Possunt addi quatuor semina frigida maiora minutim incisa, vt cum vrina cum inflammatione, aut aliqua alicuius partis intemperatura retinetur, aut veremur, ne medicamenta illa nimis calida vlcus exasperent, aut partis inflammationem excitent. Oportet enim istos pulueres diuersos, & dissimiles facere pro caussarum varietate. Nam si propter calculum retineatur vrina, ipse calculus deturban- dus est: ob id lapis iudaicus, ocre, aut talus leporis, & alia pleræque adiungenda, quorum superius meminimus, cum de pilulis ageremus.

De formulis.

F iunt hæc medicamenta ad fluxiones inhibendas, vel ad vlcerū trachiz arteriz, vel pulmonū curationem vel ad raucedinem, & tussim. Quædā hypoglottides dici possunt, quod sub lingua diutius retineantur ad sistendas fluxiones tenues, & acres. Fiunt autem inspissantibus, & iis quibus electuaria parantur. Differūt tamen ab electuariis, quod hæc arida eligantur, quæ vel mucilag. gummi trag. vel arab. excipiantur, vel syrupo, vel albumine oui vel terebinthina, & formentur, quibus resiccatis vtimur, eligimus autem quæ magis ori grata sunt vel saltem minus ingrata, aut apia. Quanquam interdū ex minus dulcibus parari oporteat, propter ægri gustum, aut quia dulcia nimis detergendo, & celerando defluxionem excitent, vt nos aliquando pro cardinale à Turnone parauimus, ex acacia, aliisque acidis, & minus dulcibus, ex quibus magnam percepit utilitatem. Foramina enim illa quæ post vuluam sunt, per quæ pituita expurgatur, laxa sunt, & continuò fluit per ea pituita. Constringenda itaque pars illa est, atque hoc modo parandæ formulæ.

Pro relaxatione Vulvæ.

R. Acatiz ʒ. ss. hypocistidis ʒ. j. boli armeni, terræ sigill. an. ʒ. ij. rosarum, spongiæ bedegar. radic. bistortæ ana ʒ. j. amyli ʒ. iij. cum syrup. de ros. siccis, & myrtill. addito pauco succo cydoniorum fiant formulæ parua, quæ noctu teneantur in ore. Aut maceretur gummi arab. in aqua peculi ros. vel myrtill. addito pauco succo cydoniorum, fiant formulæ parua, quæ noctu teneantur in ore. His formulis nonnulli spicam, vel cinamomum,

num, vel nasturtium addunt. Spica autem ingrata est, & sapore feruido, vnde minus conuenit: nec nasturtium, nec cinam. præsertim tenue, excitat enim defluxiones. Si quis itaque cinamomo vti velit, ad crassorum præsertim pénétrationem, aut potius odoris gratiam, cinamomum crassius addat, quod astringit, vel caryoph. pauca quantitate, vt

R. boli armeni 3. iij. gummi tragac. amyli an. 3. ij. a-cac. corticis mali punici an. 3. cinamomi crassi vel caryoph. ana 3. β . cum syr. de ros. siccis fiant formulæ, quæ in ore teneantur.

Ad incrassandam materiam sit hoc modo.

R. Gummi tragac. arab. amyli an. 3. iij. seminis papauer. albi, terræ sigil. boli armeni an. 3. j. cum syr. iuiub. vel de papauer. trochis. pro nocte fiant. Quod si expectorandum sit, aut inspissandum, ex penidiis, saccharo, gummi tragac. & pauco succo glycir. parabuntur, vt

R. penidiarum 3. j. sacchari candi 3. β . gummi tra- *Ad expecto-*
gae. & arab. an. 3. j. anis. 3. β . succi glycir. 9. β . fiant for- *toratæ-*
mulæ cum syr. iuiub. vel cum mucilag. gummi tragac. *nem.*
vel arab. extracta cum aqua rosarum.

Ad tussim & raucedinem.

SI ad expectorationem, tussim, asperitatem, raucedinem præscribantur ex leuiter detergentibus hoc modo
R. pinearum 3. iij. sacchari candi 3. j. excipiantur mucilag. gummi tragac. extracta cum aqua decoctionis lyquir. hord. aut passul. aut temperabitur hoc modo.

R. liquir. ras. contus. 3. j. pas. mundar. 3. iij. hordei integri p. j. fiat decoctio ad 3. iij. in colatura adde gummi tragac. 3. β . quibus adde pinearum 3. iij. sacchari candi 3. j. fiant formulæ cum pauco amylo, quibus sub lingua repositis vtatur.

Ad asperitatem trachæ arteriæ.

AD trachæ arteriæ asperitatem similes possunt fieri cum decoctione hordei integri. Ad vocis clarificationem additur farina orobi, vel fabarum. Cum detergenda est arteria, pituita liquefacienda, aut tenuis excicanda, & raucedo proueniat ob pituitæ in faucibus concretionem, cubebæ apponuntur hoc modo.

R. farinæ fabar. 3. farinæ hord. 3. β . sacchari candi 3.

ij. succi glycir. ʒ. j. cum mucilag. gummi tragac. extracta cum aqua hord. fiant formulæ. Eligimus farinam fabarum, quia amara non est, ut orobi farina. Si quis farinam orobi velit, sacchari quantitatem augeat. Si parentur ad exiccationem, his addi possunt cubebaram ʒ. ij. Calefaciunt enim plurimum & acres sunt. Addi poterit etiam piper, & alia quæ pituitam fundunt. Myrrha etiam huic affectui satis conuenit, propter amarorem verò reicitur.

Ad pestem.

Formulæ etiam sunt ad aeris pestilentis castigationem, quibus tempore pestis utimur. Aer enim pestilens dum attrahitur, in ore elaboratur, & horum medicamentorum ratione castigatur. Tales autem formulæ non vno eodémque modo parari debent. Nam si constitutio aeris pestilentis sit calida, ut æstate, odoratis frigidis castigabimus, hieme verò calidis odoratis.

Aduersus pestem in æstate.

℞. ros. rub. florum viol. nymph. an. ʒ. j. cortic. citri sicci, & semin. citri ana ʒ. β. coriand. sandal. rub. & albi ana ʒ. ij. boli armeni ʒ. j. cum mucilag. gummi tragac. cum aqua ros. extracta fiant formulæ. In hac compositione eligentur odorata minus calida. Nam calida tempore calido ephemeram excitare possunt. Præterea omnes morbi pestis tempore sunt pestilentes & contagiosi. Summopere igitur cauenda humorum agitatio, & calfactio. Quia autem hæc deglutienda sunt, parum boli addimus, qui inspissando prohibet humorem agitationem, & infectionem. Tempore pestilenti frigido facilius parantur. Medicamenta enim odorata sunt calida. Ex pulueribus igitur odoratis parari possunt hoc modo.

℞. pul. arom. ros. diamarg. frig. an. ʒ. ij. boli armeni ʒ. j. β. cum mucilag. gummi tragac. extracta cum aqua rosarum formentur pilulæ, quas teneat in ore, quibus addi poterit corall.

Ad oris foetorem.

EX solo etiam mosco & saccharo parantur trochisci moscatelini dicti, ad oris foetorem, qui tempore frigido usurpantur, ut supradicti etiam, additis ad ipsum oris foetorem granis tribus mosci. Et hæc de formulis, quæ sub lingua tenentur breuiter dicta sunt a nobis.

De instaurantibus.

Instantia medicamenta dicuntur, quæ ad virium imbecillitatem factam subito vel ob morbum acutum, vel ob euacuationem immodicam fiunt. Parantur autem vel ex succo, aut iure carnis, pulueribus cordialibus, conseruis, & aliis, quæ spiritus instaurare possunt, vel odore, vel substantia, & partes aliquas principes alterare. Fiunt autem tribus modis. Primum hoc modo maiores nostri parare solebant. Carnes capi reiecta pinguedine sumebant, cui in partes diuisæ, lotæque vino, aut aqua cordiali conseruas admiscebant affectui, partive accommodatis. Pulueres igitur & aquas additis quandoque panno aureo, catena aurea, & numismate aureo: quæ singula vitreo vase inclusa balneo mariæ decoquebant, donec pes capi in lebetè suspensus sit, exempli gratia, in feb. ardentibus ad virium conseruationem.

R. conseruæ viol. bugl. nenuph. an. ʒ. j. pul. diamarg. frigid & de gummi ana ʒ. ij. pannic. auri num. vj. aquæ ros. bugloss. acetos. an. ʒ. vj. ponantur omnia in vase vitreo diligenter concluso, atque pasta, vel luto satis obturato, quod vasi aqua pleno impositum decoquitur donec pes coctus sit.

Vt autem studiosi nostram componendi rationem intelligant, patefaciendi sunt errores, qui in hoc componendo committuntur, deinde nostram tanquam meliorem & faciliorem vsurpabunt. Hic autem nulla habetur ratio medicamentorum. Nam carnem crudam pulueribus cordialibus admisceant, ac vnà decoquant, obliui theormatis imperantis, vt quæ longam coctionem desiderant, tenuioribus & leuioribus nunquam in decoctione admisceantur. Nam si quis velit carnem perfectè decoquere, adurentur pulueres, sin pulueres cordiales & odoratos non velint destrui, caro cruda planè manebit. Nunquam igitur medicamenta bona parabunt. Neque recipiendum est illud perfectæ coctionis iudicium. Nā pes diutius decoquendus cum sit, ob eius substantiam duram atque carnosam, non modò pulueres hoc iudicio perierunt, sed etiam ipsa caro nimium cocta erit, & exiccata.

Imposituram quorūdam prætereo, qui catenas aureas decoquant, cum nihil inde dissoluatur præter argentum

*Error.**Imposituræ**ra.*

uium, aut sordes, aut pinguedo quædam, quæ omnia tamen remanent. Nos autem loco carnis crudæ carnem semicoctam, aut ius coctum per quartam horæ partem sumimus, atque in aqua calida calefacere, & permisceri sinimus, deinde percolatum vîdum præbemus. Eodem modo paratum neq; crudum, neque assum, neq; coctum nimis obtinebit, vt in thoracis affectibus.

Mos Parisiensis.

R. iuris capi perfectè cocti lb. ss. aquarum buglossi. viol. ana 3. ij. aquæ capilli ven. 3. ij. pul. diamarg. frig. & diaireos simpl. ana 3. ij. pul. de gemmis 3. j. panniculorum aurinum. ij. misce, decoquantur in duplici vase per quadrantem horæ, coletur & vtatur. Parisienses pharmacop. carnes in alembico distillant, & aquam inde extractam conseruant, & ægrotis præbent, quæ aqua diu seruari non potest, cum adeo tenuis sit, vt spiritus possit nutrire, & reficere. Non erit præter institutum si passulæ addantur, nuclei pinei, vel amygdalæ, potissimum quando pars aliqua thoracis laborat. Si ad pulmonum vitia, ex detergentibus: si ad fluxum, ex constringentibus & exiccantibus additis nutrientibus odoratis, & cordialibus, vt in cibo sit medicina, & in medicina cibus, vt Hipp. imperat. In affectibus thoracis abstinet ab astringentibus: in omnibus aliis leuiter astringentia cordialibus admisceantur, quia virium dissolutionem impediunt, & partem roborant.

De medicamentis mollibus, ac primùm opiatis.

Differencia.

DE medicamentis in forma liquida & sicca iam dictum est: superest vt nunc de iis agamus, quæ mediam inter hæc naturam habent, quæ scilicet neque humida sunt vt syrupi, neque sicca vt pulueres, tabellæ, trochisci, pilulæ sunt. Ea porro medicamenta conficiuntur ex succis humore quodam coniunctis, aut ex mollificationis substantia, vulgò opiatæ dictæ, & confectioes. Differunt autem opiatæ, sine, siue operatione. Quædam enim ad partiam alterationem fiunt, vt ad ventric. alterationem, aromaticum ros ad cordis, confectio alkermees ex granis tinctorum: aduersus venena, confectio de hyzinto. Ad caput, aurea Alexandrina. Hæ omnes ferè calfaciunt, & exiccant. Nonnullæ verò fiunt ad doloris sedationem, vt confectio Philonij asyncrita, à colo verò colica

colica dicta est ab antiquis, quia narcotica. Aliæ ad laxandum vt hiera picra, colocynthis Archigenis. Lohoc de cassia, catholicum ad communia recremēta vacuanda. Ad pituitæ vacationem, diaphenicum, indum maius, quæque ex phlegmaticis conficiuntur. Ad bilem, electuarium de psillio, diaprunis simpl. & solutium. Ad atram bilem, confectio hamech. Confectiones aut ecceproticæ sunt, aut succus, aut herbarum decoctione ex causa, aut pulpa tamarindorum, passularum, prunorum, ad inspissationem scilicet. Eodem modo duæ paratæ in officinis reperiuntur, diacass. & diasebesten, vt diacassia cum melle, & diacass. cum saccharo. Si quis delicatam admodum facere velit diacassiam, poterit hoc modo.

Ad recrementa communia euacuanda.

R. mercur. M. ij. ciclæ M. j. pass. prunorum, sebest. sic. ana pa. xxx. anis. 3. iij. flor. viol. p. j. fiat decoctio & extrahatur pulpa pass. pruno. ficuum, sebesten, & cum pulpa cass. fiat opiata decoctione incorporata. Accipimus fructuum maiorem numerum, quia opus est illorum pulpa satis copiosa: quia pauca futura est extractis pelliculis & nucleis. Quæ si diu seruanda est, decoctioni addendum sacchari q. s. atque in syr. coquēda, cū quo fit opiata: hæc excrementa communia purgabit. Si quis autem affectus pulmonis velit sanare glyc. addet. Ad reliquos autem humores vacuandos, addenda sunt medicamenta propriè trahentia succos eos, veluti si hæc compositio receperit rhab. aut succum ros. aut syr. ros. laxatiuum fiet tantum biliosa: Sin decoctioni addatur carthamus, agaric. polypod. pituitosa: Sin thymus, epithymus, sena, polypod. in maiori quantitate, quam in priore decoctione fit melancholica. Hac vtimur ad ventris astrictiōnem sine aliqua affectione alicuius partis. Si sanus sit, potest tuto ex omnibus istis humidis & detergentibus alium molliētibus parari, veluti si quis opiata ex catholico & cassia paret, poterit addere senam, agaricum, cineres tartari. Si vlcus sit in renibus aut vesica, nullum ex his ponendum: Sena enim & agaricus exasperant partes affectas, quod & carth. facit. Si autem calculo sit obnoxius, ficus possunt addi (a quibus abstinendum, si

Hæc communia excrementa vacuat. Biliosa. Pituitosa. Melancholica.

Cautiones

Ficus.

Cassia.

vlcus adfuerit, quia vim habent suppurandi) quod in vl-
 cere non est faciendum. Colico affectui, obnoxiiis, &
 aluum lubricam habentibus, non est opus addere cas-
 siam. Cassia enim sua lubricitate lienteriam excitaret,
 & flatus gigneret, nisi prius castigata fœniculo, aut ani-
 so, aut aliquot granis piperis. In ardore vrinæ castiga-
 tur semine berberis, eoque modo fit opiata eccopro-
 tica, neque vlceribus, neque colico dolori contraria. Cæ-
 terum si fieri possit, gratæ fiant opiatae, mouendæ aluo
 accommodatæ, quæ nullis affectis partibus noceant,
 quod fieri potest, quemadmodum hæc semine berberis
 addito non admodum nocet sua acrimonia, aut aniso
 addito in flatulentis affectibus. Pectori autem, ventri-
 culo, hepati, & nervis magis accommodantur, si vel suc-
 cum in ea parte redundantem euacuent, vel ea quæ par-
 ti affectæ conueniunt, quæque eius læsionē impediunt,
 recipiant, veluti fit pectoralis ex pulpa pass. ficuum, &
Pectoralis. dactylorum, maximè autem additis agarico aut cartha-
 mo aut polypod. aut sena, atque inspissata syr. viol. si
 materia sit calida, aut si crassa sit materia, syrup. de gly-
 cir. vel paretur modo sequenti.

Opiata pectoris.

℞. polypod. querc. recentis q. j. liquir. ras. 3. j. pass. e-
 nucleatarum, fic. an. pa. xx. dactylorum mundatorum, &
 parum maceratorum in aqua hordei: vel aqua & vino
 albo, num. x. anis. 3. ij. fœnic. 3. j. seminis melonum 3. ij.
 bismal. 3. j. flor. viol. p. j. fiat decoctio in sufficienti aqua,
 donec mollescât fructus, cōtundantur, & trāsmittantur
 per pannum rarum canabinum, & colaturæ adde sac-
 chari q. s. fiat syr. cum quo fiat opiata, cui addi poterunt
 agaricus, medulla carthami & sena in puluerem reda-
 cta. Talis autem compositio & capitalis & pectoralis e-
 rit, non quod ad caput penetret, verum quia humores
 capitis, quibus repletur, & infestatur, euacuet. Nec pro-
 hibet etiam si parum cinamomi addatur ad gratiam,
Capitalis
& pecto-
ralis. Penidias autem addi prohibet, quia inspissant, & molem
 augent, & iuiubæ, et si deterfionis non sint expertes.

Pro hepate.

Hepaticis affectibus, maximè qui cum obstructione
 fiunt, cōuenit præcedens opiata, paucis admodum
 additis,

additis, quæ & detergunt, & pituitam trahunt. Obstructiones auferunt materiam trahendo, aut potius ne fiât impediunt, aduersa pituita, ne in venas ingrediatur. Fit igitur hepatica, addita spica nardi, vel celticæ paxillo, vel azaro, vel cinamomo. Ad obstructions ab hepate calefacto eadem erit vsui. Verùm ad ventris obstructionem cum calefactione alio modo parabitur. Fructus enim feruorem bilis extinguentes vsurpandi sunt, *vt Extinguentes bilem fructus.* pruna, sebesten, tamarindi, vt,

R. prunor. sebest. ana pa. xxx. pass. pa. xv. anis. 3. ij. quatuor seminum frig. maior. 3. iij. flor. viol. bugloss. borrag. ana p. j. fiat decoctio in aqua endiuix & pulpæ fructuum extrahantur, & transmittantur, quibus addetamarindorum 3. ij. cass. recenter extractæ 3. iij. seminis berber. 3. j. β. rhabar. electi irrorati decoctione 3. iij. & cum vna decoctionis parte in syrupum redacta fiat opiata, vel cum syr. rosaceo laxatiuo addito cinam. 3. j. sumantur mane, in forma boli 3. j. aut in decoctione cichorij vel pulli.

Pro liene.

Splenetica fient illa pituitosa seu phlegmagoga additis senæ folliculis & cuscute seminibus, & si sumatur cum decoctione mercurialis, vt,

R. decoctionis prædictæ ad opiata pituitos. lb β. sen. orient. cuscute, summit. thymi ana 3. j. flor. genistæ, anthos, borra. & tamarisci, an 3. β. fiat decoctio, in qua diss. sacchari q. s. fiat syr. coctus ad perfectionem, quem inspissabis capiendo pulpæ cass. 3. vj. pulpæ pass. & sebesten ana 3. j. senæ orient. tenuiss. pulueris 3. j. β. medullæ seminis carthami & epithymi ana 3. iij. fiat opiata.

Ad calculum renum & vesicæ.

Quædam etiam opiata fiunt ad calculos renum & vesicæ, ad vlcera & calfactiones earundem partiũ. Ad calculos parantur ex detergentibus, relaxantibus, & flatus discutientibus, leuiter incidentibus & prouocantibus urinam.

R. radic. bismal. 3. ij. liquiri. ras. radic. eryng. ana 3. j. pass. sic & sebest. an. pa. xxx. anis. fœnic. an. 3. ij. apij. petros. ana 3. β. florum viol. chamom. & genistæ ana p. j. fiat decoctio in aqua decoct. cicer. rub. in vnâque parte

decoctionis in syr. coctæ cum melle & saccharo, additis medullæ cass. 3. vj. pulpæ fic. pass. extractæ, fiat opiata, de qua sumatur ad deterfionem renum hora vna ante cibum, ne hi fructus vertantur ad alimentum.

Ad Vlcus renum.

SI vlcus adfit vel inflammatio, ardorem extinguētia, & leuiter detergentia sine morfu tamen, ex vfu erūt, ne vlcus irriteretur, hoc modo.

R. cass. recenter extract. 3. iiij. tamarindorum electorum ad acrimoniam extinctionem, & pulpæ sebestenana 3. j. mucilag. seminis psilij 3. vj. cum syrupo viol. fiat opiata, quæ sumatur cum aqua hord. vel decoctione pul. li. Decoctio autem hæc ficus non recipit, quia sua acrimonia partem lædunt vlceratam, nec senam, quam idæ facere credunt, nec dissolutionem flatus, nisi paucam a nisi quantitatem quis velit adiungere. Præterea neque berberis semen addimus, nec vrinas prouocamus. Nam acida pungendo partem vlceratam lædunt.

Ad morbum articulare.

AD articulare morbum leniendum, communis, vel pituitosa sufficiet opiata, ad deriuationem tantum, non autem eradicationem. Eadem sufficit ad recrementorum communium euacuationem.

Ad alterandum & confortandum.

Funt & opiata ad alterationem & confortationem, quæ alteratiuæ & confortatiuæ dici possunt, quas pharmacopolæ cordiales vocant. Sunt tamen & stomachicæ, & ventriculares, pulmonariæ, renales, vesicales, articulares, cerebrales, nervosæ, menses & vrinas mouentes, & calculos comminuentes. Fiant autem ea conferuis parti & morbo accommodatis, ex pulueribus, & syr. vel melle, vel his omnibus simul, vt ad ventriculum refrigeratum, calida ad relaxatū, & fluentem sicca, & astringentia præscribimus: Vt ex conferuis conferua cortic. citri, eryng. anthos, zinzib. conditum. Ex pulueribus aromaticū ros. diarrh. diagalan. rosata nouella. Ex aromaticis denique confectiōibus, vt garyophil. ad calfaciendū sine astrictione. Præterea ad alios affectus etiam dari possunt, vt capitis neruorum, & ad refrigeratum ventriculum & ad nimis humectatum talis fiat opiata.

*Ficus &
senareii-
ciuntur.*

Pro refrigerato Ventriculo.

R. Conferuæ eryng. & cortic. citri ana ʒ. j. florum an-
thos 3. iij. confect. aromat. rosac. ʒ. j. cum syrupo
conseruationis corticis citri, fiat opiata, sumatur tribus
horis ante pastum. Fiant etiam opiata sine conseruis,
ex pulueribus, aucta quantitate syrup. addito saccharo
hoc modo.

R. confectio. aromatici ros. ʒ. i. diagalang. diarrhod.
abb. vel rosatæ nouellæ ana 3. iij sacchari parum, cum
syr. conseruæ cortic. citri, fiat opiata, sumatur ad quan-
tatem auellanæ, superbibendo parum vini diluti aqua
absynth. vel mentæ, vel fiat sic.

R. zinzib. conditi cum saccharo ʒ. j. pul. diarrhodi
abb. 3. iij. aromat. ros. 3. ij. cum syr. de menta, fiat opiata,
capiat, vt dictum est.

Pro Ventriculo relaxato.

Quod si ea relaxatio sit cum larga humiditate te-
nui, & refrigeratione, post vsum pilularum hoc e-
rit vtendum.

R. myrobalanorum conditorum nu. i. vel carniū
cydon. (quæ magis probantur, quàm myrobalani) cor-
tic. citri conditi, zinzib. conditi ana ʒ. i. confectio. aro-
matici ros. ʒ. ij rasuræ ebor. corall. rub. & vsti, & loti in
aqua mentæ ana ʒ. ij. ciner. intestinorum gallinæ, & lu-
pianæ ʒ. iij. cum pauco syru. conseruæ cortic. citri, fiat
opiata, sumatur, vt dictum est.

Quod si maior sit ventris relaxatio, & intestinorum,
eaque cum fluore lienterico, tum augenda est magis a-
strictio in fine, veluti si addantur diacydonites 3. ij. quod
magis astringit, aptior erit ad siccandum cum astrictio-
ne, & calfactione. Aut fiat sic,

Pro Venteria.

R. Myrobal. emblicorum nu. i. (si pauper fuerit) cy-
doniorum ʒ. i. corticem citri conditi ʒ. i. pul. diacy-
donites 3. 2. diarrhodi abb. & ros. nouellæ ana 3. i. coral.
rub. vsti ʒ. j. ʒ. conseruæ acori collatæ & tranſmissæ per
cribrum 3. vj. cum syrupo, de cytoniis, fiat opiata, suma-
tur ante cibum.

Pro dysenteria.

SI vero est de dysenteria, refrigerandum erit & con-

stringendum. Conserua itaque ros. antiqua vsurpanda; caro cydoniorum: prætermittendum zinzib. cortex citri & alia. Fit autem ex astring & refriger. hoc modo.

R. carnis cydon. conditæ ʒ. j. conser. ros. antiq. ʒ. j. ʒ. pul. coral boli armen. an. ʒ. ij. diamarg. frig. ʒ. j. cum syr. cydon. fiat opiata, sumatur manè.

Quod si magis astringendum, veniendum ad trochif. exiccantes, & constringentes, quales sunt trochif de spodio, de terra sigillata, & similes.

Ad refrigerandum Ventriculum.

AD refrigerationem tamen vsurpamus conseruas, alias partes refrigerantes, vt

R. conf. ros. nenuph an ʒ. ʒ. pul. diamarg. frig. & triand. an. ʒ. ij. diarrhodi abb. ʒ. ʒ. corall. rub. ʒ. j. ʒ. cum syr. viol. fiat opiata.

Ad humectationem Ventris, totiusque corporis.

AD humectationem ventric. & totius corporis paucas paramus opiatas, quia & potu potius, quàm medicamentis humectamus. Quod si quis vti velit, fiat sic.

R. conseruæ rad. bugloss. & borrag. conseruæ viol. & satyrionis (humectat enim, & pinei in morbis siccis & melancholicis, etsi excitent venerem, idem faciunt ob flatus, qui possunt discuti aliis medicamentis) an ʒ. j. pinearum (quia humectant, sed facile conficiuntur, calor verò remittitur ablutione infusarum in lacte, quat. sem. frig. maior. mundat. sem. bombac. ana ʒ. ij. carnis testud. præparatarum (quæ habent humiditatem non facile dissipabilem) ʒ. j. anis. ʒ. j. cinam. ʒ. j. fiat opiata cum syr. de bugloss. vel borrag. Hæc humectat, refrigerat & nutrit, in qua additum est anisum, quia, quæ humectant, vt radic & earum conseruæ flatus gignunt, ob id parum addendum censeo. Cinamomum verò ad gratiam tantum & iuuandam concoctionem Diatrágac. non conuenit, propter camphoram, quæ fortissimè exiccat. Puluis resumptius non valet, nisi præparetur recenter, quia semina illa facillimè rãcescunt. Præparatio testudinum & viperarum, vt concoquantur.

Pro hepate opiata.

AD hepatis alterationem & apertionem fiunt opiata ex his, quæ partem ipsam spectant, & alterationi ad-

ni aduersantur, quibus hepar calefit, refrigeratur, humectatur, & reficcatur. Cum autem id sit, totius corporis habitus afficitur. Non enim fieri potest in tali parte alteratio aliqua insignis, citra sensum aliarum partium, quæ per venas sanguinem recipiunt. Itaque nullo existente affectu, aut paruo admodum, vt aliarum alterationes & inflammationes castigantur, ita vt eius partis, quæ ab hepate calefacto, refrigerato, humectato, exiccato totum corpus affectum similem sentit.

Ad calfactum hepar.

AD opiatam pro calfacto hepate præscribendam videndum est, num calefactio ex intemperatura traxerit originem, sine fluxu substantiæ, atque tunc pars tantum alteranda est: Sin ab inflammatione, aut à bile retenta, tum refrigeranda est his, quæ leuiter aperiunt, nec prætermittenda, quæ non multum constringunt. Conserua itaque ros. caro cydoniorum aut alia hinc ex usu non erunt, quia à parte inflammata alterantur: sed detergentia, & biliosa recrementa euacuantia erunt adhibenda. Conuenit ergo conserua capil. vene. quauis ad primum gradum calefaciat, quia resoluendo obstructions, refrigerat per accidens. Conser. item cichor. in hepatis inflammationibus multum prodest, quia aperit obstructions, & expurgat, viol. bugloss. borrag. non sunt aduersæ, quia humidæ, & minus calidæ. Pulueres item, qui simili facultate præditi sunt, usurpandi.

Ad calfactum hepar cum obstructione.

R. conseruæ flor. cichor. & capill. vener. ana ʒ ss. conseruæ viol. ʒ. iij. pul. diatragac. frig. & triasand. ana ʒ. ij. quat. semin. frigid. minutim incisorum ana ʒ j cum syrupo endiuicæ, fiat opiatæ, quæ erit ad calfactionem obstructione, & inflammatione hepatis. Quod si refrigerandum tantum sit, nulla existente obstructione, omnes conseruas refrigerantes usurpandas esse censeo, vt conseruam nenuphar. & similes.

Ad obstructionem maiorem in ictero.

AD obstructionem maiorem parantur, sed considerandum, quis affectus hanc sequatur an icterus, an aqua intercus. Nam si fuerit icterus, aperiemus cum quadam deterfione, & refrigeratione. Si aqua intercus, ape-

riemus obstructions exiccando, & facultates hepatis magis confortando seu roborando.

Ad icterum.

R. Conferuæ capil. ven. rad. apijana 3. j. ʒ. flor. cichor. vel calendulæ 3. j. pul. triafant. 3. ij. diarrh. abb. 3. j. quat. sem. frig. maior. minutim incisorum ana 3. 2. cum syr. endiuæ composito, fiat opiata, de qua cap. superbibendo. aquæ gram. vel cichor. vel endi. 3. j. Si autem sequatur aqua intercus, corroborandum est magis iecur corroborantibus & exiccantibus, vt.

Ad aquam intercutem.

R. Conferuæ flor. cichor. capil. vener. ana 3. j. pul. diodori abb. & aromat. ana 3. iij. triafand. 3. 2. hepatis lupi 3. j. ciner. intestinorum lupi 3. ij. cum syrup. de eupator. fiat opiata, sumatur ad quantitatem auellanae, & superbibantur aquæ de absynt. 3. ij. Tales opiatae quodammodo ad caliditatem vergunt, & ad paruam refrigerationem viles erunt, quæ cachexiam facere incipit. Sin maior sit refrigeratio, dialaccam accipiemus, dialcurcumam, aromat. ros. diagalang & confer. radic. apij, hellenij, vel anthos, hoc modo.

R. conferuæ anthos, & rad. apij, ana 3. ʒ. confectiois aromat. ros. 3. j. pilu. diarrh. abb. j. trochisc. de eupat. 3. ʒ. cum syr. de bizan. vel de menta, vel de eupat. fiat opiata, de qua cap. superbibendo vinum dilutum cum aqua absyn. Adduntur etiam trochisci de absynth. de rhab. e-nulæ campanæ & endiuæ.

Pro splene.

AD splenis intemperiem eodem ferè modo, & iisdem remediis vtimur, nisi quod fortius aperimus obstructions, atque imperamus, quæ splenem magis respiciunt, vt. conferuam florum tamarisci, ceterach, scolopendrij, & potissimum ex trochiscis de absynthio, vel de eupat. capparibus, vel similibus fortioribus, idque ratione materiæ, non substantiæ, sic.

R. conferuæ radic. apij, (quia multum aperit) 3. j. conferuæ ceterach, & capilli veneris ana 3. ʒ. pul. diarrhod. abb. trochisci de cappar. ana 3. j. cum syr. acetoso, fiat opiata, de qua cap. superbibendo aquæ foenicu. vel ferratæ, vel port. vel rusci, vel asparagi, vel grami. 3. j.

Splen

Splen autem intumescit non ob melancholiæ copiam, sed potius ob flatum circa illam partem congregatos, & retentos. Parâda itaque remedia ex constringentibus, & flatum discutientibus. Astringentia enim prohibent eius inflationem & eleuationem, & quod receptum est, discutunt. Discutiunt autem semina maiora, & minora, semina apij, agarici, port. cortex tamarisci, malorum præterea astringentium cortex, si à flatibus tumescit, vel fructus vel semen. Aqua etiam chalybeata, vel ferrata, & chalybis rasura splenem minuunt prætumidum, vt

R. confer. ceterach ʒ ij. trochisci de cappar. ʒ. j. diarr. abb. diagalan. ana ʒ. j. β. limaturæ chalyb. macerata in aceto, & tenuissime trita ʒ. iij. seminis portulacæ ʒ. j. fiat opiata cū syr. acetos. simpl. ex qua sumatur quotidie ad quantitatem auellanae, superbibendo parum aquæ portulacæ, thamarisci vel syr. acetos. simpl.

Pro corde & palpitatione.

AD cordis alterationem parantur ex supradictis conferuis, & pulueribus cordialibus de quibus non plura: interdum tamen animaduertendum ad palmum, cardiacam, & palpitationem, maximè fieri, & parari opiatas cordiales. Fit autem palpitation cordis potissimum à flatibus, qui sunt in crapula cordis, vel à copia aquæ in eadem collecta, pro quarum differentia parandæ sunt opiata diuersæ. Cardiacæ autem oritur à paucitate spirituum, aut quia perturbantur à spiritu melancholico, aut ob eorum motionem & influxum. Confectio itaque alchermes principatū obtinet in cardiaco affectu, quia spiritus crassos attenuat, & melancholicos à corde profigat. Conserua etiam de bugloss. cū sit temperata, spiritus gignit, & temperat, & fouet: hanc prodesse sæpius experti sumus, vel quia hilaritatem parit. Talis autem opiata sequens erit.

*Cardiacæ
caussa.*

*Confectio
alchermes
Conserua
buglossæ.*

R. confect. alcherm. ʒ. β. conseruæ radice bugloss. ʒ. j. conseruæ florum anthos ʒ. β. pulueris diamarg. frig. (quod dicitur respectu alterius calidioris: nam & ipsum reuera calidum est) ʒ. j. cum syrup. de pomis redolentibus (qui valet ad hunc cordis affectum. Fit & compositus ex elleboro nigro, & aliis calidis ad melancholiam expurgandam) fiat opiata, qua sumpta superbi-

batur parum vini diluti aqua borraginis vel bugloss.

Pro palmo a flatibus, non ab aqua.

SI palmus fiat à flatibus, hæc non admodum erunt ex usu, quia syr. de pomis ingreditur. Poma enim flatu, seu ventositatem seruant, usque ad tertiam concoctionem, vt Auic. scripsit. Necessum itaque magis erit ea incorporare cum syrup. conseruæ cortic. citri, vel ex his parare quæ flatu discutiunt, & primam coctionem iuuant, in aqua multi flatu gignuntur, huiusmodi parabitur ex corroborantibus cor, & ventriculū, vt

R. confect. arom. ros. 3. j. diarrhod. abb. & confect. alcherm. ana 3. j. corticis citri saccharo conditi 3. j. conseruæ bugloss. & anthos ana 3. iij. fiat opiata cum syrup. conseruationis cortic. citri cap. ante & post pastum (nam primas tenet ad iuuandam primam coctionem) superbibendo parum vini cum aqua mentæ, & absynthij diluti.

Pro palmo ab aqua.

QUod si ab aqua fiat cordis palpitatio, euacuantibus elicienda erit aqua, & ægrotantes in otio retinendi, quia nisi moueantur, hoc morbo non corripiuntur. Opiatam autem, ne cordis affectum negligere videamur, parabimus, additis superioribus quibusdam partibus ex cordialibus resiccantibus, vt ex rasura eboris, cornu cerui, coral. rub. vsti, ossis de corde cerui. Vel fiat cinis ex pericardio bouis, quomodo vtamur, vt

R. opiatæ præordinatæ 3. ij. coralli rub. vsti, & lotiaqua meliss 3. ij. rasuræ ebor 3. pul. marg. 3. β. cum syru. conseru. cortic. citri, fiat opiata, capiat serò & manè.

Pro capitis affectibus.

AD capitis affectus diurnos parantur opiatæ diuersæ pro affectuum ratione, veluti ad calfaciendum, exiccandum, & refrigerandum: ad humectandum verò rarissimè, quin potius topicis remediis id peragimus, quàm opiatis. Fiunt etiam opiatæ ad morbos per consensum factos veluti in dolore capitis, & ventriculi per consensum facto. Præscribuntur etiam opiatæ, in quibus maior tamen est obseruanda cautio, quàm vulgus facit, qui praxim exercet. Omnes enim opiatas ex odoratis faciunt, non reuocantes in memoriam, quæ

scripsit

scripsit Hippoc. de odoris. Odorata enim muliebria ducunt, sed capitis grauitatem faciunt, vt tertio *cata topom* *Veilissima*
Gal. indicat de croco & myrrha. Parandæ igitur erunt *hac in fr-*
opiatæ ad capitis affectus, vt in epilep. doloribus capi- *gida.*
tis per consensum factis, & in vertigine ex calidis exci-
cantibus, vel consumentibus materiam, citra vllam effu-
mationem, in quibus parandis hic seruabitur ordo. Pri-
mum igitur recipiant, quæ nullo modo odorata sunt,
deinde quæ param admodum odorata sunt, quales sunt
cineres odoratorum, & aliorum, quæ sua natura sunt in-
odora, vt corallum, cornua, ossa, lapides, & semina quæ-
dam pauco odore prædita, vt lactucæ, port. papaueris,
coriandri, tametsi parum odoris habeant. Conseruæ
præterea nonnullæ, quæ non multum odoris habent, vt
conserua viol. capil. ven. ceterach, acori vulgar. saluiz, *Conserua*
vel anthos, quæ paulò maiorem spirant odorem. Con-
serua verò stechados nimium caput tentat: zinziber
conditum, cortex citri, parum redolent: myrob. conditi
cass. olent, ob id lauandi sunt. Audio præterea aliquid
admisceri, cass. syrupo conseru. myrobalanorum. Quod
si ita est, inutilis sanè erit ad astringendum, vt practici
putant. Præterea renouatur frequenter, imbecillior id-
circo redditur & inefficacior.

Pulueres omnes dicti capitales ambram, vel moscum *Quo tem-*
recipiunt, aut crocū & alia fumos excitantia. In morbis *pore exho-*
itaque, qui per effumationem fiunt, non sunt dandi, aut *benda.*
contra vulgarem opinionem, & cōsuetudinem exhiben- *Nonnullis*
di, id est, ante cibum, vt eam effumationem imminuat *cibo sum-*
cibus supra ingestus, quemadmodum multos dolores *pro dolor*
sedari vidimus sumpto cibo. Eam ob causam tremulos, *cap. seda-*
vertiginosos sumpto cibo melius habere experimur. *tur.*

Ad morbos capitis frigidos.

AD morbos igitur frigidos, in quibus nullus est dolor,
aut nulla effumatio, fiet hoc modo.

R. conseruæ capilli vener 3. j. conseruæ anthos, zin-
zib. conditi ana 3. ii. j. cinerishi. und. 3. β. coral. rub. vsti
3. j. piper. tenuiss. pulu. 3. j. β. cum syr. de stechade fiat
opiatæ

Piper hîc ponitur, quia insigniter calefacit, & exte-
cat, & non est admodum odoratum, zinziber præterea

conditum non multum olet. Insuper conferua anthos non multum calfacit, & exiecat insigniter. Syrupis de stechade sine odore est, & alia medicamenta quæ huic alligantur. Omnia autem medicamenta, quæ huic affectui conuenire videntur, simul colligata, in olla perforata imposita in furno vrantur, donec in cineres redigantur, qui postea lauantur, si timeatur odor vitionis. Sin fieri potest, bonum est empyreuma seruare ad maiorem calfactionem, vt

℞. summitat. rosmar. cinam. macis, nucis moscatae, garyoph. ana ʒ. ss. hirund. vel pellic. castor. priapi tauri an. ʒ. j. vrantur, vt supra dictum est, & ex cineribus cum paucō saccharo & syrup. de stechade fiat opiata. Valet ad paralyf. conuul. plenitudinem, & oculorum reumatismos, & aliarum partium, ad articulorum dolores à morbo Italico, & alios affectus, in quibus multum exiccandum. Ex sale, item ostreis, spongiis, & plerisque aliis marinis exiccantibus parari possunt ad capitis affectus diuturnos. Tales enim plerumque à larga humiditate fieri solent. Sed de his satis.

Ad Vrinas, & menses mouendos, & ad Venerem.

Ad opiatas cientes vrinas, menses, lapides comminuendos, & vlcera curantes venimus. Ad eos enim affectus non erit difficile parare opiatas his, qui pulueres, & syrup. idem præstantes cognouerunt, aut si ex conferuis obseruarunt quid quæque efficere soleat, veluti conferua eryng. & vrinam, & menses, & venerem mouet. Idem ferè efficit conferua radic. apij. & pastinacæ agrestis. Difficile ergo non erit hoc modo opiata parare.

*Conferua
eryng.*

℞. conferuæ eryng. radic. pastinacæ agrestis ana ʒ. j. trochiscorum de myrrha ʒ. iij. cinamomi ʒ. ij. cum syr. de arthemif. fiat opiata, sumatur manè, deinde superbibat cyathum vini hippoc. vel decoctionis puleg. aut calaminæ. Fit & vt diximus de pulueribus & pilulis assumendis propter eundem affectum viscerum. Hæc autem medicamenta minus commodè in opiatarum formam reducuntur. Nam opiata & multum syrup. vel conferuæ vel mellis capiunt, & molem augendo vim medicamenti minuunt. Cæterum si quis efficaciorē conficere studeat

deat, conseruam tantum permittat, & ex pulueribus, & herbarum succis paret, vt ad menses prouocandos hoc modo parabitur.

Ad menses mouendos.

R. Succi eryng. succi sabinae, & puleg. depuratorum an. 3 iij. cinamomi, azari, myrrhae, croci ana 3 j. seminis nigellae 3. ss. vel 3 j. ss. simul incorporentur, & fiat opiata. Ad dulcorandum adde parum syr. de arthem.

Ad calculum.

AD calculum simili modo parantur ex succo foenic. marini, vel portulacae, & succo seminis paliuri, vt R. succi port. foenic. marini ana 3. ss. seminis paliuri 3 j. azari, & ocre ana 3. iij. cinamomi, feseliana 3 j. fiat opiata addito paxillo syrup. de bizant. vel de quinque radic. Parantur etiam ex pulueribus, vt lithontripon, lapide Iudaico ana 3. ss. vel pilulis additis, succis humidis vel syrupis.

Ad venerem excitandam minuendamq.

AD venerem tum excitandam, tum minuendam praescribi solent medicamenta quae formam opiatae sortiuntur. Cum enim haec forma humida sit, & consistentiam aliquam habeat, diutius durare potest. Ceterum in opiatis venerem excitantibus, duo maxime requiruntur, scilicet vt substantia seminis augeatur, & id flatulentum fiat, aut acre: ob id quae multum alunt praescribuntur, & cibus, & alia quae semen augere possunt, quales sunt nuclei pinearum, pistaciorum, amygd. auel. la. testiculi gallorum, cerebra passerum, quibus addi potest caro testudinum, semen fraxini, quod linguam auis vocant, cereb. porci cum origano paratum. Per multa flatus gignunt, quaedam frigidiora sunt, quam vt semen augeant, quae vero calida sunt & flatulenta, ea prouocare creduntur venerem, vt bulbus eiusque semen, radix vtriusque pastinacae, satyra, orchis, eruca recens, origanum, erysimum recens, farina fabarum, castaneae elixae, & alimenta ex lacte parata, & semen lini, vt Gal. placuit, & quaecunque nimis sicca in lacte macerata, parataque. Quod si corpus ob nimiam refrigerationem ad venerem non exciteretur, aut in mulieribus sopita sit venus ob nimiam humiditatem, vtilissima erit haec opiata.

*In Genere
excitantibus
duore
quisitur.*

*Venerem
prouocantia.*

R. conferuæ radic. eryng. zinzib. conditi an. 3. j. testiculorum gallorum decoctorū in lacte 3. β. pineorum mundatorum & in lacte maceratorū 3. j. amygd. auellanarum maceratarum in melle per diem naturalem an. 3. β. seminis bulbi 3. j. cum syr. conferuæ cortic. citri. fiat opiata, de qua sumatur ante pastum. In his autem resiccantia non sunt addenda, ne resiccando materiam absumant. Moscus autem & ambra ob odorem, & caliditatem quandam conueniunt, quia spiritus incendunt. Solus enim odor venerem mouet. In paulò autem calidioribus magis vtimur temperatis medicamentis, vt

R. conferuæ satyr. 3. ij. cortic. citri conditi 3. β. auellandarum cum melle maceratarum numero x pinearum, & pistaciorum in butyro breuiter frictorum an. 3. j. carnis testudinis decoctæ cum eruca 3. ij. cinamomi 3. β. cum syr. conseruationis eryng. fiat opiata: sumat vt prius ad quantitatem nucis magnæ, sed sobriè post alendum. Coena enim copiosior, seminis acrimoniam obruit, & vim minuit medicamento. Vtendum autem alimentis multum nutrientibus.

Pro ijs quibus semen est acre & fluidius.

Quibus semen est acre suapte natura ad venerem excitatur, & citissimè semen reiciunt, aut illis ob tenuitatem effluit, sine magno sensu, & ante secundū concubitum, aut citiùs detumescit, atque languescit mentula, quàm mulier ad expulsionem parata sit. Hinc fit vt frequenter apud medicos conquerantur, ad quorum curationem non quæ venerem mouent, nec quæ eam extinguunt sunt danda: sed quæ semen crassius, ac quæ flatus augent. Spiritus autem crassos reddunt castanæ ciliæ, poma, oriza in lacte cocta. Et quanquam hæc ad alimenta potius, quàm ad medicam referuntur, ex his tamen tale medicamentum possumus conficere, vt

R. pinearum conditarum cum saccharo 3. ij. radic. paltinacæ agrest. 3. j. caul. lactucæ & carniū cucurbitæ conditæ cum saccharo an. 3. j. β. carnis testudinis coctæ cum oriza 3. ij. cum syr. conseruationis satyr. fiat opiata, sumat ad nucis quantitatem tribus horis ante pastum. Hæc enim cum alijs topicis remedijs mirum in modum prosunt.

Ad seminis profluuium, & Venerem minuendam.

AD venerem minuendam, & seminis profluuium diuersæ fiunt opiata. His enim qui salaciores sunt, ob seminis copiam, minuenda subtrahendo alimētum. Facile enim sistitur impetus ille libidinis. Quod si ob seminis acrimoniam sint salaces, aut partium caliditatem quæ perpetuò attrahunt, plusquam necessarium sit ad sui nutritionem, vtile erit medicamenta præscribere frigida. & sicca, aut sicca cum magno calore. Frigiditate sua semen minuit nymphaea. Eius itaque conserva cum semine papaueris vsurpanda, coralli fragmenta, & lapides preciosi vt iaspis, cristallus, camphora, vt,

℞. conservæ nymphæ 3. ij. caul. lactucæ ana 3. j. coralli rub. & cristalli ana 3. iij. camphoræ ʒ. ss. cum syrupo myrtill. fiat opiata. Ad horum autem castigationem, quibus interdum ventriculus læditur, semen rutæ commodè admiscetur cum agni casti 3. ss. quæ calore nimio semen resiccant, & extinguunt. Si autem, qui cachexia laborant, aut atrophia, sint ad venerem procliuiiores, & valentiores, longè alia ratione progrediendū. Non enim à calore, aut seminis copia id pender, sed quia semē flatulentum latius distendendo mētulam repletionis speciem præbet, & mēbrum dilatando ad expulsionem disponit. Flatus autem fiunt à calore imbecillo ob cacochy. & quia atrophia laborant, aut malè dormiunt, hoc symptomate magis vexantur. Oportet itaque partes illas inferiores cōstringere, & flatus discutiendi, calorem intendendo, adiuncta facultate concoctrice hepatis, ventriculi, & venarum.

Ad Ventriculi corroboracionem.

AD ventriculi confortationem fit medicamentum ex confectiōibus, & pulueribus supradictis. Hæc autem medicamenta multo meliùs in forma pulueris sine multo saccharo parantur. Nam saccharum & mel, aliæque dulcia ventric. laxando flatus gignunt, & maxime quando humiditatem paucam adiunctam habent. Parabimus autem hoc modo opiata.

℞. cortic. citri cum saccharo conditi loti in vino 3. ij. confectiōis aromatici ʒ. ʒ. j. anis. 3. iij. scenic. 3. ij. seminis rutæ & viticis ana 3. j. cum Syrup. de menta fiat

Menta.

Si folia mentæ sicca apponuntur, præstantissimum erit remedium. Minuit enim semen menta, & ventriculū corroborat astrictione leui & calfacit. Et quia semē homines audaces & furibundos reddit, communi prouerbio dictum est, tempore belli neque edendam, neq; sēdendam mentam. Ob mirabilem itaque mentæ facultatem syrup. de menta addimus, aut fiat sic.

℞. fol. mentæ siccæ ʒ. ij. seminis viticis ʒ. iij. anis. foen. ana ʒ. ij. seminis rutæ ʒ. j. corti. citri sicci, coral. rub. vʒi loti in aqua rutæ ana ʒ. ij. cum syr. de menta fiat opiata, sumatur ad quantitatem fabę ante pastum. Efficacior erit quā si ex aromatico ros. aut aliis pararetur, quia ob moscum & ambram minū conueniunt. Hic autem affectus accidit post veneris vsum immodicum, ob vasorum dilatationem, aut potius relaxationem. Aliis igitur remediis, quā refrigerantibus huic affectui occurrendum, scilicet iis, quæ iuuant concoctionem. Illi enim e-racuati cum sint, & refrigerati, flatūs, qui affectum augent, gignunt. Ex constringentibus, & resiccantibus sic.

℞. conferuæ enulæ camp. & anthosana ʒ. ij. pul. irid. Veneriæ ʒ. iij. viticis & rutæ ana ʒ. ij. rad. bistortæ, & seminis vuarum ana ʒ. j. radi. cyper. ʒ. ss. fiat opiata cum syr. de menta, sumat manē cum inunctionibus circa renes & pudenda illas partes astringentibus.

De colicis & arteriacis.

Colica.

Flunt autem colica medicamenta & arteriaca ea forma, qua & opiata, veræque sunt opiata. Recipiunt enim opiū, vnde nomen sumpserūt, vt mithridatū, theriaca, philonium, aurea Alexandrina. Quoniam verò vsus superiorum medicamentorum exoleuit hoc tempore, aut si quis sit vsus illorum, non distinguuntur ab arteriacis, ē re fore putamus, si hoc loco rationem vtriusq; post Gal. doceamus. Colica igitur medic. sunt anodyna, quæ stupefaciendo partis sensum auferunt, & necessario dolorem sedant. Dolor enim nō potest esse sine sensu partis, cum dolor sensus sit tristis. Quia verò tales colici dolores, vnde colica medicamenta nomen sumpserunt, sunt à materia frigida, & crassa, vel à flatibus medicī solis frigidis non vtuntur. Calida autem ad materiæ præparationem, & concoctionem addunt, vt piper longum.

vel

vel nigrum, crocum, styracem, pyretrū. Et quia hæc medicamenta anodyna, vt hyosciamus, papauer, mandrag. opium, sunt foetida, & aduersa ob insignem vim refrigerandi, odoratis & calidis castigantur, vt castoreo, myrrha, croco, styrace, pyretro, vel euphorb. & aliis calidioribus. Semper enim hos dolores flatus comitantur, vt semine anisi, dauci, semine apij, petro, aliisque flatus discutientibus, sedantibus dolorem, & odoratis, hæcque ratione Philonium est compositum à Philone. Asyncriton ab alio, vt pleræque aliæ compositiones.

Artheriaca autem medicamēta fiunt ad sistendas fluxiones tenues, vnde lyquirit. M. & alia medicamenta ex-^{Artheria}pectorantia addimus. Ex stupefacientibus opium, & castigantibus opium, quæ simul detergendi, & concoquendi vim habent, vt styrax, crocus, myrrha. Addimus detergentia propter id quod iam influxit, vt opij & aliorum medicamentorum amarorum, adduntur & inspissantia, vt amyllum, tragacan. bolus arm. terra sigillata quæ excipiuntur syr. iuinibino, vel de papauere, vel violato. Tales multæ compositiones reperiuntur apud Gale. vt pilulæ de arnogloss. styrace, pilulæ contra omnes catarrhos apud Mesuem. Sed quia colicis medicamentis vtuntur nostri medici, & in colico, cum nephritico dolore, & doloribus vlcerum vesicæ, & renum absque vlla ratione, indicandum nobis, qualia debent fieri medicamenta ad hos morbos à colicis diuersa, ne in vulgarem errorem incidamus. Quare hæ compositiones multa calida recipiunt, vt euphorbium, pyrettrum atque multa alia aperientia, & incidentia vlceribus aduersissima.

Duas itaque medicamentorum differentias possumus constituere: altera vtimur ad affectus à materia frigida, vt colicis doloribus, altera in pulmonum affectibus, aut vlceribus renum & vesicæ. Medicamenta dolori colico ^{Colico do-} determinata, fieri debēt ex superius enumeratis, vt opio, ^{lori deter-} ex concoquentibus, vt pipere, & croco, ex discutientibus ^{minata.} flatus, seminibus anisi apij, petro, vt

R. opij 3. ij. castor. euphorb. styrac. myrrhæ, piperis longi & nigri ʒ. j. seminis apij, petro. cumini, cinamomi ana ʒ. ij. cum melle despumato fiat opiata, quam magna quantitate paramus, quia diu permixtam esse, &

per sex menses conseruari oportet, antequam illa vti-
mur, quanquam aliter vulgus medicorum faciat, non si-
ne magno ægrotantium malo. Quòd si huiusmodi com-
positio non reperiatur parata, diluimus opiũ vino mal-
uatico antiquo, atque in mortario calido diu permisce-
mus castor. euphorb. myrrha, croco, vt eorũ acceleretur
permixtio, maioremque calidorum quantitatem addi-
mus, quia statim vti volumus, non in tota massa, sed in ea
parte, qua vti tunc volumus. Parari etiam potest eiusmo-
di compositio colica ex pulueribus odoratis calidiori-
bus opio, & syr. aliquo, vt si quis accipiat galangæ vel a-
rom. ros. vel diambraz, vel diamosci ʒ. ss. opij diss. in vino
maluatico, vel aqua vitæ ʒ. j. croci castor. ana ʒ. j. cum
syr. de stechade fiat opiata, de qua sumatur ʒ. j. cum vi-
no & aqua hyss. vel ex floribus citri, vel absynthij quos
multum conducere his affectibus frigidis frequenter su-
mus experti. Idẽ præstat aqua ex floribus croci. Ego au-
tem non probò eos, qui dũ opium tẽperant, laxantia ad-
dunt vt benedictam. Talia enim medicamenta opio ad-
dita non laxant, atque ita inutilis est permixtio. Sati-
us igitur fuerit, pro laxantibus discutientia status addere, &
calida, quia opium castigant. His compositionibus vti
poterimus in dolore nephritico, vel vterino. Sin nephri-
ticus dolor adsit cum arenulis, commodius parabitur
ex relaxantibus quibusdam, odoratis & narcoticis, vt,

Pro dolore nephritico.

℞. Liquirit. ros. myrrhæ, styrac. azari, spicæ celticæ,
scœnanthi, seminis paliuri, alicacabi & bismal. an. ʒ. j. a-
pij, petro. rubiæ maioris ana ʒ. ss. opij ʒ. ij. croci ʒ. j. cum
syr. capil. ven. & pauca terebinth. lota in aqua graminis,
& vino albo fiat opiata, sumatur à ʒ. j. ad ʒ. j. post vom-
itum, vel detergentia medic. dentur. Si verò ad dolores
vesicæ cum vlcere parabuntur ex leuiter detergentibus
sine morfu, & sedantibus dolorem stupefaciendo, & as-
peritatem vlcæris auferendo, vt,

Pro dolore Vesicæ cum Ulcere.

℞. Succiliquir. ʒ. ss. myrrhæ, styrac. thur. mastic. a-
na ʒ. j. gummi tragac. & arab. ana ʒ. ij. opij, cort. man-
dragor. an. ʒ. ij. papau. alchecang. seminis endiuiz
plantag. & bismal. ana ʒ. ij. cum syrup. iuiubarum, fiat
opiata

opiata: sumatur 3. j. longè à pastu, superbibendo decoctionis hordei mundati parum.

De arteriacis.

Arteriæ parantur ex detergentibus, & expectorantibus, incrassantibus modicè & asperitatem lenientibus, ut trachiz arteriæ asperitas leniatur, quod de fluxit nò retineatur, quod fluxum est, incrassando sistatur. Ob id incrassantia magis conueniunt, quàm astringentia, quia astringentia retinent quod iam influxit in pulmones, incrassantia autem non impediunt expectorationem, sed potiùs iuuant, si tenuis sit materia. Meliùs autem retinerentur hæc medicamenta in pilulas, vel formulas, quia diu retenta magis sistunt. Possunt autem hæc in opiatas reduci sic.

℞. succi glycir. styrac. gummi tragac. & arab. amyli ana 3 iij. boli armeni 3. ij. opij 3. j. β. cum syr. iuiubarum fiat opiata, sumatur 3. j. longè à pastu. Præscribi igitur poterit ad vlcera vesicæ & renum. Deterget enim leuiter, aut saltem excrementorum asperitatem mulcet, & maximè temperat, si detur cum lacte ouis, vel cremore hordei valdè diluto, vel cum ouo crudo calfacto tantum. Similes opiatas conficiebant antiqui ad affectus hepatis, renum, vteri, & aliarum partium, & dysenteriam, quibus iam nos raro vrimur. Si quis tamen velit vti, vtatur in vehemētissimo dolore, viribus tamen non exolutis, nec debilibus. Fiunt autem fortiora remedia, sed non nisi fortioribus corporibus dari debent.

Hepatica opata.

Hepaticæ sunt opiatæ additis hepaticis, ut si ad dolorem hepatis præscribatur, dabitur cum dialacca, aut cum diacurcuma addita 3. j. opij pro 3. j. confectionis diacurcumæ, vel dabitur ex puluere aromatici ros. & triasand. vel diarrhod. abb. & opio cum syrupo de absynth. In calido quidem affectu ex triasand. & diarrhodo, in frigido ex dialacca, vel ex diacurcuma.

Pro dolore in fluxu Venteris.

Ad fluxum ventris dysentericū paratur ex resiccantibus, constringentibus, & narcoticis castigatis sic.

℞. acaciæ, hypocist. carnis cydon. sumach. gall. ana 3. j. coralli rub. vsti, & loti in aqua ros. 3. j. β. opij 3. j. cina.

momii crassi, & cyperi ana 3. ℥. cum syr. de ros. siccis fiat opiata satis spissa, vt in forma pilularum vel morcellorum inuolutorum in nebulis, vt deuorari possint. Addi potest 3. j. ℥. boli armeni, vel terræ sigillatæ. Tales compositiones reperiuntur apud Gal. *Katà topous*. In liëteria non conueniunt, nec admodum in diarrheæ, nisi vehemens dolor adsit, quod non frequenter fit.

Ad Vteri dolores.

AD vterum parata est triphera magna sine opio. Ineptè autem fecerunt, qui opium sustulerunt, tali confectione.

Si autem in frigida constitutione vel ad temperandū vti volebāt, cur alias potiùs opiatas magis delicatas, magisque conuenientes non temperabāt, aut etiam theriacam, mithridatum, auream alexandrinam, aliàsque confectiones, quæ opium recipiunt, præscribunt? Aut si opium addere reformident, cur mandragoram etiam non expunxerunt, quæ non minùs aduersa est, quàm opium? Hæc autem fecerunt, quia ignorant mandragoram recipi, aut ignorāt qua ratione sine opio primū instituta fuerit. Aliquis forsā voluit certa de causā tripheram parari sine opio, vnde qui sequuti sunt, nulla animaduersione adhibita, sed ex fide practicoꝝ semper sine opio præscripserunt. Talis igitur compositio utilis erit ad fluxum vteri. Vtemur itaque in doloribus vteri triphera cum opio, aut parabitur ex calidis flatus discutientibus, & narcoticis, si dolor adsit sine vlcere, vt,

℞. castorei, myrrhæ, croci, styrac. (quia menses prouocat, & aperit obstructions sedando dolorem) ana 3. ij. radic. ireos, spicæ nardi, folij malabatri, azari ana 3. j. opij 3. j. ℥. cum syr. de arthem. fiat opiata, sumatur 3. j. superbibendo parum vini albi diluti aqua ex floribus citri. Ego ex odoratis & calfacientibus parauī hoc modo.

℞. pulueris diamorci, & diambæ ana 3. ij. castorei 3. j. opij 3. ℥. cum syrupo de arthemī fiat opiata, sumatur 3. j. vt supra.

Si verò præscribatur ad dolores vteri à materia calida, vel à carcinomate depascente, aut vlcere depascente, aut purulento, non dabuntur talia medicamenta quæ maiorem dolorem parti inferant, quàm auferant. Ex

deter-

detergentibus itaque sine morſu imminuendo quantitatē, dolo rem ſedabimus, & acrimoniam excrementorum frangentibus, & partis affectæ ſenſum minuentibus, & vlcus excitantibus, vt

℞ bdellij (quod euocat & detergit) myrrhæ ana ʒ. j. cortic. thur. ſarcocollæ, maſtich. ana ʒ. j. ꝑ amyli, ſtyrac. ana ʒ. ij. ſemin papauer. albi, endiuiz, plantag. ana ʒ. j. ꝑ cum ſyr. iuiub. fiat opiata. Quod ſi dolor non ſedetur, augeatur quātitas opij ad ʒ. iiij. Si verò ſanguinis fluxus adſunctus ſit, ratione fluxionis aſtringentia augenda ſunt, detergentia verò minuēda, quæ in iſtis affectibus pauca eſſe debent, quia detergendo partes ſuperiores, partem affectam recremenis onerāt, ſed ſupra partem affectam detergentia apponenda ſunt, quod in alijs etiam vlceribus obſeruandum eſt, niſi in ventriculo, & in teſtinis ſuperioribus fuerit vlcus, ad quas partes citò medicamentum penetrat, ſine multis recrementis, neque illorum ratio valet, qui purgato corpore hæc dari oportere dicūt, cum ita non poſſunt purgari, quin ſemper aliqua cruda, & alia remaneant. Redeamus autem ad medicamentum conſtringens, & fluxum retinens, vt

℞. acaciæ ʒ. ij. ſang. dracon. boli arm. terræ ſigill. (quæ *Bolus ar. terra ſigil.* duo valent aduerſus venena, non à proprietate occulta, *terra ſigil.* ſed ſubſtantia ſua emplaſtica, & aſtringente, qua prohi- *Valent ad-* bent venena fieri per corpus) ʒ. ij. opij ʒ. j. cortic. thur. *uerſus venena.* maſtich. ſarcocollæ an. ʒ. ꝑ cum ſyr. de papauere, & myrrhæ. *venena.* till. fiat opiata, capiat ad quantitatem auelianæ, ſuperbibendo parum aquæ plantag. & buſſæ paſtoris. & ſanguinalis, quæ ſanguinis impetū à quacunque parte fluat, ſiſtere poteſt, maximè ſi ob tenuitatem fluat, aut facultatis expultricis irritationem, vt in criſi ſuperflua accidere ſolet.

De clegmatis ſive lohoth.

E Clegmata Græci vocant, quæ interpretari poſſumus elingibilia, eo quod lambendo aſſumantur. Arabes autem lohoth appellāt. Fiunt autem ad trachiæ pulmonique affectus, vel minꝯ propriè ad linguæ aſperitatem, vel ad alicuius partis inflammationem, vt oris, & columellæ. Labuntur vt ſenſim descendendo, diūque retardando tandem in trachiam arteriā penetrent. Quare

hæc medicamenta semper aliquid viscidum recipere debent. Fieri solent ex materia conuenienti affectui. Nam

Materia. si ad expectorationem detergentia materiam recipiunt: in vlcere & catarrho, detergentia pituitam: in costarum & pulmonum inflammationibus, leuiter detergentia ex usu sunt. Si ad vlceris exiccationem, exiccantia sine magna deterfione. Si ad sputum sanguinis, leuiter constringentia & glutinantia. In summa detergentia omnia sunt dulcia, amara, nitrosa, & quædam acia. Amara autem prætermittimus, quanquam antiqui myrrha, aliisque amaris vsi sunt: nos verò eorum loco, dulcia, leuiterque

Detergentia. amara vsurpabimus, vt enulam campanam, conseruam iris, & marrubij, atque etiam acia, vt squillam, erysimum, hyssopum. Præsertim autem dulcia, quæ alimentis annumerantur, vt saccharum, sapa, vinum dulce, mel, ficus, aut earum decoctio, vix passæ, iuiubæ, dactyli, decoctum hordei, eiusque cremor, ptisana: radic. dulc. vt glyc. & detergente, vt graminis radix recens: & acres, vt enula campana recens, iris, squilla, sed & porrum his admiscetur maximè cum dulcibus, quia pituitam crassam incidendo, eius concoctionem adiuuat. Detergunt præterea amygdalæ, pinæ, auellanae, & medullæ quatuor

Deterg. seminum frigid. semen bombacis: & viscosa, vt gummi tragac. arab. mucilago, seminis mal. ex constringentibus & refrigerantibus mucilago seminis pilij, cydoniorum, albumen oui, & cremor ptisanæ in sputo sanguinis per se, vel cum aliis permixta sanguinem retinent. His adduntur conseruæ capil. ven. Syrupi satis viscosi sunt, & ad expectorationem alias accipiendam sufficiunt. Terebinthina interdum ad deterfionem, & calfactionem, & retinenda medicamenta his adiicitur.

Ad catarrhum.

AD catarrhum tenuem in principio inflammationis, in quo inspissare oportet, & leuiter detergere, hæc præscribuntur.

℞. pul. diatrag frig. 3. iij. sacchari candi, penid. ana 3. j. syr. iuiub. q. s. fiat loboth, capiat lambendo. In progressu autem, nimisque tenui materia, additur diatris simpl. & pro syr. iuiub. violatus ponitur. Si materia magis crassa sit, vt in pleuritide, & peripneumonia à materia frigida

ex pul-

ex pul. diairis, & pauco diatrag. frig. syr. capill. de glycir. ad maiorem expectorationem hoc modo.

In pleuritide.

R. pul. diairis simpl. 3. ij. diatrag. frig. 3. j. sacchari candi 3. ij. syr. capil. & de glycir. an. 3. j. misce. Conuenit & in declinatione inflammationis à materia calida. Ad incrassandam & sistendam defluxionem fiat hoc modo.

R. pulpæ iuiub. 3. β. amyli 3. ij. gummi tragac. & arab. ana 3. j. cum syr. de papauere, fiat lohoth, sumatur lambendo. Si magis incrassare, & inspissare volumus, terram sigillatam addimus vel bolum armenam, semen papaueris albi, vel maluarum aut melonum.

Ad mediocrem expectorationem hoc modo.

R. Pulpæ pass. 3. j. mucilag. sic. extractæ cum decoctione hord. 3. β. enulæ campanæ siccæ 3. j. pul. diaireos simpl. 3. j. cum syr. de glycir. fiat lohoth. Aut sic.

R. amygd. dulc. pinearum infusarum in aqua decoctionis hord. & glyc. ana 3. j. β. pulpæ pass. 3. β. seminis mal. & bombac. ana 3. ij. femin. anif. 3. j. succi glyc. 3. ij. cum syr. de prass. vel glyc. fiat lohoth. deterget, expectorat, & materiam crudam concoquit.

Aliud fortius.

R. Squillæ in pasta inuolutæ, & in furno assæ 3. β. fortiter contundatur, cui adde succi glyc. 3. ij. conferuæ enulæ campanæ 3. β. sapæ & oxymel. simpl. ana 3. ij. auelanarum 3. β. quat. semin. frigid. incisorum ana 3. iiij. pinearum & amygd. dulc. ana 3. j. pistentur simul, & reducantur ad formam lohoth.

Quoniam squilla nō semper reperitur, eius loco usurpari poterunt trochisci de squilla, aut mel squilliticum. Veteres in his eclegmatis imperabant capil. ven. aliásque herbas, quæ difficulter triturantur, ut hyss. marrub. sed facilius decoquuntur. Ex his fiebat syr. valde coctus, deinde inspissatus, & ad formam lohoth redactus, ut

R. marrh. capil. ven. hyss. calamint. ana M. j. pass. fic. dactyl. ana num. 30. anif. 3. ij. glycir. ras. 3. iiij. quat. semin. frigid. ana 3. ij. fiat decoctio in aqua hord. ad q. j. cui adde pinearum 3. iiij. gummi tragacan. & arab. puluerarum ana 3. j. pulpæ pass. dactyl. & sic. diligentissimè

contusorum ana ꝑ. ʒ. ʒ. misce, & addita pauca quantitate sapæ, fiat lohoth.

Ad tuſſim.

FIt etiam lohoth ex butyro, ſaccharo & pauca terebinth. quo in catarrho à materia frigida, & pectoris conſtrictione dilatanda vtimur. Fundit enim, expectorat, & detergit. Dantur hæc in tuſſi, quia à materia craſſa, aut tenui tuſſis fit. Quod ſi tenuis in craſſanda ſit, eclegma ex inſpiſſantibus conueniet: Si craſſa extenuanda, & detergenda, quæ ex ſquilla parantur, & aliis detergentibus, erunt ex uſu: vt ſit in vocis clarificatione. Si tuſſis ob pus retentum excitetur, expectorantia leuiter detergendo conueniēt. In aſthmate eadem erunt præſcribenda, ſpectata humoris materia. Qua re tantum, quæ ſtatu diſcūtiunt, addentur, vt aniſ. foenicul. dulce, quia aſthma à pituita ſpumofa, aut valde craſſa fit. Ad ſanguinis concreti expectorationem, & ſputum eiufdem, aut fluxum inhibendum eclegmatis vtimur. Concretus itaque ſanguis extergentibus, expectorantibusque educitur, addito ſyr. acer. vel oxymelite. Sanguis retinetur leuiter aſtringentibus, emplaſticis & refrigerantibus. Fortiter enim aſtringentia anhelitum cohibent, leuiter vero aſtringentia minime, ſed emplaſtica, vel lenta admiſſa frigidis ſatis impetum ſanguinis retinēt. Frigida enim ſanguinis feruorem extingūt. Aſtringentia, quibus vtimur ſunt conſerua roſ. antiq. caro cydon. conſerua cōſolidæ, quæ lentorem habere, & venas coaleſcere facit. Emplaſtica ſunt amylum, gummi tragac. & arab. bolus arme. terta ſigill. vel argil. exiccando ſanguinem ſidunt, lapis æmatites, corallum, ſang. drac. ſuo lentore & aſtrictione, carabæ ſuo lērore & ſiccitate. Sunt etiam ex uſu, quæ ſanguinem coagulant, vt ſlos chameleon. flor. gallij, quos etiam ſpargularia vocant, flores ſalicis, & cannarum, ſemina portul. plantag. burſ. paſtor. ſanguinal. alb. oui, ſyr. de roſ. ſiccis, de papauere, myrtinus, de iuiubis, quando aſtringentibus adiungitur. Nam non ſolum in craſſat aut reſtringit ad retinendum ſanguinis impetum, niſi cum aqua aut ſueco herbarū enumeratarum detur, quibus additur ſuccus portul. recens. Ad eundem affectum reperiuntur trochiſci parati ex iſtis ſimplicib. vt,

deter-

*Quibus e-
ducitur
ſang. con-
cretus. A-
ſtringen-
conſerua.*

*Emplaſti-
ca.*

*Quæ coa-
gulāt ſāg.*

de terra sigillata, carabæ, bolo armena, de spodio, cum semine acetoso, quæ hoc modo parabuntur.

Pro spuro & sanguinis reiectione.

R. confer. symphiti, & rosar. antiq. ana 3. ℥. gelatinæ cydon. conditorum saccha 3. j. trochiscorum de terra sigillata vel de carabæ 3. ij. cum syr. myrtil. fiat ad modum lothoth. Solemus enim sic loqui, cum apponuntur conferuæ, quia videtur habere substantiam nimis crassam. Additur hæc conferua symphiti, quia consolidat, & lentore suo retinet, & leniendo expectorationem iuuat. Ea itaque vtemur quoties retinendum, & expectorandum est. Conferua ros. antiq. modicè constringit propter saccharum. Trochisci constringunt & incrassant. Carnes cydoniorum hæc nō apposuiimus, sed earum gelatinam: tenuiorum enim est partium, faciliusque penetrat, quemadmodum syr. de cydoniis, vel eorum succus, qui magis conuenit in affectibus thoracis. Caro autem affectibus ventriculi sic parari poterit.

R. gelatinæ cydonior. vel succi eorundem 3. j. amyli, tragacan. ana 3. ij. terræ sigill. sanguin. drac. ana 3. ij. carabæ 3. j. lapidis æmath. 3. ℥. incorporentur simul, fiat lothoth. Quod si minùs astringat, addi parùm sy. up. myrthi, vel de ros. siccis. Ad dulcorandum parua quantitas sufficit, quia medicamenta sunt sine sapore. Eadem fient ex puluere prædicto, & albumine oui simul agitat, si sensim deglutiantur, vt

R. sanguin. dracon. 3. ij. amyli, tragac. ana 3. j. seminis portulacæ, papauer. vuarum ana 3. j. terræ sigillatæ, vel boli armeni, ros. rubrarum ana 3. ℥. fiat pul. tenuiss. qui albumine oui crudo fortiter agitato, vt sit tenuium partium, excipiat, sumaturque eclegmatis loco, cui saporis gratia saccharum ros. tabulatum addatur. Ex succis recentibus sic fiet.

R. succorum burs. pastor. sanguin. herbæ plantag. depuratorum propter crassitiem ana 3. ij. amyli, sang. drac. ana 3. ij. corall. rub. gummi tragac. ana 3. ij. sacchari ros. tabulati q. s. incorporentur simul, & reducantur in formam eclegmatis. Infundantur gummi tragac. in succis. Si non satis lentus sit, addatur modicum albumin. oui, aut syrapi loco sacchari.

Ad pulmonum Ulcera.

Flunt eclegmata detergentia ad vlcera pulmonum, & trachiz arteriz, qualia præscripta sunt ad detersionem pituitæ, aut facienda, quæ consolidant, qualia sunt quæ ad sputum sanguinis præscripta sunt, nisi quod hic adiungimus, quæ vlcus magis exiccent, vt gum. tragac. arab. torrefact. & consolid. maiorem. Addere solemus confer. 3. ros. antiq. corall. ciner. cancerorum fluuiatilium, vel marin. prius lotorum in aqua hord. vel furfuris, quàm vrantur, aut auferatur falsedo, & post vstionem in aqua ros. addere solemus & semen, & cap. papaueris albi, cum tussis nimium vexat infirmum, & vlceris consolidationem impedit, vt

R. conferuæ symphiti & ros. antiq. ana 3. j. gummi tragac. & arab. leuiter torrefactorum, ciner. cancr. fluuiatilium vel marinorum, ante & post vstionem lotorum in aqua ros. ana 3. ij. corall. rub. boli arm. terræ sigillatæ ana 3. j. semin. papau. albi, & plantag. ana 3. j. ss. cum syr. de ros. siccis, fiat lohoth. Fit etiam ex syr. ros. laxatiuo, qui inspissatus in eclegmatis formam citra calcificationem deterget, vt

*Tempus
exhibendi
lohoth.*

R. syr. ros. laxat. 3. ij. succi glyc. 3. j. farinæ hord. 3. ss. gummi tragac. vel arab. 3. j. fiat lohoth, sumatur manè tantum, serò autem vtatur constringentibus. Manè autem vtendum est, quia dormiendo pus retinetur, vigilando verò pituitam defluentem intercipimus: exspuimus enim & pus incrassatum expellimus. Tempus itaque matutinū ad purgationem accommodatius est, quàm aliud. His autem eclegmatis pulmonem vulpis addere debemus potius, quàm aliis. Nihil enim aliud præstat quàm exiccationem: quod vt melius præstet, & facilius, in puluerem reductus cum trachia arteria vri debet in furno, alioqui foetidum nimis est remedium, & minus gratum.

De tabellis.

DE tabellis autem superuacuum foret quidquam addere, nisi quod eadem ratione fiunt, qua & opiatæ, id est, ex conferuis pauca quantitate, puluere, & saccharo. Coquitur saccharum in aqua parti vel affectui, vel causæ accommodata, cui conferua admiscetur, & puluis parti accommodatus seu determinatus supra marmor per-

permixtus extenditur placentæ modo. Vel vt saccharum ros. tab. in orbiculos parantur, quibus vtimur. Sed quia conferuæ eas humidiores reddunt, sine conferuis paramus, vt ad ventriculi corroboracionem, confortacionem, & exiccacionem.

℞. pulueris arom. ros. ʒ. ij. diarrh. abb. ʒ. j. sacchari diss. in aqua mentæ, fiat elect. reducatur in tabellas ponderis ʒ. ij.

Simili modo fiunt cum conferuis ad hepatis, splenis, capitis, aliarumque partium affectus.

Ad hepatis refrigerationem.

℞. Conferuæ florum cichor. & nenuph. an. ʒ. j. pulueris triasantal. diatragacan. frigidi ana ʒ. ij. sacchari diss. in aqua endiuizæ q. s. fiat electu. reducatur in tabellas.

De conditis.

Condita non multum differunt ab opiatīs: Conueniunt siquidem materia, fiuntque ex conferuis, pulueribus, & saccharo. In hoc autem differunt, quod plus conferuæ recipiant, pulueris minus, sacchari puluerisati plurimum. Hæc magis grata esse debent, quam opiatæ. Nihil itaque amari, foetidi, aut ingrati, & parum pulueris recipiunt. Pulueres enim propter nimium odorem ingrati sunt ægrotantibus. Ad minuendam autem mollietiem conferuarum exiccamus pul. sacchari albißimi, vt

Conditum refrigerans & constringens.

℞. Conferuæ ros. ʒ. j. pul. diamarg. frig. ʒ. j. corall. rub. subtiliss. puluerisati ʒ. ʒ. sacchari q. s. fiat conditum.

Ad sitim & pulmonum inflammationes.

℞. Conferuæ viol. ʒ. ʒ. conferuæ bugloss. ʒ. ij. pul. diatrag. frig. ʒ. j. diamarg. frig. ʒ. ʒ. sacchari candi, & albiss. ana partes æquales, fiat conditum, quod refrigerat, confortat, & humectat. Fiunt etiam ad confortandum, alterandum, constringendum, nunquam ad laxandum. Fiunt & constringentia & siccantia modice, quibus à pastu vtimur ad oris constrictionem, & bonum anhelitum, vt

℞. myrobal. emblic. ablutarum in aqua ros. num. x,

corric. citri, conseruæ ros. antiqu. carniū cydon. ana
 ʒ. ʒ. pul. corall. rub. & margariti tenuiss. pulueratarum
 ana ʒ. ij. diarrh. abb. & diacydonitæ sine speciebus an.
 ʒ. ʒ. sacchari ros. tabulati q. s. fiat conditum, de quo cap.
 post pastum. Ad spiritus foetorem additur aromatic. ro-
 satum & parum mosci, & diamosci vel ambra. Conserua
 ros. antiqua debet addi, quia magis exiccat, recens ma-
 gis laxat & humectat.

De pasta regali.

EX iisdem sunt pastæ regales, ex quibus condita. Ad-
 ditur autem syrupus pauca quantitate, vt pasta sic-
 cior efficiatur opiata, humidior verò electuario. Fiquæ
 sic ad expectorationem in morbis pectoris.

ʒ. conseruæ capil. ven. conseruæ bugl. ana ʒ. ʒ. pul.
 diatrag frigid. diatris simpl. an. ʒ. ij. penid. sacchari can-
 di, an. ʒ. ij. syr. de glycir. parum, fiat pasta regalis, suma-
 tur vt lothoth lambendo cum baculo lyquir. Conuenit
 expectorationi in morbis pectoris. Vniuersalis & com-
 munis hæc pasta est, qua in materia tenui & crassa vt
 possumus. In tenui autem materia loco syr. de lyquir.
 syr. de iuiubis apponemus, conseruam viol. vel syr. viol.
 in febribus autem calidis, & aridis ardentissimis, quæ ex
 pulpa passularum sic.

ʒ. pulpæ pass. ʒ. j. conseruæ enulæ campanæ dili-
 genter contusæ ʒ. ij. pul. diatris simpl. ʒ. iij. cum syr. de
 lyquir. fiat pasta, quæ admodum expectorat. Itaque uti-
 mur, quando materia multum crassa est. Incidit & atten-
 nuat.

De masticatoriis.

Masticatoria, oris sunt remedia ad affectus capitis,
 dentium, trachæ arteriæ, ad pituitam expurgan-
 dam, quæ simplicia aut composita sunt. Simplicia sunt
 mastix, pyretrum, staphisagria, senna; & quæcunque pur-
 gant saliuam mouendo. Composita sunt ex his parata,
 & in puluerem reducta. In sacculis reponuntur, qui ma-
 stificantur, aut pulueres, excipiuntur cera alba, quæ ma-
 stificanda est manè ieiuno ventriculo, deinde expuenda
 cera. Eligenda autē, quæ non sunt saporis ingrati, quod
 diu retineri in ore debeant.

Ad sedandos dentium dolores.

AD sedandos dolores dentium à materia in dentes defluxa sunt ex radic. pyretri, cubebis, pipere vel aliis medicamentis calidis. Ad sputum sanguinis orti ex corrosione gingivarum, aut trachiae arteriae mastica- bitur portulaca. Ad linguae inflammationem eadem ma- sticanda est, vel lactuca, aut aliud repellens.

De pandalis.

AD pulmonum & pectoris affectus utimur medica- mentis pandaleis appellatis, quorum forma ab A- rabibus aut neotericis adinuenta. Gravior autem est e- clegmate, neque ab electuariis differunt materia aut quantitatis proportionem, verum forma duntaxat. Ele- ctuarium enim in forma tabellae, vel placetae extenditur: Pandaleon, vero integrum remanet, in pixide lignea coquitur, saccharum sufficienter infunditur, & concre- scere finitur, deinde cum æger eo vultui, fragit cochlea- ri aut cultro frustum aliquod, quod in ore retineat, ut ta- bellam, vel eclegma, & sensim transglutiat. Fiunt autem ex pulvere & saccharo in aqua dissoluto, & rursus co- cto ad perfectionem, ut concreescere valeat. Sunt qui co- servas commiscant, nimis autem durum redditur pan- daleon, aut alterutrum faciendum, vel minuenda est quantitas conservarum, aut plus saccharum coquen- dum. Posset etiam cum materia est viscosa, aut pro pau- pere parari ex melle cocto, & fortiter agitato, donec sac- charo candidius reddatur, ut apud nos turrones confi- ciuntur, qui à torrendo dicti videntur. Solent confici ex auellanis, vel amygd. torrefactis, melle cocto exceptis. Possunt & hoc modo fieri.

R. pinearum contus. & auellan. contus an. ʒ. β. mell. cocti donec concrescat, qr. β. reducantur ad formam pandaleon. vel turronum.

R. pul. diaris simpl. ʒ. ij. piper. gran. v. mell. de spumati & cocti q. s. fiat pasta solida, vel pandaleon, quo utimur in materia crassa, vel lenta è thorace educenda. Piper enim additum aut zinziber pituitam calefacit, incidit, & attenuat, quò facilius educatur, nec saporem medica- menti deuasat. Zinzib. autem magis convenit, quam pi- per, quia minus exiccat.

Ad incrassationem hæc forma minùs conuenit, quia mel nimium detergendo fluxiones excitat. Itaque in naturis & affectibus calidis, in quibus materia tenuis est, aut cum febris adest, pastas duras seu pandalea ex saccharo conficimus hoc modo.

R. pul. diatrag. frig. 3. ij. sacchari candi & albi, & penidiarū ana 3. j. dissolue in aqua viō. & fiat pandaleon, capiat lambendo. Ad maiorem expectorationem ex pulueris diairis simpl. 3. β. diatragacanti frig. 3. j. sacchari solidi in aqua ros. soluti q. s. fiat pandaleon. Multò autem magis deterget, si pulueris diairis Salomonis apponatur, vt

R. diairis Salom. 3. j. diatragacan. frig. 3. β. sacchari diss. q. s. fiat pandal.

Ad incrassationem cum conseruis.

R. conseruarum viol. 3. iij. pul. diatrag. frig. 3. ij. sacchari diss. & perfectè cocti q. s. & vbi fuerit perfectè coctum, conserua viol. primum ponatur, & exiecerur paulatim donec fiat puluis, qui tritura non eget. Reponantur omnia in pixide, & fiat pandaleon.

Ad expectorationem etiam valet conserua capill. vener. deinde enulæ campanæ vel iridis, si reperiatur. Nec erit reiicienda conserua anthos, quia calfaciendo, & extenuando cum dulcibus mixta expectorat, vt

R. conseruæ enulæ campanæ diligenter pistatæ 3. ij. conseruæ capil. ven. 3. j. pul. diaireos simpl. 3. ij. sacchari dissoluti in aqua hyssopi, vel scabiosæ, melissæ, vel betonicæ q. s. fiat pandaleon.

De Morcellis.

AD eosdem affectus & ad atrophiam paramus solida medicamenta ex amygd. pineis, medulla quatuor seminum frigid. maiorum, semine bombacis, vel papaueris ad somnum. Semina frigida maiora debent addi, quia alia facile vertuntur in bilem, cum saccharo sunt morcelli, vel placentæ, vel tartæ, coquuntur in furno. His adiungi debent flatus discutientia (quia semina frigida maiora ratione frigiditatis, & humiditatis pariunt flatus) sed parua quantitate addi debent, vt anisum, cinamomum ad gratiam: foeniculum dulce ad flatus & exiccationem. Cinamomum probo, nisi in fluxionibus

nibus incipientibus. Tunc enim magis astringens, quæle est crassum, quam illud tenue plus probarem. In hecticis & consumptis ex carne testudinum, paramus & aliis supradictis, non cancerorum; nam nimis facile dissolvitur.

Ad deterfionem fiunt sic.

R. Amygd. dulc. maceratarum in aqua hord. (ad deterfionem ne facile vertatur in bilem) vel viol. vel bugloss. recentium lb. ss. pinearum eodem modo præparatarum q. j. anis. pulueris. vel integri (ne calfaciat, & penetret in venas) 3. ij. contundantur & addito paucio amylo, & sacchari q. s. fiat pasta, ex qua conficiantur mors vel placentæ, coquantur in furno postquam panis extractus. Sin flatus sint in ventre & intestinis, anisum non debet conteri, si verò in venis, debet. Amylum nutrit, & vim emplasticam habet.

Ad phibisim & corporis emaciationem, vel atrophiam

Galeat sequens compositio.

R. pinearum & amygd. dulc. maceratarum in iusculo an. lb. ss. carniū testudin. perfectè coctarum, vel ranarum propter nutritionem, vel cancerorum fluuiatiliū 3. iij. medullæ quatuor seminum frig. maiorum, amygdal. ana 3. ss. anis. 3. ij. cinamomi 3. j. sacchari q. s. amyli parum, fiat pasta cum paucio iure testudinum & vino, fiant morcelli, coquantur in furno. Ego verò carnis mistionem improbo, quoniā nimium in furno exiccatur, nisi in frusta scindatur, & cum iure paretur. Ranarum coxæ idem præstant: humiditatem enim quandam habent, quæ facile non dissipatur. Vinum album addi volumus, ut magis nutriat, & facilius, & citius faciat penetrare reliqua alimenta. Anisum autem, quia humida & dulcia flatus gignunt, ad quorum discussionem conuenit. Addimus tamen, quia gratius & dulcius semen carui, cumini, apij, & fœniculi. Non recusarem fœniculum Italicum illud dulce.

Pignolatum.

FIt huic similis forma, quæ pignolatum dicitur, ex pinearum nucleis in saccharo bene cocto & dealbato impositis, & in morcellos redactis. Nos autem aliquando alia admiscemus & imperamus, ut in formam pigno-

lati reducantur, atque hæc forma fatigatis nobilibus medicamentis & fastidientibus alias medicamentorum efficaciorum formas, imperatur.

De manu Christi.

Compositio quædam Arabibus manus Christi dicta est, ob iucunditatem: atque ea duplex, simplex, & quæ cum perlis dicta. Simplex nihil aliud est, quam saccharum ros. in formam morcellorum, ab eoque solummodo differt, quod saccharum dicitur tabulatum, quia in laminas, vel tabulas supra marmor extenditur. Manus Christi cum perlis fit, addito pulvere perlarum, siue margaritarum tenuissimè tritarum. His viamur in cordis affectibus. Alia vero medicamenta admisceri debent, aut possunt, modò perlis sint similia, nullo sapore, aut odore prædita, ne gratiam medicamenti perdant, ut si quis, dum fluxu ventris torquetur, manum Christi in ore detinere velit, parare poterit cum pulvere coralli, qui inodorus est, ut in cordis affectibus cum ras. eboris, vel pulvere ossis de corde cerui, ut exempli gratia.

R. sacchari dissoluti in aqua ros. ℥. iiij. margarit. tenuiss. tritarum ℥. ij. coquatur perfectè saccharum & fiat manus Christi. Eadem ratione cum rasura eboris, vel cornu cerui, vel pulvere fragmentorum lapidum preciosorum.

De dentifriciis.

Variis modis parantur dentifricia, nempe forma opiata, aut solida sicca & firma. Nulla autem commodior est sicca, quæ fit ex pulvere inæquali, aspero, & sicco, vel ex cineribus detergentium, & resiccantium, ut ex corallo, cornu cerui, conchis marinis, pane hordeaceo, gallis, & nucibus cupressi in furno vstis, ut

R. cornu cerui, dentium equi ana ℥. ij. concharum marinarum aut pectinum, salis cõmunis, nucis cupressi ana ℥. j. vrantur simul in clibano. & fiat pulu. crassius quo fricentur dentes. Putamina ouorum, vel sepia ossa non vsta (scetent enim) in puluerem reducta, commoda sunt ad dentifricia, quibus adiuncta sunt quædam odorata sapore non ingrata, ut cinamomum crassius, garyophil. Sin dentes corrosi sint & scetidi, maiorem salis quantitatem addemus. Ex hoc pulvere sunt opiat

opiatæ cum melle squillitico, vel syr. de ros. siccis, de quibus diximus cap. de opiatis. Ex hoc puluere fiunt dura & solida dentifricia ad formam pyramidis, si excipiantur mucilagine gummi tragac. vel arab parata ex aqua rosarum: longitudinis erunt digitalis, extremo, quod in acutum definit, quadrato, vel rotundo, quibus in umbra siccatis utemur mane & post cibum. Fiunt etiam ex radicibus mollibus gingiuas non lædentibus, ut altheæ, & aliarum coctis in sale, alumine & aceto, vel aqua. quæ sale & alumen recipit, quibus in clibano siccatis & induratis fricentur dentes. Veteres ex lentisco dentifricia parabant, ut & apud nos fit. Possunt etiam ex myrrha aut alio ligno astringente fieri. Sunt qui ex feniculi festucis ob odorem conficiunt. Cur autem id faciant, non video, cum nihil astringentis habeant præterquam ob odorem. Si verò ex sale & alumine pararentur, vel ex radic. mal. vel bismal. meliores essent, ut,

R. myrrhæ, mastich. thur. ana ʒ. β. cornu cerui vsti & loti, coralli rub. ros. santalini moseatelini, garyophilorum ana ʒ. ij. ossis sepiæ, aluminis rochæ combustæ ana ʒ. j. lapidis pumicis ʒ. j. β. salis communis combustæ ʒ. j. fiat pul. utatur cum radice maluæ præparata, ut dictum est.

De pessariis.

Pessarium & nasalium formæ sunt remedium, quæ ad uterum referuntur. Est autem pessus (ut ex Paulo colligere licet) lana pexa, vel quodcunque aliud teres, digiti humani formam referens quo medicamenta sustinentur, eisque utimur ad menses mouendos, supprimendos, uteri suffocationem, prouocationem excrementorum uteri. Nasalia eadem esse puto, quanquam nonnulli velint esse bombacem aut lanam pexam, quæ puluis excipitur, ut utero adhibeatur.

Pessaria verò quoniam dura fiunt, ad formam suppositorij, quæ filo obligata noctu subiiciuntur, ut facile, cum visum fuerit, possint extrahi. Fiunt autem ex simplicibus vel compositis pro causarum & affectuum diuersitate.

Ad menses mouendos.

Ad menses mouendos fiunt ex calidis attrahenti-

bus acribus, facultatem expultricem mouentibus, vel ex radicibus aristolochiæ, ciclamini, brionis, foliis abrotani, arthemisi. saluæ, puluer. puleg. mercur. calamint. semine nigellæ, & vrticæ, leucocy. Item ex lachrymis, myrrha, sagapeno, & opopanace. Ex compositis, vt hiera picra Gal. hiera colocynthi benedicta, triphera magna sine opio & mandragora parata. Fieri autem possunt duobus modis ex puluere, scilicet prædictorum medicamentorum excepto aliquo succo, & conformato in formam glandis, vt,

℞. myrrhæ, seminis nigellæ Romanæ & vulgar. ana 3. iij. saluæ 3. ij. castor 3. β. cum succo mercur. vel pauca terebinth. vel melle fiat pessarium. Aut puluis ponatur in sacculo confectus ex panno raro, addito pauco bombace, fiat ad crassitiem digiti maioris. Commodissime autem his utemur ex puluere benedictæ, quæ attrahentia plurima, aperientia & acria recipit, vnde ducit menses. Vtile enim est & necessarium medicamenta attrahentia apponi, cum sanguis in partem iam non influit, aut vt diuertatur, cum ad pulmones, cerebrum, & mammæ nimium influit. His etenim maxime utimur, cum vterum expurgare volumus excrementis in vteri cavitare collectis, addimusque agaricum, & alia pituitosa, quia talis humor maxime redundat in parte, aut chologoga si biliosa, flaua, & serosa excrementa sint, hoc modo.

℞. agarici troc. 3. ij. pulu. benedictæ 3. iij. cum succo mercur. fiat pessarium, adde parum terebinth. vt melius vniantur medicamenta. Non enim debet agaricus in tenuissimas partes teri, sed in crassas duntaxat. Potentius enim trahit neque retinet, aut lædit vterum.

Ad vteri præcipationem.

Flunt ex discutientibus flatus, trahentibus valde, ex odoratis iucundis, hoc modo.

℞. beniouini, styrac. garyoph. ana 3. j. galliæ moscatæ 3. β. mosci ḡ. vj. fiat pulu. exceptus bombace, imponatur in vterum. Hæc autem simplicia reduci debent in pulueres, quia sunt selectissima, chara, & utilissima ad hunc affectum, maxime autem si ciuetam, aut moscum recipiant.

Ad menses retinendos.

Flunt & ex constringentibus, ac consolidantibus ad menses retinendos, vt,

R. stercoreis porci ʒ. j. sang. drac. ʒ. j. boli armeni ʒ. ij. cum succo burf. pastor aut plantag. fiat pessar.

Idem pessarum ablato stercore vtile erit in vlceribus vuluæ, addita cerusa, vel tuthia.

De trochiscis.

Trochiscorum forma tantum fit ad medicamentorum conseruationem. Nam trochiscis non vtimur integris, exceptis, quos in ore retinemus. Trochisci enim de squilla in theriaca positi formam perdunt, dum in puluerem reducuntur. Item trochisci de viperis, diarrh. trochisci de rhab. & alijs, quibus in opiatibus vtimur. Tali autem forma fiunt, vt iam dictum est, vt pulueres in formam talem reducti diutius conseruentur, qui alioquin perirent, aut exhalarent: quod ex Dioscor. colligitur, qui imperat nardi celticæ radic. & cauliculos folijs abiectis tritos, secerni, vino excipi, & in pastillos redigi, atque ita in vase fictili diligenter operto asseruari. Id autem conseruationis gratia fieri docet, cap. de cinamomo. Tritum, inquit, vino excipiat, vmbraque siccata, quo diutius daret reconditur. Vtinam idem fieret de reliquis pulueribus cordialibus odoratis. Diutius enim conseruaretur eorum facultas Trochisci enim sic obdurati ob duritiem & densitatem diutius resistunt aëris iniuriis. Pulueres verò minimè, quia tenues cum sint, statim aër subit, atque ita alterantur. Cæterum conficiendorum trochiscorum ratio hæc est. Reducantur in puluerem ea, quibus volumus parare trochiscos, si in puluerem reduci possunt. Quanquam & nonnulli trochisci formentur ex quibusdam, quæ puluerisari non possunt, ne eorum facultas deperdatur, vt de viperis, de squilla, & similibus, vt excrementis testudinis: sed fieri debet decoctiones, deinde vino, aut alio humore excipiuntur, vt odorati sint, aqua ros. excipiantur, vt trochisci de gallia moscata, de gallia magna, & vino ad ventriculi & hepatis apertionem vt diarrhæd. Alij succo endiuæ, vt trochisci de absinthio: alij succo eupatorii, vt de eupatorio appellati. Trochiscorum alij sunt laxantes, trochi-

Sci alandal, de agarico : alij astringentes vt de terra figilata, de spodio, de carabe: alij aperientes hepatis obstructions vt trochisci de eupatorio, de rhab. Alij splenitici vt de cappar. alij sedantes dolorem vlcerum vesicæ vt alchecangi. Quamquam autem Medicus ipse non paret medicamenta, sed paratis vtatur duntaxat, breui tamen indicabimus conficiendi rationem. Sumat itaque medicamenta arida, in puluerem reducat, ac reponat vsui futuro. Trochisci ventri apti sunt, ex quibus opiatam parandam docuimus prætermisiss conseruis. Eodẽ modo sunt hepatici, & splenitici, & illi qui yrinam mouent, menses, sedantes dolorem, & vlcera sanguinemque & alui fluxum restringentes. Tantummodo eligantur medicamenta parti affectæ determinata. Fiunt efficaciora remedia magis communia, quam propria, & vera, vt multis remediis adaptari possint, quemadmodum theriaca antidotus est communis omnium animalium moribus, sic de reliquis. Fiunt etiam trochisci ad affectus externos, vt ocularia medicamenta olim in trochiscorum modum fiebant, vt ex Dioscor. cap. de nardi spica patet, & ex Galen. in methodo medendi collyrium album Rasis, trochisci formam adhuc retinet.

Præterea facilius asportatur forma sicca, & dura, quam liquida & molli. Possumus etiam, cum volumus, in pul. reducere, deinde in opiatas, vt diarrhædum.



GVLIELMI RONDE-
LETII DOCTORIS MEDICI,
ET MEDICINÆ IN SCHOLA
MONSPELIENSI PROFESSORIS
regij & Cancellarij,

*De compositione medicamentorum externorum,
Liber posterior.*

P R Æ F A T I O.



VPERIORI libro de internis, id est, de iis quæ in corpus ingeruntur, abundè à nobis disputatum est. Superest vt de remediis externis, id est, quæ exterius admouentur, agamus, quæ sunt inunctiones ex oleis simplicibus, vel permixtis, & cæteris, quæ suo ordine explicabuntur: vt linimenta, vnguenta, cerata, emplastra, cataplasmata, pulres, sinapismi, collyria, sacculi, epithemata, fomenta, incessus, balnea, lotiones, suffitus. Cæterum ab inunctionibus ex oleis tanquam medicamentis minùs compositis auspicabimur. Sunt enim olea veluti basis & fundamentum seu elementum ceratorum & vnguentorum. Fiunt interdum inunctiones ex vino & oleo, vt

R. ol. absynth ʒ. ij. vini maluatici ʒ. j. fiat inunctio pro ventriculo. Interdum pluribus admixtis. Varius autem est oleorum ordo, vt.

Oleum	Nardinum	{	Exsiccat	{	Et cale- facit
	Nucum				
	Ricinum				
	Lucernarum				
	Oliuarum recens	{	Humectat		
	Amygdal. dulcium				
	Sesaminum				
	Amygdalarum	{	Relaxat		
	Oliuarum				
	Sesaminum				
	De absinthio	{	Astringit		
	De menta				
	Lentiscinum				
	Mastichinum				
	Chamæmelinum	{	Rarefacit		
	Anethinum				
	Amygdalarū amarar.	{	Digerit		
	Nucum				
	Oliuarum antiquiss.				
Rutaceum					
De spica vulgari	{	Detergit			
De myrrha					
De iunipero					
De tartaro					
De frumento					

Oleum

Nymphae
Myrtillorum
Omphacinum

Exsiccat

Oleum

Et refri-
gerat.

Cucurbit.
De semine Melonum
Violarum
Cucumeris

Humectat

PArtibus etiam adscribuntur olea, vt capiti ferè omnia, præter quàm de hyosciamo, quod nullo pacto conuenire potest. Thoraci ea tantùm quæ laxant & pectus dilatant, nisi sanguine è pectore fluente, in quibus vtimur astringentibus, sed non debent poni supra totum pectus Relaxant, & pectus dilatant oleum amygd. sesaminum, de lilio, irinum, cherinum.

Diversis parti- bus olea potif- simum conue- niunt:	Ventriculo	Moderatè calfa- cientia, vt sunt	De menta De mastiche De absynthio Nardinum
		Moderatè refri- gerantia cū atri- ctione, vt sunt	Cycionium Myrtillorum Lentiscinum Ex semine vua- rum.
		Quare ve ventriculo con- ueniunt : nam & con- fringi vult leuiter.	
	Hepati,	Obstructo	Nardinum Amygdalarum amararum.
	Lieni,	Quæ attenuant, vt	De caparibus De fraxino De spica Irinum De behem. Liliorum
		Relaxantia & cal- facientia, vt	Irinum Cherinum Anethinum.
	Vtero,	Odorata, vt	De croco De myrrha Foliatum Nardinū, de spi- ca, & olea frigida, de gagate, petro- leum, & de casto- reo.

Constringentia, quando constringendum, vt in defluxionibus.

Articulis
omnia

Olea conueniunt potissimum

Fortiter resiccantia & digerentia cum resiccandum & digerendum, vt in declinatione morbi articularis.

De sulphure
De vitriolo.
De spica nardi.
Rutaceum.
Nucum omnium communium
De nuce indica.
Nucis moscatæ & macis.

Neruis fortiter resiccantia, aut fortiter constringentia, cum relaxatio timeretur, vel paralyxis, ob id conuenit maximè oleum.

Mastichinum
Lentiscinum

Olea, quæ flatus discutiunt in conuulsione sunt optima. Quanquam oculis olea non conueniunt ob partium tenuitatem & acrimoniam, antiqui tamen succo balsami (quod nonnulli oleum balsami vocant) vsi sunt in principio ad digerendum in suffusionibus, cum sit succus tenuis, olei speciem referens: in cuius locum oleum de spica substituere possumus in suffusione oculorum cum pauca cera, vt quod tenuitatem partium non minorem habeat, vt oleum de myrrha in quibusdam affectibus. Alia olea aliis magis conueniunt, alia minus. Viceribus olea non conueniunt, quia sordida ea efficiunt, & humectant, cum exiccati desiderant: interdum tamen ad mineralium asperitatem castigandam admiscuntur constringentia, exiccantiaque: vt oleum rosace. myrthinum, lentiscinum. Iisdem affectibus conueniunt quoque olea, quæ per calcinationem fiunt, vt oleum de vitellis quorum in cancro conuenit, quia coctione multa humiditatem perdit, & ideo vim siccandi acquirit.

Affectibus, quæ in cute sunt, conueniunt olea quæ Ad Vitia potentissimè siccant, detergunt, & digerunt, vt oleum de cutis.

frumento, iunipero, oleum nucum rancidarum, gaiaci
hactenus de inunctionibus.

De linimentis.

Materia.

Linimenta appellantur ea remedia, quæ extrinsecus
adhibita, vel asperam partem lenire, vel dolorem
mitigare, vel calfacere, rarefacere, & refrigerare, & exic-
care, & humectare, vel discutere, & detergere, vel emol-
lire, & maturare nata sunt. Si poneretur cera, cerata es-
sent. Fiunt autem ex oleo aliquo antiquo, & axungia,
butyro, & seuo liquefactis, vel aliis, quæ olei consisten-
tiam habent, vel styrace liquida, succo balsami, myrrha
liquida. Aliquando additur terebinthina, vel mucilago,
vel medulla, quæ axungię similis est temperatura, &
consistentia. Facultatem accipiunt ab oleo & aliis à qui-
bus parantur. Fiunt autem ad omnes partes. Nam nulla
verò vel à materia, vel ab affectu accipiunt.

Linimentum ab olei irrigatione differt. Nam lini-
mentum diutius adhæret, neque tam facile effluit, unde
& ad calfaciendum, & ad maturandum, & ad sedandum
dolorem magis conueniunt linimenta, quàm olea per
se. Habent enim butyrum vel axungiam, quæ cum sunt
refrigerata, spissitudinem, & aliquam consistentiam ser-
uant, minùs tamen spissa sunt, quàm vnguenta, vel ce-
rata, de quibus postea.

Ad thoracis affectus.

Ad thoracis affectus veluti ad catarrhi concoctio-
nem, vel ad sedationem doloris à materia calida,
parantur hoc modo.

℞. ol. amygd. dulc. & ol. viol. ana ℥. ij. butyr. loti in aqua
hordei mundati ℥. j. misceantur, illinatur pectus.

Si materia calida vel frigida iam impacta fuerit, se-
quens erit ex usu.

℞. olei amygd. dulc. ℥. iiij. butyr. recentis ℥. ij. axungię
gallinæ, vel anatis ℥. j. fiat linimentum.

Si verò materia frigidior crassiorque & continuatior
sit ob lentorem, ut ea concoquatur, tale fiat.

℞. olei amygdalarum amarar. olei liliorum, vel irinĩ,
vel cherinĩ ℥. ij. butyri rancidi loti ℥. j. axungię gallinæ
& anatis ℥. ss. mucilag. semin. lini, & fœnugr. extractæ
cum

cum aqua hordei & pauco vino albo ꝯ. ꝯ. misce, & croco addito liniantur & latera, & pectus. His linimentis nihil prohibet addere quę sua natura aliquam mediam consistentiam habent, vt mucilaginem feminis, vel rad. altheę, vel styracem liquidam, vel terebinthinam, vel cęsypum, quia digerit.

Ad tumores & dolores aliarum partium præsertim à materia frigida, in quibus relaxanda quę cōstricta sunt, vel à quibus aliquid educendum ad partium separationem, talibus vtimur, nisi in quibus periculosa est nimia remollitio, vel relaxatio, vt in hepate. Verum ad articulorum constrictionem, ad dolores spinę, & totius corporis, tales inunctiones sunt faciendę, quę verē acopę sunt, & lassitudines soluunt.

Si aliquid educendum est, veluti calculus ē renibus deturbandus, aut infans ex vtero reducendus, aut facilius vomitio prouocanda, ora earum partium linimento relaxamus.

Ad duritiem splenis & hepatis addimus mastichen, *Ad sple-* vel ladanum, quę molliunt & constringunt. Additur & *nis* *he-* spica, vel oleum lentiscinum, aut alterius leuiter astringentis, & calfacientis. *patis duritiem.*

Eadem supravterum apponimus addito pauco styra- *Ad vterū.* ce, vel benioui, de spica, foliatum idem efficit. Cum autē multa similia adduntur, vnguenti, aut cerati naturam recipiunt.

Dolores cuiuscunque partis, qui à tensione sunt re- *Ad dolo-* laxando sedantur. Ad partes inflammatas linimentis *res.* vtimur, vt discutiamus, maturemus, digeramus, & sedemus dolorem, vt in doloribus inflammationum auris, vel ani, vel alterius meatus. Linimenta parantur, quia magis parti adhærent, quàm olea minùsque obstruunt, aut grauant partem dolentem, quàm vnguenta, cerata, & emplastra. Idem faciendum censeo, in vulneribus *Ad inflā-* mium resiccatis. Ad dolorem ergo inflammationis auris, *mationem* vel ani, tale fiet linimentum, quod dolorem sedet laxan- *auris &* do, neque calfaciat plusquam par est, vt *ani.*

R. olei viol. ꝯ. iiii. mucilāg. rad. alth. & feminis psillij extractę cum lacte, aut iure pulli, vel aqua hord. munda-
ti an. ꝯ. j. butyr. vel axung. porci, vel medul. porci recen-

tis, vel vituli ꝑ. ꝑ. misc. fiat linimentum. Illinatur pars inflammata & ani & aurium. His medullam addimus, quia temperata non differt ab axungia.

*Ad constringendū non conuenit lini-
mentum.* Ad constringendum minus conuenit linimentum, quia nulla est axungia quæ constringat insigniter: Scuum tamen hircinum, & bubulum, & taurinum ex Dioscoride constringit, sed non per se, quia fit potius siccando, quemadmodum frigida. Præterea astrictio fit potius rebus terreis, quàm aliis. Itaq; emplastra, vnguenta, aut cerata meliora erunt linimenta pro hoc scopo.

Humectantia olea. Ad calfaciendum verò, humectandum, & siccandum linimenta fieri possunt. Humectant quæ ex oleis frigidis, & humidis fiant, vt quæ ex oleo viol. & cucurbitæ parantur, vel ex butyro recenti, addito pauculo lacte recentis mulso, vel lacte quatuor seminum frigidorum maiorum, vel succo cucurbitæ, vel melonum, vt

℞. olei violar. ꝑ. iiij. olei de semine cucurbitæ ꝑ. j. lactis recentis muliebris, vel butyr. recentis an. ꝑ. j. ꝑ. misc. illinatur leniter pars humectanda tribus horis post pastum, præcedente fori tepidè.

Exiccabimus si fiat ex oleis exiccantibus, &c

Exiccantia. ℞. olei irini & costini an. ꝑ. ij. pingued. gallinæ antiquæ salitæ, butyri saliti rancidi an. ꝑ. j. veteris vini, & generosi parum, vel aque vitæ, fiat linimentum.

Pingua antiqua calidiora & sicciora sunt, quia eorum humiditas absumpta est. Huius medicamenti operatio ad resiccandum tarda est. Itaque si ad formam vnguenti referatur, efficacius erit, & quia diutius hærebit, & quia succos quosdam, & metallica, vel alia terrestrium partium recipiet, quæ potentissimè exiccant.

Refrigerantia. Ad refrigerationem partis quæ vel erysipelate, vel alia insigni inflammatione laborat, non tam conuenit linimentum, quàm embrocatio, ex succis, vel decoctionibus herbarum frigidarum, aut vnguenta, quæ magis refrigerant. Poterit autem linimentum parari hoc modo.

℞. mucilag. seminis psil. extractæ cum aqua semperuiui, & pauculo aceto. ꝑ. iiij. succi plantag. vel solani ꝑ. j. olei nymph. vel de papauere vel hyosciami ꝑ. iiij. coquantur succi vsque ad consumptionem, deinde adde pomatæ ꝑ. j. misc. fiat linimentum quo illinatur pars feruēs.

Hæc olea nō è rancidis & antiquis seminibus parari de-
bent, sed recentibus, & non enucleatis. Linimenta calfa-
cientia dolorem frigidum sedabunt, & inflammationis
murationem iuuabunt, si parum ictiolæ addatur aut
maior quantitas mucilaginis fœnugræci, vel vitellum
oui, vel plus substantiæ emplasticæ habeat, sed multo
magis si parum farinæ frumenti addatur.

Sin discutiendum aut dolor calidus sit sedandus, lini-
mentum refrigerans vsurpandum, & hoc modo appro-
priandum, vt si repellendum, plus aceti, vel astringentiũ
imponatur, aut mucilago cydoniorum extracta cum
proprio succo, aut luccus polygoni, aut oleum myrthi-
num, omphacinum, quod ad doloris calidi sedationem
sufficiat, nulla alia re admixta.

Si tensio sit remittenda, linimentum humectans vsui
erit: refrigerat enim & relaxat. Sin addatur oleũ amy-
dulc. magis relaxabit, & multo magis dolorem sedabit,
præsertim partium constrictarum. Hoc autem linimen-
tis conficiendis animaduertendum est, vt si ad aures, vel
alios meatus componantur, plus olei addamus, vt liqui-
dius remaneat. Sin verò supra partē adhibeatur, vt mi-
nus olei, plus butyri aut adipis, ne videlicet tam citò ef-
fluat. Sunt qui linimenta ab vnguentis hacratione sola
differre autumant quod ceram non recipiant, quorum
sententiam reſicio, etiã si in linimētis pulueres adſician-
tur, vt in vnguentis. Nam pleraque vnguenta sine cera
parantur, quale est ægyptiacum.

De vnguentis.

Vnguenta crassioris sunt consistentiæ, quàm lini-
menta, & valentiora, & cum nunc ex omni materia
fiant, difficile fuerit, eorum vnā formam præscribere,
quæ omnibus conuenire possit. Enumeratis itaque qui-
busdam illorum differentiis, sigillatim illorum facien-
dorum rationem docebimus.

Vnguentorum quædam calefaciunt, refrigerant, exic-
cant, humectant, digerunt, maturant, detergūt, carne vl-
cera implent, cicatricem inducunt, carnem generant, di-
gerunt, minuunt, absumuntque, abscessus rumpunt, par-
tes quasdam corroborāt, dolores sedant, axiodyna, & a-
copa sunt, ventrem laxant: Quædam ex herbis recenti-

bus decoctis cum axungia fiunt, vt illud commune Populeonis: Ex decoctione herbarum infusarum per multos dies, ex quibus extrahatur succus viscosus, qui postea oleo cerâq; admixtus rursus decoquitur, & in vnguenti formam redactus seruatur, veluti quod ex althea paratur, Martiatum, & Aragon. Ex radicibus parata diutius macerantur in oleo, deinde contuso diligenter coquantur, & colaturæ cera additur, vnguentum paratur, veluti quod Agrippæ attribuitur. Ex floribus paratur cum pinguedine & oleo, vt rosatum, quod ex axungia porci receti, succo ros. & floribus maceratis fit, addito oleo ros & non amygd. quod calefacit, & relaxat. Tamen amygdalinum scripsit Mesues. Metallica vngueta & decoctione & sine decoctione parantur. Sine coctione sensim fundendo succum, oleum, vel acetum, vt vnguentum diapharmacum & ex cerusa: coctura, veluti cum lithargyrum in oleo decoquitur, & alia metallica, vel cum succi herbarum in oleo decoquantur ad eorum consumptionem, vt in vnguento ex pōpholige. Succus solani in oleo rosato coquitur & absumitur, deinde metallica puluerisata oleo, in quo cera liquefacta fit, insperguntur. Omnia fere vnguenta oleum, ceram, vel terebinthinam recipiunt, nisi cum pingua hæc repugnant scopo, vt si conficiamus ad gangrenas, & putrida vlcera, prætermittitur oleum, pinguedo, resina, & cera, & cū melle, aceto, vel vino decoquantur, fiuntq; vnguenta, vt illud nobile ægyptiacū, quod ad gangrenas confert, & vlcera antiqua, in quibus carnem putridam detrahenda oportet, & putredinem arcere. Ex aceto itaq; melius. Simile est illud Mesue vnguentū, sanans vlcera antiqua, quod aloem, myrrhā, succos absynthij, chelidonij, & plantaginis recipit. Pforicum etiam Mes. ex lithargyro, calchanto, æruginē, vel aceto fit vnguentum ex plumbo apud Nicolaum. Vnguentum de Minio, de lithargyro coctis, vnguentum de cerusa coctum, vnguentum Nicolai contra scabiem, & alia multa, quæ diligens lector potest obseruare. In his affectibus siquidem oleum minus conuenit, ob id sine oleo & cera parantur. Cæterum quamuis medici, & chirurgi vnguentis & emplastris vtantur, paratis magis, quàm quæ ipsi præparent (quia forsitan minus nota est illis vnguentorum & emplastro-

Ægyptiacum.

plastrorum componendorum ratio) nos tamen quæ ad partes referuntur , & ad causas affectuum hoc loco docebimus, à capite initium sumentes.

Pro capite vnguenta.

Capiti ergo paramus vnguenta ad morbos propulsandos, vel præcauendo, qui consortij lege fiunt, vt in calidis doloribus, vertigine &c. Fiunt autem pro affectuum varietate, in quibus obseruandum est, ne indicationes sumptas à partibus negligamus; veluti si calfaciendum, refrigerandum, aut exiccandum sit cerebrum, validioribus remediis id faciendum est, indicatione sumpta à situ. Cerebrum enim situm est in parte profunda. Si extra caput, siccandum fortius, quia cutis valde dura & sicca est, & minus sensibilis: inde fit vt illa medicamentum ferre possit. Fiunt vnguenta excellentia ad dolores capitis calidos, vt in principio cuiusque doloris facti per consensum partium infernarum, vt vertiginis, & in initio epilepsiæ, quæ per consensum fit, ex oleis refrigerantibus & astringentibus, vt repellantur humores, & fumi, qui recipiuntur, vt feruor, & sanguinis ebullitio desinat. In talibus non parum aceti addendum ad penetrationem. *Refrigerantia & astringentia olea.* Fiunt autem vel ex oleo rosaceo, omphacino, vel myrtino, vel cydoniorum, vel alio astringente, cera alba, rosis, coriandro, semine myrti, lactucæ, & aliorum eiusmodi, vel ex succis herbarum repellentium, vt,

℞. olei ros. omphac. ana ʒ. iij. coriand. ros. rub. myrtillorum coralli ana ʒ. j. ceræ albæ q. s. aceti parum, fiat vnguentum, quo vnguatur anterior pars capitis. Vel ex siccis sic.

℞. succi summitatum vitis, plantag. & solatri an. ʒ. j. olei ros. omphac. vel cydoniorum vel nenuph. ʒ. iij. De-coquantur vsque ad consumptionem succorum, quibus adde ceræ albæ q. s. seminis berberis, seminis coriandri, & endiuæ an. ʒ. j. myrtill. ʒ. ij. misce, fiat vnguentum addendo aceti q. s.

Si dolor à fumis oriatur, idem fieri poterit, nisi quòd emplastra minus valent, quia discussionem nimis obstruendo prohibent. Sed post hæc, olea vnguentis addimus ad discutiendum, & resoluendum quod collectum est. Sunt autem opportuna, quæ caput non tentant, quale

est oleum amygd. amararum, oleum chamom. & sambuci, & nardinum. Alia enim nimis odorata capitis gravitatem inducunt, ut anethinum, oleum de spica, irinum, nucum: quibus utendum non est in declinatione, in qua fortiora, & resoluentia fortiter sunt adhibenda. Neque timendus est dolor capitis, corpore purgato. Est enim aliqua ex parte materia, quæ magis molestabat, discussa, tenuis videlicet. Fiunt etiam ad resolutionem materie relicte, calidæ ex mediis, frigidæ ex calidis summè. Medium est, si statim ex oleo anethino paretur, ut

R. olei anethini & chamom. an. ʒ. iij. flor. chamom. & melil. sambuc. anthos, stechad. ana ʒ. ʒ. nucis moscatæ, & macis ana ʒ. j. ceræ novæ q. s. fiat unguentum, addito pauco aceto, vel vino albo ad penetrationem. Hoc convenire potest in phrenitide, & dolore capitis. In declinatione verò vinum album cōveniet, in principio acetum.

Si materia sit frigida & contumax fortioribus & summis utendum est. Et

R. Olei nucum, & irini ana ʒ. ij. olei rutæ. ʒ. j. nucis moscatæ, caryophil. macis, piperis, piretri, castor. ana ʒ. j. ceræ citrinæ q. s. aquæ vitæ parum, fiat unguentum quod illinatur pars affecta. Conveniet in doloribus frigidis & longis, ut in catarrho, catoche, caro, apoplexia, & lethargo. In affectibus, in quibus sensus non est exactus, foetida & nimium odorata non sunt reiicienda. In huiusmodi itaque affectibus stuporem inducentibus oleum de spica, petroleū, & foetida usurpamus. In quibus verò est exactus sensus, aut dolor primū incipit, reiicimus quæ graviter offendunt nares, & dolorem capitis iam factum augent. Ad ulcera multum exiccantia usurpamus. Cum enim cutis, quæ ossi integit, vel quæ parum carnis, aut omnino nihil habet, durior, sicciorque sit, exiccanda est, indicatione ab eius temperatura sumpta. Miscenda itaque erūt myrrha aloë, iris, panax. & quæ fortius siccant, ut antimonium, lithargyrum calchitis, sulphur, bitumen, tuthia. Ferre etiam possunt emplastra facta molliora, ut in oleo rosarum vel irino, liquefactum emplastrum de lanua, de gratia Dei, diacalchiteos, divinum, & contra rupturam.

In ulceribus capitis manantibus parantur ex summè

In doloribus frigidis.

Exiccantia.

mō exiccantibus & resoluentibus, vt ex fuligine furni, alumine, sulphure, sandaraca, auripigmento, cineribus nucum, vel testis erinacei, vel hypocampi, vt,

℞. olei nucum, olei lucernarum, & de iunipero ana 3. ij. calchitid. 3. j. nucum vstarum cum testis, granorum iuniperi ana 3. β. ceræ rub. parum, fecis aceti acerrimi 3. j. fiat vnguentum. Curat omnia vlcera capitis manantia, quod citius efficiet, si cinabaris 3. iij. vel sublimati 3. iij. recipiat, vel 3. j. argenti viui extincti cum 3. iij. sulphur. (Argentum enim viuum extinguipotest, vel sulphure, vel aceto, vel calcinatione.) Si affectus sine sudore curandus sit, vt is qui sine morbo Italico accidit: Si verò cum sudore vt in morbo Italico, cum axungis, vel oleo amygd. dulc. est extinguendum.

*Quibus
extingui-
tur ar-
gentum
viuum.*

Ad alopecia ophasimque parāda sunt ex fortiter digerentibus, & resiccantibus. Abstinedum autem ab his, quæ depilant, vt auripigmento, sandaraca, calce. Quauis enim non prohibent pilos renascere, grauitertamen ferūt infirmi, quod reliquum est pilorum deperdere, vt,

℞. olei de iunipero, & de abrotano ana 3. ij. cineris erinacei terrest. 3. β. cineris pellis talpæ, & vrsi ana 3. iij. abrotani vsti 3. ij. cineris vespar. 3. β. ceræ candellarum nigrarum q. s. fiat vnguentum. Vtile est hoc vnguentum, nisi à morbo Italico proueniat alopecia. Tunc enim facta inunctione totius corporis miscendum erit vnguentum paratum cum hidrargyro, & conueniet post sudationes. Siccat, digerit, pilorum procreat generationem, & pilos relictos conseruat, si pili decidant ob relaxationem pororum post sudationes frequentes, fiant vnguenta ex constringentibus, vt ladanō, acacia, hypocistide, aliisque astringentibus, vt,

Constringentia poros cutis.

℞. olei myrtill. vel cotonearum 3. ij. ladani puri 3. β. hypocistid. acaciæ ana 3. ij. aluminis 3. j. ceræ albæ q. s. fiat linimētum, quo vngantur post detersionem capitis factam cum lixiuio debili in quo rosæ decoctæ sint. Sed de lixiuiis plura suo loco. Hæc vnguenta huic causæ efficacissima sunt.

Quod si ob vitiosos humores radices pilorum erodentes, ob alimenti defectum, vt in hecticis, decidant, parum valebunt. Quod si ab acris humoribus, vt in

morbo Italico, post euacuationem vniuersalem aliquam factam, relaxantibus, & areoticis aperitiuis potius vtemur, vt humor per poros cutis expellatur, nec diutius in corpore remoretur, quibus addenda sunt temperantia, quale est lac, & inter alia oleum amygd. dulc. fiet autem hoc modo.

℞. olei amygd. dulc. ℥. ij. butyr. recentis ℥. j. lactis ℥. iij. Butyrum & oleum cum cera liquecant, quibus vtrūque refrigeratis misceatur lactis quantum ebibere poterit, vnguatur frequenter sero & manè. Abluatur sero lactis, vel lacte ouillo, aut bubulo, aut lacte amygd. dulc.

Psilotra duplicia.

Hinc sequuntur vnguenta psilotra. quæ ab effectu ita vocantur, quod scilicet pilos corrumpant, & decidere faciant. In his autem componendis magna est adhibenda diligentia, & in applicandis magna dexteritas requiritur. Duplicia autem sunt, vnius generis quæ depilant, alterius, quæ renasci pilos prohibeant. Quæ depilant, sunt ex calce, sandaraca, auripigmento sine axungia, vel oleo, sed cum lixiuio, & sapone molli, quoniam etiam si aliquid olei habeat, calx castigat, alioqui oleum vim sandaracæ, & auripigmenti obtundit. Fiat hoc modo.

℞. saponis gallici mollis ℥. j. sandaracæ auripigmenti ana ℥. iij. calcis viuæ ℥. j. misceantur simul, & applicentur supra partem, quam depilare volueris. Sin aqua vel lixiuio prius abluatur pars, citius penetrabit. Caue autem ne diutius parti adhæreat. Vrit enim cutim, quam postea vnguento ex calce decies extincta in aqua rosea & oleo rosarum, aut vnguento de cerusa curare oportet. Vbi euulsi erunt pili, hoc efficacissimo oleo renasci prohibentur.

℞. olei hyosciami vnc. iij. salamandræ num. iij. scolopendræ num. x. lepores marinos, & vrticas marinas ana num. iij. salis ammo. & fossilis ana ℥. vj. decoquantur simul, quibus decoctis adde sanguinis vespertilionis ℥. ij. ceræ albæ parum, fiat vnguentum, vngatur pars, & fricetur sponsia vel alcionio. Et ne oborietur inflammatio, oleo hyosciami foueatur. Utatur diu & frequenter.

Aurium vnguenta magis exiccare debent, at parti- *Ad aures*
bus internis liquida potius iuiciuntur, vel linimenta *vnguenta.*
sunt potius, quàm vnguenta. Nihil itaque iam de vnguentis aurium dicemus.

Ad oculos vnguenta.

Oculis vnguenta non præscribuntur ex oleis, sed ex pomata, vel vnguento rosato, & mucilagine fœnugræci, vel aliis rebus opportunis.

Fiunt autem ad palpebras affectas, vel ad curationem corneæ. Palpebris autem adhibentur, vt frequenti nitatione detergantur. *Ad palpebras vnguenta.*

Et quanquam oleum oculis sit mordax, veteres tamē opobalsamum quod oleum balsami vocant apponebāt, in cuius locum substitui potest nostrum de spica, quod *Oleum de spica.*

Ad inflammationem itaque oculorum & palpebrarum fiunt hoc modo, quamvis collyria liquida, vel linimenta magis conueniant, quàm vnguenta. *Ad oculorum & palpebrarum inflammationem.*

℞. pulpæ pomorum decoctorum in lacte, vel cum aqua ros. ʒ. ij. contundantur diligenter. deinde adde aque periculi ros. & myrrh. ana ʒ. β. mucilag. seminis phlij. Adde tuthiæ præparatæ ʒ. β. incorporentur simul, & fiat vnguentum Vel fiat sic.

℞. vnguenti ros loti in aqua peculi ros. ʒ. j. tuthiæ præparatæ, & acaciæ ana ʒ. j. incorporentur, fiat vnguentum quo vnguantur palpebræ.

Si inflammatio sit cum defluxione, & scabie, & rubo. *Inflammatione cum defluxione.*

℞. pomatæ ʒ. β. tuthiæ, trochiscorum alborum ras. ana ʒ. β. vitrioli romani ʒ. β. vnguantur palpebræ.

Ad inflammationem digerendam sic parabitur.

℞. Mucilag. seminis fœnugræci loti in aqua fœniculi, & in eadem extractæ ʒ. β. sarcocollæ nutritæ cum lacte ʒ. iij. aloës, myrrhæ, croci ana ʒ. β. misce, fiat vnguentum, applicetur palpebris. Digerit enim & detergit.

Addeterisionem suffusionis & cicatricis extenuationem, ex fellibus vel melle parantur.

℞. Fellis vaccæ ʒ. j. fellis vulturis, vel milui, vel galli.

3. ℞. mel. rosacei colati 3. ij. ossis sepia 3. j. stercoris la-
certi 3. ℞. misce, fiat vnguentum, quod seruetur in vase
æneo, vel,

℞. omphac. inspicati vel coctione, vel solis exiccatione,
& murcæ præparatæ ana 3. j. saccha. candi 3. ij. mu-
cilag. fœnugr. 3. iiij. tuthiæ præparatæ 3. j. ℞. misce, vngan-
tur palpebræ.

Ad genarum scabritiem, scabiem & Ulcera.

*Ad genas
Sngueta.*

℞. Omphac. acaciæ ana 3. j. tuthiæ præparatæ 3. ij. ce-
rusæ lotæ, antimonij ana 3. iiij vnguenti ros. 3. ℞. misce,
vngantur genæ, cui adde cinerem myrtill. lotorum in a-
qua periculi ros.

*Ad lach.
fluxum.*

Ad lachrymarum fluxum vnguenta parabuntur, non
ex nimium astringentibus vel fortius exiccantibus, quia
talia carnem, quæ est in canthis oculorum, absumunt,
sed ex sarcoticis admixtis emplasticis, & leuiter astring-
entibus, vt,

℞. corticis thuris, mastich. sarcocollæ ana 3. ij. gum-
mi tragac. & arab. torrefactorum 3. j. tuthiæ præparatæ,
antimonij, ana 3. ℞. sang. dracon. puri, acaciæ & amurcæ
inspissatæ ana 3. ij. misce, fiat vnguentum, vngantur can-
thi oculorum, & totæ palpebræ.

Ad agylopos.

*Prima
agylopos
occafio.*

AD agylopos, quas lachrymales fistulas vocant, fiunt
vnguenta & ad præcautionem, & ad curationem.
Ad præcautionem conueniunt vnguenta illa prima di-
cta ad lachrymas. Nam ferè prima agylopos occasio est
frequens lachrymarum descensus, quæ genas ab osse se-
parantes & diutius in parte hærentes, os humectantes,
à suo temperamento immutant, deinde corrumpunt:
quo corrupto nihil profunt medicamenta, sed ad chi-
rurgiam confugiendum est, & os vstulandum, nouacula
prius carne incisa, & cute, deinde sarcoticis & sicciori-
bus cicatricem inducimus. Non est autem prætermit-
tendum defluxiones acres citius abscessus facere. Quare
priusquam vel purgantia, vel topica remedia institua-
mus, distinguemus à qua causâ fiat, calidane an acri, vel
à frigida & humida. (Potissimum enim ab aurib. liqui-
dem hæc erodunt, & abscessum faciunt citius; si à frigi-
dis longiori tempore.) Exempli gratia, Si corpus serosis
& cri-

& acribus humoribus abundet, ab acrimonia fieri conii-
ciemus. Talis enim plerunque est habitus externus,
quales sunt humores in corpore redundantes. De signis *Initium*
autem alio opere tractabimus, nunc de medicamentis. *affectus.*
Si fiat continuus in oculos humorum defluxus citra ru-
borem, & copiosius partes relaxatæ, & tumefactæ appa-
reant, & genâ inferior aqua plena inspiciatur, initium
certè erit affectus, atque tunc oportet vnguenta lachry-
mas sistentia fortiora reddere, aucta tuthiæ antimoni-
que dosi, quibus proderit chalcitidem, & alumen ad-
iungi, vt,

R. antim. chalcit. alumin. ana 3. iij. sang. drac. corall.
rub. (quia suo pondere prohibet abscessum) ana 3. ij. li-
tharg. 3. ss. ol. ros. ceræ rub. ana q. s. aceti parum, fiat vn-
guentum, quo vngatur pars affecta. Et quia emplastrû
forma huic scopo accommodatior est, ex his emplastrû
paramus diminuta quantitate ol. vel lithar. cocti in ace-
to, oleo de succo palmæ, aut pyris sylvestrib. Si defluxio
acris sit & mordax, humor incrassandus est, & pars con-
stringenda, ne tam facilè suspiciat.

R. litharg. cerus. lotæ, antimon, ana 3. iij. tuthiæ præ-
paratæ, plumbi tenuissimè puluerisati ana 3. ij. succi plâ-
tag. & palmæ, ol. ros. ana partes æquales: coquantur ad
consumptionem succorum: addito pauco aceto, in quo
dissoluè ceræ albæ q. s. fiat vnguentum vt supra dictum
est, addèdo in fine opij torrefacti leuiter 3. ss. & compri-
matur pars eo emplastro, vel supra vnguentum laminæ
plumbi adplicentur, quæ pressam partem retineant: in
quibus vnguentis eligenda sunt, quæ ponderosa, vt fa-
cultate siccandi & refrigerandi, & pondere suo compri-
mendo iuuent, quemadmodum in enterocèle facien-
dum docebimus. Magnes itaque, plumbum, antimo-
nium, cerusa, lithargy. & tuthia valèt, & dormièdum est
in partem contrariam, vt vnguentum premat partem.
Radices bistor. quinque solia taphis barba. vel cortex
rhab. idem præstant in aceto maceratæ, exiccate, & in
vnguenta redactæ. Lapides ponderosi, vt lapis Iudaicus
& marmor cum oleo profunt.

Ad spoliatiõem ossis fiat vnguentum ex agarico, *Ad spolia-*
tartaro, myrrha, & melle, quod ossi imponitur. Aliud *tione ossis.*

autem ex emplastro diuino optimum fit, ad inducendam carnem.

Ad affectus narium.

AD narium affectus hunt mollia vngueta ad polypos exedendos & extirpandos, & ozenas extirpandas. Fiunt autem vel ex causticis vel septicis, vt auripigmento, sandaraca, reagali, sublimato, præcipitato, vel ex cathereticis, id est, imminuentibus carnem, vt flore æris, squamma æris, flore petreæ (qui forte est salpetre) hæc autem omnia si reducuntur in vngueta, id sine oleo & pinguedine fieri oportet: quia pingua omnia extinguunt acris medicamenta, & mortificant. Cû sapa igitur & melle, vel omphacio parabuntur, quibus etiam atrodentia cum astrictione admiscenda, vt chalcitis, calcantum, misty, sory, alumen vstum. Fiunt hoc modo ex cathereticis. Pulueres melle excipiuntur vel omphacio inspissato, & parato in vase æneo, alias non eroderet, vt

℞. squammæ æris, æruginis æris ana ʒ. ij. omphacii ʒ. iiij. incorporentur simul, & fiat vnguentum, quo illinuntur tantum partes affectæ, vel

℞. sandaracæ, vel auripig. chalcit. præcipitati an. ʒ. ij. mellis q. s. fiat ad formam linimenti. Vel si fortius velis, adde omphacium. Hæc si maiora, addito multo melle, vel succo mali granati, vel plantag. vtilia erunt ad ozenas curandas in principio, vt auferatur pars affecta male & corrupta: tandem ad sarcotica veniendum parti accommoda, id est, sicciora, quale est illud quod multum aloes, myrrhæ, sarcocollæ, carabæ, cerusæ plumbi vsti & loti, & lithargyri recipit, vt

℞. aloes lotæ, aquæ plantag. ʒ. iiij. myrrhæ electæ ʒ. ij. radic. irid. sarcocollæ ana ʒ. j. cerusæ, antimon. ruthiæ, minij ana ʒ. ss. olei hyperici & ros. ana ʒ. ij. mel. ros. cola. ʒ. j. succi granorum punitorum, & pilosellæ, vel ling. passerinæ ana ʒ. ij. Coquantur succi cum oleis, deinde mel, postremo puluerisata diligenter inspergantur, & ad vnguenti formam reducantur. In ist. synguentis nunquam prætermittantur detergentia quædam, quia in eis partibus retardantur communia recrementa, & propria vlceris. Vide autem ne nimium detergant: vel alia astringentia addeda, ne nimium detergendo ad partem

tem reuocentur recrementa capitis. Non obetit si cera addatur his vnguentis. Nam vbicunque oleum ponitur, & cera poni potest, sed quia lachrymæ, & alia satis viscosa sunt, & emplastica, cera & resina, & terebinthina omitti possunt. In vnguentis ad ozena præparatis, quia morbus est fœtidioris, fugienda sunt fœtida, & potius odorata admiscenda, quemadmodum itidem illius gran. apposimus, & quia sarcoticum. Sin diuiti paretur vnguentum, adde mosci ʒ. ss. musci arboru, vel benioiuin, vel cyperi, vel rosarum ʒ. j.

Ad affectus oris vnguenta.

AD oris affectus raro aut nunquam vnguenta instituiamus, quia nauseam mouent, & ob largam humiditatem non possunt adhærere. Gargarismata igitur vel alia remedia instituuntur, vt aqua sublimata, aqua fortis temperata, vel eclegma aliquod ex his, quæ ori grata sunt, tum odore, tum sapore. Nec me laet gargarismatis admixtum ab aliquibus esse vnguentum ægyptiacû, quod nō improbo, cum illud ex melle, aceto, & flore æris sit confectum. Sic etiam vnguenta hoc modo parata sine oleo, cera, pice, resina, aut adipibus possunt accommodari ex melle, vel sapâ, vel ex omphacio. Si quis ad oris vlcera vnguenta constituat, in memoriam reuocet theoremata in medium proposita, cum de gargarismatis ageremus: quo loco admonuimus, vt medicamenta illa ingrata, vel ob grauem odorem, vel saporem, astringentem, & siccitatem insignem magna quantitate habere debeant, aut tam propè œsophagum non apponerentur, ne in ventriculum deuantur. Nam ferè illa omnia efficacissima ad oris vlcera venenosa sunt, vt li-
tharg. chalcitis, sublim. cerusa, sed commodè potest pa-
rari ex acacia, omphacio, alumine, & aliis hoc modo.

Cautio

*Ad oris vl-
cera.*

℞. acaciæ, omphac. ana ʒ. i. j. mell. ros. colati ʒ. iij. rad. irid. ʒ. ij. alumi. ʒ. j. ss. cortic. thur. ʒ. j. misce, fiat vnguentum: applicetur parti ad diuersionem vlcerum, & post diuersionem minuendum est omphacium ad ʒ. j. & augendum alumen ad ʒ. iij.

Succus pyrorum agrestium, vel sorborum, vel cyto-
niorum in melle decoctorum cum magna vtilitate ponitur. Siccatur enim & astringit, quod necessarium est, quia

*Succi a-
stringen-*

partes internæ oris multum humidæ sunt ob saluam, quæ vim vnguenti minuit, & laxæ sunt, vnde serpit vlcerus, & pascitur semper: itaque constringendum est. Fit vnguentum ex farinis non amaris, melle ad deterfionem, butyro ad maturationem, vel axungia ad exiccationem, si torreantur Ad maturationem.

R. farinæ tritici 3. iiij. coquantur cum sapa vel butyro, vel oleo, & parti applicentur. Ad deterfionem ex farina hordei, vel orobi, vel fabarum, magis siccabunt si torreantur, vel in furno coquantur prius, deinde miscantur. Hæc autem forma potius inter pulres, quam vngueta debet referri. Ex vltis etiam, vt ex corallo vsto cornu cerui, ebore, sale, alumine vltis, pane vsto, ex antispodio, & melle, vel sapa. Ad desiccationem efficacissima parari possunt hoc modo.

R. coralli albi & rub. cornu cerui vstorum ana 3. ij. ostreorum vstorum 3. j. mellis, vel sapæ q. s. fiat vnguentum Quod si acetum addere volueris, vel ex oxymelite, efficacius erit Vel sic.

R. salis communis in furno assis (quia magis reficcat) 3. i. aluminis 3. iiij. ros. rad. bistortæ ana 3. j. excipiantur oxymelite, & leuiter coquantur, fiat vnguentum, quod potentissimè siccet oris vlcerà. In syrupo myrthino vel ros. vel citri coqui debent, & vt ægyptiacum, parari sine oleo & cera.

Ad faciem vnguenta.

AD faciem ornandam siue fucandam, & ad faciei morbos sunt vnguenta. Fucatur facies aut dealbatione; & genas rubras facièdo & labia, de quibus multa in libello nostro de fucis diximus: breuiter tamen hic dicemus vnguenta potissimum fieri ex axungiis & dealbantibus, vt vnguentum illud vulgo citrinum dictum à citro, ad dealbandum potissimum paratū est, axungiam que porci recentem, vel pomatam, vel seuum hœdi, vel capræ potissimum recipit. Nec etiā est reiicienda asini, cāti, neque hominis axungia, si religio patiatur. Oleo etiam aliquando vsurpamus, quæ ex amygdalis dulcibus præsertim, vel cucurbitæ semine, vel cucumeris, vel melonum paratur, è quibus hæc minùs calfaciunt, & cutim leniunt, conueniuntque iis, qui cutim squalidam habent.

*Vnguentū
citrinū.*

habent. Medullæ cruris vituli, & veruecini maxime cōueniunt, si fundantur recentia in aqua fabarum, si detergendum, vel cum aqua nenupharis, si sanguis in faciem influens, sit temperandus, seruetur ad vsum. His adduntur alba quædam vt borax, sublimatum bene extinctum, vel cerusa. Sunt qui marmor, alabastrum, vel conchas (quas porcelanas vocant) in tenuissimum puluerem redigant, & vnguentum parent, de quibus plura lib. de fucis. Sin ad castigationem alicuius rei præter naturam vnguenta fiant, pro natura rei parabuntur, vt ad tubercula, quæ *psyrdracia* vocantur, ex lytharg. butyro, axungia. Si ad nigredinem cutis, vel maculas, vel panos, fient detergentia, quæ nocte illinentur, manè verò detergentur, & fuci adhibentur. Fient autem ex radic detergentibus vt ari. brionis, cucum. irid. vel serpent. Ex farina faba. orobi, cicerum: ex florib. faba. ex viridi æris, sublimato leuiter extincto, quando exedenda sunt aliqua. Ex ol. de vitellis ouorum, de tartaro, sinapi amygd. amar. frumenti, myrrhæ. Paradigma vnum apposuisse sufficiet, vt cōpositionis rationem agnoscant.

*Radices
detergētes.
Farina.
Olea.*

R. rad. cucum. & brion. ana quart. j. rad. irid. & serpent. ana 3. j. incidantur & remperentur in sero caprino, vel vrina pueri per sex dies in vase æneo, deinde decocta, donec mollescat, diligēter in mortario cōtundantur, & per setaceum transmittantur, addendo parum decoctionis, quibus adde adhuc olei ouorum & amygd. amar. ana 3. j. fari. faba. non excorticatarum 3. ij. virid. æris 3. j. sublim. leuiter extincti in succo citri 3. ij. axung. porci & terebinthinæ lotæ ana 3. ij. lique scat axungia in oleo & terebinth. deinde misceantur omnia in mortario, & fiat vnguentum, quo vngatur facies serò, manè autem abluatur aqua distillationis peponum, vel fabarum recentium. Deterget mirum in modum maculas, & tubercula exedit. Mitius fiet hoc modo.

R. olei ouorum. ol. myrrhæ ana 3. j. farinæ fabarum 3. ss. rad. irid. & aristoloch. ana 3. ij. succi rad. cucumer. & serpentar. ana 3. j. decoquantur succi cum oleo ad consumptionem eorum: postea adde terebinth. lotæ 3. ss. & omphacini inspissati 3. j. reducatu ad formam vnguenti addito pauco melle, vngatur facies serò & manè.

Detergatur sero lactis, vel aqua florum fabarum, vel nenupharis, vel aqua distillationis vuarum dulcium. Fieri potest aliud efficacissimum ex fellibus.

℞. fellis Ouranoscopi, vel aliorum piscium, quorum fel flauum non est, neque nigrum, neque viride 3. j. mellis optimi 3. iij. omphacini 3. ss. sacchari candi 3. j. stercoreis lacertæ 3. j. misce, fiat vnguentum: vngatur sero, mane abluat faciem cum aquis supradictis, vel cum decoctione hordei mundati parum cocti, ne nimium facie splendere faciat. His vnguentis sufficiet semel in mensure vi, tribus aut quatuor diebus, antequam prodire velit: & prius probari debent in parte aliqua occulta. Quod si acrius sit, tunc axungia cati, vel oleo ouorum, vel amygdalarum dule. temperari debet. Nō enim omnes eadem sunt carnis mollitie, aut duritie. Experiendum itaque est primum, vt dixi. Si enim brachium, aut coxam, in qua expertum fuerit, læserit, nimium detergendo, multo magis faciem, cuius cutis mollior & rarior est. Cum autem vtetur, videat ne diutius permittat parti hære, sed potius iterare debet, alioqui partē læderet. Quod intelligendum de his, quæ sublimatum non extinctum, vel æruginem æris recipiunt.

Ad pectoris & colli vitia vnguenta.

AD colli & pectoris vitia fiunt vnguenta potius, quā emplastra, quia facilius adhibentur. Fiunt itaque ad anginas, strumas, & parotidas, quæ in hoc conueniunt, quod semper ex relaxantibus, & lenientibus, & digerentibus fiunt. Satiùs enim est humores cedere ad extra, quàm ad intra.

Ad parotidas.

Ad parotidas suppurandas & discutiendas vnguenta, deinde cataplasmata paramus, fiuntque ex oleis digerentibus, concoquentibus, relaxantibus, vt oleo cinnamomi, liliorum, amygdal. de semine lini: ex butyro, & axungia porci, anatis & gallinæ, ex œsipo, dialthea, aliisque similibus relaxantibus, & emollientibus, & digerentibus modice.

℞. olei cham. vel liliorum vel amygdal. 3. iij. butyr. recent. vel axungia porci 3. ss. pinguedinis gallinæ 3. j. farina semini scænogræci 3. ss. flor. chamomil. melilior. ana 3. ij. ceræ nouæ q. s. fiat vnguentum.

Idem

Idem valet ad strumas factas, & antiquatas, in quibus nulla est defluxio: sed cum incipiunt, oportet alia vnguenta parare, quæ maiorem vim habeant discutiendi, exiccandique materiam iam defluxam. Si itaque ex nucibus cupressi fiat vnguentum ex sale & aliis, non dubito quin discutiatur, quod experientia comprobauimus.

R. nucis cupressi. numero x. sic. pa. vj. rad. cannæ 3. ʒ. fiat decoctio in oxymelite, facta expressione adde salis communis, & cineris spongiæ, & chalcitidis ana 3. iij. misceantur, & fiat vnguentum, quo vnguantur partes duræ. Cum iam humor congelatus est & scirrhum fecit, ad alia vnguenta descendendum est, quæ scirrhos emolliendo curare possunt, vel sanguinem trahunt, & faciunt, ut suppurentur, ut

R. opopanax styrac. bdellij ana 3. ʒ. dissoluantur in oleo amygd. dulc. & irino q. s. quibus adde mucilaginis fœnugr. & ficuum extractæ cum vino albo an. 3. iij. radic. irid. Venet. puluerisatæ 3. ʒ. rad. gladioli eodem modo exiccata & puluerisatæ 3. j. propolis veræ 3. iij. misce, fiat vnguentum, vngatur pars. Ad suppurationem cataplasmata apponemus, quia plus caloris habent, illumque diutius seruant.

Ad anginam.

AD anginam factam digerentia & exiccantia vnguenta sunt ex usu ut siccent, quicquid in parte collectum est, ac vnguentis emollientibus & relaxantibus, quibus adiungemus sterces hirundinum, vel nidum, aut cinerem eorum, vel sterces columbarum, vel gallinarum. Hæc enim excrementa & defluxiones siccant, absumunt, & digerunt ob bilem, quæ referta sunt, ut

R. dialtheæ & cœsypti ana quarta. j. nidi hirund. 3. iij. rad. iridis 3. ʒ. cum oleo irino, vel liliorum, fiat vnguentum, vngatur ceruix. Vnguentum resumptiuum in officinis paratum etiam vsurpatur, sed illi addenda fortius digerentia propter oleum viol. mucilag. gummi arab. & tragac. & seminis cydoniorum, quæ si ab vnguento expungantur, efficacius & aptius fiat pro his affectibus, in quibus relaxatio necessaria est. Hoc itaque modo erit temperandum.

℞. vnguenti resumptiuī 3. ij. butyr. recentis & axung. porci ana 3. j. stercor. hirund. vel columbarum 3. j. ℔. olei irini & liliorum vel chamom. ana q. s. fiat vnguentum, vngatur pars, vel fiat vnguentum ex adipibus accommodatis.

Ad pectus vnguenta.

AD pectoris constrictionem, vel maturationem, & cōcoctionem eorum, quę in membranas costarum continentur, fiant vnguenta ex relaxantibus & digerentibus. Quę verò aliquo modo astringunt, aut summē ficcant, non sunt temerē supra pectus apponenda, nisi cū affectus est in musculis, ex partibus externis. Vtīmur vnguento resumptiuo, quod satis conuenire videtur, si mucilago gummi arab. & seminis cydoniorum auferatur. Emplastra enim illa vel resolutionem impediunt vel suppurationem procurant, aliis admixta. Semper itaque oleū amygd. vel chamomilę, vel aliud, quod rarefaciat vel relaxet, adiungimus, vt superius docuimus in vnguentis ad Anginam. Vel sic paramus.

℞. olei amygd. dulc. butyr. recen. ana 3. iij. axung. gall. 3. ij. iridis, croci ana 3. j. cerę nouę q. s. fiat vnguentum, vngatur pectus. Quod si frigidior sit materia, additur oleum anethi, amygd. amar. liliorum, radic. enulę camp. hyss. mucilag. scēnugr. seminis lini, dialtheam, cēlypum & sulphur. Si affectus sit in musculis, terebinthinam abietinam, & lariceam in laterum doloribus, quemadmodū & picē summa cum vtilitate. Cōcoquant enim, digerunt, dolorem soluant, & ad extra trahunt.

Ad thoracem vnguenta.

IN sputo thoracis, quod à thorace venit, vtile est vnguento vti, quod astringat sanguinisque impetum cohibeat. Quod deprehenditur si nō sit splendidus, & spumofus, sed nigricans, & aliqua pars thoracis doleat, neq; impedit, quod supra diximus, relaxantia esse vsurpanda. Nam si fluxus admodum vrgeat, iubet Galenus vsurpari olea astringentia, vt myrrhinum, melinum, & alia. Ponuntur enim duntaxat hęc super thoracis partem aliquam, non per totum thoracem. Hinc fit, vt minū impediatur respiratio. Parabitur itaque hoc modo.

℞. olei myrrill. vel ros. 3. ij. mastichi. vel lentisci 3. j. sang.

Signa sanguinis è thorace.

sang. draconis, cortic. thur. ana 3. j. boli armeni, coralli ana 3. ij. ceræ albæ q. s. fiat vnguentum, quo vngatur pars dolens tantum. Sanguinem compescit, vt vlcus, quod sæpe fit curat.

Ad Phthisim Vnguenta.

In phthisicis si retineatur sputum, apponendum est vnguentum illud ex adipibus, & oleis relaxantibus temperatum, sed non continuò, vt practici iubent, quia illa maturando, aut putrefaciendo mortem accelerant. Vtilius itaq; fuerit vtcunq; refrigerare, & astringere partem, & exiccare, vt vlcus factum coalescat, & applicare supra regionem vlcis, quod vlcus deprehenditur ex dolore, & colore. Conueniet ergo illud vnguentum sanguinem retinens, si addatur terebinthina cum lithargy- ro & farina hordei torrefacta, & sarcocolla, vel sic,

Quomodo deprehenditur vlcus.

R. ol. ros. olei lentisc. vel mastichini ana 3. iij. sarcocollæ nutritæ in vino albo, vel lacte, cocti thur. mastich. myrrhæ an. 3. j. cineris cancrorum 3. ss. farinæ hord. torrefacti 3. j. terebinth. abietis, mell. ana 3. ij. misce, vel ex cineribus cucurbitæ fiat vnguentum, vel

R. cinerum cortic. cucurbit. 3. j. boli armeni 3. ss. excipiantur butyro & cremore hord. fiat vnguentum, applicetur post expectorationem.

Hecticis linimentum refrigerans & humectans vsue- rit, & accommodatius vnguento: si vnguentum malis, adde ceram albam lotam cum decoctione hordei munda- ti, vel cum aqua viol. vel bugloss.

Ad hecticos vnguentum.

Ad hepatis affectus Vnguenta.

Hepatis vnguenta ferè omnia aliquam astrictionem desiderant, aliquam dico ob affectus in quibus astrictio non conuenit, vt in magnis obstructionibus, in scirrho hepatis. In refrigerando hepate plus est periculi, quam in calfaciendo. Admiscenda ideo quædam calida, sumpta indicatione à facultate sanguificandi, quæ calore perficitur. Fiunt igitur refrigerantia cum quadam leui astrictione. Nam post febres tertianas refrigerare oportet, nec multum cōstringere propter obstructiones, vt in ictero. Non leuiter itaque peccant, qui ceratum, vel vnguentum sandalinum vsurpant in hisce causis. Refrige- rat enim & astringit non leuiter. Quare cum refrigerare

Vnguentum sandalinum.

Vnguentum oportet, citra magnam astringionem, vnguentum ros.
ros. sandalino præstat: quod si nimium cōstringat, violaceum,
 vel de nenuphare addemus, aut flores violarum, succum
 endiuæ & scariolæ, sic frig. sine astringione fiet, vt

R. vnguenti ros. 3. 3. olei viol. 3. 2. Santali albi 3. 1. ce-
 rus. 3. 2. aceti parum, fiat vnguentum. Santalum album
 vel rub. iecur roborat, leuiterq; astringit, sed cerusa lota
 refrigerat sufficienter. Aliis addi posset spica celtica ad
 penetrationem, & refrigerationem nimiam castigandam.
 Fiunt etiam olea ex seminibus frigidis maioribus,
 quæ refrigerant citra astringionem. Cum refrigerandum
 cum astringione est, tunc vnguentum sandalinum vsur-
 pandum, vel tale est parandum ex refrigerantibus & a-
 stringentibus, quorum magnus est numerus, vt

R. olei myrtill. vel cydoniorum, vel ros. omphacij 3. 3.
 seminis portulacæ, endiuæ, scariol. ana 3. 1. corall. boli
 armeni ana 3. 2. myrtill. balaustiorum, spicæ nardi, san-
 dali rub. ana 3. 3. antispodij 3. 2. ceræ albæ q. s. fiat vn-
 guentum. Hic addatur spica & sandalum ad visceris
 confortationem & caloris naturalis conseruationem.
 Vbi aduertemus insigniter astringentia non esse appo-
 nenda, cum nulla appareat occasio, cur ita cōstringere
 oporteat. Præterea hepar nimium exiccaretur, & ob-
 strueretur, atque impediretur sanguinis in vniuersum
 corpus distributio, quæ est necessaria ad corporis nutri-
 mentum. Siccamus aliquando satis insigniter, veluti in
 hiposarca, sed minus cōstringimus, quia obstructions
 sunt auferendæ, & hepar est refrigeratum, quod calferi
 oportet eiusmodi vnguento.

R. olei nardini, de absynth. ana 3. 3. spicæ nardi, sche-
 nanti, asari an. 3. 1. antispodij facti ex myrrho, vel ex co-
 rall. rub. vel ex cornu cerui 3. 2. florum anthos 3. 3. semi-
 nis apij, petro. ana 3. 1. ceræ citrinæ q. s. vini maluatii
 quantum poterit bibere, vel id adde tempore inunctio-
 nis. Calfacit, roborat, exiccat, & aliorum penetrationem
 iuuat. Valet idem vnguentum in omni affectu hepatis
 cuius causa frigida est, vt in cachexia, quæ ab intempe-
 stiua frigida portione euenit, & in tympanite, quando
 causa frigida est. Solet enim causa calida hydropem
 excitare. Cum ergo à causa frigida sit, conuenit aucta

do si sem. apij, petro. Si calida sit, erit quidem calfacien-
dum, sed moderatè, vt,

R. olei de absynt. ʒ. iij. sandal. omniũ. coral. rub. vsti &
loti in aqua absynt. & cichorij ana ʒ. j. seminis endiuizæ,
scariolæ an. ʒ. apij, petros. anis. an. ʒ. iij. ceræ q. s. fiat vng.
hepat. Tempore inunctionis adde vini maluatici parũ.
Vile etiã fuerit in causã quædã eligere, quæ citra calfa-
ctione hepar iuuare possint. quale est oleũ ex hepate ra-
narum, galeorũque omniũ. Est enim eorũ hepar adipo-
sum, & in oleum resoluitur, si in partes diuisum in olla,
vel sartagine coquatur, deinde exprimatur. Sed cæteris
omnibus præcellit hepar caniculæ, & centrinæ. Corro-
borat enim citra calorem, & emolliendo iuuant, si scir-
rhus adiunctus sit. Nec improbo mastichen, styracem,
& spicam celticam adiungi vt efficaciora reddantur. De
eorum facultate plura libro nostro de piscibus. Paratur
ergo vnguentum corroborans facultatẽ sanguificandi ex
hepate istorum piscium, quod similitudine substantiæ iu-
uat pinguedine, humore, & calore temperato emollit, vt,

R. olei hepatis Galei ʒ. iij. spicæ nardi schen. azari
ana ʒ. ss. mastic. bdellij, myrrhæ, styrac. ana ʒ. iij. Si scir-
rhus adsit, dissoluantur in oleo, quibus adde terebin-
thinæ abietis ʒ. j. ceræ citrinæ nunquam calfactæ, vt ex-
trahitur ex alueariis q. s. fiat vnguentum, tempore inun-
ctionis, adde vini maluatici parum, vel fiat sic.

R. hepatis lupi terrestris nu. j. coquatur in oleo a-
mygd. dulc. cui adde radic. irid. ʒ. j. colentur, & in colatu-
ra dissolue sordium alueariorũ siue propoleos ʒ. iij. sty-
rac. bdellij myrrhæ, ammoniacique ana ʒ. iij. spicæ celti-
cæ, & scœn. ana ʒ. j. fiat vnguent. quo vngatur hepar in-
duratum. Tempore inunctionis adde vini albi parum.

Ad effectus splenis vnguenta.

IN splenis affectibus frequentius vsurpare solemus *Quid in-*
hoc vnguentum quàm in hepate. Solet enim propius *terest in-*
scirrhum pati ob sanguinem crassum, quamuis hepar *ter hepatis*
quoque ob sanguinem lentum & crassum, quo nutritur, *ca et sple-*
scirrhum patiatur, vt docet Galenus Hoc autem interest *netica &*
inter mæstica, hepatica, & splenetica, quòd minus re- *rè emol-*
laxationem aut emollitionem splenis timeamus, quàm *lentsia.*
hepatis. Ea de causa & radicibus maluarum, althææ, &

aliarum sine discrimine vtimur, quibus in hepatis affectibus vti veremur, nisi in maximo discrimine. Præterea quæ liquefaciendo humores emolliunt, & verè emollientia sunt, vt bdellium, ammoniacum, galbanum, opop. ferè reiciuntur, aut saltem his recentioribus, aut in minori quantitate vtimur. Quæ itaque in hepatis scirrho vsurpamus, eadem in splenis scirrho vsurpatur, dissoluta in aceto squillitico, vel in oleo tenuissimarum partium, vt

R. ammoniaci, bdellij, opop. diss. in aceto squillitico ana 3. 2. radic. liliorum, vel bismal. decoctorum in axungia porci, vel oleo amygd. dulc. vel amarar. 3. 2. styra. myrrhæ, irid. ana 3. 3. mucilaginis seminis, scœnug. extractæ in vino albo 3. 2. terebinth. & propoleos an. 3. 3. misce, fiat vnguentum. Nec erit inutile semen flatus discutiens addere. (Solèt enim plerunque flatus abudare circa hæc partem, vt in colo) vt semen viticis, apij, petros. 3. 1. vel 3. 2. Vnguenta autem non nisi post fotum adhibeantur. Potest etiam aliud sic parari, quando exactè obduruit.

R. radic. mandrag. q. 1. diuisæ in partes decoquantur in oleo seminis lini, vel sesamini, vel amygd. addito paulo aceto contundantur, & per cribrum passentur, quibus adde opop. diss. in aceto squillitico 3. 2. styrac. myrrhæ, bdellij, seminis alchech. ana 3. 3. ceræ nouæ vel propoleos, & terebinth q. f. croci 3. 2. spicæ celticæ, & scœnant. azari, vel viticis ana 3. 1. misce, vngatur splen. Tantam vim emolliendi habet hoc vnguentum, vt etiam ebur emolliat. Itaque non erit vituperandum, etiam si mandragoram recipiat. Nam etsi frigida sit, est etiam sicca. Huc accedit, quod calefacientia, quæ hoc vnguentum ingrediuntur, vt spica, crocus, vitex, azarum, & pleraque alia, quæ satis superque calefaciunt, vt eius frigiditatē obtundant. Intumescit splē plerunque ob flatus, quia membrum laxum est, & causæ optima sunt exiccantia, & modicè cōstringentia, vt portulacæ semen cū vitice, cyperus, azarū, scoria ferri, corallum vstum, & alia huiusmodi, vt

R. olei nardini & de absynth. ana 3. 3. seminis agnicasti, port. cappar. vel de fraxino ana 3. 2. apij, petros. cumini in aceto macerat. ana 3. j. corall. rub. vsti, & scoriz ferri ana 3. 1. 3. ceræ q. f. fiat vnguentum, cui adde tempore inunctionis aceti q. f. vng. regio splenis.

*Discutit
flatus.*

*Tumoris
lienii ob
flatus qui
bus ob-
staculum.*

Ad splenis obstructions valebit vnguentum factum ex oleis obstructions soluentibus, rarefacientibus, & attenuantibus, vt

& olei amygd. amar. vel de cappar. vel de frax. 3. iij. seminis apij, petros. genistæ, asari ana 3. ij. spicæ celticæ, scœn. ana 3. j. seminis lauendulæ 3. ss. ceræ q. s. fiat vnguentum: adde parum aceti tempore inunctionis.

Ad tumores splenis minuendos fiunt vnguenta, quæ ventrem laxando, & lienē euacuando prodesse creduntur, vt vnguentum vulgo dictum Arthanita magnum, & paruum. Sic enim vocant Arabes ciclamen, e quibus

*De ar-
thanita.*

magnum magis laxat, alterū spleni magis accommodatum. Talia vnguenta parari possent minori impēsa, neq; tanto calore prædita sine oleis laxantibus, quale est oleū ricinū, ol. ex semine thymelæ, ex radicibus cucumeris. Aliorum enim acrimoniam obtundunt, sed ex succis & farina & melle. Solebāt enim veteres farinis succos herbarū & radic excipere, quos corpori applicabant, veluti Gal. 2. ad Glauc. parat vnguentum ex succo semperui ad inflammationes, in quo farinam hordei ponit, non vt resoluat, (nam in principio adhibet) sed vt succum exhibeat, & excipiat. Magis enim conuenit farina hor

*Farina
hordei, &
frumenti.*

dei, quæ magis refrigerat & exiccat, quàm tritici, quæ calfacit, & suppurat, efficitque vt non solū in principio,

sed etiā in incremento conueniat, veluti ex succis splenē minuentibus, attenuantibus, & purgantibus serosa & melancholica recrementa, in quorū numero sunt succi mer. rad. cucumer. ciclam. rad. sambuci, quibus addunt nonnulli succum polypod. quer. qui videtur parū laxare ob astrictionem, sed aliis adiunctis id faciat. Succus

*Purgantia
serosa &
recrementa
melancholica.*

thymelæ, chameleæ, brass. marinæ, thithy. mal. lythar. & laureolæ. Attenuat succus aristoloch. & quodammodo purgat, vt succus apiorum vsurpatur. Ciclam. succus quia laxat, & splenem inuat. Succus mercur. quia laxat, quemadmodum & sambuci succus. Polypod. quer. quia laxat & constringit: Cucumer. quia attenuat & emollit & laxat. eodem modo succus apiorum, iridis, quia attenuat. Ex istis autem succis vnguentorum tria genera conficiuntur, primū ad lienis tumores: alterum vētrem laxans: tertium serosa per ventrem, & vrinas euacuans.

Primum. R. Succi ciclamini ʒ. vj. succi cucumer. agreſt. vel mercur. vel ſambuc. vel ebulli ana ʒ. iij. farina lupinorum q. ſ. & vini mal q. ſ. fiat vnguentum.

Secundū. R. Succi ſambuci & mercur. ana ʒ. iij. mell. communis & farinae orobi, vel lupinorum ana ʒ. ij. miſce fiat vnguentum, farina eligenda eſt amara, vel nitroſa, quia pungit, ſaltem non impedit alui emolliſionem. Si quis velit addere olea, faciat hoc modo.

R. olei cicini, id eſt, ricini, vel ſeſamini, vel irini ʒ. ij. cicleg, cucumer. ebulli ana ʒ. iij. coquantur leuiter, cum liquiſacta cera applicentur. Neque erit præter inſtitutum ſuccum aliquem tenuantem iſtis admixcere, veluti ſuccum iridis, ariſtoloſch. vel apij vel aliorum: ut odorata, vt myrrham, ſtyracem: aut lachrymas, vt ammoniac. opopanax. Soluūt enim & attenuant. Vel fiat hoc modo.

R. olei cherini vel rini ʒ. iij. ſucci ariſtoloſch. vel cucumer. agreſt. vel ebulli ʒ. iij. ammoniac. bdellij, opopanax diſſ. in prædictis oleis ana ʒ. ʒ. terebinth. butyr. ſaliti ana ʒ. ij. ceræ nouæ q. ſ. fiat vnguentum quod attenuat, laxat & emolliſit.

Ad Ventrem Vnguenta.

Ventrem laxantia vnguenta parantur ex ſupradictis ſuccis & laxantibus medicamentis. In his neque olea ſunt neceſſaria, neque pingua, neque purgantia caſtigare ſolent, vt vel retardare, ſed ſolum ea quæ vel augere, vel accelerare poſſunt, vel humorem quodammodo præparare vel meatus reſerare. Hinc patet error Nicolai, qui ex ſuccorum magno acervo vnguentum præparatur, in quo ſuccum cucurbitæ & capil. ven. addit, & aliorum quæ nihil extrinſecus laxant. Primum enim vnguentum ex veratro vtroque paratum, ſuccum cichorij, acorum & ſemperuiui recipit. Paratur eſſiſſimum hoc modo.

R. ſucci mercur. ciclamini. & cucumer. agreſt. ana ʒ. iij. elleb. vtriuſq; colocynthi ana ʒ. ʒ. diagrid. ʒ. ʒ. fellis tauri ʒ. ij. farinae lupini ʒ. ʒ. mel parum, fiat vnguentum: vngantur partes vmbilici, & inguina poſt ſortum ex relaxantibus, & emollientibus. Idem poteſt etiam aquas purgare, maxime ſi ex ſucco braſſ. marinæ, vel thymel. vel cham. fiat.

*Error
Nec.*

Ad mouendas Vrinas Vnguenta.

Fiant etiam & vnguenta ad mouendas vrinas, si retineantur à grumo sanguinis, vel à crassis humoribus. Ea autem fiunt ex oleis, succis, & pulueribus acrium vrinas prouocantium, vt ex succo apiorum & cressonum, & similibus, oleo amygd amar. scorpionum, vt,

R. succi radic. raphan & cressonum ana ʒ. ij. succi apij & petro. ana ʒ. j. olei scorp. ʒ. iiij. olei spicæ ʒ. ʒ. terebinth. ceræ ana q. s. azar. & seminis apij & pet. ol. ana ʒ. ij. misce, vngatur regio renum, vesicæ, & perinæ, vel,

R. axungie cuniculi ʒ. j. succi foeni. marini recentis, vel conditi cum aceto ʒ. j. ʒ. azari, spicæ celticæ, foeni. ana ʒ. j. olei scorpion. & nucum ana ʒ. ij. ceræ & terebinth. parum, fiat vnguentum.

Ad sanguinem coagulatum idem valet, efficaciusque erit, & magis determinatum, si bituminis ʒ. j. addideris, vel olei petrolei parum. Non statim his vnguentis vti oportet, ne vena, quæ nondum coaluit, rursus aperiat, sed paulo post, & quando symptomata retentionis vrinæ multum vrgent.

Ad sanguinem coagulatum Vnguenta.

Ad Vermes Vnguenta.

Vermibus è ventre eximendis conueniunt ea vnguenta, quæ laxant ventriculo imposita. Itæ quæ fiunt ex amaris medicamentis, occidendis, & expellendis vermicibus conueniunt, quæ ex amaris & acris fiunt, vt,

R. succi vtriusque persicar. vel foliorum persicæ arbor ʒ. j. olei amygd. amar. vel de absynth. ʒ. ij. petrolei ʒ. iiij. fellis bouis & aceti parum. farinæ lupinorum ʒ. ʒ. misce, fiat vnguentum addita terebinth. vel pice, q. s. ponatur supra vmbilicum. Fiunt alia, quibus vtendum in febre, quæ cum fluxu est, vt,

R. farinæ lentium ʒ. ʒ. cornu cerui. & coralli rub. v. storum ana ʒ. ij. seminis citri & portulacæ ana ʒ. iiij. olei ros. & myrtill. ana ʒ. ij. succi limonum ʒ. iiij. misce, fiat vnguentum addita pauca quantitate terebinth. aut ceræ rubræ, ponatur supra vmbilicum.

Ad febr. Vnguenta.

Si febris cum vermicibus citra fluxum sit, ex amaris minus calidis fiat, vt,

R. succi ros. succi limonum, vel aranciorum ana ʒ. ij. olei viol. ʒ. iiij. agarici ʒ. ij. rhubarbari ʒ. j. fellis bouis &

aceti parum, ceræ q. s. fiat vnguentum. Aloë, Myrrha, & reliqua amara apposita occidunt vermes, & deturbant inferius, si superior pars ventris vngatur. Nunquam enim inferior pars inungenda, quia vermes hæc fugiunt tanquam venenum.

Ad Ventriculi affectus Vnguenta.

AD oris ventriculi aliarumque eius partium affectus sunt vngueta pro causarum varietate. Hoc autem commune habent, quod semper moderatè astringentibus corroborandæ sunt ventriculi partes. Sin emollire oporteat scirrhum aut duritiem vetriculi, minùs emollientibus id est faciendum, vel contrariam facultatem obtinentibus, vt mastiche, oleo mastich. de myrrha, styrace, & ladano. Relaxetur gula seu œsophagus, ita vt summa cū difficultate cibū possit transmittere, porū autem minimè, quia minorè crassitudinem habet, nec cōprimi potest: ad quem affectum parari debent vnguenta ex calidis astringentibus, aut aliqua astringentia calidis miscenda. Calida astringentia sunt cassia, id est cinamomum crassum, cyperus, mastix, ladanum, hypocistis, caryophil. macis: Vel calida, vt stæchas, ros. mar. hyssopus, salvia, quibus adiungimus nuces cupressi, & rosas, vt,

R. olei mastich. & cydoniorum ana ʒ. iiij. ladani, hypocistid. & acaciæ ana ʒ. ʒ. caryophil. nucis moscatæ immaturæ ana ʒ. ij. myrobal. citrinorum ʒ. iiij. ceræ q. l. fiat vnguentum.

Si hoc satis non calfaciat, addantur flores rosmarini, stechad. salviæ an. ʒ. ij. & dosis myrobal. minuenda, hoc vnguentum non supra ceruicem, nec supra asperam arteriam, sed in lateribus colli applicare conuenit, neque retro, vt Galenus voluit, neque ante, quia ad partē affectam penetrare non posset ob asperam arteriā, retro ob vertebrae colli, sed per latera colli faciliè vis penetrat.

Ad oris ventriculi relaxationem valet idem vnguentum, vel simile parti appositum circa 13. vertebram ad latus sinistrum. Nihil refert etiam si pars anterior inungatur. Nam calfacto ventriculo etiam os incalescit facultate communicata, sed multò citius os per posteriorem, vt corpus ventriculi, per anteriorem medicamentis apposis curatur, ob situm partium.

Ventriculo parantur vnguēta calida & frigida, quam vulgus ventriculum semper calfacere velit, constringere, aliquando laxare & emollire. Rarò astringentia in vnguētis imperamus siue refrigerare, siue calfacere, siue exiccare velimus, sed calidioribus vnguētis plus astrictionis inesse oportet, refrigerantibus minùs, quia quæ refrigerant, ferè semper constringunt, & robur per accidens seruant. Calida verò laxando soluunt, ideo calfacere debent pro intemperaturæ excessu. Simultùm recessit, multùm: si parùm, parùm.

Si ad coctionem iuuandam fiant vnguenta, aliàque *Ad iuuandam* remedia externa, vt linimenta, cataplasmata, temperata *dā coctionem* sunt, vt quæ in abscessibus suppurare debent. Omnis coctionem *En-* coctio fit à calore moderato, & temperato: quæ igitur iu- *guenta.* uant innatum calorem, illum temperatum prouocare debent in nobis, non cum excessu. Talia igitur erunt,

℞. olei mastich. & mentæ ana ℥.ij. spicæ nardi, nucis moscatae, caryophil. an. 3. ℞. ros. rub. 3. ij. ceræ parùm, fiat vnguētum, vngatur duabus aut tribus horis ante pastû, addendo tempore inunctionis parùm vini albi, vel claretii: moderatè calfacit & adstringit, calorem conseruat, & concoctionem iuuat. Si verò frigidior sit, tardius concoquit, & flatus multos gignit. Addemus itaque, quæ magis calfaciunt, & flatus discutiunt.

℞. ol. de absynth. & ol. nard. an. 3. ij. galangæ, caryoph. mastich. cyper. an. 3. ij. cumini, foliorum anthos an. 3. j. ceræ q. s. fiat vnguētum.

Si in ventriculo cibus fluctuet ob largam humiditatem: aut sit per se relaxatus, ne amplecti possit cibum, & liquida exeant excrementa, tum siccare magis oportet, & constringere, quod aperit fiet, si superiori vnguēto sandali, coralli vsti, cortic. citri, cinamo crassi an. 3. ℞. & acetii parùm addiderimus.

Si verò refrigerare tantùm velimus citra constrictionem magnam, vt in febrib. hecticis, & temperaturis calidis, vel cum adhuc superest in ventriculo materia aliqua euacuanda, vnguēto sequenti, vel simili vtetur quod refrigerat, & ventriculum roborat, ne materiā retinet, sed potius deorsum derubaros ventriculi confirmando sic,

℞. olei rosa. & omphacini 3. iij. coralli rubr. coriand.

sandalialbi, florum labruscæ, & cortic. eitri an. ʒ. j. ceræ albæ q. s. fiat vnguentum, vngatur oris ventriculi regio, addito pauco aceto tempore inunctionis, quod non solum iuuabit penetrationem, sed etiam refrigerabit, & cōstringet. Neque est quod acētū repudiemus ob nervos, quia integris viribus eò non peruenit, imò & syru. acet. & alios syru. ex aceto compositos iniicimus. Quid igitur eorum contactum externum verebimur præter rationem? Si refrigerare, relaxare, & humectare (quod raro fit initio) velimus, fiant hoc modo.

℞. olei viol ʒ. ij. olei nenuph. & amygd. dulc. ana ʒ. j. ceræ citrinæ q. s. fiat vnguentum, linimēta tamen in hac causa magis conueniunt. Ventriculum laxamus, cum astrictus est nimium, vt in magna inedia, aut cum vomitum prouocare volumus. Paratur autem vnguentum ex modicè calidis & relaxantibus, conturbantibusque os ob foetorem, quo potissimum os ventriculi inungimus. Talia sunt galbanum, asarum, assa foetida: vt,

℞. ol. liorum, amygd. butyri rancidi ana ʒ. ij. agarici, azari tenuissimè pul. ana ʒ. ij. ceræ nouæ (quia magis relaxat) q. s. fiat vnguentum. Agaricus & azarum conturbant ventriculum, & butyrum rancidum. Nam ingratus ille odor vomitum ciēt, quem multo magis prouocabunt foetidiora, vt ammoniac. & bitumen: vt,

℞. fæcis olei liliorum, ol. communis antiqui, & foetidi ana ʒ. j. dialtheæ ʒ. ss. ammon. dissoluti in ol. ʒ. ij. succi cucumer. agrest. vel raphani agrestis, vel ciclamini ʒ. j. ceræ parum fiat vnguentum, quo vngatur os ventriculi. Additur & in istis vnguentis mucilago, semin. foenugr. Vngendæ sunt partes lateris colli, quod fit cum est necesse multum vomere, vel in quibus difficulter prouocatur vomitus, vt partes superiores relaxentur, & tunc partes inferiores constrictæ sunt, quò facilius sursum ascendant excrementa. Quando constringendum est, eligimus constringentia simul & odorata vt reficiant, vbi considerandum est, calfaciendum ne sit an refrigerandum, vt in cholericâ passione, & vomitu sanguineo refrigerandum, & constringendum.

Ad lienteriam vnguenta.

IN lienteria verò calfaciendum & astringendum, in dysente-

dysenteria refrigerandum & constringendum. Distinguenda itaque quæ refrigerando constringunt, ab iis quæ calfaciendo id præstant. Calfaciunt constringendo cyperus, galanga, mastix, caryophil nux mosc. omphocina, spica nardi, cortex thur. thus ipsum. Nullum verò ex his insigniter id præstat, quia astrictio insignis esse non potest cum caliditate, nisi astrictio proveniat ab adustione, ut misy, sory, chalcitis. Quare si magis constringere velimus, addenda quædam frigida terrea ut gallæ, cort. mali gran. balauft. citrini, rosæ, spodium, bedegar. alumen vinacea, coral. bolus arm myrthi folia & fructus, cydonia, pruna sylvest. mespila, corna & sexcetera alia, quæ diligens lector in hac classem reuocare poterit. Ex astringentibus calidis modicè astringens paratur hoc modo, ℞. olei mastich. ol. de absynth. an. 3. i. cyperi, caryoph. nucis mosc. i vini maluat. limaturæ cortic. thur. ana 3. i. ceræ albæ q. s. fiat vnguentum. Hæc cum calore leuem habent astrictionem. Quare si quis fortius constringere velit, addat vinaceorum, balauftiorum, radic. bistortæ ana 3. 2. tempore inunctionis parum aceti. Iuuat enim constrictionem & penetrationem.

℞. myrth. & cydon. ana 3. 2. coral. rub boli arm aloes, rad. bistor. & gallarum ana 3. 2. acaciæ, hypocistid sadaniana 3. i. ceræ albæ q. s. fiat vnguentum, quod & refrigerat modicè vel parum calfacit.

Constringere & refrigerare non est operosum. Nam quæ frigida sunt, quodammodo constringunt, & quæ insigniter constringunt, magna ex parte sunt terrenæ substantiæ adustione, ut chalcit. misy, sory, melantheriani. Fiunt itaque vnguenta ex oleis astringentibus, quorum parua est dosis, vnâ cum aliis astringentibus ut,

℞. olei ros. omphac. cydoniorum ana 3. 2. gallarum cortic. mali granati, balauftiorum, myrull. spongiæ, bedegar. bistortæ ana 3. 2. boli armen. 3. s. acaciæ 3. i. ceræ quat. semin. fiat vnguentum, cui adde aceti parum. Accetum ponendum, vel aliqua tenuium partium, ut penetrare faciant astringentia, & terrea, quæ sibi aditum præcludunt constringendo, & sæpe fluxionem ventris augent apposita, ut aliquando vidimus: quia constipata cute & partibus superioribus comprimendo expellunt.

Quam ob causam non vitupero eos, qui in his vnguentis spicam, vel cyperum, vel cinamomū in pauca quantitate addunt, quod alia nimis crassa penetrare faciant, tum etiam quod ventriculi, & aliarum partium functio, siue actio non nisi calore perficitur, qui sopitus semper excitandus, fouendūque est.

Ad int. flina & ventris.

*Ad flatus
discutien-
dos.*

Intestinis & ventriculo eadem vnguenta præscribuntur, nisi quod non semper necessaria sit illa restrictio, præterquam in fluxu vētris. Sed discutientia flatūs maiore quantitate ponenda, tam ob flatum, quàm ob frigidiorē temperaturam, & excrementa pituitosa, quæ in illis abundant. Ad calfaciendum itaque flatus discutientes, & dolorem sedandum sic fiet,

℞. ol. nardi. & rutæ. ana ʒ. 2. apij, petros. ana ʒ. 3. Horū cham. melil. ana ʒ. 2. piper. galangæ ana ʒ. 1. ceræ q. s. fiat vnguentum: tempore inunctionis adde vini albi generosi, vel maluatici parū: vngatur manē reiectis excrementis, vel post clysterem.

Si dolor colicus sit vehemens, fortioribus erit calfaciendum & discutiendum, vt

℞. olei anethini, rutacei ana ʒ. 3. ol. de spica ʒ. 1. β. seminis rutæ, cumini, baccarum lauri, apij, petros. ana ʒ. 1. spicæ nardi, galangæ ana ʒ. 3. β. ceræ q. s. fiat vnguentum, vngatur ventris pars media. Adde etiam tempore inunctionis vinum maluatium.

Ad affectus Vteri vnguenta.

AD vteri præcipationem & inflationem valent eadem vnguenta, addito pauco vino maluat. Ad vteri item obstructions à crassis humoribus, ob quos menses non liberè fluunt. Sed ne hoc vnguentum materiam exiccet, & absumat, temperandum erit multo oleo liliorum, vel amygd. dulc. vel cinamo. vel axung. anser. vel galli. vel butyro. Hæc relaxando efficiunt, vt menses sine dolore, & molestia fluant.

Ad prouocationem mensium non fluentium ob obstructions determinatum faciemus ex illis relaxantibus, aperientibus, & prouocantibus menses & vrinas, vt

℞. ol. amygd. amar. & liliorum ana ʒ. 1. ol. cherini, vel irini ʒ. 2. spicæ celticæ, scœnanth. azari ana ʒ. 3. seminis apij,

apij, petro. ana 3. 3. terebinth. & axung. anferis veteris ana 3. 2. ceræ nouæ q. f. fiat vnguentum, quo vngatur regio pubis, renum, & inguinum, addendo vini maluatici parum. Addūtur & succi herbarum calidarum, & tenuium partium vt apij, succus pedis columbini, arthemisiarum, pulegij, & similia. Supra pubem, renes, & inguina applicantur vnguenta ad partus facilitatem, sed addenda sunt, quæ parturientes iuuant, vt aristolochia rotunda, vel longa, & similia, vt

Ad faciendum partum.

℞. olei amygdal. dulc. & butyr. recentis ana 3. 2. axung. porci, & gallinæ ana 3. 3. aristoloch. rotundæ, & longæ ana 3. 3. cinamomi tenuioris, asari, styrach. myrrhæ ana 3. 1. ceræ nouæ q. f. applicetur supra os pubis, aut circa caudam, & emunctoria, post vsum fomenti ex maluis & aristolochia.

Idem vnguentum conuenit ad secundinæ eiectionem, & fortiora adduntur, vt agaric. colocynt. Iuuat enim expulsiōe cuiuslibet rei irritando facultatem expultricē.

Ad secundinarum eiectionē.

Ad retentionem fœtus vnguenta.

AD fœtus retentionem plus valent aliquando vnguenta quàm emplastra, exempli gratia, cum mulier abortire solet ob sanguinis copiam & acrimoniam, aut caliditatem nimiam, quæ partes relaxat, si emplastra apponantur, suo contractu calorem augent, plūsque nocent quàm iuuant Vnguētum præterea altius penetrat, quàm emplastrum, fiet autem hoc modo,

Aborsus causa.

℞. olei ros. omphac. vel cydoniorum, vel myrthi 3. 3. radic. bistor. 3. 1. boli armeni, coralli rub. ana 3. 3. balaustiorum 3. 3. ceræ rub. q. f. fiat vnguentum, addendo acet. quantum ebibere poterit, diluti aqua peculi ros. vngatur regio ventris, & renum frequenter, & antequā multus sanguis effluerit.

Valet idem ad mensium superpurgationem. Si hoc non simus contenti, aliud parandum ex resinētibus sanguinem refrigerando, condensando, vel astringendo, vt

Ad superpurgationem mens.

℞. ol. nenuph. 3. 1. cydon. 3. 3. boli arm. acac. sanguinal. ana 3. 3. balaust. spong. bedegar. alumin. ana 3. 1. ceræ albæ q. f. cui incorpora acet. quantum ebibere poterit, diluti in aqua peculi ros. plantag. vel bursæ pastor. vel earum succo. Idem efficacius fit cum succus porri additur.

Animaduertendūque est nū, grumi sanguinis post retentionem remaneant, nec putrescant, & suffocationem aliāque symptomata prouocent. Quæ multū siccant, sanguinis impetum sistunt, vt

℞. off. sepia ʒ. ss. coral. vsti, sanguinal tuthia ana ʒ. ʒ. 2. alum. ʒ. ʒ. 1. ol. cydonio. & myrt. ana ʒ. 2. succi plantag. vel burs. past vel polygoni, vel hernialis ʒ. ʒ. 3. addito pauco aceto simul misceantur, fiat vnguentum diu agitando. Qui ceram velit, addat albam. Coquantur parū succi, deinde omnia simul misceantur.

Ad sanguinis impetum sistendum.

*Quando
sanguis re-
tinetur.*

Sanguis ē naribus, pulmonibus, thorace, renibus, vesica, hepate, intestinis, hæmorrhoidib. dentibus & ab utero fluens semper retinendus est, nisi per crism, vel per menses, vel per hæmorrhoidas naturaliter & moderatè fluat. Retinetur potissimū auersione per sanguinis missionem, vel cucurbitas, vel ligaturas, item epithematis, vel emplastris, vel vnguentis supra venas impositis, per quas defluat ad vulnus, vel venæ apertionem. Nā in vulnere satius est puluere inspergere, quā alio modo medicamenta adhibere, quia citius sanguinem sistit, inspissat, conglutinat, & coagulat, qui postea venam obstruit, & sanguinem foras erumpere prohibet. De vnguentis igitur, quæ circa partem apponuntur, dicemus, quæ parantur ex pulueribus frigidis, & constringentibus, album oui, vel succis herb. sūntque ea ferè agglutinantia, vt quæ ex bolo, sang. drac. thure, mastiche, aloe, bistort. & sanguine exiccato parantur. Efficaciora autem sient si pili leporis vel papi florum salicis, aut alterius herbæ addantur. Succī sunt plantag. polygoni, herina. caudæ equinæ, bur. past syderit. albumen oui agitatum, mucilago, gummi tragac. & arab. sūnt agglutinantia, vt

*Puluer. frigidis &
constring.*

Succī.

℞. gallarum cortic. interior. castaneæ, vel cortic. mali granati, vel balaustiorum ana ʒ. ss. boli arm. ʒ. ʒ. 1. sang. draconis ana ʒ. 3. cum albumine oui excipiantur, fiat vnguentum: vel sic,

*Locus cui
apponitur*

℞. ol. myrtill. vel ros ʒ. 3. succi burs. pastoris vel polygo. ʒ. 2. gallarum, balaustiorum. radic. bistortæ ana ʒ. ss. ceræ albæ q. s. aceti parum, fiat vnguentum. Hæc vnguenta non sūnt ponenda supra os venæ fluentis, sed paulo

paulò infra supra regionem, per quã venæ ad illud permeant, & potissimum in ea parte, in qua magis ad extra se prodit, vel cùm sanguis influit in caput, vnguenta hæc in lateribus colli, in quibus venæ & arteriæ positi sunt, apponenda erunt, & circa emunctoria, quando in aliquod membrum descendit, vt in principio arthritidis, missò sanguine, & non existente venenosa materia, aut in magna quantitate. Si sanguis à pulmone fluat, vtile erit imponi vnguentum supra renes, & totam spinam, quia magna vena & arteria spinæ incubat. Sin è vulnere fluat, supra emunctoria illius partis læsæ. Nec improbo super vulnus imponi, si possit. Sin per sedem, supra renes, vt etiam cùm per vesicam fecernitur, circa perineum, vel arteriam, vnde fluit sanguis.

*Si à pulm.
fluat quo
loco appo-
nenda. Si
à vulnere.
Si per se-
dem.*

De vnguentis qua ad chirurgum spectant.

SVpere est vt de vnguētis chirurgicis agamus, quæ sunt ad maturationem abscessuum, vlcerum deterfionem, carnis generationem, inducendam cicatricem, ad pso-ram, luem veneream, cicatrices dealbandas, & emolliēdas, de quibus omnibus breuiter dicemus, ne chirurgis- curationem vlcerum & tumorum præripiant iuniores medici, qui nihil non audēt. Initium autem sumemus ab vnguentis morbi Italicum curantibus, de quibus multa scripta sunt à diuersis authoribus. Plerosq; tamen errare video, & vnam eandemq; vnguēti descriptionem omnibus præscribere, nullo habito delectu, & nullius causæ distinctione, sed eodem vnguento & scabiem Italicam, & dolores articulorum, & capitis, & vlcera curare nituntur. Primum itaq; morbi essentia cōsideranda est, causa affectus, & symptoma. Morbus hic in frigiditate & nimia humiditate consistit, quæ à secunda coctione, deinde à tertia, quæ fit in membris externis, (multò autem magis in particularibus) suam naturam mutuatur, quod indicat curatio, quæ constat non tantum ex resiccantibus, sed etiam ex euacuantibus, vel ex sanguinis missione, vel ex ambobus: quia causa continens & immediata, quæ est humor collectus in ambitu corporis, his nō euacuatur, sed curatur sudoris prouocatione, deinde vrinæ: Tertiò & vltimò purgatione frequenti & continua, quæ ob suam frequentiam corpus siccatur insigniter, quæque

*Error mul-
torū in cu-
rādo mor-
bo Italicq.*

*Essentia
morbi Ita-
lics.*

Curatio.

constet ex his, quæcunque sudores moueant insigniter, vel exiccent extrinsecus, vel intrinsecus, quæ morbum hunc euincant, vt vnguenta sudorifica, potiones ex ligno Gaiaci, rad apios, salis parillæ, & aliorum multorum.

*Curio in
curatione.*

*Quid con-
siderandū
in curatio-
ne.*

Antequam vnguenta præscribantur, diligenter considerandum est, num affectus sit in cute, carne, ossibus, perioestio, aut capite, costis, sura, brachiis, vlna. Si enim in cute sit, vlcera excitabit vel papulas, vel scissuras manuum, vel cutis efflorescences. Si sub cute, alopecias, si sub perioestio, dolores membrorum: si in ossibus, exostoses. Deinde considerata est humoris consistentia, sitne tenuis an crassus. Nam tenuis in cute efflorescit, crassus sub cute latitat, perioestio, vel osse. Deinde videndum nū humor alicuius partis substantiam corruerit, vlcus fecerit in carne, vel carnem in osse: nam secundum horum diuersitatem vnguenta varia sunt præscribenda. Nam quæ vlcera curant, & scabiem, mitiora sunt. sed sicciora: quæ dolores curant, calidiora, & magis relaxantia, quæ exostoses fundentia & resiccantia.

Ad dolores capitis & articulos curandos.

Ad dolorem capitis & articulos, curandos fiunt vnguenta *acopa* dicta, vt ex adipibus pectorale magistrale sic a Nicolao appellatum, resumptiuum, dialtheæ, martiatum, arragon. si argentum viuum addatur, vt

*Quæ non
conueniunt*

℞. axung. porci non salitæ lb. i. butyr recent. axung. galli. & anatis an. 3. 3. ol. irini vel laurini 3. 4. euphor. 3. i. terebinthinæ lotæ in aqua vitæ 3. 3. argenti viui extincti in axung. porci 3. 5. ceræ nouæ parum, litharg. 3. 2. misce, fiat vnguentum. In his neque cinabrium ponendum est, neque sublimatum, neque sulphur, quia nimium extinguunt argentum viuum & sudores retinent, sed post sudationem conuenire possunt ad resiccanda vlcera. In istis

*Quæ con-
ueniunt.*

*Oleum a-
mygd. cū
argeto vi-
no non de-
bet poni.*

omnes axungie conueniunt, olea omnia calida resoluentia & calidiora, & magis tenuium partium, quia plus penetrant, & resoluunt, & sudores mouent. Oleum verò amygd. nunquam poni debet, vbi est argentum viuum, quia experientia comprobatum est, oleum hoc vim argenti viui extinguere. Gummi conueniunt dissoluta in vino vel oleo. non in aceto, vt galbanum, myrrha, opopanax maxime in pauca quantitate, & in antiquato morbo,

bo, vt in exostofi. Additur etiam castoreum, staphisagria, & alia calidiora. Si itaque morbus sit antiquatus, & cum *Qua con-*
doloribus capitis, vel sunt exostoses, ex his vltimis pa *ueniunt*
rantur vnguenta hoc modo. *exostofi.*

℞. axung. porci non salitæ antiq lb 1. axung. anat. & *Curatio e-*
gallinæ ana 3. 2. olei laurini & irini ana 3. 3. olei de spica *xostofum*
3. 1. *℞.* staphisag. myrrhæ, styrac. opopan. dissoluti in aqua *et doloris*
vitæ ana 3. 3. terebinthinæ lotæ in aqua vitæ 3. 3. argenti *cap.*

viui extincti in axung. porci 3. 6. resinæ & ceræ parum,
fiat vnguentum. Hic animaduertendum est vnguentis i
stis diutius vtendum esse. Primum enim inungendæ sunt
omnes partes sanæ, vt humores eo trahantur. In decli
nationes verò partes tantum affectæ, vt quicquid in par
te collectum est, discutiatur exactè & diutius sunt inun- *Error mul-*
gendæ, vt humor alitè latitans sensim lique scat, ac tra- *torum.*
hatur, & crassum cum tenui euacuetur, quod pauci no
stri tēporis faciunt, & hinc fit, vt post vsum remediū
plerunque morbus maior appareat, vel recrudescat, vel
qui non apparebat sese manifestet.

In papulis si morbus consistat, vel in scabie, vel vlce. *Curatio*
ribus paruis vt in herpete: tunc parabitur vnguentum *morbis alia*
ex modicè calfacient. & rarefacient. & detergent. defic *pro ratio-*
cantibusque. (Prius autem mittendus est sanguis, & cor- *ne sympto-*
pus purgandum) quale est vnguentum enulatum, aucta *matum.*
dosi argenti viui, & addito oleo, de iunipero, vel irino, *Sanguis*
vel laurino, vt *miss. et*

℞. axung. porci lb. *℞.* butyr. recent. 3. 3. olei chamo- *purgatio.*
mil. 3. 4. irini 3. 2. myrrhæ, styrac. ana 3. *℞.* viridis æris 3.
2. argenti viui extincti in succo limonum, vel lapati a
cuti, vel enulæ cam. 3. 4. subl. 3. 2. litharg. 3. 2. terebinth.
3. 2. ceræ parum. fiat vnguentum. Hoc differt ab aliis,
quia axung. porci lb. *℞.* tantum recipit, quia nimium hu
mida est. Butyrum autem quamuis simile videatur valet *Butyrum.*
etiam ad psidrachia, id est, pustulas, & papulas paulum
supra cutem eminentes. Præterea recipit æruginem æ
ris, quæ etiā si videatur impetū sudoris per se impedire,
vlcera tamen & vitia cutis detergendo curat. Extingui
tur argentum viuum in succo limonum, vel citri, vel la- *Qua vitia*
pati acuti, vel enulæ, quia hi succi scabiem curant, & ad- *cutis emē-*
ditur sublimatum: quia siccant vlcera, psoras, scabiem, & *dant.*

cutis vitia. Lithargyrum, quia siccatur, consistentiam vnguenti auget, & argentum viuum retinet. Terebinthina valet ad dolores soluendo, & resoluendo, si aqua vitæ abluatur, sic detergendo iuuat. In quibus nimia cutis laxitas timetur, aut nimia caltactio, additur oleum ros. & cerus. Quia verò nimium sudores impedit, in vniuersali vnctione non conuenit, sed in partis alicuius vlceratæ intemperie conuenire potest, vt alia metallica.

Vlceribus morbi Italici conuenire potest vnguentum quod suprâ scriptum est, si vlcera prius sint vtrunque deterfa. Nam exactè ob malitiam, quam habent, detergi non possunt, quæ multò satius est detergi vnguentis detergentibus, quàm si vnguentis istis detergantur. Deinde vnguenta applicanda in parte affecta, & toto corpore. Diutius autem inharere debent in parte vlcerata, aut admiscendam vnguentis aliis sarcoticis. Hoc vnguentum magis idoneum erit vlceribus, ob cinabrium, quod magis siccatur, minùs autè sudores mouet, præsertim cinabrium nostrum factitium ex sulphure & argento viuo, quia argentum viuum sic extinctum nullius est efficaciz propter ablatas illi vires à sulphure. Errant igitur, qui argentum viuum sulphure extinguunt, maximè cum sudores moueri oportet, ad corporis exiccationem. In particularibus autem vnguentis (quando exiccandum) partium exulceratarum conueniet cinabrium, aut cum post vsum Gaiaci, & aliorum prouocantium sudores vti volumus vnguento ad curationem vlcerum, vt

R. vnguenti marciati ℥. 3. seui hircini ℥. 4. olei irini ℥. 3. myrrhæ ℥. 1. virid. æris, irid. styrac. an. ℥. 2. terebinth. lotæ in aqua vitæ ℥. 3. resinæ, ceræ an. ℥. 2. argenti viui extincti in succo limonum ℥. 4. cinabr. thur. mastice an. ℥. 2. misce, fiat vnguentum, quo vngantur partes exulceratæ à morbo Italico, & vicinæ.

Hic vnguentum marciatum ponitur, vel aragon, sic dictum pro arigon, quasi iuuans, ab arigo, quia mirificè valet ad vlcera antiqua, seuum hirci, quia siccatur admodum. Cinabrium hic positum dosi minore ob argentum viuum. Reliqua omnia vlcera tergent & siccant. Non me latet ex terebinthina, argento viuo, & aqua vitæ fieri vnguen-

unguenta, vel etiam ex sola axungia, & argento viuo. *Experientia autem comprobauit omnes, qui eis vsi sunt, in tremorem, aut conuulsionem incidisse. Sed si quis velit ex paucis conficere, satius fuerit cinabrium cum terebinthina vel sublimatum tantum cum aqua vitæ, cera, vel resina, vel axungia miscere. Sed prima multo securiora sum expertus. Hic obiter est notandum ea unguenta, quæ cinabrium, cerusam, lithargy unguentum, vel oleum ros recipiunt, minus prouocare sudorem. Cum itaque corpus sudoribus erit euacuandum, ab illis abstinendum censeo.*

Qua minus prouocant sudorem.

Ad psoram vnguenta.

Ad psoram, lichenes & eiusmodi cutis vitia paratur tale,

℞. olei de iunipero 3. 2. olei nucum 3. 1. tartari albi 3. 5. vitreoli. salis communis, sulphur. ana 3. 3. terebinthinæ lotæ cum succo limonũ 3. 2. litharg. 3. j 5. ceræ parum, fiat unguentum. Si morbus fuerit contumax, adde sequentia, argenti viui 3. 2. sublimati erit 3. 2. efficacius. Applicatur post balnei vsum & purgationem, vt remollescant crustæ, & citius penetret, vel sequens,

℞. olei de iunipero 3. 3. litharg. auri 3. 4. olei lucernarum & nucum ana 3. 2. tartari vini tenuissimè puluerisati 3. 1. 5. vitrioli, salis communis ana 3. 3. incorporentur simul & adde succi plantaginis & limonum ana 3. 3. acetii squillitici 3. 1. incorporentur simul, & fiat nutritum.

Tempus exhibendi.

Ad herpes.

Ad herpes fiunt ex succis herbarum siccantium & adstringentium vel detergentium cum mineralibus.

Si enim herpes exedens sit, erunt ex vsu constringentia, quæ impediunt ne serpat, vel exedentia quod corruptum est, insigniter exiccantia, qualia sunt mineralia. Proinde succi isti lactucæ, solani, semper viui non sunt addendi, quia sunt humidiores, licetque refrigerent, nõ tamen astringunt, vt Galenus 2. ad Glauc. docuit, & libr. 14. method. fiat itaque hoc modo.

℞. succi plantag. & summitatum vitis, vel labruscæ 3. 2. succi polygoni 3. 3. lithargyri 3. 1. tuthiæ præparatæ & antimonij ana 3. 5. aloës citrinæ 3. 3. ceræ parum, fiat

vnguentum addito pauco oleo myrrhino, vel ros. omphacino.

Si verò herpes exedat carnem, vtile erit omphacium vnguento addere, quod carnem corruptam auferat & castiget. Deinde ad alia miriora veniendum, & cicatrix inducenda. Vnguentum ex pompholige addito alumine citissimè curat.

Ad scabiem communem.

AD scabiem communem sufficit vnguentum enulatum, vel quod ex resiccantibus paratur, quale quod à pauperibus conficitur ex oleo communi & sulphure simul mistis, vel sic,

℞. litharg. cerusæ lotæ ana 3. i. myrrhæ, styrac. liquida ana 3. 2. salis communis 3. 2. sulphur. viui 3. 3. argenti viui extincti in succo limonum 3. i. olei ros. q. s. ceræ parum: fiat vnguentum, vngatur vola manuum, & postea fricetur totum corpus manibus iunctis.

Ad pruritus vnguenta.

AD pruritus parantur vnguenta, quæ vel humorem salsum, vel serosum & acrem per insensibilem vacuationem purgent, discutiant & detergant hoc modo.

Pruritus sedantia. ℞. radic. lapati acuti, & enulæ campanæ an 3. i. decoquantur in aceto & confusa per cribrum passentur. quibus adde olei irini 3. 4. salis communis 3. i. myrrhæ 3. 2. litharg 3. i. β. ceræ parum, fiat vnguentum. Si propterea non esset pruritus, addatur parū argenti viui quod pruritus sedat maximè, qui à paruis pediculis vulgò (cirrōns) vocatis excitatur, vel addatur sublimati parum. Post exiccationem vel discussionem materiæ, remanet sensus ille pruritus, quem auferre oportet addendo ipsi vnguento oleum hyoscy. quod refrigerando pruritus aufert mirum in modum. Vel fiat sic,

℞. vnguenti pomphol. 3. 2. olei hyoscy. 3. i. β. fiat vnguentum, vngatur locus pruriens. Post horum vsum utile est corpus balneo, vel lauacro detergente frequenter abluere, quia quæ in cute remanent, pruritus excitant. Prima lotio sit lixiuio, altera ex decoctione fabarum, ros. & hord. tantum.

Ad sedandum dolorem Vnguenta.

IN doloribus sedandis seu leniendis maximè vnguentis vtuntur chirurgi, & ad concoctionem tumorum, & maximè vomicarum, & ad deterfionē puris, & ichorum, ad absumptionem putridæ carnis, ad carnis generationem, & ad cicatrices inducendas. Ad dolores sedandos potius vtimur linimentis, quàm vnguentis, vt suprà dictum est. Linimentis ergo præscriptis ad dolores aurium, vel aliarum partium vtimur, vel vnguento resumptiuo in dolore qui fit, cum suppuratur materia. Est enim emplasticum & maturando, & relaxando doloris sedatiuum. Si à materia calidiore oriatur, adde olei violati, vel hyoscyami aliquid, vel vtere vnguento ros. addito oleo hyoscyami, vel violato. Vnguento populeonis recēsis, sedatur dolor à materia calida. Vnguenta verò calida vt dialtheæ, & œsypus dolores frigidos sedāt, quibus addendum oleū amygd. Ad dolorē calidum & inflammationem suppurandam vtuntur chirurgi foliis hyoscyami decoctis & axungia porci, vel vnguento ros. miscentur. Tale autem in illis partibus, quæ ob multū sensum vehementer dolent, vt sunt pudenda mammæ, apponendum est.

De maturantibus Vnguentis.

Maturantia vnguenta ex suppurantibus fiunt, quæ calorem temperatum, vel nostræ temperaturæ similem habent perse, vel temperatura aliquibus aliis, sūntque emplastica. Fiunt ex oleo communi, & sesamo, & amygdal. aliisque téperatis. Sed admiscētur cera, pix, vel resina, vel seuum, vel farina tritici, vel vitelli onorū vt augeatur vis emplastica. Habent chirurgi vnguenta parata Basilicum maius & minus. Minus verò suppuratorium est: maius non solum suppuratorium est, sed etiam deterget nonnihil & carnem generat ob myrrham & olibanum. Ad vomicas itaque concoquendas & apostematosa sordidæque conuenit. Hinc etiam inter sarcotica numerantur à Guidone in suo antidotario. Pix dissoluta in oleo communi vnguetum facit. Fit vnguentum ex oleo & ouis duobus modis. Quod fit ex integro ouo, & oleo violaceo, sedat dolorem inflammationum & suppurat. Eo autem vtendum, cum dolor magnus est ob suppurationem. Nam albumen oui licet sit frigidum,

Vnguentum resumptiuum.

Basilicum maius & minus.

refrigerando vnit calorem, & emplastica sua substantia suppurat. Cùm itaque dolor magis sedandus est, oleum violatum. Cùm suppurandum, oleum amygd. dulc. vel commune vsurpandum. Hoc autem vtendum est post abcessuum apertionem, vt dolorem ferro & igne excitatum, leniamus: Cùm suppurare vel concoquere, volumus, ex vitellis ouorum tantum, & oleo communi, quod multò citius faciet, vel si tantillum terebinthinæ addatur, quod potissimam fit in neruosis locis, vt iuncturis.

Vnguentum resumptiuum

Vnguentum resumptiuum satis emplasticum est, & temperatum ad maturationem iuuandam, accelerandamque suppurationem, vt & dialthea, quâquam inter malactica à Guidone enumeretur. Sed non minùs materiæ crassæ est suppuratorium, quàm emolliuium. Recipit enim resinam, colophoniam, ceram, terebinthinam, semen lini, & scœnug. gummi hederæ, galbanum, quæ omnia vim emplasticam maiorem habet, quàm vt decet malactico vnguento, quanquam etiam aliquid substantiæ emplasticæ inesse oporteat, nō autem tantam, quin aliquid debeamus à parte dura euacuare: itaque facio suppuratorium. Verum quidem est à squilla aliquid digestionis habere, sed & radix illa viscosam habet substantiam ad suppurationem materiæ contumacis iuuandam, licet Guido chirurgorum princeps vnguento aureo pro incarnatione vtendum esse doceat. Concoctorium tamen & maturatiuum dicimus esse, vt Basilicum, imò multò magis ob crocum, resinam, colophoniam, mastichen, & alia multa *peptica*, vt olibanum. Illo igitur vti poterimus etiā pro maturatiuo vomicarum & vlcèrum. Sin quis incarnationem velit efficere, addat myrrham, & olibani augeat quantitatem. Si quis alia ratione conficere ex oleis & axungijs volet, vel in forma cataplasmatidis, vel pulta vt parti affectæ supponatur, sic poterit conficere. Ad vulnera quidem & vlcera ex farina tritici, oleo, & seuo, fiat forma vnguenti. Vel ex terebinthina, oleo, seuo, & pice, vel colophonia vulgò dicta, quæ magis digerit ob pinguedinem deperditam, quàm maturet, Est enim fex olei de terebinthina. Multum itaque olei communis & amygd. ponendum est, vt magis cōcoquat, quàm digerat. Hactenus de suppurantibus vel maturantibus. Hic ta-

Aureum.

men

men leſtores admonitos volo emplaſtra metallica fieri vnguenta maturantia, ſi oleo multo diſſoluantur, vt & reliqua emplaſtra hoc modo diſſoluta; vnguenta ſunt, id docente Galeno qui emplaſtrum diachalcitidos & aliis ceratis hoc modo diſſolutos in duplici vaſe, ne coſtura vterentur, faciebat vnguentum.

De concoquentibus.

AD materiam calidam concoquendam aptiſſimum eſt emplaſtrum diachylum parum diſſolutum oleo violaceo vel amygdalarum. Illud autem parare oportet ex oleo recenti non vteri, quia magis temperatum reſens, & aptius concoquit, vetus magis digerit, vt omnia exemplaria habent. Fit autem id emplaſtrum ex mucilagine rad. maluz, ſeminis pſilij, hyoſcyami, lini, & quæ *Diachylū* ob emplaſticam ſubſtantiam calorem naturalem accipiunt ab oleo. Lithargyrum non impedit maturationē, & ipſa vi emplaſtica temperatur. Hoc vnguentum temperando calorem, & retinendo concoquit, maximè vbi feruor eſt magis, vt in inflammatione eryſipelatoſa, vel eryſipelate phlegmonoſo. In ſimplici inſtāmatione diachylum communi oleo diſſolutum maturat. Paratur ex ſœnugræe. & lini ſemine, radice altheæ, oleo & lithargyro. In materia craſſa & frigida non erit reiſciendum diachylum magnum, quod recipit & temperata, & emplaſtica, nec reſert etiam ſi ſuccum iridis, & ſquillæ recipiat: facient enim eā ad materiæ incisionem & præparationem, & réperaturo lithargyrum. In abſceſſu à materia craſſa emplaſtrum de mucilagine conuenit. Neque mirum videri debet malaſtica aliquando maturantia fieri reſpectu materiæ frigidæ, vel craſſæ. Non enim calfaciunt ſupra primum gradum. E conuerſo fit vt maturantia malaſtica ſiant, cum pauca materiæ eſt, neque multum congeſta: hæc enim contingunt propter materiæ diſpoſitionem, quæ facit vt agens aut debilius aut fortius opus ſuum peragat in materia.

De detergentibus.

VNguenta detergentia ſunt ad vlcerum ſordidorū & depaſcentium deterſionem. Ex detergentibus alia ſine morſu, vt dulcia, alia cum leni morſu, alia cum vehementi detergent. Cum morſu detergent acria &

*Vnguen-
tum apo-
stolorum.*

nitrosa, amara & salsa: sine morſu dulcia tantum: Cum leni morſu dulcia & acria vt mel, ſaccharum candum. Detergentia, ſiue deterſoria vnguenta dicuntur, quæ mediocriter detergunt, corroſiua, quæ id fortiter efficiunt. Detergunt enim non ſolum pus craſſum, ſed & carnem corruptam detrahunt, & ſupercreſcentem minuunt. Fiunt ex ærugine æris, oleo, & cera, vel ex ærugine & melle tantum, vel ex aceto, melle, & flore æris, vt ægyptiacum vulgò dictum. Fiunt autem ex lachrymis vt ammoniaco galbano, opopanace, bdellio, arrodentibus permixtis, vt in vnguento apoſtolico, aut in vnguento ceraſeos. Quia verò hæc cum nimio morſu arroduunt, & detergunt, adduntur pingua ad eorum acrimoniam, & aſperitatem leniendam, cera, terebinthina, oleum. His admilcentur ſarcotica, quæ modicè detergunt, vt ariſtolochia, myrrha, thus, in apoſtolico, in ceraſeos verò ſarcotica, aloë, lithargyrum in vtroque. Meo iudicio ſatius eſſet multò ab iis abſtinere cum fortiter eſt arroendum. Parum enim aut nihil iuuant, quia eorum operationes planè inter ſe puguât. Alia enim vlcera replent, alia concuant, ſed quæ eorum acrimoniam temperât, ſunt addenda, vt oleoſa, pingua. In iſtis catheteticis vnguentis admilcent & ſeptica, & ſarcotica, vt in vnguento Auicennæ à Bruno & Guidone uſurpato in vlceribus ſordidis & putridis, quod & calcem auripigmentum rubrum recipit, licet vulgata exemplaria Guidonis tragac. rub. legant, pro auripigmento rubro. Addemus autem totam compositionem.

℞. auripigmenti rub. ʒ. j. calcis viuæ, alumini, corti. gran. ana ʒ. vj. thur. gal. ana ʒ. iij. cere, olei roſ. fiat vnguentum, hoc vnguentum proportionẽ reſpondet trochiſcis Andromachi, niſi quòd trochiſci vitreolum recipiunt, & myrrham. Fortiùs itaque detergunt, & arroduunt, neque ceram, neque oleum habent, quæ medicamento- rum acrium frangunt vim, & acrimoniam. Rurſus tragac. legitur pro auripigmento rubro, cap. de arroſiuis. Hic notandum vltimum hoc vnguentum magis conuenire putridis vlceribus quàm ſimpliciter ſordidis, ad carnem putridam auferendam, quia recipit cortices mali granati, & gallas quæ conſtringunt, & indurant, & deter-

deter-

deterfionem minuunt, quamuis amari ſint cortices. Sed quia ad vlcera putrida paratur, optimum illud quod poteſt & carnem minuere, & ſaniem inſigniter exiccare, vt putredinis auferatur occaſio altera, nempe humiditas, quæ putredinis cauſa eſt, & mater. Alia ſunt detergentia ex amaris, & aliis nitroſis, vt ex ſuccis herbarum, myrrha, centauro, omphac quod arrodit fortiter, ex melle, ſaccharo & farinis detergentibus, vt hordeo, fabarum, orobi, lupin. ex ſucco apij, abſynth. vel centaur. minor. ſi non timetur inflammatio. Si verò calidior ſit pars, his addemus ſuccum plantag. vel chelidon. vel craſſulæ, id eſt, aſſoi vel telephij, myrthi. Fit igitur hoc modo ad deterfionem abſceſſus in inflammatione.

℞. ſuc. apij. plantag. ana ꝑ 2. farin. triti. ꝑ 1. vitellorum ouor. num. 2. coquantur ſucci cum pauco melle, deinde alia addantur. Nec erit præter inſtitutum ſi addatur ol. roſ. vel commune. propter dolorem. Nam tota materia cocta non eſt. Oleum igitur commune & farina triticea cum vitellis ouorum concoquunt materiam calidam, & dolorem ſedât. Temporis autem progreſſu oleum præmittitur, & far. tritici mutatur ad far. hord. vel fabar. ſi magis ſit detergendum, vel orobi, vel lupinorum. Incipiendum autem à mitioribus, deinde ad alia progrediendum. Hinc fit vt ex tritico primùm fiat, ſecundo ex farina hordei & ſpelæ hoc modo,

Farina tritici.
Farina hord.

℞. mell. roſ. ves mell. cocti lb. ſ. ſucci apij qr. i. farinæ hordei ꝑ 3. 4. coquantur & reducantur ad formã vnguenti. Cum pars neruoſa affecta eſt, addenda eſt terebinthina hoc modo,

℞. mell. cocti lb. ſ. terebinth. quart. i. ſucci abſynthij, vel centaurij ꝑ 3. i. miſce, fiat vnguentum. Cum ex pure male olente deprehendimus eſſe putredinem, myrrhæ parum addimus: ſi vlcus deterſum eſſe videatur, myrrhæ doſis augenda eſt, addendo olibanum, vel iridem, vel colophoniam, & loco terebinth. lytharg. deinde ad ſarcotica nos conuertemus. Si ſanies craſſior fuerit, lachrymas quaſdam addemus, & galban. opopa. bdellium, ammon. diſſoluta; in vino & oleo antiquo, vt cum durities abeſt, ob congelationem humorum magis, quàm ob copiam hoc modo,

Ægyptia. R. galbani, opop. an. 3. 3. dissoluatur in vino antiquo, & rad. irid 3. β. ol. terebint. q. s. fiat vnguentum. Lachrymæ hinc non dissoluuntur in aceto, quia acris est, nec nisi in putridis, quæ ferè sensum amiserunt, est admiscendū, vt in vnguento ægyptiaco, quod vtimur in putridis, & gangrenis duntaxat. Vinum autē antiquum tenue attenuat, calfacit, exiccat, minúsque nocet, potissimū circa partes nervosas.

Fortia. Ex herbis & earū succis fortia fieri possunt vnguenta, & media, & mitia. Fortia ex chelidonia & centauryo confusis, & melli admistis. Fortiora ex succis, vt succo iridis, squillæ, & melle squillitico. Media ex succis absynth. beton. Imbecillia ex succo plantag. cichor. agrest. quod habet vim detergendi. Agrimonia, callitric. ceterach. detergunt, sed minús id præstant ob astringentiam. Succus rosar. mediocriter deterget, & vsurpari potest. & succus betæ, qui deterget ob nitrositatem, & alia nitrosa infinita, quæ neglecta iacent ob medicorum negligentiam, quorum maxima pars simplicium facultatem ignorant, nec à consuetis etiam si destituantur, ne latum quidem vnguem audent discedere: interdum ex syrupo rosato laxatiuo, & farina hordei paratur vnguentum ad maiorem deterfionem: Ex syrupo de rosis siccis ad maiorem exicationem & deterfionem.

Detergentia fieri possunt ex emplastris in officinis paratis, vt in maturatiuis superius monstrauimus, hoc excepto, quod in eorū dissolutione minús olei requiritur, nisi acris emplastrū mitius reddere velimus, sed vino dissoluimus, mel. pauco, ol. ros. vel myrthi, vel antiquato, vel succo herbæ, vt si quis basilico, vel in eius defectu oxycroceo. parare velit vnguentum, temperabit hoc modo, R. emplastri oxycrocei 3. 2. dissolue in vino rubeo, ol. & melle, vel in oleo tantum, fiat vnguentum.

Oxycroceū. Fit ex maturantibus, & attrahentibus, & deterforiis. Recipit enim crocum, picem, ceram, colophoniam, terebinthinam, quæ concoquit magis quàm detergit, myrrham, ammoniacum, galbanum ad deterfionem. Hoc vtemur in putridis & vlceribus factis ab abscessu pituitoso, frigidoque detergendo.

Ceroneū. Sin morbus fortius deterforium requirat, ceroneum dissol-

dissolutū erit vsui, quod plura detergentia & attenuantia accipiat, & præter alia cerapinum, aloen, opopanax. mastich. & bdei. alumen, styracem vtramque, & litharg. *De gratia Dei.* Emplastrum de gratia Dei, vel de ianua eodem modo *Dei.* dissoluta in vnguenta vertuntur, ad capitis vlcera. Detergunt enim non modò capitis vlcera, sed & aliarum partium, maxime neruofarum, & durarum. Qui corrosiuum cupit,umat emplastrum Andromachi secundum Nicolaum, quod vnguento ad Auicen. relato proportionem respondet, recipitque seu arietini, & picis ana ʒ. iij. gumi pini ʒ. 8. sandaracæ veræ, & auripigmenti (quæ simul reperiuntur) aluminis scissilis, & calcis viuæ ana ʒ. 3. ammoniaci dissoluti in vino rub. & oleo ʒ. 2. fiat vnguentum aucta dosi olei.

In depascentibus & corrosiuis, vel virulentis non solent præscribi detergentia, sed tantum malactica; quæ repellunt & siccant vlcera, vt vnguentum ex litharg. cerusa, vel plumbo, vel antimo. vel minio, vel pompholige, vel vnguento rub. desiccatiuo, vt illud Mesue de cerusa, cui addunt argentum viuum (cùm adest pruritus, & præcessit morbus Italicus) vitriolum, & florem æris. In vlceribus dispuloticis à facultate occulta vnguentum tripharmacum Mesue, vnguentum de litharg. cocto & crudo, de cerusa cocta & cruda. Reducuntur autem ea *De cerusa* vnguenta vel ad formam nutriti, & dicuntur cruda, quia litharg. & cerusa non coquuntur, sed oleo vel aceto, vel succo aliquo excipiuntur, sensim instillata, & agitata in mortario sine cera fiant. Si cum cera, alba eligenda, & in oleo liquefacienda, & pistando cerusa admiscenda, & aliud medicamentum eodem modo fit de cerusa crudum: coctum autem, si ex succo paretur & cera. Succum tamen decoqui oportet, & ceram liquefieri, deinde puluere aspergi, & paratum est vnguentum pompholigos vocatum, & desiccatiuum rubrum. Vnguentum de plumbo crudum est, quia ceram non recipit, sed oleum & mineralia, vt litharg. cerusam, antimonium, plumbum vstum, & oleum ros. Oleum ros. & myrthinum hic vsurpantur, quia siccant & astringunt, sed & lentiscinum & mastichinum addi possunt. Cùm autem siccandum & astringendum sit, eos probare non possum, qui rubrum desiccatiuum ex oleo

Rosaceū, parant violaceo, quod minùs humidum est, & myrthi-
populeum. nùm magis conuenit. Nos autem cum vnguenta vn-
Vnguentū guentis miscemus, rosaceum, & populeum miscemus,
citrinum. præsertim cum dolor, vel calida intemperies adest. Vn-
 guentum citrinum per se valet ad siccanda vlcera &
 maximè ad cicatricem inducendam. Cum vlcera his vn-
 guentis non cedunt, sed magis serpunt, & recrudescunt,
 statim conficimus aut esse cacoethes, aut dispuloticum,
 aut cheroneū, aut telephum, aut propter os corruptum,
 aut propter carnem subiectam intemperatam, & hu-
 more aciri redundantem, aut defluxionem quandam ef-
 se. Os corruptum incisione aut cauterio auferimus, car-
 nem malè affectam sanam depascentem, & corrumpen-
 tem, nec sinentem cicatricem induci, cauterio vel vn-
 guentis, vel pulueribus arrodentibus, causticis castiga-
 mus, & ad viuum arrodi permittimus. Quod vt fiat, vn-
 guentis primùm tentamus, tanquam mitioribus, dein-
 de ad trochiseos & ad alia arrodentia siccā, quæ fortius
 operantur, transimus, & vnguenta illa corrosiua detra-
 hentia vsurpamus: vt quæ recipiunt florem æris vel æ-
 ruginem, vel chrysocollam, vel sublimatum, vel præci-
 pitatum, vel lapidem cianeum. Hæc enim detrahunt
 carnem & minuunt, corruptamque exedunt.

Defluxionem vel vlcus depascentis iis quæ corrodo-
 vel vrendo constringunt, castigamus, vt sandaraca, auri-
 pigmen, chalcitide, misy, sory, & alumine. Sin alia vsur-
 pantur astrictionis expertia, gallas addimus, corti mali
 gran. nuces cupressi, aliâque constringentia. Hoc modo
 reperies parata apud Gal. Auicen. & alios, vt illud quod
 citatur à Guidone, cap. de vlcere cum proprietate exhib.
 ut supra. Recipit autem lapidem lazuli pro chrysocol-
 la substitui, cadmiæ, aluminis, chrysocollæ, viridis æris
 ana partes viij. floris æris, scammæ æris vstorum ana
 partem j. gummi cupressi partes quatuor, ceræ, olei ros.
 vel myrthini ana q. s. fiat vnguentum. Hoc vnguentum
 summa cum ratione compositum est. Nam cadmia po-
 tenter siccāt, alumen siccāt & astringit, & carnem flac-
 cidam, quæ humorem nimium continet, contrahit. Chry-
 socolla crustas gignit, quæ paucis cognita est. Non e-
 nim ea est, qua nunc aurifices vtuntur, sed est mineralis.

& viridis, & frequenter cum lapide Cianeò, vel lazuli re-
peritur, suntque eiusdem facultatis. Si itaque desit chry-
socolia, lapis lazuli substitui potest, suntque eiusdem fa-
cultatis, aut secunda æruginis species apud Diosc. quam
chrysocoliam Gal. etiam vocat. Est autem ærugo æris
parata cum vrina pueri. Addit præterea Galen. in hoc
vnguento florem, & scammam æris ysti ad maiorem cor-
rosionem, & gummi siue resicam non à pine, vel larice,
vel abiete, at ex cupresso, quæ & reuinitate partium & a-
strictione quadam prædita est, in cuius locum mastichen
substituendam, censeo ob astrictionem ol. ros. vel myrthi
eligitur. Est enim vlceribus necessaria quædam astrictio
etiam insignis, quia partes illæ laxæ excrementa susci-
pientes ob laxitatem, & curationem vlceris retardantes
constringuntur, ne morbus serpat: tum quia alia medi-
camenta detrahentia, arrodentia, & vrentia dolorem ex-
citando calfaciunt, & fluxiones excitant. Præterea si a-
stringentia aliis astrictionis expertibus admisceantur,
fit ut illa non tam promptè penètrent, aut altius descen-
dant, sic assatim rodendo plus doloris inferant. Hac ita-
que ratione tibi vnguenta paranda sunt. Vnguentis, præ-
cipitatum & sublimatum addimus, quæ putrefaciendo,
& minore cum dolore detergunt maximè, ut

℞. vnguenti albi ras. 3. i. sublimati 3. i. misce. Aliud,
℞. trochiscorum albi ras. cum opio 3. i. vnguenti po-
puleonis 3. ss. argenti viui vel sublimati 3. 3. fiat vnguen-
tum. Dosis augetur cum satis efficax non est: minuitur
cum nimium arrodit, vel calfacit.

Si quis vlcus exactè curare velit, & carnem corruptā
vel malè affectam castigare vel arrodere, efficacissimum
hoc erit.

℞. omphac. inspissari, ut Diosc. docet 3. i. diluatur a-
ceto pauco & reducatur ad formam vnguenti, & parti
applicetur. Sin maiorem dolorem inferat, fiat sic.

℞. vnguenti ros. 3. i. de cerusa ss. ompha. 3. 8. misce,
fiat vnguentum, vel

℞. vnguenti populeonis 3. i. omphac. amurcæ præpa-
ratæ an. 3. ss. calcit. floris æris an. 3. 2. cadmiæ, vel tuthiæ
3. 3. misce, vtatur. Sin æger tolerare non possit, tempera-
re oportet, aut omnino cauterio vri, deinde his vel sur-

prædictis vtendum. Argentum viuum congruè his vnguentis additur.

De sarcoticis.

Sarcoticis tanta est cum detergentibus cognatio, vt eadem esse videantur, tantum differunt secundum magis & minus. Nam carnem generantia siue carnis generationem prouocantia extergendi quandam facultatem habent citra morsum cum siccitate aliqua, vt quod crassum est pus detergatur: tenue autem & aqueum exiccetur. Detergentia verò magis detergunt, quæ cicatricem inducunt, fortioribus sarcoticis similia sunt. Nam deficiant talia, & astrictionem quandam habent, qua carnem densant & cōstringūt, & veluti in callum vertunt. Sarcotica autē sunt fortiora, aut fortissima, aut debilia. In carne generanda & vlcere exiccando cōseruanda est partis temperies. In pueris igitur & mulieribus mollibus, mollique carne præditis, ex aloë, colophonia, mastiche, fari. hord. māna, thure, & paucō melle sarcotica paramus: vt

℞. thur. mastich. ana. ʒ. ʒ. coloph. ʒ. 2. ol. ros. & mel. q. s. fiat vnguentum. In eiusmodi etiam corporibus basilicū maius addita pauca myrrha & thure, & paucō mel. sarcoticum est, vt etiam vnguentum aureum. Fortiora parantur pro corporibus mediis in siccitate & humiditate carnis, vt ex aristolochiis, panace, iride, farina orobi, & lupinorum, cadmia, litharg. & pauca quantitate fortissimorum: fiat hoc modo,

℞. aristoloch. rotundæ, irid. cortic. thur. ana ʒ. ʒ. mastich. myrrhæ, aloës, cadmiæ ana ʒ. 2. mel. parum, fiat vnguentum: vel,

℞. fol. consolidæ, pilosellæ, betonic. hyperic. caudæ equinæ, verbenæ ana M. 1. decoquantur in vino, & contundantur, deinde adde mel. terebinthinæ ana ʒ. 3. thuris, mastich. sanguinis dracon. myrthi ana ʒ. 3. fiat vnguentum: vel sic,

℞. succi radic. iridis ʒ. 2. vini parum, mell. ʒ. 3. cadmiæ vel litharg. ʒ. ʒ. aloës, myrrhæ ana ʒ. 3. fiat vnguentum: vel,

℞. succi radic. narciss. ʒ. 2. succi verbenæ, hyperici, caudæ equinæ ana ʒ. j. olei antiquiss. ʒ. 2. colophon. ʒ. 1. gummi elenij seu æthiopicæ oleæ, myrrhæ, sang. drac. mastic.

massich. aloës ana 3.3. concoquantur succi cum oleo & pauco melle ad inspissandum, quibus admiscemus pulueres reliquorum. Efficacissimum est, replet vlcerà concava carne, & recentia subito consolidat. Huius ordinis erit vnguentum ex emplastro diuino confectum, dissolutum in oleo communi, quod ferè ex puris sarcoticis cōstat. Huius etiam ordinis sunt, quæ ex fortissimorum *Fortissimorum.* pauca quantitate parantur, admixtis imbecillibus. Fortissima sunt antimonium, plumbum, ostreorum cinis, cochlearum caro, pix, resina, colophonia, chalcitis vsta, rasura panni, alumen, sarcocolla, farina orobi, lupinorū calx extincta, vel lauata septies, emplastrum diachalciteos, addita myrrha, vel sarcocolla, vel indo, dissoluta in oleo rosaceo. Tale erit vnguentum, quo in corporibus duris & siccis, vt agricolarum & aliorum fortissimorum vtimur, & vlceribus partium vehementer siccarum, vt plantæ pedis, aurium capitis, & quæ humectantur fluxu alicuius humoris. Tale autem erit.

R. cineris ostreorum, calcis viuz septies lotæ aqua plantag. ana 3. β. cadmiæ, antimonij, cerusæ, chalcit. tostæ & lotæ aqua ros. ana 3. i. sarcocollæ, picis, colophon. ana 3. i. cum melle fiat vnguentum.

De epuloticis.

E Pulotica medicamenta sunt, quæ vlceribus æquatis, & carne plenis cicatricem inducunt siccando & cōstipando, & veluti callum indurando. Commodiora autem sunt in forma pulueris, quàm alia forma, deinde in forma emplastri, denique in forma vnguenti. Ratio est, quod insignis densatio, & exiccatio est necessaria, vt in carne molliore, & quodammodo laxa cicatrix callusque quidam est. In forma pulueris medicamenta & melius adhibentur, & valentiora sunt, nec quidquam recipiunt, quod actionem retardet, vt oleum, ceram, resinam. Breuiter itaq; docebimus, quibus parari possit vnguentum epuloticum, enumerata prius sylua, è quibus conficitur, ex quorum numero sunt quædam, quæ primò & integra facultate id præstant, alia quæ ex aliqua parte tantum, alia quæ per accidens. Vera epulotica sunt, quæ cum *Vera epulotica.* astrictione quadam carnem indurare, & exiccare possunt, cuiusmodi sunt alumen, galla, omphacitis, acacia,

cortex mali punici, balauftia, citrini, nux cuprefsi, myr-
thi semen, bolus armena, magnes, lapis iudaicus, li-
tharg. Alia sunt epulotica propter vftionem, qualia sunt
cateretica, quę ad modum naturalem & falubrem redu-
cunt, à catereo, purgo, vt flos æris, scamma æris, quę si v-
rantur, lauentur, detrahunt, deficcant, carnem densant,
& cicatricem inducunt. Vrantur quędam, vt melius in
puluerem reducantur, vt ostree: quędam, vt maiorem
vim habeant ficcandi, vt aristolochia, quę vsta sarcotica
est & cicatricem inducit, coria bubula, cortex vlmī, quer-
cus. Cicatricem etiam inducunt, quę astringunt sine
magno morfu in pueris, mulieribus, & partibus humi-
dis natura, non autem superfluitate excrementitia & ad-
uentitia. Ex verē epuloticis vnguenta paramus, vel illis
sarcotica admiscemus, vt

℞. aloës, sarcocollę, myrrhę, iridis ana 3. 2. litharg.
cerulę ana 3. 3. cortic. mali granati, vel balauftij 3. 3. cum
melle crudo fiat vnguentum. Vel si quis oleum rosę vel
myrrh. vel cydoniorum, vel aliquod aliud astringens ad-
dere velit, potest in ficcioribus naturis, vel partibus &
locis humidis. Ex primis & secundis paramus hoc modo.

℞. lithargy. aluminis, floris æris vsti & loti, plumbi
vsti ana 3. 3. balauftiorum, boli ar. vel cinerum ostreorū
ana 3. 2. olei myrrhi 3. 3. vini parum, seui hirci, & colo-
phonię ana 3. 2. misce, fiat vnguentum. In siccissimis na-
turis & partibus, vel constitutione humida & regione,
vel in vlcere prope emunctoria, à quibus semper aliquid
recipit, vel prope meatus excrementorum. Ex fortiori-
bus paramus hoc modo.

℞. aristolochię vstę & lotę, nucis cuprefsi, balauftio-
rum vstorum, ostreorum vstorum ana 3. 2. aluminis,
floris æris vsti & loti, chalcitidis ana 3. 3. mellis, vini a-
stringentis q. s. fiat vnguentum.

Nonnulli ex succis herbarum, vel herbis epulotica
parant, sed talia sunt primi ordinis, nisi fortiora ad-
dantur. Axungia antiqua porci si addatur, per multos
dies prius est maceranda in aceto, & saluta esse debet.
Seuum enim hirci efficacius est ob maiorem siccitatem.
Colophonia potius vsurpanda, quam terebinth. vel la-
uanda cum aqua vitę, aut paucō aceto rosę herbę quę-
dam

dam vim constringendi & siccandi habent, sicet tamen recentioribus meliores. In summa quę valent ad coria densanda, quia frigida & sicca sunt, eorum vsum probarim, vt folia myrthi, folia rhu. coriariorum, & alia pleraque, quę in hunc ordinem referri possunt, ex Diosc. vt ea, quę sequuntur, hippuris, centaur. verbenaca, plantago, folia cupressi, quercus, ilicis. Radices sunt efficaciores, vt radix tormentillę, bistortę. Ceterum omnia sunt in puluerem reducenda, aut vino astringente, aut aceto, vel succo astringente, vt cydoniorum, pyrorum, temperanda, quibus seuum addendum est, in formamque vnguenti reducenda. Argentum viuum his admixtum valet, sed præsertim in vlceribus morbi italici, & disepuloticis, & extinguendum aceto, vel sulphure. Cinabaris etiam conuenit in istis, & sublimatum extinctum in succo limonum, vel pyrorum agrestium. In delectu horum medicamentorum diligenter est obseruandus totus habitus corporis, vel morbus adiunctus, vel constitutio morbi, vel causa morbi, vel superexcrementia carnis, vel defectus. Nam si vlcus non sit æquum, sufficient prima remedia quę carnem generant, & cicatricem præparant, ita vt pars tandem plana reperiatur. Si enim vlcere cauo existente, detrahentibus uteremur, absumeretur humiditas necessaria ad carnis generationem, vlcusque remaneret & profundius fieret. Si verò ad carnis supercrescentiam istis prius utamur, cicatrix quidem inducetur, sed inæqualis & fœda. Utendum itaque fortioribus, vel imbecillioribus detrahentibus, vel constringentibus carnem laxam. Morbi etiam causę conseruanda ad eligendum epuloticum conferens, veluti quę argentum viuum recipiunt, si a morbo Italico nascatur, cinabrium, sublimatum, & alia necessaria, quę potissimum siccant. Si propter defluxum fiant, fortiter deficcantia & constringentia sunt vsurpanda, vt quę ex balauistiis, alumine, chalcitide, gallis, & aristoloch. vsta parantur. Si verò vlcus ob decubitus humorum, qui a calore partis imbecille sit, vel a malo totius corporis habitu oriatur, eligenda, quę calorem iuuent, & robur parti addant, vt mastix, radix bistortę, cortex thur. aristoloch. nux cupressi. Si ob habitum totius corporis humidiores,

siccioribus & fortioribus erit vtendum, quia talia vlce-
ra difficile coalescunt. Si ob acres humores à toto cor-
pore, vel ob partis temperiem calidam, ex siccioribus &
frigidioribus parandum est remedium, vt ex corallo, bo-
lo armena, tuthia, nuce cupressi, sang. dracon. cerusa, li-
tharg. maceratis in aceto, & cum albumine oui incor-
poratis, vel vnguentum de plumbo, aut de tuthia, aut ex
pompholige ad hoc parandum, admixtis quibusdam ex
numero enumeratorum prius. His diutius vtendum est,
adhibita optima victus ratione, & quiete partis labo-
rantis. Agglutinantia quæ sunt, quomodo à sarcoticis
& epuloticis differant, quis eorum sit vsus, & qua me-
thodo sint permiscenda, dicendum est.

De glutinantibus.

Glutinantia ab effectu dicta sunt, quòd glutinent,
vel coniuncta retineant, Græcis *collatica*, quòd par-
tes tanquam glutina coniungant. Sunt autem austera,
astringentia, vt Gal. visum est, & siccantia, qua in parte
cum sarcoticis, & epuloticis conueniunt: differunt verò
ratione maioris & minoris, à sarcoticis, quòd sarcotica
minùs siccant, & abstergant. Nam quæ carnem gene-
rant aliqua ex parte detergant. Glutinantia verò ne mi-
nima quidem in parte detergant, sed multum siccant
quicquid in partem vlceratam influit, & absumunt, vt
pars vacua sit recrementis. Necessario autem vi quadam
repellendi prædita esse debent, aut summa siccitate, vt
deffluxionem, & inflammationem prohibeant, aut ita
siccant, ne pus, aut sanies fiat, cum epuloticis magis con-
ueniunt. (Nam astrictionis aliquid epuloticum habet)
sed epuloticum minùs siccant, constipant, astringunt, & densant.
Quædam in diuersis corporibus idem præstant, vt cor-
porum humidorum vulnera cicatrice obducant, & sicco-
rum vulnus simplex glutinent, vt bolus armena vulnere
pueri inspersus cicatricem inducit albumini oui permix-
tus. Vulnus simplex glutinant sang. drac. calx lora, aloë,
aristolochia non vñta. Glutinantia medicamenta sunt im-
posita vulnere iuncto, & bene cõsuto, vel ligatura, vel as-
sulistoniuncto, itè sarcocolla, gumi elenij, succus hype-
rici. In vulneribus simplicibus recentibus, in quibus nul-
la facta est contusio, nullius rei deperditio, nihil in eis

extranei inductum, nil sanguinis concreti, nullus sanguis sit à magnis venis, aut arteriis influens, labra statim coniungenda sunt, & ista remedia adhibenda Si paruum sit, & in parte quæ non multum tensa sit, sufficiens adglutinās medicamentum imponere. Sin maius sit, ligatura aut sutura, aut alio modo coniungendū est, & medicamentum supra ponendū, non infra, ne coagulationem impediat. Agglutinationem autem impediunt superius enumerata, & superueniens inflammatio. Eam ob causam utile diximus, vt tale medicamentum vim repellēdi habeat quandam, vt impediatur fluxus, condensando partes, & repellendo modicè. Si dolor itaque iam exiccatum sit, vel inflammatio, vel sanies, vel caro malè effecta sit, *Agglutinantia.* acre tale medicamentum non est adhibendum. Agglutinantia sunt narcissus, hippuris, gummi tragac. arab. bolus armena, sang. drac. pentaphyl. sarcocolla quæ inde nomen accepit, symphitum, clymenum, herba Sancti Antonij, quam aliqui (*sege*) vocant, syderitis prima, cuius tanta vis est vt eius foliis illita vulnera sine periculo inflammationis agglutinentur. Aliæ syderitis species, vt à ferro nomen acceperunt, sic vulneribus medentur. Sunt & aliæ infinitæ herbæ à rusticis nostris cognitæ, & alia simplicia medicamenta, quibus vulnera parua glutinantur statim, vt tela araneorum, sol, oleum lucernarū antiquissimum, feruens terebinthina. In summa quæcūque possunt vulneratam partem cōiunctam seruare prohibendo inflammationem, vel putredinem, talia vulnera glutinant, vt oleum antiquissimum, & lucernarum feruens adhibitum ita siccet vulnus, vt nihil redundantis humoris inueniatur, sic coalescit caro ob mollietatem. Terebinthina feruens idem efficit, & sal positum in paruis scissuris cutis. Tela araneorum & retinet sanguinem & siccatur. Sunt qui oleo & vino omnes scissuras carnis curant, dicuntque esse basilicum Christi, quia in Evangelio, legitur vinū & oleum immissum in vulnera eius, qui in latrones inciderat. Ex prius enumeratis rebus, bolo armena scilicet & reliquis, pulueres conficiuntur ad sistendum sanguinem, & glutinandum, quos excipiunt albumine oui, & vulneri applicant, & frequenter vulnus semiglutarum secundo apparatu rumpunt, aut

maturatio facta ex vitello oui, vel embrocatione conglutinationem impediunt. Quod si diutius sinerent exsicari partem, sine sanarent: quod plerunque empirici faciunt ex balsamo facta ex olei hyperici, vel alterius rei. Nos itaque tale vnguentum parabimus duobus modis, aut ex puluere costrictiuo, vt diximus, aut balsamum in formam vnguenti parabimus, vt

R. pulu. costrictiui 3. 2. incorporentur cum albumine oui agitato, vel cum ichthiocolle dissoluta cum vino astringente, vel succo cydoniorum vel pyrorū, vel plantaginis. Idem præstabit, si incorporetur cum mucilagine gummi tragac. vel arab. quæ adduntur vt partes suo lentore retineant ne diuellantur. Quo autem melius id fiat, commodius fuerit pilos leporis addere, vel papos floris salicis, vel arundinis, vel senetionis, & aliorū: molles sint, & fractu contumaces, vt stupæ canabinæ delicatissimæ, vel rasura panni linei detriti. Puluis talis fit ad glutinationem.

R. boli armeni, sang. drac sarcocollæ, mastiches, aloës gallarum, balaustiorum, blattæ bizantiæ ana 3. 5. foliorum syderitis 3. 4. misce, fiat pul. qui cribretur, deinde pilorum leporum integrorum 3. 2. vel tantundem lanuginis, florum salicis, etiam integræ, quia si in tenues partes reducantur, neque sanguinem retinent, neque labra coniungent. Ex calce viua extincta, & frequenter lota, & albumine oui efficacissimum efficitur agglutinans, ita vt ferruminare possit fractum vitrum, si mastix addatur lota sic ne vrat. In forma vnguenti paratur sic,

R. olei antiquiss. lb. 1. succi narcissi & syderitis ana 3. 3. florum hyperici 3. 4. gummi elenij 3. 5. mastich. sang. drac. & aloës ana 3. 2. blattæ bizantiæ 3. 5. coquatur diu oleum per se, deinde succi addantur, demum hyperici flores ponantur in vase vitreo, quod obturatur, & soli exponantur per dies decē vndecima die addantur pulueres, & agitentur. Prius autē & colari debent, & flores auferri, rursus soli exponantur per viginti dies, deinde serua ad vsu. Hæc enim non solum vlcera cutis curant, sed etiam nervorum, si retineantur coniuncti, & quiescant, donec coierint. Oleum sit antiquissimum & coctum, vt siccius & crassius fiat, Succo non sunt coquendi, sed in oleum

in oleum fervens iniiciendi, præter blattam bizantiâ & narcissum, quæ nervos dissectos glutinât. Caro cochlearum contusa cum myrrha & thure vulnera nervorum glutinat. Salvia pro albumine oui posita efficacius reddit medicamentum, quia potentius siccât, nec nimis suo lentore retinet. Fieri possunt sine oleo ex vino, terebinthina, aliisque accommodatis, vel herbis, quæ talem vim habeant, in vino maceratis donec inspissentur. Deinde addenda, quæ lentorem habent, vt gûmi elenij, vel pini, vel abietis pro lb j. 3. ij. ichthocollæ 3. j. β. mastic. sang. diacron. sarcocollæ ana 3. j. misce: fiat vnguentum quod quò lentius & glutinosius fuerit, eò melius & efficacius. Aqua vitæ potest addi ad eas partes in quibus nihil periculi imminet ab inflammatione, & hæc hætenus.

De ceratis.

Cerata à cera nomen sumpserunt, fiuntque ex oleis & cera (vt ipsa Græcorum appellatio indicat) tali proportionem permixtis vt cera liquida sit, non tamen effluat, sed consistentiam quâdam habeat inter emplastrum & vnguentum: ob eam causam additur cera oleo, vt oleum quod effluit, neque diu moratur supra partem, diutius in ea parte hæreat, atque ita calfaciat, refrigeret, exiccet, concoquat, emolliat, cōstringat, vel induret, aut partibus dolore vexatis aut mollibus vt ventriculo, hepati, spleni vtero, pectori, neque duritie, aut distentione corporis plicationem impedian, vt emplastra, quæ partibus, quas formas retinere cupimus applicamus, vt supra fracturam, luxationes, aliasque partes osseas. Cæterum cum multæ sint ceræ differentiæ, intelligendum, in quem finem instituantur cerata, an ad laxandum, emolliendum, dilatandum, sedandum dolorem frigidum, an ad concoquendum. In his omnibus ceram novâ & pingue, vel quæ facile mollescat, eligere oportet, vel si pro thorace, aliâque parte cōstricta laxanda paretur. Si verò refrigerandum, siccandum, repellendum, indurandum, cōstringendum est, cera candida recens sumetur. Nam quæ diaphana reddita est, aquæ fortis acrimoniam servat. Noua autem ob pinguem illam vel aëream partem eget lotionem frequenti, acetôque inter dealbandum addito induratur, siccior, frigidiorque redditur. Nō leuiter

*Ceratum
Galen.*

ergo peccant, qui vnguentum resumptiuum, vel ceratum acopum ex cera alba parant, vel ceratum infrigidans Gal. ex cidona recenti, cum hoc ex cera alba fieri debeat. Illa autem acopa relaxantia ex cera citrina recenti, quæ faciliè mollescat, & lique scat.

Ceratum fit ex oleo omnibus partibus accommodatum, quod calfacit, refrigerat, exiccat, & humectat, repellit, concoquit, digerit, indurat, remollit, & sedat dolorem, si oleum obligatur ei parti vel affectui accommodatum, & cera, quod etiam in vnguentis obseruandum. Fiunt etiam cerata ex emplastris in oleo liquefactis, vt veteres conficiebant, cum, scilicet, supra partem dolentem, & inflammationem emplastra applicare volebant, eaque parabant in forma solida. Sin pars affecta, aut inflammationis ratione, duritiem emplastri ferre nequibat, oleo mollius efficiebatur in duplici vase. Ita vt pãoo adhærere posset firmitus, & lentius vnguento, mollius emplastro. Itaque si quis velit cõficere ceratum, ceram vel resinam addet, vt magis adhæreat, & quãdoque pulueres, veluti ʒ. j. vel ʒ. j. ʒ. puluerũ pro ʒ. j. ol. vel succorum. Ceræ duræ paulo plus quàm ʒ. ʒ. pro ʒ. j. ol. addita pauca resina. Intelligi autẽ id debet, quando aliud quod cõsistentiam & adhærentiam præstet, non recipit. Nam si compositione ingrediuntur lachrymæ quædam, aut pix, minùs ceræ addetur, aut lithargyrum diutius in oleis coquitur, & axungis. Et si seuum recipit, quod axungia durius est, minùs ceræ & resinæ recipit. Pro temporis cõstitutione habenda est cõponendi ratio. Nã quæ hyeme faciliè liquecunt, diutius cõcoquuntur, aut illis plus ceræ, minùs olei admiscetur. Porro cerata à partibus nomen mutuuntur, vt ceratum stomachicum Galeni. Alia à numero medicamentorum, vt ceratum Mesue dictum, *diapente*, à quinario numero, quod emollit neruorũ durities. Alia à morbo, vt ad hernias Arnaldi de villa noua. Alia ab authore, vt ceratum Andromachi. Porro autem quæ videtur ad institutũ facere dicemus. Itaque cõponendorum ceratorum variam esse rationem perspicuum est. Nam quæ verè cerata sunt, à linimentis differunt & vnguentis, quod ceram recipiant, vt vnguentum rosaceũ ceratũ diceretur, si ceram reciperet. Cerata alia, quæ

*Cerata à
partibus.*

quæ resinâ, lachrymas, aliâque simplicia sicca recipiunt, non admodum ab emplastris differunt, vt ceratum illud Arnaldi, veriùs dici posset emplastrum, quàm ceratum, licet mollius esse debeat, quod minimè à pharmacopeis paratur ratione partis cui adhærere debet. Sic autem distinguemus, si ceratum crassius & durius facere velimus, imperabimus vt diutius coquatur, aut eis plus ceræ & resinæ adhibeatur, quod ita in omnibus obseruandum est. Ad dolorem iuncturarum & articulorum.

℞. mucilag. fœnugræci factæ cum aceto ℥. iij. farinæ, seminis lini. pul. chamomil. & hermodacty. ana ℥. ij. olei vulpini ℔. ss. olei lumbric. & de croco ana ℥. iij. incorporentur simul, & cum pauca cera, fiat ceratum.

De emplastris.

Emplastra à materia nomen sumpsferunt, quòd ex Emplastris, id est, terreis & glutinosis fiant. Emplastra omnia medicamenta Galenò dicuntur, quæ tenaciter corporis partibus & meatibus adhærent, vt amyllum, alica, cerusa, cimolia, pompholix, calx lota, cadmia, falsus aster, creta, argilla. Sunt autem ex eorum numero, quæ non terrea, sed aqueæ sunt substantiæ, & naturæ. Quinetiam quædam non parum aëris continent, omnia quidem glutinosa, ac proinde emplastica. *Duplex siquidem emplasticatorum medicamentorum natura: Alia enim exactè terrea, & sicca sunt: alia viscida quidem omnino sunt, sed ex terrea, aquea, ac plerunque etiam aëra substantia sunt mixta, sicut oleum dulce, albumè oui, lactis caseosa substantia, suillus adeps. Hæc sunt verè emplastica, etiam si ex iis duntaxat emplastica non conficiamus, sed etiam aliis viscosis, quæ aliquid acrimonie habent, vt ex lachrymis, pice, terebinthina, colophonia, mastiche, myrrha ladano, aliisque multis, quæ nihil viscidum quidem habent, vt spica, cinamomo, caryophil. sed continentur aliis glutinosis, viscidisque admixtis. Fiunt igitur emplastra ex metallicis, maximè lithargyro, quod materia emplastrorum dicitur à Galenò, ex cadmia, pompholige, plumbo vsto. Vera omnia emplastra coctura fiunt, quanquam coctura etiam fiunt aliqua, quæ potius in numero durorum vnguentorum enumeranda sunt, quàm emplastrorum. Tale est emplastrum de fer-*

mento apud Nicolaum, quod ex puluere & mucilagine pillij, atque succis quibusdam & farina hordei, quæ omnia viscosa sunt & arida, retinent. Emplastrum de crusta panis magistrale, quod farinam & panem recipit, sine coctura etiam fit. Emplastrum de baccis lauri ex melle cocto paratur, quod coctura omnia fiant ex iis liquidis, è quibus emplastrum componitur, quæ sine liquatione permisceri non possunt, veluti quæ ceram, aut resinam, aut picem, aut terebinthinam recipiunt. Vera itaque emplastra coctura fient. Alia verò non vera, incorporabuntur mucilagine, aut pane, aut farina. In emplastris componendis deligi debent, quæ magis affectui, quem expugnare volumus, cōueniunt. Ex herbis recentibus parantur aut succis. Recētes decoqui oportet oleo & paucō vino vel aqua, ad vini vel aquæ consumptionem: Succus in maiori vini quantitate, aut aquæ, aut aceti, & diutius. Porro si lithargyrum & cerusa emplastrum ingrediantur, eorum quantitas consideranda est. Nam si maxima est quantitas, coqui debet in oleo lithargyrum tantum, vel aceto, vel oleo & vino, vel succo aliquo aut decocto donec coaguletur, semper agitando vt faciendum docet Galen. lib. *cata genes*, in emplastro diachalciteos, quod etiam fieri debere censeo in vnguento diachilon magno & paruo, in apostolico, & emplastro diuino. Si verò lithargyrum & cerusa pauca sunt quantitate, vel $\frac{3}{j}$, vel $\frac{3}{ij}$, sine coctura tritura aliis miscentur, sine illa longa coctura, vt fit in emplastro contra rupturā, in quo lithargyri $\frac{3}{ij}$ tantum ponuntur, & in Ceroneo, quod $\frac{3}{j}$ s. lithargyri tantum recipit. Emplastra si ex lachrymis fiant viscosis & pinguibus, per noctem infundentur in vino aut aceto, aut oleo quod magis conuenit. In crastinum liquabuntur & percolabuntur, deinde decoquantur ad consumptionem vini & aceti, tandem picem, secundo colophoniam, tertio terebinthinam admiscebimus, ne coctura exoluatur, & vim emplasticam amittat. Si ex lachryma vna, viscosa, pingui, vel duabus fiat, pistillo calido extendentur, nec macerabuntur, veluti cum emplastrum paratur ex Galbano, aut assa foetida, vel ammoniaco ad vterum, vel aliam affectionem. Si lachrymæ pingues non sint, in puluerem reduci possunt, vt

Cautio.

*Cautio
alia.*

Alia.

benio-

beniouin , mastix , & aliis pulueribus permisceri in emplastris coctis & non coctis. Si succi emplastris admiscendi, nihil viscidum habeant, sed friabiles sint, tales in puluerem rediguntur, vt aloe. Sin molles sunt & aliquantulum viscosi, vt acacia, hypocistis, ladanum, succus lyquiritiæ, dissoluitur in aqua, vel succo, aut vino, aut aceto, & aliis in decoctione permiscebantur, vt ille humor viscosus non absumatur, aut aridis rebus admixti triturbantur vnà ob aliorum ariditatem. Sin ex aromatibus fiat emplastrum, sine coctura parabitur, vt emplastrum de mica panis, aut in duplici vase decoquantur, aut in sine tantum aromata addentur, quomodo paratur emplastrum pro matrice, pro stomacho. Cæterum eorum compositionem vno aut altero exemplo demonstrabimus, & ad dolores & durities emplastrum commune faciemus quod resoluit, digerit & emollit hoc modo.

R. lithar. auri tenuiss. trit. ℥. iiij. nutriantur oleo chamomillæ in mortario, deinde coquantur semper mouendo donec inspissentur, deinde adde ammoniaci, bdellij dissol. in vino liquefactorum, & colatorum ana ℥. ss. ceræ ℥. v. terebinth. ℥. iiij. iridis ℥. j. malaxentur manibus inunctis oleo liliorum vel amygd. Valet hoc emplastrum ad duritiem splenis, hepatis, tumorum in articulis, vel aliis membri partibus. Hepati accommodabitur hoc emplastrum. si ol. vel axungia malaxetur, aut addamus spicam indicam, vel celticam, aut scænanthum, aut asarum. Spleni, si lachrymæ in aceto scillitico dissoluantur. Tumori- bus duris non versis in tophos, si euphorb. parum addatur, vel axungia porci, vel medullæ eiusdem. Etiam ex succis herbarum vel decoct. accommodantur, vel mucilagine hoc modo.

R. fol. chamep. M. j. radic. maluz & cucumer. agrest. ana ℥. iij. incidantur & macerentur in olei antiqui duabus partibus & vna vini: decoq. & in col. decoquantur litharg. ℥. iiij. ad consumptionem vini, deinde dissolue picis colophoniz, pinguedinis porci ana ℥. vj. galbani, ammoniaci, opopan. dissol. in oleo amygd. si recentes sint lachrymæ, sin antiquæ, in oleo viola. ana ℥. j. irid. myrth. styracis, propoleos, mastich. ceræ an ℥. ij. misce,

fiat empla. malaxetur cum lacte mulieris. Si è mucilaginibus fiat empla. extrahantur mucilagines & post lithargyri cocturam misceantur, ne fortè longa coctura indurentur aerea & aquea parte (in quibus emplastica vis consistit) cōsumptis: fiat emplast. Sufficit itaque levis coctura in mucilagine, & odoratis. Sine coctura magna ponitur lithargyrū in emplastris, vt in cheroneo, in quo post reliqua ponitur, & parum decoquitur. Non enim aliis bene misceri possiet, sine leui quadam coctura, vel longa pistatione, vel malaxatione. Ex multis aridis odoratis fiunt emplastra sine oleo, cera, pice, & reliquis, maxime cum densare & constringere volumus, sed pane macerato in aceto, vel succo vt mentæ, excipimus, addendo succum aliquem, cum farina vel mucilagine gummi traga. vel psilij, vel cydoniorum, vel mel, vel micam cydoniorum, aut aliorum fructuum. Vt ad fluxum ventris sic.

℞. cort. mali gran. gall. balaustiorum, aluminis an. ʒ. ʒ. acaciæ. sang. drac. myrtill. cortic. myrobal. chebulorum, & seminis vuarum an. ʒ. 2. fiat pul. qui excipiaturs mina cydoniorum & mucilag. gummi tragac. extractæ, cum aceto, fiat emplastrum. Vel sic,

℞. succi cydon. pyror. agrest. acetian. ʒ. 3. panis tb. ʒ. coquantur diligenter, & contundantur, & passentur, deinde adde mastichis, sang. draco. boli armeni ana ʒ. ʒ. farinæ lentium & hordei ana ʒ. i. mucil. gummi traga. ʒ. i. ʒ. misce, coquantur leuiter, fiat emplastrū quod applicatur supra vētrem. Emplastrum de grānis lauri excipitur melle cocto: excipi possēt ichthiocola dissoluta in multo aceto. Hęc autem non sunt verè emplastra, sed statim dissoluuntur & exiccantur, quia sine oleo parantur. Ad constringendum & exiccandum sumuntur quædam emplastica & decoquuntur, deinde additur cera rub. fit emplastrum, vt emplastrum contra rupturam, quod ex decoctione pellis arietinæ, consolidæ, polypodij conficitur, additis pice nauli, aloe, lithargyro & terebinthina cum sanguine humano sine oleo. Nihil refert, si olea astringentia sumamus, vt in vnguentis factum est, etsi ex mineralibus & aliis refrigerantibus emplasticis conficeremus, aut post eius præparationem abluamus diligenter vnguentum, & infundamus aquam astringentem vel

vel acetum, vel succum, vel prius abluamus oleum cum decoctione astringente, aut aqua astringente, vt fit in emplastro Comitissæ. Exemplum huius theorematiss est emplastrum ad retinendum fœtum, vel sanguinis fluxum ex vtero, aut renibus.

℞. olei cydon. o. ei myrthi ablutorum cū aqua plantag. & peculi ros. vel cum decoctione rad. bistortæ ʒ. 4. ceræ rub. ʒ. 3. sang. drac. boli armeni, acaciæ, hypocist. ana ʒ. ʒ. rad. bistortæ, gallarum; balaustiorum, coral. rub. masticæ, ana ʒ. 3. cerusæ ʒ. j. terebinthinæ lotæ in succo burs. pastor. ʒ. 3. misce, fiat emplastrum decoquendo in oleis cerusam, postea addendo terebinthinam & alia in fine, vel malaxentur cum succo polygonij, vel cydon. vel aceto, & applicetur.

Emplastrorum varix sunt differentix, quæ à partibus sumuntur, vel ab affectu, vt sunt cephalica, empl. de ianua, vel de Gratia Dei, stomachica, splenetica, pro renibus, pro matrice, quæ ratio appellandi facit, vt multi Medici aberrant, & multò satius fuisset, vt emplastrum de baccis lauri, empl. de betonica, vel diachilon appellassent. Nam empyrici & alij, qui se methodicos profitentur, si ad suffocationem vteri emplastrum præscribant, statim emplastrum pro matrice imperabant, non animaduertentes esse constringens, cum potius Cereoneum vel aliud, quod ex lachrymis resoluentibus, & discutientibus fumos & flatus compositum sit, usurpandum. Magis enim conuenit emplastrum pro matrice ad imprægnationem, & vt retineat semen, nec extinguat frigiditate sua, aut humiditate nimia expellat. Idem etiam emplastrum ad retinendos fœtus in vtero usurpant; sed id non posse insigniter facere indicant multum calida, quæ id ingrediuntur, nisi ob largam cotyledonum humiditatem fœtus retineri non possit, aut ob sanguinem biliosum, renum calorem, vteri partes relaxentur. Ad quod etiam valet emplastrum contra rupturam, & illud pro renibus vocatum apud Nicol. Cæterum qui dextrè volet emplastris vti, emplastrorum materiam, & mistionis modum nouerit oportet. Sic ad partium affectus facillè emplastrum componet, qui mente tenuerit indicationes à partibus, vel à partium

Emplast.

Varia differentia.

Empyric. error.

Cui conuenit pro matrice.

*Emplastri
natura.*

functione sumptas. Et quia diffusè satis, & exactè à nobis indicata sunt cap. de vnguentis, non duxi eadem hic reperenda. Eadem enim hic sunt obseruanda, scilicet, vt ex vnguento emplastrum facturus, resinam picemque addat, vel minùs olei, plus ceræ apponat. Præterea emplastri natura esse oportet, vt sit ipsillum & vis ollum, & parti adhæreat, quod refrigeratum solidum sit & durum, calfactione verò malaxetur aut aqua calida, vel oleo, vel mollescat, vel lëtescat, quam naturam à pice, resina, terebiath. cera, oleo & aliis viscosis, vt gummi sumpsērunt. Magis itaque coquenda sunt emplastra, quæ multum humida recipiunt, vel succos, vel acetum, vel decoctum, vel aquam, quia humiditas illa contraria est viscosis & adhærentibus. Hyeme minùs coquuntur, quia aeris frigiditate conseruatur consistentia dura. Æstate magis coquuntur, vel olei minùs imponitur, ne propter largam humiditatem defluant, & soluantur calore. Nimum enim cocta vruntur, dissoluuntur, & inutilia sunt.

De cataplasmatu.

*Cataplas.
ex pulvis
diffetētia.*

Cataplasmatum forma in medendis morbis, leuandis doloribus, concoquendis humoribus, vel digerendis tumoribus maximè accōmodata, & cum emplastris impropriè dictis, magnam similitudinem habent. Sed etiam chirurgi cataplasmata ex herbis contusis addita pinguedine, & etiam pulres, emplastra, vocant, propterea quod consistentiam habent mollem, & supra pānum, vel stupam, aut lanam possunt emplastri modo extendi & adhærere. In hoc autē differt cataplasma à pulte, quod puls è farina aliqua in oleo & aqua vel melle, vel buty. decocta sit, cum cataplasma herbas, radic. flores, fructus, semina, succos, olea & axungias recipiat. Alia cocta sunt, alia cruda, & ex herbis contusis, vel ex succis, & farina mixtis. Fiunt autem ad dolores lenendos, concoquendos abscessus, discutendam materiam & flatus, ad calfaciendum magis, quàm refrigerandum, quia molle est medicamentum spissum, & calorem habet blandum ob humiditatem.

Cataplasmata supra partes omnes dolentes aut inflammatas applicari possunt, indicatione sumpta ab effectu, à partibus, à materia & à loco, & quæ obseruantur

in eorum compositione, distinctiones, & limitationes, easdem obseruandas imperamus in vnguentis. Ad partium itaque externarum & artium inflammationes, & dolores ex his paramus, quæ & partem laxare, & obsequem reddere possunt, & aliquid à parte discutere, & ex minùs emplasticis. Herbæ malacticæ, vt maluæ cum radic. sunt coquendæ, vt cap. de Clysterib. emollientibus diximus. Poni etiam possunt folia violæ, vel flores, quia dolorem sedât, flores chamo. vel melil. vel fœnugr. vel lini, farina, axungia porci, vel butyrum, quanquam axungia commodior sit, quàm olea, temperata tamen olea, vt recens commune sine sale, amygdalinum, sesaminum & chamomel. conueniunt.

R. radic. althææ gr. i. mal. cum radic. viol. branchæ vrsinæ M. i. florum chamom. violarum puluerisatarum, fursur. ana p. i. fiat decoctio in brodio pingui, vt veruecis, vel adde axung. porci lb. ss. contundantur omnia, & per cribrum transmittantur, & fiat cataplasma. vel postquam facta est decoctio emollientis clyster. imperamus vt modo dicto præparetur, & addita pice & axungia iubemus fieri cataplasma.

Ad dolores articulorum ortos à materia calida sedandos sic præparatur. *Ad dolores artic.*

R. medullæ panis medijs (nam albus nimis est emplastic. & retinet, nihilq; euacuat) lb. i. decoquatur in lact. bubul. è quo nò sit extractum butyr. q. s. fiat cataplasma.

Ad magnam doloris sedationem oleû violarum ponendum, ad maiorem oleum hyoscyami, ad maximum oleum niádragoræ: sed cum apponuntur narcotica, addi potest crocus in pauca quantitate, quia concoquit & astringit, quod ad sedationem doloris conuenit. Vel fiat ex herbis sic,

R. solani, viol. ana M. j. florum hyoscy. M. ij. florum viol. & chamom. ana p. j. fiat decoctio in lacte, vel aqua. His cum axung. porci contusis & cribratis crocique ʒ. j. addito fiat cataplasma. Satius enim est herbis & radice vti, quàm opio. Nam cum concoquitur cum pinguibus, summam illam frigiditatem deponit.

Concoquentia cataplasmata fiunt ex emollientibus herbis, addito pane candido, vel farina tritici cum *Concoquentia catapl.*

axungia porci, vel oleo communi, vt

℞. radic. bism. ℔. ℥. mal. M. i. panis candidi ℔. i. fiat decoctio, contundantur, & per cribrum transmittatur cataplas. quod ob panem vel farinam tritici concoquit. Addi possunt fructus, vt ficus, butyr. & vitelli ouorum, hoc modo.

℞. farinæ tritici ℔. i. sapæ ℥. 3. fiat decoctio, cui adde vitel. ouorum nu. 3. fiat cataplasma. Plus erit si sine ouis paretur, & loco sapæ oleum vel butyrum ponatur. Ad viscera addimus spicæ purum, vel thur. vel croci.

Detergentia cataplasmata. Detergentia solent fieri ex herbis, floribus, seminibus & farinis, vt

℞. pariet. M. i. florum chamomi. melil. sambuc. ana p. 2. fiat decoctio: in decoctione incorpora farinæ fabar, & hordei, vel furfur. macri ℔. ℥. olei chamomi. vel amygdal. amar. ana ℥. 2. pinguedinis gallinæ ℥. i. fiat cataplasma, permiscendo fecem decoctionis. Hic solent chirurgi quidam absynthium addere in resoluentibus, cum astrictionem quandam habeat, & terreas partes, & (vt Galenus docet lib. simplic.) intus aperire possit, extra minimè. Si autem Auic. id fecit in cataplasmate, in incremento id fecit, in quo oportet repellere & digere. Nam & in eodem addit rosas. Ob id etiā a Guidone laudatur in incremento inflammationis. In istis adduntur radic. cucumer. folia ebuli, anethi, flores rosar. stachados, chamomilæ, sambuci, semina anis. fœnic. apij & petro. maximè cum flatus discutiendi sunt, oleum chamom. anethin. amygd. amar. cicinū etiam antiquarum. Oportet enim talia medicamēta calida esse, & tenuium partium, vt in vaporem vertant, & trahant, neque nimium calida, quia fortiter siccando cutem densant, & fortiter trahendo, quicquid est tenuium partium crassum remanet quod digeri non potest. Magna itaque est adhibenda ratio materiæ euacuandæ. Nam sanguis mitis, & non nimium crassæ consistentiæ, moderatis debet digeri, crassæ verò consistentiæ & contumacis, fortioribus, non tamen extremis, vt ad summa per media transcamus. Modicè digerit furfur, panis sordidus magis, si bene salitus est, & coctus, & fermentatus. Farina hordei fortius, fabarum farina non exiccatarum, item farina orobi

Digerētia.

orobi & lupinorum. Coquuntur in vino & aqua, quæ fortiora esse volumus. Stercora multum digerunt, & ex illis etiam fiunt cataplasmata, sed maxime cum flatus discutiendi, ut in œdemate, & hydrope, in quibus oleorum usus periculosus, quia relaxant.

In dolore colico & nephritico cataplasma.

Fiat autem hoc modo in dolore colico & nephritico. ℞. stercor. bubuli lb. 2. vini & mell. parum, fiat cataplasma. Fortius erit si semina carminatiua misceantur, vel sulphur, in hydrope, ut

℞. stercor. bouis lb. 1. stercor. capræ qr. 1. anis. fœnic. carui ana ʒ. ʒ. mellis parum, fiat cataplasmata. Ad hydropem hoc modo.

℞. sulphur. viui ʒ. 2. cucumini ʒ. 1. seminis apij petro. ana ʒ. ʒ. cum excrementis cochlearum fiat cataplasma, *Ad hydro-*
vel ex carne & testis cochlearum fiat cataplasma. *pem cata-*
plasma.

Ex stercore hirundinum fiunt ad anginas vel ex nido, qui eorum excrementis plenus sit, & luto, ut *Ad anginam cata-*
plasma.

℞. stercorum hirundinum, vel gallinarum, vel canis ʒ. 4. farinæ fabar ʒ. 2. olei liliorum & chamomil. ana ʒ. 3. butyri recentis ʒ. 2. fiat cataplas. Vel ex vnguento dialtheæ & farina fiat cataplasma.

℞. vnguenti dialtheæ vel œsypi ʒ. 4. ol. liliorum vel amygdal. ʒ. 3. stercoris hirund. vel gallinarum ʒ. 6. misce, fiat cataplasma. Hæc sunt digerentia cataplasmata, quæ omnibus partibus, aut certis quibusdam præparantur. Supra reliquas partes ut supra oculos aliquando sedantia dolorem applicamus, non suppurantia, fiuntq; ex pomis coctis, & confusis, vel ex farinis, vel pane, ut ad dolorem, & inflammationem oculi, ut

℞. pomorum acidorum num. 3. decoquantur in aqua peculiros. amoris seminibus & pelle, & duro quod inest, contendantur & facto cataplasmate applicentur frigide supra palpebras. *Sedantia dolorem.*

Sin in principio quis velit astringens, & repellens facere, capiat pyra, mala cydonia, sorba, aut alios fructus astringentes, & cocti, & diligenter confusi applicentur cum dolor non adest, sed cum calor, & defluxio incipit. Si verò dolor iam partem vexet, ab astringentibus abstinendum, & ad sedantia dolorem veniendum, quæ vel acrimo-

Astringē-
tia & re-
pellentia
cataplas-
mata.

niam frangunt humoris stupefaciendo, vel modicè re-
soluendo. Acrimoniam defluxionis acris frangit, quod
ex pomis dulcibus coctis in lacte, vel axungia recenti
lota in aqua viol. vel hordei mundati, & vt priùs mon-
stratum est, contusis, & per cribrum transmissis. Paratur
delicatissimum quod parari debet parua quantitate, ne
pondere grauet partem. Fit etiam cataplasma ex pane
syncomisto decocto in lacte, vel cum farina hordei, sic,

℞. panis syncomisti lb. ss. temperetur in lacte & pa-
rum coquatur, deinde fiat cataplasma. Non sunt multum
coquenda, quæ ex lacte parantur, sed potius contunden-
da, & sine coctura adhibenda, quia lac cum decoquitur,
inspissatur, & pars aerea, quæ magis sedat dolorem, ab-
sumitur remanétque pars caseosa, quæ crassior reddita
emplastrica fit, vnde minùs dolorè soluit, sed magis con-
stringit. Huc accedit quòd serum coctura acre reddi-
tur. Magis itaq; dolorem soluit lac frigidum & crudum,
quàm coctum: recens, quàm acidum, quod de omnibus
cataplasmatibus ex lacte paratis dictum volo. Lac eligen-
dum, quod plus butyri habeat, minùs casei, quale est vac-
cæ, ouis, mulieris, in quorum penuria vti possumus ca-
prino, asinino, sed non nisi in prædictorum defectu, quia
detergunt magis hæc, quàm sedant dolorem. Cum igi-
tur detergendum erit, horum vsus erit aliis præferendus.
Cautione. Cataplasmata oculorum ex farina vel pane, non sunt
coquenda, ne fiant emplastrica, nimiumque parti adhæ-
reant. Fiant itaque ex herbis non addita farina, vt

℞. portulacæ M ij. confusa diligenter apponatur su-
pra partem affectam. Eodem modo fieri possunt ex plan-
tagine & solanis.

Ad stupefaciendum cataplasmata.

AD sensum stupefaciendum ex pomis mandragoræ
decoctis in lacte vel foliis hyoscyami eodem mo-
do coctis paratur cataplasma, quibus addi oportet pa-
rum croci, quod insignem illam frigiditatem mandra-
goræ & hyoscyami obtundat. Neque horum vsus debet
damnari. Nam si opio vtendum censent omnes medici,
quid prohibet quo minus foliis hyoscyami in lacte co-
ctis vtamur? quandoquidem imbecillius est medica-
mentum coctum, quàm crudum, & fortius illud quod ex
succo

succo paratur,quàm quod ex herbis.

Ex succis & farina pauca, vel pane syncomisto paratur cataplasma erudum ad partes, in quibus repellere & refrigerare oportet magis, quàm calfacere. Rarò enim aut nunquam succos herbarum accipimus ad calfaciendum, sed herbas ipsas.

Ad inflammationem cataplasma.

Ad inflammationem parantur ex succo semperuiui, vel illud quod lib. j. ad Glaucon. ponitur, quamuis Guido linimentum fieri imperet: fiat autem sic.

℞. succi semperuiui lb. j. vini crassi acerbi (vt magis astringat) lb. ss. farinæ hord. (ad excipiendos succos) qr. j. cortic. mali granati, sumach. an. ʒ. ss. misce, & fiat cataplasma. Hoc neque ceram, neque oleum, neque pinguedinē recipit, sed Guido sic improprie loquutus est. Hordæum hîc ad resoluendum non ponitur, sed ad inspissandum potius succum, vt consistentiam cataplasmatism accipiat. Idem fieri potest de cotyledonis, portulacæ, plantag. aliarumque refrigerantium herbarum succis. Iusserunt veteres vt semper farina his succis admisceretur, tum vt succos contineret, tum vt minus calfaceret, sed potius his admixta refrigeraret. & exiccaret. Admisceri possent hi succi albumini ouorum, aut mucilagini psyllij, aut cydoniorum, vt inspissati habeant maiorem emplastificam substantiam. Cataplasinata itaque sient cocta & cruda, sed intra dolorem oculorum refrigerantia esse debent, & cruda, alia coqui possunt.

Ad fluxum Ventris cataplasmata.

Cautio.

Flunt etiam cataplasinata ad cohibendum fluxum ventris & corroboranda intestina sic.

℞. micæ panis tosti, & in aceto macerati ʒ. vj. contundantur, cui adde garyoph. macis. mastic. galangæ, granorum myrthi, & acinorum vuarum, balaustiorum an. ʒ. ss. olei absynthij, & mentæ an. ʒ. ij. fiat cataplasma, applicetur supra ventrem, vel

℞. prunorum agrest. & prunellorum ana lb. ss. decoquantur in aceto. per cribrum mittantur, & in colatura decoque micæ panis sordidi lb. j. foliorum absynthij, tenuissimè puluerisati, mastichis, coralli ana ʒ. j. omnium Santal. & cortic. mali granati ana ʒ. ss. olei os. & cydon.

an. ʒ. iiij. misceantur & fiat cataplasma, quod applicetur supra ventrem serò cum ibit dormitum.

Hæc duo cataplasmata sunt ad cohibendum fluxum ventris, & ad roboranda intestina. Et quia hîc fuit ordinata opiata, apponemus.

℞. carnium cydoniorum ʒ. ij. citri & conseruæ aconit vulgaris an. ʒ. j. pul. corall. rub. ʒ. iiij. pul. diarrh. abb. ʒ. j. diacyto. sine speciebus & aro. ana ʒ. ʒ. cum syr. cydo. fiat opiata, cui adde trochis. de spodio ʒ. j. ʒ. capiat manè. Hæc opiata præcedit duo vltima cataplasmata.

PULTES.

Pultes in curandis morbis intro sumuntur, aut ad concoctionem tumorum præter naturam foris applicantur. Pultes ex farina hordei & lacte fiunt, in affectibus thoracis, & vlceribus internis ventric. & intestinorum, si lac chalybeatum sit, aut pars butyrofa amota. Fiunt ex farina orizæ ad exiccandum & constringendum. Fiunt cum melle ad detergendum, cum butyro ad concoctionem tuberculorum, vel tumorum interiorum, cum lacte ad dolores sedandos. Sed de internis aliàs, cum de externis nobis sit hîc constitutus sermo. Pultes igitur externæ eodem modo parantur. Decoquantur farina cum aqua, oleo, vel butyro, vel lacte, vel melle, & fit puls concoquens, si ex farina tritici fiat hoc modo.

℞. farinæ tritici lib. ʒ. aquæ quantum sufficit, olei communis ʒ. iiij. decoquantur & fiat puls. Ex pane semydalite eodem modo parantur, vel ex amylo, ex farina hord. vel fabar. vel orobi, vel lupinorum ad deterfionem, discursionemque materiæ fiunt in hydromelite, vt

℞. farinæ hord. & fabar. ana ʒ. iiij. decoquantur in hydromelite, vel aqua, postea addatur mellis q. ʒ.

Cum magis discutere volumus, in oinomelite, vel in aqua decoquantur, cui addatur oleum antiquissimum, vel amygd. amar. vel de cherua, vel chamon. vel aliud ex digerentium numero. Sin detergendum & calfaciendum, axungia antiqua salita conuenit. Cum maturandum, & coquendum, recens non salita. Idem de butyro est iudicium. Axungia gallinæ & anatis digerit. Ad constringendum rarò parantur, nisi cum retinere volumus insigniter exiccando, tunc cum aceto paramus, vt

℞. fa-

Concoquens
puls

Axungia.

Ad con-
stringen-
dum.

℞. farinæ lentiū ʒ. iiij. farinæ orizæ torrefactæ ʒ. ij. deco-
quatur in aceto ros. & fiat puls, applicetur supra vētrem.

Ad vermes occidendos & deiiciendos ex farina lupi- *Ad Ver-*
norum in aceto decocta, aut succo amaro decocta (vt ab- *mes puls.*
synthij) puls paratur. Et hæc de pultribus, quæ non mul-
tum à cataplasmate differunt.

Sinapismi.

Sinapismus à sinapi, ex quo conficitur, additis ficibus
contusis ad excipiendum, nomen sumpfit. Fit autē ad
humores euacuandos, ad superficiem corporis, vt à par-
te interna attracti dolor solvatur, vt in coxendico, & ca-
pitis dolore diuturno. Spleni & omni dolori antiquo,
qui frigidus est, vt incalescat, sinapismo vtimur. Mitior
autem fit, aut fortior pro natura corporis, vel partis affe-
ctæ. In corporibus duris quælia sunt rusticorū, nautarū,
piscatorum, & id genus hominum fortioribus vtimur: in
urbanis, mediis, in pueris, mulieribus, & nō multum car-
nosus, imbecillioribus. Fortior duas partes sinapi cōtusi
recipit, nec in aceto macerati. (Nam lāguidius efficere- *Triage-*
tur) ficuum partem vnā. Imbecillior contra ficuū par- *nera sina-*
tes duas, sinapi vnā. Medius æquales vtriusque partes. *pisimi.*
Eorum parandorū ratio est. Ficcus sicca in aqua tepida pri-
die macerentur, sequēti die expressæ probè læuigari de-
bent, deinde sinapi acre per se cōtusum misceri, & massa
facienda. Vtebantur veteres balneo, relicto sinapismo.
Sin pars calidior erat, succo maluæ mitigabant, deinde *Cautio.*
cerato ros. vlcus cū cerusa curabāt. Si resolutis partibus
adhibeatur, sæpius detergenda est pars, & inspicienda.
Nam propter sensum obtusum, vel amissum nō sentiūt,
& vrūtur. Supra partē remanere debet, donec pars crue-
to rubore rubescat, quod Diosc. donec cutis rubescat,
dixit ob sanguinem attractum. Sinapismi loco in coxen-
dico dolore stercore cā prarum cum aceto vti possumus.

De dropacibus.

Dropax eiusdem efficaciz est cum sinapismo ad e-
uocanda excrementa ad summā cutim: differūt ta- *Differ. dro-*
men materia. Nam sinapismus paratur ex sinapi, & cū- *pac. & si-*
tem vlcerat, & rubrificat, vnde & rubrificantia antiqui *napiismi.*
vocalunt sinapismos. Dropax verò ex materia calida fit, *Vsus.*
& quæ lēiore suo pilos euellit, vt ex iis quæ p̄silotra sūt.

*Forma
Varia.*

Duplex.

Hinc fit vt dropace vtamur, cum depilare volumus, vt ex Martialis carmine licet colligere lib. 10. Hirsutis ergo cruribus, genisque. Materia eadem est cum acopis, & emplastris. Forma autem varia est. Quidam enim emplastri formam referunt, alij cataplasmatibus. Quandoque ante sinapismum ad præparationem materiæ, interdum post ad materiæ reliquias discutiendas. Dropax duplex est, simplex & compositus. Simplex item duplex: alius, qui ex oleo, & pice sicca paucissimo oleo siccata fit, quæ forma nihil aliud est quam picatio dicta Aëtio: Alius ex pice sicca, cera, pice, brucia, resina picea frixa fit, quæ simplicem appellant. Compositus est, qui Gallus Oribasij apud Paulum dicitur, cuius descriptionem require. Quamquam horum remedium vsus obsoleuerit, non est neglegendus ad morborum diuturnorum perfectam curationem.

Collyria.

*Forma
Varia.*

Collyria sunt medicamenta oculorum tenuissimè trita & læuigata Arabibus (Alcohol) dicta. Hinc fit, vt cum exactè læuigare velimus, dicamus, fiat collyrium, aut trituretur vt Alcohol. Cæterum variæ formæ fiunt: quædam enim arida, quædam liquida, nonnulla mellis consistentiam habent. Materia ex quibus componuntur, sunt succi, liquores, flores, semina herbarum, metallica, & pleraque alia. Angulis oculorum affectus præscribi possunt liquida: pilulæ, quæ mellis consistentiam habent. vt penicillo palpebris applicentur: Arida vero insufflantur, vel intra palpebras ponuntur. Vtuntur his in omnibus morbis oculorum, qui cum varijs sint, varia collyria fieri necesse est. Iam enim repellendū est: interdum fluxio inhibenda, nonnunquam detergendum, nunc dirigendum, alias astringendum, aliquando relaxandum, & dolor sedandus. Deligitur materia conuenientior, & forma. Liquida enim melius refrigerant partes angulorum. Densa verò parti applicata, diutius hærent, & ex consequenti fortius operantur. De repellentibus vnguentis abundè satis, cum de vnguentis oculorum diceremus, disputatum est. Liquida collyria fiunt ex aquis distillatis, aut succis herbarum, aut fructuum defecatis: ex aquis rosæ myrthi, peculi rosæ plantaginis caprifolij, portulacæ: quibus adiungere oportet, vt adhæreant, neque tam facile effluant,

fluant, parum albuminis ouorum fortiter agitatorum, vt
℞. aquæ peculi ros. myrthi, & caprifol. ana ℥. iij. al- *Repellēs.*
bum. ouorum fortiter agitatorum ℥. j. misce, applicetur
frequenter.

Et, quando dolor mitigandus, & ardor minuendus,
sanguinis facta missione, & per cucurbitulas facta reuul-
sione, aquas frigidas minus astringentes ad maiorem
mitigationem addimus, vt,

℞. aquæ plantag. viol. & portulacæ ana ℥. ij. albumi-
nis ouorum ℥. ij. misce. His dissoluuntur arida & spissa &
adhuc liquida collyria vocantur, quia aridorum pauca
quantitas additur, aut non debent agitari arida cum suc-
cis, ne puluis, qui dolorem solet excitare, permisceatur,
vel debent percollari & permisceri cum aliquo, quod
corpus habeat, aut lentorem, quo oculum contingat in-
flammatum. Repellens tale est.

℞. aquæ peculi ros. & myrthi ana ℥. ij. trochisc. albo- *Repellens*
rum ras. sine opio ℥. j. albuminis ouorum ℥. j. misce. *collyrium.*
Sedans dolorem sic.

℞. Aquæ viol. plantag. ana ℥. ij. trochiscorum albo- *Sedans*
rum ras. cum opio ℥. ij. albuminis ouorum, & decoctio- *dolorem.*
nis fœnugr. lotæ in aqua ros. ana ℥. j. misce. Hic additur
decoctio fœnugræci, quæ dolorem leuat & resoluit. Do-
lor enim circa statum est vehementissimus, in quo dis-
cutere oportet. Huc accedit, quod dolor oculorum non
solum ab intemperie, sed plerunque à plenitudine fit,
quæ distentionem facit: ideo à parte aliquid discuti-
endum est. Trochisci albi non solum digerunt, sed etiam
resolunt à parte inflammata.

Ex succis herbarum vel fructuum recenter extracto-
rum fieri possunt collyria repellentia, digerentia, deter-
gentiaque Succiautē antiquariæ simoniam acquirunt.

℞. succi plantag. succi viol. depurgatorum ana ℥. iij.
aquæ peculi ros. ℥. ij. misce, fiat collyr. vel,

℞. succi pomorum ℥. iij. ad sedationem doloris ab
intemperie, vel ad magis repellendum ex succis cydonio-
rum, pomorum, & aliorum fructuum astringentium. Hic
albumen oui non additur, quia succi plus satis adhærēt,
quàm aquæ distillatæ. Quod si nimium liquidi sint, ad-
de parum albuminis ouorum, vel gr. aliquot gâmi trag.

vel mucilag. psilij, vel cydon. quia asperitatem auferunt, sedant dolorem & refrigerant. Talia viscosa vel mucilaginea, & astringentia in principio, quando parum aut nihil saniei aut materię resudat à parte inflammata. Non enim retinere oportet, sed euacuare. In ipsa applicatione collyriorum sedatiuum dolorem admiscetur lac muliebre recens mulsim: gummi arab. & tragac. expertia sunt mordacitatis, dolores & asperitates mulcent, & alia adhærere faciunt. Concoctoria & discutoria post repellentia & sedantia dolorem applicantur, quæ ex thure, croco, decoctione meliloti, sarcocolla, lycio indico sũt, quibus addit castoreum Galenus, sed sua acrimonia dolorem excitat, vt,

Concoctoria collyria.

℞. thur. 3. ss. croci 3. j. sarcocollæ nutritæ in lacte mulieris 3. j. B. terantur omnia supra cotem sensim infundendo decoctum fœnugræci, fiat collyrium, vel,

℞. micæ panis albi 3. ij. temperentur in aqua decoctionis cham. & melil. & exprimantur, expressioni adde croci ʒ. j. quod si feruor adhuc appareat, adde lac muliebre.

In declinatione concoquentibus addenda sunt, quæ detergunt, digerunt sine morſu, qualia sunt lapis æmatites, cadmia, antimonium lotum, myrrha, sarcocolla,

Detergentia & discutoria collyria.

quæ concoquit & digerit. Aloë quæ aliquid absterſionis cum astringente habet. Ex his colly. sunt hoc modo.

℞. sarcocollæ nutritæ in aqua decoctioni fœnug. 3. j. tuthiæ præparatæ, antimonij loti ana 3. j. ss. myrrhæ ʒ. ij. croci ʒ. j. dissoluantur in aqua fœnic. vel euphras. vel rutæ, vel vino albo & aqua pluuiæ, fiat sic. Hic detergentibus & discutientibus vtendum, cum præcessit inflammatio ob defluxionem & sensum partis exquisitum.

Cautio.

In vlcere verò & aliis morbis, qui sine inflammatione, aut sine defluxione acri sunt, vtentur fortius detergentibus & resiccantibus, quæ sunt omphacium, myrrha, æs vstum, flos æris, succus chelidonij, centaur. minor. fella auium, quadrupedum, & quorundam marinorum, saccharum candum & sterus lacerti, sapo, siccus costus in multa aqua delet maculas & suffusiones.

Detergentia & resiccantia hac. Ad suffusiones albugines & cicatrices. collyria.

Extergunt sine morſu cornu cerui, & caprarum, cum morſu vsta & non lota. Ex his parantur ad suffusiones, cicatrices, & albugines, quæ temperare oportet mitioribus,

bus, vel in palpebris penicillo apponenda sunt spissa, vt,
 ℞. omphac. præparati in vase æneo 3 j. mucilag. fœ-
 nigr. extractæ cum aqua ros. 3. ℞. misce, applicetur cum
 penicillo, vel,

℞. amurcæ inspissatæ 3. ij. omphac. 3. ℞. vitellorum o-
 uorum fortiter agitatorum vnc. ℞. misce, applicetur vt
 supra, vel,

℞. fellis vranoscopi, vel scorpionis, vel draconis ma-
 rini 3. ℞. mell. rosacei colati 3. ij. sacchari candi pul. 3. iiij.
 fiat collyr. spissum. Ad idem valet fel hirci, bouis, per-
 dicis, gallinæ, vel milui conseruatum melle in vase æ-
 neo, maximè quod ob tenuitatem partium euanescat,
 quale est piscium & auium: quadrupedum verò ob cras-
 sitiem vesicæ diutius seruari potest, quale est tauri, vac-
 cæ, porci, hirci, lupi & similia. Ex succis herbarum
 sunt efficacissima.

℞. succi chelidon. & succi fœnigr. & centaur. minor.
 ana 3. j. mell. ros. colati, sacchari candi ana 3. ℞. incorpo-
 rentur simul ad formam linimenti.

Cum volumus detergere, & resiccare, vt in vlceribus
 palpebrarum, & corneæ, vel in vera declinatione oph-
 thalmiæ, talia medicamenta ex metallicis, vel cornibus
 sunt, vt,

℞. cornu cerui, vel capræ tenuissimè triti 3. ij. ruthiæ,
 antimonij ana 3. j. excipiantur melle ros. vel syr. ros. fiat
 ad formam linimenti.

Leuit. & astringentia in initio.

℞. Mucilag. semin. psil. cydoniorum extractæ in aqua
 ros. an. 3. ℞. trochiscorum alborum ras. sine opio & far-
 cocolla ana 3. ij. aque peculi ros. 3. ij. agitentur omnia si-
 mul in ampulla vitrea, fiat collyr. quod in oculos instil-
 letur, vel,

℞. mucilag. gummi arab. & tragac. extractæ cum a-
 qua ros. an. 3. j. aque peculi ros. & aque albuminis ouo-
 rum ana 3. ij. agitentur simul & fiat collyr. quod instille-
 tur in oculos. Vel ex decoctis fit hoc modo.

℞. foliorum plantag. & solani hortens ana M. j. ℞. se-
 mi. papauer. albi 3. j. ℞. ros. rub. p. j. decoquantur simul
 in sufficienti quantitate aque, deinde instilletur colatu-
 ra in oculos.

Fortiter astringentia pro fluxu lachrymarum immoderatarum, non pro sola inflammatione.

℞. thur. mastich. ana ʒ. ʒ. ʒ. olivum myrobal. adustorum & in puluerem redactorum ʒ. ij. coralli rub. ʒ. ʒ. succi malorum granatorum ad partis dimidium decocti ʒ. ij. aquæ peculi ros. aut myrtill. ʒ. ij. misce, fiat. collyr. applicetur suprà, vel,

℞. lapidis hæmatitis ʒ. ij. cerusæ lotæ in aqua ros. ʒ. ij. cupulorum glandium in puluerem tenuissimū redactorum ʒ. j. ʒ. pul. uuæ acerbæ in clibano exiccata ʒ. j. aquæ distillatæ foliorum sumach, aquæ myrtillorum, & peculi ros. ana ʒ. ij. omnia simul agitentur, fiat collyr. quod potius canthis oculorum, quam oculis instilletur.

Astringentia & discutiētia pro inflammationis incremento.

℞. Cerus. diligentissimè lotæ in aqua ros. ʒ. ij. tuthiæ præparatæ ʒ. j. ʒ. mucilag. fœnug. extractæ in aqua ros. ʒ. j. aquæ fœnic. vel euphras. ʒ. j. aquæ peculi ros. ʒ. ij. fiat collyr. vtatur vt dictum est.

Aliud discutiens pro declinatione.

℞. Sarcocollæ nutritæ ʒ. ij. tuthiæ præparatæ ʒ. ij. mucil. fœnugr. extractæ in aqua fœnic ʒ. ʒ. aloës ʒ. j. ʒ. myrrhæ omnino in tenuiss. puluerem redactæ ʒ. j. aquarum fœnic. & euphras. ana ʒ. ij. fiat collyrium, quo circa inflammationis initium vtili lect.

Ad sedationē doloris potest parari collyr. si medulla panis in lacte coquatur, deinde succus à medulla expressus in oculos infundatur. Idem etiam præstat succus fœniculi oculis instillatus, quæ vim habet maximam ad leniendum dolorem oculorum, & discutiendum exiguam humoris portionem oculis impacti. Narcotica vsurpantur aliis prius tentatis remediis, & rebus ferè iam deploratis, & euacuata maiore parte humoris, & a materia calida, alioqui eorum vsus temerarius & periculosus, vt,

Narcotica collyria.

℞. trochiscorum alborum cum opio ʒ. j. lactis mulieris puellam lactantis ʒ. j. ʒ. misce, fiat collyr. vel sic.

℞. cerusæ lotæ in aqua ros. ʒ. ij. vel mucilag. seminis psil. extractæ in aqua ros. opij. gran. ij. croci gran. vj.

Ad tollēdas maculas oculorum aquæ ros. ʒ. iij. fiat collyr. vtatur frequenter.

Ad tollēdas maculas rub. oculorum collyr. refriger. astringen. fiat.

℞. mu.

R. mucilag. semin. pſilij cum aqua roſ albuminis oui fortiter agitati, ſpuma innatāte purgati an. ʒ. j. ſarcocol. nutritæ, aloes ſuccotrinæ quinquies lotæ, cum aqua roſ. lycij an. ʒ. ʒ. ſterc. lacerti ʒ. vj. trochiſ. albi raf. ʒ. ij. aquæ euphraſ. ʒ. ʒ. miſce, fiat collyr. de quo ponat ſupra oculos manè & ſerò longè à paſtu.

Pro ſuſſuſione oculorum.

R. ſœnic. & euphraſ. an. p. ij. roſ rub. p. ʒ. ſemi. ſœnugr. diligenter loti cum aqua ciſternæ & ſœnic. an. ʒ. iiij. fiat decoctio in aqua q. ſ. ex qua oculi foueantur tepidè cum ſpongia molli longè à cibo, donec imponatur ſequens collyrium.

R. raſuræ vaſorum viridium (Gallicè *potſ plombez*) ſpumæ maris, ſtercor. lacert. lapidis hæmatites ana ʒ. ij. fiat pulvis ſubtiliſſimus, per ſindonem cribratus.

R. chelido. & accri an ʒ. ij. concaſſentur & coquantur in vaſe mundo ad tſb. j. aquæ, donec ad tertiam partem redeat. In illa aqua imbibatur pul. ſupradictus, & poſtea ſiccetur in ymbra, deinde teratur cum illa aqua, iterum incorporetur, fiatque hoc quinquies: tandem fiat pul. & cum aqua euphraſ. & ſœnic. fiat collyr. ſerò & manè imponatur, vt dictum eſt.

Sacculi cucuſæ.

Sacculi formâ quibuſdam morbis conuenit: partibus conſuuntur vel interbaſtantur, & hi quidem, qui ad caput præſcribuntur cucuſæ dicuntur. Sed & ſtomacho, & cordi applicantur ſacculj, qui omnes pulueribus determinatis implentur. Reliqui autem ſacculi ſimpliciter dicuntur, ſiuntque ex ſeminibus magna ex parte integris frixis in ſartagine, quæ quia alio modo non poſſunt applicari, arida cum ſint, ſacculis includuntur ad diſcuſſionem. De his itaque primum agemus. Ad dolores lateris, qui ſiunt à flatibus, ſiunt ex auena vel milio frixis irroratis vino, addito ſale. Nam ad maiorem diſcuſſionem aliquando ſemina ſœnic. apij, petro. aut aliorum diſcutientium ſtatus adduntur in colico dolore à flatibus. Siunt etiam ad lateris dolores ex floribus ſeminibusque hoc modo contuſis, & quia non mutamus materiam, ſed ſunt caſſacia ſupra laminam, aut vapore vini calidi: vt.

Ad dolores lateris,

℞. furfur. macrip. j. semi. anis. fœnic. carui confusorum ana ʒ. ij. florum chamæ. melil. sambuci. anthos ana p. j. fiant sacculi duo confuti, & supra laminam ferream vino extinctam calfacti applicentur parti.

Ad cordis affectus sacculi. Conducet autem duos habere sacculos, ut dum vnus calfactus supra partem hæret. alter pareatur. Nā subinde mutandi sunt. Cordi præscribuntur in affectibus frigidis, vel cum cardialgia, vel iactitatio, à flatibus, aut à copia feri in pericardio contenti excitatur: ut,

℞. florum anth. stechad ana ʒ. ij. summitatum ocimi, cortic. citri sicci, macis. garyoph. ana ʒ. iiij. diamarg. calidi, vel de gemmis, vel diacameron ʒ. ij. fiant sacculi forma rotunda, consuantur. Imponi autem debet bombax ad retinendum puluerem, & pānus, qui integit, debet esse delicatissimus. Irroretur vino & aqua melissæ, calfiat fumo, & temperatus prædictis aquis tepidis applicetur cordi, & cum siccat, remoueat. In palpitatio- ne trochisci de camphora probantur.

Ad stomachi affectus. Ad stomachi dolores & imbecillitatem fiunt sacculi. Cæterum ad dolores parum facere mihi videntur. Qui ad imbecillitatem præscribuntur, concoctionem iuuant, & ventriculum calfaciunt. fiuntque ex odoratis calidis & leuiter astringentibus herbis, radicibus, seminibus: ut,

℞. comæ absynth. exiccati & mentæ ana ʒ. ij. cortic. citri sicci ʒ. j. galangæ. cyperi. carioph. ana ʒ. ʒ. ros. rub ʒ. ij. fiat pul. ex quo sacculus, qui à scuti figura scutum appellatur. Magnus fieri debet, ut ad vmbilicum vsque descendat, latiorque pars infra vergat, angustior supra os ventriculi. Hic animaduertendum, ne contra theorema supra cap. de vnguentis data, facere videantur in sacculis conficiendis. Efficaciora aut calidiora, quanquam tenuium sint magis partium, inter astringentia vsurpanda, quia illa panno inclusa minùs calfaciunt, quàm in vnguentis aut linimentis.

Ad caput sacculi. Capiti sacculi duo applicantur, vnus latus supra anteriorem partem capitis ponitur: Alter capiti, modo pilei, duabus partibus simul iunctis applicatur, vnde cucula vocatur, prior ille latus sacculus, Frontale dicitur à fronte, & fit ad refrigerandum & repellendū. Hæc au-

tem

tem forma potius contactu suo calefacit, quam refrigerat, nisi multum humectetur aceto, & aquis. Vtraque autem hæc forma parum probanda. Priores sic fiunt.

℞. coriandri ʒ. β. semi. lactucæ ʒ. iij. semi. papauer. 3. ij. florum violarum, nenuphar. an. ʒ. j. ros. rub. ʒ. β. misce, fiat pul. ex quo impleatur sacculus latus quinque digitos, longus pedem vnum.

Capiti imponitur cucufa ad calfaciendum, digerendum, spiritusque animales excitandos in lethargo, & aliis morbis frigidis. Fiunt autem ex odoratis radicibus, herbis, floribus, & quibusdam seminibus, vt radic. galangæ, cyperi, calami aromatici, nume. mosc. caryophil. maceratis, floribus anthos, stechad. saluiæ, chamomilæ, melilori, sambuci.

Semina minus frequenter addimus, nisi myrthi semina, & grana tinctorum addamus, vel cum somnum inducere volumus citra magnam refrigerationem, semen anethi. Nihil verat addi beniuinum, quia siccitate sua in puluerem facile reduci potest, reliquæ autem lachrymæ nunquam. Ad resoluendam materiam, quæ lethargum, vel dolorem capitis excitat, fiat hoc modo.

℞. galangæ, calami odorati, cyperi ana 3. iij. nuc. moscatæ, caryoph. ana 3. ij. foliorum beton. & samplici ana 3. j. florum anth & stechad. ana ʒ. β. fiat puluis qui bombace exceptus, panno rub. raro intersuatur, & fiat cucufa. Hæc eadem conueniet in capite corroborando, si grana tinctorum, flor. ros. & semina myrthi addantur, sed ea vtendam post discussionem materiæ. Cæterum duo *Cautio* sunt in his parandis obseruanda, vt, scilicet, tenuiū sint partium medicamenta ob situm cerebri: deinde ne nimium calfaciant, & constringant. Calida enim & attenuantia liquefaciunt, vt sol, frigida astringentia exprimūt constringendo, vt frigus aeris nos ambientis, quod comprimendo fluxiones mouet. Huc accedit, quod nimium astringentia perspirationem cerebri impediunt, & doloris causam retinent.

Epithemata.

Epithemata, vt ex Paulo, Aetio, Diosc. licet colligere, Malagmata dicuntur, quæ visceribus aliisque partibus applicantur. Qui hodie medicinam exercent,

*Ad affe-
ctus cordis
epithema-
ta.*

irrigationem vel humectationem vocant, fons modo supra cor, hepar, & supra pectus totum in hecticis, & febribus ardentibus, & multum siccis. Cordi applicantur in febrib. ardentib. pestilentib. & hecticis, & in palpitatione & cardiaca. Fiunt autem ex aquis affectui & parti propriis. Aqua buglo & borrag. semper commendatur, quia temperata est: Aqua viol. ros. & nenuphar. in febrib. conuenit, & cum refrigerare volumus. Vinum albu semper additur maiori quidem copia cum calfaciendum, ut in cardiaca, vel spirituum depopulatione, minus vero in febribus. Item pul. diamarg frig. ut triasand. ad refrigerationem & confortationem. Semen citri, coral. cristal. flores violæ, & nenuph. ad refrigerationem. Ad calfactionem vel exiccationem trochisci de caphora, quæ frigida esse censetur, semē ocymi, aqua menthe, aqua ex floribus limonum, vel citri, vel arantiorum. In imbecillitate ob spirituum resolutionem, vel extinctionem fiet hoc modo.

℞. aquæ meliss. florum arantiorum, bugl. ana ℥. iij. aquæ ex florib. myrthi, vel ros. ℥. ij. vini maluat. ℥. j. pul. diacameron, vel de gemmis, vel diamarg. calidi ℥. j. trochiscorum de camphora ℥. j. misce, fiat epithema. Cordi applicatum excitat & reficit calorem naturalem, spiritus instaurat. Valet etiam in iactatione, quæ est a flatibus. Ad refrigerationem cordis in febribus ardentibus paratur tale ex supra enumeratis: ut

℞. aquarum bugloss. ros. ana q. j. viol. q. ij. pul. diamargar. frig. ℥. j. cristalli ℥. j. ℞. succi citri ℥. ℞. misce, fiat epithema

*In hecticis
& arden-
tibus febrib.
epithem.*

In hecticis & ardentibus febrib. experientia comperit vtilius ardorem pulmonum, & thoracis obtundere. Nam cum pulmones minus calent, aerem attractum minus calfaciunt. Obtunditur ergo humidis & frigidis, cum febris corpus exiccat, & caloris acrimoniam auget siccitas. Ex humidis igitur parantur, quæ a me primum inuenta, ex oleis scilicet, & aqua hord. mundati, leuiter, ne suo lentore obstruat, & euentationem prohibeat. fiatq; error peior priore. Fiunt etiam ex decoctione quatuor semi. frigidorum maiorum, vel ex cucurbitæ decoctione, & aliis. Hæc semina refrigerant & humectant cura

astri-

astrictionem. Conuenit itaque oleum viola. quia refrigerat, humectat, & relaxat. Item oleum vel decoctum ex semine cucurbitæ, & aliorum semin. frigidorum maiorum, oleum de semine papaueris cum oleo amygdali dulci & cremore hord. Applicantur autem post euacuationem factam, vel post sanguinis missionem, & potissimum in statu, in quo omnia sunt sæuissima. Pectus relaxant hæc vltima epithemata, & respirationem augent, *Tempus.* *Pectus re-*
laxantia. quæ magnam vim habent in acutis morbis, & sudores excitant, prohibentque ne in hecticam febrem mutentur febres illæ squallidæ. Tinguntur panni tepide, partique applicantur, & subinde mutantur, ne calfacti corpus calfaciant.

R. hord. mund. p. ss flor. viol. p. ij. fiat leuis decoctio, & in tb. j. misce olei viol. 3. iij applicetur. Oleum prohibet, ne tam citò exsiccentur panni, & partes humectat. Vel cum feminibus frigidis: vt

R. hord. mundati p. ss. quatuor semin. frigid. maiorum contusorum 3. ij. florum viol. p. j. nenuphar p. ss. fiat decoctio. In collaturæ tb. iij. diss. olei amygd. dulc. & viol. ana 3. iij. agitentur simul, & fiat epithema, supra thoracem applicetur. Maximè conuenit febrib. hecticis & squallidis. Frequenter autem vtendum sero & manè. Oleum chamomilæ in febribus ab obstructione ortis, vino albo permixtum, & epithematis modo super hypochondria appositum concoqui. obstructions cutis soluit, sudores elicit. Idem efficere oleum amygdal. amar. expertus sum, modò supra inferiorem ventrem ponatur, vel supra ventriculum ante accessionem ad vomitionem iuuandam. *Oleum cha-*
momil. *Amygd.*
amar.

Ad erysipelata faciei, vel aliarum partium fiunt ex aceto epithemata, & aqua dulci, vel ros. vel plantag. vel myrthi, vel nenuph. Ex succis pernixtis aceto vel aqua ad augendam molem, vel ne nimis spissi sint succi. Tinguntur panni rari, & applicantur. Magis etiam refrigerant, ab ære refrigeratur medicamentum, & euaporantur ex parte fumi illi calidi. In summa quories pars inflammatur, aut alia calida affectione afficitur, epithemate vtendū est. Epithemata ex stillatitiis liquoribus & pulueribus conficiuntur ea mensura, vt tb. j. aquarum

permisceantur 3. ij. & 3. j. ℞. in vehementi febre, virium imbecillitate, & rotius corporis incendio: vt

℞. aquæ bugloss. & acetos. ana 3. iiij. aquæ ros. 3. ij. vini albi 3. ℞. pul. electuarij, diamarg. frigid. & ossis myrobal. ana 3. j. cinamomi gra. v. misce simul cum pauco scarlatæ, granatæ, fiat epithema, quod tepidum admoueatur regioni cordis.

In febris ardentibus circa statum.

℞. Aquæ viol. acetos. & bugloss. ana 3. iiij. scab. & meliss. ana 3. ℞. pul. electuarij diamarg. frigid. & ossis, de corde cerui ana 3. j. cinamomi gra. v. fiat epithema; vt dictum est, & eo tempore admoueatur quo maius incendium ab ægro percipitur.

Pro hepate.

Sunt, quæ robur hepatis augent, & intemperiem illius corrigunt, in quibus non est suspectus aceti vsus, vt in pectore, modò in pauca quantitate ponatur. Licet aliquando his epithematis astringentia admouere, quia subiecti visceris robur seruant, vt semen acetosæ, polypodium, & similia: vt

℞. aqua endiuæ, scariolæ ana 3. iiij. aquæ absynth. 3. j. ℞. aceti vini albi 3. ℞. seminis acetos. & portulacæ ana 3. ℞. pulu. sandalorum ana 3. j. misce, fiat epithema pro regione hepatis. Aliud,

℞. aquæ scariol. solatri ana 3. j. ℞. aquæ acetos. endiuæ, & bugloss. ana 3. iiij. aceti vini albi 3. j. trochiscorum de spodio 3. ij. spicæ nardi 3. ℞. omnium sandal. ana 3. j. fiant epithemata, vt prius. Suspicio sit obstructionis, non sunt admouenda astringentia.

Pro testiculis epithema.

Nonnunquam testiculis admouentur epithemata ad refrigerandum sanguinem & vniuersum corporis habitum, vt in profluvio sanguinis immoderato Refrigerantia admodum testiculis sanguinem inhihent, & minus reddunt fluxilem. Curandum tamen, vt epithematis refrigerantibus aliqua admisceas, quæ temperamentum testiculorum conseruent, ob id aliquando vinum album miscemus, & alia similia, quæ illud præstare possunt.

℞. aquæ ros. 3. ij. aquæ solani 3. j. ℞. vini albi 3. j. trochiscorum de camphora 3. j. misce, fiat epithema, admoueatur testiculis, & ex decocto refrigerantium & astringentium, vel decocto florû nymphææ, vel ros. rub. balau-

balauftiorum & fimilium, quibus in aqua decoctis pare-
tur epithema.

FOMENTA.

Fomentis sæpe utimur, antequam vel cataplasmate,
vel vnguentis utamur, quo pori aperiantur, partes
relaxentur, & quodammodo viam muniant aliis reme-
diis. Fiunt maximè ad sedandos dolores vel remollien-
dum ex decoctis cataplasmatum.

Ad dolorem colicum fiunt fodus ex calidis discutien-
tibus flatus & anodynis, vt

*Ad dolorem
colicum,*

R. radic. bismalæ ʒ. ij. fol. calamenti, origani an. M.
j. sem. fœnug. lini an. ʒ. j. apij, petro. seseli an. ʒ. ʒ. flor.
chamomil. melil. vel sambuci an. p. j. fiat decoctio in a-

qua & vino vel oleo, fiatque fodus cum spongiis vel fil-
tro macerato in decoctione. Vtilis est idem fodus in ne-
phrítico dolore, sed efficacior erit ad deturbandum cal-
culum, si quæ cõmuniunt, & pituitam extenuant, addan-
tur, vt folia empetri recentia, vel condita aceto, folia a-

*Ad dolorem
nephriticum.*

pij, petro. radic. grami. asparagi, fœnugr. Valet & hic
posterior ad vrinæ retentionem à crassis humoribus, quia
incidit & attenuat. Et etiam in vrinæ retentione à san-
guine coagulato, nisi fluxus sanguinis excitaretur. In
inflammatione non valet, quia nimium calfacit, sed ex
temperatis, laxantibus & modicè refrigerantibus, vt

*Ad Grina
retentionem*

R. mal. bismal. cum radic. ana M. j. foliorum viol.
M. ij. seminis lini ʒ. j. florum viol. chamom. an. p. j. fiat
decoctio in aqua & cum decoctione tepida fiat fodus, ex
residentia fiat cataplasma, addendo butyri recentis, vel
axung. gallinæ, cuniculi, olei scorpionum ana ʒ. iij.

*Ad infla-
mationem
fœtus.*

Ad dolores lateris fiunt fodus ex relaxantibus, & ano-
dynis, additis paucis flatus discutientibus, vt

*Ad dolorem
lateris.*

R. mal. cum rad. M. j. ʒ. ficuum pa xx. florum cham.
mel. viol. ana p. j. seminis lini, fœnug. ana ʒ. j. anis ʒ. ʒ.
fiat decoctio in aqua pro fodu. Sin materia frigida fuerit,
relaxantia & discutientia addimus, vt

R. mal. cum radic. M. j. ʒ. calaminth. M. j. seminis lini,
fœnug. ana ʒ. j. anisi, fœnic. an. ʒ. ʒ. florum anthos, cha-
momilæ, melis. sambuci ana p. j. fiat decoctio, quæ vesti-
cæ aut cucurbitæ aut vasi æneo infundenda, deinde par-
ti applicanda. Vesica commodius lateri applicatur, vel

spongia mollis expressa, pannoque raro siceo inuoluta, ne odor ægorantis nares feriat. Frequenter autem mutandi sunt foci, ne refrigerati lædant.

Ad iecur. Supra iecur non nisi in vehementissimo dolore, vel duritie focibus vrimur. In dolore tamen conueniet prædictus focus, addito absynthio vel ros. vel spica pauca.

Ad sple- mem. Ad splenem induratum frequentissimè fiunt, mixtis in aqua vel in aceto, vel in vitroque, vt

R. radic. bismal. liliorum ana lib. β. mal. M. j. fic. num. xxx. seminis lini & fœnug. ana ʒ. ij. flor. chamom. mal. ana ʒ. β. fiat decoctio in aceto acerrimo & foueatur cum spongiis, vel ex fortioribus fit, vt

R. radic. cucumer. agrestis quart. j. radic. bismal. & irid. ana ʒ. ij. seminis lini, fœnug. & bismal. ana ʒ. j. florum viol. mal. ana p. j. fiat decoctio in vino albo, ol. liliorum, & amygd. fiat focus.

Ad Vteru. Ad vterum fiunt fomenta, additis vterinis, vt aperientibus & attrahentibus, si sunt trahendi menses, vt

R. radic. rubiæ maioris, eryng. fœnicu. apij, petro. graminis ana ʒ. iiij. radic. liliorum & bismal. ana ʒ. ij. puleg. matric. ana M. j. seminis apij, petio. seseli, fœnug. bismal. ana ʒ. j. florum chamom. & lescoi vel purpurei, vel citrini, ana p. ij. fiat decoctio in aquæ duabus partibus, & vna vini albi, foueatur vterus. Cauenda est nimia exiccatio, quia absumitur materia mensium, sed laxantia addenda, vt temperent & laxent partes constrictas. Si ad emolliendum vterum, malactica debent vincere alia.

Ad oculo- rum affe- ctus. Supra caput fiunt irrigationes non focus, de quibus postea. In oculis fit focus, quia oculus propter exactiorem sensum ictum ferre non potest, vt Galenus in meth. docet. Cum itaque discutere volumus, vel vtrunque corneam emollire, vel potius rarefacere, vt collyria, digerentia efficaciora sunt. In suffusione & *ypopeia* fiunt ex relaxantibus & digerentibus, vt

R. fœnic. loti ʒ. ij. florum chamom. p. β. seminis fœniculi ʒ. iiij. fiat decoctio, ex qua focus. Si fortius digerendum, decoctum paramus ex ruta, euphrasia, verbenaca, fœnic. in aqua & vino, vbi nulla est inflammatio. Si verò inflammatio adsit, ex decocto fœnug. loti frequenter in aqua.

Fotus fieri debent supra emunctoria, quando materia frigida, & tumor durus concoctioni resistit, quod & *Ad emū-
storia.*
in omnibus aliarum partium tumoribus expertus sum
uille. Fotus enim calore suo continuo calfacit & matura-
rat, aut digerit, trahitq; aliquid sanguinis ad illam par-
te, qui citius putrescit, vnaque cum eo materia dura &
viscosa, efficitque, vt pars aperiatur, & hæc materia tan-
quam in ventre conglobata extrahitur. Fiant autem ex
malacticis & relaxantibus, vt rad. liliorum, altheæ, cu-
cum agrest. ficubus, seminibus lini, scœnug. altheæ, apij,
petros. floribus cham. melil & sambuci.

*Relaxan-
tia fomē-
ta.*

R. rad. bismal. ʒ. 2. fol. bismal. calament. branchæ
vrsin. ana M. j. seminis lini & scœnugr ana ʒ. ʒ. seminis
mal. florum cham. & melil. ana p. 2. fiat decoctio in q̃r.
1. aquæ. Decoctum tepidum filtro excipiatur & parti af-
fectæ admoueat. Hoc vtimur aut simili post vniuer-
sale purgationem in partibus inflammatis, aut alio
modo tenis, quæ vehementes dolores excitant, vt in
pleuritide, & aliis id genus affectibus. Cuius enim rarefa-
cta medicamento exhalat quædam tenuis portio humo-
ris inflammationem committentis. Quod si materia, quæ
tensionem efficit, sit frigida, fiat decoctio, in qua permi-
sceri potest radix liliorum, quæ inter medicamenta la-
xantia vim insignem obtinet discutendi, vt

R. rad. ireos & galang. crassæ an. ʒ. ʒ. fol. organ pu-
leg. & calamenti ana M. j. seminis anisi & scœnic. ana ʒ.
j. ʒ. flor. rosmar. sampuci, & stechad. vtriusq; an. p. 1. fiat
decoctio in æquis aquæ & vini partibus, deinde foveatur
pars affecta calida. Illud impactos humores attenuat, &
in habitum digerit.

Ad discutiendas ophthalmiæ reliquias, plurimum con-
uenit quod sequitur.

*Ad reli-
quias oph-
thalmiæ.*

R. foliorum euphras. M. 1. paleæ auenæ M. 2. scœnugr. in
aqua scœnic. loti ʒ. ʒ. 3. seminis anisi & scœnic. an. ʒ. ʒ. 1. ʒ. flo-
rum stechad arabic. p. ʒ. fiat pul. ex quo parentur duo
sacculi quadrati, qui infundantur in modico vini albi, &
aquæ scœnic. de eo foveantur oculi.

Pro œdemate discutiens & exiccans parabitur hoc
modo.

*Pro œde-
mate.*

R. calamenti, orig. betonic. flor. rorism. & ros. rub. an.

III4 DE MEDICAMENTIS

p. 1. foliorum lauri & saluæ an M. ß. lupinorum 3. 2. cæ-
lami odorati, scænanthi, spicæ nardi ana 3. 2. florum v-
triusque stechad. foliorum rorism. & ros. rub. ana p. 1. fiat
decoctio in aqua pluuiali, deinde adde aceti modicum:
cum spongia fiat forus.

*Ad tendo-
nes & ner-
uas.*

Ad eundem scopum fiunt lixiuia parata ex cineribus
ilicis, fagi, quercus, prunorum tantum, quibus inest vis
siccandi insignis, vt in eodem lixiuio ad augendam exic-
cationem, tum ad partes roborandas, alumen coqui-
tur. Malactica aut fomenta sunt eiusmodi. Horum vsus
frequentissimus est in membris luxatis, antequam loco
priori restituantur, in tendonibus & neruis induratis,
non minus frequēs in scirrhis emolliendis, quibus præ-
cipuè hæc malactica debentur. Hoc tamen diligenter à
medico est obseruandum, cum scirrhus partem aliquam
occupat, aut aliam toti corpori deseruientem, nunquam
sola emollientia vsurpet. Hæc enim vim partis principis
resoluunt: ob id admiscenda aliqua, quæ robur illius
seruent, vt ad lienis scirrhos, & tumores emolliendos
permiscebit spicam nardi, schænantum, absynth. vt

℞. radic. bismal. 3. 2. ireos 3. ß. fol. bismal. mal. an. M.
1. absynth. M. ß. feminis lini & fœnug. ana 3. ß. feminis
tamarisci & stechad. arabic. ana p. 1. fiat decoctio in tri-
bus aquæ partibus, vna vini albi, addendo aceti modi-
cum, deinde foueatur lien. Aliud,

℞. panis porc. & radic. cucumeris agrest. ana 3. 1. ß.
bismal. cum radic. senecionis & mal. ana M. ß. feminis
mal. fœnugræci lini ana 3. 3. florum chamom. p. ß. adde
schænan. 3. 2. cortic. radic. tamarisci 3. ß. fiat decoctio in
quart. vt aquæ addendo circa finem, vini & aceti parum,
fiat forus.

*Ad dolorem
nephritic.* Ad dolorem nephriticum emolliens, laxans, & calcu-
lum frangens tale erit.

℞. radic. bismal. 3. 2. ß. fol. pariet mal. bismal. petro.
maced. ana M. 1. feminis milij solis 3. ß. feminis lini &
fœnugr. an. 3. 1. florum chamo. & melil. & summitatum
anethi an. p. 1. fiat decoctio in tribus partibus aquæ vel
vna vini albi, ex qua foueatur regio renum, & vterum
dolentium. Aliud fortius.

℞. radic. saxifrag. & radic. rapha. ana 3. 1. rad. liliorum
alborum

alborum & bismal. ana ʒ. i. fol. senecionis, parietar. violariæ & sylibrij aquatici ana M. j. mal. branchę vrsiæ, & bismal. ana M. i. ʒ. seminis saxifrag. & milij folis ana ʒ. ʒ. His enim ad frangendos calculos vis non mediocris inest.

Fomenta astringentia, & roborantia partes internas proventriculo roborando, & coctione iuuanda, vt

R. fol. bismal. & mentæ, & absynth. siccorum ana M. *Pro Ventriculo.*
1. ʒ. cortic. citri sicci ʒ. ʒ. spicæ nardi & schænanthi an. ʒ.
2. ros. rub. p. 2. decoquentur omnia in vino styptico, ex quibus ventriculi regio foueatur Fortius pro ventriculo & intestinis erit hoc.

R. florum menthæ, & absynthij, summitatum labruscæ, & foliorum sumachi. ana M. ʒ. seminis plantag. & portulacæ ana ʒ. 2. balaustiorum & ros. ana p. 2. cortic. mali granati ʒ. i. ʒ. fiat decoctio in vino styptico quo foueatur regio ventris inferioris.

Pro splene indurato, & tumido fiat hoc modo.

R. florum chamom. stechad. melil. ana M. i. florum *Pro splene indurato.*
genistę, anethi, scolopend. an. M. i. ʒ. fiat decoctio in vino albo & aqua, fiat fots.

Inseſsiones.

E*Ncathisma* Græcis, Inseſsio Latinis, quæ nihil differt à fots in materia, sed in forma cum balneo conuenit, vt sit quasi balneum ventris partium infernarum. Fiunt autem ex decoctione radi. herbarum, florum, seminum, quorum residentia sacco imponitur, cui resideat æger. Hac vtimur forma, præsertim in affectibus vesicæ, coli, vteri, ani, renum, ventris, ob ægri imbecillitatem, non balneo, quia maior fieret virium resolutio à toto corpore, quàm si partes quædam foueantur. At quia colicus est morbus, aut nephriticus, aut podagra, aut gonagra, hæ partes non sunt laxandæ, ne fluxionem suscipiant, sed potius firmandæ oleo astringente, aut alio medicamento: vt si propter inseſsum sanguis fundatur, fiunt inseſsiones ex decoctis superius factis pro clysteribus vel fotsibus. De his itaque non multa.

Cautio.

Emollientia aluum.

6 menses enocata.

Emollientia fiunt encataſmata aliquando ad emolliendam aluum, aliquando ad menses enocandos, non

nunquam suppressendos, si immodicè fluxerint. Emollientibus utimur, cum alvus nimium astricta est, aut etiam cum hæmorrhoides prætumidæ dolorem in ano excitant, aut etiam cum ob meatuum angustiam aut astrictionem, lotium liberè reddi nequit. Fit autem emolliens ex solo mal. decocto, vel althææ, cuius vaporem perforatis subselliis æger percipit, qui vim emolledit habet, & aliqua ex parte dolorem leniendi, si quis sit vel in tumidis hæmorrhoidibus, vel in recti intestini inflammationibus ad anum peruenientibus.

Menses prouocantia alia, in quorum decoctione ad medium ventrem contineatur mulier, aut, si id fortè non sit, vaporem diligentissimè recipiat per infundibulum, deductis undiq; pāni multis insoluta, ne in ærem ambientem vapor exhalet. Talia autem ex omnibus medicamentis menses prouocantibus in aqua & vino decoctis fiunt, qualia in balneis sequentibus describentur. Astringentia & roborantia, quibus utimur in fluoribus alui immodicis, & mensium purgationibus immoderatis, ut

℞. radic. bistortæ & consolidæ maior. ana ℥. 2. nucum cupress. pini, cort. mali granati ℥. 2. ros. rub. balaustiorum & granorum myrthi an. ℥. 1. ℞ decoquantur omnia in vino rub. styptico.

Ad fluore alui astringentia. ℞. fol. plantag. hippur. burs. pastor. & cærinod. an. M. 2. summit. rubi, lentiscai & foliorum sumach. ana M. 1. ℞. aluminis rochæ ℥. 2. ros. rub. balaustiorum an. ℥. 1. ℞. decoquantur omnia simul in vino rubro, aut aqua chalybeata, deinde huic decocto infideat æger.

BALNEA.

Balneum remedium est totius corporis, vel ad detersionem, vel ad dolores, vel ad lassitudines, vel ad vitia cutis, vel intemperiem totius corporis. Fiunt autem balnea quandoque ex sola aqua, & illud balneum aquæ dulcis appellatur ad differentiam eorum, quæ ex aqua marina vel salsa, vel nitrosa, vel aluminosa, vel ferrata vel bituminosa fiunt natura, vel arte. Balneum aquæ dulcis ex aqua tenuis substantiæ, quæ citò penetrat, paratur, ut ex aqua pluuiali, vel fluuiali non infecta alumine, aut creta. Quædam enim flumina cretam habent: quam ob causam lenta est & pinguis ea aqua, potiusque obstruit,

De aquis.

obstruit, quàm penetrat, aut laxat: talis est aqua ex Arari Lugduni. Aqua bonorum fontium tertium locum occupat, postremum puteana, vel palustris Balnea refrigerantia parantur ex herbarum decoctione vel florum, ut in hecticis febribus & calidiore natura, sed talia nihil obstructionis habere dicuntur: quia si constipant cutim, febre diariam accendere solent, ut Albulæ aqua facit, cuius meminit Gal. in meth. Intemperiem castigaturus, primum natet in balneo tepido, ut detergatur, & aperiantur pori, & mox aliud balneum ingreditur, in cuius aqua sint decocti flores violarum, bugl. ana p. iij. nenuph. p. ij. Magis probantur flores, quia tenuium sunt partium, nec ineptè fecerit, qui succos herbarum extraxerit, & balnea aquæ miscuerit, ut,

R. succi solatri cucurbitæ, melonum ana lb. iij. misce. *Pro hect.*
Si autem æger laboret hectica, post balneum vng. ol. *balnea.*
ros. & cutis, confirmetur, ne discutiatur habitus corporis. Conducibile itaque illis fuerit tertium balneum aquæ frigida ingredi, vel in eodem balneo rosas addere, folia salicis, folia myrthi, vel aquam ros. vel peculi ros. vel myrthi. Nunc autem ægri deterius habent propter medicorum vel assistentium imperitiam, qui satius esse purant ægros in aqua feruente lauasse.

Ad dolores ventris, colli, uteri, renum: ex decoctione *Addolores*
fomentorum vel encathisimatum fiunt balnea. In his *Ventris.*
autem maior medicamentorum quantitas inesse debet, & tepida, ut sint, necesse est, & aperta, ne æger in his sudet, sed diutius in eis natet. Ad cutis affectus detergentia & siccantia præscribuntur, nisi cum crustæ aut scammæ duræ sunt. Tunc enim balneum paratur ex malacticis, & leuiter detergentibus: deinde ex detergentibus & exiccantibus, tertio ex siccantibus & leuiter astringentibus, quod ab huius ætatis medicis non obseruatur, sed simul omnia permiscunt sine utilitate ægros diuexantes. Tale igitur fiet in affectibus cutis crustosis, *Ad affe-*
scamosis, siccis & squallidis, ut, *ctus cutis*

R. mal. cum radic. branchæ vrsinæ, viol. ana M. iij. *balnea.*
mercur. pariet. betæ ana M. ij. seminis lini ʒ. j. florum chamom. p. ij. fiat decoctio pro balneo, in quo bis natet, deinde utatur sequenti.

R. radic. brioniz, lapati acuti, cucumer. agreſt. ari. ſerpentar. ana lb. i. rad. aſphod. vel gentianæ, vel ſquillæ lb. ſſ. ſaponar. parietar. abſynthij, ſcabioſ. ſuma. borrag. ana M. i. lupinorum, fabarum integrarum ana lb. ſſ. flor. centaur. minor. p. 3. roſ. p. 2. fiat decoctio pro balneo: de qua decoctione adde plus vel minus, pro morbi natura, vel corporis habitu & viribus, & diutius vratur. Cùm iam materiam magna ex parte ſudoribus & inſenſibili tranſpiratione vacuatam viderimus, commodè applicabuntur vnguenta illa detergentia & exiccantia, donec omnia ſint deterſa vel exiccata: quibus peractis ad deterſionem cutis & corroborationem præſcribemus hoc.

R. folio. myrth. vel lentifci, vel plantaginis, tapſi barbati, pilofellæ, hippuris, & polygoni ana M. ij. hord. integri, fabarum integrarum ana lb. j. myrtill. p. 3. fol. roſ. p. 4. rad. irid. biſtortæ, & pentaph. an. 3. ij. fiat decoctio, in qua diſſ. ſalis communis lb. 3. aluminis q. x. miſce, fiat balneum tepidum, & ſpongiis nouis detergatur diligenter. Ex lixiuio etiam fieri poſſunt, modò non ſit nimis acre.

*Pro hecti-
cis.*

In febris hecticis conueniunt balnea ex aqua tepida humectantia, quæ vt magis humectent, addimus lb. i. olei violati, aut butyrum recens in prædicta aqua diſſoluimus, quod humiditatem aëream in partibus externis infundit. Aliquando radices & plantas, vt,

R. radic. biſmal. lb. 2. vel mal. branchæ vſinæ, bugloſſ. cum radic. ana M. iij. flor. viol. bugloſſ. borrag. anap. 4. roſ. rub. p. 2. Humectantibus balneis admiſceantur decocta pedum veruecis. & inteſtinorum, quamuis illa ad remolliendum potiùs uſurpantur. Relaxantium balneorum uſus eſt maximus in doloribus magnis ſedandis, iſque medicamentis parantur, quibus fomenta relaxantia, & quemadmodum in illis aliquando permilcentur, quæ calculum frangunt, ſic etiam in balneis frequenter uſurpantur, quæ ſedant dolorem nephriticum, aut in totum ſupprimunt, cuiuſmodi eſt ſequens.

Pro nephritico.

R. radic. liliorum alborum & biſmal. ana M. 4. foliorum parietariæ, ſaxifragiæ petroſ. fœniculi marini, fœnugr. ana M. 2. ſeminis lini vel fœnugr. lb. ſſ. milij ſolis

℞. 2. foliorum sylibrij, violar. borraginis, bugloss. ana p. 4. quibus addere potes radic. raphan. ℞. 1. foliorum senecionis M. 2. florum chamom. sambuci ana p. 2. ℞. decoquantur omnia in sufficienti aquæ quantitate, deinde permisceantur vini albi ℞. 4. olei liliorum & butyr. ana ℞. 3. paretur balneum, in quo sedat æger, tantisper dum vehementibus doloribus torquetur. Huic autem balneo vis inest sedandi doloris, calculos comminendi, & obstructos meatus reserandi, quo vti post alias vacationes est saluberrimum, & eo ipso tempore, quo æger in balneo residet, portiones calculum frangentes exhiberi possunt. Pro maioribus autem cutis affectibus parabitur sic.

℞. radi. lapati acuti ℞. 2. radic. enulæ campan. ℞. ℞. *Pro affe-*
fumar. lupinorum, borrag. bugloss. parietar. betæ, sapo- *tibus cu-*
nar. ana M. 4. quatuor seminum frigidior. maiorum ana *tis maio-*
3. foliorum acetos. lapati acuti, lentiginis aquaticæ ana *ribus bal-*
M. 2. misce simul, & pro balneo decoquatur, in quo po- *nea.*
tes addere farinæ fabarum ℞. 2. sedeat in hoc balneo æger, vel,

℞. radic. brioniz & cucumeris ana ℞. ℞. rad. asphod.
℞. 3. lapati acuti, & enulæ campanæ ana ℞. ℞. foliorum
mercur. betæ cum radic. saponar. pariet. lupinorum, fu-
mar. ana M. 3. seminis raphani ℞. j. quatuor seminum fri-
gidiorum maiorum ana ℞. 1. ℞. lumbricorum per media
dissectorum numer. 4. foliorum senæ mundatorum ℞. 3
elenij ℞. j. trium florum cordial. p. 3. reponantur omnia
pro balneo, in quo dissolue farinæ lupinorum & ciceris
rub. ana ℞. ℞. fiat balneum, vt dictum est.

Quod si in cute prædura, prætumida apparuerint ex- *Pro exan-*
anthemata præcedentibus permiscendæ sunt radic. e- *themat.*
mollientes cum seminibus & aliis eiusdem naturæ, quæ
frequenter in elephanticis vsurpare consueuimus, vt,

℞. radic. brion. & cucumer. agrestis ana ℞. 3. radic. al-
thæ, liliorum alborum, lapati acuti ana ℞. 3. radic. ser-
pentariæ, hastulæ regiæ ana ℞. 2. florum mal. bismal.
& branchæ vrsinæ ana M. 4. lupinorum, fumar. lapati
acuti, saponar. acetos. & vtriusque cichor. ana fascicu-
lum vnum, seminis lini & fœnug. ana ℞. j. seminis ra-
phani ana ℞. j. quatuor seminum frigid. maiorum ana

℥.ij. florum chamom. & melilo ana p. ij. florum borrag. bugloss. nympheæ, hord. integri & cicerum rub. ana pa. ij. misce simul, & decoquantur in sufficienti aquæ quantitate pro balneo: quo præsidio utimur ad discutiendam scabiem crustosam & contumacem & emollienda tubercula elephantorum, quibus tota cutis scætet. Post hoc balneum, utendum erit tertio balneo superius descripto in cutis affectibus.

Balnea pro mulieribus primum ad mouendos menses, ut,

*Ad mouē-
dos mēses
balnea.*

℞. rad. iris fl. b. galangæ crass. & rad. rubiæ maioris ana ℥. ij. rad. altheæ & ciclamini ana ℥. ij. foliorum arthem. nepetæ, matricar. organ. mercur. ana M. iij. puleg. psillij, sampsi & foliorum lauri ana M. ij. seminis petroselinos, ameos & cinamomi ana ℥. j. b. seminis lini & fœnugr. ana ℥. ij. florum sampsi, anthos, stachados arab. cicerum rub. & summitatum sabinæ ana p. iij. decoquantur omnia in duabus partibus aquæ & vna vini albi, deinde sedeat in balneo frequenter ad mouendo, ventri inferiori plantas in prædicto balneo decoctas.

Ad iuuandum conceptum.

Sæpenumero consimilia parantur balnea, quibus tamen nonnulla miscentur astringentia facultate uterum corroborantia, atque inducentia asperitatem, quod conceptum facilius & tenacius retineat uterus, ut in humida intemperie uteri, post statam mensium purgationem, utile erit sequens balneum.

℞. rad. valerianæ fl. j. b. rad. cyprip. galangæ crass. & enulæ campanæ ana ℥. ij. foliorum lentisci, arthem. calam. origani, lauedulæ, sampsi, & foliorum lauri ana M. iij. summitat. lentisc. myrthi & cupressi ana M. ij. seminis ameos, lentisci, & fœniculi ana ℥. j. b. cortic. malorum granatorum ana ℥. ij. aluminis ℥. ij. ros. rub. stachad. arab. florum sampsi ana p. ij. concoquantur omnia in sufficienti aquæ quantitate, addendo cum ea vini rubri stiptici modicum, utatur balneo.

*Ad colicū
dolorem.
nephriti-
cumque.*

Balnea anodyna in nephritico dolore & colico, alisque ventrem inferiorem obsidentibus parantur, pro nephritico dolore antea dicto. Si verò dolor colicus fiat

à pituita

à pituita vitrea in intestinis impacta, aut flatibus crassis exitu carentibus fuerit exiccatus, non negligenda relaxantia, sed illis misceri debent, quæ vehementi caliditate pituitam frigidam colliquant, & flatus discutunt, eaque decoquenda partim in aqua, partim in vino, ut ad colicum dolorem.

R. radic. altheæ lb. ij. quatuor remollientium ana fasciculum vnum, origani, calamenti, puleg. rutæ ana M. 3. anis. fenic. petros. ana lb. ss. florum anth. samplici, stachados arabic. & meliloti ana p. 3. cortic. citri sicci per frusta dissecti 3. 2. lauendulæ, & fol. lauri ana M. 3. decoquantur omnia in duabus partibus aquæ, & vna vini. Quod si vini maluatici copia suppetit, illius modicum permisceri poterit.

Balneum abstergens, & purgans, rarefaciens, digerens refrigerantibus temperatur pro leprosis. ut,

R. brioniæ, cucum. asiæ, serpentar. enulæ camp. an. lb. ss. lapati acuti, acetos. borrag. buglos. saponar. cum propriis radic. fumar. lupinor. endiu. cichor. plantag. an. fasciculos 3. lupinor. cortic. fab. hordei integri ana p. 2. ros. rub. florum nenuphar. trium florum cordial. & tamar. an. fasciculos 4. flor. chamom. & melil. an. fascicul. 2. fiat decoctio in aqua fontana. & pluuia pro balneo, quod ingreditur manè ventriculo vacuo. Bis aut ter in secunda vice sumat tabellam vnâ diamargariti frigidi, superbibendo 3. 2. aquæ borrag. Item à prandio ingreditur longè à cibo, continuis tribus diebus peragat id ipsum. Tandiu verò moretur in balneo, ut vires non dissoluantur, nec multum diffuant, sudores illis probè extersis, deinde, ut dictum est, ingreditur.

Lotiones.

PArtium quarundam sunt ablutiones, quæ balnei vicem gerunt, videnturq; balnea particularia. Abluuntur caput, axillæ, manus, pedes Caput ad sordes auferendas lixiuio, vel cineribus sarmentorum. In capitis vlceribus lixiuiis desiccantibus vtimur, ut abrotani, betonice. In pediculari morbo amaris, ut lupinis, nitro, cap. & fellibus, & ad vermes occidendos, & furfures detergendo. & pilos tingendo. In furfuribus, detergentibus, mes occidendo.

Ad tingē- dos capill. vt melle, succis herbarum amararum, aut herbis ipsis decoctis, vt cicla parietaria, saponaria. Capillis tingendis palea auenæ vtimur, cortice, & ligno berberis, floribus genistæ, & hyperici. Lixiuum commune fit ex ciner. samentorum, quod fortius fit, si stillatiuum sit, id est, si per cineres frequenter coletur, vt faciunt, qui saporem parant: sed adhuc fortius erit ex cineribus caulium, ficus, roboris, vel quercus.

Ad alopeciam. Ad alopeciam fit ex alcionio potētissimum lixiuum, quod siccat & digerit potenter, & morbum curat. Ad detersionem & digestionem commodissimè parantur, ex caulibus fabarum in vlceribus, quo etiam vtendum est ad occidēdos pediculos, addito semine staphisag. absynt. aut alia herba amara, vt persicaria.

Ad axill. las lotio. Axillæ abluuntur lixiuo parato ex astringentibus, vt oleastro, lentisco, additis quibusdam odoratis constringentibus, vt ros.

Ad manus lotio. Manus abluuntur & pedes, quorum abluendorum rationem iam subiiciemus cum ad mundiciem, tum ad sanitatem pedes lauantur. Iam verò absque vllō delectu vrsupant omnes decoctiones herbarum calidarum & frigidarum simul permixturum. Cæterum si tantum detergendum, fit lixiuiū quod deterget, firmat & siccat pedes.

Ad claritatem visus lotio. Ad visus claritatem adduntur siccantia in lixiuo, vt folia lauri, sampuci, & quedam myrthi. Interdum frigida quedā, vt nymphaea, lactuca, & alia temperata, vt quæ etiam somnum conciliare possunt, vt herba papaueris.

Ad constringendum multum salis aut aluminis additur. Siccat hoc lauacrum pedes, & per consensum cerebrum & oculos.

Ad mundandos pedes, & tremorem arcendum.

Lauantur aqua & vrina manè: tum etiam ad curandum seu arcendum tremorem manuum, quod experientia probatur, etiam si tremor à plumbo & argento viuo proueniat.

Ablutiones oris & dentium fiunt ob diuersas causas, de quibus inter remedia interna satis superque diximus. In febribus ardentibus dum ægri non possunt dormire, pedes abluimus aqua in qua frigida & humida sunt decocta: vt,

℞. fol. mal. recentis, fol. lactuæ, cucumer. cucurb. viol. M. i. folior. nenuphar. & viol. ana p. i. fiat decoctio, qua abluantur pedes, cum ibit dormitum, nec detergantur, aut panno humido inuoluantur.

*Ad somni-
ciendum
in feb. lo-
tio.*

Ad eundem morbum profuerit, pudibunda & aures abluisse, quia hæ partes nervosæ refrigeratæ, & humectatæ cerebro communicant. Nam vt calx cum humectatur, fumat, sic membra hæc ardore febrium siccata, & calfacta effumant benignum & mitem vaporem, quo conciliatur somnus.

Embroche.

Irrigantur partes cum oleum vel decoctum aliquod ex alto fuditur instar pluviæ, Græci, *embrochin apo ton brechem*, quod irrigare significat. Non differunt irrigationes à fomento humido, nisi quod decoctum ipsum irrigatur supra partem ex alto. In fomentatione verò spongia vel pannis densis in decoctione madefactis vtimur. Huius formæ remediorum causam adfert Galen. lib. 13. meth. ca. 22 quo loco docet, quomodo faciendâ sit irrigatio, & supra quas partes tantum, & cui penetret propter ictum, cuius tamen ratio levis admodum est.

Nam ex ictu resilit quemadmodum pluvia supra saxum cadens. Neque enim potest propter meatus angustiam recta ingredi, sed necesse est vt per insersionem pars tenuior aerem sequatur, vt ipsemet libr. simplic. docet. Causam autem huius rei puto esse, quod cum ex alto irrigatur, guttæ quædâ descendunt, quæ diutius capiti immorantes, facilius intro penetrrent. Præterea pars euentatur, nec ita incalescit, vt in fotu. Ille etiam irrigationes magis in affectibus calidis sunt ex usu, quam in frigidis.

Sunt qui ad fracturas, & ad articulorum dolores faciant irrigationes, quod improbo si dolor adsit. Nam nõ vt in capite alia pars ictum recipit, imò in inflammatione, aliisque affectibus idem euenit.

Dolet etiam cutis sola distentione & intemperatura, nec leuissimum contactum ferre potest.

In nephritide sunt ex oleo ros. viol. & nenuphar. vel cum decoctione repellente in principio, deinde repellente, & digerente: vt,

℞. lactuæ, viol. plantag. solatri, semperuiui, vel por-

tulæ ana M. j. florum violarum, nenuphar. ros. ana p. j. foliorum myrthi M. ss. fiat decoctio quæ per clepsydrum paruum in caput instilletur. Huic decoctioni additur florum chamo. melil. anthos ana p. i. in incremento, in declinatione verò betonica, spondilum, origanum, & calamentum.

*Ad conciliandum
somnum.*

Ad conciliandum somnum primæ decoctioni addimus semina lactu. papau. albi, vel al. quid cortic. mandrag. in summa necessitate. Ad morbos frigid. fiunt irrigationes ex lixiuiis & muria, & mineralib. resiccantibus, vt alumine, chalcitide, vel herb. Sed quia omnes herbæ multo calore sunt præditæ, magis calfaciunt quàm siccant, plûsque fundendo humores mouent, quàm absorbunt. Itaque ducò conducibilis si lixiuia fiant ex cineribus prius lotis, vel extinctis irrigatione aquæ aut vini, aut aceti cum adhuc calent, & lixiuium ex alto inspergere supra commissuram coronalem. Cum ob fluxû sanguin. vel ob os fractum non est tutum soluere ligaturam partis vulneratæ, dolentis partem irrigamus ex alto. (Nâ ictus frangitur à fascia) ol. ros. cum volumus inflammationem prohibere, violaceo, cum dolorem sedare.

*Ad lithar-
gum.*

R. fol. hyssop. origani, calamen. puleg. an. M. ss. semin. anis. foenugræ & coriand. cum aceto præparati ana 3. 2. florum stecad. arab. & rosmari. ana p. i. fiat decoctio ad lb. i. in qua irrigetur caput. Vel sic,

R. radic. acori, cyperi, & irid. ana 3. 2 fol. betonicæ, sampsuci, saluæ, origani, calamenti ana M. ss. cortic. citri sicci 3. 3. seminis anis. 3. i. ss. coriand. præparati, granatum tinctorum ana 3. 2. ss. florum vtriusque stecad. ana p. i. fiat decoctio in sufficienti quantitate aquæ, deinde irrigetur caput, addendo si sit contumax morbus & à materia frigida, aquæ vitæ 3. ss.

Suffitum.

Suffitus fiunt vel ad voluptatem, vel ad sanitatem. Ad voluptatem ex bene odoratis, vt beniouino, styrace, ladano, ambra & mosco. Ad sanitatem quædam ex odoratis, quædam ex foetidis, alia ex odoratis & foetidis simul permixtis. Odorata fiunt forma spherica maiore, quæ poma odorifera dicuntur. Quædam minore spherarum precariarum instar, quas mulieres carpo circumuoluunt,

uoluunt, vel collo suspendunt. Fiunt ex ambra, mosco, ciueta, & carbone salicis ad molem augendam aut nigredinem iniiciendam.

Fiunt etiam veluti balani, vel zuiculæ, quæ vulgò cypræ vocantur, aut forma trochiscorum, vt trochisci de alipta moscata, qui in morbis curandis successerunt cyphis veterum.

Excipiuntur hæc mucilagine gummi tragac. vel arabici in aqua ros. macerata.

Ad morbos curandos fiunt fumigia duplici forma, pulueris, scilicet aut trochiscorum. Pulueres minùs conueniunt, quia citiùs absumuntur, neque adeò commodè admisceantur ea, è quibus parantur, vt fumigium illud, quod in officinis paratum inuenitur.

Ad catarrhos sistendos, & siccandos sic paramus.

R. coriand. ros. gummi hederæ torrefactæ an. 3. i. nigellæ torrefactæ in aceto 3. i. s. mastich. thur. corri. thur. ana 3. 3. gummi iuniperi 3. 2. fiat pul. non admodum tenuis, quo supra carbones imposito suffumigentur capitis operimenta. Potest etiam excipi mucilagine gummi tragac. & fiant formulæ lupinares.

Ad catarrhos sistendos.

Fiunt alia ad vlcera pulmonum exiccanda, quæ ex defluxione fiunt, ex resiccantibus, astringentibus, & refrigerantibus, & his, quæ fuliginem faciunt. Nam fuligo vlcera consolidat. Talia sunt pix, resina, terebinth. mastix, gummi iuniperi, thus, & cortex eiusdem, sandala, auri-pigm. blatta bizantia, rosæ & capita papaueris, vt

Ad vlcera pulmonum.

R. gummi hederæ torrefacti, coriandri, ros. rub. sandall. mastich. myrrhæ, thur. & cortic. eiusdem ana 3. 3. beniouini, styracis, ladani puri, & hypocist. an. 3. 2. auri-pigm. rub. 3. 1. excipiant terebinthina, & fiant formulæ lupinares, quibus fumigentur operimenta capitis. Efficax est ad vlcera aurium, narium, pulmonum & vreri.

Quod si peruenierit vlcus post sputum sanguinis, & sic cum inflammatione admisceantur frigidis ea, quæ minùs calfaciunt, excipiunturque mucilagine, vel cera alba, vt plus fumi reddant, aut cum carbone, vt

Ad vlcus pulmonum cum inflammatione.

R. coriand. preparati & ros. rub. ana 3. 1. ladani puri & hypocist. ana 3. 3. sandal. rub. & albi, blattæ bizantiæ, capit. papauer. & cortic. mandrag. an. 3. 2. styracis, benio.

uini ana 3. j. auripigmenti rub. ana 3. β cum mucilagine gummi tragac. & arab. infusorum in aqua ros. q. s. Addito salicis carbone, fiant formulæ, vtatur vt prius.

Ad tussim inueteratam.

Ad tussim inueteratam valet fumigium, quod paratur ex bechicis, vngula caballina, & aliis exiccatis: vt, R. radic. & foliorum vngulæ caballinæ 3. 1. foliorum marrubij 3. β styrac. myrrhæ, bdellij ana 3. 3. capit. papaueris, & seminis hyoscyami ana 3. 1. excipiantur terebinthina pice, & butyro simul liquatis. fiant formulæ, quibus fumigentur opercula capitis. Excipiat etiam fumus per nares & os.

Ad suffocationem vteri.

Suffitus ad vteri suffocationem fiunt ex foetidis, vt galbano, assa foetida, blatta, castoreo, aut fragmentis plumarum, vel etiam ex simplicibus separatim, vt si castoreum tantum, vel assa foetida cal facta naribus apponantur.

Ad menses mouendos.

Ad muliebria ducenda fiunt ex odoratis & aperientibus, quæ inutilia mihi videntur, nisi cum ex congelatione humorum, vel nimia partium refrigeratione partes constrictæ sint: vt,

R. myrrhæ, styrac. bdellij ana 3. β. irid. asari, cumini ana 3. 3. opopan. 3. 2. foliorum puleg. vtriusque siccorum ana 3. 1. excipiantur terebinthina & butyro, fiat fumigium quo fumigentur per emborum tempore quo erupturi sunt menses. Calfacit, relaxat, neque nimium resiccet, quod fugiendum est. Nam quæ siccant, materiam absumunt, & partes siccando retinent.

Ad castigationem vteri.

Ad vteri castigationem & exiccationem paratur talis, quo post mensium purgationem vtetur: vt,

R. aliptæ mosc. vel gallæ mosc. 3. β. beniouini, calami arom. ana 3. 2. cum mucilag. gummi tragac. fiant formulæ, recipiant fumum per infundibulum: vel sic,

Ad conceptum.

Ad calfactionem resiccationemque, & ad conceptus præparationem.

R. ladani, mastichis, gallæ moscatæ, caryophil. maccis, calamenti, galangæ ana 3. 3. cyperi, ros. ana 3. 1. β. hy pocist. & castorei ana 3. 2. cum mucilag. gummi tragac. fiant formulæ, quibus vtatur, vt prioribus, post mensium purgationem ante concubitum.

Ad procidentiam vteri ex foetidis & astingentibus, vt repositus suo loco maneat: vt,

R. bitu-

℞. bituminis & lapidis gagatis an. ʒ. 2. vineæ ʒ. 2. ca-
stor. cyperi, radic. bistortæ, copularum, glandium & ba-
laustiorum ana ʒ. 3. excipiantur cera, fiant formulæ, qui-
bus suffumigantur per embotum. Fiunt suffumigia par-
ticularia ad dolorem iuncturarum, quibus suffitur
lana, aut bombax, deinde parti apponitur ex digerenti-
bus & resiccantibus, vt

℞. foliorum absynth. anthos, stechados, chamomillæ
ana ʒ. 2. myrrhæ, styrac. beniouini ana ʒ. 3. excipian-
tur terebinthina, fiant formulæ, ex pyrithe lapide suffu-
migetur durities neruorum, vel aliis misceantur hoc
modo.

℞. marchasitæ ʒ. 2. propoleos ʒ. 3. bdellij, myrrhæ, sty-
rac. iridis ana ʒ. ʒ. cum terebinthina fiant formulæ.

Ad prouocandum sudorem in morbo Italico, & eum
curandum fiunt suffitus, quibus interdum totum corpus
suffumigamus, aliquando partem aliquam tantum, in
qua post totius corporis curationem morbi remanent
quædam reliquæ, vt cum vlcus in mentula, pede, vel
aure, vel alia parte externa remansit.

Fiunt autem potissimum ex cinabrio, in quo argenti
vivi plurimum inest. Adduntur quædam odorata, quæ
etsi non iuuant, castigant tamen fœtorem medicamen-
ti. Alia iuuant vt styrax, beniouin, vt

℞. cinabaris ʒ. 2. styrac. beniouini ana ʒ. 1. myrrhæ,
corticis pini ana ʒ. ʒ. cum terebinthina formentur for-
mulæ, fumigantur loco calido, & in principio habeant
caput extra eminens, ne ledatur vox, aut suffocetur, quod
multis ob incuriam accidit.

Si crus, aut brachium, aut alia pars laboret in morbo
Italico, post vniuersalem curationem fumige-
tur pars illa recipiendo fumum per
infundibulum.

*Finis libri posterioris, De formul. remediorum
externorum.*



PHARMACOPOLA-
RVM OFFICINA, EO-
DEM RONDELETIO
. authore.



V M ægrotantium caussa, Lutetiæ, Antuer-
piæ, Lugduni, Romæ, Monspessuli, Tholo-
sæ, aliisque multis locis versarer, multa su-
perflua & inutilia, multa autem necessaria
& vilia, ad bene ægros curandos desiderari cognoui, &
vnumquemque Pharmacopolam pro arbitrio medica-
menta parare, nullamque certam medicamentorum cõ-
ponendorum, medicorum sequi regulam: quosdam
imperitos rei medicæ, aut barbaros Arabes imitantes.
Has ob causas toti Reipub. utile fore putavi, si officina-
nam methodicam parare breuissimè iudicaret, in qua
neque vascula aurea, neque pyxides pictæ viderentur,
sed ex qua remedia, ex non adulteratis, sed optimis
quibusdam rebus composita, paruo ære comparare
quisque posset, plus in recessu habitura, quàm in fronte
promittat, quod longè aliter hoc tempore in officinis
solet fieri. Nam qui officinam Pharmacopolæ parant,
in hoc tantum incumbunt, vt vascula aurea, & picta si-
bi habeant, quæ plus ad ostentationem faciunt, quàm ad
necessitatem, vt vulgus illas officinas admiretur. Quod
si illam superfluam & inutilem impensam in compo-
nendis optimis medicamentis insumerent, & sibi, & æ-
grotis longè melius consultum esset. Sed ea est ferè o-
mnium communis insania, vt malint videri quàm esse.
Huius insanix fautores sunt magistratus, qui in hos
impostores deberent animaduertere. Item artium Pro-
fessores, quibus à principibus demandata est provincia,
vt eorû officinas inuisant & inspiciant, si bene instructæ
sint rebus omnibus. & si, quæ parantur auxilia ad mor-
bos propulsandos, talia sunt, qualia esse debent. Qui au-
tem

tem hanc commissam prouinciam, vel ob quæstum, vel ob amorem contemnunt, grauiter peccant in Remp. digni sanè, qui summam cum ignominia à bonorum consuetudine appellantur, qui vt suo officio fungantur, tantum abest, vt pharmacopolæ refragentur, vt sepè ad id sollicitent ac inuitent. Nam, vt qui malè agunt, lucè fugiant: sic, qui bene hanc lucem amplectuntur, sibi & ornameto, & vtilitati futuram intelligunt. Confidentius enim illis ægroti sese committent, & liberalius medicamenta persoluent, cum nos diligentia eorum & fidelitatis testes habebunt. Hoc potissimum Pharmacopolæ curandum, diligenterque obseruandum est.

Instructurus officinam, ante omnia curet, vt simplicia optima, & selectissima sibi vndiquaque comparet: comparata singula diligenter à putredine conseruet: Ita ordine disponat, vt omnia ad manum sint, & ex his cõposita medicamenta certis temporibus paret, & parata seruet. Sed quæ illa sint, & quomodo conseruanda, aut in ordinem digerenda, paucis docebimus.

A quibus petantur medicamenta.

Medicamenta petuntur ab aëre, aqua, terra, lapidibus, plantis, animalibus. Quæ ab aëre, vt manna, quod mel aëreum dicitur à Galeno, quòd in aëre & corporibus colligatur.

Ab aqua petuntur medicamenta: dulci, vt pluuiali, fontana, fluuiali, ex qua herbæ nascuntur, vt Lentigo aquatica, Acorus vulgaris, Nymphaea, Stratiotes aquatica, Hippuris fœmina, Lauer, Syimbrium.

Ab animalibus aquatilibus, vt crocodilus, Piscis, Testudo palustris, Ranæ, Cancris fluuiatiles, Ostæchi fluuiatiles, Anguillæ & multi alij pisces. Ex aqua salsa, vt Alcyonium, Sal, Flos salis, Spongiæ, Corallus vterque.

Ab aqua mixta ex dulci & salsa, vt Adarce, reperiturq; in illis locis, vbi dulcis aqua miscetur cum mari, vt in ostiis Nili, Anguillæ, Asphaltum & in mari mortuo etiam reperitur, & in quàm plurimis aliis locis, vt in eo fonte, qui vulgò fons (*de la Pège*) dicitur (*à Beauregard.*) Ab excrementis à terra, Herbæ, Arbores, Animalia, Metallica, Lapides, terræ variæ species. Ex herbis, vt Radices, Caulis, Folia, flores, fructus, semina.

Ex animalibus integris parantur medicamenta, vt cicadis, vermibus, asellis, cantharidibus, cancris, scyllis, locustis, vulpecula, galerita, trogloditibus, hirundinibus, cuculis, pipionibus, ranis, rubetis, torpedine, talpis, lepore marino, & terrestri, & aliis multis similibus. Ex partibus animalium & primum à capite toto, vt smardis, lacertæ, leporis, muris.

A partibus capitis, vt cerebro leporum, passeris, cranio hominis & dentibus apri, equi anisi, lamix Elephantis, lupi, vnicornis. A partibus animalium, vt corde porci, pulmone vulpis, hepate lupi, vulpis, capræ, hirci, canis rabidi, anseris, echini terrestris, erinacei, ranæ, hienæ, equi syluestris, pulli onagri, asini, rubetæ ventriculo toto vel interna pellicula ventriculi anseris, & gallinæ, intestinis lupi, gallinæ, anseris, leporis: renibus vulpis, castoris, lutræ, gallorum, stinchorum: testiculis gallorum, castoris, lutræ, vulpis: vesica castoris, apri, exiccata cum urina in furno: cornibus & ossibus cerui, tauri, vituli, hominis, leporis, elephantis hirci: cute serpentis, viperæ, vrsi, vituli marini, erinacei terrestris & marini, ouis, leonis, ictiocolæ. Ab humoribus, sanguinè hominis, porci, columbarum, leporum, anatum, anserum, hirci, vespertilionum, tunnorum, testudinum terrestrium, marinarum, & palustrium. A bile, vt piscium, vranoscopi, pastinacæ, buglossi: auium, vt aquilæ, milui, perdicis, gallinæ: quadrupedum, vt tauri, vaccæ, vulpis, hirci, lupi. Insectorum, vt serpentis, lacerti. A lacte animalium, vt mulieris, chameli, caniculæ, vaccæ, capræ, asinæ, ouis. A coagulo hœdi, leporis, vituli marini.

Ab ouis gallinarum, phasianorum, formicarum.

Ab excrementis particularium animalium, vniones, quæ sunt in ostreis, moschus, cineta, cætipus, pili equorū, vrsæ, hominis, talpæ, leporis, canis: vngula asini syluestris, equi, lychenæ equorum: cutis viperarum, serpentis, vrsi, vituli marini, erinacei terrestris, & marini, leonis.

Ex balneis, & athleticis, vrina pueri, apri, mulæ: stercore, gallinarum, hirundinum, columbarum, lupi, canis ossa rodentis, hominum, capræ, vaccæ, muris, lacerti, porci, asini.

Ab adnatis, adipe hominis, porci, gallinæ, anseris ouis,

nis, anatis, vrsæ, taxi, leonis, asini, equi, tauri, capræ, hirci, serpentis, viperarum, vmbre piscis, vituli marini, angullæ: cornibus, cerui, vnicornis, asini indici, capræ.

Ab arboribus, vt radicibus, foliis, caulibus, corticibus, lignis, floribus, fructibus, seminibus, succis, lachrymis, nucamentis.

Radicum aliæ sunt aperientes, calfacientes, mollientes, extenuantes, digerentes, relaxantes, purgantes, astringentes, temperatæ.

Aperientes, vt graminis, asparagi, rusci, fœniculi, apij, olusatii, smyrnij, petroselini, spicæ nardi, asari, rubiæ maioris, quinque folij, cyperi, capparis, fu, filicis.

Extenuantes digerentes, vt ari, serpentariæ, zinziberis, costi, enulæ campanæ, galangæ crassæ & tenuis, calami aromatici, gentianæ, & cucumeris agrestis, sambuci caparum, squille, peoniæ, rapis, mei, prancrasij, xiphi, iridis, piretri, ebuli, allij, porri, raphani.

Purgantes radices, centaurij maioris, rhabbari, brioniæ, lapati acuti, hipolapathi, vtriusque veratri, omnium rithymalorum, alipi, polypodij, turbith, rha-pontici.

Temperatæ & cordiales, vt satirionis, cynosorchis, borraginis, doronici romani, eringij, pastinacæ domesticæ, ben album, & nigrum, quorum loco supponuntur radices borraginis, & buglossi.

Radices malacticæ, vt liliorum omnium, omnium maluæ specierum, acanthi, geranij maioris, rapsi barbati.

Radices constringentes, rapsi barbati, tormentilæ, bistortæ.

Folia & caules, calfacientia cum astrictione, vt absynthij omnes species, menthe balsamitæ, saluie.

Calfacientia sine magna astrictione, vt chamedrios, chamepithios, scordij, marrubij, hyslopi, betonicæ, melissæ, anthos, scabiosæ, pulegij, regalis & ceruini, calamenthe omnes species, Thlaspi, iberis, rutæ, stechados, lauandulæ, nasturtij, erucæ, erisimi, bechij, anagallidis, anethi, porri capitati, lauri, maioranæ, parthenij, artemisissæ, aboroni, sabine, ormini, fœniculi.

Media & minus calfacientia, vt buglossi, borrag. agrimoniz, capillorum ven. Adriani vulgaris, callitrici, omnium maluarum.

Refrigerantia, lactucz domesticæ & agrestis, portulacæ, cucurbitæ, solani, plantaginis, semperuiui, vmbilici veneris, hepaticæ, lenticulæ aquæ, polemoniz, telephij, polygonati.

Minus refrigerantia, cichorij, intybi, fonchi leuis, rostri porcini asperi, endiuiz agrestis.

Laxantia, tithymalorum, thymeleæ, brassicæ, si leuiter coquantur, chameleæ, mercurialis vtriusq; , brassicæ marinæ, scammonij, lapathi acuti, betæ, spicacij, lubricado.

Qua methodo debeat sibi simplicium promptuaria parare pharmacopola.

Herbas in officinis habere debet, quæ vel calfaciunt, vel refrigerant, vel exiccant, & seruari possunt integris viribus. Quæ autem humidæ sunt, in hortis sunt conseruandæ: aut obseruandum, quibus in locis inueniri possint, cum earum vsus erit necessarius. Quare diligenter montes, prata, littora, aliâq; loca considerare debet, & quæ herbæ in sua regione foelicitè proueniunt, & quibus careat, vt aliunde aduehi curet, vel si aliquas non habeat, quæ in locum substitui possunt. Nam qui vnam ex tribus speciebus calamenti habet, vel montanum vel pulegium regale, vel nepetam (vulgò herba cati) potest aliqua istarum carere. Quare quæ similes vires habent, noscat oportet, de quibus suo loco.

Herbæ in hortis conseruari possunt, betonica, calamentum, pulegium vtrunque, origanum, sampsucus, parthenium, stechas, mentha, satureia, hyssop. saluia, thymus, chamepithis, chamedris, spodium, pollium, centaorium minus, absynthium, eupatorium Mesuæ. Herbæ in hortis conseruari debent, vt apium, olusatrum, smyrnium, & similia, violaria, lactuca, intybus domesticæ, nymphaea, semperuiuum vtrumque, telephium, portulacæ, capillares omnes, cichorium, fumaria, buglossa agrestis, plantago, malua, solanum. Semina & fructus reponuntur in vsus multos: ob id illa habere oportet, quæ sunt in frequenti vsu. Hæc in vase fictili conseruari debent, ne propter caliditatem rancescant, & sic ordine

disporc

disponere oportet. Semina frigida maiora sunt primi ordinis, cucurbitæ, melonum, cucumeris, citruli.

Secundus ordo, semina bombacis, maluarum, violarum, bismalæ, semen psilij. Tertius ordo, semina frigida minora, lactucæ, endiuæ, scariolæ, plantaginis, rosarum, cydoniorum. Quartus ordo semen alkekengi, papaveris albi & nigri, hyoscyami albi, mandragoræ, cicutæ. Quæ ponuntur in eadem arcula, possunt substitui eo ordine quo disponuntur. Quintus ordo, quatuor semina calida maiora, anisi, fœniculi, cumini, lauri. Sextus ordo, quatuor semina calida minora, apij, petroselinij, ameos, pastinacæ domesticæ & sylvestris. Septimus ordo, fœseli, Massiliensis, Peloponensis, Æthiopici, anethi, rutæ domesticæ & montanæ, rapisæ vrticæ, lauandulæ, spicæ, staphisagriæ, sinapi, carthami, ricini, porri, cape, bulbi, seminum contra caulium, napi.

Enumeratis his, quæ pharmacopolæ sunt necessaria, sequitur, ut quando eorum sese offert usus, ut promptè habeantur, & quomodo id fieri possit dicamus. Cum herbarum omnium natura similis nusquam sit, aliæque sine substantiarum & qualitatum magis constantium, ita ut extra natale solum viribus integris ad vnum annum, vel plures seruari possint, modò rectè præparentur & recôdantur, ut hæ, quæ calfaciunt, refrigerant & exiccant: Aliæ autem, ut humidæ, vix octo dierum spatio sine putrefactione, & vix, nisi deperdita sua humectandi vi, seruari possint: opus est, ut his optimè consideratis omnem operam diligens pharmacopola conferat, ut ea in officinis suo tempore collecta, & conseruationi sæpe præparata in totum annum afferuet, quæ domi annum custodiam ferre poterunt. Si quæ è sua regione, vel qualia opus est, non possit cogere, ea aliunde sibi aduehi curet: porriusimùmque ex his regionibus, in quibus natiuitas à doctis celebrata est scriptoribus. Quòd si nō possit, vel sibi imponi timeat, alias noscat ac perquirat, quæ aptè in locum poterunt substitui: idque non suo arbitrio faciendum, sed ut præcipienti medico indicare, quod penes se habeat, & de substituendo eâ religiosè interrogare possit. Quæ autem illæ sint, ut scias, ne idem mihi bis veniat repetendum, in sequens caput reicio: in quo de horum

quæ in officinis seruanda sunt, loco commodo, & ordine disposito, ex ordine dicere est animus, succedaneorum tractatum particularem alias daturus. Quæ autem partitionis secundum locum obtinent, vel in hortis seruabuntur, vel quibus in locis ruri nascentur, accuratè notabit, vel si nusquam ob cæli inclementiam, vel concursionis facilitatem seruari possint.

In hortis autem habebuntur apium, ollus atrum, smyrnium, & similia, nec non violaria, lactuca, intybus domestica, portulaca, borrago.

Ruri, umbilicus veneris, nymphaea, vtcunque semperuium, telephium, callares omnes, cichoreum, fumaria, buglossum vulgare: eaque præcipuè, quæ in vsum frequentius veniunt, vt plantago, solanum, malua.

Reliquorum omnium simplicium, quæ ab arboribus vel animalibus eruuntur, quanquam exficari poterunt, & sine putredine conseruari, primorum conditionem subibunt, vt etiam terræ, & mineralium, tum marinarum quælibet genera, hoc est, in officinis commodè seruari poterunt. Reliquorum autem quæ talem moram ferre non poterunt, perquisitio diligens fiet, quando eorum necessarius sese offeret vsus.

Herbas in officinis habere debet, quæ calfaciunt, refrigerant, exsiccat, quia seruari possunt integris viribus. Quæ autem humidæ sunt, in hortis conseruandæ sunt, aut obseruandum quibus in locis inueniri poterunt, cum eorum vsus desiderabitur. Seruantur autem betonica, calamentum, pulegium vtrunque, orig. samb. parth. stechas, menta, satireia, hyssopus, saluia, chamepithis, chamedris, scordium, centaurium minus, ceterach, absynth. eupatorium Mesues.

In hortis haberi debent apium, ollus atrum, smyrnium, &c. Ex his, dum videbuntur exficari, succi extrahentur, & præparati, vt artis est, in reliquum annum seruabuntur: vt succus hypocisthidos, vel syrupi præparabuntur, vt syrupus de succo endiuivæ & similes, etiam violaria, lactuca, intybum domesticum. Vel adnotare oportet quibus in locis nascentur, vt umbilicus veneris, nymphaea, semperuium vtrunque, telephium, portulaca, capillares omnes, cichorium, fumaria, bugl. vulgare,

gare, præcipuè ea quæ in vsum frequentem veniunt, vt plantago, solanum, malua. Pharmacopola diligèter mōtes, prata, littora, aliâque loca considerare debet, & quæ herbæ in sua regione scèliciter proueniant quibûsque careant, vt eas aliûde aduehi curet. Debet habere & nosse aliquas, quæ substitui in eorum locum possint. Nam qui vnicam ex tribus speciebus calamenti habet, vt dixi, vel montanam, vel pulegium regale, vel nepatam, carere potest istarum aliqua. Ob eam causam, omnem diligentiam adhibere debet, vt quæ consimilem facultatem habeant, cognoscat, & quæ efficaciora, & minùs efficacia: de quibus suo loco dicemus.

Semina & fructus plurimis vsibus sunt commoda. Ob id ea in promptu sunt habenda, potissimùm quorum frequens vsus esse solet. Primò semina frigida maiora, hoc est, melonum, cucurbi. cucu. citruli in vase fictili, ne ob caliditatem citiùs rancescant Prope ea collocari debet, semina bombacis, maluarum, violarum, psillij, & cydoniorum. Postea semina frigida minora, lact. end. scario-læ, portul. plantag. & semen rosarum. His sunt adiungenda semina alkekangi, pap. albi & nigri, ac semen hyoscyami albi: quibus adiungi possunt semina mandrag. & cicuræ. Postea reponenda erunt semina calida maiora, vt anisi scenic. carui, semina etiã calida minora quæ sunt, semen apij, petroselini, ameos pastinacæ domesticæ vel sylvestris. Istis adiungenda sunt semina seseli Mafiliensis, Peloponèsis & Æthiopici. Semina rutæ, domesticæ & montanæ siue sylvestris, taphiæ, vrticæ. semen lauandulæ, spicæ, semen viticis, staphisagriæ, sinapi, porri, cepæ, bulbi: semen contra caulium, napi, semen carthami, & ricini, loco minùs calido conseruantur.

Fructus in loco minùs sicco reponi debent, & in vasis fictilibus potius quàm ligneis, vt eorù humiditas, nimia siccitate, non resoluator. Simul reponi debent pruna, tamarindi, sebesten, iuiubæ: Ficus autem in alia arca, cum passulis, quibus adiungi possunt dactyli, amygdalæ, nuclei pinearum, auellanæ, pistacia in suis putaminib. seruari debent: non enim tam faciliè rancescunt, & nuces, & balanus myrepfica: ob id in sacculis reponi possunt. Quòd si hi fructus à putaminib. excoriati sint, locis fri-

gidioribus & minus siccis diutius conseruantur Fructus
 Iuniperi, & oxycedri, iuniperi maioris, quam cedrum ex-
 istimo, baccae lauri, hederæ, thymeleæ, chameleæ: bac-
 cæ myrthi cum fructu, sumach & berberis, mespila, &
 fabæ, pyra syluestria, mala cotonea per medium dissecta,
 filo traiecta, superiore parte officinæ suspendenda. Cor-
 na siccare possunt, & cum myrtillis conseruari, piper al-
 bum longum, nigrum, cubebæ, grana paradisi, cardamo-
 mum maius & minus Alio loco reponi debet hordeum
 mandatum, & integrum, oriza & farina illorum seminu,
 sem. lini, foenugræci, & sezamini radices odoratæ seruân-
 dæ sunt in loco minus calido, superiori tamen, vt enulæ
 campan. Ireos venetiæ, & florentinæ, bechini, siue vngu-
 læ caballinæ; galangæ maioris & minoris, cyperi calami
 aromatici Radicē ben albi & rubri si quis velit habere,
 collocet cum radicibus bugl. borrag. Liquiritiæ radix,
 consolidæ, narcisci, squillæ, pācratij, zinziberis, mechin,
 quem puto cecacul. verum. Item cyperus babyloneus,
 quam tērram meritam putabant, gentiana, azarum, va-
 leriana, garyophyllata, cucumer agrestis, brionia, iar-
 rus, serpentaria, arum, asphodellus Radices apij, petro-
 selini, graminis, foenugræci, asparagi, in regionibus fri-
 gidis colligi debent. Pro hyeme autem seruantur in sub-
 terraneo loco, vel in arena, quemadmodum in quibus-
 dam locis parare solent, & in caueis sepelire ne frigore
 gelentur. In aliis regionibus sufficit colligere pro heb-
 domada, quo tempore syr. parant, vel apozematis vtun-
 tur medici, ne quotidie cogantur extra urbem quærere.
 Quod si quis habeat in horto, vel in loco vicino vrbi, op-
 timum erit. Radices, lapathi acuti recentes, meliores
 sunt & possunt semper inueniri, maximè apud nos et-
 iam media hyeme, & eo tempore frequenter vtimur. A-
 sarum seruetur cum aliis odoratis, & spica celtica, spica
 nardi, schenanthos, flores violarum, nenupharis In eo-
 dem ordine buglossi, borrag. chamomilæ, meliloti, flo-
 res anthos, stœchados, saluæ, lauandulæ. centaurij mi-
 noris, hiperici, androseni, flores balaustiorum citrino-
 rum cum rosis, ligna, cinamomum tenue & acre, id est,
 cinamomum crassum & astringens, quale est cassia, san-
 dalus albus, citrinus & rubeus.

*De collocatione medicamentorum in officinis, & in quibus
vasis seruandum sit & numquodque.*

Non sufficit suo tēpore optima simplicia collegisse, & ad conseruationem præparasse, sed sic conseruanda sunt, ne pūtescant loci humiditate, nève resiccata nimium, resolutione suam virtutē deperdant. Verū inter medicamenta sunt; quæ negligentiam pharmacopolæ ferre possunt, quæ dura & densa sunt, quæ à causis procatarcticis non multum læduntur. At quæ tenui sunt substantia, non sustinēt iniuriam externi aëris, omnium minimè odorata & flores. Ob id vnumquodque in loco magis apto oportet disponere.

De medicamentorum collocatione, & ordine, & ratione.

Vt omnia in officinis ad compositiones faciendas magis sint in promptu, & vt ita dicam, ad manum, ordo in collocatione sollicitè est obseruandus. Quod vt fiat, quantum per præcedentis capitis canones licebit, locus in classes ita diuiditur, ita vt vnam humida, aliā sicca, tum etiam aliam frigida, aliam etiam & calida, tam simplicia, quàm composita obtineāt. Rursum classium, alia nobis propinquiora sunt, quæ vsus sunt frequentioris, alia secundo, tertio, & sic deinceps ordine, pro ratione vsus illorum: ita vltimum ea, quæ fortiora sunt, & minus consueta, occupant, non amisso præterea titulo, imò singulis imposito, qui nobis quid in ea theca repositum sit, significet: nec diu nos anxios per officinam errare sinat. Hæc eo modo parabuntur, vt in plures diuisa arcullas, omnia eiusdem ferè facultatis contineant. Liquida omnia vasis argenteis, vitreis, corneis, fictilibus vitreatis, conseruanda sunt: vt olea, resinæ, liquida vnguenta, quæ autem vnguenta ad refrigerationem parantur, in plumbeis. Resinæ, syrapi, & alia, quæ intus sumuntur, neque in vasis æneis, neque in plumbeis conseruanda sunt. Nam si Gal. aquā cisternæ reicit, propterea quod per tubos plumbeos, & canales in cisternam defluat: quantò magis reiicienda medicamenta conseruata in talibus vasis, à quibus abraditur vel ærugo, vel cerusa? Ob id sunt conseruanda in vasis vitreis, vel fictilibus vitreatis, maximè si diu quiescere debent, & in his conseruari, vt solent pharmacopolæ. Adipes & vnguenta ex a-

dipibus parata, in vasis plumbeis, vel argenteis conseruanda sunt, vt à rancedine conseruentur. Semina & fructus in vasis ligneis, vt thiliaceis, buxeis, aliisque lignis, quæ nullo odore sint prædita, & medicamentorum substantiam tenuem conseruare possint. In eisdem folia & flores recondi possunt, aut etiam in sacculis carthaceis. Quæ diffilationem desiderant & exsiccationem, in sacculis lineis conseruantur, vt radices aliquæ, quæ aerem ferre possunt ob densitatem, vt aristolochia rotunda, longa, asphodelus, hermodactyli, bistorta, & similes radices. Arculæ sint hoc modo paratæ, vt tres aut quatuor, vel quinque arculas contineant, vt earum quælibet medicamenta, quæ similem naturam & facultatem habent, reposita habeat, imposito cuiuslibet suo titulo ea parte, qua à nobis detecta est. In prima & secunda reponantur ea, quibus frequentius vtimur: in vltima vero, quæ fortiora sunt, & minus consueta, vt videre est in tabula sequenti.

Tabula prima continentur.

Costus dulcis, tussilago, elenium, iris Florentiæ gentiana, aristolochia longa, clematidis rotunda, macis, nux moscata, asphodelus hermodactyli.

Tabula secunda.

Costus amarus, zedoaria, surumbet, mechin, zinzib. calamus odoratus, galāga maior & minor, cyperus, cynamomum & cassia, pentaphylli, cortex externus nucis moscatæ, nux mosc. macis, folium malabatri, azarum, scœnanthum, spica celtica, spica nardi.

In hac tabella prius posuimus zinziber, quia frequentius eo vtimur quàm mechin: quod species est zinziberis. Ab Arabibus forsan cecacul appellata. Si fortè vnum pro alio sumatur, nihil mali quidem sequetur. Surumbet, zedoariam & costum, in postremis articulis reposuimus: quia eis minùs frequenter vtimur. Hoc modo medicamentis dispositis, multo minori negotio parabuntur, vt quæ frequentius in compositionibus simul ponantur, simul inueniantur. Adde quod medicamentorum dispositio *antiballomena*, quæ quid pro quo, appellantur, indicabit. Nam quæ in prima arca ponuntur, pro secunda poni possunt, & è contra, diminuto pondere.

Cum

Cum dicimus quantitatem augeri, volumus duplam substitui. Nam si medicamenta sint adeo imbecilla, satius est eis non vti, quam duplo pondere ea substituere. Nam moles medicamenti augetur, & vis aliorum minuitur. Vt omnia ordine digerantur, oportet locum in multas classes diuidere, & in vna classe partes superiores & inferiores. Iisdem classibus distinguenda erunt medicamenta calida, frigida, sicca & humida, tam simplicia, quam composita. Primum igitur de simplicium collo- catione agemus, deinde de compositorum.

Tabula tertia.

Santali citrini, santali rubri, albi, xylobalsamum, asphaltus, lignum aloes.

Tabula prima radicum.

Radix graminis, asparagi, rusci, apij, petroselini, rubræ maioris, rub. minoris, cortex rad. lauri, cortex populi, cortex fraxini, cortex rad. tamarisci, cortex rad. capp. asari, ari. serpentariæ, raphani agrestis, cortex sambuci, staphis agriæ, radix dentillariæ, piretri, ebeni, ligni gaiaci, chynæ, salsæ parillæ.

Tabula tertia.

Epithymi, thymi, chryfocollæ, ammoniacum, lapis lazuli, elleborus albus, niger: colocynthis, alandal, dagridium, croci, cnidij, seminis catapuciæ, genistæ, radix tithymali, rapontici, quinque myrobalani, & rhab.

Primatabula.

Borrag. buglossi, liquiritiæ, ben albi, ben rubri, mal. bismal. liliorum, rapsi barbati, bistortæ, ciclamini, quinque folij, genistæ, cucumeris agrestis, esulæ, turbith albi, polypodij, semen vrticæ, carthami, agarici trochiscari, alandal, colocynthidis.

Tertia tabula florum.

Flores cenanthes, ros cichorei, borrag. buglossi, nenu- pharis, violarum, sambuci, meliloti, chamomilæ, sal- uia, stechad. anthos.

Tabula secunda.

Capita papaueris, semina mandrag. hyosc. papau- eris nigri & albi, portulacæ, citruli, scariolæ, endi- lastucæ, melonum, cucumeris, cucurbitæ, maluarum,

bismal. bomb. foenug. lini, sesami, cumini, carui, foenic. anisi, portulacæ domesticæ & agrestis, petro. apij, rutæ agrest. & domest. ammi, seselli massilien. sinapi erucæ, thlaspi, nasturtij, seminis contra caulium, rapæ agrestis, paliuri, seminis hiperici, miliij solis, alchechangi, piper longum, album, & nigrum, genistæ, asari, seminis hederæ, psilij, cydoniorum.

Prima tabula fructuum.

Citri, seminis berberis, gallarum, sumach myrtillorum, cytrini, balaustiorum, cortex mali granati, vuz corinthiacæ, passulæ cum suis vinaceis, dactyli, tamarind. lebesten, prunorum acidorum, ficuum, iuiub. passul. mundatarum. Quæ vsurpantur in officinis sunt acetum, mel, oxymel, oxysaccharum, syrupi, decoctiones, laxantia medicamenta, confectiones aromat. pul. pil. trochisci, potiones medicatæ, olea, vnguenta, cerata, emplastra, acetum rosatum, sambucinum, scilliticum, passulatum, mel. ros. violatum, antosatum, scilliticum, passulatum, oxymel scilliticum, Iulianum, diureticum, seu de rad. simplex gal. de calamenta, oxysaccharum simplex, & compositum.

Syr. simplices, vt violaceus, de nenuphare, adiantinus, end. simplex, de pap. simpl. rosatus, myrtinus, de limonibus, de rosis siccis, acetosus simplex, de menta.

Compositi, de duabus rad. end. de cichorio, de fumaria, de eupatorio, de absynth. de menta, de stechade, glycirrhiza, de prasio, de arth. de iuiub. de pap. de bizantiis, & scolopendria, de quinque rad. de thymo, de epithymo, de pomis, de calamintha.

Decoctiones clysterum, communis medicinæ, pectorales, medicamenta laxantia, mollia, vt confectiones: dura, vt electuaria.

Confectiones, diacasia, diacatholic. diaphenic. indum maius, confectio hamech, hiera picra, hiera colocynth. triphera persica, benedicta, diasene, diaprunis, de psilio, confectio alchermes, ex lapide non vsto, electuaria, de succo ros. diacarthami, de citro solutiui.

Confectiones aromaticæ, aromaticum rosat. aromaticum moscat. pul. diambra, diamoschi, diarrhod. abb. diarrhod. syluij, triasantalum, diatrágacanthi frigidi, diatr-

diaireos Salomonis, diapenidium sine speciebus, rosata nouella, philonium romanum, saccharum rosat. cum perlis, requies Nicolai.

Pilulæ communes, de hiera simplici, elephanginæ, assaieret, mastichinæ, ante cibum, de quinque generibus myrob. aggregatiuæ, aureæ, de scarocol. de agarico, de rhab. de fumo terræ, de lapide lazuli, lucis, cochia, trochisci, diarrhod. de viol. de camphora, alchechangi, de myrrha, galliæ moscata, aliptæ moscata, de rhab. de spodio, de carabe, alandal, de capparibus, de agarico, de eupatorio, de absynthio.

Olea, vt oleum ros. de thymelea, myrthil. de frumento, cydoniorum, cicyonium, nenupharis, de iunipero, viol. phorum, liliorum, ouorum, chamomillæ, de myrrha, anethinum, rutaceum, irinum, cherinum, enulatum, de castoreo, de euphorb. costinum, mastichinum, de menta, de absynthio, anachardinum, muscatelinum, de piperibus, laurinum, amygd. amararum & dulc. vulpinum, lumbricorum.

Vnguenta, marciatum, aragon, agrippæ, dialthea, resumptium, basilicum, populeum, aureum, apostolorum, ægyptiacum, album Rafis, citrinum, cerusæ, album, rubrum de bdelio, de arthanita, fuscum Nicolai, pompholigos, tetrapharmacum, enulatum, contra vermes.

Cerata, album gal. refrigerans, sandalinum, æsopi, de pelle arietina, stomachicum Gal. diapente, ceratum, de vigo, siue de ranis.

Emplastra, de palma, siue diacalciteos, emplastrum diuinum, de betonica, siue de ianua, emplastrum diachilonis cum gummi, magni ireati, de meliloto, emplastrum oxycroceum, tetrapharmacum, emplastrum nigrum pro matrice.

*Quas compositiones paratas habere debeat
pharmacopola.*

Simplicia medicamēta, quò plura & meliora habebit pharmacopola, eò melior & ditior, munitiorque erit ad morborum expugnandorum remedia præparanda, compositiones neque tot, neque tantas habere oportet. Nam corrumpuntur, & multum mellis, vel sacchari, vel aliorum simplicium absumitur, nulla necessitate postu-

lante. Illas igitur tantum habebit, quibus nouit medicos illius regionis frequentius uti, quas fidelissime parat: deinde vasis conuenientibus & aptissimis conseruet, ut dictum fuit & dicetur. Permultæ compositiones sunt, quæ omni tempore parari possunt. Ob id non sunt parandæ, aut in parua quantitate propter subitos morbos. Itæ aliquæ sunt compositiones, quæ frequentius sunt parandæ, ut habeamus & recentes & antiquas, qualia sunt omnia, quæ ex opio parantur, ut theriaca, aurea Alexandrina, Asyncritum, Philonium, Triphera magna, & cætera huiusmodi medicamenta. Illa tamen commemoro ex syr. confectionibus, aliisque formis medicamentorum, quibus instructus esse debet, & quibus contentus esse potest medicus in morbis curandis. Nam oportet medicum uti propriis medicamentis temperaturæ, morborum causis, aliisque accidentibus, & communes compositiones magna ex parte tales non sunt. Ob id melius est nouas compositiones pro rei necessitate componere. Sed propter hyemis tempus & morbos repêtinis, cogimur aliquas paratas habere. Et quia aliquæ sunt compositiones, quibus statim non est utendum, ut Theriaca, aliisque ex Opio, ut Pil. de Cynoglossa, ob id illas paratas habere debet. Præterea sunt aliquæ quæ certis tantum temporibus parari possunt: ut medicamentum ex Cæcris ad canum rabidorum morsum, & Confectio alchermes, & alia multa. Ob id paramus & parata seruamus. Quia medicamēta cōcoquentia & præparantia humores, prima sunt, ob id primū de illis dicendū est. Sunt autem medicamēta præparantia, ut syrupi, vel quod iulep dicitur, vel medicamēta ex aceto & melle parata, à compositionis materia, oxymellita dicta. Ex aceto & saccharo multa medicamēta minus composita parantur. Ob id oportet Pharmacoposam habere multas aceti differentias, ut acetum simplex ex optimo vino albo & tenuium partiū, non autem ex fece, ut Lutetiæ parare solent, quod quidem acetum habet crassas partes & paucas tenues, & potius constringit, quàm aperiat, increffat, quàm tenuet. Ex eo aceto parabitur acetum Rosatum, Scilliticum, Sambucinum, & Passulatum, quod quidem omni tempore parari potest. Sambucinum, quo tempore florer Sambucus,

eus, Rosaceum omni tempore ex rosis siccis, & melius, quam ex rosis recentibus. Quod enim ex his paratur, facile putrescit & minus odoratum est: quod ex siccis, magis siccatur & magis odoratum est, magisque constringit. Potest autem fieri acetum rosatum ex multis infusionibus, ut sit Syrupus rosarum laxativus, aut Syrupus de ros. siccis. Hoc aceto debent uti medici in oxyrrhodini præparatione, & in aliis medicamentis resiccantibus, repellentibus & constringentibus. Acetum Sambucinum ex floribus Sambuci primum resiccatis. Nam ob humiditatem facile putrescerent, si, non siccati, in vasis includerentur. Hoc aceto uti frequentius debent medici quam faciunt, quia acetum, sua natura, vita est melancholiæ, & mors bilis. Flores Sambuci magnam vim habent adversus atram bilem. Eam ob causam in morbis melancholicis, in quibus timetur aceti usus, Sambucinum magnam cum utilitate usurpatur. Acetum passulatum omni tempore parari potest. Paratur autem ex aceto, quod mediocris sit aciditatis, in quo maceretur passule à gigartidis munda. Debemus parnam quantitatem parare, tum quod fieri semper potest, tum quod ob longam moram passulae facile putrescunt, aut quia dulcedo minuitur, & acidus ille sapor augetur. Optimum est illud acetum in affectibus thoracis & pulmonum, acetum squilliticum ex aceto & squilla paratur æstatis initio, squilla prius ex filo siccata. Concoquit pituitam in capite & ventriculo. Ex melle multa medicamenta parantur, ut mel. ros. viol. anthosarium, mel squilliticum. Mel autem passulatum dictum est potius sapa ex vuvis passi, quam ex melle. Ob id inter differentias sapæ poni debet. Mel. ros. hoc modo paratur.

Mel rosatum.

℞. Mell. optimi non antiqui, & crudi potius, quam decocti aut leuiter cocti, addita aliqua quantitate aquæ dulcis, lib. vj. rosarum recenter resic. in umbrâ, & remotis, vnguibus libr. ij. Parentur, & ponantur in vase vitreo, vel terreo vitreato, & soli exponantur, & moueantur tertio quoque die, & vndiquaque incalescant, & obturentur diligenter.

Sunt qui succum ponunt: Alij mediam partem succi, & aliam rosarum. Sed qui hoc agunt, non intellexerunt

mixtionis rationem. Nam si rosæ exiccatae poni debent, succus nō est ponendus. Sed quod rosæ exiccatae magis cōueniant, quā recentes, hoc facile cognosci potest ex Mesue, qui saccharum ros. & mel rosatum ex siccatis rosīs parari iubet. Ad hæc si recentes, vel succus ponatur, nimīā vim detergendi habent. At cum mel natura sua sufficienter detergāt, nō est augēda illa facultas: sed tantum voluerunt maiores nostri, mellis morsum, calorem & tenuitatē, ros. astrictione temperare. Melius parare in sole, quā in decoquatur, quia flores omnes propter tenuitatem substantiæ & odorē non ferunt decoctionem: sed calor solis temperatus & longiori tempore agens, satis ista medicam. permiscet. Si autē ex floribus recentibus, vel succo paretur, tunc decoquere possumus, lēto tamē igne. Si mel non decoquatur, minorem acrimoniam habet: si coquatur, acrius redditur. Non debet parari ex melle antiquo ob eius acrimoniam, neque ex melle fido. Quod si non sit aliud in promptu, prius est despumandum. Sed ne acrimoniam acquirat, inter despumandum, adde aliquātulum aquæ. Post præparationem mellis rosati, Pharmacopola debet liquidiorē partē separare, & transcollare, & illud dicitur mel rosatum collatum, ad potiones & alia medicamenta liquida paranda.

Mel Violatum sic paratur.

℞. Mellis optimi non antiqui nec cocti ℥. iij. florum viol. leuiter exsiccatarum lib. j. ponantur in vase ad solem, ut supra de melle rosato ostensum est.

In affectibus thoracis, peripneumonia, pleuritide, & similibus conuenit.

Mel anthosatum.

℞. Mell. optimi triannis, quadriannis, aut antiquissimi ℥. iij. florum anthos semiexsiccatorum ℥. j. misce, & ut prius dictum est, in sole paretur.

Ex floribus autem parari debet, aut si quis velit eos præmittere, saltem conseruam anthos paratum habeat. Habet enim mel, cum cōserua, easdem facultates. Quare alterutro carere possumus.

Mel squilliticum ex Gal.

EX melle antiquo, aut prius decocto fit, cui misce squillæ siccatae in umbra, manibus cōtrite, quantum volue-

volueris. Immittatur in vas ex quo fuerit extractū mel. Deinde angusto cooperculo operiens, & extrinsecus corium vniuerso corpori vasis circundans, & diligenter ligans, in locum omnino ad meridiem expositum reponne, Aquilonis flatibus nullatenus obuium, vt ab ipsis perflari possit, & frequenter moueatur, vt vndiquaque incalescat.

Hoc idem fieri potest in aliis medicamentis, quæ ad solem parantur, debetq; mel squilliticum ex melle antiquo, aut prius decocto fieri. Vbi summè detergendum est, vt ex pectore pulmonibus, aliisq; partibus, ad attenuandum, expectorandum & detergendū hoc vtuntur.

De oximellitibus differentiis.

EX melle simplici & aceto multa alia medicam. parantur, vt oximel ex duabus radicibus, oximel ex quinque rad. oximel diureticum, oximel ex ligustro, ex calamintha, iulianum, squilliticum. Sed medicus tantum parabit oximel simplex & diureticum. Nam hæc sufficient. Qui enim diureticum habet, potest carere oximellite ex quinque aut duabus rad. oximel ex ligustro & calamintha ex tempore parari possunt, neque frequenter illis medici vtuntur. Sed quia Diosc. & alij antiqui herbas decoquebant in hydromellite, vel oximellite, hinc natæ sunt tot oximellitibus differentiæ. Oximel Iuliani parari non debet, quia laxantia medicamenta recipit, multaque alia venenosa. Præterea acetum potius astringit, quàm laxat. Adde quòd oximel Iuliani, & simile, tentat nervos, & alias partes, quæ acetum pertimescunt. Acetum squilliticum parari debet ad faciendum oxymel squilliticum, & ad aliquos vsus, vt ad dealbandos dentes. Est autem acerrimum medicamentum. Oximel autem squilliticum mitius est, & minus lædit partes nervosas, vt ait Galen. In consilio pro Epileptico.

Parabitur hoc modo oximel squilliticum.

℞. laminas squillæ inter externam corticem & medias cortices lino contrusas, tanto interuallo, vt non se contangant. Siccabis in vmbra per dies quadraginta. (Non enim faciliè siccantur ob viscidum succum, quem habent, & situm faciliè contrahunt, si se contangant)

lb. j. sed ligneo cultello conscindes. Alios quadraginta dies in aceti boni lb. 8. in vase vitreato oris angusti bene obturato insolabis. Mouere oportet, vt in melle squillitico dictum est. Acetum postea collabis, & vsui seruabis. Initio æstatis præparabis antequam squilla floreat. Squilla quæ diu seruata est melior est ea, quæ recenter extrahitur, quia siccior reddita est. Oxymel squilliticum parandum non est. Qui enim mel squilliticum & acetum squilliticum habet, oxymel squilliticum in promptu parare potest, si partes mellis tres, aceti duas capiat. Quod si pertimescas, ne acrius sit ob squillam, temperato oxymellite simplici, vel minorem quantitatem vsurpa. Eius compositio est ex lb. duabus aceti squillitici & mell. despumati lb. 3. simul decoctis, quod nihil aliud est, quàm commixtio saporum, & ne tot vasa habere oporteat, hoc carere possumus. Satius est acetum & mel habere. Nam melle vi tantum aliquando cogimur, aliquando aceto per se. Facile autem, qui vtrumque habuerit, pro urgente necessitate commiscere poterit.

*Oxymel diureticum, quod communiter paratur, & pro
Syrupo de quinque rad. & sui esse potest.*

℞. radicum sequentium mundatarum & incisarum,

scilicet radicū apij fœnic. petro. rusci, asparagi ana lb. i.

Alias legi seminis apij, fœnic. ana 3. i. Temperentur radices in
eur, in a- lb. 5. aquæ fontis & in lb. seminis aceti albi per diem na-
que fontis turalem, & in eadē aqua decoquantur radices primum:
& aceti postea adde semina apij & fœnic. quibus adde mell. lb.
albi ana 2. Decoquantur omnia lento igne ad consumptionem
lib. 5. tertiæ partis, fiat syrupus.

De Oxyfaccchara.

A Rabes ex aceto, faccharo, & aqua composuerunt syrupum acetosum simplicem, quem Oxyfacccharam vocauerunt. Mesue etiam vocat & syrupum acetosum, de quo suo loco dicemus inter syropos. Sed Nicolaus Oxyfacccharum composuit, quo vti debet medicus in morbis biliosis. Magis enim conuenit, quàm oxymel, propter succum granatorum. Hæc medicamenta in frequenti vsu habenda sunt, quia efficacia sunt & facile parantur. Oxymel pro pituita & obstructionibus. Oxyfaccchara pro biliosis morbis, qui sunt cum obstructio-
ne. Syru-

ne. Syrupus acetosus simplex, inter alios medius erit, conuenietq; utrique descriptioni, sed minùs, quàm oxymel, in pituita: minùs quàm oxysaccharum, in morbis biliosis. Cuius descriptio talis erit.

R. succi granatorum acidorum ℥. 8. (quidam addit aceti ℥. 4.) sacchar. lb. 1. coquantur, donec ad formam syrupi veniant.

Hanc malim cum succo granatorum, ut aliquantulum differat à syrupo acetoso simplici. Nam quod ex aqua, aceto & sacch. paratur, non differt ab oxymelite. Arabes ex aceto & saccharo fecerunt simpliciter oxymel simplex, & magis compositum, sed differunt, quia magis conueniunt morbis biliosis, quàm oxymel, & minùs pituitosis.

Oxysacchara comp. fit a sic paratur.

R. capill. ven. asplenij, ceterach, philitidis, id est, linguæ ceruinæ, trichomanes, hepaticæ ana M. j. flor. viol. p. 2. rad. petro. rusci, asparagi, graminis an lb. ℥. coquantur omnia simul in sufficienti quantitate aquæ. Deinde adde succi malorum granatorum acetosorum lb. 1. Infundantur radices mundatæ & incisæ in succo, addendo parum aquæ. Tertio die coquantur ad syrupi consistentiam addendo sacchari quantum sufficit.

De Syrupis.

Syruporum alij sunt simplices, alij compositi. Simples possunt fieri ex omnibus herbis cum saccharo: sed sufficit paratos habere ex communioribus, & ex his, quæ omni tempore parari non possunt. Paratur syrupus violarum, nympheus, adianthinus, endiuix simplicis, de papauere. De succo acetosæ ibi nō describitur (quia semper parari potest) de fumaria simplex, syrupus rosat. ex infusione recentium, syr. myrthinus, de limonibus, de ros. siccis non paratur, quia quotidie parari potest. Relinquuntur de agresta, de acetositate, citri, de succo cucurbitæ, de granatis, de succo ros.

Syrupus Violatus sic fit.

R. aquæ infusionis viol. lb. 5. sacch. albiss. lb. 4. misce, decoquantur cum facilitate, & seruetur vsui. Item potest parari ex multis infusionibus, quæ leniendo aluum laxabunt, qui distinguendus erit ab alio.

Syrupus nenupharinus sic fit.

℞. florum nenupharis lb. 2. decoque, & expressioni adde sacchari lb. 2. deinde decoquantur ad syrupi consistentiam.

Syrupus capilli Veneris sic fit.

℞. aquæ decoctionis capilli veneris lb. 3. sacchari lb. 2. fiat syrupus, ut artis est.

Syrupus de fumo terræ.

℞. succi de fumo terræ depurati lb. 3. sacchari coll. lb. 3. fiat syrupus.

Syrupus endiuia simplex.

℞. succi endiuia depurati lb. 8. sacch. coll. lb. 5. & β. fiat syrupus.

Syrupus ex infusione ros recentium.

℞. aquæ infusionis ros. lb. 6. sacch. lb. 4. misce, fiat syrupus.

Syrupus myrthinus.

℞. succi myrti. lb. 12. decoque in vase vitreato, lento igne, ad consumptionem tertiæ partis: deinde collatur. & accipe ex coll. lb. 7. & infunde super illud sacchar. clarificati lb. 5. fiat syrupus.

Syrupus de limonibus.

℞. succi de limonibus lb. 1. sacchari clarificati lb. 3. misce, fiat syrupus.

Syrupus de buglossa.

℞. succi buglossi depurati lb. 4. sacch. lb. 3. β. f. syr.

Syrupus de papauere.

Fit ad formam & ad præparationem syrupi violati, vide Nicolaum.

Syrupus acetosus simplex.

Acetosus simplex parandus in parua quantitate, quia semper omni hora nullôq; negotio parari potest, & qui oxymel habet, carere potest acetoso simplici, quia ad pituitæ attenuationem præscribi solet. Quare carere possumus. Sed quia nobiles mellis saporem vel odorem ferre non possunt, ob id parantur pro ipsis hoc modo. Cuius multæ sunt descriptiones apud Serap. Aui. & alios. Nos verò Mesuæ descriptionem apposuimus, quæ talis est.

℞. aquæ fontis lb. 5. sacch. lb. 4. coquantur in vase fictili vitreato, in igne sine fumo ad consumptionem dimi-

diæ partis, semper despumando. Quibus adde aceti lb. 2. Si autem imbecillum parare velis, vel si acetum sit acerrimum, lb. 1. lb. Si verò debile sit acetum, lb. 4. Et quando fortissimum parare voles, lb. 4. aceti fortissimi. Etiam adde rosas, coquito ad syrupi consistentiam. Si hoc syrupo statim vti volueris, minùs inspissabis decoquendo. Si verò diutius seruare, decoquendus erit magis. Hic syrupus oxymelli simplici respondet, medius inter oxymel & oxyfaccharum. Quòd si aqua fontis non suppetat, aqua fluuij, aut pluuiæ vsurpanda est, & cum diutius seruandus est, consulerem ex aqua pluuiæ parare, vt coram rustici parant, quia melius & diutius conseruatur, nec timenda est astrictio, vt quæ acetum habeat.

Syrupus acetosus simpl. { debilis }
 { medius } *ex lib.* { duabus }
 { fortis } { tribus } *aceti fit.*
 { quatuor }

QVòd si acetum acerrimū sit, 2. lb. pro 3. & 3. pro 4. poni debent, aut plus aut minùs aquæ, quod gustu indicari debet, vt de posca dicitur, quæ tunc bene temperata est. cum sine molestia bibi potest. Sed quia coctura & saccharo, aceti aciditas temperatur, fortius esse debet, quàm in posca.

*De syrupis compositis, & quibus contentus esse
 debet aromatarius.*

SYrupi compositi debent etiam parari aliqui, quia in declinationibus morborū pro apozemate vtuntur. Medici rarò in principiis morborum, maximè si laxantes sint, vti debent, qualis est de fumo terræ, de epithymo, de cichoreo cum rhab. Aliis non laxantibus vtentum est in principio, in magnis caussis, vt in febribus ardentibus spuris, vt syrupo de rad. de bizantiis, postea syrup. de endiuia composito ad bilis præparationem, syrup. de stæchade ad pituitæ præparationem post oxymel & syrupum acetosum, syrup. de iuiubis, de papaue. re ad incrassandum, de liquiritia, de marrubio ad expectorandum & dilatandum. Sunt autem hoc ordine collocandi.

Syrup. de duabus rad.

Syrup. endiuæ compositus

Syrup. de cichorio.

Syr. de fumaria cōpositus.

Syr. de eupatorio.

Syr. de absynthio.

Syrup. de menta.

Syrupus de liquiritia.

Syr. de prassio.

Syr. de Artemisia.

Syr. de iuiubis.

Syr. de papa uere.

Syr. de hyssopo.

Istis contentus esse debet, quia syrupus de bizātiis fiet, addito aceto in syrupo de duabus rad. Syrup. de quinque rad. non differt ab oxymelite. Quare cum est attenuanda & aperienda obstructio, oxymel magis conuenit, vel si eum aquis aperientibus miscueris. Syrupo de hyssopo carere possumus, quia medius est inter eos, qui extenuant & incrassant. Quod si syrupi de iuiubis parti vni addantur duæ partes eius, qui de liquiritia est, erit idem syrupus, cum syrup. de hyssopo. Syrup. de acetoso, de succis herbarum carere possumus, cum syrupum de iuiubis compositum habebimus. Syrupo item de epithymo carere potest quicumque syrupum de fumaria compositum habebit. Hoc tantum differunt quod de epithymo calidior sit, & magis idoneus ad ichores falsos & pituitosos euacuandos: sed facile talis reddetur, infundendo agarici 3. i. pro lb 1. syrupi. Quare sufficit alium habere paratum. Quibus autem differant facile cognoscet, qui volet vtriusque conferre descriptiones. Syrup. de cichoreo simplex, & de scolopendria non multum differunt, si rhab. excipias. Qui enim de cichorio est, sine rhab. potest parari, & quando utendum erit, addetur ea portio rhab. quæ videbitur. Quia etiam minor quantitas est, vel etiam cum rhabarbaro euanescit eius vis & facultas soluens, constringens verò, nimium vires suas imprimit. Cum rusticis dare erit necesse, syrupum ex infusione rosarum recentem vel succum ros. addere poterit, quò minor portio paretur. Parandus est rectè & in parua quantitate, quia pauci vtuntur syr. de cichorio composito. Syr. viol. & capilli Ven. non sunt dispensandi compositi, sed potius simplices. Nam capil. Ven. compositus cum iuiubis paratus, fit determinatus pectori: sed minus aperit, vel discutit, vel attenuat. Hoc igitur est facien-

faciendum, cum vsus postulat. Syr. viol. compositus non multum differt à syrupo de iuiubis. Relinquendi verò sunt & hi simplices parandi, quæ ex simplicibus compositos, non contra, facere possumus. De eupatorio addimus, quia ad hepatis imbecillitatem & refrigerationem, obstructionemque facere cognouimus, nec vllum inueni huic respondentem. Syrupum enim de duabus radic. & syrup. de bizantiis olim aceto paratum, alio nomine dictum de dinari à barbaris. Hunc parari volumus, quia est sine aceto: multò magis viris, mulieribus, & morbis, qui vsum aceti respuunt, conuenit, tum etiam, quia liberum est vnam partem acetosi simp. vel parum aceti, cum vsus postulat, addere. Est utilis ad obstructiones hepatis & lienis aperiendas, & bilis crassæ extenuationem, citra magnam calfactionem. Sequi solet acetosum simplicem, & potest accommodari omniaus partibus obstructis à bile flaua. Recipit autem hæc.

R. rad. apij & fœnic. an. ʒ. 2. aut 3. seminis anisi, fœnic. apij ana ʒ. j. seminis intybi, vel scariolæ ʒ. β. facta per sex horas maceratione, radices coquantur prius, deinde adde semina, in lb. decem aquæ fontanæ ad consumptionem dimidiæ partis coll. adde sacchar. lb. 3. & reducantur ad syr. consistentiam. Sunt, qui addunt radices intybi, vel semen. Sed cum nomen acceperit à radic. cum numero, visum fuit illa prætermittere, cum dicere possumus nomen accipere, non ab aperiētibus, quæ sunt dæ rātum: sed vt detur cum decoctione aliarum rad. & fiat syr. de v rad si quis nolit vti oxymelite diuretico.

Syrupus endiuia compositus descriptione Gentilis.

Syrupus end. paratur ex herbis aperiētibus & refrigerantibus modicè, quia vbi aperiendum & magis refrigerandum, utilis est, vt in tertiana exquisita, ordine tantum mutato.

R. hordei integri, capilli veneris an ʒ. i. polytrici, lenticulæ aquæ, vel rosarū recentium ana ʒ. β. seminis berberis ʒ. 2. fiat decoctio in sufficienti quantitate aquæ, & coll. adde sacchar. q. s. quibus adde succi intybi, siue end & hepaticæ ana lb 3. & residentia facta, aromatizetur ʒ. j. santali albi & rubri, & ʒ. i. cinamomi boni.

Hic syr. sine methodo compositus esse videtur, nul-

loque ordine, in quo hordeū non mundatū, sed integrū esse legendū duximus, quia deterget, & aperit, quod magis facit hordeum sua externa cute, quā interna parte qua obstruit. Primo loco illud posuimus, vt interea dum semina quærentur, decoquatur, vt suam flatulentia perdat, longiore coctura: deinde herbas, post flores, ne in diuturniore coctione eorū vis in fumū euanescat. Illud forsā nouum videbitur, quod succos non decoquimus, sed in fine tantū apponimus. Hoc autem fit, quia succi coctura vim amittūt. Ob id in clarificatione ponuntur vnā cum sandalis, & cinamomo, dimissis alis, vt ligno aloēs ingrato & incerto. Semen cydoniorū, quod multū odorem inspirat, & mucilagine sua inspissat, cū extenuare potius sit opus, reiiicimus, semēq; berberis, eius loco, reposuimus in decoctione, quia in clarificatione nihil præstat, vt decoctio refrigerandi & attenuandi vim habeat. Cinamomum omnium humorum vitia castigat & emendat. Sandali non nocent cum rhabarbaro.

Syrupus de cichorio sine rhabarbaro.

DVæ sunt descriptiones, quarū altera est Placentini, quæ est facilior: altera Nicolai Florentini, quæ magis est efficax ad obstructions hepatis & refrigerationem, sed difficilè paratur ob vocum ambiguitatem. Nec mirum, si Pharmacopolæ non conueniant in huiusmodi syrupi præparatione, cū nec ipse Nicolaus sibi consentiat in interpretatione taraxiconis, cicerbitæ, endiuæ, scariolæ. Ipse enim dicit, endiuæ vtriusque per end. scariolam seu intybum domesticum intelligens. Quod si id est verum, cur addidit scariolam? Quare neglectis interpretationibus barbarorum, nos sumus intencionem sequuti. Hoc autem modo putabimus, & in hunc ordinem reducemus. Est enim sine methodo descriptus. Nouerat enim tantū herbarum nomen facultatēque & figuram ex commentariis, eratque magis ad congregandum, quā ad digerendum natus.

R. radic. asparagi, fœnic. apij ana ꝑ.ij. glycyrrhizæ ꝑ.ij. intybi domestici & syluestris, & dentis leonis (quem taraxiconem vocant, nos chondryllam Dioscor.) ana M. ij. cicerbitæ siue rostri porcini, siue sonchi leuis, hepaticæ siue lichenis, lactucæ satiuæ & syluestris, fumariæ,

riæ, lupulorum ana M. j. hordei integri, seminis halyca-
bi ana ʒ. iij. capil. ven. scolop. polytrici, cuscute ana ʒ.
vj. fiat decoctio in sufficienti quantitate aquæ, & coqua-
tur ad syru. consistentiam, & clarificetur. Cum syr. de ci-
choreo cum rhab. præscribitur, tunc in singulis libris sy-
rupi adduntur rhab. ʒ. iij. spicæ nardi ʒ. iij. puluerizen-
tur in panno raro ligata, & decoquantur leuiter, & ex-
primantur: vel si infundantur in calido syru. exprimanturque leuiter, melior erit. In hoc syr. posteriora priora
fecimus, vt diutius coquantur. Pro endiu. domestica &
syluestri, cichorium satium siue scariolam & cichor.
quod picris ob amarorem Dioscoridi dicitur, posuimus.
Nihil refert, si accipias illam speciem, quæ est folio la-
tiore, vel illam, quæ est angustioris folij. Nam eandem
habent facultatem. Taraxiconem interpretati sumus
ex Nicolao Florentino. Putarem chondrylæ speciem.
Cicerbitam legimus, nõ eu. urbitam, quia cicerbita est,
quam Græci Sonchum leuem appellant, nostri rostrum
porcinum. Sonchi duo sunt genera: alterũ asperum vo-
catum, quod nostri lactucam agrestem falsò putant: al-
terum, quod nostri cicerbitam asperam vocant. Dicitur
tamen sonchus leuis ad differentiam prioris: cum erum-
pit, tenuitate quadam mollescit, ob id dicitur leuis. Cũ
senescit, durior redditur. Quòd autẽ rostrum porcinum
non sit, sed species sonchi, est manifestum ex Dioscorid.
descriptione. Alter tenuitate quadam mollescit, in cibis
appetitur, anguloso caule ac tenui, interdum rubescẽte,
foliis in ambitu per interualla dissectis. In rostro por-
cino omnia ista reperiuntur. Est caule vacuo, rubente,
tenerescit. Demum cum inueterascit, asperum fit: ob id
cicerbitam asperam vocant, vt Hermolaus monstrat. Li-
chenem dicimus pro hepatica, vt & Dioscor. videat in-
terpretationem qui volet. Hic syrup. lactucam satiuam
& syluestrem desiderat. Quòd si endiuia vulgaris sit la-
ctuca syluestris. quid accipient pro lactuca agresti? Iam
monstratum est endiuiam vulgarem dictam sonchum
asperam esse, quia similis syluestri est, & magis spinis
horret, quod neque lactucæ, neque alteri potest conue-
nire. Lactuca agrestis, herba est latiore folio, quàm endi-
& molliore. Ad lactucam in hortis neglectam accedit,

nisi quod crispior est. Hanc vulgus aromatatorum non nouit: ob id permitto, vt pro ea lactucas amaras accipiant, quæ proximè ad earum naturam accedunt. Summitates lupulorum diximus, ne postea legatur lupinorum. Summitates lupulorum sunt accipiendæ, quia folia sicca sunt, & caules lignosi, & parum succi continet. Hordeum integrum, quia magis deterget. Sinerhabar. parari iussimus, vt syr. de cichor. simplex, cum syr. de cichor. cum rhabar. differret. Erit autem liberum dosim rhabarb. augere, vel pro pauperibus cum succo ros. vel cum syr. infusionis ros. parare. Valet hic syr. in æstuantibus stomacho & hepate, & in febribus aut inflammationibus hepatis, splenis, & aliorum viscerum, quia refrigerat & aperit sine calfactione. Bilem purgat leuiter. Quare in declinationibus febriū dari debet, cum emulsionem quatuor seminum frigid. maio. vel cum decoctione cicerum rub.

Syrupus de eupatorio.

℞. radicum apij, scænic. intybi ana ʒ. ij. glycyrrhizæ rasæ, scænanthos, cuscutzæ absynthij, ros. an. ʒ. 6. capill. ven. anisi, bedegar. id est, spinæ albæ succhazæ, id est, spinæ arabicæ, florum bugloss. aut radicum eius, anisi, scænic. eupat. vulgaris ana ʒ. 5. rhabarb. electi, mastickis ana ʒ. 3. spicæ nardi, asari, folij an ʒ. 2. coque in lb. 8. aque ad tertiæ partis consumptionem. Col. adde sacchar. lb. 4. succorum apij & intybi ana lb. 3. coquantur ad syrupi consistentiam. Coquantur autem primùm radices cum herbis, in fine odorata, & succi clarificati addantur, ne eorum vis exoluatur. Hic ponere debemus eupatorium Mesuæ, non illud, quod a Dioscor. aut Auic. appellatur. Formam refert centaurij minoris, & exsiccatum flavescit, & valde amarum est, cum leui quadam astringitione. Calida est herba in primo, & sicca in secundo, quæ dicitur herba sanctæ mariæ. Pharmacopolarum eupatorium est canahis agrestis, vel eupatorium Auicennæ. Eius penuria absynthij & asari ana pondus dimidium apposuius. Spica celtica, vel schænanthina substitui potest. Quare non erit difficile ratione eupatorij, parare hunc syrup. Syrupus de eupator. Mesuæ non multum differt à cichorio, nisi quod fortius aperit, & magis calefacit.

facit, & ad hepatis imbecillitatem aptior est. Et quamquam sit difficilis paratu ob bedegar, succhahæ, id est, spinæ arabicæ, & eupatorii cognitionem, parari volo ob cachexias & malas intemperaturas humidas hepatis, & aliorum viscerum. Non nimis vexat pharmacopolas bedegar & succhaha, quia hoc nomine bedegar, *cynosbator* significauerunt, vel male interpretati sunt. Ex ea excrementum quoddam simile spongiæ, quod spongiam bedegar vocant, usurpant, forte quod astringit & siccatur insigniter. Vocauerunt Arab. ut patet ex Serap. & Dioscor. spongiam albam. Nostri Chamæleontem appellant falso. Multo magis conuenire videtur succhaha, id est, spina arabica, quæ est similis superiori, nisi quod valentius astringit & siccatur. Quare pro illa spina, substitui potest spina alba, *cynosbate*, siue bedegaris, quia astringit insigniter citra calorem. Si quis folio vulgari utatur, quia verum antiquorum folium non habemus, sed arboris odoratæ, uti potest spica nardi pro folio, ut quidam putant, augendo illius quantitatem. Sed hoc non est omnino reiiciendum. Habet enim odorem & acrimoniam. Ob id potest præstare, quod olim præstabat folium indicum, & palustre, quod aquis natabat, sine caule & rad. ut Dioscor. scribit. Nos succi apij & end. an. lb. 3. addidimus, quia multis erit certa iustaque quantitas, quam pro lb. 2. lb. 4. ut in syr. de bizant. interpretantur. Quia hic additur magna quantitas decoctionis, ob id nimium sit amarus, minui aliquantulum quantitatem iussimus. In cachexia & hydrope optimus est, quia ex aperientibus & siccantibus, calfacientibus, & roborantibus hepar paratur. Habet aliqua astringentia & laxantia, ut rhab. quod dicitur anima hepatis, & astringit ac amarum est, unde bilem trahit, quæ maxime in hepate redundat. Conuenit. aucto rhab. in febribus compositis diuturnis, & in locum syr. de eichoreo substitui potest, si detur cum decoctione eichorei, vel end. vel cum aquis earundem.

Syrupus de fumaria.

Syrupus de fumaria cum syrupo de epithymo conuenit adeo, ut alterum eorum sufficiat habere in officina, ut iam dictum est. Et quia ex fumaria conficitur, frequentior est eius usus, & visum est illum retinere, alte-

rum verò prætermittere, quanquam de epithymo efficacior est ad omnes ichores vacuandos, tam serofos, quàm melancholicos. Sed quæ huic oporteat adungere, quo similis prorsus reddatur, docebimus. Hic autem ex his componitur.

℞. polypodij quercini 3. vj. liquiritiæ 3. viij. prunorum numero centum, pass. mundatarum lb. 3. absynthij 3. vj. cuscutæ, florum borrag. viol. an. 3. j. ros. recentium 3. j. 3. epithymi 3. 6. anis. 3. lb. Omnium myrobalanorum 3. j. 3. fiat decoctio in lb. x. aquæ pluuiæ, vel fontis, vel optimi fluuij ad consumptionem dimidij. In vna parte infunde tamarindorum, cassiæ extractæ an. 3. 2. coquito ad consistentiam syr. Coll. adde sacch. diss. collati in vna parte decoctionis, & succi fumariz an. lb. 3. coquantur ad syr. consistentiâ sensim. Anisi 3. lb. addidimus, quia polypodiū & alia medicamenta dulcia illud exposcunt, ob flatum, quos gignunt, quod Mesues docet frequenter faciendum in cap. de Polypodio. Hic syrupus nullo ordine descriptus fuit. Ob id, quo ordine simplicia sint decoquenda, disposuimus. Omnes myrobalanos esse iniciendos colligimus, ex interpretatione Mesues, qui dicit summam eorum, quæ hunc componunt, ad decem & septem peruenire, quamuis in aliquibus citrini & chebuli tantum ponantur pondere 3. 20. aut, vt alij ponunt, ana 3. 2. 3. quod idem est pondus. Rosas nolumus expungere. Nam si recentes ponantur, ichores soluant cum aliis, & etiam per se. Quare tempore rosarum est dispensandus. Quod si non licebit eo tempore succum rosarum addere, ad 3. 3. imperabimus. Dosim auximus, vt efficacior esset syr. ad ichores euacuandos, quorum causa factus est, & in lb. 10. aquæ pluuiæ: quia hæc medicamenta putrescere prohibet magis, quod in hoc syr. est maxime necessarium. Nam propter prunas & tamarindos facile contrahit situm. Ad dimidiū tantum aquam consumere volumus, aut minuenda est aquæ quantitas, si ad lb. 3. absumenda. Nam si lb. 10. ad lb. 4. reducere oportet, duo sequuntur mala. Primum, quod aliqua medicamenta diutius decoquenda, vires perdant: alterum, quod hic syr. suapte natura spissus, spissior reddatur. Quod si ad dimidium tantum, vires medicamentorum seruantur,

tur, & minùs spissus erit, quandoquidem spissitudo hunc ingratum facit. Tamarindos cassiam, neque diu decoqui neque sine decoctione miscere volumus. Quòd si hic syr. partim ex succo fumar. partim ex succo mercur. pareretur, efficacior erit, quòd hæc medicamenta mitiora sint. neque possint mediocri quantitate purgare. quod erit si, vt practici imperant, detur in minori quantitate cum aquis. Quare dandus erit cum decoctione mercur. vel ex decoctione agarici, & simul, vt efficacior reddatur, syr. de epithymo, si detur cum decoctione thymi, calamentæ, stechad. agar. fœnic. & anisi. Istit superat syrupus de fumaria syrupum de epithymo.

Syrupus de absinthio.

R. absynth. Romani 3. 100. coquantur in lb. 3. aquæ ad tertias. Fricentur manibus & collentur. Coll. adde vini albi antiqui & clari, mell. antiqui ana lb. 1. coquantur in syr. Hanc descriptionem eligimus, quia quæ præscribitur apud eundem authorem, recipit rosas, cydoniorum succum, quæ multum astringunt. Sed cum hic syr. sit non solum ad ventriculum roborandum, sed etiam ad purgandum per ventrem biliosa recrementa, & per vrinas non posset hoc modo paratus conuenire, neque in declinatione febrium tertianarum ad bilis euacuationem, vt Gal. iubet dari. Quare vt communior esset ad omnia hæc, illam descriptionem reiecit.

Quòd si quis spicam nardi, aut celticum adiungere velit, non repugno, quia per hæc eius actio corroboratur, & fortior fit. Hic non aliam speciem absynth. iniici volumus, quam vulgare illud. Tale est verum Romanum, vt videre est in antiquis ruinis Romæ, in quibus tam frequens est, vt nulla frequentior videatur herba. Manifestum est ergo esse illud absynthium ponticum: non enim seriphium, non xantonicum. Quare primam speciem esse oportet.

Si quis velit magis astringere, addat cochlear vnum succi cydoniorum, cum vti voluerit.

Syrupus de menta.

R. succi mentæ lb. 1. succi granatorum dulcium, & acidorum ad dimidium cocti ana lb. 2. sacchar. lb. 4. in syr. decoquantur. Hic syr. semper parari potest, si ser-

uetur succus granatorum, sed commodius. Vere ob mentæ succum, vel autumnno ob granatorum succum. Quod si nō reperiat menta bene humida, in eo succo mentæ lb. 1. β. macera per 24. horas, augendo succorum quantitatem, vel minuendo dosim mentæ ad lb. 1. fiat syrupus cum sacchari lb. 2. Vtilis est ad vomitiones & ventris subuersiones, ad singultus, stomachique relaxationem, & appetentiæ magnam deiectionem. Malumus habere descriptionem, quia simplicior & paratu facilior, & cum erit opus astrictione, licebit syrupum de cydoniis accipere, aut addere.

Syrupus de Stechade.

AD partes refrigeratas, humoresque crassos attenuandos utilis est, & in affectibus cerebri, qui hic ordine describendus & parandus est.

℞. vuarum passarum enucleatarum 3. iij. rad. pyretri 3. 7. (pyretum in nullo syr. ponitur, præterquā in isto) calamynthæ, orig. thymi an. 3. 10. anisi 3. 6. zinzib. piper. longi ana 3. 3. florum stæch. 3. 30. fiat decoctio (facta maceratione per 24. horas) in lb. 10. aquæ & mel. lb. 5. & fiat syr. in hoc suspende cinamomi, calamin. arom. spicæ nardi, zinzib. piperis nigri & longi ana 3. 1. ligatorum in panno raro.

Datur cum aqua decoctionis spicæ vel roris. vel cum aquis hyss. betæ, saluæ, & similium. Hic syr. debet fieri cum melle, quia mel magis deterget lentos humores, ad quos coquendos fuit institutus. Et quò dispumetur melius, à principio mel. ponendum diximus. Nam & quæ hunc syrupum complent, non ferunt magnam decoctionem. Sunt enim odorata & tenuium partium. Possumus prætermittere piper & zinzib. in decoctione, quia in clarificatione ponentur: sed non multum coquuntur. Forsam aliquis mirabitur, quòd crocum omiserimus: quod non sine ratione factum intelligere oportet. Nam hic syr. in dolore capitis, scotomate epilepsiæque præscribi debet. At crocus tentat caput & lædit cerebrum, dolorem inferendo, vt ait Gal. de compositione hieræ agens, lib. cata. 10. p. 100. Ob id igitur crocum prætermisimus. Nos tamen non latet vim habere coctoriam, si capitis dolorem non adferret, multumque ad cerebrum effumaret.

Sufficiunt odorata alia, quæ in clarificatione & post, suspensione sexuantur, & in syr. legata reponuntur. In hunc syr. pyretum iniicitur, quo raro utebantur in internis affectibus antiqui, sed in externis tantum vel ad pituitæ per os solutionem, vel ad dentium dolores. Ob id visum fuit prætermittere, & pro pyretro rad. enulæ campanæ, quæ ad pituitam detergendam & alterandam utilis est, vel crassam galangam, quæ ab omnibus in affectibus nervorum accommodata existimatur. Calaminthæ tres sunt species: sed parum refert, quam accipias. Secunda tamen, quæ pulegium regale vulgò dicitur, extenuat & incidit potenter pituitam. Quare putarem præferendam & usurpandam. Nota pulegium ceruinum esse diptamum Dioscoridis.

Syrupus de liquiritia.

AD expectorationem & expurgationem pulmonum valet, & hoc modo paratur.

℞. glycyrrhizæ rasæ contusæ ʒ. 2. capill. vener. ʒ. 1. fol. hyssopi viridis ʒ. ʒ. in lb. 4. aquæ fontis macerentur per 23. horas, coque ad dimidias. Expressum percoque cum mel. & sacchar. ana ʒ. 8. sapæ ʒ. 2. aquæ viol. ʒ. 6. fiat syru. Nota penidias non debere ingredi syrupos pectorales, quia incrassant, nisi ex syrupo facere voluerimus eclegmata. Hunc syr. docent præparandum multa, ut ea, ex quibus suam potissimum accipit facultatem, & effectus, quos præstare scribit Mesue. Valet enim ad tussim antiquam, ad expectorationem, non in principio pleuritidis (nam quæ constringunt & dilatationem thoracis impediunt, non conveniunt, sed quæ incrassando sistunt defluxionem, ut syr. violaceus, syr. iuiubinus, de papauere in tenuissima defluxione) sed ut Mesue docet, ad tussim ant quam quæ attenuantia & detergentia desiderat, & incidentia, qualia hic syr. habet. Dicitur de glycyrrhiza, & vires suas assumit ab hyssopo & adiantho, quam capillum veneris vocamus, quæ omnia attenuant. Recipit mel & saccharum. ob id penidias expunximus, quia syrupum incrassant. In eclegmatis ratione optima ponuntur, quia medicamenta diu in gula adherendo, aliquam partem in tracheam arteriam transsumunt. Sed in syrupis, qui non solum transglutendo

senſim, ſed bibendo aſſumuntur, vt ad pulmones veniāt, & detergeant partes, oportet aliquam tēnuitatem partium ineſſe: ſaltem non eſſe craſſos, vt qui per anguſtiſſimas vias ad pulmonem peruenire debeat. Ob id in nullo ſyru. addi debent, ſed cū modo eclegmatis vti volumus, oportet admiſcere tragacanthum, & alia viſcida. Aquam violarum ponimus, non autē roſarum, quia, hæc ſputum retinet ſua aſtrictione: illa refrigerat, citra aſtrictionem, & laxat pulmones. Item temperat ſiccitatem. Nam ſicca non debent eſſe nimium, quæ ad expectorationem inſtituuntur, ne ſputum & pituitam reſiccent & retineant: quod Gal. docuit obſeruandum, ſecundum locos, de remediis pulmonis agens. Loco penidiarum ſapam potiùs addimus, quæ deterget & leuiter conſtringit, ſi detur ad deſuxiones, compeſcit detergendo. Id Gal. ſecundū locos docens, iubet Diacodium componere cum melle, cū detergere volueris: cum ſapa, ad liſtendum fluxiones. Nam quæ detergunt, vt mel, fluxiones mouent. Hæc leuis aſtrictio ſufficiet ad partium corroborationem, quia partes dilatari potiùs, quàm conſtringi volumus ob ſuam actionem. Cæterum aquæ ſtillatitiæ adduntur decoctionibus, cū herbarum non habentur, & cū volumus, vt medicamentum penitiùs penetret.

Syrupus de praſſio.

Syrupus de martubio paratur ad pituitæ attenuatiōnem & expectorationem in hunc modum.

℞. rad. apij, ſcenic. an. 3. 5. rad. glycyrrhizæ 3. 1. ireos 3. 3. praſſij, hyſſopi recentis, capilli veneris ana 3. 6. calaminthæ 3. 5. paſſul. enucleatarum 3. 5. ficuum pinguium ſiccatarum num. 15. ſeminis maluæ, ſcenugræci, ana 3. 3. ſeminis lini & cydoniorum ana 3. 2. Decoque in lb. 10. aquæ ad conſummationem tertiæ partis. Coll. adde mel. & ſapæ ana lb. 2. fiat ſyrup.

Hic ſyru. non eſt valde neceſſarius, & ſi velint medici, poſſunt carere. Nam ſi ſyrupus de glycyrrhiza detur cum decoctione ireos, & calaminthæ, vel hyſſopi, vel praſſij, vel ſi ſyrupo de glycyrrhiza addatur ſyrupi de ſtoechade tertia pars, certè idem præſtabit, quod ſyrup. de praſſio; vel ſi ſyrupus de hyſſopo cum prædictis de-

tur. Præterea non est admodum gratus ob semen lini & fœnugræci. Recipit etiam mucilaginem cydoniorum, quæ non multum iuuat. Hic oportet marrubium & hyssopum recentem ponere, ne nimium exsiccando, sputum retineant. Adde quod marrubium viride probatur in hac compositione. Penidias expunximus, & sapam addidimus, quæ magis conuenit, sed etiam doloribus renum & colli potest conuenire. Detergit enim, & lenit partes exasperatas, & modicè calefacit. Ventrem leniendo & incidendo laxat, maximè si cum decoctione prassij & herbarum remollientium detur, & cum decoctione maluar. Alio modo capite de Tussi describitur à Mesue, & amygdalarum & pinearum nucleos, mastichem, & cinnomum recipit: sed hunc magis probamus.

Syrupus iuiubarum.

Hic syrupus quia mediocriter inspissat defluxiones attenuas, quæ fiunt, & iam factas inspissat, & deterget aliquantulum, asperitatesque asperæ arteriæ emendat, in frequentivsu est. Idcirco in officinis retinemus, qui si rectè paretur, mediùs est inter violaceum & syrup. ex capitibus papaueris, in huncque modum fit.

℞. iuiub. numero sexaginta, hordei mundati, glycyrrhizæ, capill. veneris ana ʒ. j. florum viol. seminis maluar ana ʒ. v. seminis cotoneorum, seminis papaueris albi, seminis melonum, lactucæ, tragacanthi ana ʒ. iiij. decoquantur in lib. iiij. aquæ pluuiæ, vel fontis ad consumptionem dimidiæ partis. In coll. dissolue sacch. clarificati lib. ij. ʒ. fiat syrupus.

In hoc syrupo nihil immutauimus præter ordinem, ut illa simplicia ordine, & secundum artem collocarentur, atque fructus, radices, ac hordeum decoquerentur diutius. Tragacanthum in fine ponitur, ne longa coctura totum in mucaginem vertatur. Aquæ lib. iiij. ponimus, ut in simplici legimus. Quæ quantitas sufficit, si legatur: vel legendum iudicamus, iuiubarum nu. lx. Quidam inepti legunt lib. x. non aduertentes illud l. 50. significare, non lib. Sufficerent aquæ lib. iiij. sed hæc, quæ viscosa sunt, & syr. inspissant, nõ debent multum decoqui, quod vis illa in externa parte sita sit, neque tragacan-

thum sustinet longam cocturam. Quare diutius decoquendum est hordeum. Dein iuiubæ fractæ capil. ven. & flores viol. in fine iniici debent, & hoc fuit in causa, cur minor quantitas aquæ addita sit. Sed qui non norunt naturam rerum, non possunt bene parare, & conqueruntur de viscositate. Si capita papaueris cū seminibus parantur, efficacior reddetur. Levis enim inspissatio est in solo semine. Saccharum clarificatum additur.

Syrupus de papauere.

Syrupus de papauere, quia utilis est in inspissatione, Syrupum de iuiub. sequitur, cuius descriptionem post syr. de iuiub. collocauimus, vt etiam Pharmacopolæ eo ordine disponant in officinis. Ex papauere parantur duo syrapi: quorum alter simplex, quia minus compositus: alter verò compositus dicitur. Sed horum duorum eadem est facultas. Compositum prætermittimus, sumusque contenti simplici. Nam catarrhus si in crassandus, de iuiub. aptior erit. Quòd si non sufficiat, adde ʒ. viij. syr. de iuiub. ʒ. j. syr. de pap. multumque incrassabit. Compositus tamen ad incrassandum catarrhum, & sistendum valebit magis, sed ad stuporem inducendum minus. Ob id multa sunt addita, quæ nihil faciunt ad conciliandum. His de causis minus compositum consulimus, qui parabitur cum sapa & saccharo. Qui autem cum sapa paratur, vocabitur diachodium, cum sacchar. verò syr. de pap. de quo postea vt sequitur.

℞. capita papaueris albi numero octoginta, seminis lactucæ ʒ. x. fiat decoctio in lib. iij. aquæ pluuiæ ad consumptionem dimidiæ partis. Coll. adde sacch. ʒ. viij. fiat syr. Hunc syr. parant ex cap. papaueris albi & nigri, æquali pondere & numero. Sed cum papauer nigrum sit periculosum, & stuporem inducat, vel somnum profundum, idcirco visum fuit albi quantitatem augere, & ad capita octoginta numerum reducere, & pro ʒ. x. quæ restabant, seminis lactucæ totidem addimus, vt sequamur Auic. qui iubet non esse pertranscundum, quòd pro nigro pap. seminis lactucæ ʒ. x. somnum concilient, ob cuius occasionem factus est.

Syrupus de arthemisia.

Post syr. de stæchadē syr. de arthem. poni debet.

℞. rad.

℞. rad. enulæ camp. rubiæ mai. fœni. petros. apij, peoniæ, cyperiana ʒ. j. merc. pulëgij, vtriusque calamint hæ, nepetæ, origani, melissæ, betonicæ, stechad. chamædrios, camæpith. samplici, sabinæ, marrubij, ana M. j. arth. persicariæ vtriusque ana M. ij. seminis iuniperi, nigellæ Romanæ, libistici, petroselini, anisi, costi, cubebarum, calami, asari, cardam. valerianæ, cymi. ana ʒ. ʒ. radices infundantur in aqua pluuiæ & pauco vino albo. Coquantur in eadem infusione radices primùm & herbe, postea semina, odorata sub finem, cum volueris auferre ab igne, & sint vltima: cum melle fiat syr. Dari debet cum decoctione glycirrhizæ vel passular. vt addatur aliqua vis deterforia. Quod si in decoctione parum sem. fœnug. vel rad. bismal. vel consolidæ mai. addideris, vt viscositas horum minuat asperitatem aperientium, quæ exulcerare solent eos, qui frequenter ipsis vritur, tutior erit huius syrup. vsus. Diuersæ apud diuersos reperiuntur descriptiones. Aliæ aliqua huc admittunt, quæ cum syrup. hoc pugnant, vt illa vulgaris, quæ tamariscum recipit: & alia aliæ, quæ parum faciunt. Nos verò ex omnibus collegimus hanc, in qua pro foliis rubiæ minoris, rad. posuimus, quia sunt efficaciores. Persicariam vtranque addidimus, quæ & crateogonum dicta est, & multum ad institutum facit. Deinde in ordinem reduximus, quo debet parari. Sequitur syrupum de stechade, quia fortior est ad extenuandum & ad ex-calfaciendum pituitam, & ad partium neruofarum vtriusque exsiccationem, & in catarrhis antiquis. Si cum decoctione glycirrhizæ, & quatuor sem. frig. ma. & pass. administretur, idem præstabit, quod syr. de præsio pollicetur.

Syrupus de hyssopo.

Du ego dubitavi, in qua serie hic syrupus esset reponendus, vel in numerum eorum, qui incrassant, vel eorum, qui attenuant. Nam rad. apij, fœnic. & fœnugr. recipit cum multis aliis detergentibus: sed etiam hordeum mundatum, myxa, sizipha, semen cydoniorum, tragacanthum, & semen matuariæ, quæ omnia inspissant. Sed cum incidentia & detergentia incrassantibus repugnent, putavi satius esse in medio detergentium &

incrassantium reponi, eritque nobis vsui, cum nondum erimus certi, incrassaréne, an attenuare oporteat, eaque de causa dispensandum curauimus, cuius exemplar erit tale.

℞. hyss. mediocriter sicci, rad. apij, fœnic. glyc. ana 3. x. hordei mundati 3. ℔. dactylorum à filiis mundatorum, & ficuum pinguium siccarum ana numer. x. pass. mundatarum 3. xij. sizipharum, m'xarum an. num. xxx. capill. ven. 3. vj. semi. mal. tragac. seminis cydon. ana 3. iij. Coque in lib. viij. aque ad dimidium. Expressioni adde sape & sacch. ana lib. ij. & fiat syr. Apud Mes. quæ alix descriptiones reperiuntur cap. de tussi, quarum prior parum distat à syrupo de iuiub. Altera huic traditæ non valde dissimilis. Differunt tamen, quia hæc recipit semen apij & fœnic. non rad. & anisum, illa semina cucu. Citruli ultra habet, neque dactylos neque penidias recipit. Ob id eam descriptionem volumus relinquere, ac tantum indicare semina potius, quàm rad. esse vsurpanda. Nam rad. non sunt necessariæ ad incisionem. At semina sufficient & id præstant, & flatus discutiunt, qui pituitam chymosam facientem tussim, & spirandi difficultatem inducunt, quia spatia pulmonum magis repleat. Præterea hic syrupus ex hordeo & fructibus componitur, tum flatulentis, tum flatus gignentibus, quia dulcia relaxando ventrem, multorum flatuum gignendorum sunt causa. Quare non radie, sed semina fœnic. & apij iniicimus. Quod si anisum addere volueris, erit melior & efficacior. Nam anisum præter quàm quod flatus discutiat, aliquid dulcedinis habet. Quare poterit ad expectorationem non nihil facere.

De decoctionibus.

De cocta multa in Mesuæ dispensario descripta sunt, quorum aliqua hic inferemus, & alia omnino prætermitemus, tanquam superflua. Nam talia non parantur, ut seruentur, quia seruari non possunt. & à syr. non differunt. Quod si in ysum trahantur à medicis, immutata præscribuntur. Nos hic decoctionem communem clysteris, & medicinæ & pectoralem tantum describemus.

Decoctio communis clysteris.

℞. Betæ, mal. parietariæ, branchæ vrsinæ, & mercuria. ana M. j. furs. p. j. fiat decoctio in sufficienti quantitate aquæ. Quod si addantur ʒ. ij. anisi & fœnic. melior erit decoctio. Omnia cerealia in parte externa vim habent detergendi. Item quæ easdem vires habent ut medicamenta, in æquali portione poni possunt, alioqui minimè.

Decoctio communis medicina.

Decoctum commune medicinæ, quod hodie ad dissoluenda solutiva usurpatur, sine arte & ineptè descriptum est. Fiat autem in hunc modum.

℞. hordei integri p. j. prunorum & pass. ana par. x. glyc. rasæ ʒ. ij. viol. p. j. anisi ʒ. j. fiat decoctio. Dicitur autem communis, quod nulli parti aut humori sit destinata, ut est pectoralis, qua utimur in affectibus pectoris, neque ad pituitā, bilem, vel melancholiam, sed tantum leniens ad omnia excrementa. Idcirco tamarindos expunximus, quia lædunt ventriculum, & ad bilem præscribuntur, sed cum communis pareretur, non est necesse addere tamarindos. Anisum prætermisum addidimus, quia odorata semina cum medicamentis laxatibus sunt admiscenda, ut Hipp. lib. de victu acut. imperat. Adde quod pruna & hordeum flatu gignunt, quos discutere oportet.

Decoctio pectoralis.

Decoctum pectorale dicitur, quod magis ad partes pectoris destinatum sit, quàm commune, nihilque habeat quod parti non conueniat. Sed fuit hoc non minus ineptè descriptum, quàm prius.

℞. hordei integri p. j. gly. ʒ. β. capill. ven. hyss. ana M. j. ficuum, dactylorum mundatorum, pass. enucleatarum, sebesten ana pa. vj. florum viol. bugl. ana p. j. anisi ʒ. ij. fiat decoctio, quæ vsui erit ad medicamenta laxantia pituitosa dissoluenda, utilis ad deterisionem & expectorationem in pleuritide. Istud dici potest decoctum frustum quo utendum est, ut vult Mesue, ante concoctionem. In ordinem reduximus hanc decoctionem, & addidimus anisum ob rationem superius ab Hippoc. addu-

etiam. Apposuiumus ficus, quia parti magis conueniunt,
& flores cordiales, vt borrag. & buglossi.

De laxantibus medicamentis.

Laxantia medicamenta vel sunt mollia, vel dura.
Mollia sunt, vt confectiones, vt diacassia, catholi-
con, diaphœnicum, indum maius, cōfectio hamech, hie-
ra picra, vel hiera colocynthidos. Dura sunt, vt electua-
ria, electuarius diacarth. de succo ros. de citro soluti-
uum. Vel sunt pilulæ. Hæc sufficiunt ad morbos curan-
dos. Plura ergo habere, superfluum est. Nos verò à com-
munioribus incipiemus.

Diacassia.

Ex cassia multa componuntur remedia. Hoc autem
à cassia nomen accepit, tanquam à nobiliori & præ-
cipuo. Fiunt autem duobus modis, vel ex decocto herb.
siccatarum, vel ex succis. Quare succorum tempore pa-
randa erunt. Quòd si ex decocto parare velis, id omni
tempore poteris. Hæc decoctio pro clysteribus & pro
pauperibus commune medicamentum fit ad leniendum
ventrem, sic.

℞. succorum violariæ, maluæ, betæ, mercurialis, pa-
rietariæ ana quar. j. succi absynthij communis ℥. ij. mell.
lib. ℔. fiat decoctio donec ad consistentiam aliquam, vt
mellis, reducantur. Cui adde cassiæ recenter extractæ
lib. j. misce, & seruetur vsui. Quòd si ex decoctione pa-
rare volueris, fiat hoc modo.

℞. violariæ, mal. mercurial. betæ, pariet. ana M. j. ab-
synthij communis M. ℔. fiat decoctio in sufficiēti quan-
titate aquæ, & facta forti expressione, adde mell. ℔. j. ℔.
misce, fiat decoctio ad consumptionem dimidiæ partis.
Cui adde cassiæ ℔. j. commisceantur. Hæc compositio
debet plus mellis habere propter aquam decoctionis.
Expūximus succum florum viol. sufficit succum habere
herbæ in priore: in ista etiam sufficit herba. Quod si quis
velit in decoctione apponere, nolo propter viola com-
muni opinione dissentire.

De catholicone.

Catholicon medicis in omnibus compositionibus
laxantibus in frequentissimo vsu est. Non multum
à diacassia differt, nisi quia recipit, quæ magis laxant, vt
polyp.

polyp. fenam, & rhab. Euacuat communia excrementa ventris, partim lubricando, partim attrahendo. Dicitur ob id catholicum, quasi dicas vniuersale, quod non fit vni humori destinatum & determinatum medicamentum, sed in ventre, siue bilis, siue pituita, siue feces, expellit citra calfactionem. Componitur autem hoc modo. Fit decoctio ex polyp. lib. j. & postea addito saccharo, coquatur in syrupum, qui inspissetur sequenti puluere, & cassia, & tamarindis. Puluis autem hæc recipit.

R. folliculorum fenæ ʒ. viij. rhab. viol. polyp. anisi ana ʒ. iiij. glycyrrhizæ, penid. sacc. candi ana ʒ. iiij. quat. sem. frig. ma. ana ʒ. j. Cassia & tamarindi in prædicto syrupo dissoluantur, postremo puluis. Hæc compositio delicatior & efficacior, & minori sumptu fit, faciliusque hoc modo paratur. Decoquatur polypod lib. j. & ʒ. iiij. quia polyp. crassamentum constringit plus, quam laxat, & multos flatus gignit, ventremque lædit: quare melius erit decoquere. Decoctioni addes quatuor sem. frig. ma. ana ʒ. j. anisi, viol. recentium ana ʒ. iiij. fiat decoctio in lib. xij. aquæ ad consumptionem lib. iiij. dissolue sacch. lib. viij. Coquantur in syrup. In quo dissolue cassiæ, tamarind. ana ʒ. vj. anisi triti ʒ. iiij. lyquiritiæ rasæ ʒ. ʒ. folio. fenæ pulueris. ʒ. viij. succi rosarum ʒ. iiij. fiat confectio. Alij habent, violarum recentium ʒ. iiij. anisi ʒ. j. In dissolutione verò cassiæ, tamarind. ana ʒ. viij. anisi triti ʒ. ii. Hæc confectio sine rhab. imperatur, quia Pharmacopolæ non apponere solent, nisi vel antiquatum, vel corticem, vel frustula, quæ asseruant, cum infusiones ex rhab. parant. Quare satius erit non iniicere, quam tale. Magis enim constringit, quam laxat, maxime in substantia. Quare nos succum rosarum substituiamus, quia laxat ventrem trahitque biliosa & aquosa, vt rhab. Dosim. auximus, vt efficacior redderetur & in minori quantitate laxaret, ne hæc compositio molesta sit ob eius molem. Quod si succus ponatur, erit minoris sumptus, & pro pauperibus etiam sic parari poterit. Nisi vereretur reprehensionem, pulpam prunorum pro tamarindis apponerem, tum quia si sint acida, maxime bilem extingunt & ventrem laxant, vt tamarindi, tum quia paratu erit facilius. Frustra enim quæruntur exo-

tica, cū ex nostris medicamenta parari possunt. Penidias & saccharum candum addimus, ad 3 ℥. In hac compositione accipiuntur 3. viij sacch vbi nulla amara reperiuntur. Penidiæ ad inspissationem adduntur. Quare minorem quantitatem decoctionis accipiendo, vel inspissando magis, ob succum ros. & lyquir additam, similem consistentiam addemus compositioni.

De diaphœnicon.

Diaphœnicon à dactylis nomen accepit, vt empl. diapalma, diaphœnicum, diachalciteos. Hęc autem compositio ad euacuandos crassos humores facta est, quia in frequentissimo vsu est, erit hoc modo paranda.

℞. dactylorum mundatorum à filis. & pistatorum & infusorum cum vino albo per triduum lb. v. vel 3. 50. pinearum cum aqua hordei decoctarum 3. 40. turbith. 3. 35. (turbith apud Arab. accipitur pro omni radice purgante pituitam crassam & viscidam) amygd. dulciū mundatarum 3. 30 scammonij 3. xij. (scammonium decoctū in malo cotoneo abiici debet. & caro cydoniorū retineri) zinziberis, piperis longi, cinamomi, macis, galangæ, ligni aloës, fol. rutæ siccorum, anisi, scœn. seminis pastinacæ agrestis, vel domesticæ ana 3. ij. ℥. Cinamomum omnium humorū vitia emēdat. Hęc compositio paucis immutatis optima erit ad pituitam crassam & lentam euacuandam. Dici poterat ex turbith, vt melius intelligeretur. Dactyli sunt eligendi recentiores, qui non sunt immaturi. Nam maturi habent etiam astrictionē sufficientem ad scammonij correctionem, & immaturi nimium constringūt pro compositione pituitosa. Nam, vt docet Gal. i. ad Glauc. absynt. quod calidum est & siccum, non conuenit in pituitosis affectibus ob astrictionem. Aliud enim est medicamētum ad crassos crudosque humores, aliud ad tennes parare. Scammonium, vt dictū est, castigari debet in biliosis medicamētis. In pituitosis verò satis est, si aliqua sint lenta, vel crassa, quæ eius tenuitatem castigēt, & ob id maturos dactylos volumus, quanquam Mesue aliter videatur imperare secūdum interpretationem aliquorum, per flauos intelligētes immaturos. Nam immaturi cholicū dolorem augerent, nō curarēt, neque etiam ob morbū cholicum, quem curare dixit, in aceto mace;

macerare oportet. Acetum nanque constringit, & morfu suo intestina lædit dolentia. Quare in vino albo macerandos dactylos iubemus triduo, & in vase vitreato, ne ex ære, aut alia quapiam materia aliquid mali contrahant. Si autem molles sint satis, non erit opus maceratione. Si duriore, diutius macerentur. Quod si in aqua & vino calidis macerentur, citius mollescunt. Cōtunde diligenter, & per cribrum modicum, tum amygdalis simul tufis trans mitte. Postea accipe mellis libras vj aque & vini infusionis dactylorum libras xij. Decoquantur & despumentur, donec relinquantur lb. iij. & ad consistentiam mellis, reliqua tusa & puluerisata misce, fiat confectio. In hac compositione non cōueniunt authores. Alij enim penidias ex aqua hord. paratas, alij verò pineas legere volunt, id est, nucleos pineæ. Legendum tamen videtur, pinearum, quia magis conueniunt ad pituitæ præparationem. Detergunt & expectorant. Et quemadmodum amygd. iniicere iussit, sic censeo nucleos pini intellexisse. Auget suspicionem, quod in quibusdam exēplaribus legitur, coctarum in aqua hord. melius, infusarum in aqua hord. amygdalæ & nuclei, ne pinguescant, in aqua frigid. macerantur. Sed hīc, vt magis detergant, in aqua hord. macerantur. Quod si quis penidias velit admiscere, non multum peccabit. Nam & penidiæ, si ex farina vel decoctione parentur, detergunt leuiter. Lignum aloes, quia verum non affertur, habetq; saporem ingratum, visum est illud auferre. Quod si quis santalū citrinum, vel cinamom. velit substituere, magis gratum reddetur. Pro dauco semen pastinacæ agrest. vel domest. ponimus, quia succedanea sunt. Mel despumandum, & decoquendum in ea aqua & vino, in quo dactyli fuerunt macerati, vt si quid viriū deposuerit in infusione, restituatur, efficaciorque erit hoc modo parata, eritque medicamentum pituitosum, & cholicū dolorem sedans, quia pituitā soluit, & non habet ea astringentia, neque cassiam, quæ tormina excitare posset, & in diuturnis morbis efficacissimum medicamentum de turbith hoc tantum dicā, quod radix est cineritia & alba, pituitā soluens crassam, neque amara, vt agaricus. Quod si quis vero & bono turbith destituatur, agaricum infusum in melle substitui potest

Nam ob cinamomum, galangam, anis. piper, fœnic. & daucum, pituitam crassam soluet, & à longinquo purgabit. Nulla compositio est in Mesue, quæ sit cum ista com-
paranda, tum quia nulla alia medicamenta, quæ molem augent, recipit, & quæ recipit, odorata sunt, ventrisque & ori non ingrata. Respondet quodammodo Indo maiori, sed in alia forma, Arabico more descripta, pituitosis medicamentis astringentia addita sunt. Recipit enim succum apij fœnicul. cotoneorum, granatorum, & multa odorata astringentia, ut ros. santalos, & alia multa, quibus posset carere. Hac medicus ad pituitosos morbos contentus esse potest. Nam iisdem medicamentis laxantibus constat, scammonio, scilicet, & turbith. Quod si quis velit uti in articularibus morbis, timeatque nimiam humorum digestionem, addat myrob. vel rhabarb. in substantia. Illa laxabunt, & constringent. Sed in articulari morbo cum materia defluit, non oportet medicamentis fortioribus mouere. Idcirco hæc vsui erit tempore, quo consistit fluxio.

De Indo maiore.

Indum maius subiunximus, non ut dispensetur, sed ut videant non multum differre à diaphænicone, & quibus abundat, potius deteriorem confectionem faciunt, quam meliorem, nempe istis astringentibus additis, & copia attenuantium, quæ augēt molem & calorem eius.

Huius permixtio talis erit.

℞. cinamomi, garyoph. spicæ nardi, ros. cassiæ lignæ, macis, cyp an. ʒ. iij. santali citri. ʒ. ij. ℞. aloes, nucis mose. an. ʒ. ij. turbith electi ʒ. j. (lignum aloes & succus cydon. non conueniunt compositioni Indi maioris) sacch. penidiati ʒ. xx. galægæ, heil, id est cardamomi, asari mastic. an. ʒ. j. ℞. diagridij ʒ. xij. omnia cum oleo amyg. foueantur, deinde accipe succi cydon. succi granat. apij, fœnic. an. ℞. ℞. coque cum melle ad spissitudinem, & confice cum speciebus. Pro Indo maiore, diaphænicone utendū censeo. Quod si velis magis attenuare, dissolue in aquis petro. vel adde dissolutioni syr. de stæcha. ʒ. j. ℞. pro dosi, & omnino similis erit. & eadem præstabit.

Confectio hamech.

Confectio hamech non est prætermittenda, vtilissimum

mum enim est medicamentum ad ichores humorum prauos euacuandos. Sed ratio est componendi docenda: non enim sine magna molestia & difficultate paratur.

R. myrobal. citrinorum ʒ. iij. chebulorum nigrorum, rhab. ana ʒ. ij. agarici, colocynth. polyp. an. ʒ. xv. absynth. thymi, senæ ana ʒ. j. viol. ʒ. xv. epithymi ʒ. ij. anisi, ros. recent. (ad odorem, aperitionem & corroboracionem) fœnic. ana ʒ. vj. succi fumariz lib. j. prunorum numero lx. vuarum, passul. mundatarum ʒ. vj. macerato dies, quinque in sero lactis sufficienti quantitate, in vase vitreo strictioris, & obtura, semel deinde feruefiant, fricentur, & collentur. Coll. adde cass. fist. purgatæ ʒ. j. tamarind. ʒ. v. mannæ ʒ. ij. frica manibus, colla, percoque ad mell. spissitudinem cum lib. j. β. sacch. & ʒ. j. β. scammonij. Postremo die adde myrob. citrinorum, chebul. & ind. ana ʒ. β. bellericorum, emblicorum, rhab. seminis fumar. an. ʒ. iij. anisi, spicæ nardi, ana ʒ. ij.

Hæc compositio videtur nulla arte composita & contra theoremata à Gal. Mesue, & aliis tradita. Nam infunduntur diutius & concoquuntur, maxime inæqualia, vt polyp. myrob. agaric. colocynth. flores viol. ros. epith. thymus, rhab. Polypodium quidem coquendum & macerandum, flores minus, epith. rhab. non diu, ne vires resoluantur, vt neque flores. Quare videntur illa infundenda solum, quæ dura, vt facilius eorum vis & succus eliciatur, vt ea quæ astringunt magis, quam laxant, vt in myrob. & rhab. experimur. Nam facultas laxas, quæ sita est in tenuiori parte, evanescit longa coctura, & astringens magis adaugetur. Quamobrem nos hoc modo parabimus, polypodium in sero lactis capræ, vel asinæ maceretur per 24. horas, cū passul. & absynth. ac decoquantur. Nam diutius seruatum serum putrescit. Deinde iniiciantur semina fœnic. agar. colocynth. thymus, epith. sena, violæ, rosæ, in sufficienti quantitate feri, id est, in ʒ. lb. fricentur manibus, & collentur. Coll. adde lib. j. β. sacch. Coque ferè ad spissitudinem mellis, postea adde succi fumariz lib. j. Deinde dissolue cassiæ, tamarind. maceratorum in vna decoctionis parte ana ʒ. v. mel. viol. ʒ. ij. Reliqua omnia in puluer. redacta incorporètur, fiat confectio hoc modo. Succus nō decoquatur, neque aliz,

quæ paucam aut nullam sustinent decoctionem. Quod si quis myrob. confricatas in succo ros. & tamarind. coquere velit, modò non diu coquatur, non repugno. Sunt enim laxantes: si decoquantur, inutiles redduntur. Hac compositio efficacissima est. Quare in minori quantitate danda est. Quod si cum decoctione mercurialis detur, serosa magis purgat. Colocynthis & agaricus in panno liganda, vel per collum collanda, ne agarici aliquid & colocynth. descendat. Aliud animaduersione dignum de feri decoctione. Serum ad purgationem eligi debet, quod magis est acre vel aquosum. Vtile est camelinum, vt & asininum. Multum feri habent, & laxant, & detergunt magis. In horum penuria caprinum, quod acre est, & agninum vel ouile. Serum minus laxat, & bene separandum est à lacte. Nam casealis substantia sistit, & non laxat, idque citius coctione longa, quàm florib. chamaeleontis: separare oportebit, & vtédum postea. Prohibeamus ne per quinque dies macerentur. Nam passul. & seram ipsam confectionem acidam redderent, & putresceret, tandémque medicamenta corrumperebantur. Sufficit igitur macerare 20. horis, & diutius eoquere.

Triphera persica, id est, delicata.

Tripheram persicam post cōfectionem hamech collocauimus, propterea quòd non multum sunt dissimiles in euacuando, nisi quòd confectio hamech ventrè lædit ob diagridium & colocynth. Triphera verò ventrem refrigerat, relaxatum cōfirmat, purgat ferè omnes humores cūa strictione & refrigeratione. Recipit autem succorum solani, intybi, lupuli purgatorum an. lib. ij. In quibus coque prunorum numero 50. follie. senæ orientalis 3. ij. viol. recentium lib j. ag. 3. j. cuscute 3. ss. spicæ nardi 3. iij. Decoquantur lento igne succi, donec ad lib. j. redeant, & in fine iniice epith. 3. iij. myrob. citrinor. ind. chebul. conficatorum in oleo amygd. amararum ana 3. ij. feruefiant: parum collentur, & in vna parte decoctionis dissolue tamarind. recent. 3. iij. pulpæ cass. 3. iij. mannæ 3. ss. Per setaceum collato, vt separentur semina & cortices. In altera parte decoctionis & lib. ij. acet. vini albi dissolue sacch. lib. iij. Coquantur ad mellispissitudinem, cui misce omnia dissoluta. Modicam coquantur

quantur lento igne, cui inspissationi adde rhab. tenuissimè puluerisati ʒ. ij. myrob. citrinorum ʒ. β. chebul. & ind. an. ʒ. j. bellericorum & emblicorum an ʒ. β. seminis fumariz. trochiscorum diarrh. abb. macis. mastiches. cubeb. antispodij, sandali citrini, quat sem. frig. ma. minutim incisorum an. ʒ. j. β. anisi ʒ. j. spicæ nardi ʒ. ij. Triphere multæ sunt species, sed hanc inter alias vsurpamus, quam vtile est paratam habere. Laxat enim & constringit citra calfactionem, neque nimium laxat aut cōstringit. Hoc tamen mutamus, vt confricentur myrob. oleo amygd. dulciū. Quod si timeatur nimia astrictio, confricentur oleo amygd. amararum. Iterum est vt antispodiū vocatum, non spodium, antispodium scilicet, quod ex arbore vel fructu constringente paratum est: quale illud est ex ramulis myrthi, vel oleæ, vel oleastro, vel malis cotoneis. Videtur hæc compositio nimium resiccare. Sed quia datur in affectibus intestinorum humidis, ob id hoc medicamentum factum est. Sed hæc siccitas, cassia & florib. viol. temperatur, castigaturque sufficienter quatuor sem. frig. ma. Si quis sacch. rubrum vel mel. pro manna in illa decoctione ponat, medicamentum non minus efficax erit: sic nec si pro rhab. succum ros. quis ponat, parua illa quantitas nihil potest, vel nihil aliud, quam mel, potest præstare. Detergit enim leuiter, quod mel viol. vel ros. simplex potest maiori pondere.

De citro solutiuum.

IN nostris offic. dispensatur electuarium in forma tabellarum quod effectū respondet diacarthamo, vocaturque elect. de citro solutiū, ad differentiā non solutis. A diacarthamo nō multum differt, nisi quod hoc puitā crassā magis attrahit ob turbith. Altero illorum carere possumus: sed quia est apud nos in maximo vsu, & castigata à Domino Falcone, nolui ego prætermittere. Substitui potest in locum diaturbith, quod est medicamentum purgans, ex cortice citri, scammonio, & turbith, cōpositum à recentioribus. Electua. de citro compositum ad euacuandam puitam bili permixtam, non recipit crassa & astringentia. Quare in puitosis febribus non erit reiiciendum. Recipit pul. diatragacanthi frigidi cum diacarthamo, & carnem cydoniorum, & alia,

quæ pituitam detergunt : alia quæ attenuant , & ad iuncturas deducunt , vt in diacarthamo. Quare in morbo articulari diach. erit ex vſu: hoc verò in morbis pituitosis , ſi ſine affluxu ſint. In educatione pituitæ crassæ ſemper aliqua humida ſunt permiſcenda, ne nimium deſiccata pituita educi nequeat. Compoſitio talis eſt.

℞. confer. cort. citri, viol. borrag. ana 3. x. pulueris diatrag. frig. turbith, diagrid. ana 3. j ſacch. lb. ij. miſce , fiat elect. Hoc medicamētum corticem citri recipit pro materia , & medicamento ventriculum reſiciente , & quia minus aſtringit, cum turbith magis conuenit, & in morbis magis pituitosis non eſſet reiciendum, ſed potiùs eligendum, quia hæc compoſitio ad pituitosa eſt , ad quæ detergenda mel eſt optimum & magis aptum. Coſerua bugl. borrag. & viol. magna vtilitate ponuntur, quia humidæ cum ſint , ſiccitatem & calorem turbith & diagridij ſua humiditate temperant, & prohibent, ne pituita exiccata difficilius expellatur. Nā, vt Gal. ait de pleurit medicamen. aliquod miſcendum medicamentum humidum, ne pituita exicceretur in thorace. Pituitam educentia proſunt magis in forma pil. idque propter longam moram, quæ eſt neceſſaria ad pituitæ craſſitiem. Turbith & diagrid. ponuntur æquali pondere, quod minus probo. Mitius eſſet, ſi diagrid. minori quantitate poneretur, vt potiùs iuuaret operationem turbith, quàm ſuā, niſi bilem traheret. Hoc medicamentum magis pituitosum eſt , quia ſi bilioſum eſſet, non adderetur turbith, quod craſſam pituitam trahit. Sed quando trahenda eſt pituita craſſa , oportet iuuare actionem illam minima quantitate diagrid. quod accelerat turbith operationem. Quare optimum erit, vt diagridij 3. ſ. tantum ponatur. Nonnulli ſacch. lib. iiij. nos autem lib. ij. adiungivolumus, ne augeatur mole. Medicamētum efficacius erit cum diagrid. doſim minuerimus. Reperitur & alia deſcriptio, quæ in hoc tantum ab hac differt quod conſeruam viol. non recipiat , quæ magis refrigerat & humectat, ſed bugloſi. Sed hæc differentia non eſt magna.

De diacarthamo electuario.

IN forma ſicca fit electuarium hoc, quod pituitam purgat ſatis potenter , & recipit detergentia & pituitam

ducentia

ducentia, & ad accelerationem, aliquid diagridij. Vis medicamenti nonnunquam tanta est, vt à iuncturis trahat. Præparatur autem hoc modo.

℞. diatragacanthi frig ʒ. ss. carniū cydoniorū ʒ. medullæ carth. ʒ. iiij. zinzib. albi ʒ. ij. diagridij ʒ. ij. turbith albi ʒ. vj. mannæ granatæ, mell. ros. collati, ana ʒ. j. sacch. candi ʒ. vj. hermodactylorū ʒ. iiij. sacc. in aqua dissoluti, q. s. fiat electuarium, in tabellis. Hæc compositio est Arabum, quia solent semper ad corroborationem ventriculi & hepatis aliqua astringentia addere, vel ad impetum diagridij & turbith compescendum. Si penidia ponerentur loco tragacanthi, vel loco carniū cydoniorum, compositio magis communis esset ad omnes affectiones pituitosas. Hanc compositionem aliqui non intelligentes componendi rationem vituperant, sed nulla ratione, quod efficacior sit, soluâtque nimium. Sed istis respondebimus medicamenta fortia in minori quantitate assumpta esse debilia. Præterea non animaduertunt hanc compositionem factam esse ad pituitæ euacuationem, quæ si à medicamentis siccioribus trahatur, propter exiccationem tenuioris partis difficillimè euacuatur. Vt igitur tēperetur siccitas medicamentorū, admiscunt diatragacanthum frigidū, & vt facilius purgetur, mel & saccharū ad deterfionem. Et quia hac compositione vtūtur in morbo articulari, addiderūt carnem cydoniorum. Sed multò meliūs esset corticem citri conditi apposuisse, vel dactylorum carnem coctam & contusam, vt in diaphernicone. Desideratur in hac cōpositione parū anisi ad flatuum discussionem. Nam hæc laxatia & dulcia solent flatus gignere, quanquam zinziber incidendo pituitam & calfaciendo id facere potest, sed non sufficienter. Quare si anisum, & fœ. ic. addideris, soloet cum minori molestia & læsione. Valet hæc compositio in pituitosis, biliosis, & melancholicis affectibus, sed in melancholicis si datur cum decoctione melancholiæ purgante. Minus conuenit in biliosis. Carthami medulla pituitam purgat, & reddit corpus immune omnium obstructionum. Diagridium purgat bilem. Ponitur autē in medicamentis articularum ob duplicem rationem, tum quia facit medicamentum penetrare & operationem accelerat, tum quia

morbus articularis ex sola pituita non fit, sed bili admixta. Quomodo enim posset pituita in articulos penetrare ac peruenire, nisi opem ferente bile? Quòd si diagridium penetret, purgétque bilem, ideo morbis articularum conuenit. Prodest ad euacuationem cholerae & phlegmatis. Purgat enim pituitam propter turbith, & medullam seminis carthami: bilem verò, propter diagridium. Adhæc purgat humorem melancholicum, & ego multas febres quartanas curauí vsu diacarthami potius, quàm confectionis hamech, aut alio modo.

Electuarium de succorofarum.

EX succo rosarum paratur electuarium bilem flauam euacuans fortiter, neq; admodum calfaciens, quòd in forma opiatę parari potest, vel in forma dura & sicca. Et quia aliqui sicca libentius, quàm humida accipiunt, optimum erit in formam tabellarũ reducere, vt maiores consueuerunt. Huius medicamenti vice multę sunt descriptiones etiam in eodem antidotario, ita vt in dubio sit Pharmacopola, quā debeat eligere. Quare non erit præter institutum indicare, quæ omniũ magis probanda sit. Alia enim est Nicolai, alia Mes. alia Syluij, quæ est secunda Nicolai parũ mutata. Sed nos illam secundã magis probamus: Alia Tralliani, sed cur descriptionem Nicolai potius, quàm aliorum prælegerimus & retinuerimus, danda est ratio, ne temere aut malo animo id factum esse existimetur. Nicolai compositio quia efficacior & paratu facilior, idcirco à nobis eligitur. Illa verò Mes. maiorem quantitatem trochiscorũ recipit, quia nimium astringunt, & simul alia calida habet, vt galliam & crocum, quæ nihil aliud efficiunt, quàm corpus calfaciendo febrem ac bilem accendere, neque hoc impedire possunt trochisci oxyacanthæ, id est, berberis. Molem etiam augendo medicamentum reddunt imbecillius, vt maior quantitas danda sit ægro magno cum eius fastidio & sumptu. Altera quæ ad Syluium refertur, quæ parum ab illa Mes. differt, media est inter Mesuæ & Nicolai compositionem. Ob id paulò melior, quòd expunxerit trochiscos de spodio, & trium sandalorum genera substituerit an. 3. vj. ex Nicolai compositione mutuò accipiēs. Crocum abstulit, gallam moscatam reliquit, sed cum melle

melle & sacch. parandum docet, quod fieri non potest. Nam parum conuenire videtur mel, quia hæc compositio ad bilem, non pituitam paratur. Adde quod mel biliosis aduersum est. Præterea humidius redderet electuarium, nec posset commodè in formam siccam reduci. Denique moles eius aucta est multis medicamentis castigantibus & corroborantibus, quibus non erat valde opus. Nam scammonij calor, tenuitas & malitia satis ex succo rosarum, sandalis & antispodio castigatur. Quare non est opus plura addere. Molem enim augent. Nicolai descriptio talis est.

℞. sacchari solidi, succi ros. ana ℥.j. & 3.4. omnium sandalorum an. 3.6. spodij 3.3. diagridij 3. 12. caphuræ ʒ. i. Caphura calida est tenuium partium, quæ si pura est, species est asphalti: si spuria, sublimatio mastiches. Nos verò hanc descriptionem sic castigamus. Pro spodio fennæ, vel pro ebore ponatur antispodium ex malis coroneis, vel myrtho paratum, vt docet Dioscorides capite de Antispodio. Nam malum coroneum aliquam habet societatem cum diagridia, & illud antispodium aliquam seruat astrictionem, ad scammonij præparationem & ventriculi corroboracionem. Et postquam illud ponitur, pro diagridio scamnoneum ponemus, & efficacius erit. Caphuram expungendam censemus, quia nimis tenuium est partium, & calfacit potius, quàm refrigerat, quod inutile est ad bilem. Ingrato enim odore suo caphura hîc non conuenit. Tenuitas verò partium in medicamentis soluentibus est fugienda. Nam deducit ad cor, & per abditissimas ventriculi partes purgans medicamentum, quod ex genere venenosorum. Præterea hæc compositio plura resiccantia recipit, quæ ex accidenti retinent. Caphuræ loco mastichen reposuimus, quia plus astrictionis, & minus tenuium partium, & ventriculum iuuabit. Quod si quis gummi tragacanthi ʒ. i. velit substituere, melius erit. Apud Trallianum reperitur etiam descriptio, vt docet Syl. in com. Mes. quæ non ad bilem, sed ad bilem & pituitam euacuandam, & articulare morbum facta est, propter succum ros. & scammonium. Recipit piperis 3. i. ag. 3. ʒ. paraturq; cum melle, hoc medicamentum, quod propter mel & piper calidius est, quàm

oportet esse medicamentum laxans bilem, quæ calidissima est, & tenuissima, quæ diffuat in articulos. Hoc prudenter factum est quod 3 ss. agar. addita, si poneretur 3. j. bilem traheret. Sine pipere oportebat esse. Quod si ad pituitæ attenuationem, oporteat agaricum esse, in minori quantitate poni debet. Adde quod zinzib. magis, quam piper cum agarico conueniret. Hæc compositio Rhodomel Actuarij est, si piper auferatur. In eodẽ Alexandro reperitur alia huius cõpositionis descriptio, quæ talẽ esse oportere docent rationes nostræ. Quare ita fit.

R. succi viol 3 2. aut 3. scammoni 3. i. lactis tithymali 3. 2. (scammonium semper ponitur in compositiõne, in qua sunt astringentia, non autem diagridium) mell. attici lb. 1. Hæc compositio efficacior est, propter lactithymali magis venenosa. Mel additur, quo ventriculus roborari possit, vel impetum & acrimoniam obrundere. Quare illa Nicolai omnibus præponenda, quam correximus, ut sequitur.

R. sacch. solidi, succi ros. ana lb. 2. & 3. 4. omnium sandal. ana 3. 6. antispodij ex cotoneis, vel myrtho 3. 3. scammoni 3. 7. mastiches vel gumm. tragacanthi 3. 1. ss. fiat electuarium in tabellas. Seruetur in arca lignea, loco sicco. Est cholagogum forte, quo utendum in biliosis affectibus, qui non sunt cum defluxione. Nam si cum defluxione essent, tunc rhab. adiungere, deberemus vel myrob. & hoc in morbo articulari à bile tacto. Paranda est hæc compositio, dum adhuc succus ros. est recens. Antiquatus enim redditur crassus & minus laxans. Antispodium abluendum est, ut empireuma deponat. Sandali dicuntur refrigerare, quod de citrino, vel rubro dubitandum est. Sed nihil impedit ex diuersa substantia lignea, sanda. tenui, scilicet, calida & terrea cõstare. Nuxmoscata omiſſa est in hac compositiõne, quod vomitum moueat, nisi fuerit omphacina, ob abundans oleum.

Arom. iticum rosatum.

IN officina, ut bene instructa sit cõfectiones, ut vocant Paromaticas esse oportet, & in forma pul. & in forma opiata. In forma cõfectionis parantur, quæ vulgò Aromatica vocantur ab eo, quod vincit, ut garyophyllatum à garyophyllis, aromaticum rosatum, à rosis. Et quia à diuersis

À diuersis fuerunt, hæc variis descripta sunt modis. Idcirco delectus est habendus, vt in aromaticis est aromaticum ros. descriptione Gabrielis receptum à maioribus nostris, quanquam illud Mesl. non minus laudandum sit. Est & aliud nardinum, & aliud moscatum: sed quia vsus recepit, illud etiam retinendum censemus, & aromaticum moscatum, de quo suo loco dicemus. Possunt hæc omnia antidota vocari, quia ad morbos longos, & ad venenata valent talia medicamenta. Antidotus aromatica ex Ioanne Damasceno descriptione Gabrielis, recipit varia medicamenta preciosa, vt,

R. ros. rub. amotis vnguibus 3. 15. gly. r. asæ 3. 7. cinnamomi electi ʒ. 5. sandali moscatelini (pro ligno aloës, quia amarum) sandali citrini ana 3. 3. macis, garyophyl. ana 3. 2. ss. gummi Arab. tragacanthi leuiter assatorum ana 3. 2. & ʒ. 2. spicæ nardi 3. 2. nucis moscatæ, cardamomi, maceris, galangæ ana 3. 1. ambre ʒ. 2. moschi ʒ. 1. syru. conseruationis corticis citri q. s. pro facienda confectione, vel sacch. dissoluti in aqua mentæ, vel absynthij stillatitia. Fiat ex eo electuarium siccum, vel cum vino & paucis sacch. excipiantur, & fiant trochisci. Hanc compositionem retinendam ad affectus intestinorum ventris, hepatis, & splenis, frigidos & humidos censemus. Nos in ordinem redeimus, quo debet simplicia collocari, & nullorum pondus immutauimus. Lignum aloës, tanquam adulterinum, & raro inuentum, expunximus. Sandali partem internam, quæ muscatelina, ab odore grato est, non minus siccam, non minus odoratam, neque à calore multum discedit. Et si sandalum vulgò frigidum existimetur, est tamen cal. vt sapor acris post masticationem, & odor indicat. Sed de ejus viribus plura suo loco. In eius locum posuimus, quod in aliis omnibus compositionibus ubi similiter occurrit, substituendum putamus. Sed ne quis miretur, quod aliquando citrinum, loco ligni aloës, ponamus, huic sic respondemus, hoc à nobis fieri, quando citrinum alioqui non recipit compositio. Perpetuum enim magis placet moscatelinum. Quod si desit moscatelinum optimum & verum, citrinum odoratissimum eius loco sumetur. Gummi tragacanthi, & arabicum expungere nolimus, quanquā sint emplastica viscosa, sed

quia siccant parum, iniiciuntur, vt etiam alia aliquando hærere faciant in tunicis ventris: quam viscositatem, vt quodammodo dimitterent, assari imperauimus. Quod cum syr. conseruationis citri excipiantur, prætermisso syr. ros. laxatiuo, vel viol. id fecimus, vt medicamentum hoc esset magis accommodatum scopo, cuius gratia paratur. Fit enim ad ventris actionem tuendam, calfaciendo & siccando. Redderetur autem minus cal. & minus astringens. Et quia ad tabellas parandas opus est pul. in pul. etiam iussimus fieri. Et quoniam, vt cap. de trochiscis docebimus, hæc forma medicamentorum conuenientissima est ad odorum conseruationem, imperauimus, vt vino exciperentur, & in trochiscos redigerentur. Cum tabellas parare vellent, sacch. dissoluant, & decoquant in aqua mentæ vel absynthij. Hoc aro. ros. sufficit habere paratum pro aromatico ros. Mes. & aro. garyophyllato, pro confectioe diacynamomum, pro diatrium pipereum, diacalametho, diospolitico, & est grauisimum ob odoris & saporis suauitatem.

Aromaticum moschatum.

Aromaticum moschatum à moscho dictum, quia efficacissimum est ad syncopas & alios affectus, in quibus utilia sunt odorata. Præterea in multis aliis censerem odorata auferenda, quia in multis morbis non conueniunt, vt in affectibus vteri qui per consensum fiunt, vt in dolore capitis, epilepsia, vertigine, & scotomate, nec in vterinis affectibus omnibus neque aegris omnibus, vel quia offendentur odoratis, vel quia hæc faciunt remedia multum preciosa & chara. Quod si margaritum frigidum, vel calidum, vel aro. rosatum, vel alia medicamenta, quæ hæc omnia recipiunt, sine istis parentur, liberum esset Medicis ea addere, & Pharmacopolæ, cum Medici imperarent faciendum, grana aliquot iniicerent. Hoc non esset molestum, neque Medicis imperare, neque Pharmacopæis facere, & ne deciperentur, admonere illos oportet, vt parent etiam pul. alios sine moscho & ambra, & sine auro & argento: neque existimandum ista esse tam necessaria, vt his carere non possimus: Nam & Gal. & Hipp. sine istis curarunt, & felicissimè. Nos tamen illud apponemus.

℞. cina. ʒ. x. sandali moscatelini (pro ligno aloes) ʒ. 7. ambra ʒ. 3. moschi ʒ. 2. in aqua ros. in aqua maceratum

fit gummi tragac. fiant trochisci, seruentur vsui in vase vitreo & loco minus calido. Odoratus esset, & paratu facilius, si moschus poneretur ad 3. 2. & ambra ad 3. 1. Nam plus moschi non adulterati reperitur, quam ambra, & frequentius minori precio venditur: & cum sint eiusdem facultatis, nō mutatur vis medicamēti. Hoc faciendum docebat dominus Falco in cōpositione illa nobilissima alkermes, siue ex cocco. Duplicāda erit quantitas huius compositionis, si ad alium finem pręparetur.

De auro & argento.

IN multis nobilissimis aurum & argentum reperiuntur. Posset parari mixtura ex auro & argento, vel haberi limatura vtriusque, & quando opus est ditiorum medicamentis addere.

De pulueribus, & primū de diambra.

Officinæ habere debent in forma puluerum diamargaritum frigidum, diarrhodon, triasantalon, diambra, diamoscum. Diambra nobile antidotum parari potest, vt diamoscum, qui vnum eorum habebit, altero potest carere. Diambra hæc recipit.

℞. cin. electi, doronici, caryoph. macis, nucis moscata, folij, vel spicæ nardi, galang. an. 3. 3. santali citrini, & moscarelini (pro ligno aloës) 3. 2. zinzib. 3. 1. ℞. spicæ indicæ, siue nardi, cardamomi, maior. & minoris, ambrae an 3. 1. moschi 3. 1. ℞. sacch. q. s. fiat in formulis, vel cum aqua florum citranguli ex infusione tragacanthi fiant trochisci parui. Seruentur vsui. In hac compositione situm medicamentorum restitui. Sandalum substituitur loco ligni aloës. Folium quanquam non sit, illud antiquorum, pro quo Gal. spicam nardi substitui vult, cum sit eiusdem facultatis, & nihil refert, etiam si ingreditur, in trochiscos redigi vellem.

Diamoschum.

Diamoschum prætermittendum puto, tum quia eo carcere possumus ob paratam diambrae confectio-nem, quæ facultatis similis est tum quia huius medicamenti varia est apud eundem authorem, & apud diuersos descriptio. Auic. septem descriptiones ponit sen 5. summa 3. trac. 3. Rasis ad Almanf. vnam, Serapio aliam, Aëtarius aliam. Ob multitudinem huius descriptionis

fatius est relinquere. Adde quòd multa recipit, quæ parum probanda sunt, vt vtrunque behen. Quòd si tantopere desiderarent, ob moschi vim, augeant quantitatem moschi in diambra, & plura præstabit, quàm illud incertum & dubium medicamentum.

Diarrhodon abbatis.

EX ros. multa collyria, & alia medicamenta diarrhodon vocantur. Sed cum nos diarrhodon dicimus, neque de electuario solutiuo ex succo ros intelligimus, sed pul. gratissimum & efficacissimum, ad corroborationem viscerum cum aliqua leui apertione, citra calfactionem, cum leui refrigeratione. Quia verò multæ sunt eius descriptiones, magis mihi placet illa Abb. ob id illam retinimus. Nam communis Mesuæ plura astringentia recipit, Iulij verò, plura calida. Mihi non placent illæ compositiones, quæ discedunt à facultate illius medicamenti, quòd nomen indidit compositioni, vt in syr. de hyss. factum est, & aliis multis. Illa descriptio non in omnibus eadē est, sed quæ sola dosi in aliquibus, vel quādo aliqua, quæ aliquid mediocriter faciunt, auferuntur, vel adduntur, non debemus descriptionem reiicere. Vix enim est vllum medicamentum, diuersis in locis traditum, in quo non liceat aliquid discriminis inuenire, vt de hiera Gal. videre est, de magmate hedicroi, theriaca. Nobis autem descriptio hæc magis placet.

℞. ros. rub. sacchar. candiana ʒ. i. & ʒ. ʒ. santal. albi & rub. gummi tragacanthi & Arab. leuiter torrefacti ana ʒ. ʒ. ʒ. cineris ossis elephantis aliàs, cerui vel antispodij, myrthi, asari, mastiches, spicæ nardi, cardamomi, croci, sandali moscatelini vel citrini (pro ligno aloë) garyoph. galliæ moscatæ, anisi, scenic. cinamomi, seminis ozimi, berberis, seminis scariolæ, seminis intybi, seminis myrthi, sem. portul. peponum, cucum. cucurbitæ, citr. mundatorum, & nimium incisorum, semin. papaueris albi ana ʒ. i. margaritarum, ossis de corde cerui, vel leonis, vel bouis ana ʒ. i. ʒ. camphoræ gr. 7. moschi gr. 3. & ʒ. fiat puluis, ex quo tabellæ conficiantur, vel trochisci, vt de aliis dictum est, cum aqua acori.

Sunt qui quat. semina frig. maiora admouent. Ego, certè in illorum sententiam venirem, quæ est Actuarij, vt expun-

ut expungerentur aut adderentur, cum est utendum, quia facile rancescunt, & compositionem corrumpunt. Sunt, qui corallum addunt, & crystallum, mandragoram, & flores nymphaeae. Verum cum est aperiendum, non sunt illa tam insigniter siccantia, & refrigerantia recipienda. Vtraque enim solent obstructionem confirmare. Haec compositio quaedam recipit ad sufficientem corroboracionem. Quare illa praetermitti possunt. Papauer apposui, quia aliquam familiaritatem habet cum corpore nostro. Rhab. mihi non placeo, quare expungendum censeo, quia astringit & laxat. Neutrum verò praestare potest in medicamentis corroborantibus, quale est hoc. Nō me laret Auic. lib. de viribus, cord. rhab. & alia inter cordialia annumerasse, sed non consulebat, ut cordialia alterantibus miscerentur. Quod si in illis affectibus sit laxandum, illa esse usurpanda, quia vires illorum principalium partium vires minus deliciunt. Quod dictum volo in vniuersum de omnibus medicamentis laxantibus. Caphuram non praetermissi, quia parua quantitas inter alia odorata non sentitur, vel minuatur dosi ad gr. 3. tantum. Haec facit penetrare medicamenta sua tenuitate, quae insignis est.

Tria sandalen ex descriptione Nicolai.

Valet eadē, ad quae diarrhodon abb. sed magis refrigerat, & minus aperit obstructiones, & recipit haec. R. sandali albi, rub. & citrini ana 3. 3. ros. rub. viol. sacch. candi, antispodij ex myrtho, succi liquiritiae, seminis portulacae ana 3. 2. & D. S. gummi Arabici, tragacanthi leuiter assatorum, seminis melonum, cucumeris, cucur. citruli, mundatorum & minutim incisorum, sem. intybi, seu scariolae berberis, an. 3. 2. S. Huic descriptioni vix reperies simile. Nam in dispensario Hispano caphura, amyliū, neque semen cucumeris reperitur. Habet violas, quas non habemus. Sacchar. recipit Nicolaus. Ego rhab. expunxi, propter rationem dictam. Amylum quoque, quia obstruit & pugnat cum scopo, non refrigerat, neq; aperit. Rosas reliquimus, sed in secunda dosi, ne maior quantitas vasorum apertionem impediat, & sufficit illa quantitas sine rhab. vel alio astringente ad viscerum corroboracionem. Sacch. non expunximus, quia de-

terget, & satis magna est quantitas, commixto etiam glyce. succo, quia leuiter deterget. Lachrymas oportet affare. Tragacanthum in Hispania ponitur, nisi vteretur, alterum certè expungendum. Quòd si leuiter affantur, vt deponant lentorem, nihil impediunt. Caphuram expungendam censeo, quia suo odore ingratiſſima est, maxime in hac compositione, in qua odorata pauca reperiuntur, quæ talem odorem possint castigare, neq; illius loco aliquid ponendum censeo. Quòd si contendas, aliquid substituendum, non nihil spicæ celticæ concedam ad aliorum penetrationem. Quidam flores nenupharis apponendos existimant, non ob refrigerationem, sed ob tenuitatem suam, quod mihi non placet, cum spicæ celticæ ꝑ. ss. ad hoc sufficiat. Hæc compositio debet frequenter dispensari, & conseruari in vase terreo vitreato, ne rancescant ob caliditatem sem. frig. ma. quibus rancidis, nihil ingratius esse potest.

Diatrageanthum frigidum.

EX triagacantho duæ sunt denominatæ compositiones. Altera calfacit, & à caliditate dicitur; altera refrigerat, & à frigiditate denominatur. Hæc incrassat fluxiones, frequentiusque vsurpatur. Ob id paranda est sola prætermiſſa calida.

℞. penidiarum ꝑ. 3. tragacanthæ albæ ꝑ. 2. amyli ꝑ. ss. glyc. quatuor sem. frig. ma. mundatorum ana ꝑ. 3. 2. seminis papaueris ꝑ. 3. Hæc compositio ad inspissationem catarrhi valet. Quare oportet illa omnia conspissare ad incrassationem. Ob id quæ sunt nimium detergentia, vel tenuium partium, vel calida, in hac recipi non debent. Consultò igitur Latinis quibusdam & semen rutæ & caphura prætermiſſa fuerunt. Semen papau. non est omittendum, quia ob frigiditatem efficacissimum est in hoc remedio. Semen rutæ in quibusdā veteribus exemplaribus Nicol. legebatur, sed ingratum est, & calidum, neque valet ratio, qua confirmant practici, in talibus semen nasturtij, alij spicam, cinamomum, addenda esse dicunt ad penetrationem. Nam partes, in quibus incrassationem his remediis molimur, non admodum profundæ sunt. Adde quòd illa sem. frig. ma. ad hoc sufficere possunt. Hæc medicamēta ex detergentibus & inci-

incidentibus parata, non præstarent id opus, ad quod præscripta sunt.

Diiris simplex.

A B iride duæ compositiones nomen habent. Altera dicitur simplex, altera à Salomone dicta. Hæ compositiones sunt artheriace. Vtraque parari potest. Prior, scilicet simplex, sic conficietur.

R. irid. Veneræ vel Florentinæ ʒ. i. ss. sacch. candi, diatrag. frig. ana ʒ. fiat pulvis, vel cum sacch. dissoluto, non succo limonum, neque albumine oui, vt quidam vult, sed aqua hyss. fiat elect. Hæc compositio potius ex Veneta, quæ iris est Illyria, quàm ex Florentina, etsi candidior videtur. At Veneta quidem flauior est, & magis ab antiquis probata. Diatragacan. hic ponitur optima ratione, quia ita habent nostra exemplaria antiqua Nicol. præpositi. Non me latet aliquos legere simpliciter, tragacanthum frig. sed cum sit calidum, nullum hoc epitheto reiiciendum puto, & iniiciendi pul. diatrag. Hic pul. diaireos multa humida recipit ad prohibendam exsiccationem pituitæ in thorace. Aliqui volunt excipere albumine ouorum quod mihi non placet, quia nimis incrassat, & inspissat. Idem author cum succo limonum parari concedit. Ad id minus conuenire videtur propter suam aciditatem. Sed si vellet in eclegma seruare, cum syr. capil. ven. excipiat, vel cum sacch. fiant formulæ. Hanc frequenter dispensare ob diatragacanthum frig. oportet, quia citò & facile rancescit.

Diiris Salomonis, descriptio Nicol. Myrpsici.

E X iride fit arteriacum dictum diiris Sal. quæ compositio ab aliis in forma pul. ab aliis in forma eclegmatis præscribitur. Varia forma est, si in eclegma referatur. Nam aliqua sunt, quæ respuunt formam pul. vt caro ficuum pinguium, caro passul. & dactylorum, quod tardius rancescunt nuclei pinearum, & amygd. Quare & nos in eclegmatis forma seruandum censemus. Nos tamen hic pul. præscribimus.

R. irid. ʒ. j. puleg. hyssopi succi, liquiritiæ ana ʒ. 6. passul. mundatarum ab acinis, caricarum pinguium, carniū dactylorum à filis mundatorum ana ʒ. 3. tragacanthi, amygd. mundatorum, pinearum, cinamomi, ʒ. i.

zib. pip. nigr. ana 3.3. styracis rub. 3.2. & 3.1. meli. q. f. fiat in formam linctus vel eclegmatis. Hæc compositio, ut supra monstrauiamus, in forma humida debet parari, & scopus idem docet. Hoc tamē mihi videtur immutandū, quod styracem calamintham potius, quā rubram immitteri debere videatur. Nōstra rubra tota arida est, quia ex ea hodie styrax liquida extrahitur. Actuarius styracē ponit sine epitheto. Quare de calamintha intelligendum est certō, per illam generalem regulam, quia cum simpliciter aliquid pronuntiatur, de præstantiore est intelligendum.

Diapenidion Nicolai Alexandrini.

EX penidiis paratur medicamentum, quod constat ex detergentibus & incidentibus. Sed vulgus medicorum, quia vti illa compositione ignorabat, prorsus ex vana duas fecit, separando odorata & incidentia. Illam vocat diapenidion sine speciebus. Nos primū integram, deinde illam truncatam sine speciebus dictam ponemus, quæ ferē in omnibus diuersa est. Vulgatam malimus sequi, quā illam Actuarius, quæ truncata est, & recipit quæ non debet, ut semen portula. Nos verō sic parabimus.

℞. penidiarum lb. j. pinearum, amygd. mundatarum, semin. pap. albi ana 3. xx. cinam. garyophil. zinzib. succi gly. gummi tragac. Arabici, amyli, quatuor. semin. frigid. maio. mundatorum an. 3. x. camph. 3. j. Hęc compositio à nobis posita est, non ut dispensetur, sed ut videatur quale sit illud diapenidion sine speciebus. Ferē omnes dissentiant in ponderibus. Alij 3. ij. penid. ponunt cum Actua. 3. xvj. præscribat. Alij licij 3. ss. addunt. Item in pondere pap. amygd. & pinearum: alij 3. xx. ut nos posuimus: alij verō 3. iij. ss. Consentit cum illis Actuarius. Sequētiū, scilicet, cinamomi, garyoph. ana 3. x. Nicol. ponit. Alij verō 3. j. ss. camphoræ, Nicol. 3. iij. Alij legunt tertiam partem 3. vnus: alij amygdal. amar. addunt, quas prætermisi, quia nullibi leguntur. Hoc modo, quo nos apponimus, censeo dispēsandum, quia proportio melior est, & arteriacum erit efficacissimum, tum ob illam quantitatem amygd. & pinearum. Neque repugnat papauer, quod sua vi narcotica tussim minuire potest. Quod in illo

illo magno pondere reperiantur aliqua, certè camphoræ quantitas erit seruanda, in quo sunt omnia integra magis. Syrupo violato omnes excipiunt, lento igne decoquendo penidias, deinde pul. subiiciunt. Diapenidion sine speciebus erit, separatis odoratis, quæ species vocantur, scilicet ablato. cinamomo, garyophyll. zinzib. Constat igitur sequentibus.

R. penid. lb. i. pinezum, amygd. dulc. sem. pap. albi, succi glyc. tragacan. gummi Arab. amyli, quatuor sem. fr. g. ma. ana 3. 10. campho. ʒ. 3. cum syr. viol. fiat ad formam eclegmatis. Quia hodie omnes volunt in pulu. ut eo conficiantur tabulæ, dissolue saccha. in aqua viol. & fiant tabulæ. Parua quantitas dispensanda est, quia diu non seruatur, etsi sacco coriaceo reponatur, vel vase vitreato. Loco minus calido & sicco seruandum erit hoc medicamentum arteriacum.

Rosata nouella Nicolai Alexandrini.

HAc compositione carere possumus, quia viribus non differt ab aromatico rosato. Sed quia hac frequentissime vtuntur nostri, nos eam apponemus, non ex Præposito, sed ex Nicolao Alexand. Recepta est immutatis ponderibus.

R. cinamomi 3. 6. ros. rub. glyc. saccha. candi ana 3. 3. garyophil. spicæ nardi, galangæ, zinzib. nucis mosc. zedoariæ, styracis, cardamomi ana ʒ. j. fiat pul. Hic est prætermittendum sacchar. & candum ponendum, quia saccha. ad deterfionem ponitur, & ad temperandam simplicium acrimoniam. Quod si in forma confectionis, vt solebant antiqui, addant mel, vel sacch. dissolutum, & faciant electuarium.

Saccharum Rosatum, Manus Christi cum perlis.

EX sacch. dissoluto fit sacch. ros. tabulatum, ad differentiam sacch. ros. quod est conserua ros. Ex eodem fit Manus Christi simpliciter dicta, fortè differunt figura, quod nunc in frusta. nunc in tabulas diuidatur. Fit cū perlis, & Manus Christi perlata dicatur, additis margaritis tenuissime tritis, ad 3. lb. pro lb. i. sacch.

Philonium Romanum, sive manu.

R. Pip. albi, hyoscyami albi ana 3. 4. opij 3. 2. lb. cinam. 3. 1. lb. sem. apij 3. 1. sem. petro. fœnic. pastinace

syluest. ana ʒ. j. & ḡ. ʒ. croci ʒ. ʒ. spicæ nardi, piretri, zedoariae ana ʒ. j. & ḡ ʒ. cinamo. tenuissimè triti ʒ. j. ʒ. euphorb. castor. an. ʒ. j. mel. despumati ad triplum pondus. Hæc compositio ad eadem valet, ad quæ Alyncri-ton, ad dolores cholicos omnes & nephriticos. vt Philoniu Me-sues. Quare si quis velit dispensare, dispensetur hoc mo-do. Id solum mutandum videtur, quod hyoscyam. ʒ. 2. ʒ. ponere oportet, & opij ʒ. iij. quia securius est vti opio, quàm hyoscyā. Hæc parari debet, quia securior & iam à vulgo recepta. Has ob causas hanc compositionem re-tulimus. Quia verò cholicum est medicamentum, do-lores stupefaciendo, & morbi dispositionem tollendo sedat. Accommodatius erit ad nephriticos, arthriticos neque facilè respirantes. Ad eundem scopum valet re-ques Nicolai, nisi quòd magis valet ad vlcera, & san-guinis fluxus, ob resiccantia, & minùs calida addita. Ob id subiungere eam visum est. Sed ex Nicolao Myrepfico petita, à quo mutuatus est, aliquibus immutatis, vt abla-to zinzib. Additur etiam santalon citrinum, & pondera omnia mutata sine ratione.

Reques Nicolai Myrepfici.

℞. ros. rub. viol. opij, hyosc. caput pap. albi, cortic. mandrag. nucis mosc. sem. scariolæ, portulac. psilij, cina-mo. zinzib. ana ʒ. i. ʒ. sacch. candi ʒ. i. santali albi & ru-bri, antipodij ex ebore, vel myrtho, gummi tragac. ana ʒ. 2. & ḡ ʒ. mel. despumati quantum s. Alij addunt ʒ. 8. ʒ. Opium in vino generoso dissolutum, spodium per se trituretur diligenter, & cum aliis misceatur, opio disso-luto, vt omnium melior fiat permixtio.

Philonium persicum.

Non est dispensandum, quia calidiora astringenti-bus adduntur, & non frequenter eo vtuntur boni Medici. Valet ad retinendum bonum sanguinem, ad quod præstandum requies valere potest.

De hieris.

Aliud medicamentorum genus est inter laxantia, quod hiera dicitur, id est sacra. Conficitur ex ama-ris. Ob id picra, id est amara dicitur. Excipiuntur amara in pul. redacta, & melle & vino, vt antidota. Sunt autem huius medicamenti permultæ compositiones, quæ ab inuento-

inuentore vel à materia, vel à sapore, vel ab eo, quod castigauit, vt meliores redderet, nomen habent. Ab inuentore, vt hiera Hermetis, ab Hermete, ab Archigene. A materia, hiera, colocynth. A sapore, hiera picra. Eadem Gal. dicitur, quòd illam castigarit ac immutarit. Illam paratam ex colocynth. habere oportet. Hæc enim duæ sufficere possunt. Verùm ea, quæ picra dicitur, variis modis apud varios paratur, & à Gal. etiam ad ventris corroborationem, ex aloë lota fit, aliquando ex non lota. Itē variā est ob aloës dosim. Nam aliquando ex 3. centum, & aliorum simplicium 3. 6. fit, aliquando ex 3. c. Aliquādo ex 80. idcirco differunt. Aliquando cum croci 3. 6. At aliquando ex 3. 5. tantum, vt quando ad dolores capitis, vertiginem & suffocationem paratur. Differt quòd aliquando asarum, aliquando carpesium recipit. Expediit ergo (vt Gal. docet lib. 7. meth.) dupliciter paratam habere, scilicet ex aloë lota, & non lota. Quod si triplicem habeant, melior est tertia 3. c. & 3. 6. cinam. xylobal. asari, spicæ nardi, croci & mastiches, siue ex aloë lota, siue non lota fiat. Sed ex croci 3. 5. paratam habere ad dolores, qui fiunt à fumis, optimum est. Hæc descriptio ante Gal. ab Andromacho tradita est, & à Gal. probatur. Hanc hierā ex aloë posteriores Galeno adscripserunt, & Galeni vocant. Hanc magis probandam censeo, si laxare sit animus. Si verò ventrem magis exsiccare & corroborare, illam, quæ ex 3. c. lotamque, ex 3. 80. non lotam. Tunc minùs laxat, quia minorem quantitatem aloës recipit, quæ sola vim laxandi habet. Quæ conficitur ex aloë lota, ea carere possumus, quia pilul. vulgò dictæ de aromatibus substitui possunt in eius locum, vel augere odoratorum dosim, vna aut altera 3. & fiet ventriculum corroborans magis, & minùs laxans. Inter hieras fortiores magis probata est ab antiquis ea, quæ à Scribonio Largo descripta est nomine Pagnini Antiocheni, quam compositionem vocari diacolocynthidem ipse testatur. Dicitur enim picra à quibusdam, quia amara est. Ab aliis diacolocynthidos. Quæ descriptio eadem est apud Paulum nomine Archigenis. Non me latet compositionem diacolocynth. descriptam à Galeno, libro De paratu facilibus, quæ non nihil euariar, accipere & cassiam,

& cinamomum, cum alijs tantum cinamomum. Gentianam pro Aristolochia, chamæpythim, pro chamædri, folium vel pulegium prætermisit. Adde quod maiorem quantitatem diacolocynthid. recipit. Habet enim colocynthid. 3. 16. aliorum 3. 4. aliquorum 3. 5. Quare cum manifestissimè appareat hæc compositio valde corrupta, & de libero studio dubitent, an genuinus sit Galen. hæc multum conueniunt cum hiera illa diacolocyn. descripta à Mesue, quam Rufo tribuit. Sed nonnulla sunt mutata, quæ multum variant compositionem, vt dosis colocynth. cassiæ & cinam. Illa Pauli siue Scribonij integerrima est. Cuius descriptio talis est.

℞. marrubij, agarici, chamæd. carnis colocynth. stæca. an. 3. 10. opopan. sagap. petrosel. aristoloch. rotundæ, pip. albi ana 3. 5. cinamomi, spicæ nardi, myrrhæ, polij, croci, an. 3. 4. Opopanax, sagapenum, & myrrha in aqua mulsâ macerentur per noctem, & contundantur. Si festucent, calefiant & passentur, & arida in pul. redigantur. Excipiantur melle q. s. & reponatur in vase vitreo. Cum vero efficaciorē facere voluerit medicus ad purgandum, cinamomi aliquam quantitatem ponat, & talis est paranda, quod sit efficacissima ad morbos cōtumaces, & à materia frigida. Hæc enim cōuenit cum illa Ruffi, Pauli, Iulij, & Antiochi facultate. Non est alia querenda, nec paranda, ne Pharmacopola oneretur multis medicamentis inutilibus, in quibus paradisi multa sumuntur simplicia. Nos hic polium pro folio ponimus, quia folium verum non habemus, & vt stæchas ac marrub. in hac cōpositione ad extenuationem ponuntur, non malè conuenit hoc loco. Non me laret Scribonium Largum habere & Paulum, in hiera Antiochi, Ruffi & Archig. polium. Quod si magis placet folium, pro folio pone spicæ nardi tantundem. Nam (vt Gal. lib. simpl. docet) eandem facultatem habent. Et hæc de hieris sufficiant. Nunc ad alia venimus, quibus instructum Pharmacopolâ esse oportet.

De pilulis.

Pilulas paratas in officinis habere oportet, tum quia sicca non tam citò miscentur & vniuntur, ac in vnam contemperationem veniunt, vt illa, quæ vel decoquuntur, vel liquida sunt. Idcirco parare per otium, & paratas habere

habere oportet, vt longa illa mora castigetur & vnian-
tur, cum propter morborum celeritatē, tum simplicium
saporem ingratum, & odoris insuauitatem, quæ si in pi-
lulas referantur, deuorantur sine sensu saporis, minúsque
saporem inspirant ingratum. Pilularum multæ sunt diffe-
rentiæ, de quibus omnibus non dicemus, sed de magis
necessariis ad morborum curationē, vel de his, quæ Me-
dicis communi consensu receptæ sunt. Erunt igitur pil.,
communes de hiera simplici, de arom. seu elephanginæ,
assaieret, mastichinæ, ante cibum, cocchiæ, de quinque
generibus myro. aggregatiuæ, aureæ, de sarcocolla, fœ-
tidæ, de agar. de rhab. de fumo ter. de lapide lazuli, lucis,
de euphorbio. Hæ sufficere debent. Multæ enim sunt ea-
rundem virium, vt apparebit his, qui diligentius expen-
dere volent facultates simplicium, & illa adinuicem
conferre. Quid opus est habere pil. sebelinas, si quis pil.
ante cibum habeat? Quid opus est pilul. Indas parare,
cum de lapide lazuli paratæ sint? Eadem ferè & pil. fœ-
tidæ maiores. Pilulis de euphorbio carere potest qui pi-
lul. de ag. paratas habet. Ad euitandam infinitam illam
pilul. syluam, nos ad hunc numerum contrahimus re-
ductum ad sex, si Medicorum collegium voluerit.

De pilulis communibus.

Comunes pil. sunt variz apud varios authores, sed
nos hic communes pilul. appellamus, quas aliqui
pestilenciales, quòd ad pestis præseruationem valeant.
Has Rasis ad Almanforem, lib. 4. tradit. Non desunt, qui
putant esse Ruffi, sed toto cœlo aberrant. Nam Ruffus
magis potionē, quàm pil. tradidit, vt ex Paulo cognosce-
re licet. Quare cum sint pil. non debemus pro croco am-
moniacū ponere, vt quidam magni nominis vir. annota-
uit. Dubitauimus diu, quā descriptionem retinere debe-
remus. Sunt enim apud Auī. Rasim, & in vulgaris dispē-
sariis diuersæ. Illam Auic. descriptionem non probamus,
quia citra pondus aliquod descripta est. Quanquā intel-
ligat in æquali pondere ponenda esse omnia. Verum il-
la rerū proportio non potest probari, quia tantum croci
& myrrhæ ponere, quantum aloes, est contra compo-
nendorum medicamentorum rationem, scilicet, quòd
quæ vincunt, & castigant, vt in istis apparet, sint æqualia

his, quæ potissimum agunt, qualis est aloë. Eadem ratione reiicienda est ratio dispensariorum, quæ in dupla proportionē aloem ponunt, & myrrham, & crocum, quanquam tolerari potest aloes 3. 2. myrrhæ, croci an. 3. 1. Magis mihi arrisit illa, quæ aloes 3. 1. myrrhæ, croci an. 3. 1. accipiebat. Illa est vera proportio, ut minus calfaciant, magis moueant alui excrementa. Nos igitur sic parabimus.

R. aloes bonæ 3. 1. myrrhæ electæ, croci an. 3. 1. cū vino odorato, fiant pilul. vel cum succo limonū. Tempore pestis conueniunt, quia propter siccitatem venenis magis resistunt, & minus calfaciunt mouēdo aluum. Non probo illorum preparationem, qui aloem abluunt in aceto, quia vires laxandi perdit, nec illam Christophori additionem. Addit enim bolum armenam tēpore pestis. Verum quæ astringunt, sua astrictione, vel proprietate venenis resistunt, vel lentore modico, purgantibus medicamentis misceri non debent, qui eorū vim extinguendo, purgatricē facultatē impediunt. Satius erit illa dare post, vel per se accipere. Nō nouit vir illē, an pugnent inter se.

De pilulis ex hiera simplici.

Pilulæ de hiera dicuntur, quæ ex puluere hieræ parantur, & pauco melle rosato collato. Quare talis est earum descriptio.

R. pul. hieræ Gal 3. 1. cum pauco melle rosato collato tingantur pil. Aliqui, ut Brassauola, agarici, tantum, quantum aloes ponunt: sed illæ non erunt ex hiera simplici, sicut nec illæ, quæ in quibusdam locis parantur, ex hieræ, agarici trochiscati an. 3. β. aloes 3. 1. Hæ sunt ex hiera composita, non simplici. Quæ autem sit hiera simplex, & quæ composita, quære cap. de hieris. Nota in pil. sumi species hieræ simpl. In opiatīs autem, compositæ.

Pilula de aromatibus, seu elephangina.

Pilulæ, quæ abluuntur in decoctione multorum aromaticorum, nomen aromaticarum acceperunt. Conueniunt cum pil. de hiera, ex aloë lota, in corroborando & minus laxando. Quare sufficit habere ex hiera simplici, ex aloë lota. Si pilulas de aromatibus parauerimus, fere eadem descriptio pilul. apud omnes est, paucis immutatis. Myrepicus lignum aloes prætermisit, expun-

expunxit ros. & absynth. & ante ablutionem crocum misceat, cum alijs omnes cum myrrha, mastiche, croci adiciant. Cubebas interpretantur cardamomum: quæ interpretatio mihi non placet, quia semen contumax ad frangendum non est. Quare omnes aliorum compositiones magis probo, quia & cubebas, & cardamomum habent, absynth. & ros. Improbanda est ratio, quæ repugnat his, quæ à Mesue in usum ducta sunt, quod non differant decoctione odorata. Hic autem diu decoquit, scilicet, donec lb. xij. aquæ ad consumptionem duarum librarum veniât, & tertia remaneat. Aliqui huic errori succurrere & consulere volentes, tertiam partem odoratorum pulverisatorum decoquendam volunt: alteram infundunt, tertiam miscant, & incorporant. Nos verò, ne longius recedamus ab eo, qui illas duas instituit, reiecimus, propterea quod in prima paucas vires recipit, & multas perdit in solatione: ultima verò plus virium recipit ab odoratis. Nos hoc modo commodè parabimus.

R. cinamomi, cubeb. ligni aloes, vel fantali, citrini, calami aromatici, macis, nucis moscatae, cardamomi, garyophil. asari, mastiches, scœnanthi, spicæ nardi, carpo-balsami ana ʒ. j. absynthij sicci, ros. rub. ana ʒ. v. terantur cum tritione grossa, & infundantur in lb. vj. aquæ bullientis. Post infusionem vj. horarum fricentur manibus, & exprimantur, & collentur. In coll. lb. iij. intice aloes exquisitissimè tritæ in aqua pluviae, diligenter lotæ in vase vitreato lb. j. qua exiccata probè, adde infusionis aromatum lb. ij. in sole æstivo vel hypocausto sensim affundendo residuum aquæ ex infusione aromatum, & ex massa formentur pil. vel si absumpta sit tota aqua, ex aqua absynthij, vel vino odorato formabuntur. Has oportet habere paratas, quæ omni tempore non possunt parari. Etiam si in hypocausto parentur, vel in furno, commodior tamen præparatio est æstate, sub cane, ut in diario docebimus.

Pilula assaieret, ex Avicenna.

R. hieræ picræ ʒ. j. mastiches ʒ. ss. myrob. citrinorum ʒ. ss. aloes optimæ ʒ. ij. fiant pil. cum syr. de stæchade. Hæ pil. dispensandæ sunt propter affectus, qui sunt cum defluxione, vel cum ventriculi remolitione, vel relaxatio-

ne. Quāquam omni tempore parari possint, & qui carent eis, addita aliqua myrob. quantitate similes sibi paret.

Pilula de mastiche.

Pilule mastichinæ à mastiche appellatæ facile, citò & semper parari possunt. Quare sufficiet earum nouissima descriptionem, & cum imperabuntur, parari poterunt. Harum tres descriptiones reperiuntur, quarum duæ similes sunt. Tertia, quæ ad Nicolaum refertur, diagridiū recipit: Multum à facultate mastiches distant: quare sunt reiciendæ, & illa Conciliatori vsurpanda, quæ magis probatur, & ventriculo magis accommodata, in cuius gratiam institutæ sunt. Dantur in ventriculi nimia laxatione à pituita aquea & tenui. Quare agaric. infundere non oportet, neque in aceto, neque in oxymelite.

℞. aloes electæ 3. x. ag. albi friabilis 3. iij. cum syrup. de stæchade, fiant pilulæ.

Pilula ante cibum.

Pilulæ ante cibum dicuntur, quæ ante pastum assumi possunt, ad ventris corroborationem. Sed tales multæ sunt, quæ hoc modo dari possant, vt pilul. de hiera, elephanginæ mastichinæ, & similes, quæ odorata recipiunt, & leuiter purgantia eum astrictione, vt rhabar. Verum cum illis sint similes de hiera, vel de aromatibus, nisi quod rhab. & f. selis montani semen non habent, idcirco non sunt dispensandæ. Nam æqualis proportio rhab. addita pil. de hiera, similes reddet, & maxime, si grana aliquot seseleos addas, vel anisi, vel apij, citra damnum carere possunt.

Pilula cocchia Rasis.

Pilulæ cocchiæ à grano, quod cocchos dicitur, nomen habent, quia fieri debent ad magnitudinē eius grani, quarum descriptiones sunt Præpositi, ex Gal. & Ras. Verum Rasis magis probandæ sunt, vt quæ hæc recipiant.

℞. hieræ 3. x. colocynth. 3. iij. & 3. j. scam. 3. ij. & 3. turbit. stæchad. an. 3. v. fiant pil. paruæ Sed quia Rasis imperat hieram picram, ob id censent secundum huius descriptionem parandas. Pro pilulis istis conficiendis hoc vnum est superstitiosum, quod ros. addit tantum, quas si placet, potes ponere. Sed cum hæc ad purgationem pituitæ crassæ, & ad ea, quæ sunt multum infixa ventriculo, insti-

instituantur, non est necesse rosas apponere, sed potius delere oportet, quia adstringentia impingunt magis, ut Galenus de absynth. scribēs docet. Quare ex hiera Gal. parari debent Cocchiæ Mesuæ minùs sunt probandæ, hoc nomine, quòd myrob. recipiant, & alia calidiora.

Aurea Nicolai.

A Vreæ pilulæ ab aureo effectu ac nobili, quem præstant, dictæ sunt, à Nicolao descriptæ & Præposito, Alex. & Myrepico. Verùm quia illa iam vulgata nihil reprehensione in se dignū continēt, retinendā cēsemus.

℞. aloës, diagridij, ana 3. v. ros. sem. apij ana 3. ij. β. anisi fœnic. ana 3. j. β. mastiches, croci interioris, colocynthidis ana 3. j. cum aqua infusionis tragacanthi formantur pil. Aliqui addunt hieræ picræ 3. j. Ego non suadeo addendū. Quòd si addatur, augetur moles medicamēti, & minùs efficax redditur. Adde quòd hæ pil. crocum, sem. odorata, rosasque recipiunt, ad fortiorum medicamentorum moderationem. Colocynthis forcipibus incidatur ante contusionem, & per se teratur, ut diagridiū.

Aggregatiua Mesua.

A Ggregatiuarum descriptiones variæ sunt. Aliæ maiores, aliæ minores dicuntur apud Mesuem, & præter has duas, tertiæ reperiuntur, quæ ex intentione sua vocantur. Quibus carere possumus & debemus. Sunt enim compolitæ ex omni genere medicamentorum dissimilium. Quòd Gal. lib. quos purgare oportet, & quibus medicamentis suora modum improbauit, miscere, quæ secum pugnent. Sed quia hæ pil. sunt ad omnes humores euacuandos, retinentur, & comparantur catholiconi. Illa descriptio primæ Mesuæ ex sua intētionē, sic habet, si exemplaribus antiquis credendum sit.

℞. myrob. citrinorum rhab. ana 3. iiii. succi eupatorii Mesuæ, id est, Agerati Diosc. siue herbæ sanctæ Mariæ, absynthij ana 3. ij. scam. in pomo in furno cocti 3. vj. myrob. chebul. ind. agarici, colocynth. polyp. an. 3. ij. turbith boni, aloës ana 3. vij. mastiches, ros. sal. gemmæ, epith. anisi zinzib. ana 3. j. elect. ros. q. s. in forma opiætæ fiant pil. Has pil. ad veritatem exemplarium veterum imperauimus præparandas, & ne fortiores sint, & facilius parentur, formantur cum succo ros. quòd recipit

scammonium. Quod fit vt ad idem recurrat, & non erunt fortiores solito.

Pil. recipientes lapidem lazuli.

PIlle, de lapide lazuli vituperantur non sine ratione. Sed si ob lapidem lazuli vituperantur, deberent pil. inde, lucis minores, de quinque generibus myrob. & de lapide armeno damnari. Omnes quippe istæ lapidem lazuli recipiunt, & propter lapidem illum ciancum, veratrum nigrum. Pro quo officinæ aconitum ponere solent, non sine magno ægotantium periculo. Inter omnes illas securiores sunt, quæ de quinque generibus myrob. quæ iam à Medicis receptæ sunt, & sine hæsitatione & formidine ab omnibus præscribuntur. Recipiunt autem, quæ violenter purgant, sed ad articulare morbum instituuntur. Earum agitationem verentes, myrob. addiderunt. Illarum verò descriptio talis est.

R. qu. generum myrob. agarici, diagridij, colocynth. senæ ana ʒ. ss epithymi, turbith, anisi, maratri, massiches, lapid. lazuli ana ʒ. ij ss & gr. v. aloes ʒ. j. succo absynthij fiat massa pil.

Quidam mediocriter eruditus non intelligens rationem componendorum medicamentorum, ip hac addendum esse zinziber colligit, quia hæ pilulæ agar. ad expurgandam pituitam crassam acceperunt. Turbith enim & agar non perpetuò desiderant zinziber, sed cum pituita crassa euacuanda est. Verum si ichores pituitæ aut aliorum humorum excrementa, quæ in articulos fluunt, trahenda sunt, & à particulis auertenda, ob id sine ipso & aliis, in multis compositionibus iniiciuntur, quia illa pugnarent, myrob. omnes recipere, atque zinziber. Hoc enim attenuat & incidit: myrob. verò astringit. illa enim est ratio Arabum, vt aliis medicamentis agentibus humores addantur astringentia, vt temperentur. Qui has pil. habent, lucis minoribus carere possunt, & pil. indis & de lapide cianeo. Quod si quis velit aliquas tales habere sine myrob. pil. de lapide lazuli habeat. Quarum descriptio similis est pil. indis, nisi quod colocynth. recipiant. Quare si quis illis magis fidat, colocynth. gr. aliquot addat vel trochisf. alandal. Sed cum

agari-

agaricum, veratrum, & lapidem lazuli recipiant, non est quod colocynthidem recipiamus.

Pil. de lapide lazuli seu ciano.

Pilul. de lapide lazuli à Mes. sunt institutæ, quod medicamentum minùs conuenienter & tutò in forma illa datur, quia cùm sit medicamentum, quod crustas faciat, diu retineri in vètriculo non debet. In formam igitur pil. reduci non debet, cùm neque sapor ingratus, neque odor gravis id suadeat. Multò magis probarem Alexan. Tralliani pul. de lapide ciano. Nos tamen illas descripsimus, in eorum gratiam, qui non nouerunt dexterè vti medicamentis, vel non nisi in forma consueta, vel qua vsi sunt eorum præceptores. Si igitur ex ciano pil. potius velis quàm pul. parentur sic.

℞. lapidis lazuli tenuissimè triti, & decies loti in aqua buglossi vel viol. 3. vj. epithymi, polyp. ana 3. viij. scammonij, eleb. albi sacch. cand. ana 3. ij. β. agarici 3. viij. garyophil. anisi ana 3. iiij. hieræ picræ 3. xv. cum succo end. fiant pil. In hac compositione sufficit abluerè lapidem lazuli tritum in tenues partes, & abluerè quidem sufficienter in aqua viol. vel buglossi, vt aliqua ex parte remittatur acrimonia lapidis, quia in ventriculo crustas inducit. Præterea pro veratro nigro, album posuimus, quod etiam si non sit securius nigro, securius saltem est aconito, quo veratri nigri vice vtuntur, similitudine fol. & rad. decepti. Pro sale indo saccharum candum posuimus. Quod si naturale esset sal indum, esset antiquorù: sed cùm sacch. candum arte fiat cum illa saccha. l. chrymā indurata spòte, affinitatis multum habet. Nihil præterea immutauimus à descriptione Mes.

Pilula de sarcocolla.

Pil. de sarcocolla similes sunt, viribus, cocchiis. Hac tantum ratione differunt, quod scammonium non recipiant. Quare qui has pil. habet, pil. cocchiis carere potest. Nam addendo parum scammonij, eadem erit compositio. Sunt apud Mes. cap. de sarcocolla.

℞. turbith 3. iiij. sarcocollæ dissolutæ in aqua ros. 3. iiij. colocynth. zinzib. ana 3. j. β. salis gemmæ 3. j. incorporentur pulueres cum sarcocolla infusa in aqua ros. & dissoluta, fiant pil. In hac compositione nihil desidera-

tur. Hoc tamen dignum reprehensione, quòd in aqua ros. dissoluatur sarcocolla. Debet potius in aqua hyssopi & melissæ, vel si calorem téperare velis, in aqua viol. quæ sine astrictione refrigerat. Sed hoc leue est, & dissimulare potest, ne pro re minima videantur à communi sententia discedere.

Pilula de agarico.

Pilu. de agarico à Mesue describuntur, & aliis multis. Omnes descriptiones ferè in idem recidunt. Quare consuetam illam in offic. dispensandam censeo, quæ optima est, in eaque nihil reprehendendum. Recipit autem quæ sequuntur.

℞. turbith 3. v. hieræ picræ 3. iiij. agar. 3. iiij. colocynt. sarcocollæ an. 3. ij. rad. ircos, prassij, myrthi ana 3. j. cum sapa fiat massa pil. Easdem vires habent, cum pil. de sarcocolla, vt de aga. pro pil. de sarcocolla vti possumus, & contra, modò cum syru. pectorali deterfuo formentur, vel cum sapa. Eadem pil. imperari poterunt, pro pil. de euphorbio, addito paucò euphorbio: pro fœtidis maioribus, addendo opopan. cis vel ammoniaci parum.

Pilula fœtida.

Fœtidæ dicuntur, quòd fœtidis componantur, vt sagapeno, ammoniaco, opop. & castoreo, & aliis multis. Sunt autem calentes in affectibus articulorum frigidis, & pituitosis morbis. Et quia viles sunt, visum fuit eas non prætermittere. Erunt pro pil. de euph. fœtidis minoribus, de hermodactylis maioribus, de sagapeno. Sunt efficacissimæ in alterando & laxando.

℞. sagapeni, ammoniaci, opop. bdellij, vel myrrhæ, colocynth. sem. rutæ agrestis, aloës, epith. ana 3. v. hermodact. esulæ ana 3. ij. turbith 3. iiij. zinzib. 3. j. s. euph. 3. ij. cum succo porri fiant pil. Hæ pil. multum habent difficultatis, quia bdellium molle non facillè inuenitur, ne dicam aliud. Magna est contentio inter interpretes an legendum sit (harmel) id est, semen cicutæ, vel potius (harmela) id est, semen rutæ agrestis. Item ob hermodactylorum & enulæ dubitationem. Nos tamen has dispensandas imperamus ob earum efficaciam, & frequentem vsum. Sanè minores facilius parantur, & paucis additis, omnino similes redduntur. Nos tamen præ-

meditata

meditata & bene pensata difficultate, remedium obtrinuimus, vt pro bdellio, myrrham iniiceremus, vel propolim veram, & pro hamel legendum harmela: quia ad morbos articulares à Dioscor. commendatur. Semē verò cicutæ, tanquam venenum, ab omnibus externis & internis remediis expungitur. Hermodactylorum vox vaga est & incerta. Non desunt, qui dicūt, hermodactyl. apud Græcos radices esse quinque folij: Apud Arab. radices, quarum Mesue tres differentias ponit, nigras, albas & rubras. Euschijs putat apud Nicolaum in antidoto Alexandrina esse ben album & rubrum, propterea quod dicitur hermodactyl albos & rubros. Sed hic locus non est sufficiens. Quia ex Mesue sunt hermodactyli albi optimi: rub. non optimi: nigri deterrimi. Nos in omnibus compositionibus Arabum, hermodactylos vulgares accipiemus. In Græcorum descriptionibus, rad. pentaphylli. Nec sunt audiēdi, qui dicunt esse ephemereum colchicum, cum differat ab ephemero flore. Nonnullis hermodactyl. flos est luteus: colchicum flores croci habet. Sed de his alijs. Māiores dicuntur, quia plura, quā minores, simplicia obtrinent.

Pil. de rhubarbaro.

EX rhab. siue, vt Mes. vocat rauetzeni, parantur pil. quarum duæ extant descriptiones. Ad cachexiam vna: Ad hydropem altera magis. Sed quia illa recipit multas lachrymas calidiores, illas prætermittendas censeo, tum quia pauci Medici illis vtuntur. Dispensantur ad cachexiam sequentes.

R. rhab. 3. iij. succi glyc. absynthij, mastiches ana 3. j. myrob. cirrinorum confricatorum in oleo amygd. amararum, trochiscorum diarrhodi ana 3. iij. β. semen apij, fœnic. ana 3. β. hieræ picræ 3. xv. confice cum aqua fœnic. Hæ pil. si sine myrob. parentur, meliores sunt, quia aptiores ad obstructions tollendas, vel si cum oleo amygd. confricentur, vt deponant astringentem & asperitatem. Efficaciores erunt, si pro myrob. agarici 3. ij. reciperentur, & magis accommodatæ erunt tollendis obstructionibus, pituitæque euacuandæ, hydropi, antiquis febribus spuris, & compositis. Pauca recipiunt laxantia, multa quæ aperiunt & detergunt. Si quis pil. alte-

rius descriptionis ad Anasarcham requirat, addat tertiam partem pil. de euphorb. vel agarico. Sed de euphorb. sunt efficaciores, & paratu faciliores.

Pil. de euphorbio.

Pilu. parantur de euph. efficacissimæ, ad aquas & frigidos morbos, descriptione Mes. quæ recipiunt hæc. R. euphorb. colocynth. agar. bdell. vel myrrhæ, sagap. ana 3. ij. aloës 3. v. fiant pil. cum succo porri. Quod non reperiatur frequenter bdellium, pro eo myrrham substituimus, quia in internis est antiballomenon, nisi in pil. de bdellio & externo remedio, in quibus propolim veram, vel ladanum usurpamus.

Pil. de fumoterra.

Dicuntur sic, quia myrob. infunduntur succo fumariz, ut maiorem vim purgandi accipiant, atque talis est illarum descriptio.

R. myrob. citrinorum, chebul. ind. ana 3. aloës 3. vij. scam. 3. v. infundantur myrob. & aloë, & ter exsiccetur. Deinde inspissentur, & incorporentur, & ex omnibus fiat pil. In hac descriptione nihil est dignum in mutatione, & animaduersione, nisi quod hæc parandæ sunt initio æstatis, vel alio tempore pareretur ex succo mercurialis, vel ciclae cum sero caprino, vel cum succo ros. vel aqua fumariz.

Pilula lucis maiores & minores.

Pil. lucis dicuntur, quod ad oculos instituantur. Harum duæ sunt descriptiones, quibus facile carere possumus. Maioribus primum, quia pil. de lap. lazuli his substitui possint: neque sequitur, Non accipiunt licium: ergo non sunt pro oculis. Certè hoc nomine vituperandæ maiores & minores, quia quæ detergendo extrinsecus profunt, in illis nulla necessitate reperiuntur, ut licium. Lucis maiores non ea recipiunt, sed tantum multa incidentia, & attenuantia. Quod si media pars ablata esset, vel dimidiam ponderis partem detraxeris, efficaciores fient ad euacuationem. Quare si quis pil. de sarco-colla, vel de ag. pro illis accipiat, erunt utiles. Quod si minores magis placeant, ob myrob. & lap. lazuli, de quinque generibus myrob. colocynth. & ag. & quæcunque videntur facere ad iustam euacuationem, & à longinquo. Adde quod maiores, quia receptæ sunt à vulgo,

recipiunt plura odorata, quæ augment molem, & vires minuunt. Sic apud Mesuem,

℞. ros. viol. absynth. colocynth. cubeb. turbith. calami arom. nucis moscat. spicæ epith. carpobalsami, xylobalsami, sileris montani, sem rutæ, scænanth. mastich. asari, garyoph. cinamo. anisi. fœnic. apij. cinamo. crassi, croci, macis an. 3. 2. myrobal. omnium rhab. ana 3. 4. agar. senæ ana 3. 5. eufrasiz vel chelidoniz 3. 6. aloes ad pondus omnium, cum succo fœnic. fiant pilul. Quia in omnibus locis eufrasia non reperitur, neque multum certa sunt quæ de ea scribuntur, visum fuit chelidonium in eius locum substituere, quia deterget, & oculis determinatur. Adde quod illa in pil. lucis maioribus, & ab eodem auctore imponitur.

Pilula bdelio maiores, descriptione Mesue.

Pilulæ de bdelio parantur ad vlcera sedis & vteri, & ad fluxum sanguinis. Quare non erit inutile eas paratas habere. Descriptio talis est,

℞. bdelij, siue ladanij puri 3. 12. ameos 3. 3. myrobal. cheb. emblic. indi. concharum venerearum, siue porcellanarum, charabæ ana 3. 2. β cum succo porri, vel cydoniorum, fiant pil. In his pil. parandis frequenter erratur. Primum, quia myrrha pro bdelio ponitur, vnde mouent hæmorrhoidas potius, quàm cohibeant, vel siccet. Quare nos ladanum substituimus, quia vt bdelium lætum est & emplasticum, ad formam pil. inducendam non aperit neque mouet sanguinem, sed constringit, vt hypocistid. succus, vel acacia. Ami torrefacere oportet vt nasturtiū, quo sanguinem sistant. Concharum venerearum legimus, non auellonarum adustarum. Sunt autem, quæ vulgò vocantur Porcellanæ. Id videtur quodammodo absurdum, quod cum succo porri formandas imperet. Nam vt Dioscor. scribit, veteres sanguinis reiectiones cohibet, si binis drachmis & æquali pondere baccatum myrthi detur. Quod si quis paret cum succo cydoniorum, efficaciores erunt ad constrictionem, & minus suspectæ iis, qui in operationibus ab occultis accidentibus minus sunt exercitati.

Pilula de styrace.

AD catarrhos inspissandos & sistendos parantur pil.

de cynoglossa, & styrace. Sed quia nostrum cynoglossum non est verum, sed potius glastum agreste (non enim caulem, neque florem gerit cynoglossum, vt docet Dioscor.) ob id mihi videntur parandæ pil. de styrace, quarum descriptio hæc est:

℞. styrac. liquidæ albæ olybani, myrrhæ. succi glyopij ana drach. 4. fiant pilulæ sicut ciceres. Dosis, duæ aut tres.

Ex alio authore descriptio.

℞. castorei, opij, styrac. calaminthæ ana 3. 1. myrrhæ liquidæ, hematites ana 3. 2, cum succo absynth. fiant pilulæ.

Pilula de cynoglossa.

℞. cynogloss. opij, semin. hyoscyam. ana 3. 4. myrrhæ, trogloditæ ana 3. 6. thuris, mastic. ana 3. 5. garyophyll. 3. 2. cinamo. styracis rub. ana 3. 2. cum aqua ros. conficiatur massa.

De trochiscis.

Trochisci à figura rotunda dicti sunt. Parantur autem ad medicamentorum cōseruationem. Nam melius conseruantur simplicia medicamenta in ea forma solida, quam in pul. redacta. Multi sunt, quibus carere non possumus, quia alias compositiones ingrediuntur, vt trochis. de viol. de ros. in pul. cordialibus, vt diarrhod. commune, trochisci squillæ & de viperis, in theriaca. Aliqui in fumigiis recipiuntur, vt aliptæ moschata, gallæ moschata. Quo tempore præparari possint, vt squillæ viperarum, paratur. Qui verò quouis tempore parari possunt, cum otio abundant, seriùs parabunt, vt hyeme Parentur tantum, qui sequuntur, trochisci diarrhodon, de viol. scillitici, theriacales, de camph. trochisci alchechangi, de myrrha, de galla moscata, de alipta moscata, de rhab. de spodio, de carabe, alandal, de capparib. de agar. de eupatorio, absynthio.

Trochisci de rosis, descriptione Rasis. Diarrhodon dicti trochisci à ros. Hoc nomine etiam pul. apud Arabas, & collyrium apud Galen. dicitur. Horum trochiscorum multæ sunt descriptiones, sed Rasis magis probatur, quæ sic habet.

℞. ros. rub. a motis vnguibus ꝑ. iiij. santali moschatae

lini, vel citrini, pro ligno aloes 3. 2. mast. 3. 1. β. absynth.
cin spicæ nardi, cina. crassi, siue cassiæ, schænan. ana 3. 1.
fiat pul. tenuissimus, qui vino exceptus reducatur in tro-
chiscos, & seruentur in vase vitreo. Hic pro ligno aloes
rarò inuentu, santalum substituiumus, cassiam, cinamo.
crassum interpretati sumus. Hæc descriptio aptissima
est, nec tamen reiicienda illa Mes. quia est paratu faci-
lior. Recipit tamen quæ sequuntur,

℞. florum ros. 3. 10. glyc. 3. 5. spicæ nardi 3. 2. β. exci-
piantur vino albo, fiant trochisci.

Trochisci de Violis.

Hoc nomen vagum est apud Græcos, sed magis a-
pud Latinos, γων, Græcis, violam significat, quam
simpliciter in officinis violam martij vocant. Latini ta-
men violam appellât *leucion*, cuius tres sunt species, lu-
teæ, quas vulgus Cheri vocat albas, seu rubras, seu pur-
pureas Græci nomine *leucos* significât. Quare incertum
est, à quibus nomen habeant hi trochisci. Puto tamen à
leucoto. Et quia nomen sonat albam violam, vertunt,
violas albas. Qui trochiscos in officinis parant, ex mar-
tialibus violis componunt contra authoris voluntatem,
qui potius ex cherino flore, quia inter violas est effica-
cissimus. Dispensabimus ergo ex illis, & secundum hanc
descriptionem fiant, quia hi trochisci recipiuntur in pul.
cordialibus. Si enim parentur secundum aliquas descri-
ptiones Mesuæ quæ turbit 3. 3 recipiunt, destrueretur
pul. cordialis. Fiat ergo in hunc modum.

℞. florum leucorij viridium 3. 5. amyli 3. 3. sem. papa.
albi 3. 2. & 3. 1. sem. plantag. 3. 4. succi myrrhæ pro opo-
balsamo 3. 1. aquæ ros. q. s. fiant trochisci, & reponantur
in vase vitreato.

Parari possunt ex albis purpureisque. Sed quia lutea-
rum præcipuè in medicina usus est, ex luteis parabun-
tur, quæ cheri vocantur. Recipiebant balsamum, quod
de opobalsamo intelligendum est tanquam de præstan-
tiore. Nos succum myrrhæ substituiumus, vt in theria-
ca, & omnibus aliis internis remediis faciendum cense-
mus. Extrahitur sic. Eligitur purissima myrrha, qualis
illa, quæ venditur multis in locis pro bdellio. Est an-
tem flaua, amara, odorata, & partes habet, velut yagues.

In tenues partes ponatur, & in cavitare albuminū ouorum coctorum ad duritiem, & supra discum stanneum reponatur in loco frigido subterraneo. Sic dissoluetur, & in verissimam steacten reductetur, & illa licebit uti pro steacte prælo expressa, & pro opobalsamo. Hos trochiscos dispensandos suadeo, quia in pulueribus quibusdam reperiuntur. Nam alio modo non utimur. Est certe medicamentum incerti effectus. Componitur enim ex pugnantis calidis, frigidis, & adstringentibus. Quare quantitatem habere oporteret, quam putamus sufficere ad pul. conficiendos. Parabitur vere & ætate in locis frigidis. Apud nos toto ferè anni tempore reperiuntur, præterquàm in fine æstatis, quando defloruerunt, & semina producant.

Trochisci de agarico.

EX agarico sine magna impensa parantur: duo trochiscorum genera Mesuz. Secundum vnam præparationem dicuntur trochisci de agarico: secundum verò alteram agaricus trochiscatus. Communiter autem in officinis sic parantur.

℞. agar. femineci, boni, & albi rasi in tenues partes 3. 4. vini infusionis zinzib. q. s. fiant trochisc. Hoc est agaric. trochiscatus, quem vocant. Trochisci verò de agarico videntur magis apti ad pituitæ eductionem, sed variis modis parantur. Alij ex agarici 3. 3. zinzib. & salis gemmæ 3. 1. cum oxymelite & syrupo acetoso formantur. Id enim parum refert, siue ex oxymelite, siue ex syrupo acetoso fiant. Multum verò, si fiant secundum illam descriptionem, vel secundum aliam, in qua 3. 1. salis gemmæ, & zinzib. 3. 1. legitur. Ego magis probo ultimam, & secundum hanc parari suadeo, quia in prima dosis est minima ad 3. 1. salis gemmæ, & zinzib. 3. 1. In secunda verò minor est, quàm conuenit dosis ad 3. 1. Sed liberum est addere, ut libet. Decoquant zinzib. in aqua buglossi. in decocto zinzib. infundunt sal bene tritum, & miscent. Sed si hoc modo parantur, non multum different ab agarico trochiscato.

Trochisci alandal.

Trochisci ex colocynthidis interna parte parantur, qui Arabicum nomen seruarunt apud omnes, quod

quod ego quoque seruare volui, propterea quòd sciretur ex colocynthide eos parari, & rarus esset vsus. Timere enim solent diagrid. colocynthidem & alia fortiora remedia sine quibus morbos contumaces curare non possumus. Parandi autem sunt ad pituitæ euacuationem in hunc modum.

R. pulpæ colocynthidis albæ & leuis purgatæ seminibus 3. i. ol. ros 3. i. mucil. gummi trag. & arab. ana 3. 2. bdelij & myrrhæ 3. i. macerentur lachrymæ in aqua ros. quatrimum, & formentur trochisf. ex colocynth. Oleo ros. confricetur colocynthis forcipibus minutim incisa: deinde cum mucagine fiant trochisf. quos siccant, & siccatos rursus in trochiscos reducant. Hoc autem faciunt, vt in tenuiores partes redigantur colocynth. Quòd si nò sit tunc factum, diligentius in puluerem redigentur, cum his erit vtendum.

Trochisci de rhabarb. eupatorio, & absynthio.

TRes sunt trochisci, qui sunt similes. Ob id sufficiet vnum ex his retinere in officinis. Retinebimus eos, qui ad hunc modum sunt parandi.

R. rhab. 3. 10. succi eupatorii 3. 4. ros. 3. 3. spicæ nardi, amygd. amar. ana 3. 2. s. anis. rub. tinctorum, seminis apij, absynth. azari ana 3. 1. cum vino formentur, si succi inspissati & siccati sint. Si verò ex succo recenti, sine vino. Sed cum succis parandi sunt. In hac descriptione restituimus pondus, & ordinem amygd. amar. Nam antiqua exemplaria & ordo hoc docent, vt post 3. 3. sequantur 3. 2. vel 3. 2. s. Quòd si desiderasset amygd. amarar. 3. 4. cum eupatorio coniunxisset, vt coniunxit, quæ pondere tantum 3. 1. ponuntur.

Succum eupator. Mes vel succum de absynthio ipse substituit aliquando. Si trochisf. de absynth. & eupatorio carere possumus, cum istos habemus, qui valent ad liberandas obstructions hepatis.

Trochisci de capparibus.

TRoehisci de capparibus parantur ad splenis affectus, & obstructions auferendas. Recipiunt aperientia sine lachrymis, & hoc nomine differunt à trochiscis hepaticis, qui rhab. omnes recipiunt, & qui nomine rhab. appellantur de absynth. & eupatorio.

R. corticis radic. cappar. seminis agni casti ana 3. 6. melanth. calaminth. acori, amygd. amar. nasturtij, ammoniaci, foliorum rutæ, aristol. rotundæ, succi eup. ana 3. 2 cyperi. scolopendriæ siue ceterach ana 3. 1. dissolvatur ammoniacum aceto-acri, & cum dissolutione fermentur trochisci. Vera scolopendria est ceterach, quam lingua ceruina easdem vires habeat ad splenem absumendum. Melanthium, nigella Romana dicitur, non vulgaris, quæ melampyron est.

Trochisci alchechengi, siue de solano Vesicatorio.

EX baccis alchechengi fiunt trochisci, qui corrupto vocabulo trochisci alchechengi vocantur, & parari debent ob summam eorum necessitatem in affectibus renum & vesicæ ad dolores & vlcera eorum. Recipiunt autem hæc,

R. baccarum alchechengi 3. seminis citruli, melonum pro semine albæ techæ, cucurb. ana 3. 4. *ß.* boli armeni, gummi arabici, corticis thuris, sanguinis draconis, papauer. albi, amygdal. amar. succi glycyrrhizæ, tragacanthi, amyli, nucleorum pinearum ana 3. 6. semi. apij, succini, siue carabæ, hyoscyami, opij ana 3. 2. cum aqua mellis compingantur trochisci. Aliqui addunt terram sigillatam. Sed in optimis exemplaribus Mes. non legitur. Aliqui dubitarunt. quòd interpretes legant (peponis Indi) sed aliqui intelligunt de techæ alba, quæ est peponis species. Qui habent, ponant: qui non habet, seminare possunt. Si minus, semen peponum, vel cucumeris. Omnia ista semina idem præstant humiditate aquea, qua abundant.

Trochisci de carabe, siue succino.

EX succino parantur trochisci efficacissimi, quos retinere visum est ex Mesue.

R. carabæ, aureos 6. cornu cerui vsti, coralli adusti, tragacanthi, acaciæ, hypocistidos, balaustiorum, mastice, lacæ lautæ, papau. nigri assil leuiter. ana aureos duos, thuris, croci, opij ana aureum vnum *ß.* cum mucilagine psilij, extracta cum aqua ros. fiant trochisci. Hos transcripsimus ex Mesue, & pondere quo ipse vsus est, nos quoque vsi sumus, aureo, scilicet, quod pendet 3. 1. *ß.* apud eum, & alios. Nihil est periculi, si quis pro aureo 3. legat,

legat, quia omnia simplicia eodem pondere notantur. Quare semper eadem proportio seruatur, non autem pondus idem compositionis rotius, quod parum refert, quando tota quantitas vna dosi non sumitur. Pro (Hemphistidis) reddimus (hypocistidis) ne nomen Arabicum remoraretur Pharmacopolam. Adiciamus mucilaginem extrahendam cum aqua ros. quia constringit & odoris suauitate aliorum foetorem emendat. In Mes. quia non legitur (gummi alsi) prætermisi. Quòd si placeat, expunge laccam lotam, quia nostra si esset, cancamum non conuenit, vel pro lacca, sang. draconis ponendum suademus.

Trochisci de antispodio, cum semine acetosæ.

Trochisci ex spodio Arabum, id est, antispodio, parantur duobus modis sine semine acetosæ, & dicuntur simpliciter de spodio. Alij cum semine acetosæ. Ob id de spodio cum sem. acetosæ dicuntur, qui magis probantur à practicis. Ob id illos retinemus, quia efficaciores ad constringendum sunt, & recipiunt hæc,

℞. ros. rub. 3. 10. antispodij ex myrtho, vel oliuæ, vel cotoneis 3. 10. sem. acetosæ 3. 6. sem. portulacæ, granorum coriandri infusorum in aceto, deinde torrefactorum, pulpæ sumach ana 3. 2. β. amyli assi, balaustiorum, berberis, ana 3. 2. gummi arab. alsi 3. 1. β. cum succo acetosæ fiant trochisci.

Trochisci de scylla.

Ad theriacæ præparationem ex scylla parari debent, in fine Veris. Ex Gal. sic parantur.

℞. carnis scyllæ decoctæ 3. 4. farinæ orobi leuiter torrefactæ, vel micæ panis candidissimi 3. 2. formentur trochisci oleorosaceo, & seruentur in domo spectante ad meridiem, non tamen in sole, & moueantur frequenter, ne situm contrahant. Scylla bonæ habitudinis, id est, eligenda recens. Illam massam ex optima farina inuolue, & in furno vel sub cineribus coquito, donec mollescat, & abiectis primis tunicis & cortice lignoso, mediam in mortario in læuorem coge, coque, & addita sufficienti quantitate farinæ orobi torrefactæ, vel micæ panis, fiant trochisci. Farina orobi usurpatur, quia apta est ad formandos trochiscos, & pugnat aduersus

venena. Et quoniam eruum aliud est album, aliud flauum, eligitur album: quo deficiente, vsurpatur flauum, vel mica panis candida. Sunt qui volunt æqualem portionem: Alij dimidiam: Alij tertiam tantum: Alij duas farinae, tres carnis scyllæ. Hæc melior est proportio, & secundum hanc parabimus.

Trochisci de Viperis.

EX viperarum carne parantur in officinis trochisci initio æstatis ad theriacæ præparationem, quæ æstate media & feruida paranda est, & cum herbæ, flores, & fructus habent ferè mäturos. Parantur ex carne viperarum, & pane tantum, varia proportione apud diuersos. Sunt enim, qui dimidiam, qui tertiam, Galen. quartam, vel quintam miscet. Nam panis ad excipiendam carnem, & seruandam ponitur. De præparatione pauca, plura in diario, seu ephemeridibus Pharmacopolarum. Caro viperarum tum vsurpatur, quia caput, cauda, & pellis, & interna abiicienda sunt, eoque tempore magis, quo plus carnis habent, vt paulò post quàm è terra exeant, & illæ, quæ ventrem non gerunt. Caro decoquatur in sufficiente quantitate aquæ, vt anguille solent decoqui.

Trochisci de galla moscata.

Non tam ad voluptatem trochisci isti parantur in officinis, quàm ad sanitatem. Vtimur enim in affectibus cerebri, vteri, cordis. Quare parare oportet, sed in pauca copia, quia semper licebit, potissimum descriptionem Mes. parare. Hisce tribus parantur.

℞. ligni aloes (pro quo santali citrini) 3. 6. ambræ 3. 3. moschi 3. 1. mucilaginis, gummi tragacanthi ex aqua ros. excipiantur trochisci. Non desunt qui ambram dissoluere velint in oleo de ben, vel amygdalar. ex eoque confingere. Hoc faciunt, vt magis effument. Sed si quis velit suffumigia parari, ex his, postea quàm exsiccati sunt, oleo inungantur, & seruentur vsui in vase plumbeo, vel terreo vitreato, vel vitreo, vt odor seruetur.

Alipta moscata, descriptione Nicolai.

Plueribus constat alipta Nicolai in vsum communem recepta. Cuius descriptiones in quibusdam desiderantur. Hæc sufficit & probari potest. Constat autem sequentibus.

℞. ladani puri ʒ. 3. styrac. calaminthæ ʒ. 1. β. styracis rub. ʒ. 1. sandali citrini ʒ. 2. ambræ ʒ. 1. camph ʒ. 1. β. moschi ʒ. 1. Aqua ros. excipiantur, & formentur trochisci. In his formandis mucilago non recipitur, quia hæc omnia ferè emplastica sunt, & ferè coniunguntur in vnum.

De cyphis Democratis.

TRochisci, cyphi, dicti, odorati suffimente. Compositio hæc erat dicata diis, qua utebantur Ægyptij sacerdotes, teste Dioscoride. Sed quia in mithridatica vera compositione ponitur, & per se vsurpari potest, eius descriptionem prætermittere nolimus. Multæ sunt componendi rationes, quarum vnam tradit Dioscorid. Alteram Democrates apud Galen. carmine, quæ variari non potest ob versum rationem. Ob id eam tenuimus cum Galeno.

℞. carnium vuarum passarum, alb pinguium, expurgatarum à pelle & gigartis, terebinth repurgatæ, & coctæ in aqua, donec dure scat, ana ʒ. 24. myrrhæ, schænanthi ana ʒ. 7. calami arom. ʒ. 9. cinamomi ʒ. 4. bdellij, vel myrrhæ. blattæ bizantiæ, spicæ nardi, cassiæ seu cinamomi crassi, cyperi purgati, baccarum iuniperi magnarum vel paruarum, pinguium, ana ʒ. 3. asphalti, vel sem. agni casti ʒ. 2. β. croci ʒ. 1. mel. optimi. & vini ana q. s. ad formandum. Carnes tundendæ diligenter, passulæ & bacce iuniperi, deinde myrrha. Bdellium in vino dissoluatur: reliqua in tenuissimas partes redacta, miscantur, addendo mell parum, & vini ad trochiscos formandos. Siccentur, & vsui seruentur. Dioscor. descriptio in aliquibus variat, scilicet, in ponderibus & numero simplicium. Resinam enim mundatam, & liquatam miscet. Nos ob rationes prædictas Democratis retinimus. Baccas iuniperi paruas substituimus, quia magnis caremus. Agnum, pro asphalto, cum Ægineta myrrham pro bdellio posuimus.

De oleis.

Olea oportet habere, quæ ipsa citra aliam mixtionem vtilia sunt ad dolores, asperitates, & alios multos affectus curandos. Præterea ex ipsis cerata, linimenta, vnguenta, emplastra, irrigationes sunt. Qua-

re de his dicemus, deque his, quæ ex oleis parantur. Oleorum alia simplicia sunt, alia composita. Simplicia, quæ nihil accipiunt à compositione, præter separationem, vel extractionem, ut oleum oliuarum, amygdalarum, nucum, ex semine sinapi, anisi, lini, & aliis seminibus similibus, vel semine vel fructu aliquo pingui. Composita verò sunt, quæ ex oliuis, floribus, herbis, vel odoratis parantur. Et hæc sunt quæ in officina habere debet Pharmacopola. Oleum omphacinum, vel eius loco paratum cum foliis oleæ, dulce, maturum, sine foliis & sale paratur statim post collectionem: oleum antiquissimū, vel eius loco, ex oliuis natis ex loco saxoso, & cocto, paratum post multos menses ex collectione oliuarum. Tale enim acre fit, quale est antiquum, vel dia coquendum, ut antiquo respondeat.

Oleum sesaminum.

Oleum sesaminum vile est in Sicilia, ubi ingens copia nascitur, sed nobis carum. Quare quæ ex sesamo olea parantur, ex oleo dulci esse debent, & maxime pingui, & crasso, qualia sunt olea, quæ in campestribus locis, humidis, & feracibus terris, colliguntur, vel ex oleo amygd. dulc. laurinum, nardinum, rutaceum, ancinum, irinum, chamæmelinum, lilliorum, de absynth. masticinum, lentiscinum, myrthinum, omphacinum, rosatum, & completum, de coroneis, de menta, violaceum, de nenuphare, de pap. de mādramo. de costo, de euphorb. de piperibus.

Oleum rosatum omphacinum.

Hoc duplex est. Aliud rude, quod omphacinum ros. dicitur: aliud verò compositum. Oleum rude ad refrigerandum & repellendum conficitur ex oleo omphacino, & rosis non expansis. Ratio parandi talis est, Accipe eam quantitatem olei omphacini, quam voles. In aqua infunde ros. parum contusarum quantitatem ei respondentem. Pone in vase vitreo, vel vitreato, & diligenter obtura. Expone soli per dies septem, & quotidie volue vas, ut undiquaque incalescat. Deinde leuiter decoque in duplici vase. Postea exprime, & illas rosas abice, & secundo alias rosas infunde, &, ut prius, repone in sole per vij. dies. Rursus decoque, imponendo aquæ rosarum

farum, vel infusionis ros q. s. Decoquatur leuiter, & reponatur oleum, & vsui seruetur. Simile fieri potest ex rosis ficcis, & aqua ros. quod magis constringit & non multò minus refrigerat, & oleo abluto aqua frigida & cum succo palmæ, vel cydoniorum, quod magis constringet, & non multò minus refrigerabit.

De oleo rosato completo.

Oleum completum ex oleo dulci, & maturo, & rosis expansis, contusis, & soli expōitis, & leuiter decoctis in duplici vase, vt ros. omphacinum componitur. Hoc ad dolores conuenit. Post annum valet adhuc ad confortationem & doloris mitigationem, omphacinum verò post annum inutile est ad refrigerandum & repellendum. Quare pro completo, secundo & tertio anno vsurpari potest.

De oleo myrthillorum.

Oleum myrthillorum, prope rosaceum omphacinum rude collocari debet. Refrigerat enim, repellit, & abstringit. Sic paratur,

R. olei omphacini lb. 4. myrthil. confractorum lb. 1. aquæ lb. 2. Bulliant ad aquæ consumptionem. Si aqua decoctionis, vel aqua myrthi apponeretur, efficacius esset. Hoc oleum parari debet hoc modo, vt præstet quæ pollicetur, & possit refrigerare & repellere. Quare sine vino, sed cum aqua decoctionis vel distillationis myrthi parari debet. In aqua verò multa succus ponitur, ne vratur oleum coctione. Vinum autem apponendum non est, nisi forte tempore applicationis, necessitate expostulante, ad penetrationem. Non enim semper vinum conuenit, vel acetum. Quare cum conuenit, addatur. Nam parare cum vino, est medicamenti vim impedire.

De oleo cydoniorum.

Oleum cydoniorum parare debemus, quia est efficax ad refrigerandum, repellendum & constringendum, & in quibus regionibus myrthus non reperitur, hoc substitui potest. Paratur autem hoc modo.

R. carniū cydoniorum maturationis mediæ cum cortice sed sine semine, quia mucilaginem habent, succi cydoniorum, ana partes æquales, olei omphacini

q. l. reponantur in vase vitreo ad solem per 15. dies, deinde diutius coquantur, quàm rosatum, & in duplici vase collatum reponatur in vsum. Quòd si efficacius efficere volueris, abiectis primis ponantur alia cydonia, & rursus insola, incoq; vt prius cum succo. Vel 40. dies insola, & coque minùs. Igne Paulus non coquit, sed insolat per 40 dies. Sed cum hoc oleũ paretur ex carne & succo cydoniorum, quæ substantia est dura, melius est parare, vt prius. Melior est illa præparatio Mes. vt in sole macerentur prius, deinde decoquantur in duplici vase. Illud Diosc. non est parandum.

De oleo nymphaeæ.

Oleum ex floribus nymphaeæ parari debet, quia est efficax ad refrigerandum, & constringendum, & venereos impetus extinguendos. Paratur autem, vt rosaceum, ex omphacino, in hunc modum.

℞. olei omphac. ℥b. i. florum nymphaeæ albæ 3. 4. contundantur, macerentur, & insolentur, & in duplici vase leuiter coquantur, exprimantur, vsuique seruentur. Quia hebet multum aquæ substantiæ hoc oleum, multum decoqui debet, vel flores per duos dies seruandi, vt marcescant aliquantulum, & tunc minùs decoquere oportet, absumpta nimium aquosa substantia.

De oleo violaceo.

Oleum violaceum parandum est Vere, ex floribus viol. & oleo dulci, non antiquo, neque solito hoc modo,

℞. olei oliuarum dulcium ℥b. 2. viol. recentium 3. 4. infundantur, & insolentur per dies 7. Postea bulliant leuiter, duplici vase, per horam. Hoc oleum cum sit ex floribus, sufficit leuiter decoquere, ne longa coctione vis resoluitur, & oleum calidius reddatur. Non sunt ponendæ violæ siccæ in fine, quia nullius sunt efficaciz, nisi parum admodum exiccatæ. Magis enim ob humiditatem usurpantur, quàm ob aliud. Refrigerant etiam magis recentes ob humiditatem, quàm siccæ. Est enim aliquid in eis quod linguam pungit, cum masticantur. Vtile est ad refrigerandum, & leniendum dolores acres.

De oleo liliorum.

Oleum liliorum simplex, & compositum olim erat
vt ex

ut ex Dioscoride videre est. Compositum fiat ex oleo, myrrha, calamo aromatico, cardamomo. Olei inspissamentum seruabunt, quo utebantur in affectibus neruorum, & vteri. Inspissamentum & fecem appellabant magna illud, vnde Barbari pro magmate accipiunt fecem olei de lilio simpl. quæ contrariam facultatem habet. Quare si quis præscribat fecem olei oliuarum, non fecem simplicis, sed compositi intelligere oportet. Cuius descriptionem apud Dioscor. reperies. Simplex conficiebatur ex oleo balanino, id est, ex oleo de sem. behē, quod semen antiquis, & balanus myrepica vel myrob. Plinio. Et quia istud oleum rarum est, erit parandum ex alio simili, ut oleo amygd. vel oleo dulci. Sed si ex oleo amygdal. fiat, efficacius erit, & ad sedandos dolores, & relaxandas partes frigore constrictas, & potissimum vuluæ, & ad rarefaciendum.

R. olei oliuarum, vel amygd. lb. i. florum liliorum alborum, amota parte interna crocea ℥. 4. Hi flores satis humidi sunt. Quare citra aquæ admixtionem insolandi, & in vase duplici diutius coquēdi, donec humiditas absumpta sit, quæ solet oleum corrumpere, ut de nenupharino dictum. Seruandi flores post collectionem, ut matrescant.

De chamamelino.

Hoc oleum semper paratum habere oportet, quod ad multa vtilissimum sit, ut ad sedationem doloris, ad febres, ad resolutionem & conformationem artium.

R. olei dulcis lb. 2. & ℥. 4. florum chamomilæ ℥. i. infunde, & soli expone. Deinde leuiter decoque, & rursum flores adde, & soli tantum appone, & vsui serua.

De anethino.

Qvanquam non multum facultate differunt hæc duo olea, cum tamen hoc facile parari possit, & sine magna impensa, parandum censeo. Est magis calidum, & in doloribus frigidis & flatulentis magis conuenit, paraturque ut chamæmelinum.

R. olei dulcis communis lb. 2. ℥. 4. florum anethi ℥. 10. & ℥. 2. Infundantur, & insolentur, & leuiter decoquantur. Rursum alij flores addantur, & insolentur tantum. Nam insolatio sufficit ad mixtionem florum odorato-

rum, & tenuium partium. Ob id sufficit humidos primos decoquere, & in oleo calido secundos exiccates iniicere, & insolare. Nam qui secundo adduntur, in hoc & in oleo calido sicei poni debent. Propè oleum chamæmelin. collocari debet, & post hoc violaceum.

De rutaceo.

Oleum rutaceū ubique parari potest, & debet, quòd sit efficacissimum, ad calfaciendum, resoluendum, & discutiendum. Fit autem hoc modo,

R. olei oliuarum antiqui lb. 3. foliorum rutæ, & succi ana ʒ. iiij. infundantur, insolentur, decoquantur leuiter, collentur, & vsui seruentur. In hoc non est facienda secunda infusio, quia ex herba & succo posuimus ʒ. 4. pro ʒ. 3. Ea enim quantitas minor erat. Non me latet hoc factum ob herbe efficaciam maximam, & foetorem. Verum hoc oleum efficacissimum esse dicitur. Quare sic non parandum. Nam in magnis & extremis morbis minus solliciti sumus de foetore. Erit etiam ob foetorem vsui in morbis vterinis, appositum naribus, & vmbilico.

De oleo irino.

Irinum ab iride dictum est. Conficitur ex oleo antiquo, floribus iridis, & radicibus, & decoctione radicis. Parabitur autem in hunc modum.

R. olei oliuarum antiqui dulcis lb. 2. succi radic. iridis ʒ. 2. infundantur, & insolentur, & coquantur ad consumptionem succi. In fine adde florum irid. ʒ. 4. & rursum decoquatur cum floribus leuiter. Non enim sufficit macerare flores ob crassitiem & succi copiam. Oleū deinde colla, & in vsum serua. Valet cōtra flatūs & affectiones neruorum frigidas.

De oleo cherino.

Oleum cheri, dicitur oleum de leucoio luteo, quo possumus carere, si irinum habeatur. Si quis velit parare, faciat hoc modo,

R. florum cheri ʒ. 12. olei antiqui non saliti lb. 2. insolentur per tres dies, & leui igne coquantur in balneo mariæ. Seruetur vsui. Idem præstat, atque irinum.

De oleo enulato.

Oleum enulatum dispensari non debet, quia easdem vires habet, cum irino. Quod si quis requirat omni tempore

tempore & facile parabitur ex radicibus contusis, & succo enulæ coctis, vt irinum.

De oleo castorei.

EX castoreo paratur oleum, quod omni tempore, & nullo negotio fieri potest. Sed quia in apoplexia, caro, lethargo, & aliis capitis & neruorum morbis est utile, præstat paratum habere.

R. olei antiquissimi lb. j. saniei castori, vel illius solidæ substantiæ ʒ. j. leuiter decoquantur. In castoreo reperitur sanies quædam ad instar butyri rancidi liquefacti, quæ ob similitudinem, quam habet cum oleo, facile miscetur. Ob id nulla decoctione eget, sed potius agitatione, & calfactione. Si verò substantia interna castoris sicca sit, reducenda est in pul. & leuiter calfacienda. Ob substantiæ tenuitatem, & acrimoniam facile oleum afficit. Nolui saniei illius causam exortumq; tradere, cum aliis locis diffusè & ex professo tradiderim.

De euphorbio.

Hoc oleum facile, & omni tempore paratur, & sufficit vel oleum castorei, vel euphorbij paratum habere. Paratur autem ex euphorbio, oleo, & vino. Cuius descriptio duplex est. Alia olei simpl. alia compositi. Sed simplex parandum. Nam compositum natura cum oleo de piperibus conuenit. Præterea vix parari potest ob defectum struthi, quo caremus. Quare sufficit simplex, quod in hunc modum parabimus.

R. euphorb. albi & loti ʒ. j. ol. lb. i. vini parum. Leuiter coquatur, vel potius incalescat. Vsi seruetur. Est enim tenuissimæ substantiæ, quæ, vt de castoreo dictum est, facile permiscetur.

Oleum de costo.

R. Costi amari ʒ. 3. cinamomi crassi ʒ. 4. extremitatum sampsoci ʒ. 8. vini odoriferi parū, olei antiqui lb. 3. Macerentur simul per tres dies, & leuiter coquantur ad consumptionem vini. Colla, & vsui serua. Hoc omni tempore parari potest. Carere possumus, ne multitudine vasorum perturbemur.

Oleum mastichinum.

Omnino tempore parari potest. Carere possumus. Sed quia frequenter eo vtuntur Medici, aliquam quan-

titatem præstat habere Sic paratur,

R. mastiches ʒ. 4. olei dulcis ʒ. 12. vini optimi parum. Decoquatur leuiter. Paratur duobus modis apud Mes. cum oleo ros. vel sesamino. Et quia Mes. vsurpat ad ventriculi & iuncturarum confortationem, ad sedationem dolorum, & ad apostemata dura, ob id illam priorem descriptionem apposuimus, quod paramus ex oleo dulci, loco sesamini Quod si quis velit magis constringere, oleū ros. ol. cydoniorum, vel myrtil. addere poterit. Sic paratum, vt diximus, magis ad dolores leniēdos, & abscessus conuenit. Nam mastiche emollit, & constringit, si practicis credimus. Quare magis emolliet & cōcoquet, si cum oleo dulci, vel sesamino paretur.

Oleum de menta.

Oleum de menta ex succo mentæ parari debet. In fine veris paretur. Tunc enim succi extrahi debet, & ad medicamentorum præparationem & conseruationem. Dios colligendi tempus succū esse vult, cum teneros emittere caules incipiunt, quia tūc plus succi habet, quàm cum ad statum peruenerunt, magis coctum, & excremētitiū ante caulis eruptionem. Paretur autem sic,

R. foliorum mentæ viridum, & succi eiusdem ana ʒ. 4. ol. omphac. lb. 3 reponantur in vase vitreo per 15. dies. Leuiter coquantur in duplici vase, ad succorum consumptionem. Facta eius expressione, vsui serua. Hoc oleum alij ex omphacino, alij ex dulci, alij ex antiquo parant. Sed cum ad nauseas, vomitiones, ventriculi corroboracionem, & appetentiam excitandam detur, oleum omphacinum magis conuenire videtur ad has actiones. Adde quod antiquum calidius est, quàm oporteat ad vomitiones, quæ magna ex parte solent ob bilis in ventriculum effusionem promoueri. Adde quod à menta satis caloris habet, & minorem astringendi vim, quàm vt vomitum compescere possit. Quod aliqui dicunt ad scirrhum ventriculi valere, stultum est putare scirrhum curari posse. Quod si quis ventriculi scirrhum curare velit, oleum mastichinum accipiat, quod ventrem roborat & emollit. Si maiorem emolliuionem requiras, habes alia remedia ad id efficacissima. Nos igitur parabimus ex oleo omphac. vel ex oleo loto aqua rosarum, vel succo

succo cydoniorum, quia meliora exemplaria sic habent.
& rationi magis conuenit hæc lectio.

Oleum de absynthio.

Oleum de absynthio eodem ferè tempore parari debet, quo oleum de mēta, quia herba plus succi, minus acrimoniæ habet. Ex absynthio Romano paretur hoc modo.

℞. summitatum absynth. Romani, succi eiusdem ana ℥. iij. olei oliuarum completarum lb. ij. paretur, vt de menta dictum est.

Oleum nardinum.

Oleum nardinum, veriùs oleum inspissatum, & unguentum, antiquorum more, dicendum esset, quia ex multis odoratis paratur. Et quanuis nullum oleum antiquorum inspissatum retineamus, hoc tamen parandum ad multas affectiones ventriculi, vteri, neruorum suademus. Sed huius descriptiones tres sunt apud Mes. Prima simplex est ex spice ℥. iij. aquæ & vini ℥. ij. β. ol. sesamini lb. iij. coctis & agitatis frequenter. Tertia descriptio est magis composita, quæ, vt mihi videtur, magis parari videtur, quàm secunda, quia minùs est composita, & magis, quàm prima. Secunda, qua hodie nostri vtuntur apud nos, hæc est.

℞. spice nardi ℥. iij. samplici ℥. ij. xyloaloes, vel eius loco, sandali moschatelini, vel citrini, enulæ campanæ, folij Indi, vel eius loco, galangæ, vel calami aromatici, vel spice, foliorum lauri, scœnanthi, cardamomi ana ℥. j. β. Irrigentur aqua & vino permixtis, priusquam conterantur. Deinde adde olei communis pro sesamino lb. vj. Coquantur leuiter, & vsui serua. Huic si addas moschi ℥. β. pro tota quâtitate, substitui poterit pro muscatelino. Tertia in hunc modum.

℞. spice nardi ℥. iij. styracis, garyophyl. ana ℥. iij. nucis moscatæ ℥. quinque, olei balsami, vel eius loco, de spica ℥. vij. olei sesami, vel communis dulcis lb. iij. infundantur, agitentur, leuiter decoquantur. Hoc non paramus, quia oleo balsami caremus. Sed oleû de spica proportionè respondet tenuitati, & temperamento. Quare commodè parari poterit. Hoc aliquando vsus sum cum maximo successu.

Oleum muscatelinum.

Quia muscatelinum recipitur in vnguento Aragoni & frequenter vtuntur in affectibus aurium, & vreti, visum huic loco descriptionē apponere, vt, videlicet, quantum conueniat cum supradicto in viribus, agnosci possit. A moscho muscatelinum dictum est quibusdam. Qui dicunt à Galen. compositum fuisse, ineptè scripserunt. Nam Gal. moschum hō cognouit. Paratur non nisi à diuitibus pharmacopæis, & difficillimè. Nam multa sunt, quæ non reperiuntur in officinis, nec componitur in omnibus officinis.

℞. olei lb. iij. folij, spicæ nardi, costi, mastie. ana ʒ. j. b. styracis, calaminth. croci, myrrhæ, cinamomi crassi, siue cassiæ lignæ, ligni balsami, bdellij an. ʒ. iij. moschi ʒ. j. nucis Indicæ ʒ. ij. Hoc vnguentum est corruptum, & incertum. Nam descriptio, quæ in Luminari maiori reperitur, habet lb. ol. vj. & statim addit ol. lb. iij. quod forsitan erat legendum ob varietatem lectionum. Habet & bdellium, pro quo duplum myrrhæ, vel illam speciem myrrhæ, quæ concolor est, lineas, & vngues non habet, & bdellij modo lentiscit, ponere licet. Sed quod sequitur, magis erat incertum. Nam mucilag. ʒ. j. ponit. Alij, inquit Luminare, dicunt mucilag. ʒ. j. vel ij. Ego legendum moschi hinc coniicio, quod secundum eundem authorem muschatelinum dictum sit à moscho, quem recipit. Sed cum duo sint hodie moschi genera, moschus arboris, & animalis naturalis sanies, vel caro odoratissima, nec dubito aliquos in ea sententia esse, vt putent moschum animalis ponendum. Quod si ponatur ʒ. j. legendum est non ʒ. j. Ego puto moschum arbo-rem esse iniiciendum, quia odoratus est, & olim miscbatur balanino vnguento, & aliis, quæ vngendo sunt, ob vim inspissandi, quam habet. Vtile præterea accommodatumque acoporum confectioibus, & eorum, quæ ad euaporationes cōceduntur à Diosc. lib. 1. cap. 20. Nucem Indicam ponendam esse omnes Arabicæ linguæ interpretes dicunt. Quanquam aliqui putauerunt hoc ol. balaninum esse. Quare non nucem Indicam, sed balanum myrepficam, id est, glandem, quam nunc vocant semen behen, accipiendum, & sic esse balaninum muschatelinum,

telinum, ad differentiam simplicis olei, quod moschum non recipit. Nos inde colligimus duo fuisse parata genera, quod oleum balaninum Diosc. moschum non recipiat, tamen cap. de moscho recipi scribit, vel oleum balaninum Dioscor. est corruptum. Quare liberum erit, vel balanum myrepicam addere, vel nucleum Indicam. Sunt enim eiusdem facultatis.

Oleum de pipetibus.

Oleum de piperibus efficacissimum est. Quare parandum. Verum descriptio fuit omnino immutata, & corrupta. Nam forte sciolus aliquis, qui non sciebat Græcos suos habere myrobalanos, immutauit in Arabicos, & sic hoc efficacissimum & conuenientissimum ol. duobus modis corripit. Primum, quod pro balano myrepica, id est, glande vnguentaria, myrob. Arabicos posuit, qui ex diametro pugnant cum balano myrepica, quod semen behen vocant. Emollit, confert frigidis affectibus nervorum, resolut durities, vt testatur Mes. vt raceam quæ Dioscor. scripsit. At myrob. Arabici frigidi cum sint, & astringentes, & crassarum partium, constringunt, refrigerant, indurant, contrahunt, opposita præstant. Aliud ex illa immutatione factum, vt modus & præparatio corrumpatur. Nam myrobal. dixit 3. v. Hic pro 3. v. posuit 3. xx. Alius error minus tolerandus est, vbi legitur, hyoscyami albi, cum hyoscy. semina frigiditate nervos lædant, & cerebrum stupefaciant. Nos, pro hyoscyamo, legimus agaricum album, qui intus & extra nervos iuuat, nec qualitatibus manifestis caliditate, & siccitate, sed similitudine substantiæ puitosam materiam retrahit à partibus nervosis, & digerit. Præterea coniectura ex facultatibus, & ex eo, quod sequitur, collegi. Legitur præterea (turbith boni & electi) quo quidem facultatem similem habet, & eadem ratione ponitur. Nos igitur sic parabimus.

R. trium pipereon ana 3. iij. balani myrepic. id est, seminis behen 3. vj. rad. apij, scenic. ana 3. iij. ss. sagapeni, opopanax, agarici albi ana 3. ij. ss. turbith boni 3. xij. zinzib. 3. iij. summitatum hyssopi recentis, sol. rutæ ana M. j. aquæ lb. xxij. ol. ricinini, id est, palmæ Christi, vel amygdalarum amararum, heminas duas, id est 3. xvij.

Hemina enim continet ol. 3. viij. vini 3. x. mell. verò 3. viij. Alij addunt ireos 3. vj. tapfiz 3. ij. anisi, cardamomi ana 3. j. β. calami aromatici 3. ij. β. spicæ nardi 3. j. expressionis hyssopi, vel thymi, sextarios tres. Hæc verò si addantur, efficacius erit. Sed cum tapfi non ubique reperiatur, pro ea prassij, vel nasturtij, vel crucæ semen ponendum, vel euphorbium, vt Gal. de compositio. medicamentorum secundum locos docet. Antiqua, & corrupta descriptio.

R. trium pipereon 3. iij. myrob. chebulorum, bellericorum, emblicorum, indorum ana 3. vj. radices apij, foniculi ana 3. iij. β. sagapeni, opopanax, hyoscyami, turbiti boni, albi ana 3. xij. zinzib. 3. iij. summitatum hyssopi recentis, foliorum rutæ ana M. j. aquæ lb. xxiiij. olei irini, heminas duas. De hoc satis.

Oleum laurinum.

EX baccis lauri, coctura longa, extrahunt rustici nostri in Valuagi, & Nemausensi agro, vbi frequentissima est laurus. Sunt, qui distillatione extrahunt, vt ex omnibus seminibus pinguibus. Sed quod coctura extrahitur, crassius est: quod distillatione, tenuius & calidius. Hoc carere non oportet, cum sit in frequentissimo vsu in vnguentis ad morbum Italicum. Conficitur autem in hunc modum, Lauri baccae immaturæ contunduntur, & affatim in aqua decoquuntur: deinde refrigerari permittuntur. Quod supernatat, decapulant, vel vas in fundo perforatum habent per quod aquam egredi sinant, donec ad oleum, quod supernatat, ventum est. Nihil aquæ relinquitur, & quidquid relinquitur olei extrahitur & reponitur.

Oleum amygdalarum, & aliorum simul fructuum.

Oleum ex amygd. dulcibus, & amaris, & pineis, nucibus, & auellanis & similibus fructibus, vt è chrysomelis eadem ratione extrahitur. Alij tundunt minutissimè amygd. mundatas, vt cum intus assumere volunt. Alij cum cortice incidunt: alij sine aquæ mixtione tundunt, quas in magdaleones disponunt, & in loco calido per quinque horas seruant: deinde panno forti comprehendunt, & torculari fortiter constringunt, & sic extrahunt oleum. Alij, vt celerius, in sartagine frigunt, mo-

uendo

uendo semper, ne vrantur: postea fortiter exprimunt, donec nihil reddatur. Verum oleum amygdalarum amararum, & dulcium, quod pro vnguentis paratur, ex his in sartagine frixis elici debet, vt calidius & antiquius. Si verò prima ratione extrahitur, minus olei, sed dulcius, & minus acre diutius durat.

Oleum vulpinum.

Olea ex animalibus integris parantur, vt ex vulpecula, vermibus, torpedine apud Paulum. Oleum vulpinum aliquibus sic paratum placet: ex vulpecula viua, aliis, exanterata parari. Ex viua, nullam aliam facultatē habet, sed vt exanteretur, non probo. Satis est, si excrementa alui extrahantur. Nam intestina adipe inuoluta sunt, & habent multum succi, vel saniei. Quare præstat excrementa alui exprimere: deinde cum pelle & aliis partibus decoquere cum aqua marina, vel salsa: in quibus summitates anethi, & hyssopi ad lb. j. decoctæ sint, & simul decoquere, addendo olei sextarios ij. s. in aque sextariis duobus. Decoquantur vsque ad vulpis dissolutionem, & fiat oleum, vsuique seruetur. Hoc oleum cum aqua marina, vel salmuria decoqui debet. Alioqui statim corrumpitur ob copiam humiditatis aqueæ, quæ breui absumi coctura non debet, vel in ol. antiquo & pauco sale tantum decoquitur.

Oleum lumbricorum.

Semper parari potest. Quare parum habere sufficit. Sic autem parabitur.

℞. olei antiqui dulcis lb. ij. vini ℥. ij. vermium terrestrium lb. s. bulliant ad vini consumptionem, vsuique seruetur.

Oleum ex torpedine.

Ex torpedine pisce, quem gellinam vocant nostri, & oleo, fit oleum, quod maximè confert ad articulorum dolores arcendos.

Oleum ex thymelea.

Ex thymeleæ semine, vt ex semine canabis, vel alterius seminis pinguis, vel ex foliorum decoctione paratur ad hunc modum.

℞. fol. thymeleæ & succi eiusdem ana ℥. iiij. vini albi ℥. iiij. ol. amygdal. amararum lb. j. macerentur per xxiiij.

horas: deinde decoque ad consumptionem aquæ & vini, vltique seruato. Vtui est ad sudores eiiciendos, vrinæ retentionem, & hydropisim, vel cutis foedationem.

Oleum sycionium.

Alij à regione cum Dioscor. sic dictum volunt libro primo, cap. 33. Alij à radic. cucumeris agrestis, quæ à Græcis *sycios agrios* dicitur, vnde sycionium dictum est. Duplex est, simplex, & compositum. Simplex ex elaterio, vel radic. cucumeris agrestis sicbat, vt ex Paulo cap. 77. lib. 3. colligere licet. & lib. 7. cap. 20. rationem componendi sic docet.

℞. cucumeris agrestis rad. refrigeratarum 3. ij. pondere. In oleum sextarium Italicum mittitur, atque in lebetè coquitur, fitque sycionium. Hic rad. refrigeratam, vocant siccata, vel conseruatam post eius collectionem, vt humiditas absumpta sit. Sic loquitur Dioscorid. aliquando, nisi quis velit dicere, refrigeratam, emortuam, cum è terra prodita sit calore natiuo, qui sensim emoritur. Sed melior est prior interpretatio. Hoc parari potest, quia facile componitur. Compositum ol. descriptum est, & à Gal. & à Dioscor. & Paulo. Sed illa Dioscor. corrupta est. Nam in vulgatis exemplaribus ol. album, est sycionium, & sycionium est album, quamuis viribus differant, & facultate multum. Sed de hoc multa in commentariis in Dioscoridem.

Oleum de frumento.

Ad impetigines, & cutis affectiones paratur, & quidem omni tempore, nullo negotio. Ob id seruandum minimè cenfeo, quia paratu est facile, & morbi, quibus accommodatur, nō sunt acuti. Quare per otium parabitur, idque variis modis. Nam alij superponunt triticum laminis ferreis ignitis, & alia superposita asfant, & inde defluens ol. excipiunt. Alij excorticatum in alambico distillant, oleumque extrahunt multo igne. Alij per descensum, vt ex iunipero, extrahunt. Illud efficacius est, quo vtor ad impetigines, & morpheas, in rusticis & minùs delicatis. Est magis olens, quam alio modo paratum.

Oleum de Iunipero.

Non solum ad animalium morbos, sed ad hominū conducit. Quare semper paratum inueniatur. Rustici

fici etiam illud parant per descensum. Diuidunt in frustra lignum, quo citius à calore affetur, & effluat oleum. In vas clausum lamina ferrea imponunt, perforata cribri modo, vt per illa foramina ol. descendat: cui oppositum vas iungunt, & inferius collocât, & in terra fodiunt, & ignem circa vas superius ponunt, vt tantum incalciscat superius, non inferius. Alij supra mensam lapideam ponunt vas illud, in quo sunt ramenta ligni, vt per colum longum in vas aliud sub mensa positum defluat, hacque ratione minus crassum & foetidum est, & hominum morbis melius est, & magis accommodatum.

Oleum philosophorum.

Oleum philosophorum, vel ex lateribus, quod ex lateribus in oleo maceratis extrahitur per alchimiſtas, qui philosophorum nomen sibi turpiter, & falso arrogant. Istud aurem paratur. Ab oleo antiquissimo non differt, nisi quod sublimatione, partium tenuitatem acquirat, & coctura cum lateribus aliquam ficcandi vim. Quare paralyſi, & ligamentorum laxationi magis conuenit, quam in alia caussa, ne quis pollicitationibus alchimiſtarum decipiatur, qui plura pollicentur, quam præſtent. Illud paratum habere non oportet, quia parari poteſt, nec eo frequentius vitimur.

Oleum ouorum.

Ex ouorum vitellis induratis multum frixis in fartagine, efficacissimum ol. paratur ad maligna vlcera, & veternos dolores ab vlcere. Quod tamen paratum habere non oportet. Est enim ex eorum numero, quibus frequenter nos vitimur, & quod semper parari poteſt. Paratur autem multis modis. Vel vitelli indurati in offis, conglobati prælo exprimuntur, vt amygdalæ, vnde effluit oleum, vel in alambico ficcati distillantur, vt lateres, ad oleum philosophorum parandum. Nihil enim est, à quo distillatione oleum non extrahatur, si sit pingue.

Oleum de myrrha.

Ex myrrh. ol. extrahitur, quo vitimur loco steactæ, in Etheriaca, & alijs nobilibus antidotis, in quibus steacte, id est, myrrha liquida desideratur. Nam styrax nostra non est illa, quæ à Serapione describitur, quæ eadem est cum Dioscoridis steacte. Extrahitur distillatione &

sublimatione communi, sed foetidum odoratum, si per aquam distilletur. Sed melius citra affationem sic paratur. Indurentur oua, & in duas partes diuidantur. Cauum extracto viteilo, myrrha repleatur, & supra discum, vel plumbum disponatur, sic ut myrrha discum tangat, & qui albumine tegatur indurato. Discus huiusmodi in loco subterraneo ponatur & declinè collocetur, ut ol. quod resudat, in vas aliud influat. Quod collectum vsui seruetur. Nihil empireumatis habet. Sed madore & frigidity in steactem resoluitur, quo tanquam spisso oleo fricari possunt vasa, & omnia instrumenta, quibus theriaca paratur.

De oleis factitiis per distillationem.

NOuam rationem excogitarunt neoterici extrahendi olei ex herbis, seminibus, lignis & leguminibus. Oleum seruat odorem rerum, ex quibus extractum est, & fragrantius expirat, ut ol. ex aniso, vel menta, vel thymo, vel saluia, adeo redolet, ut si in aliquo loco seruetur, totam domum impleat odore. Sed quia illa olea parantur magna impensa, sunt etiam efficaciora, quam quae aliquibus corporibus adhiberi debeant. Relinquo illa diuitibus, hisque qui huiusmodi rebus delectantur. Quare haec de oleis sufficiant, si tantum addidero, de omni medulla seminum posse extrahi oleum, ut ex amygd. ex semine pap. hyoscyami, cucurbitae, melonum, citruli, & lactucae, pinearum, nucibus, balano myrepisia, ex fisticis aliisque fructibus. Haec olea non debent parata seruari, quia rancida fiunt, & humiditatem amittunt. Calidiora redduntur, sed sufficit habere extrahendi rationem, ut ex recentioribus uti possimus, cum opus fuerit.

De ceratis.

CErata à cera nomen habent, quia ex cera & oleo conficiuntur. Pauca in officina parata habenda, quia omni tempore & citò parari possunt ex ol. aliquo & cera. Videntur autem esse media inter vnguenta & emplastra. Ex illis alia sunt verè cerata: alia minùs propriè dicta. Tamen à similitudine aliqua cerata dicuntur, quae herbas & alia praeter ceram & oleum recipiunt, ut illa quae hodie retinentur in officinis, ut ceratum sandalinum, stoma-

stomachicum, de œsipo, de pelle arietina, infrigid. Gal. & emplastra mollia, consistentia. Nam vt vera cerata vnguenta dicuntur, sic contrà. Sic improprie appellatur ceratum album Gal. quod ab antiquis, vnguenti nomine, dicitur. Talia enim oportet esse emplastra viscerum, vt hepatis, lienis & ventriculi. Si enim dura essent, dilationem ventris, & ex consequenti respirationem læderent. Ob id cerata dicuntur, quæ ad hernias, & scirrhum hepatis lienisque curandū valēt, vt illud Andromachi, stomachicum Gal. & cerata Thesei. Nos verò de his agemus, quæ necessaria sunt ad morborum curationem & consueta. Quædam verò eorum parata habere oportet, vt quæ antiquitate facultatem non amittunt, sed eam seruant, vt ea, quæ calida sunt, vt est stomachicum Gal. vel quæ certo tantum anni tempore parari possunt, vt œsipi, vel quæ difficilius parantur, quæ per otium parare oportet. Alia parata non seruanda aut pauca quantitate, & album Gal. Vel si paratum sit, aqua frigida innouandum, & abluendum & refrigerandum est.

Ceratum album Gal. siue refrigerans.

℞. ol. ros. 3. 3. vel 4. ceræ albæ 3. 1. Descriptio est apud Sylium & Euchium. Liquescat in duplici vase, & postquam refrigeratum fuerit, infunde aquæ frigidissimæ tantum, quantum recipere poterit, semper miscendo. Postea immittatur in vas plenum aqua frigidissima, vt magis refrigeretur, & in frigidiore loco domus seruandum. Aqua sit pluiiæ, vel fluuij, vel fontium, tenuium partium, & frigidissima est imponenda. Aceti parum addendum, si altius, & citius refrigerare velis. Melius est enim tempore inunctionis addere. Sine aceto autem parari debet, vt si parti non conueniar acetum, ea de causa vnguentum non reiiciatur, vt in doloribus vteri & pectoris, aliisque similibus.

Ceratum sandalinum Mesua.

Dicitur sandalinum, quia tria sandalorum genera continet. Valet ad refrigerandum, siccandum, & constringendum, ad fluxum sanguinis & alia. Quod paratum habere oportet, quia est in frequenti vsu, neque citò paratur. Fit autem in hunc modum.

℞. ros. rub. 3. 12. sandali rub. 3. 10. vel 11. sandalorum

alborum, vel citrinorum an. 3. 6. boli armeni præparati 3. 7. antispodij ex offe elephantis, vel myritho, vel cydoneis 3. 4. camphoræ 3. 2. ceræ albæ 3. 20. aliàs triginta, ol. ros. omphacini lb. i. liquefeat cera in oleo. Deinde omnia tenuissimè puluerisata infundantur, vt artis est, fiat ceratum. Sunt tamen qui imperant, ceram & ol. lauari. Quod non est faciendum, nisi cum oleum antiquum est, vel cera alba non est, sed citrina. Tunc enim abluere poteris, vel postquam cera liquata est & oleum, aqua frigida oportet abluere, & frequenter aquam mutare. Sed non post cerati compositionem, propterea quod tenuior pars puluerû, ablutione aufertur. Hoc cerato abutuntur plerique hodie, cum in febribus ab instructione præscribunt, cum vim obstruendi, & densandi habeat.

Ceratum æsippi seu æsipatum Galeni.

Multæ sunt huius cerati descriptiones apud Mes. quæ ad viscera indurata emollienda parantur, vt quæ acopa etiam esse possunt. Vnum ad Philagrium refertur, aliud ad Paulum, aliud ad Galenum. Sed quia ceratum Philagrij & Pauli bdellium desiderant, quo caremus, ob id mihi videtur illud Gal. ascriptum dispensandum. Dicitur autem æsipatum Gal. à Mes. quod recipit sequentia,

℞. ceræ nouæ flauæ 3. 3. ol. chamomilæ, irini an. 3. 6. mastiches 3. i. spicæ nardi 3. 2. croci 3. i. β. terebinthinæ abietis 3. i. resinæ 3. β. æsippi 3. 80. misce, fiat ceratum. Si quis fortius velit facere, ad emolliendos tumores durôs, addat ammoniaci 3. i. styracis 3. β. tuncque præstabit, quæcunque pollicentur alia Pauli & Philagrij cerata.

Ceratum de pelle arietina. Arnaldi de Villanova

ex 3. cap. de crepatura.

Ceratum hoc ab aliquibus emplastrum dicitur, atque inter emplastra reponitur, dictumq; improprie ceratum, quia non habet ceram. Sed id nominis habet, quia mollius esse debet emplastro, vt melius partibus accommodetur.

℞. lithargyri auri, lapidis hæmatitis. sang. draco. boli armeni, mastic. ammoniaci, mumix siue pisaphalti, vel asphalti duri, galbani, thuris cocti, lumbricorum

ter.

terrestrium ana 3. β . picis naualis, colophonix, ceræ albæ, & rub. ana 3. 1. radic. consolidæ mai. minor. & mediæ ana 3. 4. ros. myrrhæ, aloës ana 3. 4. stellæ marinæ combustæ, gallarum, balauftiorum, aristolochiæ longæ, & rotundæ an. 3. 6. visci quercini, terebinthinæ an. 3. 2. sang. hominis pituitosi lb. 1. minus quarta parte, coquatur pellis arietina, vel hœdina.

Ceratum stomachicum Gal. à Mes. vocatum.

A Stomacho, vel potius ventriculo, cui æcommo-
datur, dicitur, quod Mesues Galeno ascribit, quan-
quam nunquam tale dedit, fortè est compositio illius
cerati, cuius meminit lib. 8. methodi.

\mathcal{R} . ros. rub. mastiches an. 3. 20. fol. absynthij siccorum
3. 15. spicæ nardi 3. 10. ceræ mundæ albæ 3. 4. ol. ros. lb. 1.
 β . Cera lique scat in ol. & refrigerata lauetur frequen-
ter, primùm aqua ros. deinde vino veteri austero & suc-
co cydoniorum, rursus pauco aceto. Postremò omnia
tenuissimè trita misceantur, & fiat ceratum. Per stoma-
chum autem, totum ventriculum nostri intelligūt, cum
veteres pro gula acceperint. Illud modicè calfacit, &
constringit: vnde frequentissimè vsurpatur in ventriculi
relaxatione, vomitione, & cruditate.

Ceratum diapente.

Sic appellatur à numero quinario. Cōstat enim quin-
que rebus, excepta cera, quæ materiæ rationem ha-
bent. Valet ad emollitionem tumorum dutorum, ad cō-
uulsionem, vel spasmus neruorum. Illud autem para-
tum habere non oportet. Sed sufficit eius descriptionem
habere, vt si quando sit parandum, facilius inueniatur
parandi ratio.

\mathcal{R} . ceræ flauæ 3. 3. styracis liquidæ 3. 3. terebinthinæ
3. j. mucilaginis ichthyocollæ, gummi hederæ ana 3. β .
ol. irini q. s. In quibusdam exemplaribus legebatur
(mucilaginis ichthyocolle, sed gummi hederæ) sed puto
vtrunque esse legendum: quia gummi hederæ, & si intus
lêdat neruos, extra ramen iuuat, & gluten etiam sua fa-
cultate emplastica iuuat coctionem, seruâdo calorem in
parte. Quare vtrunq; ponédum censemus. Castigauimus
etiâ, quod dicebatur (gummi hederæ vel ichthyocollæ,
ol. irini q. s.) Nam illud (q. s.) cum duobus prioribus nō

conuenit, sed cum ol. tantum, quod ad excipiendum ponitur. Sed aliorum duorum ꝑ. ꝑ. posuimus, ut ordo indicabit. Efficacissimum est vnguentum illud ad iuncturarum tensiones, & durorum tumorum emollições. Hæc duo cerata præcedunt ceratum celsi.

De Vnguentis.

Vnguenta non longè à ceratis collocari debent, quia non multum differunt, & ob magnam similitudinem sæpe confunduntur, & sunt veluti media inter cerata, & emplastra. Vnguenta parari debent, & parata in officinis haberi ob frequentem & multum eorum usum, tum quia certa anni parte tantum commodè possunt parari, nec in omni loco. Multa tamen sunt in officinis parata, quæ similia sunt, quibus carere possumus. Sed quæ frequentiori usu haberi debent, ut quatuor vnguenta calida, quæ primò ponenda sunt, ob multiplicem eorum usum. Vnguenta hæc vocamus more vulgi, non, ut antiqui, odorata illa, de quibus Diosc. multa primo libro. Hæc sunt, quæ parata habere oportet in officinis, Martiatum, Aragon, dialthea Agrippæ, & resumptium, basilicum, populeum, aureum, apostolorum, Egyptiacum, albus Rasis, nutritum, citrinum, de cerusa, deficcatorium rubrum.

De Vnguento Martiato.

Paro vnguentum Martiatum vulgò dictum, quamuis non desint, qui Martianum velint appellari.Ætius & Nicolaus Martiatum vocant. Ob id retinebimus vulgaram & consuetam appellationem, tum etiam ob Pharmacopæorum inscitiam. Alij ab inuentore, alij à Martio mense dictum volunt, quod eo tempore in regionibus calidis parari debeat, propterea quod herbæ incipiunt erumpere. Alij autem à Marte, quod hoc vnguentum ad Martem bellorum deum referant, antiqui. Constat enim ex rebus omnibus, quæ ad ferrum valent, ita ut vnguentum syderis appellari possit. Sed quocunque modo dicatur, vel à quo inuentum sit, parum refert, modo rectè pareatur. Recipit multas herbas efficacissimas, & medicamentum est ad vulnera & vicera, quæ cum frigiditate sunt, vel in loco frigido, vel in lassitudine & dolore partium dextrè accommodatum valet. Usurpatur

non solum ad hominum morbos, sed ad brutorum animalium affectus, ut equorum, mulorum. Diu verò dubitavi, quam descriptionem illi hoc loco apponerem, an vulgarem, an Nicolai Alexandrini, vel aliorum Græcorum, quæ omnes inter se diuersæ sunt, tum in ponderibus, tum in simplicibus. Tandem visa est illa Nicolai Alexand. minùs vitiosa, quæ est eiusmodi.

R. ceræ albæ lb. 2. ol. lb. 8. roris mar. fol. lauri ana ʒ. 8. rutæ ʒ. 7. tamarisci ʒ. 6. esbrij, id est. ebuli, sabinæ, balsamitæ, lelisphati, saluæ, ocymi, polij montani, calaminthæ, arthemisiæ, enulæ, betonicæ, branchæ vrsinæ, spargulæ minoris, herbæ venti, id est, parietariæ, pimpinellæ, agrimonie, absynthij, herbæ paralytis, herbæ sanctæ mariæ, cinarum sambuci, herbæ crassulæ, id est, sabæ grossæ, millefolij, semperuiui, chamæd. centaurij minoris, fol. fragulæ, quinque folij, herbæ tetrahit, id est, iudaicæ ana ʒ. 4. radic. althææ, cymini, myrthi ana ʒ. 3. fœnugr. ʒ. 1. β. butyri recentis ʒ. 1. & 3. 2. vrticæ, violæ albæ, papauer. rub. mentæ saracenicæ, lapatioli, politrici, cardui benedicti, quem carduum cœli vocant, anthilis, quam yuam moschatam vocant, triphylli, qui panis cuculli vel alleluya dicitur, crispulæ camphoratæ non camphoræ, medullæ ceruinæ ana ʒ. β. adipis vrsi, gallinarum, mastiches ana ʒ. 1. thuris ʒ. β. ol. nardini ʒ. 2. non ut alij habent, ʒ. 2. Quid enim possunt ad tantam quantitatem alterius olei, & tantam herbarum congeriem?

Descriptio Nicolai Alexandrini.

R. ceræ albæ lb. 10. ol. communis sextarios 6. id est, ʒ. 6. 3. 1. ʒ. 1. roris mar. fol. lauri ana lb. 2. β. amaraci, id est, sampuci lb. 2. esbrij, aliàs ebuli, sabinæ, balsamitæ, ocymi, lelisphaci, polij calaminthæ, arthemisiæ, enulæ, betonicæ, branchæ vrsinæ, herbæ venti, pimpinellæ, agrimonie, absynthij, herbæ paralyseos, herbæ sanctæ mariæ, cinarum sambuci, herbæ crassulæ, semperuiui, mille folij, chamædrios, centaurij minoris, centum neruiæ, rubi indici, aut phragariz. ex sententia Cronibrugensis, fragulæ, quinque folij, herbæ Iudaicæ ana lb. 1. β. radic. althææ, cymini ana lb. fœnugræc. lb. β. butyri ʒ. 5. vrticæ, viol. papauer. rub. mentæ, saracenicæ, & men-

æ communis; lapathioli ana ʒ. iij. politrice, carduncel
 li, matris syluæ, maratri, yuæ moschata, alleluya, linguæ
 ceruinæ, crispulæ, camphorata, styracis, medullæ cerui-
 næ, adipis vrsi, adipis gallinacei ana ʒ. iij. thuris ʒ. ij. ol.
 nardini ʒ. ij. aliàs ʒ. i. Herbæ omnes colligantur, quan-
 do ad incrementum venerunt, vt apud nos principio
 Maij, & hoc vno aut duobus diebus, postquam sol ra-
 diauerit, & vsque ad meridiem, non postea. Diuidan-
 tur in partes paruas, & in vino generoso rubro infun-
 dantur, per septem dies in loco calido, & moueantur
 semel in die. Octauo die decoquantur lento igne ferè
 ad consumptionem vini. Tunc ol. commune antiquum
 adde. Paulo post butyrum cum axungijs, & medulla.
 Deinde colla, & abiectis herbis, adde collaturæ ceram,
 & liquefacito. Deinde styracem, in oleo nardino, in du-
 plici vase, & puluer. thuris, & mastiches. Sic omnia con-
 fundantur, & seruentur vsui. Hac ratione efficacissimum
 vnguentum acopum comparabitur. Nam si alio modo
 pararetur, styrax vreretur. Oleum nardinum vires a-
 mittit, & thus & mastiche. Sextarius hic pendet ʒ. xv.
 Nam mensuralis, octodecim continent. Amarachum in
 Alexandrino legimus & sampsucum, siue maioranam
 interpretati sumus. Nam partheniū in causa fuit, quod
 maiorana scopis magis conuenit. Factum est hoc vn-
 guentum ad tumores discutiendos, durities, ad articu-
 lorum dolores. Est enim, vt breuiter dicam, acopum, qui-
 bus omnibus magis conuenit maiorana. Nam, vt Diosc.
 docet, acopis malagmatisque calfaciendi gratia admi-
 scetur. Paulus autem eluxaris tumoribus conuenire scri-
 bit. Auget suspicionem, quod amaracum iniicere in
 Alexan. legitur: quanquam in vulgatis exemplaribus,
 item Luminari maiore (sampsucum) ponit. Quod facit,
 vt audacius sampsucum verterimus. Est enim nomen
 vagum, & commune sampsuco, & parthenio. In Ni-
 colao non legitur (tamariscum) Luminare maius sam-
 psucum tamariscum ponit. Nos verò, quia Nicolai
 Alexandrini lectionem praelegimus, nolumus addere,
 neque rutam, quanquam in Luminari Hispano lega-
 tur, vt conuenire possit. Non enim propositum est om-
 nes herbas, atque omnia medicamenta acopa hic con-
 gregare,

gregare, sed aliqua, quæ authori magis fuerint grata, Esbriou vario modo interpretati sunt. Alij flores saluæ, alij maioranam seruare volunt. Sed quid sit esbriou, apud Arab. nescio, neque saluia ponenda, neque maiorana. Nam elelisphacos, id est, saluia, ponitur postea, & maiorana, nomine amaraci, posita est. Quare puto mēdum esse in lectione, vel in interpretatione. Quare cum melioribus exemplaribus lego ebuli. Nam Græcus codex legit ebuli nomine latino, vt sepe aliis vtitur. Esbriou si saluiam significet, non debebat pōhere Elelisphacon esse saluiam syluestrem, quæ est verbascum syluestre Diosc. Sed Græcus codex omnem hanc dubitādi occasionem aufert, scribēs *easoly* pro *eosoly* nomine Latino, vt qui frequenter vtitur aliis. In hoc vnguento castigauimus, quæ sequuntur. Et ne hoc citra rationem quis factum esse putet, rationem subiungemus. Quod autem possimus id facilius monstrare, scopum vel vtilitatem, vel vsum huius vnguenti proponemus, cuius causa hæc electa fuerūt medicamenta ad id efficiendum. Primum igitur vnguentum hoc ad calfactionem paratur, ad dolores podagricos, ad paralyses, ad tumores, ad vlcera. Quod si ita sit, medicamenta calida & sicca, quæ vim habent digerendi, esse oportet. Primum legimus ʒ. 6. rutæ, pro ʒ. 7. rutæque, quod efficax sit, in maiori quantitate poneretur. Ordo etiam hoc ostendit. Primum fol. lauri ʒ. 7. deinde rutæ ʒ. 6. & postea tamarisci ʒ. 6. Sic in aliquo manu scripto leguntur. Nec valet, quod possunt dicere, qui omnia errata authorum volunt excusare, quod calida sit multum. Nam rosmarinus & laurus calfaciunt non minus, & ponuntur in maiori quantitate.

Descriptio emendata.

CUm huius nobilissimi vnguenti descriptiones conferrem, tantam inueni difficultatem conciliandi illas, vt omnibus prætermisissis interpretationibus, & descriptionibus, hanc tradere, quæ magis scopis & vtilitati respondere videretur, statuerim. Videbunt studiosi, qui rationes nostras expendere voluerint. Nec est quod me reprehendant, quod illam Alexandrini non receperim. Nam non caret mendis & dubiis. Habet

esbriion & saluiam, quanquam vulgus putat easdem esse, & omnes interpretantur conseruam esbrij, florū saluiæ. Nisi quis velit dicere flores alio vocabulo, alio herbam appellari.

℞. ceræ albæ lb. 2. ol. lb. 8. rorismarini, foliorum laurina. ana ℥. 7. rutæ ℥. 7. amaraci seu maioranæ, siue esbrij, ℥. 6. Sic legendum, non tamarisci, aut ammoniaci, vt aliqui. Nam tamariscus nulla ratione conuenit, quanquam iuuat splenem. Neque ammoniacum, quia inter herbas non reposuisset.

Quare amaraci legendum, quod est maiorana. Parthenium enim hîc exponere non cōuenit, & amoto (th) remanet amaraci: esbrij secundū aliquos idem est cum maiorana. Alius maioranam ad horum expositionem addiderat. Sic orta est illa confusio, vt pro vna herba, tres aliqui ponant, tamariscum, maioranam, & flores saluiæ, pro esbriio.

Sabinæ, balsamitæ, siue mentæ aquaticæ, sisymbrij. Sunt qui legendum putant Balsaminthæ, vt ponatur illa herba, quæ poma fert rubra, quæ magnam in conuulsionibus vim habent, & neruorum doloribus ob vim balsamo similem tributam consolidandi, Balsamine dicitur. Fructus verò pomum eximium & mirabile, Gal-
lis (*Pomes de Merveilles.*) Erit efficacius vnguentum ad vulnera & dolores, si quis ea vti voluerit. Liberum tamen relinquo.

Elelisphaci) Sic legendum Græci docent, à quibus *elelisphacos*, saluia vocatur, non, vt vulgò, Liliphagos. Conuenientissima herba, vt sit utilis vulneribus, compescendo sanguini, purgandis vlceribus ferinis, vt Dioscor. docet lib. 3. cap. 40.

Ocimi, siue basiliconis maioris, polij. Sunt, qui montanum desiderant. Sed quod ad mare nascitur, magis odoratum, & efficacius. Ab antiquis Creticis laudatum, quòd in insula nascatur, quòd emplastri modo appositum vulnera conglutinat, vel, vt quibusdam placet, viride hoc facit. Siccum maleficis vulneribus medetur.

Calaminthæ, arthemisæ, enulæ, betonicæ, branchæ vrsinæ, spargulæ, siue gallij, herbæ venti.

Anemone, vocatur herba venti. Cuius multe sunt species

species apud Græcos, ut videre est cap. de Anemone. Sed præter illas species othona herba apud Dioscoridem anemone, id est, herba venti, dicitur, quam nos suspicamur esse Othonem, & legitur melius menta pro crua, quam alij putant clymenon. Nos illam ipsam, quam Arabes mentam maiorem. Quæ si clymenon est, non potest non cōuenire, ut quæ profluvia sanguinis infrenet, & folia vel siliquæ vulneribus recentibus imposita, ad cicatricem perducant. Hanc ego ponendam censeo, non Græcorum anemonem, quia hæc compositio multas alias herbas habet, quæ ab antiquis mutatae sunt vel incognitæ, ut quæ sequuntur. Pimpinella, vim aliquam siccandi habet, & leuem astringendi refrigerandique, antiquis incognita. Agrimonia. Hanc aliqui prætermiserunt. Absinthium, herba paralysis siue primulae veris, quæ est ex genere verbasci, & ad aliorum differentiam odoratum, verbascum appellant. Herbae sanctæ Mariæ. Multæ sunt herbae hoc nomine, ut parietaria, persicaria, quæ nimium acris est & mordax. Alia est herba, quam aliqui putant eupatorium Mesuæ, quæ in viis vliginosi crescit, flore luteo, cymarum sambuci, herbae crassulae, siue fabae inuersae, quæ telephion dicitur, hic usurpanda. Nam telephion præterquam quod vitiliginem albam curat, medetur viceribus telephiis, id est, malis. Siccat enim ad tertium gradum, si Gal. credimus, & detergit. Semperuiui, millefolij, chamædrios, centaurei minoris, centumneruæ, id est plantag. maioris, foliorum phragulae, quinque folij, herbae Iudaicae siue syderitis ana ʒ. 4. radic. althææ, cymarum myrthi ana ʒ. j. foenug. ʒ. iij. ʒ. butyri recetis ʒ. j. & ʒ. ij, urticae, viol. albæ, quam Græci leucoion vocant, quæ magis conuenit, quam purpurea, quæ refrigerat & humectat, quod in hoc vnguento non est necessarium. Verum lutea, vel viol. leucoion podagricos iuuat, ruinas sedis curat, maxime flores. Pap. rub. mentæ sarasenicæ, vel alterius, lapatioli, polytrici, cardunceli, siue cardui bened. matris syluæ, caprifolij, seu periclymeni, valerianæ, quam maturellam Barbari vocant, alij maratrum legunt, sed falso Valerianam siue phu ad dolores & potissimum lateris valere scribit Dioscorid. Iuxta moschatæ pro herba moschata legendum. Est autem anthyllis

apud Dioscor. quæ quia vulneribus medetur, hic ponitur. Alleluya, siue oxylapathi, linguæ ceruinæ, crispulæ, alij bupthalmû, alij herbam cancri, quæ heliotropion minus dicitur, vel vt aliis placet, ceterach. Sed non multum refert, vtra ponatur. Heliotropion plures vires habet huic instituto accommodatas. Camphoræ, vel, vt alij melius, camphoratæ Camphoratam autem herbam alij putant abrotonum esse. Verum est alia humi serpens foliis minutissimis, quam nostri camphoratam ab odore vocauerunt. Illa ad naturâ millefolij accedit, & ad vulnera magnam vim habere docet experientia. Quare vulgarem camphoratam antiquis incognitam ponendam puto. Camphora verò quod sit tenuium partium, & potenter siccet, nō videtur conuenire. Auger suspicionem, quod styrax postea sequitur. Styracis calaminthæ, medullæ ceruinæ, adipis vrsi ana ʒ. j. Sed in quibus locis nō reperitur medulla cerui, apri substitui poterit, vel tauri. Adipis gallinæ, mastichis ana ʒ. j. thuris ʒ. β. olei nard. ʒ. ij. Ratio conficiendi talis esse debet, vt sit efficacissimū. Colligantur omnia eo tēpore, quo perfecta sunt, in qualibet regione. Nam in calidis verè parari debet. In frigidioribus nō ante festum diui Barnabæ, vel diui Ioannis. Colligantur autem vno vel duobus, vel tribus diebus, colligendo prius humidiores, vel frigidiores, vel quarum succus viscidus & lentus est. Quæ verò sunt odoratæ, & tenuiū partiū, vltimo loco. Quare primum radices semperuium, crassulam vocatam, matris syluam, papauer rub. centumneruiam, cymam sambuci, papauer nigrum. Deinde quare alias omnes, si possint vno aut duob. diebus colligi. Parum refert, modò in coquendo ordo ferretur, vt prius coquantur, quæ maiorem coctionem ferre possunt, & quæ a nobis sunt annumeratæ, colligendæ sunt in prima die. Sustinent decoctionem rad. & frigida herba & crassa, & quæ duræ sunt, & adstringentes. Ob id adiiciantur radices althææ, semperuium, telephium, papauer nigrum & album, bianca vrsina, folia laurifabina, pimpinella, centumneruia, quinquefolium, folia myrthi, lapatioli, cardunceli, lingua ceruina, agrimonia, vrtica. Secundo loco ponatur ruta, absynth, arthemisia, herba venti, alleluya, siue oxytriphillum, camphorata.

Ultimo odorata, vt herba moscata, mēta saracénica, cé-
 taurium minus, chamædris, mille fol. & aliæ. Frequenter
 contundendæ, vel gladio diuidendæ sunt in partes par-
 uas. Infunde in diuersis vasis, vt sunt dispositæ, & diutius,
 quæ duræ sunt & siccæ. Nam infusionis & coctionis ea-
 dem est ratio. Infundantur vino odorato antiquo rubro,
 tenui, vel albo dies 8. ab infusione radicum. Coquantur
 sensim lêto igne, semper mouendo. Cùm vinum incipit
 minui, & herbæ maiorem locum occupant, oleum inii-
 ciendum, & coquendum donec vinum quasi absumptū
 sit. Cui butyrum & axungias adiungere possumus. Col-
 landum & exprimendum exactè. Collaturæ calidæ ce-
 ra liquetur, qua liquefacta, misce mastice & olibanum,
 styracem, & ol. nardin. exagitando semper extra ignem,
 donec in linimentum coagulatum fuerit, vel vnguentū.
 Reponatur in vase, & seruetur diligenter. Si in vase æ-
 neo reponatur, efficacius erit ad vulnera antiqua, & vl-
 cēra. Seruetur in parte inferiore officinæ coopertum.
 Hoc vnguento carere non debet. Durat in tres annos,
 vel plures, si bene seruetur coopertum. Hoc sufficeret
 pro vnguento Aragon, & vnguento Agrippæ, pro dial-
 thea, vel contra. Sed quia sunt in frequentī vsu, appone-
 mus illa quatuor vnguenta calida vocata,

Vnguentum Aragon.

Vnguentū Aragon calidius est supradictō, & facilius
 paratur, quia paucioribus, sed efficacioribus cōstat.
 ℞. rad. brionæ, rad. dauci, cucumeris agrestis, roris-
 mar. maioranæ, serpilli, rutæ, folior. lauri, saluæ, sabina
 ana ℥. 3. pulicariæ vel conizæ maioris, vel minoris, lau-
 reolæ ana ℥. 9. nepetæ, foliorum cucum. agrest. ana lb. 8.
 mastice. olibani ana ℥. 1. pyretri, euphorbij, zinziber pi-
 per. ana ℥. 1. olei petrolei ℥. 1. ol. laurini, axungie vrsi ana
 ℥. 3. Aliqui addunt olei miscellini ℥. 8. butyri ℥. 4. olei
 communis lib. 5. ceræ lib. 1. & ℥. 4. Hoc vnguentum eo
 ordine debet disponi, quō melius & facilius dispense-
 tur. Radices reposui in primo ordine, vt prius decoquantur.
 Addidi brioniæ rad. quia folia nullam vel paruam facul-
 tatem habent instituto accommodatam. Et ne pharma-
 copolæ folia vsurparent, addidi accipiendas esse radie.
 Expuxi, quod posset dubitationē facere, nempe, agnini,

Legimus enim radic. cucumeris agnini. Qui sic legendum censet, decipitur. Nam agninus cucumer, alius est à cucumere agresti, qui efficacissimus est. Agninus autem inefficax. Qui in hortis seritur, frequentissimus in Hispania. A qua regione aliqui nobis attulerunt, & incipiunt colere in hortis quorundam nobilium. Est autem tenuis, sed longus, & ad anguis vel serpentis modum, contorquetur & humi serpit. Hoc etiam in foliis feci ne deciperetur parum cautus. Vnguentum istud pro vnguento de cyclamine vsurpari potest, addendo colocynthid. diagridij, & fellis bouis 3. i. pro 3. i. succi cyclaminis 3. ss. Si vngatur vmbilicus & venter, laxabit ventrem, & vermes deiciet, & aquam hydropicorum purgabit. Si ventriculus contangatur, excitabit vomitionem; alui subductionem, si in emunctoriis coxarum, & in planta pedum adhibeatur.

Vnguentum dialthea.

DVplex est apud Nicol. Vnum compositum, aliud minus compositum, quod simplex vocatur. Sed compositum communiter paratur. Ob id tale hic describemus.

℞. rad. altheæ lb. 2. semin. lini, scœnug. ana lb. 1. scyllæ lb. ss. olei oliuarum lb. 4. ceræ lb. 1. terebinthinæ, gummi hederæ, galbani ana 3. 2. colophonix, resinæ ana lb. ss. Rad. & semina omnia coterantur, infundantur, per quatuor dies in sufficiente parte aquæ & vini. Deinde coquantur, donec incrassescat mucilago. Colletur, & quo facilius succus lentus per cribrum transcolletur, & descendat, instillandum est aliquid decoctionis sensim. De-coquantur vsque ad succi consumptionem lib. 2. cum ol. quibus adde ceram, qua liquefacta adde terebinth. galbanum, & gummi hederæ. Vltimo loco ponatur colophonia, & resina puluerisatæ. Leuiter bulliant ad perfectam coctionem, quod refrigeratum vsui serua.

Vnguentum Agrippæ.

ANicol. traditum eandem facultatem habet, cum dialthea. Sed quia in frequenti vsu est, ad emolliendum, & quia minori impensa parari potest, subiungimus, & in officinis parandum censemus.

℞. rad. brionix lib. 2. ad cucumeris agrest. lib. 1. scyllæ 3. 6. rad. irid. 3. 3. rad. filicis 3. 2. rad. ebuli, tribuli marini ana

ana ʒ. i. ʒ. olei antiqui lib. 4. ceræ nouæ flauæ ʒ. 15. Parabitur hoc modo, Radices diligenter detergantur à pul. incidantur in frusta, infundantur in ol. per septem dies, deinde decoquantur, donec rad. mollescant, & succum deponant. Decoctio colletur, & fortiter omnia exprimantur. Coll. adde ceram flauam, non albam, vt vulgaria exemplaria habent, quia minus emollit. Vbi refrigeratum fuerit, vsui serua. Non eligemus ol. commune, sed antiquum, quòd sit magis tenuium partium, & ad digerendum accommodatius, & emolliendum, viscosis istis permixtis. Hoc autem scire oportet apud Dioscor. nullam mentionem fieri de tribulo marino, sed tantum de aquatico, & terrestri. Hic non est ex tribulorum genere, sed ex eryngiorum. Quare qui procul à mari sunt, sic hoc parari oportuerit: nam pro scylla cæpam, & pro tribulo marino eryngiorum radicem vsurpare possunt.

De Vnguentis pectoralibus.

AD pectus parantur vnguenta laxantia, lenientia, quibus etiam ad laxandas partes induratas, & tensas emolliendas vti possumus. Post illa emollientia & digerentia subiunximus. & prope vnguentum Agrippæ collocari debent. Sunt autem tria nominibus distincta, quorum vnum pectorale dicitur à parte. Alterum à materia, vt vnguentum ex adipibus. Tertium, quod minus laudandum, magis tamen vsurpatur à Medicis, resumptiuum dicitur. Cuius descriptionem ponam, & explicabo, vt intelligant illud minus accommodatum thoracici, quàm pectorale, vel de adipibus, & quòd de adipibus melius est, & quò velim Medicos vti. Sed primum videamus, quale sit apud nos resumptiuum tam frequenter à nostris Medicis vsurpatum.

Vnguentum resumptiuum. descriptione vulgata.

℞. axungie porci recentis sine sale ʒ. 4. axungie anseris, gallinæ, anatis ana ʒ. 2. cæsi humidæ ʒ. ʒ. ol. cham. violari, anethi ana ʒ. 2. butyri recen. lib. 1. ceræ albæ ʒ. 6. mucilagin. tragacanthi, cydoniorum, seminis lini, bismaluz, gummi arabici an. ʒ. ʒ. In hoc vnguento multa sunt reprehendenda, vt sit vnguentum pectorale vel malacticum. Primum quòd ex cera alba parari non de-

bet, sed ex flaua. Quare si quis parare velit, flauam vsurpet. Omnia enim relaxantia emollientia, digerentia, concoquentia, dolores frigidos sedantia, ex cera flaua parari debent. Quæ verò ad astringendum, refrigerandum, indurandum, & siccandum, ex alba, quæ frigidior est & magis sicca & astringens. Aliud maiore reprehensione dignum, quod mucilagines frigidas & constringentes recipit cum calidis relaxantibus, vt gummi tragacanthi, & arabici, seminis cydoniorum. Quare putarem ego illas esse expungendas, & mucilagines augendas lini, & rad. bismaluz ad 3. 1. Quod si mucilaginem foenu. adiungere visum sit, ad 3. 3. non erit absurdum, & pro ol. viol. ol. amygd. dulcium ponere. Sic erit ergo veri vnguenti resumptiui descriptio castigata. Ex huius vng. castigatione apparet castigatio illius pectoralis vnguenti, quod mucilaginem recipit psilij, tragacanthi, & arabici. Hæc emplastica digestionem impediunt, obstruendo poros, & potius suppurant, calidis & temperatis permixtis, & partem tenfam retinent, quod in doloribus & potissimum pectori aduersum est, ob respirationis necessitatem.

R. axungia porci recens. sine sale 3. 4. axungia anatis, gallinae anseris ana 3. 1. æsopi humidæ 3. 3. ol. amygd. dulcium, cham. anethini ana 3. 2. butyri recentis non saliti lib. 1. ceræ flauæ 3. 6. mucilaginis seminis lini, & rad. bismaluz an. 3. 1. 3. foenug. 3. 3. misce, fiat vnguentum resumptiuum. Talis erit pectoralis vnguenti descriptio.

Vnguentum pectorale.

R. Ol. amygd. dulcium 3. 4. ol. cham. viol. an. 3. 3. axungia gallinae, anatis an. 3. 2. butyri recentis 3. 6. ireos puluerisatæ 3. 2. croci 3. 3. ceræ citrinæ 3. 3. misce, fiat vnguentum. Quamuis in alio vnguento resumptiuo ol. violaceum expunxerimus, ab isto tamen expungendum non est, quia refrigerat citra astrictionem, & laxat, & dolores lenit. Ob id hoc parandum pro inflammationibus pectoris, & costarum doloribus. Erit medium inter resumptiuum superius, & vnguentum ex adipibus, quod magis simplex est, accommodatissimum in inflammationibus pectoris, & constrictioni, vel expectorationi.

Vnguentum ex adipibus.

R. adipis gallinae, anseris, anatis ana 3. 6. butyri recentis,

centis tantundem, ceræ citrinæ 3. 4. ol. chamom. amygd. dulcium añ. 3. 3. misce, fiat linimentum, ceratum vel vnguentum. Accommodatissimum est hoc vnguentum in inflammationibus pectoris & costarum, & constrictione pectoris, ad concoctionem & expectorationem.

Vnguentum de bdellio.

Vnguenta ad indurationes, in hac parte consequenti ordine doctrinæ, collocabimus, in quorum numero est vnguentum de bdellio, & vnguentum paruum de cyclamine, seu de arthanita.

℞. bdellij 3. 6. euphorbij, sagap. ana 3. 4. castorei 3. 3. ceræ citrinæ 3. 15. ol. cherini, seu leucoi lutei 3. 10. fiat vnguentū. Paretur in hunc modum, Bdellium, & sagap. dissoluantur in aqua vitis agrestis: castoreum & euphorbijum in aqua calida. Cera lique scat in ol. Omnia misceantur, & fiat vnguentum. Hoc dispensari potest omni tempore. Quare non est dispensandum, nisi quando imperatur. Non solet, nisi in conuulsionibus & rigoribus nervorū præscribi, in quibus oleis & remediis mitioribus est vitandum, interea, dum alia parantur. In hoc malimus apponere ol. ex leuco. floribus paratum, quàm iasmino, quia rarò paratur, neq; in omnibus locis reperitur. Sed leucois in omnibus locis reperiri potest, & sunt similia facultate. Hoc autem vnguentum difficile paratur ob penuriam bdellij. Nam quod pro bdellio ostendunt est myrrha vera, quæ vngues habet, & est subflaua, vt Diosc. descripsit. Inter myrrham, aliquando partem bdellij inuenimus. Sed difficillimè discernitur à myrrhæ specie, quæ bdellij more lentescit, cū masticatur, vel digitis tractatur & malaxatur. Estque concolor, quasi colore, aloes. Verùm cū non multum differat bdellium à styrace, vel myrrha, poteris ex illis parare, maximè ex illa, quæ concolor est. & lentescit. Vel uti succidaneo antiquorū, quo in externis remediis magis, quàm internis utebantur. Est autē propolis vera, quæ eodem modo lentescit, si digitis fricetur, odore fermēti. Est enim acida, & in rimis & foraminibus alueorum reperitur. Illud mel nō est, neq; cera, sed ex oculis populi, vel betulæ, vt aliarum arborum, quæ resinam reddunt. Sunt nonnulli, qui sordes alucariorum vsurpant, sed malè, & multò peius

antiqui ceram albam pro illa vsurpabant, quæ frigida est, & sicca, indurans potius, quàm emolliens. Poterit itaque facilius, & minori impensa parari.

Vnguentum paruum de artanita, seu de cyclamine.

℞. succi cyclaminis, mucilag. rad. filicis, succi ebulli-
ana ʒ. 8. succi summitatum tamarisci, vel sambuci ʒ. 2.
œsopi humidæ ʒ. 5. ol. irini lb. 2. bdellij ammoniaci an.
ʒ. 1. β. ceræ flauæ ʒ. 6. corticis rad. capparis ʒ. 1. β. spicæ
nardi ʒ. β. In Gallia, & aliis locis, vbi tamarisci succus
haberi non potest, succus sambuci substitui potest. Hoc
enim succedaneovsus est Gale. lib. 9. de composi. phar.
secundum locos. Paratur autem hoc modo, bdellium,
& ammoniacum dissoluatur cum aceto scillitico. Succus
cum ol. bulliant ad aliquam consumptionem. Deinde
ceram adisce. Qua liquefacta, ammoniacum & bdellium
dissolue, in sine spicam. Fiat vnguentum. Hoc in
frequentiore vsu est, quàm magnum, quod paratur ad
laxandum ventrem, & ad vermes occidendos deficien-
dōsque. De illo postea agemus, si aliqua alia vnguenta,
quæ ad horum naturam accedunt, aliqua ex parte tradi-
derimus, quale est illud fuscum Nicolai.

Vnguentum fuscum Nicolai.

℞. ol. communis lb. 1. β. ceræ nouæ ʒ. 4. colophonix,
picis naualis, sagap. ana ʒ. 2. mastich. galbani, thuris,
terebinthinæ ana ʒ. 1. misce, fiat vnguentum. Hoc vn-
guentū semper parari potest. Quare sufficit habere par-
uam quantitatem. Vtile est ad trahendū, emolliendum,
digerendum, concoquendum crassos humores. Sed illud
animaduertendū est, quòd antiqui colophoniam voca-
bant à Colophone regione. Nostri colophoniam vocant
resinā, vel terebinthinam, à qua extractū est ol. terebin-
thinæ. Est resina multum frixa, & minus pinguis. Pix na-
ualis pix dicitur, quæ è nauibus derasa est, quæ ob sæuum
admixtum, & salsuginem maris aliam facultatem habet,
quàm recens, & simplex. Hæc minus maturat, magis sic-
cat. Quare in vlceribus, vt colophonix, magis conuenit.
Suaderē, vt posthac nauale raderēt è nauibus, & hæc tan-
tū naualis vocaretur, alia, cōmunis pix tantū, ad dif-
ferentiam, vt antiqui solebant. Non enim naualis quòd
nauibus apponatur, sed quòd apposita fuerit, dici debet.

Vnguentum basilicum maius.

Basilicum vnguentum, quasi dicas regale, magnum ad differentiam minoris, recipit concoquentia & digerentia. Vtus est in abscessibus detergendis, in quibus aliquid suppurandum, concoquendum, detergendumque, & in vulneribus, quæ sine inflammatione, aut intemperie calida sunt. Hoc carere possumus, si aureum habeamus. Nam cum eo conuenit, atq; etiam id efficacius est.

R. ceræ flauæ, resinæ pini, sæui vaccini, picis naual. glutinis piscium, quod ichthyocollam vocant, olibani, myrrhæ an. ʒ. vj. picis ʒ. iiij. Hoc non est dispensandum, quia non eo frequenter vtuntur Medici, & non immerito, cum aureum id præstet, eiusque descriptio sit magis efficax, & integra. Hæc autem in multis exemplaribus incerta est. Nam picem bis ponit, & incerta est dosis. Nam dicit, picis ʒ. iiij. & alierum an. ʒ. j. ʒ. quod fortè sic legendum est Alij picis ʒ. iiij. aliorum verò ʒ. j. ʒ. vt mōstret diuersam esse descr. Et in facul. declaratione falsum docet. Dicit enim conferre vulneribus, in quibus est calfactio. Sed id facile castigare possumus, si negationem addamus.

Basilicum minus.

Huius descriptio varia est. Paulus enim ex quatuor rebus, cera, colophonia, pice, & adipe taurino, æquis partibus, sine oleo componit. Mes. verò ex resina, pice, cera, æquis partibus, & oleo q. s. Istud paratur, & parandum est. Dicitur & tetrapharmacum, quia non computatur cera, & macedonicum, cum thus adderetur, quo utebatur Galenus, & antiqui.

Vnguentum aureum.

Aureum à colore aureo dicitur, quem à croco accipit, vel aureum à præstantia. Est enim in vulneribus curandis efficacissimum. Concoquit enim, deterget, & carnem gignit. Proportionem respondet basilico magno, sed magis deterget, ob myrrham, quam habet basilicum magnum. Hoc verò magis siccat, & minus terget.

R. ceræ citrinæ ʒ. vj. ol. boni lib. ij. ʒ. terebinthinæ ʒ. ij. resinæ, colophonie an. ʒ. j. ʒ. olibani, mastiches an. ʒ. j. croci ʒ. j. In hoc nihil mutauimus, præter croci dosim, quia legitur in nouis dispensariis (croci ʒ. j.) quæ quantitas maior esse videtur, quam oporteat. Habet autem

facultatem concoctoriam. Sed cum multa alia sint ad id commodius faciendum, non video cur in tanta quantitate poni debeat. Nos itaque pro $\mathfrak{z} . j . 3 . j$ legimus, tum propter rationem assignatam, tum quia in manuscripto antiquo ita legimus. Anget suspicionem, quod prius dixerit (olibani & mastiches an $\mathfrak{z} . j .$) Si tantundem croci voluisset, cur ab aliis separasset? Adde quod semper solemus minorem rerum similium quantitatem ponere ultimo loco, ut Andromachus fecit in theriacæ dispensatione. Adde quod illa parua quantitas multum tingit.

Vnguentum Egyptiacum.

AD deterfionem gangrenæ & ulcerum putridorum paratur omni tempore. Quare minor quantitas sufficit. Vel quia nimia impensa paratur, habendum. Paratur diuersa præparatione. Alij ingredi faciunt æqua proportionem sic.

℞. floris æris aureos quinque, id est, $\mathfrak{z} . v$. mell. aureos xij. aceri acris aureos viij. Decoquantur, & decocta inspissentur. Aureus valet $\mathfrak{z} . \text{ss}$. Sed si maior, lege \mathfrak{z} . vel $\mathfrak{z} . j$. quia eadem seruat proportionem, & Pharmacopola minus dubitabunt. Et certè ponderum apud Latinos, Græcos & Arab. magna est dissidentia. Aliqui addunt thuris aureos ij. ss . Sed illud sarcoticum non est apponendum, nisi cum imperatur, quia magis putrefaceret, quàm resiccaret, & cum imperatur, potius cortex, quàm thus ponendum est.

Vnguentum Apostolorum.

NOmen accipit à numero duodenario non quod vñ sint Apostoli. Curabant enim citrà medicamento- rum vsum, potestate à Deo concessa, cum dixit, Super ægro manus imponent, & bene habebunt. Est autem in frequēti vñ ad ulcerum putridorum, id est, sordidorum deterfionem. Recipit detergentia, catheterica, & sarcotica Sic paratur.

℞. terebinth. ceræ albæ, resinæ an. $\mathfrak{z} . xij$. opopanacis, floris æris an. $\mathfrak{z} . ij$. ammoniaci $\mathfrak{z} . xiiij$. aristolochiæ longæ, thuris masculi an. $\mathfrak{z} . vj$. myrrhæ, galbani ana $\mathfrak{z} . iiij$. bdellij $\mathfrak{z} . vj$. lithargyri $\mathfrak{z} . j$. infundantur lachrymæ, & decoquantur in lib. ij. ol. æstate, hyeme verò lib. iiij. deinde alijs misceantur. Sed non mihi immutanda dosis videtur.

tur, sed illa maiori quantitate aceti diluere oportet, & minùs coquere. Pro bdellio vsurpanda est propolis, vt aliàs monstratum est. Vnguento apostolorum respondet craseos magnum Mes. Quare non erit necesse, nisi paratum habere vnguentum craseos. Primum potius parandum est ad vlcera detergenda & implenda carne.

Vnguentum craseos paruum Mes.

HOc potius dispensandum est, quàm magnum, quia vnguento apostolorum respondet. Ob id nulla est eius necessitas. Hoc verò ad vlcera detergenda & implenda confert.

R. aristoloch. ireos, sang. drac. opopanax, sarcocolle ana 3. ss. litharg. læuigati 3. v. ol. lib. j. coquatur lithargyrum in ol. donec non inficiatur. Cui adde reliqua in tenuem pul. redacta. Fiat vnguentum. Nos autem pro ammoniaco opopanax substituimus, quòd magis sit sartoticum & conueniens. Neque multum repugno, si ammoniacum ponatur. Hoc potest esse vsui pro vnguento ex panno.

Vnguentum pompholigos.

ACcepit nomen à pompholige, sed nostri ex tuthia, quam vocant. parare solent, quæ spodium est Dios. & omnium Græcorum. Quare dicendum esset vnguentum ex tuthia. Sed cum parum differat tuthia, à pompholige, non est ab hoc recedendum. Illi autem, qui nos præcesserunt, facile poterunt excusari, quòd pompholigem non agnoscerent. At nos, qui & agnoscimus & haberi ex fornacibus potest, vbi funditur æs ad bombardas parandas, & tintinnabula, vel vbi parantur ex ære vasa culinaria, excusari non possumus. Quare Pharmacopolas hortor, vt ex fornacibus colligant, cum habere possint, quantum voluerint. Est enim magis tenuium partium, quàm spodium, siue tuthia. Sic parabitur.

R. olei ros. omphacini 3. x. ceræ albæ 3. v. succi granorum solatri 3. v. cerusæ lotæ 3. iij. plumbi vsti & loti, pompholigis ana 3. ij. cortic. thuris 3. j. Succum fructus solatri decoque in oleo ad cōsumptionem. Cui adde ceram. Deinde omnia redacta in puluerem tenuissimum. Fit vnguentum, quo vtimur in cancris, & gangrenosis vlceribus. Quare oportet illud esse bene paratum, ne

inorsum in parte excitet, neque eam paret ad putrefactionem, vt illud facit, quod à nostris dispensatur. Quare danda est opera, vt ex ol. ros. omphacino fiat, quod magis repellit & exsiccat, quàm illud rosaceum completum vocatum. Quod si tale non reperiatur, abluatur in aqua peculi ros. vel in aqua myrthi, vel ceterach, vel plātaginis, vt illam vim ol. laxatiuam, & putrefactiuam, abluione amittat. Deinderosas exsiccatas rubras decoque in duplici vase. Fiat oleum omphacino respondens, vel succum foliorum oleo, vt Gal. imperauit. Cera alba est abluenda, tum ob pul. tum ob acervim, quam accepit in sua dealbatione. Succus ex fructu vel foliis solatri extrahitur, neque peccat, si ex foliis paretur. Cerusa ob acervi vim est abluenda, & vt amittat aliquam vim emplasticæ substantiæ, in qua pluiæ, vel fluuiorum, vel plantag. est abluenda. Plumbum, quia cum sulphure vritur, abluendū, vt cerusa, vt deponat empireuma, vel lima in tenues partes diuidere oportet, vt diligenter contritum in partes tenues reducat. Nam alia ratione non vritur, quàm vt facilius in pul. reducat. Minus enim acre est, quod non vsum, quàm quod vsum est. Tuthiam nostri ponebant, quæ antiquorum est spodium, & quia non nouerant pompholygē, spodium vsurpabant. Pompholyx cinerica est, quæ in parietibus fornacis colligitur. Adhæret aliquando vt fuligo. Aliquando, vt quæ proximior flammis, tanquā pumex, vel racemus ex multis ampullis. Vnde Botritis dicitur. Sed id notare oportet, quod in quibusdam locis quæsi alba colligitur, vt cinis, vt in fornacibus, in quibus æs funditur, non aurichalcum. In vulgatis exemplaribus (thus) legitur, vbi legendum (cortex thuris.) Thus enim putrefacit: cortex autem vlceribus malis conuenit, vt docet Diosc. Quod paratum est hoc modo, tam dffert à communi scopo, vt homo viuus à mortuo. Hoc vnguentum vsui esse potest, pro vnguento ex cerusa, sed non contra, ob acervum. Quare cum pro vnguento ex cerusa eo vti volueris, adde acervi albi q. s.

Vnguentum desiccatiuum rubrum.

Post vnguentum de pompholyge, collocari debet vnguentum desiccatiuum rub. quod frequentissime vsurpa-

surpatur à Chirurgis in erysipelatosis & feruidis vlceribus, & ad cicatrices faciendas.

℞. lapidis calaminaris, siue cadmiæ, terræ sigillatæ ana ʒ. iij. litharg. auri, cerusæ vltæ & lotæ ana ʒ. iij. camphoræ ʒ. j. ceræ albæ ʒ. v. olei ros. myrthini ana ʒ. vj. fiat vnguentum. In hoc vnguento tantum hoc mutauimus, quod cerusam vltam & lotam imperauimus, ratione optima, quia magis sicca & rubra redditur. Idcirco rub. dictum est, & vt ad cicatrices & herpetas efficacius sit, lauandum ad empireum auferendum. Vritur chalcitis, donec sandaracæ vel minij colorem acquirat. Ceram albā imperauimus, quia magis siccatur, & magis rub. apparet vnguentum, si ex alba fiat. Oleum myrthinum pro violaceo posuimus, quia violaceum humidius est, quàm vt in vlcerum vnguēis ponendum sit, & maximè in eo, vbi omnia refrigerant. Quare myrthinum substituimus. Lapis calaminaris est cadmiæ species, ex qua æs rubrū fit. Pro terra sigillata vsurpandam esse argillam vel cretam diximus. Nam terra illa, spargis dicta, vel sigillata, nihil aliud est, quàm argilla collecta in Lemno insula, quæ ob illum lentorem, quem habet, & vim emplasticam insignem, valet ad incrassandas fluxiones, & ad sanguinis fluxus, quæ omnia præstat nostra. Quod dicunt valere ad pestem, non ad curationem, vt aliqui putāt, sed ad præcautionem. Nam cum illa & bolus armena vim inspissandi sanguinem habeant, & conturbationem sanguinis impedire possint, pestem impediunt, quæ nihil aliud est, quàm cum sanguinis perturbatio fit, vt nos docuimus in nostro tractatu de peste. Quare non est nauigandum in Pootum, vt adulteratam argillam sigillo illo notatam habeamus, cum creta idem præstet, quod & terra sancti Pauli, quam vendunt circulatores in Italia, vel terra sigillata. Exsiccant illæ terræ, modicè viscosæ, quod in hoc vnguento requirimus.

Vnguentum album rasis.

Minio paratur, & eius frequens est vsus, vnde paratum habere semper oportet.

℞. ol. communis loti lb. ij. cerusæ lib. j. ceræ albæ ʒ. vj. misce, fiat vnguentum. Oleum abluendum aqua frigida, nisi recens fuerit, minimè que salitū. Cerusa ablu-

tur necne, nihil interest. Sed quia in affectibus palpebrarum vsurpatur, non malum est, si semel abluatur.

Vnguentum citrinum.

A Citro nomen accepit, quo vtuntur mulieres ad fucum, & Chirurghi ad siccandum, & cicatrices faciendas, & dealbandas. Habet enim aliquam vim deterfiuam, & insignem exsiccandi. Difficile paratur ob præparationis difficultatem, & reliquarum rerum penuriam.

℞. borracis 3. ij. camphoræ 3. j. coralli albi 3. ss amiantuli dulcis 3. j. vmbilici marini, tragacanthi, albi, amyli ana 3. iij. marmoris, crystalli dentalis, olibani albi, nitri ana 3. ij. gersæ serpentariæ 3. j. cerusæ 3. vj Borrax est duplex. Aliud, quod pingue dicitur, quia nigrum & ad saponis mollis quasi colorem & cōsistentiam accedit. Aliud est album, & ad formam salis vel aluminis concretum, & diaphenum, quod arte tale redditur. Est huic arte paratum simile ex sale alcali & vrina, quod ferruminat aurū, à quo affectu aliqui mediocriter eruditi chrysocollæ nomen inciderunt, non animaduertentes, chrysocollam antiquorum colore viridi esse, siue illa sit naturalis, quæ cum lapide cianeo & fodinis emittitur, siue illa artificialis Galeno ex vrina vel ære, quam speciem Dioscorides inter species æruginis reposuit. Quare nos borracem nitri speciem dicemus. Borracem nitrosum vocant Arabes, & à sapore isto, omnia alia, quæ hoc sapore sunt prædita, borracalia vel nitrosa vocant. Additur caphuræ 3. j. quia est foetida tenuiū partium valde. Quare facile penetrat. Magna autem est inter medicos contētio de eius origine & temperatura, quoniam aliquid dicunt esse arboris lachrymam, alij bituminis candidissimi speciem, alij factitium quidpiam. Ego verò puto aliam naturalem, aliam factitiam ex mastiche distillata in vrina. Naturalis certè naphthæ naturam præ se fert, quod facile concipiat flammam. De eius ortu nihil certi habeo. Verum de eius temperatura certò possum affirmare calidam esse, & quod odorata sit, & quodammodo ex aërea substantia & tenui, ob quam tenuitatē ignem facile concipit etiam in aqua, quod forsan aliquos decepit, quod semen absumeret. Inde ab effectu colligunt, summè refrigerare. Verum est illa secunda operatio, non prima,

per

per accidens, non per se. Nam si quādo seminis spiritum dissoluit, ob id venerem extinguit, semine absumpto, ut ruta, agnus, menta sicca, ut & alia calida. Sed videor hāc limites instituti transcendere. Hoc enim ad Medicum spectat, non ad Pharmacopæum. Hoc tamen addam, quod caphura debet ab electuario diatragac. frigid. auferri, quia debet medicamentum istud refrigerare, & humectare, & inspissare. Sed illa contrarium præstat. A diamargarito frigido non item, quia illa valet ad cordis iactitationem, siue palpitationem, ad quem affectum hæc compositio multum confert. Præterea offuscaur à moscho, & aliis odoratis medicamentis, quod non fit in diatragacantho. Sed hæc satis de cāphora. Hic ponitur, tum quia alba est, & dealbat, ut sulphur, per accidens resolvendo. Corallus siue corallum planta est marina, quæ supra saxa oritur Multas rad mittit, sed supra saxi superficiem crasso candice adhæret, cortice minus rubro videtur integri, non album. Quod facit, ut nō credam esse florem salis, quo investitur. Nam & album simili modo vestiretur, cum in eodem saxo nascatur. Sunt autem tres coralli species distinctæ colore tantum, rubrum, album, & nigrum. Quorum album vilius est. Rub. vero charius ob multos vsus Nam mulieres eo ornātur. Pueri in collo vel citra carpum gestant aduersus fascinationes, & Medici ad siccandum, refrigerandum, & constringendum vtuntur frequentissime. Nascuntur in eodem loco. Nigrum verò vocatur *anapathes*. Rarò inuenitur, colore quæ hebeni est. Album in hoc vnguento præfertur, quāquam in omnibus aliis remediis rub. sit inferius, non alia ratione, quā colore. Nam cum hoc non solum ad morborum curationem, sed ad candorem faciei mulieribus inducendum paretur, præfertur album rubro. Differt etiam album, quod in medio cavitatē habeat, neque solidum sit ob coiledones siue acetabula, quæ habet frequentia. Siccat, refrigerat, & dealbat, vel maculas cooperit. Quanquam non est negandum ob falsuginem, quam habet paruam, detergere, ut omnia falsa. Neque magis refrigerat, quā rubrum. Calor distinguit speciem, nihil ad temperamentum pertinet. Paratur autem multis modis, pro diuersitate affectuum, & partium

affectarum. Nam si ad frangendum lapidem, vel occidendos vermes, vel ad siccanda vlcera interna, vel ditionem oculorum, pareretur sine vltione Verum si ad fluxum ventris, vel si ad vetriculi exsiccationem, vrendum, sed abluendum. Nam nisi abluatur, vim calcis habet. Quare & calfacit. Quia in re magni nominis Medici frequenter decipiuntur. Ad frangendum calculum, vel potius deturbandum renum calculum datur. Tunc in puluer. reducendum, & succo limonum diluendum. Item cum vermes occidendi sunt. Si quis plura desideret, Diosc. lib. 5. cap. 139. & 140. legat, & plura apud Plinium lib. 32. cap. 10. Sed quod in Stecatibus insulis reperiri dicit laudatissimum, & quod fructum ferat, experientia docet contrarium. Iuxta album Rasis collocandum. Quae enim ex lithargyro cocto, vel non cocto fiunt, non multum differunt ab vnguentis ex cerusa, & contra. Sed quia minimo paratur, & vt opinioni veterum consulamus, hic talia vnguenta apposuimus, quibus tamen carere possumus. Nam tetrapharmacum putamus parandum, quia longiori tempore paratur, quam lithargyrum nutritum, differuntque coctura tantum.

℞. litharg. aceti ana ʒ. j. ol. ʒ. ij. Coque lento igne, donec crassitiem vnguenti habuerint.

Vnguentum nutritum.

EX iisdem paratur nutritum, sed diuersa proportionem, vt,

℞. litharg. auri ʒ. ol. communis lb. ʒ. aceti ʒ. iiij. Agitentur in mortario sensim, oleum & acerum instillando. Si fiat in mortario plumbeo, erit efficacius.

Vnguentum psoricum, siue enulatum.

℞. rad. enulae camp. coctae in aceto, contusae & percollum passatae lb. j. axungiae porci, ol. communis ana ʒ. iiij. ceræ nouae ʒ. j. argenti viui extincti in axungia, vel succo limonum, terebinth lotae ana ʒ. ij. sal. communis puluerisati ʒ. ʒ. incorporentur simul in mortario, vt decet. Fiat vnguentum. Nihil autem immutandum fuit. Paratum feruetur, quia psoricum est efficacissimum, & pro aliis omnibus hoc sufficit.

Vnguentum contra Vermes.

Quanquam vnguentum Aragon vermes occidat, & de-

& deiciat, huius tamen descriptionem apposui, ut si paratum habere velint, habeant.

R. ol. amygd. amar. 3. j. succi foliorum persici absynt. ana 3. ss. farine lupinorum, cornu cerui vsti ana 3. j. aloes succotrinæ, felis tauri ana 3. ij. ceræ q. s. fiat vnguentum. Melius esset sine cera & ol. ex aceto, succo, & felle liquidis, in formam cataplasmati reducere. Illa quantitas olei 3. j. pauca est. Succo si decoquantur, minus efficaces sunt. Nos in hoc succum absynthij pro materia substituimus, quia absinthium magis amarum est.

De emplastris.

Quibus oporteat pharmacopolam munitum medicamentis, in vniuersum dictum. Inter quæ emplastra enumerauimus, tum quia oportet ea reposita habere, quæ magno artificio parantur, ne si quando egeamus, non rectè parentur, si citò parari cogantur, quæ longo tempore debent parari. Item quæ certis tantum temporibus parantur, ut emplastra ex succis herbarum, parata seruari debent. Adde quod illa diu seruari possunt, nec antiquitate corrumpuntur. Ergo hæc parata habeat, quibus frequentius vtitur.

De diachylone communis Ioannis Damasceni.

R. Mucilag. seminis fœnugræ. seminis lini & radic. altheæ ana lb. j. litharg. puluerisati à plumbo & scoria lb. j. ss. olei veteris clari lb. iij. Litharg. & ol. multum, & diu in mortario, vel alio pistillo ferreo agitentur, & misceantur. Deinde igni lento coquantur, spatula semper agitando, donec liquetur litharg. & crassescat. Deponatur ab igne & refrigeretur, quo refrigerato, mucilag. leuiter coctæ sensim, instillentur, agitâdo, donec exacte misceantur, & confundantur. Hanc descriptionem Mes. apposui, quæ retinenda est. Facile enim paratur, & satis est efficax ad duros partium tumores, & ad dolores, qui sub costis sunt. Nam in aliis ob duritiem dura emplastra supra partes dolètes externas poni non debent, ut docuit Gal. Auger enim dolorem durities emplastrorum. Quare in vnguentum dissolui debent. In hoc emplastro hoc tantum est animaduersione dignum, lithargyrum diligentissimè conteri debere, ut facilius liqueat, & permisceatur ol. Purgetur plumbo & scoria, quia

1250 PHARMACOPOLARVM

litharg. ex plumbo conficitur. Quate remanet aliquid, quod concoctum non est, & fæx siue scoria, quæ partes etiam si eandem facultatem habeant, nihilominus liquantur & permisceri non posset ol. æqualiter, non desideratur hic. Oleum antiquum videtur magis conuenire, mediæ ætatis, vel recens, quia magis emollit. Antiquum magis digerit. Ex hoc loco rationem parandi emplastra ex lithargyro, & mucilag. intelligetis.

De emplastro Diachylonis.

R. Lithargyri 3.6. ol. veteris lb. 1. mucilagin. p. filij 3.4. mucilag. semi. altheæ 3.2. fiat emplastrum, vt supra. Hanc compositionem retinuimus, quia vsus recipit ad maturationem tumorum calidorum, quanquam, vt supra monstratum est, supra tumores calidos emplastra minus conueniant ob duritiem. Quare melius in vnguentum mutabitur, diluendo oleo viola. In hoc parando, quæ supra de litharg. & de coctura mucilaginum referre oportet. Oleum vetus expungendum, quia cum frigidis hoc conficit, non debet oleum antiquum indi, quia digerit magis, quàm emolliat, vel maturet. Illa enim maturant, quæ temperata sunt, vel calorem calori nostro similem habent. Quare simpliciter, oleum, vel, communis, legendum est.

Emplastrum diachylum magnum.

R. Litharg. tenuissimè puluerisati, & cribellati vnc. 12. ol. irini, chamomilæ, anethi an. 3. 8. mucilag. semin. scænu græ. lini, radicis altheæ, ficuum pinguium, passulorum, succi ireos, scillæ, cæsi pi humidæ, glutinis piscium ana vnc. 12. terebinth. vnc. 3. resinæ pini, ceræ citrinæ ana vnc. 2. fiat emplastrum, agitando in mortario cum ol. & decoquatur lento igne, spatula leuiter agitando, donec coagulentur. Mucilagine misceantur, vt supra dictum est, & vbi duritiem acquisuerunt, supra marmor imposito, magdaleones formentur. Hæc compositio tam frequenter vsurpatur à Medicis ad emolliendum, vt nullo modo carere debeat pharmacopola. Quæcunque dicta sunt superius, in aliis obseruanda, & præter illa hoc quoque animaduertendum, quod succi ireos & scyllæ sub finem imponendi, quos absumere oportet, priusquam

terebinth. quæ etiam diu decoqui non debet, vt nec æfipus, nec ichthyocolla, siue gluten piscium.

Diachylon cum gummi irreatum.

Quidam supradictis aliqua addiderunt ad aliquas affectiones curandas, vt irreatum, & appellant diachylon irreatum ab iride dictum. Est autem talis proportio.

R. diachylonis communis lb. i. radic. ireos ʒ. i. malaxentur cum ol. lilio. Tale est irreatum. Est aliud, quod appellatur diachylum cum gummi, ob lachrymas, quæ adduntur, respondens emplastro de mucilaginibus.

Illud cum gummi ex incerto auctore.

R. mucilag. seminis althææ, semin. lini, mucilag. medianæ vlmī, & fœnugr. an ʒ. 4. ol. chamomilæ, liliorum, anethi ana ʒ. i. ammoniaci, galbani, opopanax. sagapeni ana ʒ. ʒ. ceræ nouæ ʒ. 20. croci ʒ. 2. terebinthinæ ʒ. 2. cum gummi in vino dissolutis, fiat emplastrum. Illa descriptio est emplastri de mucilaginibus. Differunt tantum in dosi. Prunorum addiderunt ʒ. ʒ. ol. dosi. Quare appellandum de mucilaginibus, vel cum gummi. Post emplastra malactica reponendum est emplastrum ceroneum, & oxycroceum, & emplastrum de meliloto.

Emplastrum de meliloto.

R. meliloti ʒ. 6. florum chamomilæ, fœnugræ. baccharum lauri, radic. althææ, sem. apij, ana ʒ. 3. cardamomi, irid. cyperi, cassiæ, spicæ nardi ana ʒ. 2. ʒ. sumpsi ʒ. 3. ammoniaci ʒ. 10. styracis, bdelij ana ʒ. 5. terebinth. ʒ. 1. ficuum pinguium numero 12. seu caprini, resinæ ana ʒ. 1. ʒ. ceræ ʒ. 6. ol. sambucini, & ol. de spica q. ʒ. infundantur lachrymæ in aqua, in qua melil. fœnugr. chamom. incocta fuerint. Fiat emplastrum. Huius nominis multæ sunt compositiones sed variæ. Nam alia est apud Gal. alia apud Trallianum. Quia verò illa Mes. comprobata est, illam proposui descriptionem. Hoc autem difficultatis inueni, quod alij legunt cardamenum, alij cardamomum, quanquam vtrunque calfaciat. Non satis constat inter interpretes quid sit cardamenum Arabum. Certius erit cardamomum accipere, quanquam negant illud Diosc. esse, de quo alio loco dicemus. Alij parari sic volunt. Ficus coctos per seraceum mittunt.

vt grana separentur. Lachrymas non in decoctione, sed in oleo liquant. Deinde ceram post terebinth. dissoluant, postquam refrixerit, odorata tenuissime trita permiscant. Radices & ficus vnà prius decoquant.

Emplastrum oxycroceum.

R. picis naual. croci, colophoniz, ceræ ana 3. 4. terebinthinæ, galbani, ammoniaci, tripherae, olibani, mastiches ana 3. 1. & 3. 3. Parantur autem sic.

Ammoniacum & bdellium in partes diuidantur, & in aceto sufficienti per noctem macerentur. Liqueantur supra ignem, tollentur, & rursus coquantur ad consumptionem aceti. Pix ponatur, quæ liquefacta pone ceram, deinde colophoniam, demum terebinth. paulò post ponatur mastix, olibanum, & myrrha, cum spatula semper agitando à principio vsque ad vltimum. Cum coctum satis erit, mutetur in aquam frigidam, & ab aqua extrahatur, & manibus exprimatur, vt aqua omnis egrediatur. Puluere croci superposito malaxentur, & formentur magdaleones & seruentur in vsum. Crocus in decoctione non debet poni, nec in pulu. redigi, donec malaxetur ne in aqua dilutus effluat. Quare sapienter in pul. redactus, malaxetur, & permisceatur. Hæc est descriptio vulgaris, quam retinui. us.

Emplastrum detanis.

EMplastrum hoc quibusdam ceratum appellatur improprie. Quare mallem inter emp. collocare, quam inter cerata. Alij in formam vnguenti parant sic.

R. olei chamomilæ, anethi, de spica, liliorum ana 3. 2. pinguedinis porci, pingued. vituli ana lb. 1. euphorbi 3. 5. thuris 3. 5. olei laurini 3. 1. s. pingued. viperæ 3. 2. s. ranarum viuientium numero 6. lumbricorum lotorum in vino 3. 3. s. succi rad. ebuli. enulæ campanæ ana 3. 2. scænan. stechad. matricariæ an. M. 1. vini generosi lb. 1. Bulliant omnia ad consumptionem vini. Coll. adde litharg. auri lb. 1. & diu agitentur. Deinde adde ceræ citrinæ q. s. terebinth. abietis 3. 2. Auferantur ab igne, & adde styracis liquidæ 3. 1. s. Agitentur fortiter. Postquam refrixerit aliqua ex parte, adde argenti viui extincti in salina hominis ieiuni 3. 4. fiat emplastrum, vt artis est. Hoc emplastrum recipit quantitatem parvam argenti viui, quare

quare efficacius reddetur ad omnia, si argenti vivi 3. 6. receperit, & euphorbij 3. 3. Quod argentum viuum extinguitur salua, superstitiosum est, & inutile. Sed hac ratione putant emendari venenum. Non enim sequitur, salua hominis ieiuni est venenum serpentibus: Ergo aliis aduersatur. Quod si salua ad castigationem vsurpari debet, ieiuni esse debet, quia salua infecta alimentis non seruat vires suas.

Emplastrum de mastiche.

Dispensatur apud nos emplastrum de mastiche. Quare visum fuit addere descriptionem, quæ in nullo dispensario reperitur. Oportet huius emplastri autores fuisse præceptores nostros.

R. picis naual. ceræ ana 3. 6. sagapeni 3. 6. ammoniaci, terebinth. colophoniz, croci ana 3. 3. aloes, thur. myrrhæ ana 3. 3. opopanacis, galbani, styracis calamina. mastiches, aluminis, fœnugræ ana 3. 2. comp hittæ 3. 1. bdellij, litharg. ana 3. 3. lithargyrum in puluere redactum cum sufficienti aqua decoquatur. Deinde pix, quæ liquefacta adde ceram, ammoniacum postea. Sagap. opopanax, galbanum, infundantur, & liquentur, & percolata iniiciantur. Mox styracem, comp hittam, terebinthinam spatula misceantur. Postremo colophoniz, mastich. thuris, bdellij, aluminis, myrrhæ, fœnugr. pul. paulatim insperge. Coquatur, coctum in aqua fundatur, & forma magdaleones.

Hanc descriptionem Nicol. Alex. dispensandam censemus, quod sit melior, & artificiosior. In hac viuum rationem collocandorum medicamentorum, & proportionem licet spectare. Ego verò mutarem libentissime illud alumen, in bitumen, quia hoc emplastrum ad digerendum, resicandum, & reserandum factum est, & solum alumen astringens est. Adde quod parum videtur illud medicamentum conuenire partibus affectis, quibus determinatur, vt thoraci, spleni, vtero & affectibus, ad dolorem scapularum thoracis à frigore ortum, ad lienis duritiem emolliendam, ad aquam intercutem à frigore, ad vteros frigidos. Quare sequendam hanc descriptionem suademus. Fortè hoc dubitare faciet, quando alij, comp hittæ, id est, fecem styracis liquidæ, alij au-

tem styracem rubram. Nam styrax illa non est Serapionis quæ ex myrrha nostra exprimebatur à Diosco. ita dicitur, sed ex styrace rub. exprimitur. Quare eadem materia erit, nec aliam residentiam styracis habemus.

Emplastrum diuinum.

℞. galbani 3. i. ammoniaci 3. 3. opopanax. 3. i. lithargyri lb. i. β. oliba. 3. i. & 3. i. myrrhæ 3. i. & 3. 2. æruginis æris 3. i. bdelij 3. 2. aristolochiæ 3. i. mastiches 3. i. magnetis 3. 4. lithargyrum puluerisatum in mortario oleo permixtum coquatur. Ammoniacum & opopanax dissoluantur, & liquentur, & collentur, quæ cocta lithargyro & liquefactæ ceræ misceantur, cum spatula agitando. Myrrham, olibanum, mastichen, aristoloch. & magnetem in pul. redacta sensim permisce, & in aquam mittantur. Formentur magdaleones. Hoc emplastrum præparandum ob vires egregias & diuinas. Non multum à ceroneo differt. Quare si paratum non habeatur, addendo aristolochiam & magnetem simile redditur. Aristolochia longa vsurpanda est, vel rotunda. Pro bdelio, propolis vsurpanda.

Emplastrum contrarietatem prima descriptio.

℞. picis naualis, aloes ana 3. 3. lithargyr. ceræ rubræ, colophonix, galbani, ammoniaci ana 3. 2. visci quercini 3. 6. gipfi, vtriusque aristoloch. myrrhæ, thuris ana 3. 6. terebinth. 3. 2. vermium terrestrium 3. 4. gallarum 3. 4. vtriusque consolidæ, boli armeni ana 3. 4. sang drac lb. i. Extat alia descriptio, quæ dicitur de pelle arietina Arnoldi de Villa noua ex lib. 2. cap. de Eupatorio, quæ magis ficit, & constringit, & melius ordinatur. Magis mihi placet illa descriptio quæ recipit.

℞. litharg. auri, lapid. hematitis, sang drac. boli arm. mumix, galbani, thuris, lumbricorum terrestrium ana 3. β. picis naualis, colophonix, ceræ albæ & rub. ana 3. i. radic. consolidæ maioris, minoris & med. æ ana 3. 3. ros. rub. myrrhæ, aloes ana 3. 4. stellæ marinæ combustæ, gallarum combustarum, aristolochiæ rotundæ ana 3. 6. visci quercini, terebinthinæ ana 3. 3. sangui. hominis rufi lb. i. minus quarta. Conficiantur hoc modo, Pellem arietinam recenter extractam seu excorticatam cum

cum pilis coque ad dissolutionem. Collaturæ lb. i. misce viscum quercinum dissolutum, cum spatula stannea, agitetur, deinde ceram, picem, colophoniam adde. Ammoniacum, galbanum dissoluatur in aceto, & collentur. Addatur deinde pul. aliorum, ultimo loco odorata, & quæ minorem calfactionem & calorem ferre possunt. Postremo terebinth. sanguis, permisceantur. Vermes in vino cocti & diligenter triti commisceantur: coquantur, donec non inquinent manus, manibus inunctis oleo ros. vel cydoniorum, non violaceo, ut vulgus facit. Malaxentur, fiant magdaleones. Ego tantum mutavi, quod legit palleam, marinam stellam legendum, quæ est ad id efficacissima. Quod sanguis hominis rufi, censerem potius hominis pituitosi, qui sanguinem viscosiorem & tenaciorem habet. Satis siccant alia medicamenta, sed parum refert. Nam oportet accipere sanguinem eorum, qui truncantur capite, in quo fluit venalis & arterialis, & sic est satis siccus, & viscosus, & hæc satis de emplastro contra rupturam.

Emplastrum de gratia Dei.

R. Terebinthinæ lb. β. resinæ lb. i. ceræ albæ 3. 4. mastiches 3. i. verbenæ, betonicæ, pimpinellæ ana M. i. fiat decoctio herbarum in vino albo generoso ad consumptionem tertiar partis. Collaturæ dissolue ceram, resinam, mastichen. Bulliant donec incorporentur, & agitentur. Tunc ab igne deponantur, & terebinthina iniiciatur, agitando cum spatula, & fiat emplastrum dictum Gratia Dei.

FINIS OFFICINÆ

Pharmacopolarum.



GVLIELMI RONDE-
LETII DOCTORIS ME-
DICI TRACTATVS

DE FVCIIS.



N faciei maculis, vel aliis quibusdam cutis defordationibus, primum vitiosus humor, à quo nascuntur, purgari debet: ut si croceo colore bilis faciem inficiat, medicamentum cholagogum propinandum est, ad corporis euacuationem, & sic de alijs humoribus dicendum est. Quod si partis internæ, ventriculi, vel hepatis, vel lienis vitio, cutis inquinata sit, & partes confirmandæ, coctio ventriculi iuvanda, cutis sordida recrementis detergenda sunt, balneis, vel stuphis. Obæsis, quibus cutis sordida est, stupha magis conveniunt. Macilentis vel scaldis, vel à sole, vel à labore, vel ab inedia, vel ab alia qualibet causa balneum aptius, alijs minus conveniunt. Utendum autem primum balneo detergente, & relaxante, manè quidem ieiuno ventriculo, deinde humectante, & leuiter detergente, post cibum & exactam ventriculi coctionem. Balneorum verò detergentium formulas subiiciemus, ex quibus valentiora conveniunt ad elephantiasim, scabiem, & cetera cutis vitia: imbecilliora verò biliosis, & delicatis prosunt, quale hoc est.

Balneum.

R. parietariæ, mal. cum rad. acanthi, viol. ana M. i. hordei integri p. 1. florum viol. chamomilæ, ana p. 3. fiat decoctio in aqua pluvie, & ex ea paretur balneum, quo ieiuno ventriculo lauetur. Deinde ubi sudaverit, in lecto corpus diligenter detergendum est.

Bal.

Balneum Valentius.

℞. rad. liliorum, serpentariæ, britoniæ ana lib. j. borrag. bugloss. fumariz, saponariæ, ana M. ij. parietariæ, adianthi, maluarum, viol. an. M. j. hordei integri fabarum non excorticatarum, orizæ an. quart. j. florum meliloti, chamomilæ, anthos, maluarum, viol. an. p. ij. fiat decoctio pro balneo, vt dictum est. Vrtilissimum erit, si addas radicē ireos, cucumeris agrestis, lapati acuti, elenij, nitri tantundem. Et hoc postremo, & medio vri possunt, ante vsum stuphæ. Biliosus verò primùm vtatur stuphis, deinde balneo humectante, detergente, & refrigerante ad hunc modum parato.

Balneum pro biliosis.

℞. hordei mundati p. ij. althææ & maluarum cum foliis viol. ana M. iij. fol. betæ parietariæ, bugloss. borrag. (quæ leuiter detergunt) an. M. j. quatuor sem. frig. maiorum, semini lini & scænug. an. 3. ij. florum viol. nenup. lilia um an. p. ij. fiat decoctio in decoctione pedum & capitis arietis, deinde paretur balneum tepidum, in quo diutius maneat, longe à cibo. Hoc quoque decocto faciem & collum abluat. Possunt etiam addi rad. liliorum, si cutis dura sit & aspera. Quod si maculæ firmatæ sint, radices ireos & cucumeris agrestis adiciantur.

℞. litharg. 3. j. s. cerusæ loræ in aqua plantag. & caudæ equinæ ana 3. ij. olei ros. 3. iij. coquatur oleum cum succis, ceræ albæ q. s. fiat linimentum.

Topica, qualia esse debent.

In topicis componendis ratio & methodus seruanda est, quæ in balneis supra tradita est. Nam si facies squallida sit, & macilenta, conueniunt olea, vel ynguenta, vel aqua vim detergendi habens. Prius ergo facies abluenda est decocto hordei mundati, vel infusione panis albi, vel aqua liliorum, vel aqua florum maluarum. Deinde ynguenta oleo amygdalarum dulcium, vel de semine cucurbitæ, vel melonis, vel cucumeris, vel pomata hoc modo parata.

Pomata.

℞. pinguedinis herdi, quantum volueris. Abluatur aqua frigida, postea diuidatur in frusta in aqua liliorum, vel florum maluarum, lique scat, & exprimatur, atque ad

vsus seruetur. Postea etiam fiet cum aquis ros. & plantag. additis pomis diuisis in multas partes.

Fiunt etiam veluti vnguento citrino, cui additum sit sublimatum, vel coctum in ventre gallinæ. Facit ad fucum, quod est præstantior. Conuenit & aqua sequens mulieribus biliosis.

Aqua distillata.

R. medullæ panis hord. qui melius sit inter album & nigrum lb. ij. lactis caprini lb. iiij. vini albi lb. ss. quatuor seminum frig. maiorum contusorum ana ʒ. ij. thuris, mastich. ana ʒ. j. boracis ʒ. ss. fabarum recentium lb. ij. vel florum fabarum p. iij. vel fabarum siccarum & cicerum rub. ana lb. ij. orizæ lb. ss. florum nenuph. viol. ros. albarum ana p. ij. vitella ouorum cum albuminibus numero x. distillantur in vase duplici. Si addatur ante distillationem terebinthina, melior erit fucus, & diutius faciem seruabit.

Ex medulla ossium arieris fit optimus fucus, qui faciem lenit, & maximè nitidam & splendidam reddit, ac eandem optimè conseruat. Extrahendæ medullæ hæc est ratio. Ossa plurima per elixationem à carne separata, & postea contusa diu coquuntur in aqua. Deinde ab igne submoueatur, & innatans pinguedo colligatur.

Post vsus balneorum vel aquarum detergentium, quibus solum vtendum est, cum malis humoribus corpus abundat, vt dictum est, & cutis sordibus obsita est multum. Hac pinguedine fit præstantius fuci remedium. In facie & calida facie eodem ferè modo vti possumus oleo lentiscino parato per sublimatum, sed in hoc prius abluendum est aqua, vel decocto hordei mundati, vel aqua plantaginis, deinde facies vngenda prædicto oleo.

Quod si vtendum est sublimate, vel borace, vel alio exiccante, huic miscere oportet oleum amygd. dulc. vel de semine cucurbitæ.

Si sint obesi, & facies pinguior, & humidior videatur, vtendum stuphis & balneis multum detergentibus & exsiccantibus, qualia sunt antè descripta. Vt licet etià detergentibus aquis, vt raphani, aqua rad. ireos, aqua primæ & secundæ speciei ciclamini, decocto fabarum, cicerum alborum, orizæ & similibus. Sed detergenti facultate omni-

bus his præstat lignum sanctum quod etiam macilentis & siccis proprium remedium fiet, si in eius decocto addatur radix liliorum & ficus albæ & pingues. Præterea possunt obesi quibusdam oleis uti, ut de sinapi, & de semine behen, vel amygdal. amar. vel etiam de vnguento citrino, præsertim si huic misceantur, vel sublimatū, vel veratrum, vel pomatæ quidpiam paratæ cum aqua ros. & periclimeni, vel sublimati extincti. Sed omnium fucus maximè videtur egregius ex sublimato & vnguento citrino, quod summum faciei nitorem inducat, eandemque pulchritudinem per multos annos tueatur. Si ruboris fucum adhibes, cōmemoratis aquis, oleis, vnguentis, adde caphurā, & acetum distillatum. Conuenit etiam lac virginalē distillatum ex vmbilico veneris, cucurbita, nenuphare, semperuino, & aliis huiusmodi ex herbis refrigerantibus. In hūc modū optima est distillatio sic parata.

Aqua distillata.

℞. decocti pulli, vel caponis, vel gallinæ lb. iij. succi limonum lb. j. aceti albi lb. ss. florum fabarum & nenup. ana p. iij. camphoræ & albuminis ouorum ana ʒ. ij. misce, distillantur in alambico. Loco decocti pulli vel gallinæ licet uti lacte capræ albæ. Laudatur imprimis pinguedo lupi, asini ad dealbandas faciei cicatrices, & maculas auferendas, & axungia cati liquefacta in aqua peculi rosarum, vel vuarum acerbarum.

Ad dealbandas faciei maculas & cicatrices auferendas

aqua familiaris Paulo Pontifici Max.

℞. aquæ vitæ quater ad minus distillatæ partes iij. summiratum florum anthos partes ij. pone in amphora bene obturata per diem & noctem cum vase bene cooperto, mox aquam & flores bene distilla. Aqua per excellentiam sacra dicta est, ad inflammationes, seruans vitam hominum. Oportet omni hebdomada accipere ʒ. ij. cum aqua & vino facie abluta. Hæc aqua mirum in modum mundificat, faciēque longissimè conseruat.

Aqua ad efficiendam cutim pulcherrimam & faciem splendidam.

℞. furfuris ex meliori trumento quod poteris inuenire, & fac primum, ut sit cribratum & cum forti aceto distempera, ut si velles dare gallinis, & postea pone in

alambico vitreo, & habebis decem aut duodecim oua recentia, & franges intra alambicum cum supra dicto furfure & simul distillentur.

De Virgine.

R. lithargyri auri 3. ij. cerusæ, salis communis an. 3. fl. acet. aquæ plantag. ros. ana 3. ij. caphuræ 3. β. fiat collyrium & passetur per manicam. Oleum de myrrha o. primæ cicatrices dealbat.

Sæpè expertum.

R. olei de tartaro 3. ij. seminis psillij 3. j. Infundantur, in mucilagine, misce cerusæ in oleo ros. diss. 3. j. boracis, salis gemmæ an. 3. j. fiat linimentum. Liquores tenues, qui ex ovo, cum decoquitur, emanant, ad idem efficaces sunt. Expertum à Domino Thocano, & Fabro medicis.

Oleum Venetis meretricibus consuetum ad fucum.

R. tartari bene combusti per reuerberationem lb. β. puluerifetur & resicca, ut sit de sale. Tunc accipe sal illud, & pone intra albumina ouorum decocta.

Ad dealbandas cicatrices.

R. olei tartari, seminis psillij ana 3. j. Infundantur in mucilagine, in oleo rosato dissoluta 3. j. boracis, vel salis gemmæ.

Ad Vestigia Variolæ.

R. aquæ distillatæ pedum vituli, vel aquæ radiceis serpentariæ, florum fabarum cum aqua rosarum, aut limonium. Oleum dactylorum delendis vestigiis cicatricum conducit.

Ad dealbandos dentes.

R. panem ex farina secalis. Coquatur sub cineribus, donec dure scat, deinde reducatur in tenuissimum puluerem, quo fricentur dentes.

Ad dealbandos dentes, & conseruandos, & oris

halitum commodum.

R. summitatum myrthi, lentisci, oleastri, saluiz, roris maritani ana M. j. corali. rub. eboris, & dentium equorum ana 3. iij. in fictili vase simul vrantur, addendo salis communis p. j. donec omnia dealbata sint, & reducantur in puluerem crassum, cui adde garyophyl. cina. mo. roris marini an. 3. iij. mosci 3. j. vel 3. ij. fiat pul. qui excipiat oxymelite scyllitico, vel mucilagine gummi

tragacanthi, vel gummi arabici.

Ad idem.

R. gummi arabici dissoluti in aqua ros. 3. ss. coralli rub. 3. ij. lapidis spongiæ 3. ss. nuces mosc. numero ij. fiant formulæ ad modum digiti, & desiccetur in umbra, & dum erunt desiccata, fricentur dentes vnoquoque die mane, & paulo post lauentur vino albo, in quo infundantur flores roris marini.

Ad idem.

R. cinabrij vsti, corticis tamarisci, ciperi ana 3. j. spicæ nardi, mastiches, coralli albi, & rubri ana 3. j. ossis sepiæ, lapidis sumitis, salis gemme ana 3. ss. ros. rub. 3. j. ss. pulueriferur omnia subtilissime, & cum aqua mentæ fiat dentifricium in forma opiata, quo fricentur dentes quotidie mane. Post abluantur vino albo, vt supra.

Ad idem.

R. aluminis rub. 3. vj. salis communis 3. iij. mastich. 3. j. myrrhæ 3. ss. garyoph. 3. vj. misce, fiat distillatio, qua fricentur dentes.

Ad idem.

R. ossis sepiæ 3. ss. mastiches, coralli rub. vsti ana 3. ij. cornu cerui vsti 3. j. ss. aluminis, carbonis, roris marini ana 3. j. cinamomi 3. j. fiat pul.

Decoctio.

R. citrangelorum limonum ana numero x. infundantur in aqua ros. & florum nymphæ fabarum, maluarum, liliorum & corticis fabarum ana lb. j. vini albi 3. iij. fiat decoctio. In collatura diss. sublimati 3. ij.

Ad auferendam crassitatem faciet.

R. butyri recentis, terebinthinæ ana 3. j. radicis liliorum decoctorum in foliis betæ sub cineribus q. j. calcis viue quinquies lotæ in aqua rosarum, vel citrangeluli succo 3. i. axungie porci recentis liquefactæ in aqua ros. 3. j. misceantur, & reducantur in formam vnguenti. Quod si fortius facere volueris, adde ablutionis vel decoctionis communis sublimati, applicetur super faciem. Hoc facit inflare cuticulam & eandem abscedere, vt facilius extrahatur. Oportet ungere faciem melle, & depilabitur. Sed ista non sunt adhibenda corporibus impuris, vt plethoricis, nisi fuerint aut sanguinis missione,

aut purgatione euacuati, & hoc erit ad conseruandam cuticulam faciei minus crassam.

Pro delicatis fit hoc modo linimentum.

℞. rad. liliorum decoctorum sub cineribus ℥. j. contundantur in mortario, cui adde sacchari candi q. j. reducantur ad formam linimēti, & applicentur super partem, faciem scilicet. Postea inungatur melle, vt dictum est. Postremo hoc vti satius est, quā priori, sed eget longiori tempore. Si facies rubicunda euadat post vsum horum remediorum, lacte virginis vtendum est, vel succo semperuiui addito, cum modico sulphure. Valet sanguis leporis, quo inungat faciem.

Ad impetigines faciei.

℞. aceti scyllitici ℥. ij. aloës 3. iij. succi lapathi acuti & olei tartari ana 3. iij. incorporentur simul ad formam linimenti. Illinantur serò partes affectæ.

Ad idem.

℞. aquæ lapathi acuti distillatæ ℥. iij. borracis 3. iij. salis cōmunis 3. j. aceti scyllitici ℥. j. misce, fiat, vt supra.

Ad idem.

℞. radic. oxylapathi quart j. decoquatur sub cineribus: postea cum aceto scyllitico reducatur ad formam linimenti. Si non curetur, adde præcedenti linimento argenti viui 3. ℥. vel sublimati 3. j. abluatur sæpe facies aqua myrtil. vel peculi pedum ros. Postea etiam adde parum albuminis, vt cutis meliùs resistat.

Ad idem.

℞. tartari 3. ij puluerifetur & cum albumine ouorum applicetur, vel aluminis vsti 3. iij. quod eodem modo propinabitur.

Ad impetigines faciei.

℞. aloës 3. ij. diss. in aceto scyllitico in modum linimenti. Liniantur serò partes affectæ.

Ad idem.

℞. radic. brioniz. Cum sale subacta in aceto acerri-
mo, admodum impetigines sanat.

Ad prohibendum ne fiant impetigines.

℞. aceti albi optimi 3. iij. succi lapathi acuti, limo-
num ana 3. iij. lithargyri auri ℥. j. decoquantur leuiter,
deinde distillentur, & ad vsum seruētur. Oleum ex erica
valet

valet ad impetigines inueteratas, & etiam oleum ex vitellis ouorum. Si impetigines ortum habeant ex morbo Italico, non curantur citra licum argenti viui.

Ad impetigines.

℞. oxylapathi partes duas, gentianæ partem vnam: concoquatur in iusta mensura aquæ, deinde exprimantur, expressum cum axungia vituli mixta rursus decoquatur lento igne, vsquequo veniat ad consistentiam vnguenti. Hoc remedio curatur impetigines. Expertum est.

Fucus optimus.

℞. sublimati 3. j. argenti viui extincti in salua hominis seu fœminæ 3. ij margaritarum porcellanarum, vel internæ partis ostreorū 3. j. caphuræ 3. j. β. incorporentur simul in mortario marmoreo cū pistillo ligneo per tres horas. Ducantur & fricentur, reducanturque in tenuissimum puluerem. Deinde hic pulvis abluatur aqua myrthi, florum & foliorū myrthi, & deficcatus seruetur in vsum. Adde foliorum auri & argenti num. x. Tempore vsus, pone in vola manus tantum oleum lētiscinum, aut amygd. dulcium, in quo dissoluatur modicum pulueris prædicti, & hanc volam altera vola manus frica, donec mixtio perfecta sit. Postea faciem & alias partes, si vis, illic vespertim cū iturus es cubitum. Sed facies lauanda primo vino albo & aqua est. Eadem partes abluantur sub mediam noctem aqua sequenti.

Aqua cuiusdam nobilis mulieris.

℞. sublimati 3. j. caphuræ 3. j. puluerisentur optimè, infundantur in succo limonum & aqua ros. nenuph. cucurbitæ, & florum aut foliorum tabarum ana ℥b. β. infolentur per 15. dies, & vsui seruentur. Postremò facies lauatur aqua & vino albo, sic facies admodum formosa videbitur.

Fucus.

℞. stercoris lacerti, ossis sepia, tartari, vini albi, rasuræ cornu cerui, coralli albi, farinæ orizæ ana partes æquales, pro copia, quæ expetitur. Diu in mortario & subtilissimè terantur, postea distemperentur in aqua seyllitica facta ex equali parte amygd. dulc. summitatū vineæ florum philo. Quo facto adde mellis optimi albi q. s. incorpo-

rentur in mortario, reponere in vase mudo vitreo, & vtere.

Alius fucus.

℞. vnguenti citrini recenter parati ℥. 3. amygdal. dulc. diutissime pistarum ℥. 1. farinæ fabarum ℥. j. ossis sepiæ, cornu cerui, farinæ hordei ana ℥. 2. omnia incorporentur cum melle, & vtere.

Alius fucus.

℞. radic. vtriusque serpentariæ, amygdal. amararum, farinæ nigellæ romanæ, seminis melonū & citruli mundatorum ana ℥. β. concassentur omnia & fortiter extrahatur lac, cui addantur sarcocollæ ℥. 2. desiccantur ad umbram, & fiant trochisci, qui distemperentur cum aqua roris marini, manè & serò lauetur facies.

Fucus alius.

℞. rapas sine testa. Ponantur in vase vitreo, & aspergantur pul. salis gemmæ & aqua limonum. Cooperiantur, & tandiu in solo ponantur, donec fiant quasi vogue-tum. De quo facies illinatur, postea lauetur aqua folio-rum fabarum.

Fucus ducus Mediolanensis.

℞. lactis caprini lb. 3. medullæ panis albissimi nume-ro 2. temperentur simul per horas sex. Limones à corti-ce extremo mundatos numero 12. infundantur per fru-cta albumina ouorū numero 12. fortiter agitatorum cal-cis, corticis ouorum, porcellanarum ana ℥. β. camph. a-luminis, coralli rub. ana ℥. 2. boracis ℥. 1. cerusæ ℥. 3. misceantur, aut diligenter distillentur in alembico vi-treo, & distillatio seruetur vsui. Si quis adderet tarta-rum calcinatum, melius esset.

Ad idem.

℞. rasuræ ligni sancti q. 1. pass. mundatarum, ficuum ana numero 20. radic. liliorum, ireos, cucumeris agre-stis q. 5. cum aqua forti fiat decoctio, & de colatura fiat ablutio.

℞. vnguenti citrini ℥. 4. pomatæ ℥. 2. misce, vngatur facies serò & manè. Ablue decocto præcedenti.

Ad idem.

℞. florum fabarum, nenuph. ana lb. 1. medullæ panis albiss. farinæ orizæ, ireos, cucumeris agrestis ana ℥. 6. mellis lib. 1. vini albi & aquæ fontis ante lb. ii j. tempe-
rentur

rentur simul, & fiat distillatio in balneo marie ana ʒ. j. aqua seruetur vsui.

*Linsimentum in modum lactis Virginalis ad
ornatum faciei.*

℞. licharg. auri ʒ. 2. bulliant in exiguo vase plumbato cum ʒ. 6. aceti albi distillati, per totum mouēdo semper cum baculo. Passetur per pānum lineum, seruetur aqua. In hanc rem tandem accipito salis aut olei tartari ʒ. 1. & dissoluantur in ampulla cum ʒ. 4. aquæ liliorum, & pone aquarum supradictarum ana guttas tres aut quatuor in manu, & conuertantur in lac virginalis, quod tenue erit. Fricetur facies & siccetur.

Quomodo fiat acetum distillatum.

℞. aceti optimi lb. 2. infunde cum exigua quantitate aquæ vitæ, garyoph. ʒ. ʒ. sand. citrini, & rasurę ligni aloes an. ʒ. 3. radic. ireos, cyperi ana ʒ. 1. ʒ. distillentur in alem-bico vitreo simul, & cum vna trium partium distillauerit ad faciendum lac virginalis, quod postea distillabitur, ad aliud vrile erit.

*Ad dealbandas cicatrices, & omnino similes
sint carni.*

℞. ol. de myrrha (vt doctissimis visum est) adde etiam aluminis. Non minori successu ad id probatum atque expertum est. Idem etiā liquor tenuis, qui ex ouo, dum coquitur, resudat. Ad idem efficax & expertum est à domino Borbono & Fabro medicis.

Distillatio.

℞. rad. ireos, cucum. agrest. an. lb. 3. radic. altheæ, liliorum an. lb. 2. racemorum maturorum lb. ʒ. dictamni gr. 1. herbæ fabarum, & parietariæ ana M. 1. macerentur in vino albo, vel sero caprino, & fiat distillatio. Adde raphani ʒ. ʒ. quat. sem. frigid. maior. an. ʒ. 1. vrinæ puellæ lb. ʒ. insolentur, & seruentur vsui.

Cum verò tota facies maculis & lētiginibus conspersa est, hunc fucum Rondeletius præscripsit vxori suæ, cui facies maculis quibusdam & lentiginibus erat inspersa, & liberata fuit.

Ad tollendas faciei maculas.

℞. lupinorum quantum voles, decoquantur in aqua pluuiali ad crassitiem, quo yngatur facies.

Ad solis & stionem, & labiorum scissuras, & maculas faciei.

℞. limacum cum putaminibus num. 20. conterantur cum testa, adde ceruse ad pondus limacum cum 3. cere nouæ, & 3. i. cornu cerui, & fiat linimentum, postea abluat faciem.

Ad dealbandas maculas faciei omnis generis.

℞. sublimati, alumin. ana 3. ℞. succi caulium 3. 6. cum lixiuio sarmentorum cineris, adde oua duo integra cum tribus fellibus tauri, & incorporentur secundum artem. Vtere hoc lixiuio cum panno madefacto in eo.

Ad verrucas, & alia tubercula.

℞. salis ammoniaci, vitreoli Romani, viridis æris ana 3. 2. aluminis rub. 3. i. calcis viuæ 3. ℞. distillantur in alēbico vitreo. Reiciatur primus liquor, secundus efficacior erit, & seruetur vsui.

Ad verrucas in facie.

℞. radices asari. Tempera in aqua ros. biduum, pista & illine.

Ad verrucas.

℞. radic. chelidon. cum axungia trita, & admota verrucas absomit & tollit. Sanguis lacerre distillatus eas deficcet. Agrimonia cum forti aceto emplastrata, verrucas tollit.

Vt capilli flauis fiant.

℞. lixiuij sarmentorum, sufficenti quantitate ad lauandum capillos, in quo bulliant florum tapsi barbati, & stachad. rad. chelid. ana p. j. Ex hac decoctione prius lotum lixiuio communi, & siccatum rursus lauetur & sensim siccetur linteis calidis. Italice mulieres bulliunt in lixiuio communi flores stachad. contus. & rasuram sand. citrini.

Ad idem.

℞. cortic. berb. 3. ℞. rad. glyc. 3. 2. ℞. ceterach, & polyp. ana M. i. fiat decoctio in colla. ad lb. i. in qua diss. mellis communis 3. i. aquæ serpentariæ, ari 3. ℞.

Ad idem.

℞. vini calcinati 3. i. rad. alcannæ 3. 2. rad. raph. 3. 3. pistentur optimè, & bulliant: fricentur capilli cum ibit cubitum. Manè autem lauetur lixiuio sarmentorum.

Ad clarificandos & candidos reddendos capillos.

℞. florum tapfi barba. cineris sarmentorum, & cineris ligni hederæ ana p. i. seminis fœnugræ. ʒ. 2. bulliant simul in aquæ pluuiæ lb. 10. ad consummationem medietatis partis, & colletur, collaturæ adde lb. 3. saponis, & in vase ponatur in sole per 24. dies agitando quolibet die baculo. Fiat linimentum, quo (toto prius capite lixiuio ligni hederæ abluto) fricentur capilli, qui sensim in sole siccantur.

Aliud ad idem.

℞. stercoris hirund. radic. enul. camp. seminis raph. sulph. flor. capparis, thuris ana ʒ. lb. omnia simul incorporantur cum paribus partibus fellis bouis albi, fricentur capilli prius loti lixiuio sarmentorum & siccati. Et dum capilli erunt sua sponte siccati, à lotionem in frictione rursus lauentur in dicto lixiuio, & siccantur paulatim panno calido.

Ad pilorum regenerationem.

℞. ol. iuniperi, nucum ana ʒ. i. mellis albi, succi lapathi ana 3. lb. puluer. seminis apij, asari ana ʒ. 3. incorporantur simul, & vngatur locus.

Ad flauos crines reddendos.

℞. lixiuium de cinere hederæ ligni decorticati, Laua sæpe caput, & euenient flauo.

Ad prohibendam caluitiem, lauetur caput cum vrina canis.

Vt pili elephantiorum renascantur & bique.

℞. cineris talpæ, vesparum, & gallinarum ana 3. 2. Ladani ʒ. i. lb. ol. irini ʒ. 2. ceræ modicum, fiat linimentum.

Ad barbam generandam expertum.

℞. olei amygd. dulc. & myrth. ana ʒ. i. cortic. rad. arundinum vstarum, capil. ven. vstorum, politrici vsti ana 3. 2. capitum muscarum vstarum, apum contritarum in suis vacuitatibus ana 3. 2. lb. ladani 3. 2. mellis ʒ. i. pulueris entur, cum modico ceræ, fiat linimentum.

Ad idem.

℞. cineris talpæ in clibano exiccata ʒ. 2. cineris apum, cineris auellandarum tostarum ana 3. i. lb. stercoris muris 3. 2. ladani optimi 3. i. lb. mellis optimi 3. i. ol. nardini, & ceræ, quod satis est. Reducatur in formam lini-

menti & diu maneat. Oportet manè faciem sequēti die hac decoctione abluere.

R. politrici, abrot. maris, roris marini, fol. myrthi, corticis rad. arundinis, florum chamomillæ, rosa. rub. foliorum rumicis ana M. i. ligni gaiaci lb. ss. fiat decoctio, utatur, ut dixi.

Ut pili cadant & non renascantur.

R. Auripigmenti, ouorum formicarum, gummi arabici ana ʒ. ss. gummi hederæ ʒ. ij. cum sanguine vespertilionis, vel cum succo hyoscyami, fiat vnguentum secundum artem. Applicetur, prius abrasis capillis. Alij addunt sanguinem testudinis, cinerem caulium cum aceto. Valet etiam lixiuium ex puluere sanguifugarum cum axungia, si illinatur pars.

Ad reddendos pilos crispos & ruffos.

Bononiæ, teste Guidone cap. 5. vbi de huiusmodi rebus tractat, lauantur in lixiuio farmetorum, in quo sunt rasuræ buxi, & corticis citri maceratæ. In Italia quoque aiunt radicem gentianæ idem præstare.

Ut manus fiant candidiores.

R. micæ panis ʒ. iij. aut iij. orizæ, cicerum rub. ana ʒ. 3. aut 4. saponis mollis ʒ. i. ss. mellis despumati, quod satis sit, fiat pasta.

Vel sic.

R. succi peponis & amygdal. amararum infusarum in sero lactis, & infusarum ficuum numero 100. seminis sinapi ʒ. 2. radic. irid. ʒ. i. fellis bouis ʒ. 4. incorporantur, & fiat pasta. Abluat cum aqua vel propria urina, deinde aqua abluat os, & cum illa abluat manus, & sic fient molles & candidæ. Omnes succi, qui in rebus crassis fiunt, faciliè siccantur, & faciem siccando corrugant, vel inflammant tandem. Quare longè melius mihi videtur vtendum esse detergentibus aquis, & nitorem inducentibus, quàm sublimato, vel alia re, inter quas aquas principatum tenet aqua carnis peponis maturi, melonum cum suis seminibus contusis, vel aqua decoctionis lactis caprini, vel vux acerbæ, si repellendum sit ob ruborem. Vel ad psydracia, paratur sic,

Ad psudracia.

R. micæ panis sordidi lb. 2. rasuræ ligni sancti lb. i. rad. cucum asinini, vel agrestis, vel serpentariæ, vel ireos, ana lb. ss. florum rosarum recentium, & fabarum ana M. 6. temperentur in sero lactis in vase æneo, donec & æruginem contrahat, & postea distilletur, & aqua seruetur vsui. Si addatur vua acerba, efficacius erit. hac vtatur serò ad deterfionem cutis, manè sequenti ad splendorem vtetur.

Ad dealbandas manus.

R. decoctionis super prunas ꝑ. 4. in lb. i. aquæ, & bene cooperiatur vas terreum plumbeatum, coquatur ad dimidium, deinde adde succi limonum ꝑ. 6. lento igne calefiat citra ebullitionem, & agitetur semper, deinde auferatur ab igne, adde mellis ꝑ. 2. ol. amyg. amararum ꝑ. 2. incorporentur, & fiat vnguentum, addendo ceræ ꝑ. 4. hoc sum semper vsus.

Ad manus tumidas ex frigore.

R. celsi, adipis anserini, & anatis ana ꝑ. 2. mucilani- nis seminis cydoniorum ꝑ. 1. amyli ꝑ. 6. terebinthinæ ꝑ. 1. ss. ol. rosa. ꝑ. 3. ol. de vitellis ouorum ꝑ. 2. ceræ citrinæ pa- rum, fiat linimentum.

Aqua pro manibus.

R. aquæ pluuiæ ampullam vnâ. Imponatur sal gemmæ pro solido: tantundem aluminis albi: insolentur per 7. vel 8. dies. Deinde hac aqua laua manus præcedente lotionem aquæ communis.

Ad abluendas manus.

R. pinearum mundatarum, pul. sinapi ana ꝑ. 4. mellis optimi lb. ss. misce, & fiat pasta.

Ad tumorem manuum ex frigore.

R. seminis lini, fœnugr. althææ an. ꝑ. 3. ss. extractæ mu- cilaginis cum aqua liliorum, vnguenti supra scripti, & de mucilaginibus an. ꝑ. 1. ol. aneth. amygd. dulc. ana ꝑ. 3. ss. fiat linimentum pro manibus cum lana sordida.

Ad splendorem.

R. micæ panis albi lb. 2. florum fabarum lb. i. ros. al- barum, vel rubrarum, nymphæ, liliorum ana lb. 3. la- ctis capræ ꝑ. j. iridis Venetiorum ꝑ. 1. distillantur in bal- neo Mariæ.

Aliud.

℞. peponum, melonum maturorum cum seminibus
℔b. 6 albuminis ouorum cum vitellis numero 5. distil-
lentur, & aqua seruetur vsui, hæc non minorem splendo-
rem facit, quàm sublimatum.

Fucus præstantissimus pro domino d'Estampes.

℞. sublimati 3. 1. porcellanarum 3. 2. margaritarum
splendidarum 3. 2. terantur diligentissimè, & incorpo-
rentur simul in mortario marmoreo, & pistillo ligneo
per tres horas deducantur, fricentur, reducanturque in
tenuissimum puluerem, deinde puluis abluatur aqua fo-
liorum rutæ, deficcatus seruetur vsui. Adde foliorum au-
ri & argenti num. 10. vt ere. Prius tamen faciem abluito
decocto hordei, & fenugr. Postea verò manè abluatur
aqua & vino albo mixtis. His autem fucis vtendum non
nisi iam purgato corpore. Ad auferendas lentigines fa-
cici nihil æquè conuenit, ac aqua distillata papaueris
erratici siue syluestris.

Aqua ad faciem decorandam.

℞. lactis vaccæ mensis Maij (ex aliis nihil valet) ℔b. 2.
aranciorum numero 3. limonum numer. 5. incidantur
minutim, aluminis, sacchariana 3. 1. Hæc omnia infun-
de in lacte, & distillantur in alembico vitreo.

Fucus nobilis cuiusdam approbatissimus.

℞. sublimati 3. 1. bulliat in ℔b. 1. aquæ cisternæ, quo-
usque sentiat aliquam acrimonia in lingua. Postea adde
cerusæ 3. 3. bulliant parum, clarificentur cum albumine
ouorum numero 6. & postea coletur, & vsui seruetur,
donec vri volueris, & agitetur frequenter.

Aqua præstantissima.

℞. terebinthinæ, mastiches, albissimæ, tuthiæ præpa-
ratæ, caphuræ, aluminis an. 3. 4 infunde in aceto forti per
tres dies. Postea distilla per alembicum, & de aqua di-
stillata laua faciem.

Ad idem.

℞. serpentariæ recentis 3. 1. rutæ M. 1. hederæ terrestris
M. 2. boracis 3. 1. styracis collatæ 3. 1. ligni aloes 3. 2. mo-
sthi 3. 1. vng. citr. ni q. 1. caphuræ 3. 6 carnis caponis 3. 1.
corticis limonum, & citranguli ana ℔b. 1. ponantur in a-
lembico, distillantur, & fiat aqua vt decet.

Aqua

Aqua ad decorandam faciem.

℞. caphuræ ʒ. iij. aluminis rub. boracis ana ʒ. vj. moschi ʒ. ij. terantur omnia, adde tartari ʒ. j. ꝑ. omnia pone in ꝑ. ij. aque rosatæ commiscendo semper cum spatula. Postea distilla per filtrum, & in ampulla bene clausa seruetur, & manè, facie bene tersa, cū panno guttam vnā aquæ sumat, deinde faciem bene fricet. Hæc aqua suo odore spiritus auget, & mirabilem inducit albedinem.

Ad gratiam vultui conciliandam.

℞. lithargyri argenti ʒ. iij. aceti optimi ꝑ. j. ad consumptionem vsque tertiæ partis, coletur, & seruetur vsui in phiala. Aqua serpentariæ ad idem prodest.

Ad faciem rubram, aqua distillata.

℞. aristolochiæ rotundæ, been albi & rub. an. ʒ. ꝑ. radic. ireos ʒ. v. liliorum ʒ. vj. cicerum rub. lupinorum cōbustorum an. ꝑ. ꝑ. nucis moscatæ, cinamomi an. ʒ. ꝑ. amygd. amararum parum contusarum ʒ. ij. ol. tartari ʒ. iij. aquæ pluuiæ ꝑ. ij. omnia prius conquassata temperentur per duos horas, deinde habeat sanguinem duorum leporum, & omnia simul distillantur.

Ad idem.

℞. amygd. dulc. recentium ʒ. ij. feminis cucurb. mundatis ʒ. j. pistentur simul, misce succi limonum, vel aranciorum ʒ. j. ꝑ. boracis ʒ. j. caphuræ ʒ. j. cerusæ optimæ ʒ. ꝑ. misce, simul incorporentur.

Ad ruborem faciei.

℞. sulphuris ʒ. j. cerusæ lotæ ʒ. ij. succi limonum q. ꝑ. applica vesperi, cum decoctione furfuris. Addi potest os sepis, caphura cum cæpa.

Ad ruborem faciei à fumis. & Vaporibus.

℞. ol. de tartaro & ros. ana ʒ. iij. succi oxylapathi, lauri, serpentariæ an. ʒ. iij. cerusæ ʒ. j. ꝑ. lithargyri auri ʒ. ij. argenti viui extracti ʒ. j. ꝑ. radic. asphod. ystorum sub cineribus ʒ. ij. fiat linimentum in mortario plumbeo.

Ad dealbandos dentes, manus & faciem.

℞. sublimati ʒ. iij. argenti viui præparati & extincti ʒ. iij. pistentur, donec albi reddantur. postea totum colligetur in panno lino, & in aqua cisternæ aut fontis paululum ferueat aqua, alio vsu accipe, idem ex eodem madefacito, quoties voles.

Ad tubercula faciei lepra.

R. cineris & rad. arist. seu serpentariæ decorticatæ per dies nouem in qua fontis lotæ. Tunc tota per cribrum transmissa, quantum voles, particulam cum aqua plantaginis vel portulacæ, vel lactucæ dissolutæ, faciem il-line. Expertum.

Ad ardorem Grina post coitum.

R. aloes in aqua plantaginis lotæ 3. ss. terebinthinæ in vino albo lotæ 3. 2. myrrhæ 3. ss. fiant pil. 7. pro 3. capi-
piat ad quinque dies pil. 5.

Item.

R. plantaginis, caudæ equinæ ana M. i. contundan-
tur, & distillentur in alambico, de qua sumantur 3. 3. aut
4. singulis diebus, manè.

Ad dolorem dentium.

R. piperis longi 3. 2. pyrethri, staphisagriæ ana 3. i.
subtilissimè pulueriscentur: mellis 3. i. ss. aquæ vitæ 3. ss.
misce super cineres calidos, & applica dentibus.

Ad idem ex Empyricis.

R. rad. chelidonæ, immittatur in aurem, qua parte
dens dolet, superdormiat.

Ad ruborem.

R. vnguenti citrini lb. ss. lithargyri 3. 4. cerusæ lotæ
3. 2. bombacis & aluminis vstorum, tartari calcinati q.
ss. succi radic. enulæ campænæ, oxylapati & cyclaminis,
limonum ana 3. 6. caphuræ 3. 3. olei ros. lb. i. ss. Argen-
tum viuum sine liquore, valet tuberculis elephantico-
rum.

Ad idem.

R. succi fumiterræ, plantaginis, acetos. ana 3. 3. olei
ros. 3. i. gummi tragacanthi & arabici ana 3. ss. sanguinis
draconis 3. 2. ceræ nouæ. quod satis est fiat vnguentum,
quo vngatur introitu lecti. Die verò crastina, ablue fa-
ciem decoctione fabarum.

Ad faciem rubram & subliuidam.

R. tartari calcinati lb. ss. sacch. candi, boracis vsti ana
3. i. ss. mucilag. seminis psilij, cydoniorum extract. cum
aqua solani ana lb. ss. albumina ouorum fortiter agitata
numer. 20 caphuræ 3. 2. incorporentur, & distillentur si-
mul in vase vitreo, bene obturetur, cum qua in introi-

tu lecti cum panno raro epithymetur partes faciei, abluendo in crastinum cum aqua florum nenupharis, & infusi fursuris in panno raro.

Ad ruborem faciei, præcedentibus vniuersalibus purgationibus.

R. lithargyri auri lib. j. infundatur in aceto bis vel ter, & moueatur sæpe, & resideat in sole, donec albetur, & seruetur vsui.

R. lithargyri, hoc modo præparati ℥. j. nutriatur ex aceto albo, & semine cucurbitæ, & agitetur, donec redigatur in formam vnguenti, & consistentiam. Adde caphuræ dissolutæ in aqua ros. ℥. ss. vngatur locus affectus, & manè vngatur sequenti decocto.

R. mal. p. j. fabarum contusarum ℥. ij. fiat decoctio ad lib. iiij. facta collatura, de residentia faciem abluat.

Linimentum pro Virgine, cui facies erat defædæta scabie.

R. lithargyri auri ℥. j. ss. cerusæ lotæ in aqua plantag. & caudæ equinæ ana ℥. ij. oleo ros. ℥. iiij. coquatur oleum & cum cera alba q. s. fiat linimentum.

In rubore faciei & tuberculis.

R. olei rosati, & tartari ana ℥. iiij. succi oxalidis ℥. iiij. cerusæ lotæ ℥. j. ss. lithargyri auri ℥. ij. argentiviui extincti ℥. j. ss. radicis alphod. vsti sub cineribus, fiat linimentum in mortario plumbeo.

R. specierum vnguenti citrini, lithargyri auri ana ℥. iiij. cerusæ lotæ ℥. ij. boracis, & aluminis vstarum, tartari calcinati ana quart. ss. succi rad. elennij, oxylapathi, cyclaminis, limonum an. ℥. v. olei ros. lib. j. argentiviui extincti suo liquore, id est, saliuæ ℥. iiij. misce, & fiat vnguentum. Hoc valet ad tubercula faciei elephantorum.

Ad rugas faciei.

R. decoctionis brionæ, decoctionis ficuum an. partes æquales: abluatur facies.

Ad nodos sub cute apparentes, tanquam auellana, in multis partibus corporis.

R. rad croci vel crocum ipsum. Pistetur cū lacte mulieris, exhibeatur vt emplastrum pro vlceribus Italicis.

R. citrini ℥. iiij. olei communis lib. j. bulliant per duas horas, donec ponatur iste puluis, semper agitando.

℞. mastiches, macis, aloës, lithargyri auri, cerusæ ana ʒ. ij. fiat puluis.

Ad solis adustionem.

℞. succi plantag. solani ana ʒ. j. ℥. lithargyri auri, & argenti ana ʒ. j. plumbi vsti ʒ. ℥. tuthiæ præparatæ ʒ. vj. caphuræ ʒ. ℥. olei ros. ceræ q. ℥. misce, fiat vnguentum.

Ad combustionem ignis.

℞. ol. ros. aquæ rosarum, albuminis ouorum, quod satis est, misce, & pareretur, & per quatuor dies admoue loco adusto, quinto die admoue sequens emplastrum.

℞. olei nucum, ceræ nouæ ana ʒ. j. liquecant simul.

Ad combusta aqua & igne.

℞. mediani corticis sambuci ʒ. vj. olei ros. ʒ. j. ℥. mastiches, thuris ana ʒ. ℥. ceræ albæ ʒ. ij. bulliant in lb. iij. aque ad consumptionem medietatis, donec expumetur, & refrigeretur: quod supernatat, idoneum est adustioni adnouere.

Ad scissionem.

℞. succi solani, plantaginis ana ʒ. ij. corticis mediani, sambuci ʒ. j. ol. ʒ. j. coque in duplici vase ad consumptionem succorum, cerusæ lotæ in aqua ros. lithargyri auri ana ʒ. j. ℥. tuthiæ præparatæ ʒ. iij. corticis thuris ʒ. ij. axungię porci recentis sine sale, & lotæ in aqua ros. ʒ. x. ceræ albæ, quod satis est, fiat linimentum. In fine adde albumina ouorum nume. ij. caph. ʒ. ℥. vngatur.

Ad partes igne affectas.

℞. calcis nouæ, vel potius nouæ in aqua ros. lotæ lb. iij. succi ros. plantaginis lb. ij. misc. fiat vnguentum. Ab Auicenna laudatur.

Ad ambusta faciei ex aqua calida.

℞. collyr albi ras. ʒ. iij. (nitendum, ne ad oculos perueniat) aquæ peculi ros. q. satis est, fiat collyrium, quo lauetur.

Ad ambusta experti sunt nonnulli hac exemplastrum felici successu.

℞. olei ros. ʒ. ij. olei ex seminibus cucurbitæ expressi ʒ. j. ℥. ceræ albæ q. ℥. fiat vnguentum, quo vntur combusti.

Ad leniendum faciem post combustionem.

℞. vnguenti pomatæ ʒ. iij. olei rosati ʒ. iij. vnguenti ʒ. ij. fiat linimentum.

Ad combustionem ex empyricis.

Vbi quis exustus est aut aqua calenti, aut igne, imponat partem affectam in aquam frigidam. Si id nequeat fieri, lintea madefacta aqua frigida vicissim parti affectæ imponat. Interim accipe cæpam magnam cum quatuor granis salis. Tere in mortarium, & combustioni impone. Cæpa aufert ignem.

Ad delenda Vestigia morbillorum in pueris.

R. ol. de lilio lib. j. pingued. ʒ. iiij. ol. ros. ʒ. lauentur diu cum aqua ros. & liliorum. Deinde,

R. albumina ouorum recentia numero iiij. in testis suis parentur, & ad ignem parum coagulentur, misce in mortario cum supradictis, amygdal. dulc. & amararum decorticatarum ana ʒ. j. Deinde incorporentur, & pistentur cum supradictis. Adde rad. arundinis ʒ. ij. ʒ. sarco-collæ, seminis melonum cum cortice mundi & abluti, lithargyri auri, sacchari, medullæ anisi, cretæ, ex qua fiunt vasa fictilia, ana ʒ. j. omnia misce in mortario, donec formam linimenti habeant.

Ad pustulas purpureas per corpus dispersas.

R. ol. ros. lb. ʒ. succi plantaginis & solani ana ʒ. ij. cerusæ ʒ. j. sulphuris ʒ. iiij. lithargyri ʒ. j. ʒ. axungię porci ʒ. ij. reducantur omnia in mortario plumbeo, donec ad formam linimenti perueniant, & vngantur partes affectæ.

Ad combustionem ignis & aqua.

Lardum antiquum ferro ignito superpone, deinde excipe guttulas ardentes cadentes in aquam frigidam, & pinguedinem, quæ supernatabit, excipito, & cum aqua ros. subigito, & parti combustæ apponito.

Pro muliere combusta in genu, pectore & collo, ex aqua calida.

R. cerusæ lotæ in aqua ros. ʒ. j. calcis lotæ in aqua ros. vel solani ʒ. iiij. pul. vnguenti citrini ʒ. ʒ. mucilaginis seminis cydoniorum, & pyrorum extractis cum aqua ros. ʒ. iiij. ducantur omnia in mortario, donec acquirant formam linimenti addendo aquæ solani modicum, fiat linimentum ad partem affectam.

Ad idem.

R. vnguenti pomatæ ʒ. iiij. olei ros. ʒ. iiij. vnguenti

cutrini vnc. semis: fiat linimentum.

Aqua distillata ad idem.

℞. sulphuris viui ʒ. v. thuris albi, myrrhæ electæ ana ʒ. iiij. cryſtalli calcinati ʒ. ʒ. succi limonũ ʒ. iiij. caphuræ ʒ. j. ʒ. aque florum fabarũ, ros. ana lb. j. pulueris entur, & simul misceantur, fiat aqua, quæ seruetur ad vsum dictum.

Ad prohibendam caluitiem lauetur vrina.

Ad dentes nigros & erosos.

℞. theriacæ q. j. elixetur cum succo fœniculi & vino albo pro dealbatione dentium.

Ad erosionem dentium.

℞. cornu cerui vlti ʒ. j. mastiches ʒ. vj coralli rub. vlti ʒ. j. fiat puluis, quo fricentur dentes.

Dentifricium optimum.

℞. hyſſi orig. mentæ ana ʒ. ij. aluminis scissilis, cornu cerui, salis communis ana ʒ. j. excipiantur, & vratur in olla, donec in prunas reducatur, adde piperis, pumicis, pyrethri, mastiches ana ʒ. ʒ. myrrhæ odoratæ, cinnomi electi ana ʒ. j. tere subtilissimè, cribra, & seruetur puluis ad dentifricium. Si cum pyramidis forma facere volueris, excipies puluerem styracis vel ladani in aqua ros. In succis sit crusta panis calcinata addita.

Ad splendorem vnguium.

Vnge vngues vnguento amygdalarum amararum.

Psilotrum.

℞. pul. noctuæ ʒ. j. cumini, sanguinis vespertilionis ana ʒ. iiij. fiat linimentum, moschi ʒ. j. hoc in pul. nostro ingreditur lapis marinus, vrtica marina, ana partes æquales. Nam tota substantia capillos euellunt, nec renasci patiuntur. Summopere autem præstandũ est, vt pars, cui debet applicari vnguentum, primò lauetur, lixiuio cinerum sarmentorum id faciet. Quòd si post admotum medicamentum pruritus relinquatur in parte, vnde pili deciderunt, vngatur vnguento albo Rasis, aut decocto feminis hyoscyami, aut feminis caulium. Hoc autem vtendum est, aliis purgato corpore. Nam medicamenta acia ad partes humores attrahunt. Sextus philosophus plethoricus vtitur vrina canina, & lacte canino, & gummi hederæ, & succo thithymali ad depilandum. Non solum euulsos ne renascantur prohibet, sed depilat.

Pro barba.

℞. mellis optimi ℥b. j. foliorum abrotani maris M. ij. misceantur simul, ac distillantur in balneo Marię. Deinde accipe stillaticij liquoris vnc. ij. cineris talpę 3. iij. cineris truncorū cauliū vnc. iij. ladanij purissimi 3. ij. misce, fiat linimentum, quo vtatur ad liniendam barbam.

Ad serpignes.

℞. succi lapathi acuti, rad. cydaminis, ranunculi, serpentarię, ana vnc. j. ꝑ. succi limonum 3. ij. lithargyri aurij vnc. j. ꝑ. thuris mastiches ana 3. v. olei tartari, laurini ana vnc. j. vitreoli albi, boracis vsti ana vnc. ꝑ. axungię porci recenter infusę, & liquefactę q. j. argenti fugitiui vnc. j. ꝑ. olei ros. q. ꝑ. fiat vnguentum satis liquidum.

Quoniam autem sublimatum, cerusa, & omnia ferē metallica ex plumbo dentes ferē denigrant & corrumpunt, hunc in modum cauendum esse videtur hoc incommodum. Dum mulier est fricanda, ore contineat oleum amygdal. dulcium, vel aliquam partem, vel amygdalas antiquas mandat, sed ol. amygd. dulcium est præstantius, quo etiam vti solemus in vñctionibus, quę solent fieri in morbo Italico. Nam argentum viuum non minus, quàm cætera, dentibus infestum est. Tum hoc notatu dignum est, quodd ab omnibus metallicis his splendida facies efficitur, eique veluti uestitorium inducitur, sed indecorem inducit. Quare meliores sunt fuci, qui citra hæc parantur, præsertim pro formosis, quę modicē astringentibus & abstergentibus vti debent,

non autem vehementioribus : quę autem minus sunt formosę & rugosę, vehementioribus vti debent.

F I N I S

